


# R E V U E ARACHNOLOGIQUE

Tome 16, fascicule unique

paru le 28 février 2007

Bernard LE PERU — Catalogue et répartition des araignées de France.



## Revue Arachnologique

La Revue Arachnologique publie des articles originaux concernant les Arachnides (Acariens exceptés) et se rapportant aux diverses disciplines.

L'abonnement se fait par tome. Actuellement, le tome **15** n'est pas achevé. L'abonnement pour le **tome 17** est fixé à 30 €

Les tomes 2 à 14 et 16 sont disponibles complets, aux prix suivants :

t. 1 : (incomplet)	t. 9 : 22,90 €
t. 2 : 16,75 €	t. 10 : 27,40 €
t. 3 : 18,30 €	t. 11 : 27,40 €
t. 4 : 19,80 €	t. 12 : 27,40 €
t. 5 : 19,80 €	t. 13 : 27,40 €
t. 6 : 19,80 €	t. 14 : 30,50 €
t. 7 : 22,90 €	t. 15 : 30,50 € (en cours)
t. 8 : 22,90 €	t. 16 : 50,00 €

- *Pour l'abonnement*, s'adresser à:-  
J.-C. LEDOUX, rue du Ruisseau, 43370 Solignac-sur-Loire (France)  
Adressez les paiements à J.-C. LEDOUX.
- *Les manuscrits* doivent être envoyés à:-  
J.-C. LEDOUX, rue du Ruisseau, 43370 Solignac-sur-Loire (France).

*Revue Arachnologique*, t. **16**.

Bernard LE PERU

**Catalogue et répartition  
des araignées de France**

J.-C. LEDOUX, IMPRIMEUR & ÉDITEUR, 43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE, FRANCE

2007





# Catalogue et répartition des araignées de France

par Bernard LE PERU\*

## Résumé

Ce catalogue présente la liste des espèces d'araignées trouvées en France. Toutes les données disponibles de la littérature concernant la répartition par département, l'altitude, l'habitat et la période de maturité des mâles et des femelles sont fournies, accompagnées des références complètes. Des informations dispersées dans plus de 680 documents sont ainsi regroupées. Les cas litigieux de taxonomie sont succinctement exposés. Une carte de répartition par département est établie pour chacune des 1569 espèces.

## Summary

A check list of French spiders is presented. All available data from literature about distribution by département (territorial and administrative division of France), altitude, habitat and seasonal occurrence of adult males and females are given, with comprehensive references. Informations scattered in more than 680 documents are thereby gathered together. Disputed cases of taxonomy are succinctly explained. A map has been provided for each of the 1569 species, showing the distribution by département.

## Remerciements

Je remercie tout particulièrement Jean-Claude LEDOUX pour les nombreux conseils et ses informations qui m'ont permis d'améliorer ce catalogue, ainsi que pour les documents qu'il m'a communiqué, notamment les publications de l'O.P.I.E.-LR.

Mes remerciements vont également à Jean-François CORNIC et Olivier VILLEPOUX pour leurs remarques concernant la famille des Lycosidae et les documents fournis.

Les gestionnaires de la Réserve des Sites géologiques de l'Essonne, de la Réserve naturelle du Mas Larrieu, de la Réserve naturelle de la Massanne et de la Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, m'ont aimablement communiqué des rapports d'inventaires concernant les araignées; qu'ils en soient remerciés.

## Table des matières

Introduction . . . . .	2
Présentation du catalogue . . . . .	3
Documents utilisés . . . . .	3

Données prises en compte. . . . .	3
Répartition. . . . .	3
Altitude . . . . .	4
Habitat. . . . .	4
Période . . . . .	4
Cartographie. . . . .	4
Taxonomie . . . . .	5
Nomenclature . . . . .	5
Familles . . . . .	5
Synonymies . . . . .	5
Identifications erronées . . . . .	5
Problème des espèces confondues . . . . .	5

Annexes . . . . .	6
Liste des départements . . . . .	6
Liste des familles . . . . .	6
Espèces nouvelles pour la France depuis 1995 . . . . .	7
Nombre d'espèces par département . . . . .	7
Références bibliographiques par département . . . . .	8

Index . . . . .	13
-----------------	----


Bibliographie. . . . .	47
------------------------	----

Catalogue des espèces . . . . .	72
---------------------------------	----

Atypidae . . . . .	72	Araneidae . . . . .	208
Ctenizidae . . . . .	73	Lycosidae . . . . .	225
Nemesiidae. . . . .	73	Pisauridae . . . . .	247
Filistatidae . . . . .	75	Oxyopidae . . . . .	249
Sicariidae. . . . .	75	Zoridae . . . . .	250
Scytodidae . . . . .	75	Agelenidae . . . . .	252
Leptonetidae . . . . .	76	Cybaeidae . . . . .	259
Telemidae . . . . .	77	Hahniidae . . . . .	259
Pholcidae. . . . .	77	Dictynidae . . . . .	262
Segestriidae . . . . .	79	Amaurobiidae . . . . .	268
Dysderidae . . . . .	81	Titanoecidae . . . . .	272
Oonopidae . . . . .	85	Anyphaenidae . . . . .	274
Mimetidae . . . . .	86	Liocranidae . . . . .	275
Eresidae . . . . .	88	Clubionidae . . . . .	278
Oecobiidae . . . . .	88	Corinnidae . . . . .	287
Uloboridae . . . . .	89	Zodariidae . . . . .	289
Nesticidae . . . . .	90	Gnaphosidae . . . . .	291
Theridiidae. . . . .	91	Sparassidae. . . . .	315
Theridiosomatidae . . . . .	112	Philodromidae . . . . .	316
Mysmenidae . . . . .	113	Thomisidae. . . . .	324
Linyphiidae . . . . .	113	Salticidae. . . . .	339
Tetragnathidae . . . . .	200		

Cartes de répartition . . . . .	364
---------------------------------	-----

\* Manuscrit reçu le 21 décembre 2005. Adresse de l'auteur : Gare de Savennes, 19200 Saint-Etienne aux Clos.



## Introduction

Publié de 1914 à 1937, le tome 6 de l'ouvrage « Les Arachnides de France » d'Eugène SIMON se présentait comme le synopsis général et le catalogue des espèces françaises de l'ordre des Araneae. Pour la première fois toutes les familles d'araignées étaient exposées; des tableaux dichotomiques illustrés, accompagnés d'indications biologiques, permettaient une détermination des espèces. Chaque famille était suivie d'un catalogue des espèces, contenant la synonymie utilisée et d'importantes données sur la répartition des espèces.

Depuis lors, quelques travaux à vocation de catalogue ou d'inventaire ont vu le jour, certains concernant une région de France, d'autres limités à un département.

J. DENIS faisait paraître en 1938 les « Éléments d'une faune arachnologique de Bretagne ». Il s'agissait d'une liste de 289 espèces, reprenant les citations anciennes, et accompagnées de récoltes inédites de l'auteur. Des informations précises sur les localités, les habitats et les dates de captures étaient données. Le « Catalogue des araignées des Pyrénées » élaboré par R. BOSMANS et R. DE KEER en 1985 faisait la synthèse des travaux concernant cette région; des nouvelles données y étaient incorporées, et les localités, habitats, altitudes

et dates étaient précisés pour les 860 espèces citées. De la même façon, A. CANARD présentait en 1989 un « Catalogue provisoire des Aranéides de Corse »; les 494 espèces de la liste étaient accompagnées des citations bibliographiques et de données inédites avec les localités, habitats et dates. En 1990 paraissait un document « Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces » réalisé par A. ASSELIN, A. CANARD, O. COUTANT, P. MARC, C. ROLLARD et F. YSNEL. Toutes les données de la littérature concernant la répartition géographique des espèces dans cette région étaient reprises, additionnées de localités inédites et accompagnées d'une carte de répartition pour chacune des 672 espèces.

D'autres travaux similaires se limitaient à l'étude d'un département. Avec les « Éléments d'une faune arachnologique de Vendée » J. DENIS commençait en 1962 une série d'articles sur les araignées du département de la Vendée, qui étaient suivis en 1967 du catalogue « Les Araignées de Loire-Atlantique ». Plus récemment, le département du Maine-et-Loire faisait l'objet d'une étude; un inventaire et une cartographie provisoire des espèces étaient présentés en 1997 par R. VEILLON dans « Les Araignées du Maine-et-Loire ». Là aussi les données de la littérature étaient reprises, accompagnées de récoltes inédites avec des renseigne-

ments précis sur les localités, les habitats, les dates, les techniques de récoltes ; une carte de répartition accompagnait chacune des 255 espèces répertoriées.

Soixante ans après la parution de l'ouvrage de SIMON, une nouvelle liste des araignées de France était publiée en 1997 par A. CANARD et V. CHANSIGAUD sous le titre : «Catalogue provisoire des Araignées de France». Chaque espèce était accompagnée de ses principaux synonymes et de quelques références renvoyant à des ouvrages de détermination ou des catalogues, mais sans aucune autre indication.

Une nouvelle synthèse des données faunistiques et taxonomiques concernant les araignées de l'ensemble de la France s'avérait opportune ; c'est l'objet du présent catalogue.

Toutes les données de la littérature disponible concernant la répartition par département des araignées en France sont regroupées ici, de même que les indications relatives aux habitats, périodes de maturité et altitudes. Des informations dispersées dans plus de 680 documents, articles ou monographies sont ainsi rassemblées. Bien que se voulant être aussi exhaustif que possible, cet inventaire des données présente sans doute des lacunes ; il ne dispense donc pas de consulter les divers travaux originaux. Pour une recherche d'information rapide, il permet cependant d'éviter de recourir à ces documents, dont certains, peu diffusés, sont d'accès difficile. Chaque donnée est accompagnée de sa référence bibliographique ; les erreurs ou omissions pourront ainsi être plus facilement corrigées. Basé uniquement sur l'analyse des travaux publiés, ce catalogue ne contient aucune donnée inédite, et n'est pas une révision, aucun matériel de collection n'ayant été examiné. Toutefois, les cas litigieux de taxonomie sont succinctement exposés, avec les notes, remarques et opinions exprimées par les auteurs des travaux. Des cartes de répartition, établies pour chacune des 1569 espèces, complètent ce catalogue. Avec une bibliographie qui prolonge celle réalisée en 1979 par J. LE DUCHAT D'AUBIGNY, cet ensemble tente ainsi d'offrir un panorama de la répartition des araignées en France.

## Présentation du catalogue

### Documents utilisés.

L'ouvrage «Les Arachnides de France» de SIMON (1874 à 1884), tome 1 à 5, a servi de base pour l'élaboration de ce catalogue. La date de départ pour la prise en compte des autres publications est l'année 1874 ; les travaux antérieurs n'ont pas été utilisés à l'exception des articles de LUCAS (1836 à 1873) qui contiennent de nombreuses données précises. Les publications ont été prises en compte jusqu'à la date du 30 septembre 2005.

Un document n'est retenu que s'il répond, en principe, au critère énoncé dans l'alinéa 1 de l'Article 8-a du Code International de Nomenclature Zoologique définissant ce qui constitue un acte de publication : «il doit être distribué publiquement dans le but de pourvoir à une utilisation scientifique permanente».

### Données prises en compte.

Certains auteurs ont utilisé les mêmes données dans plusieurs ouvrages ou articles sans préciser qu'il s'agissait de répétitions. Éviter ces répétitions aurait néces-

sité la comparaison minutieuse des documents, donnée par donnée. Comme il y a moins d'inconvénient à répéter une même donnée que d'en omettre une, toutes ces données sont donc incluses dans ce catalogue. Les données accompagnées d'une référence bibliographique ne sont pas reprises dans le catalogue, afin d'éviter les redites. Toutefois, quelques documents n'ayant pas été consultés, les données qu'ils contiennent, citées ultérieurement dans d'autres travaux avec une référence bibliographique, sont incorporées au catalogue, sous la référence de ces travaux ultérieurs.

Par ailleurs, dans les «Arachnides de France», E. SIMON fait parfois référence à d'autres auteurs pour les données concernant la répartition des espèces, mais sans fournir d'indication bibliographique. Ces données, qu'elles soient inédites ou qu'elles aient fait l'objet de publications antérieures, sont incluses dans ce catalogue, avec donc la possibilité de répétitions.

Les citations faites d'après des études de spécimens de collection des musées ne sont pas retenues, sauf si elles sont accompagnées de données de répartition inédites.

### Répartition.

Le territoire couvert par cette étude est la France métropolitaine et la Corse. La Principauté d'Andorre, située sur le versant sud de la chaîne pyrénéenne, en est exclue.

Les données concernant la répartition géographique sont présentées par département. Cette représentation est utilisée pour sa commodité ; elle a permis d'inclure de nombreuses données (en particulier extraites de l'ouvrage de SIMON, 1914 à 1937) où seul le département est indiqué.

Par simplification et souci d'homogénéiser la représentation cartographique, les départements actuels Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines sont regroupés en un département «Seine», qui correspond donc aux anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise (modification en 1964). De même, le Territoire de Belfort est arbitrairement incorporé au département du Haut-Rhin et la Principauté de Monaco est incorporée au département des Alpes-Maritimes.

Il est utile de rappeler que certains départements ont changé de nom au cours du siècle dernier : Basses-Alpes, renommé Alpes-de-Haute-Provence en 1970 ; Charente-Inférieure, renommé Charente-Maritime en 1941 ; Côtes-du-Nord, renommé Côtes-d'Armor en 1990 ; Loire-Inférieure, renommé Loire-Atlantique en 1957 ; Basses-Pyrénées, renommé Pyrénées-Atlantiques en 1970 ; Seine-Inférieure, renommé Seine-Maritime en 1955.

Les indications régionales ou nationales mentionnées dans le tome 6 des «Arachnides de France» de SIMON (1914 à 1937) (par exemple «Alpes» ou «Midi de la France») sont citées in extenso, mais ne sont pas incorporées aux données par département.

La présence des espèces dans les pays limitrophes est indiquée. Cette information est extraite des listes d'espèces publiées pour ces pays (Allemagne, Belgique et Suisse : BLICK & al., 2002 ; Espagne : MELIC & al., 2002 ; Grande-Bretagne : HARVEY & al., 2002 ; Italie : PESARINI, 2003). La distribution générale d'après PLATNICK, 2004 est ensuite mentionnée, lorsqu'elle

accroît l'aire de répartition définie jusqu'alors. En cas de contradiction entre les informations fournies par PLATNICK, 2004 et les listes d'espèces des pays limitrophes, la priorité est donnée à ces listes d'espèces.

#### **Altitude.**

Sauf lorsqu'il s'agit de récoltes effectuées en montagne, les altitudes sont rarement précisées dans les travaux. La transcription intégrale des données aurait pu faire croire à la présence préférentielle des espèces en montagne. Aussi ne sont indiquées que les altitudes maximales pour les espèces présentes à la fois en plaine et en montagne, et les altitudes minimales et maximales pour les espèces « montagnardes ». Cette distinction est parfois arbitraire, surtout dans le cas d'espèces peu fréquentes dont la répartition est mal connue. Les espèces sont considérées comme présentes en plaine lorsqu'elles sont citées explicitement d'une altitude inférieure à 500 m, ou lorsqu'elles sont citées d'un département dont le point culminant est inférieur à 500 m. Il faut noter qu'aucune recherche n'a été faite pour déterminer l'altitude des lieux géographiques mentionnés dans les travaux ; seules sont prises en compte les altitudes explicitement indiquées. Les récoltes pourront, parfois de toute évidence, avoir été réalisées à des altitudes inférieures aux minimales indiquées, ou supérieures aux maximales indiquées.

Lorsqu'une seule altitude est disponible pour une espèce, elle est citée telle quelle. Elle est précédée de "jusqu'à" si l'espèce peut être considérée comme présente en plaine et si l'altitude indiquée est supérieure à 500 m.

#### **Habitat.**

Les données concernant les habitats sont citées de manière exhaustive, avec toutes les références. Les dénominations des habitats sont généralement reproduites telles qu'elles paraissent dans les textes originaux. Toutefois certaines modifications ont été apportées afin de permettre des regroupements de données, dans la mesure où ces modifications n'altéraient pas trop le sens original.

Certains termes sont remplacés par un terme semblable : « pré », « marais », « champs cultivés », « dans les feuilles mortes » remplacés respectivement par « prairie », « marécage », « cultures », « litière ». Des expressions ont été réduites : « dune littorale », « détritus végétaux », « intérieur d'une maison », « dans les mousses » deviennent respectivement : « dune », « détritus », « maison », « mousses » ; il en est de même pour la plupart des expressions commençant par « dans ». Les mots « châtaigneraie », « chênaie », « hêtraie » et « pinède » sont remplacés respectivement par « forêt de châtaigniers », « forêt de chênes », « forêt de hêtres » et « forêt de pins ». Les termes « aulnaie », « bétulaie », « oliveraie » et « saulaie » sont maintenus tels quels. Les dénominations sont généralement mises au singulier.

La description des habitats est également modifiée de telle façon que les termes se succèdent du macrohabitat vers le microhabitat, par exemple : « forêt de hêtres, clairière, mousses au sol », ceci afin d'homogénéiser la présentation de ces habitats. Dans certains cas la succession de ces termes constitue une énumération des composantes de l'habitat, de niveau équivalent, par exemple : « forêt de hêtres et de sapins, mousses, sous les pierres, sous les écorces ».

Ne sont pas indiqués les habitats dans lesquels les araignées cherchent refuge seulement pour passer l'hiver.

Le terme « herbes », employé seul, d'une signification trop pauvre, n'est généralement pas retenu.

#### **Période.**

Pour l'indication des périodes de maturité, seules ont été retenues les données mensuelles concernant les individus adultes dont le sexe est précisé, la détermination des juvéniles étant souvent douteuse. La présence des femelles avec leur cocon ou avec leurs jeunes est mentionnée ; dans ce dernier cas, il faut préciser qu'il s'agit de femelle portant ses jeunes (Lycosidae) ou de femelle présente sur une toile avec ses jeunes, quelque soit la forme ou la fonction de cette toile. Les indications des périodes de ponte sont incluses dans la rubrique « femelle avec cocon ».

#### **Cartographie.**

La représentation cartographique se borne à indiquer si une espèce a été citée avec sûreté d'un département ; elle ne fournit aucune donnée quantitative relative au nombre de spécimens récoltés, ni au nombre de citations de l'espèce pour ce département.

La représentation des indications de SIMON, 1914 à 1937, comme « toute la France » ou « Alpes », pose un problème. Par exemple, *Drassodes fugax* est citée de manière formelle de plusieurs départements des Pyrénées et du Gard, mais SIMON, 1914 à 1937, mentionne "Alpes". Ne pas représenter cette information pourrait induire en erreur, la seule vue de la carte faisant croire à la présence de l'espèce uniquement dans les Pyrénées et le Gard, alors qu'elle a été récoltée de façon certaine dans les Alpes. Aussi les données sont représentées sur les cartes à l'aide de deux trames distinctes : l'une pour les départements dans lesquels la présence de l'espèce est formellement indiquée, l'autre pour les départements dans lesquels la présence de l'espèce est probable selon les indications générales ou régionales de SIMON, 1914 à 1937. Il faut toutefois insister sur le fait que les mentions comme « toute la France » ou « presque toute la France » doivent être considérées avec réserve.

La délimitation des régions indiquées par SIMON (1914 à 1937) s'est faite de la façon suivante. Pour le Midi de la France : les départements allant de la Gironde aux Hautes-Alpes, et ceux situés plus au sud ; pour l'Ouest de la France : les départements allant de l'Eure à la Dordogne en passant par le Maine-et-Loire, et ceux situés plus à l'ouest ; pour le Nord de la France : les départements allant de la Seine-Maritime à la Marne, et ceux situés plus au nord ; pour l'Est de la France : les départements allant de la Meuse à l'Isère, et ceux situés plus à l'est. La région Centre de la France est constituée des autres départements. Pour les régions plus restreintes, les départements de ces régions habituellement cités par SIMON (1914 à 1937) ont été pris en compte, par exemples l'Isère et les Hautes-Alpes pour la région Alpes du Dauphiné, ou le Cantal et le Puy-de-Dôme pour la région Auvergne. Néanmoins il est nécessaire d'insister sur le caractère arbitraire de ces limites.

Quelques rares espèces ne possèdent aucune donnée de répartition à l'échelle départementale ou régionale. Afin d'homogénéiser la cartographie, ces espèces dis-

posent d'une carte, mais celle-ci est vide, avec un point d'exclamation placé en son centre.

## Taxonomie

### Nomenclature.

Le but de ce catalogue n'étant pas d'exposer les dernières innovations taxonomiques, la stabilité de la nomenclature a été privilégiée lors des choix effectués entre les diverses dénominations des espèces.

En ce qui concerne l'exhumation de noms anciens, sous prétexte d'application des règles de priorité ou d'homonymie, l'opinion de BONNET, 1955, suivie dans ce catalogue, mérite d'être citée: «J'ai lutté contre cette absurdité qu'il y a, en appliquant ces règles, de remplacer un nom très en vogue par un terme inconnu, ignoré depuis longtemps ou par un terme nouveau». Il peut être utile de rappeler l'article 23.2 du Code International de Nomenclature Zoologique (ou ICZN), quatrième édition: «Le Principe de Priorité doit être employé pour promouvoir la stabilité. Il n'est pas destiné à contrarier l'usage, dans sa signification habituelle, d'un nom accepté depuis longtemps par l'introduction d'un nom inutilisé qui est son synonyme ou homonyme plus ancien.» («The Principle of Priority is to be used to promote stability and it is not intended to be used to upset a long-accepted name in its accustomed meaning by the introduction of a name that is its senior synonym or homonym.»).

La division d'un genre, le déplacement d'une espèce d'un genre à l'autre, ne sont retenus, généralement, que si ces modifications ont été utilisées majoritairement par les auteurs ultérieurs, soit dans les ouvrages de détermination, soit lors des citations d'espèces dans les travaux ayant servi à la réalisation de ce catalogue. Les synonymies, même celles récemment établies, sont dans la plupart des cas adoptées.

### Familles.

L'ordre des familles est celui adopté par le catalogue de PLATNICK, 2004, avec toutefois quelques différences dans la composition de ces familles: le genre *Cepheia* est maintenu dans la famille des Mysmenidae (au lieu des Synsphyridae), le genre *Louisfagea* (= *Pimoida*) est maintenu dans la famille des Linyphiidae (au lieu des Pimoidae), le genre *Zoropsis* est maintenu dans la famille des Zoridae (au lieu des Zoropsidae), le genre *Cheiracanthium* est maintenu dans la famille des Clubionidae (au lieu des Miturgidae). À l'intérieur des familles les espèces sont rangées par ordre alphabétique des genres et espèces.

### Synonymies.

La liste recense 1569 espèces. Les sous-espèces et variétés ne sont pas traitées; les données qui leurs sont attribuées sont regroupées sous le nom de l'espèce *sensu lato*. Toutefois, lorsqu'elles sont actuellement élevées au rang d'espèce, les sous-espèces sont prises en considération, leurs données traitées séparément et leurs noms inclus dans les listes de synonymes. Par exemple l'ancienne sous-espèce *Meta segmentata mengi* est actuellement élevée au rang d'espèce sous le nom *Meta mengi*; les données qui concernaient cette sous-espèce sont placées sous l'espèce *Meta mengi*, et non pas sous *Meta segmentata*.

Les récoltes anciennes sont souvent faites sous des noms d'espèce différents de ceux utilisés aujourd'hui; ces données n'ont été retenues que lorsque les synonymies ont pu être établies à l'aide des ouvrages de BONNET, 1945 à 1961, ROEWER, 1942 et 1954, BRIGNOLI, 1983 et PLATNICK, 2004.

Afin d'alléger le texte du catalogue, quelques mesures ont été prises pour réduire la liste des synonymes. Les noms contenant des fautes d'orthographe ou typographiques sont exclus de la liste des synonymes; les données sont placées naturellement sous le nom correct de l'espèce. Il en est de même pour les noms d'espèces commençant par une lettre capitale, les noms d'espèces comportant un trait d'union (hors les cas actuellement valides). Les noms d'espèces dont l'écriture diffère par une seule lettre située au milieu ou à la fin du nom, et dont la reconnaissance est sans ambiguïté, sont également considérés identiques (par exemple «*microphthalma*» et «*microphtalma*», «*kochi*» et «*kochii*»). Par contre sont mentionnées les diverses formes de terminaisons latines des noms de genre ou d'espèce, hors les cas ci-après.

Quelques noms de genres bien connus, et contenant de nombreuses espèces, possèdent des orthographes multiples, qui sont exclues de la liste des synonymes. Ces genres sont les suivants, avec entre parenthèses les différentes orthographes utilisées: *Araneus* (*Aranea*), *Cheiracanthium* (*Chiracanthium*), *Euophrys* (*Evophrys*), *Leptyphantus* (*Leptyphante*, *Leptyphanter*, *Leptyphante*, *Lephtyphantus*), *Oxyptila* (*Oxypitila*), *Theridion* (*Theridium*), *Walckenaeria* (*Walckenaera*) et *Zodarium* (*Zodarium*). La reconnaissance de ces termes ne présente pas de difficulté et est sans ambiguïté.

### Identifications erronées.

Les corrections des identifications erronées sont prises en compte lorsque les auteurs de ces corrections donnent des informations précises sur les collections examinées, les spécimens en cause et leur localité, ou lorsqu'il s'agit d'un auteur corrigeant ses propres erreurs. Le nom utilisé à tort est alors suivi de la mention «err.», ce qui permet de faire la distinction entre ces noms et les synonymes. Lorsqu'un auteur indique de manière globale qu'une espèce a été mal identifiée, cette opinion est mentionnée, mais les citations sont laissées sous le nom d'espèce utilisé dans les travaux originaux.

### Problème des espèces confondues.

Certaines situations sont difficiles à traiter correctement. C'est le cas des espèces actuellement séparées qui ont été, à une époque ancienne, confondues sous un même nom. Il n'est alors pas possible de savoir à quelle espèce attribuer les citations anciennes. Seule une révision complète de ces espèces, avec un examen des collections, permettrait de résoudre ces problèmes. En l'absence d'informations nécessaires, les données sont placées sous le nom utilisé dans les travaux originaux. Cela conduit, de fait, à des répartitions qui sont inexactes; dans ces cas, les cartes représentent davantage la répartition d'une dénomination que la répartition réelle d'une espèce. Il faut insister sur le fait que ce catalogue ne résout pas ces situations confuses; au mieux, il ne fait qu'exposer les problèmes.

## Annexes

### Liste des départements

Ain	Gard	Pas-de-Calais
Aisne	Garonne (Haute-)	Puy-de-Dôme
Allier	Gers	Pyrénées (Basses-) = Pyrénées-
Alpes (Basses-) = Alpes-de-Haute-	Gironde	Atlantiques
Provence	Hauts-de-Seine (voir « Seine »)	Pyrénées (Hautes-)
Alpes (Hautes-)	Hérault	Pyrénées-Atlantiques
Alpes-Maritimes	Ille-et-Vilaine	Pyrénées-Orientales
Alpes-de-Haute-Provence	Indre	Rhin (Bas-)
Ardennes	Indre-et-Loire	Rhin (Haut-)
Ardèche	Isère	Rhône
Ariège	Jura	Sarthe
Aube	Landes	Savoie
Aude	Loir-et-Cher	Savoie (Haute-)
Aveyron	Loire	Saône (Haute-)
Bouches-du-Rhône	Loire (Haute-)	Saône-et-Loire
Calvados	Loire-Atlantique	« Seine »
Cantal	Loire-Inférieure = Loire-Atlantique	Seine-et-Oise (voir « Seine »)
Charente	Loiret	Seine-Inférieure = Seine-Maritime
Charente-Inférieure = Charente-	Lot	Seine-Maritime
Maritime	Lot-et-Garonne	Seine-et-Marne
Charente-Maritime	Lozère	Seine-St-Denis (voir « Seine »)
Cher	Maine-et-Loire	Somme
Corrèze	Manche	Sèvres (Deux-)
Corse	Marne	Tarn
Creuse	Marne (Haute-)	Tarn-et-Garonne
Côte-d'Or	Mayenne	Val-de-Marne (voir « Seine »)
Côtes-d'Armor	Meurthe-et-Moselle	Val d'Oise (voir « Seine »)
Côtes-du-Nord = Côtes-d'Armor	Meuse	Var
Dordogne	Morbihan	Vaucluse
Doubs	Moselle	Vendée
Drôme	Nièvre	Vienne
Essonne (voir « Seine »)	Nord	Vienne (Haute-)
Eure	Oise	Vosges
Eure-et-Loire	Orne	Yonne
Finistère	Paris (voir « Seine »)	Yvelines (voir « Seine »)

### Remarques :

Par simplification et souci d'homogénéiser la représentation cartographique, les départements actuels Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines sont regroupés en un département « Seine », qui correspond donc aux anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise (modification en 1964). De même, le Territoire de Belfort est arbitrairement incorporé au département du Haut-Rhin et la Principauté de Monaco est incorporée au département des Alpes-Maritimes.

Il est utile de rappeler que certains départements ont changé de nom au cours du siècle dernier : Basses-Alpes, renommé Alpes-de-Haute-Provence en 1970 ; Charente-Inférieure, renommé Charente-Maritime en 1941 ; Côtes-du-Nord, renommé Côtes-d'Armor en 1990 ; Loire-Inférieure, renommé Loire-Atlantique en 1957 ; Basses-Pyrénées, renommé Pyrénées-Atlantiques en 1970 ; Seine-Inférieure, renommé Seine-Maritime en 1955.

### Liste des familles

Atypidae	Eresidae	Zoridae	Sparassidae
Ctenizidae	Oecobiidae	Agelenidae	Philodromidae
Nemesiidae	Uloboridae	Cybaeidae	Thomisidae
Filistatidae	Nesticidae	Hahniidae	Salticidae
Sicariidae	Theridiidae	Dictynidae	
Scytodidae	Theridiosomatidae	Amaurobiidae	
Leptonetidae	Mysmenidae	Titanoecidae	Miturgidae : voir Clubionidae
Telemidae	Linyphiidae	Anyphaenidae	Pimoidae : voir Linyphiidae
Pholcidae	Tetragnathidae	Liocranidae	Synphridae : voir Mysmenidae
Segestriidae	Araneidae	Clubionidae	Zoropsidae : voir Zoridae
Dysderidae	Lycosidae	Corinnidae	
Oonopidae	Pisauridae	Zodariidae	
Mimetidae	Oxyopidae	Gnaphosidae	

### Espèces nouvelles pour la France depuis 1995

Liste des espèces nouvelles pour la France découvertes durant les dix dernières années, suivies de la référence bibliographique. Les espèces sont dans l'ordre adopté dans le catalogue.

*Enoplognatha diversa*: BOSMANS & al., 1999  
*Enoplognatha gemina*: BOSMANS & al., 1999  
*Enoplognatha oelandica*: BOSMANS & al., 1999  
*Enoplognatha quadripunctata*: BOSMANS & al., 1999  
*Steatoda italica*: KNOFLACH, 1996a  
*Theridion dromedaria*: KNOFLACH & al., 2000  
*Agyneta cauta*: LEDOUX & al., 1996c  
*Agyneta decora*: ROLLARD, 2000  
*Asthenargus perforatus*: BLICK, 2000  
*Baryphyma maritimum*: BONTE, 2000  
*Caviphantes saxetorum*: HEIDT & al., 1998  
*Centromerus subalpinus*: LEDOUX & al., 1996c  
*Entelecara errata*: LEDOUX & al., 1996a  
*Eperigone trilobata*: BLICK, 2000  
*Lepthyphantes angulatus*: LEDOUX & al., 1996a  
*Lepthyphantes complicatus*: LEBORGNE & al., 1998  
*Lepthyphantes pseudoarciger*: LEDOUX & al., 1996b  
*Lepthyphantes variabilis*: LEDOUX & al., 1996c  
*Linyphia alpicola*: HELSDINGEN, 1995  
*Macrargus carpenteri*: LEDOUX & al., 2003  
*Mecynargus foveatus*: LEDOUX & al., 2003  
*Meioneta equestris*: LEDOUX & al., 2003  
*Panamomops mutilus*: LEDOUX, 2000  
*Porrhomma oblitum*: BLICK, 2000 et LEDOUX, 2000

*Sciastes carli*: LEDOUX & al., 1996c  
*Tapinocyboides pygmaeus*: DUFFEY & al., 2004  
*Trichoncus auritus*: LEDOUX & al., 1996a  
*Trichoncus helveticus*: LEDOUX, 2000  
*Trichoncus similipes*: LEDOUX & al., 1999b  
*Trichoncus trifidus*: LEDOUX & al., 1996a  
*Typhochrestus bogarti*: LEDOUX & al., 1999a  
*Araniella displicata*: ROLLARD, 2000  
*Pardosa saltans*: TÖPFER-HOFMANN, 2000  
*Pardosa sordidata*: EMERIT & al., 2004c  
*Tegenaria dalmatica*: LEDOUX, 2004b  
*Hahnia difficilis*: LEDOUX & al., 1996b  
*Mastigusa macrophthalma*: BRAUD & al., 2005  
*Clubiona pseudoneglecta*: MERRETT, 2001  
*Zodarion couseransense*: BOSMANS, 1997  
*Zodarion ruffoi*: BOSMANS, 1997  
*Cryptodrassus hungaricus*: LEDOUX & al., 2004b  
*Gnaphosa cantabrica*: LEDOUX & al., 2003  
*Gnaphosa nigerrima*: VILLEPOUX & al., 2004  
*Gnaphosa opaca*: BRAUD & al., 2004  
*Micaria pallipes*: BOSMANS & al., 2000  
*Micaria triguttata*: LEDOUX & al., 2003  
*Philodromus buchari*: MUSTER & al., 2004  
*Philodromus lunatus*: MUSTER & al., 2004  
*Tmarus horvathi*: LEDOUX & al., 1995  
*Evarcha michailovi*: LEDOUX & al., 1996a  
*Talavera aperta*: BLICK, 2000  
*Talavera inopinata*: LOGUNOV & al., 2003  
*Talavera krocha*: LOGONOV & al., 2003  
*Talavera monticola*: LEDOUX & al., 1995


### Nombre d'espèces par département

Le premier nombre est le nombre d'espèces citées explicitement du département. Le nombre entre crochets est le nombre cumulé d'espèces en tenant compte des indications régionales et nationales de SIMON, 1914 à 1937.


Il faut insister sur le fait que ces valeurs ne représentent que partiellement le nombre réel des espèces, et qu'elles dépendent de l'intensité des prospections réalisées. Ainsi le département des Pyrénées-Orientales, le plus riche en nombre d'espèces citées, est aussi celui qui bénéficie du plus grand nombre de références bibliographiques.

Ain: . . . . .	237	[431]
Aisne: . . . . .	100	[392]
Allier: . . . . .	6	[359]
Alpes (Hautes-): . . . . .	211	[590]
Alpes-Maritimes: . . . . .	383	[700]
Alpes-de-Haute-Provence: . . . . .	292	[610]
Ardennes: . . . . .	52	[358]
Ardèche: . . . . .	195	[528]
Ariège: . . . . .	277	[549]
Aube: . . . . .	226	[452]
Aude: . . . . .	144	[512]
Aveyron: . . . . .	46	[446]
Bouches-du-Rhône: . . . . .	409	[632]
Calvados: . . . . .	348	[445]
Cantal: . . . . .	87	[404]
Charente: . . . . .	48	[379]
Charente-Maritime: . . . . .	202	[431]

Cher: . . . . .	36	[380]
Corrèze: . . . . .	205	[396]
Corse: . . . . .	512	[703]
Creuse: . . . . .	0	[353]
Côte-d'Or: . . . . .	37	[364]
Côtes-d'Armor: . . . . .	237	[414]
Dordogne: . . . . .	107	[401]
Doubs: . . . . .	227	[413]
Drôme: . . . . .	56	[462]
Eure: . . . . .	329	[454]
Eure-et-Loire: . . . . .	15	[355]
Finistère: . . . . .	270	[441]
Gard: . . . . .	175	[536]
Garonne (Haute-): . . . . .	190	[508]
Gers: . . . . .	219	[474]
Gironde: . . . . .	237	[502]
Hérault: . . . . .	190	[512]
Ille-et-Vilaine: . . . . .	339	[465]
Indre: . . . . .	4	[354]
Indre-et-Loire: . . . . .	12	[359]
Isère: . . . . .	168	[471]
Jura: . . . . .	77	[407]
Landes: . . . . .	171	[490]
Loir-et-Cher: . . . . .	257	[421]
Loire: . . . . .	27	[379]
Loire (Haute-): . . . . .	11	[357]
Loire-Atlantique: . . . . .	166	[415]
Loiret: . . . . .	182	[412]
Lot: . . . . .	79	[432]
Lot-et-Garonne: . . . . .	118	[446]
Lozère: . . . . .	58	[486]
Maine-et-Loire: . . . . .	386	[483]



Nombre d'espèces par département, en tenant compte des citations explicites et des indications régionales ou nationales de SIMON, 1914 à 1937.



Manche : . . . . .	164	[390]	Var : . . . . .	489	[666]
Marne : . . . . .	75	[367]	Vaucluse : . . . . .	368	[587]
Marne (Haute-) : . . . . .	14	[346]	Vendée : . . . . .	386	[514]
Mayenne : . . . . .	25	[347]	Vienne : . . . . .	21	[359]
Meurthe-et-Moselle : . . . . .	24	[350]	Vienne (Haute-) : . . . . .	29	[376]
Meuse : . . . . .	5	[345]	Vosges : . . . . .	34	[354]
Morbihan : . . . . .	385	[501]	Yonne : . . . . .	102	[372]
Moselle : . . . . .	92	[367]			
Nièvre : . . . . .	20	[367]			
Nord : . . . . .	210	[425]			
Oise : . . . . .	176	[425]			
Orne : . . . . .	209	[406]			
Pas-de-Calais : . . . . .	219	[424]			
Puy-de-Dôme : . . . . .	188	[436]			
Pyrénées (Hautes-) : . . . . .	360	[600]			
Pyrénées-Atlantiques : . . . . .	314	[582]			
Pyrénées-Orientales : . . . . .	801	[875]			
Rhin (Bas-) : . . . . .	229	[419]			
Rhin (Haut-) : . . . . .	324	[447]			
Rhône : . . . . .	40	[387]			
Sarthe : . . . . .	26	[354]			
Savoie : . . . . .	54	[405]			
Savoie (Haute-) : . . . . .	351	[528]			
Saône (Haute-) : . . . . .	12	[342]			
Saône-et-Loire : . . . . .	8	[355]			
"Seine" : . . . . .	486	[549]			
Seine-Maritime : . . . . .	296	[425]			
Seine-et-Marne : . . . . .	444	[520]			
Somme : . . . . .	257	[411]			
Sèvres (Deux-) : . . . . .	2	[346]			
Tarn : . . . . .	75	[433]			
Tarn-et-Garonne : . . . . .	79	[440]			

### Références bibliographiques par département

Le nombre de références pour chaque département est indiqué entre crochets.

- Ain :** BOURNE, 1977; CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1958b; DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; HEIDT & *al.*, 1998; HUBERT, 1964a; KNOFLACH, 1996b; PRUDON, 1894; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1884a, 1884b, 1926, 1929, 1932, 1937; VILLEPOUX, 1990b; VLIJM, 1971. [24 références].
- Aisne :** COUTANCEAU & *al.*, 1992; DENIS, 1939b; GROS, 2004; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1880b, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1887b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; THALER, 1975. [18 références].
- Allier :** SIMON, 1876a, 1926, 1932, 1937. [4 références].
- Alpes (Hautes-) :** BIGOT & *al.*, 1981; BOSMANS & *al.*, 1999; BRIGNOLI, 1978; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; GAUTIER, 1980, 1981; HECLIAK & *al.*, 1984;



- HELSDINGEN, 1969, 1995; HUBERT, 1964b; JEANNEL, 1926; MÜLLER, 1985; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b; SIMON, 1874a, 1875a, 1875d, 1876a, 1878a, 1879, 1881a, 1882, 1884a, 1884b, 1913, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [30 références].
- Alpes-Maritimes:** BECKER, 1881, 1882; BERLAND, 1926, 1935; BOSMANS, 1997; BOSMANS & al., 1994, 1999, 2000; BRIGNOLI, 1978, 1979a, 1984; BUCHLI, 1970; CORNIC, 1978; DALMAS, 1915, 1916, 1919, 1920; DENIS, 1938b, 1957b, 1964c, 1964d, 1965a, 1967b; DEVILLE, 1902; DRESKO, 1957d, 1962, 1966, 1987; DRESKO & al., 1968; GRIMM, 1982, 1985; HELSDINGEN, 1969; HUBERT, 1964a; IORIO, 2003c, 2003d; JEANNEL, 1926; KNOFLACH, 1999; LUCAS, 1874b; LUQUETTI & al., 1969; MAURER, 1981; MAURER & al., 1988; MUSTER & al., 2004; PICKARD-CAMBRIDGE, 1874; PLANET, 1905; RODMAN, 1919; SEGERS, 1992; SENGLLET, 1972, 2001; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1881b, 1882, 1884a, 1884b, 1898c, 1907a, 1907b, 1911, 1913, 1914, 1916, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; THORELL, 1875; WESOLOWSKA, 1986. [71 références].
- Alpes-de-Haute-Provence:** BOSMANS, 1997; BOSMANS & al., 1999; BRIGNOLI, 1978; DRESKO, 1962, 1966, 1987; DRESKO & al., 1975; JEANNEL, 1926; KRAUS & al., 1974; LUCZACK & al., 1964; METZNER, 1999; MÜLLER, 1985; PEYERIMHOFF, 1906; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b; SIMON, 1874a, 1874b, 1875a, 1875b, 1875d, 1876a, 1878a, 1879, 1881a, 1882, 1884a, 1884b, 1898c, 1913, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; WUNDERLICH, 1994b. [35 références].
- Ardennes:** BOSMANS, 1994; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969; LENICE, 1992; SIMON, 1884b, 1926, 1929. [7 références].
- Ardèche:** BALAZUC & al., 1952, 1954; BOSMANS, 1997; BOSMANS & al., 1999; BRIGNOLI, 1979b; DRESKO, 1952b, 1957c, 1959b, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; HELSDINGEN & al., 1977; HOLLANDER & al., 1972; HUBERT, 1964a, 1964b; JEANNEL, 1926; LEDOUX, 1979, 2004a; LEVY, 2002; LUCAS, 1870b; MUSTER & al., 2004; RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1882, 1884a, 1884b, 1911, 1913, 1914, 1915b, 1922, 1926, 1929, 1932, 1937; VIRE, 1896; VLIJM, 1971; WUNDERLICH, 1994d. [44 références].
- Ariège:** BOSMANS, 1997; BOSMANS & al., 1999; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1953b, 1959a, 1960a, 1961b, 1962f, 1962g, 1963d, 1965a, 1965b, 1967d; DRESKO, 1951, 1953, 1957c, 1957d, 1962, 1966, 1989; DRESKO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a, 1964b, 1969; JEANNEL, 1926; KNOFLACH, 1993a, 1996a; LOGUNOV, 2000; LOPEZ & al., 1978a; LUCANTE, 1880a, 1880b; PLATNICK & al., 1996; SENGLLET, 2004; SIMON, 1874a, 1875a, 1881a, 1882, 1884a, 1884b, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1914, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937. [51 références].
- Aube:** PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b; SIMON, 1874a, 1875a, 1875d, 1876a, 1878a, 1879, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [17 références].
- Aude:** BONARIC, 1974; BOSMANS & al., 1999; BRIGNOLI, 1978; DALMAS, 1916; DELFOSSE, 2000a, 2000b; DENIS, 1959a, 1961b, 1967d; DRESKO, 1962, 1966; FAGE, 1913, 1919, 1931; JEANNEL, 1926; MILLIDGE, 1979; SENGLLET, 2004; SIMON, 1875a, 1876a, 1876c, 1878a, 1881a, 1881b, 1882, 1884a, 1884b, 1907a, 1910, 1911, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [34 références].
- Aveyron:** BRAUD & al., 2004; DRESKO, 1957d, 1959b, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968; GROS, 1982, 1983a; HUBERT, 1964a, 1969; JEANNEL, 1926; SIMON, 1876a, 1878a, 1879, 1881a, 1884b, 1911, 1914, 1926, 1932, 1937. [21 références].
- Bouches-du-Rhône:** BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1973, 1977, 1983, 1985; BOSMANS, 1997; BOSMANS & al., 1994, 1999, 2000; CORNIC & al., 2004; DALMAS, 1916; DENIS, 1937c, 1948d, 1949c, 1949d, 1950c, 1954b, 1963f, 1963g, 1964c, 1965a, 1966c, 1967b, 1967c; DRESKO, 1952b, 1962, 1966; GRIMM, 1985; HELSDINGEN, 1969; HOLLANDER & al., 1972; JEANNEL, 1926; KABOUÏCHE & al., 1997; LEDOUX, 2000; LOPEZ & al., 1973; LUCZACK & al., 1964; METZNER, 1997, 1999; MILLIDGE, 1975a, 1975b, 1979; PETIT & al., 1945; PLATNICK & al., 1984; REHFELDT, 1992; SEGERS, 1992; SIMON, 1874a, 1875c, 1876a, 1878a, 1880b, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1913, 1914, 1915a, 1926, 1929, 1932, 1937; SOYER, 1953a, 1953b, 1955, 1959, 1963, 1964, 1966, 1967, 1973; TONGIORGI, 1974. [71 références].
- Calvados:** ASSELIN & al., 1989; CANARD, 1990a; DENIS, 1942, 1943e, 1947c, 1948c, 1963f; DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1942, 1943, 1946; KERVILLE, 1898; LUCAS, 1863, 1870c, 1870d, 1870e, 1874c, 1877b; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [30 références].
- Cantal:** DENIS, 1947c; SIMON, 1876a, 1878a, 1879, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; VILLEPOUX & al., 2004. [14 références].
- Charente:** DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a; SIMON, 1884b, 1914, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937. [10 références].
- Charente-Maritime:** BELIN, 2001; BIGOT, 1983; BOSMANS, 1994, 1997; BOSMANS & al., 1999; DRESKO, 1966; DRESKO & al., 1968; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1874a, 1874d, 1875a, 1876a, 1876b, 1878a, 1879, 1881a, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1932, 1937; THIRION, 1998; WUNDERLICH, 1994d. [24 références].
- Cher:** DENIS, 1943b, 1944b, 1945b, 1947c, 1962g. [5 références].
- Corrèze:** BOSMANS, 1997; JUBERTHIE, 1954; LE PERU, 2004; SIMON, 1878a, 1929, 1932. [6 références].
- Corse:** BERLAND, 1922; BIGOT, 1977; BOSMANS, 1997; BOSMANS & al., 1999, 2000; BRIGNOLI, 1971, 1974; CANARD, 1989; DALMAS, 1916, 1921; DENIS, 1935c, 1937e, 1965a; DRESKO, 1957d, 1966, 1986; FAGE, 1943; GERHARDT, 1928; GRASSHOFF, 1959, 1983; GRIMM, 1985; HARM, 1971; HEIMER & al., 1988; HELSDINGEN, 1969; HIPPA & al., 1983; HUBERT, 1964b; KNOFLACH, 1993b, 1994, 1996a, 1996b, 1999; KNOFLACH & al., 2000; KRAUS, 1955; LEDOUX, 1963, 1967; LOGUNOV, 2000; METZNER, 1997, 1999; MILLIDGE, 1975a, 1979; MORTON, 1922; MÜLLER, 1986; MÜLLER & al., 1991; MUSTER & al., 2004; O'NEIL, 1979; PHISALIX, 1922; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b; PLATNICK &

- al.*, 1996; REMY, 1950; RENNER, 1987; ROEWER, 1926; SCHARFF, 1894; SENGLER, 1972, 2001, 2004; SIMON, 1874a, 1874b, 1875a, 1876a, 1876e, 1878a, 1881a, 1881c, 1882, 1884a, 1884b, 1910, 1914, 1915a, 1926, 1929, 1932, 1937; THALER, 1986, 1990; TIBERGHIEU & *al.*, 1993a, 1993b; TONGIORGI, 1966; TÖPFFER-HOFMANN & *al.*, 2000; VERNEAU, 2000; VLIJM, 1971; WESOŁOWSKA, 1986; WUNDERLICH, 1977, 1979, 1980a, 1980b, 1994a, 1994c. [89 références].
- Côte-d'Or**: Anonyme, 1992; DENIS, 1938a; DRESKO, 1956, 1957c, 1959b, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; LACOMBLE, 1992; REMY, 1946; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1884a, 1884b, 1914, 1929, 1937. [23 références].
- Côtes-d'Armor**: ASSELIN, 1990; CANARD, 1983, 1984, 1990a, 1990b; CAZALET, 1935; COUTANT, 1990; DENIS, 1938a, 1968b; DRESKO, 1966, 1971a, 1971b, 1972, 1973, 1974b, 1975; DRESKO & *al.*, 1974, 1975; GROS, 2004; LUCAS, 1871a; MARC, 1990a; RAZET, 1953; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SALMON, 1959; SIMON, 1875a, 1876a, 1876d, 1881a, 1884a, 1932, 1937; THOMAS, 1988; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [37 références].
- Creuse**: aucune donnée.
- Dordogne**: BOSMANS, 1997; DENIS, 1944b, 1944c, 1945b, 1947c, 1962g, 1965a; DRESKO, 1959a; EMERIT, 2002; JUBERTHIE, 1954; KNOFLACH, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999b, 2001, 2004a; LUCANTE, 1880a, 1880b; PLATNICK & *al.*, 1984; SIMON, 1878b, 1911, 1926, 1929, 1932, 1937; THOMAS, 1999. [25 références].
- Doubs**: BOSMANS & *al.*, 1999; DRESKO, 1959c, 1962, 1966; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; EMERIT & *al.*, 1997; FAGE, 1931; GROS, 1982; HUBERT, 1964a; REMY, 1946; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1926, 1937. [16 références].
- Drôme**: BIGOT & *al.*, 1985; DRESKO, 1953, 1957d, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; FAGE, 1931; HELSDINGEN, 1969; HOLLANDER & *al.*, 1972; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1876a, 1913, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; VLIJM, 1971. [18 références].
- Eure**: EMERIT & *al.*, 2003; GRIMM, 1986; HELSDINGEN & *al.*, 1977; LANCELEVÉE, 1884; PLATNICK & *al.*, 1984; SIMON, 1878a, 1878e, 1880a, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1899, 1909a, 1909b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [20 références].
- Eure-et-Loire**: SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1884a, 1884b, 1926. [6 références].
- Finistère**: ASSELIN, 1990; BAUDOIN, 1946; BIGOT, 1983; BOSMANS & *al.*, 2000; CANARD, 1983, 1984, 1990a, 1990b; COUTANT, 1990; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1947c, 1963d; DRESKO, 1957a, 1971a, 1971b, 1972, 1973, 1975; LEDOUX & *al.*, 1996a; LUCAS, 1868; MANACH, 1995; MARC, 1990a; PIERRE & *al.*, 1947; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1926, 1929, 1932, 1937; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [35 références].
- Gard**: BIGOT, 1983; BIGOT & *al.*, 1982b; BOSMANS, 1994, 1997; BRIGNOLI, 1971, 1978; CHANSIGAUD & *al.*, 1994; DENIS, 1962a, 1965a, 1967b; DRESKO, 1952b, 1957d, 1959b, 1962, 1966, 1982; EMERIT & *al.*, 1994, 2004b; FAGE, 1913, 1931; HELSDINGEN, 1969; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; JÉZÉQUEL, 1961; LEDOUX, 1963, 1973, 1977, 1979, 2000, 2004a; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a, 2001, 2004a, 2004b; LUCAS, 1845; RAHOLA, 2005; SIMON, 1876a, 1878c, 1884b, 1901, 1907a, 1911, 1913, 1914, 1915b, 1922, 1926, 1929, 1932, 1937; THÉLÉSPHORE, 1878. [52 références].
- Garonne (Haute-)**: BONNET, 1925, 1931, 1932; BOSMANS, 1997; DENIS, 1939b, 1953b, 1954a, 1959a, 1960a, 1962c, 1962f, 1962g, 1965a, 1967b, 1967d; DRESKO, 1947a, 1953, 1962, 1966, 1979; DRESKO & *al.*, 1961, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE, 1954; JUBERTHIE-JUPEAU & *al.*, 1981; KERVILLE, 1927, 1932, 1935; LOPEZ & *al.*, 1978a; LUCANTE, 1880a, 1880b; MARPLES, 1935; RENNER, 1987; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1910, 1911, 1914, 1926, 1929, 1937. [45 références].
- Gers**: DENIS, 1959b; DRESKO, 1959a; GROS, 2004; JEANNEL, 1926; LUCANTE, 1880a, 1880b; SIMON, 1875a, 1875b, 1876a, 1878a, 1878b, 1881a, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [19 références].
- Gironde**: AMANIEU & *al.*, 1963; BECKER, 1879b; CAUSSANEL, 1970; DENIS, 1951b, 1952a; DRESKO, 1966; DRESKO & *al.*, 1968; LUCANTE, 1880a, 1880b; MAGNÉ, 1967, 1969; SIMON, 1874a, 1874b, 1875a, 1876a, 1878a, 1878b, 1879, 1881a, 1881b, 1881c, 1882, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; THOMAS, 1999; VLIJM, 1971. [31 références].
- Hérault**: BONARIC, 1974, 1985, 1987; BOSMANS, 1997; CAILAR & *al.*, 1951; CASTELNAU, 1897; DENIS, 1963e; DRESKO, 1957d, 1959b, 1962, 1966, 1982, 1987; DRESKO & *al.*, 1968; EMERIT, 2002; EMERIT & *al.*, 1985, 1990, 2004b; FAGE, 1931; HELSDINGEN, 1969; HOLLANDER & *al.*, 1972; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE & *al.*, 1988; KNOFLACH & *al.*, 2000; LEDOUX, 1963, 1967, 1973, 1973b, 1979; LEDOUX & *al.*, 2001, 2004a; LEGENDRE, 1973; LOPEZ, 1973, 1974, 1975, 1976; LOPEZ & *al.*, 1977, 1978b, 1979, 1981, 1985; LUCAS, 1845; METZNER, 1999; SENGLER, 2001; SIMON, 1874a, 1874b, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1881b, 1881c, 1882, 1884a, 1884b, 1910, 1911, 1914, 1922, 1926, 1929, 1932, 1937; WESOŁOWSKA, 1986. [65 références].
- Ille-et-Vilaine**: ASSELIN, 1990; BOSMANS & *al.*, 1999; CANARD, 1979, 1980, 1982a, 1982b, 1983, 1984, 1990a, 1990b, 1990c; CAZALET, 1935; COUTANT, 1990; DENIS, 1938a, 1940a, 1968b; DRESKO, 1971a, 1974a, 1975; MARC, 1990a, 1990b; RAZET, 1953; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1884a, 1884b, 1937; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [31 références].
- Indre**: DENIS, 1958b; SIMON, 1876a, 1937. [3 références].
- Indre-et-Loire**: DENIS, 1958b; SIMON, 1875a, 1878a, 1881a, 1929, 1932. [6 références].
- Isère**: DENIS, 1934d; DRESKO, 1952b, 1953, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; EMERIT & *al.*, 2004c; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1884a, 1884b, 1913, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [23 références].

- Jura**: DENIS, 1958b; DONDALE, 1972; DRESKO, 1959c, 1962, 1966; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; LESSERT, 1910; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b; SIMON, 1874a, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [17 références].
- Landes**: BOSMANS, 1994, 1997; BOSMANS & *al.*, 2000; BRISTOWE, 1928; DENIS, 1964a; DRESKO, 1972; GOULLIART, 1980; HELSDINGEN, 1969; KNOFLACH, 1999; LUCANTE, 1880a, 1880b; SIMON, 1874a, 1875a, 1875d, 1876a, 1878a, 1881a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [23 références].
- Loir-et-Cher**: HENRY, 1981; HILLYARD, 1975; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1999b; LUCAS, 1848; SIMON, 1881a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [12 références].
- Loire**: SIMON, 1926, 1929, 1932, 1937. [4 références].
- Loire (Haute-)**: LEDOUX & *al.*, 2001, 2003; VILLEPOUX, 1986; VILLEPOUX & *al.*, 2004. [4 références].
- Loire-Atlantique**: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b, 1963c; BOSMANS, 1994; BOSMANS & *al.*, 1994, 1999; CANARD, 1982a, 1990a, 1990b; COUTANT, 1990; DALMAS, 1919; DENIS, 1963d, 1967e; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964b, 1966; JUBERTHIE, 1954; LUCAS, 1882a; MARC, 1990a; MURPHY, 1994; PIONNEAU, 1911; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1875a, 1881a, 1884a, 1884b, 1926, 1929, 1932, 1937; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [34 références].
- Loiret**: COCQUEMPOT & *al.*, 1984; JÉZÉQUEL, 1961; LECLERC & *al.*, 1991; LEDOUX & *al.*, 2002, 2004a; SIMON, 1926, 1932, 1937. [8 références].
- Lot**: BOSMANS & *al.*, 1999; DRESKO & *al.*, 1968; FAGE, 1931; HELSDINGEN, 1969; JEANNEL, 1926; LUCANTE, 1880a, 1880b; SIMON, 1876a, 1881a, 1884b, 1911, 1922, 1926, 1929, 1937; VIRÉ, 1902. [16 références].
- Lot-et-Garonne**: DALINGWATER, 1991; DENIS, 1944b, 1947c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1968; LUCANTE, 1880a, 1880b; MERRETT, 2001; SIMON, 1877c, 1878a, 1881a, 1884b, 1914, 1932, 1937. [16 références].
- Lozère**: ALDERWEIRELDT, 2001; DENIS, 1939b, 1965c; HOLLANDER & *al.*, 1972, 1974; LOGUNOV, 2004; SIMON, 1876a, 1926, 1929, 1932, 1937. [11 références].
- Maine-et-Loire**: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b, 1963c; BRAUD & *al.*, 2004, 2005; DALMAS, 1920; DENIS, 1964c, 1965a; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; DUFFEY & *al.*, 2004; HUBERT, 1964a; NOËL & *al.*, 2005; SIMON, 1875a, 1876a, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; VEILLON, 1997. [21 références].
- Manche**: ASSELIN, 1990; BERLAND, 1924; CANARD, 1990a, 1990b; DENIS, 1947c, 1963d, 1968b; GUIBÉ, 1946; KERVILLE, 1894, 1898, 1900; KRAUS & *al.*, 1974; LUCAS, 1877a, 1878b; MARC, 1990a; PÉTILON & *al.*, 2004; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1876a, 1878a, 1884a, 1884b, 1926, 1929, 1932, 1937; TONGIORGI, 1966; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [31 références].
- Marne**: BOSMANS & *al.*, 1994; LUCAS, 1878a; SIMON, 1876a, 1878a, 1881a, 1884a, 1884b, 1926, 1929, 1932, 1937. [11 références].
- Marne (Haute-)**: DENIS, 1958b; FELTGEN, 1906; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1884a, 1884b, 1929, 1937. [9 références].
- Mayenne**: BEAUCOURNU & *al.*, 1963a, 1963c; COUTANT, 1990; DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a, 1964b; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1875a, 1926; YSNEL, 1990a. [17 références].
- Meurthe-et-Moselle**: BIRAT & *al.*, 2001; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; FELTGEN, 1906; FLORENTIN, 1904; HUBERT, 1964a, 1969; IORIO, 2002, 2004b; KREMER, 1989; LEBORGNE & *al.*, 2005; PASQUET, 1984; REMY, 1927, 1932b, 1946; SIMON, 1875a, 1926, 1929, 1937. [20 références].
- Meuse**: GRIMM, 1986; IORIO, 2003b; SIMON, 1926, 1932, 1937. [5 références].
- Morbihan**: ASSELIN, 1990; BEAUCOURNU & *al.*, 1963c; BOSMANS & *al.*, 1994, 1999; CANARD, 1982a, 1983, 1990a, 1990b; COUTANT, 1990; DENIS, 1938a, 1945b; DRESKO, 1959a, 1962, 1971b, 1972, 1974a, 1975; DRESKO & *al.*, 1975; MARC, 1990a; MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1876a, 1878a, 1878c, 1881a, 1882, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [38 références].
- Moselle**: IORIO, 2003a, 2004a; LEBORGNE & *al.*, 1998; REMY, 1946; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a. [7 références].
- Nièvre**: DENIS, 1943b, 1944b, 1945b, 1947c; DRESKO, 1959c; SIMON, 1884b, 1926, 1937. [8 références].
- Nord**: DENIS, 1930, 1931a, 1931c, 1932a, 1934c, 1937d, 1939b, 1943a, 1943d, 1944a, 1944b, 1945b, 1946b, 1947c, 1949a, 1949d, 1949e, 1950d, 1952b, 1955a, 1955b, 1960a, 1960b, 1961a, 1962g, 1963a, 1963b; EMERIT & *al.*, 1999; GOULLIART, 1973, 1979a, 1979b, 1980; LEDOUX & *al.*, 1999a; SCHODDUYN, 1925; SIMON, 1884b, 1926. [36 références].
- Oise**: DENIS, 1931a; DUQUEF, 1993; HUBERT, 1964b; JÉZÉQUEL, 1961; SIMON, 1874a, 1874b, 1875a, 1876a, 1878a, 1880a, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1887a, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; TONGIORGI, 1966. [21 références].
- Orne**: ASSELIN, 1990; CANARD, 1990a, 1990b; COUTANT, 1990; DRESKO, 1959b; GUIBÉ, 1946; LETACQ, 1913; MARC, 1990a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [27 références].
- Pas-de-Calais**: BONTE, 2000; DENIS, 1937d, 1953d, 1955a, 1955b, 1956, 1958a, 1961a, 1965a; EMERIT & *al.*, 1999; GROS, 1983a; JACKSON, 1930; ORHANT, 1997; SIMON, 1875a, 1926, 1932, 1937. [17 références].
- Puy-de-Dôme**: BOSMANS, 1997; DENIS, 1947c, 1948a, 1948b; GOULLIART, 1979a; JÉZÉQUEL, 1961; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2004a; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1884a, 1914, 1926, 1929, 1937; VILLEPOUX, 1986, 1990a; VILLEPOUX & *al.*, 2004. [19 références].
- Pyrénées (Hautes-)**: BONNET, 1925; BOSMANS & *al.*, 1985b, 1986, 2002; BRIGNOLL, 1978, 1984; BUCHAR

- & *al.*, 1993; DENIS, 1939b, 1950b, 1951c, 1953a, 1953b, 1954a, 1955c, 1959a, 1960a, 1963e, 1967d; DRESKO, 1951, 1953, 1957d, 1962; DRESKO & *al.*, 1961, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a, 1966; JEANNEL, 1926; JÉZÉQUEL, 1961; KERVILLE, 1935; KNOFLACH, 1992, 1996a; KRAUS & *al.*, 1974; LUCANTE, 1880a, 1880b; MAURER, 1992; SENGLER, 2004; SIMON, 1874a, 1876a, 1878a, 1884b, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915a, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; THALER, 1984. [54 références].
- Pyrénées-Atlantiques**: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1985b, 1999; BRIGNOLI, 1978; BUCHAR & *al.*, 1993; DENIS, 1953b, 1957a, 1959a, 1959d, 1960a, 1967d; DRESKO, 1947b, 1953, 1957d, 1959b, 1962, 1966; DRESKO & *al.*, 1961, 1968, 1975; FAGE, 1919, 1931; HUBERT, 1964a, 1969; JEANNEL, 1926; LUCANTE, 1880a, 1880b; MAURER, 1992; SIMON, 1876c, 1878a, 1878d, 1878e, 1879, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915b, 1916, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; WESOLOWSKA, 1986. [50 références].
- Pyrénées-Orientales**: ALICATA & *al.*, 1987; BERLAND, 1922; BONNET, 1932, 1939; BOSMANS, 1994, 1995, 1997; BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987, 1999, 2000; BRIGNOLI, 1976, 1978, 1982; BUCHAR & *al.*, 1993; BUCHLI, 1962, 1965, 1969, 1970; CORNIC & *al.*, 2004; DALMAS, 1916, 1919; DENIS, 1931b, 1932b, 1932c, 1933b, 1933d, 1934b, 1935c, 1937e, 1943c, 1944b, 1944c, 1945b, 1947b, 1947c, 1948b, 1948c, 1951a, 1952c, 1953b, 1959a, 1960a, 1961b, 1961c, 1962c, 1962e, 1962g, 1963e, 1965a, 1967d; DRESKO, 1957c, 1957d, 1962, 1966; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; DUFFEY & *al.*, 2004; EMERIT & *al.*, 2000, 2004a, 2004b; FAGE, 1909, 1913, 1931; GERHARDT, 1930; GOULLIART, 1979a; GRIMM, 1985; GROS, 2004; HELSDINGEN, 1969; HELSDINGEN & *al.*, 2001; HIPPA & *al.*, 1983; HUBERT, 1964a, 1964b; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE, 1954, 1985; KNOFLACH, 1996a, 1999; KNOFLACH & *al.*, 2000; KRAUS & *al.*, 1974; LEDOUX, 1967, 1993; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 1999a, 2001, 2003, 2004a; LOGUNOV, 2000; LOPEZ, 1983; LOPEZ & *al.*, 1976; LUCAS, 1847a; LUGETTI & *al.*, 1969; MACHADO, 1949; METZNER, 1999; MILDIDGE, 1975b, 1979; PLATNICK & *al.*, 1984; SEGERS, 1992; SENGLER, 2004; SIMON, 1874a, 1874b, 1875a, 1875d, 1876a, 1878a, 1881a, 1881c, 1882, 1884a, 1884b, 1898a, 1907a, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915b, 1916, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; SOYER, 1965, 1967, 1973; TAMBS-LYCHE, 1957; THALER & *al.*, 1994; TONGIORGI, 1966; TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. [131 références].
- Rhin (Bas-)**: DENIS, 1950a; LEBORGNE & *al.*, 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & *al.*, 1992; REMY, 1946. [5 références].
- Rhin (Haut-)**: BLICK, 2000; BOSMANS & *al.*, 2000; DENIS, 1950a; DRESKO & *al.*, 1968; FAGE, 1931; KRAUS & *al.*, 1974; LEPRIEUR, 1880; LESSERT, 1910; METZNER, 1999; MULLER & *al.*, 1895; REIBER, 1880; RENNER, 1987; SCHALLER, 2000; SIMON, 1881a, 1914, 1932, 1937. [16 références; LEPRIEUR, 1880 et REIBER, 1880, concernent le même document].
- Rhône**: DALMAS, 1920; DENIS, 1964c; DRESKO & *al.*, 1975; KRAUS & *al.*, 1974; LE BERRE & *al.*, 1981; SIMON, 1874a, 1914, 1915a, 1926, 1929, 1932, 1937. [12 références].
- Sarthe**: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; ROLLARD, 1990a, 1990c; SIMON, 1875a, 1926, 1937; YSNEL, 1990b. [12 références].
- Savoie**: BERLAND, 1937; BOSMANS, 1994; BOURNE, 1974; DRESKO & *al.*, 1975; HEIDT & *al.*, 1998; HELSDINGEN, 1995; MÜLLER, 1985; SIMON, 1876a, 1914, 1929, 1932, 1937; THALER & *al.*, 1994. [13 références].
- Savoie (Haute-)**: BOSMANS, 1997; BOSMANS & *al.*, 1999, 2000; BOURNE, 1977, 1978; BRIGNOLI, 1978; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; EMERIT & *al.*, 2004c; GROS, 1983a; HELSDINGEN, 1969; HUBERT, 1964a, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1909, 1910; LOGUNOV & *al.*, 1997; MULLER & *al.*, 1895; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b, 1898; SIMON, 1884a, 1884b, 1914, 1915b, 1926, 1929, 1932, 1937; THALER, 1994; VILLEPOUX & *al.*, 2004. [34 références].
- Saône (Haute-)**: BECKER, 1879a; DRESKO, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a; REMY, 1932a, 1946. [6 références].
- Saône-et-Loire**: DRESKO, 1957b, 1957d, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. [6 références].
- “Seine”**: BERLAND, 1911, 1922, 1931, 1933; BOSMANS & *al.*, 1999; CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & *al.*, 1977; COCQUEMPOT & *al.*, 1991; DALMAS, 1915, 1916, 1920; DELFOSSE, 1999, 2004; DENIS, 1937e, 1944b, 1945a, 1945b, 1946a, 1946b, 1947c, 1949d, 1962g; DENIS & *al.*, 1946; DONDALE, 1972; DRESKO, 1947b, 1947c, 1957a, 1957c, 1962, 1974b, 1983; DRESKO & *al.*, 1968; GROS, 1983a; HUBERT, 1964a; JÉZÉQUEL, 1961; LESNE, 1933; LOGUNOV, 2000; LUCAS, 1836, 1847a, 1847b, 1847c, 1847d, 1849a, 1849b, 1849c, 1853, 1871c, 1873a, 1873b, 1874a, 1875, 1876, 1880, 1882b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b; PLANET, 1905; PLATNICK, 1975; PLAZANET, 1995; RASTEL, 1998; ROLLARD, 2000; SIMON, 1874a, 1874b, 1874c, 1875a, 1876a, 1877c, 1878a, 1878e, 1878f, 1879, 1880a, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1914, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000; VALLÉ, 1875. [85 références].
- Seine-Maritime**: BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; CORNIC, 1977; COULON, 1934; DENIS, 1963d; DRESKO, 1966; DRESKO & *al.*, 1968; DUPONT, 1934; EDOUARD, 1917; LANCELEVÉE, 1884; MAIL, 1916; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a, 1875b; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [25 références].
- Seine-et-Marne**: BERLAND, 1928; COCQUEMPOT & *al.*, 1984, 1989, 1990; DENIS, 1946b, 1946c, 1965a; DOIGNON, 1976; DRESKO, 1943, 1946, 1948, 1952a, 1957c, 1959b, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a; JÉZÉQUEL, 1961; LUCAS, 1864; MERIGUET, 1999; ROYER, 1928; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1876c, 1877c, 1878a, 1878e, 1879, 1880a, 1881a, 1881c, 1884a, 1884b, 1898b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937; TONGIORGI, 1966; TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. [42 références].
- Somme**: COMMECY, 1992; COUTANCEAU & *al.*, 1992; DENIS, 1946b, 1955b; DRON, 1993; DUQUEF, 1993; ROSELLE, 1887, 1888a, 1888b, 1891; SIMON, 1875a,

- 1876a, 1878a, 1880a, 1881a, 1884a, 1884b, 1914, 1918, 1926, 1929, 1932, 1937; SUEUR, 1992, 1993. [25 références].
- Sèvres (Deux-):** BOSMANS & *al.*, 1999; SIMON, 1937. [2 références].
- Tarn:** DENIS, 1958b; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; LUCANTE, 1880a, 1880b; SIMON, 1876a, 1877b, 1878a, 1929, 1937. [13 références].
- Tarn-et-Garonne:** DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; KRAUS & *al.*, 1974; LUCANTE, 1880a, 1880b; SIMON, 1876a, 1878a, 1884a, 1884b, 1926, 1929, 1932. [15 références].
- Var:** BECKER, 1879b, 1880, 1882; BERLAND, 1922, 1926, 1929, 1930, 1931; BIGOT, 1983, 1993; BIGOT & *al.*, 1979, 1987a, 1987b, 1988; BOSMANS, 1997; BOSMANS & *al.*, 1999; BOULLARD, 1980; BOUMEZZOUGH & *al.*, 1983; BRIGNOLI, 1971; DENIS, 1931a, 1933a, 1933c, 1934a, 1935a, 1935b, 1935d, 1936, 1937a, 1937b, 1937e, 1939b, 1945b, 1948d, 1949c, 1965a; DRESKO, 1962, 1966, 1987; DRESKO & *al.*, 1968; EMERIT, 1977; FAGE, 1913, 1931; GOODMAN, 1928; GOULLIART, 1979a, 1979b; GRIMM, 1985; GROS, 1982, 1983a, 1983b, 2004; JEANNEL, 1926; KABOUCHE & *al.*, 1997; KOVOOR & *al.*, 2000; KRAUS & *al.*, 1974; LEDOUX, 1963, 1972, 1973b, 1979, 2004b; LUCAS, 1847a; MÜLLER, 1985; MUSTER & *al.*, 2004; PICKARD-CAMBRIDGE, 1874; PONEL, 1983, 1984; PONEL & *al.*, 1993; SEGERS, 1992; SENGLLET, 1972, 2001; SIMON, 1874a, 1875a, 1875d, 1876a, 1876c, 1878a, 1879, 1880b, 1881a, 1881b, 1881c, 1882, 1884a, 1884b, 1898c, 1907a, 1914, 1916, 1926, 1929, 1932, 1937; SOYER, 1967, 1973; WUNDERLICH, 1979. [94 références].
- Vaucluse:** BIGOT & *al.*, 1982a, 1985; BOSMANS, 1997; BOSMANS & *al.*, 2000; CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978; CORNIC & *al.*, 2004; DRESKO, 1962; FABRE, 1905; FAVET, 1984; HECIAK & *al.*, 1984; HUBERT, 1964a; LEDOUX, 1972, 1973, 1973b, 1977, 1979, 2000, 2004a; LEDOUX & *al.*, 2001; MAURER, 1981; MILLIDGE, 1979; MUSTER & *al.*, 2004; SIMON, 1874a, 1875a, 1876a, 1878a, 1878c, 1881a, 1884a, 1884b, 1914, 1915a, 1926, 1929, 1932, 1937. [37 références].
- Vendée:** BOSMANS & *al.*, 1999; CANARD, 1983, 1990a, 1990b; CLARK & *al.*, 1970; COUTANT, 1990; DENIS, 1939b, 1940b, 1941, 1946b, 1947a, 1947b, 1947c, 1947d, 1949a, 1949b, 1949e, 1953c, 1959c, 1962b, 1962d, 1963c, 1963d, 1964b, 1964c, 1965a, 1965c, 1966a, 1967a, 1968a; DENIS & *al.*, 1946; DRESKO, 1971a; DUFFEY, 1964; GROS, 2004; MARC, 1990a; MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990a, 1990b, 1990c; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1878c, 1881a, 1914, 1937; YSNEL, 1990a, 1990b, 1990c. [49 références].
- Vienne:** DENIS, 1958b; DRESKO, 1947b; DUREPAIRE & *al.*, 1994; SIMON, 1875a, 1876a, 1878a, 1932; VLIJM, 1971. [8 références].
- Vienne (Haute-):** CANARD, 1983; DUFFEY & *al.*, 2004; SIMON, 1876c, 1878a, 1881a, 1884b, 1914, 1926, 1929, 1932, 1937. [11 références].
- Vosges:** BIRAT & *al.*, 2001; BLICK, 1991; DENIS, 1958b; DRESKO & *al.*, 1968; FELTGEN, 1906; GRIMM, 1985, 1986; HUBERT, 1969; KRAUS & *al.*, 1974; OXFORD, 2000; SIMON, 1876a, 1878a, 1881a, 1884a, 1884b, 1926, 1929, 1932, 1937. [19 références].
- Yonne:** DRESKO, 1950, 1957c; HOLLANDER & *al.*, 1972, 1974; HUBERT, 1964b; JEANNEL, 1926; LOGUNOV & *al.*, 2003; LUCAS, 1871b, 1872; SIMON, 1876a, 1884a, 1884b, 1910, 1926, 1932, 1937; TONGIORGI, 1966. [17 références].

## Index

Cet index contient :

- Les noms des genres valides : indication de la famille.
- Les noms des espèces valides : indication de la famille.
- Les synonymes cités dans le catalogue : indication de l'espèce valide. Dans quelques rares cas, la synonymie ne concerne qu'un seul sexe; celui-ci est alors indiqué entre crochets.
- Les noms utilisés par suite d'une identification erronée; ils sont suivis de la mention [err.] : indication de l'espèce valide.

## A

- Abacoproeces*: Linyphiidae  
*abbreviatum* (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium pelagicum*  
*abbreviatus* (*Thomisus*): *Thomisus onustus*  
*abeillei* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*abnormis* (*Oreonetides*): *Saaristoa abnormis*  
*abnormis* (*Saaristoa*): Linyphiidae  
*abnormis* (*Tmeticus*): *Saaristoa abnormis*  
*acalypha* (*Epeira*): *Mangora acalypha*  
*acalypha* (*Mangora*): Araneidae  
*acalypha* (*Meta*): *Mangora acalypha*  
*acalyphus* (*Araneus*): *Mangora acalypha*  
*Acantholycosa*: Lycosidae  
*Acartauchenius*: Linyphiidae  
*accentuata* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*accentuata* (*Anyphaena*): Anyphaenidae  
*accentuata* (*Lycosa*): *Alopecosa accentuata*  
*accepta* (*Prothesima*): *Zelotes villicus*  
*acerbus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*Achaeearanea*: Theridiidae  
*aciculifer* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes notabilis*  
*acripes* (*Euophrys*): Salticidae  
*aculeata* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*aculeata* (*Tarentula*): *Alopecosa aculeata*  
*aculeatus* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*Aculepeira*: Araneidae  
*acuminata* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*acuminata* (*Euryopsis*): Theridiidae  
*acuminata* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*acuminatus* (*Euryopsis*): *Euryopsis acuminata*  
*acuta* (*Opistoxys*): *Porrhomma microphthalmum*  
*adansoni* (*Hasarius*): Salticidae  
*adansoni* (*Plexippus*): *Hasarius adansoni*  
*adianta* (*Araneus*): *Neoscona adianta*

- adianta (Epeira): Neoscona adianta*  
*adianta (Neoscona): Araneidae*  
*adiantum (Araneus): Neoscona adianta*  
*adiantum (Neoscona): Neoscona adianta*  
*adiantus (Aranea): Neoscona adianta*  
*adiantus (Araneus): Neoscona adianta*  
*adipatum (Porrhomma): Oreonetides vaginatus*  
*adjacens (Diplocephalus): Diplocephalus connatus*  
*adjacens (Streptosphaenus): Diplocephalus connatus*  
*Aelurillus: Salticidae*  
*aenea (Micaria): Gnaphosidae*  
*aenea (Prosthesima): Zelotes aeneus*  
*aenescens (Ballus): Bianor aurocinctus*  
*aenescens (Bianor): Bianor aurocinctus*  
*aenescens tantulus (Bianor): Bianor tantulus*  
*aeneus (Heliophanus): Salticidae*  
*aeneus (Zelotes): Gnaphosidae*  
*aequalis (Centromerus): Centromerus brevipalpis*  
*aequalis (Centromerus): Centromerus brevipalpis*  
*aequipes (Euophrys): Talavera aequipes*  
*aequipes (Talavera): Salticidae*  
*aerius (Sintula): Meioneta mollis*  
*aestiva (Entelecara): Linyphiidae*  
*aestiva [err.] (Entelecara): Hylyphantes nigrinus*  
*aestivus (Tiso): Linyphiidae*  
*affinis (Aelurillus): Salticidae*  
*affinis (Aelurops): Aelurillus affinis*  
*affinis (Atypus): Atypidae*  
*affinis (Centromerus): Tmeticus affinis*  
*affinis (Colobocyba): Tapinocyba affinis*  
*affinis (Meioneta): Meioneta beata*  
*affinis (Tapinocyba): Linyphiidae*  
*affinis (Tmeticus): Linyphiidae*  
*affinis (Trichoncus): Linyphiidae*  
*affinis [err.] (Trichoncus): Trichoncus vasconicus*  
*afrodite (Enoplognatha): Theridiidae*  
*Agalenatea: Araneidae*  
*Agelena: Agelenidae*  
*agelenoides (Agelena): Agelenidae*  
*agnellus (Lepthyphantes): Linyphiidae*  
*Agraecina: Liocranidae*  
*agreste (Gongylidium): Oedothorax agrestis*  
*agrestis (Erigone): Oedothorax agrestis*  
*agrestis (Lycosa): Pardosa agrestis*  
*agrestis (Oedothorax): Linyphiidae*  
*agrestis (Pardosa): Lycosidae*  
*agrestis (Tegenaria): Agelenidae*  
*agrestis [err.] (Tegenaria): Tegenaria atrica*  
*agricola (Lycosa): Pardosa agricola*  
*agricola (Pardosa): Lycosidae*  
*Agroeca: Liocranidae*  
*Agyneta: Linyphiidae*  
*alacris (Gnaphosa): Gnaphosidae*  
*alacris (Lepthyphantes): Linyphiidae*  
*alacris (Tenuiphantes): Lepthyphantes alacris*  
*albescens (Episinus): Theridiidae*  
*albicans (Drassodes): Gnaphosidae*  
*albicans (Drassus): Drassodes albicans*  
*albicomis (Nemesia): Nemesiidae*  
*albidus (Centromerus): Linyphiidae*  
*albidus (Leptodrassus): Gnaphosidae*  
*albidus (Philodromus): Philodromidae*  
*albimana (Aulonia): Lycosidae*  
*albimana (Lycosina): Aulonia albimana*  
*albimana (Micaria): Micaria coarctata*  
*albimana (Ozyptila): Xysticus bufo*  
*albimanus (Xysticus): Xysticus bufo*  
*albobimaculata (Eris): Bianor albobimaculatus*  
*albobimaculatus (Bianor): Salticidae*  
*albocincta (Steatoda): Steatoda albomaculata*  
*albocincta [err.] (Steatoda): Steatoda incomposita*  
*albofasciata (Alopecosa): Lycosidae*  
*albofasciata (Lycosa): Alopecosa albofasciata*  
*albofasciata (Tarentula): Alopecosa albofasciata*  
*albofasciata (Trochosa): Alopecosa albofasciata*  
*albofasciata (Xerolycosa): Alopecosa albofasciata*  
*alboirrorata (Anyphaena): Anyphaenidae*  
*albomaculata (Euryopis): Euryopis quinqueguttata*  
*albomaculata (Nurscia): Titanoea albomaculata*  
*albomaculata (Poecilochroa): Gnaphosidae*  
*albomaculata (Steatoda): Theridiidae*  
*albomaculata (Titanoea): Titanoeceidae*  
*albomaculatus (Lithyphantes): Steatoda albomaculata*  
*albonotatus (Heliophanus): Heliophanus lineiventris*  
*albopictus (Philodromus): Philodromidae*  
*albosignata (Tetrax): Tetrax caudata*  
*albostrigata (Micaria): Micaria subopaca*  
*albotrimaculatus (Synageles): Salticidae*  
*albovittata (Hypsosinga): Hypsosinga albovittata*  
*albovittata (Hypsosinga): Araneidae*  
*albovittata (Micaria): Gnaphosidae*  
*albovittata (Singa): Hypsosinga albovittata*  
*albovittatus (Araneus): Hypsosinga albovittata*  
*albovittatus (Singa): Hypsosinga albovittata*  
*albus (Thomisus): Thomisus onustus*  
*algerica (Cyclosa): Araneidae*  
*algericus (Episinus): Theridiidae*  
*algerina (Cyrba): Salticidae*  
*Alioranus: Linyphiidae*  
*Allocosa: Lycosidae*  
*Allomengea: Linyphiidae*  
*Alopecosa: Lycosidae*  
*alpestris (Philodromus): Philodromus vagulus*  
*alpica (Araniella): Araneidae*  
*alpica (Epeira): Araniella alpica*  
*alpica (Gnaphosa): Gnaphosidae*  
*alpica (Leptoneta): Leptonetidae*  
*alpicola (Alopecosa): Lycosidae*  
*alpicola (Linyphia): Linyphiidae*  
*alpicola (Lycosa): Alopecosa alpicola*  
*alpicus (Araneus): Araniella alpica*  
*alpigena (Arctosa): Lycosidae*  
*alpigena (Lycosa): Arctosa alpigena*

- alpigena* (*Scotinotylus*): *Scotinotylus alpigenus*  
*alpigena* (*Scotyotylus*): *Scotinotylus alpigenus*  
*alpigenus* (*Scotinotylus*): Linyphiidae  
*alpina* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*alpina* (*Zilla*): *Zygiella montana*  
*alpinus* (*Thanatus*): *Thanatus coloradensis*  
*alpinus* [err.] (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus latifrons*  
*alsine* (*Araneus*): Araneidae  
*alsine* (*Epeira*): *Araneus alsine*  
*Altella*: Dictynidae  
*alticeps* (*Bolyphantes*): Linyphiidae  
*alticeps* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*alticeps* (*Erigonopterna*): *Erigonoplus alticeps*  
*alticeps* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*alticola* (*Euophrys*): Salticidae  
*alticola* (*Typhochrestus*): Linyphiidae  
*alticola* [err.] (*Lathys*): *Lathys sexpustulata*  
*altifrons* (*Erigone*): *Entelecara acuminata*  
*altissimus* (*Araeoncus*): Linyphiidae  
*alutacius* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*alutacius* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes alutacius*  
*alveolata* (*Pardosa*): *Pardosa ferruginea*  
*Amaurobius*: Amaurobiidae  
*ambiguus* (*Echemus*): *Echemus angustifrons*  
*ambiguus* (*Silometopus*): Linyphiidae  
*amentata* (*Lycosa*): *Pardosa amentata*  
*amentata* (*Pardosa*): Lycosidae  
*ammophila* (*Archaeodictyna*): *Dictyna ammophila*  
*ammophila* (*Dictyna*): Dictynidae  
*amoenus* (*Oonops*): Oonopidae  
*anceps* (*Hyptiotes*): *Hyptiotes paradoxus*  
*anceps* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*andorranus* (*Drassodes*): *Drassodes cupreus*  
*andrenivora* (*Lycosa*): *Alopecosa pulverulenta*  
*andrenivora* (*Tarentula*): *Alopecosa pulverulenta*  
*andrenivora barbipes* (*Tarentula*): *Alopecosa barbipes*  
*Anelosimus*: Theridiidae  
*anglica* (*Gnaphosa*): *Gnaphosa leporina*  
*angulata* (*Epeira*): *Araneus angulatus*  
*angulatus* (*Araneus*): Araneidae  
*angulatus* (*Episinus*): Theridiidae  
*angulatus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*angulatus* (*Oryphantes*): *Lepthyphantes angulatus*  
*angulipalpis* (*Anguliphantes*): *Lepthyphantes angulipalpis*  
*angulipalpis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*angulitarse* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*angustatus* (*Oonopinus*): Oonopidae  
*angustatus* (*Oonops*): *Oonopinus angustatus*  
*angustiarum* (*Cybaeus*): Cybaeidae  
*angustiformis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*angustiformis* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes angustiformis*  
*angustifrons* (*Echemus*): Gnaphosidae  
*angustifrons* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*angustifrons* (*Wideria*): *Walckenaeria angustifrons*  
*annulipes* (*Agroeca*): Liocranidae  
*annulipes* (*Oecobius*): Oecobiidae  
*antennatus* (*Scotinotylus*): Linyphiidae  
*antennatus* (*Scotyotylus*): *Scotinotylus antennatus*  
*antica* (*Erigone*): *Walckenaeria antica*  
*antica* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*antica* (*Wideria*): *Walckenaeria antica*  
*antiopae* (*Prosthesima*): *Zelotes laetus*  
*antiopae* (*Zelotes*): *Zelotes laetus*  
*antiqua* (*Walckenaeria*): *Walckenaeria antica*  
*antiqua* (*Wideria*): *Walckenaeria antica*  
*Antistea*: Hahniidae  
*antrorum* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes eugeni*  
*antrorum* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*Anyphaena*: Anyphaenidae  
*apennicola* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*aperta* (*Talavera*): Salticidae  
*apertum* (*Liocranum*): Liocranidae  
*apertus* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*aphana* (*Ero*): Mimetidae  
*Aphantaulax*: Gnaphosidae  
*Aphileta*: Linyphiidae  
*apiatus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*apicatum* (*Gongylidium*): *Oedothorax apicatus*  
*apicatus* (*Oedothorax*): Linyphiidae  
*Apostenus*: Liocranidae  
*approximatus* (*Bathyphantes*): Linyphiidae  
*approximatus* (*Stylophora*): *Bathyphantes approximatus*  
*apricorum* (*Melanophora*): *Zelotes apricorum*  
*apricorum* (*Prosthesima*): *Zelotes apricorum*  
*apricorum* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*aquatica* (*Argyroneta*): Cybaeidae  
*Araeoncus*: Linyphiidae  
*Araneus*: Araneidae  
*Araniella*: Araneidae  
*arcanus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*arcanus* (*Tmeticus*): *Centromerus arcanus*  
*arciger* (*Pellenes*): *Pellenes arcigerus*  
*arcigerus* (*Pellenes*): Salticidae  
*arctica* (*Erigone*): Linyphiidae  
*Arctosa*: Lycosidae  
*arcuata* (*Ergane*): *Evarcha arcuata*  
*arcuata* (*Evarcha*): Salticidae  
*arcuatus* (*Attus*): *Evarcha arcuata*  
*arcuatus* (*Evarcha*): *Evarcha arcuata*  
*arcuatus* (*Hasarius*): *Evarcha arcuata*  
*arenaria* (*Lycosa*): *Pardosa agricola*  
*arenarius* (*Thanatus*): Philodromidae  
*arenicola* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*arenicola* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*arenicola* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes arenicola*  
*arenicola* (*Pardosa*): *Pardosa agricola*  
*arenicola* (*Xysticus*): Thomisidae  
*argelasius* (*Olios*): Sparassidae  
*argelasius* (*Sparassus*): *Olios argelasius*

*Argenna*: Dictynidae  
*argenteola* (*Rhomphaea*): *Argyrodes nasicus*  
*argenteolus* (*Ariamnes*): *Argyrodes nasicus*  
*argenteomaculata* (*Euryopis*): *Euryopis quinqueguttata*  
*Argiope*: Araneidae  
*arguta* (*Harpactea*): Dysderidae  
*argutus* (*Harpactes*): *Harpactea arguta*  
*Argyrodes*: Theridiidae  
*argyrodes* (*Argyrodes*): Theridiidae  
*Argyroneta*: Cybaeidae  
*Ariadna*: Segestriidae  
*arietina* (*Mastigusa*): Dictynidae  
*arietinus* (*Tettilus*): *Mastigusa arietina*  
*arlandi* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*arlandi* (*Mughiphantes*): *Lepthyphantes arlandi*  
*armadillo* (*Ballus*): Salticidae  
*armata* (*Micaria*): *Micaria dives*  
*armatus* (*Heliophanus*): *Heliophanus kochii*  
*armida* (*Aculepeira*): Araneidae  
*armida* (*Araneus*): *Aculepeira armida*  
*armida* (*Epeira*): *Aculepeira armida*  
*armidus* (*Araneus*): *Aculepeira armida*  
*armigera* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*armillata* (*Zora*): Zoridae  
*armoricus* (*Philodromus*): *Philodromus buxi*  
*arundinacea* (*Dictyna*): Dictynidae  
*arundineti* (*Pedanostethus*): *Robertus arundineti*  
*arundineti* (*Robertus*): Theridiidae  
*arvernus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*Asthenargus*: Linyphiidae  
*atellanus* (*Attus*): *Sitticus caricis*  
*atomaria* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*atomarius* (*Thomisus*): *Ozyptila atomaria*  
*atra* (*Erigone*): Linyphiidae  
*atra* (*Melanophora*): *Zelotes latreillei*  
*atramentaria* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*atramentarius* (*Coelotes*): *Coelotes segestriformis*  
*atratus* (*Chalcoscirtus*): Salticidae  
*atratus* (*Thanatus*): Philodromidae  
*atrica* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*atrica* (*Xylla*): *Zygiella atrica*  
*atrica* (*Zilla*): *Zygiella atrica*  
*atrica* (*Zygiella*): Araneidae  
*atrocaerulea* (*Prothesima*): *Zelotes atrocaeruleus*  
*atrocaeruleus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*atrocoeruleus* (*Zelotes*): *Zelotes atrocaeruleus*  
*atropos* (*Amaurobius*): *Coelotes atropos*  
*atropos* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*atrotibialis* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*atrotibialis* (*Wideria*): *Walckenaeria atrotibialis*  
*atrox* (*Amaurobius*): *Amaurobius fenestralis*  
*Attulus*: Salticidae  
*Atypus*: Atypidae  
*auberti* (*Lasaeola*): *Dipoena umbratilis*  
*audax* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes complicatus*  
*audax* (*Xysticus*): Thomisidae

*aulica* (*Kochiura*): *Anelosimus aulicus*  
*aulicum* (*Anelosimus*): *Anelosimus aulicus*  
*aulicum* (*Theridion*): *Anelosimus aulicus*  
*aulicus* (*Anelosimus*): Theridiidae  
*Aulonia*: Lycosidae  
*aurantiaca* (*Ero*): *Ero tuberculata*  
*aurantiipes* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*aurata* (*Micaria*): *Micaria sociabilis*  
*auratus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*aureolus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*aureolus fuscolimbatus* (*Philodromus*): *Philodromus fuscolimbatus*  
*aureolus lividus* (*Philodromus*): *Philodromus lividus*  
*auritus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*aurocinctus* (*Bianor*): Salticidae  
*aurocinctus* (*Sibianor*): *Bianor aurocinctus*  
*aurocinctus tantulus* (*Bianor*): *Bianor tantulus*  
*auronitens* (*Philodromus*): *Philodromus fuscomarginatus*  
*auspex* (*Drassus*): *Poecilochroa senilis*  
*aussereri* (*Callilepis*): *Nomisia aussereri*  
*aussereri* (*Hypsosinga*): *Singa aussereri*  
*aussereri* (*Nomisia*): Gnaphosidae  
*aussereri* (*Pterotricha*): *Nomisia aussereri*  
*aussereri* (*Pythonissa*): *Nomisia aussereri*  
*aussereri* (*Singa*): Araneidae  
*avicula* (*Caracladus*): Linyphiidae  
*avicula* (*Erigone*): *Caracladus avicula*  
*aviculus* (*Caracladus*): *Caracladus avicula*

## B

*badia* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*badius* (*Dendryphantes*): *Pseudicius badius*  
*badius* (*Pseudicius*): Salticidae  
*balazuci* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*balazuci* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*baleatus* (*Xysticus*): *Xysticus nubilus*  
*baliola* (*Euophrys*): Salticidae  
*Ballus*: Salticidae  
*balteatus* (*Sintula*): *Centromerus serratus*  
*barbata* (*Prothesima*): *Zelotes barbatus*  
*barbatus* (*Trachyzelotes*): *Zelotes barbatus*  
*barbatus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*barbipes* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*barbipes* (*Lycosa*): *Alopecosa barbipes*  
*barbipes* (*Saitis*): Salticidae  
*barbipes* (*Tarentula*): *Alopecosa barbipes*  
*Baryphyma*: Linyphiidae  
*Bathyphantes*: Linyphiidae  
*bavarica* (*Segestria*): Segestriidae  
*beata* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*becki* (*Plaesiocraerus*): *Thyreosthenius parasiticus*  
*becki* (*Thyreosthenius*): *Thyreosthenius parasiticus*  
*bedeli* (*Attus*): *Pellenes nigrociliatus*  
*bedeli* (*Pellenes*): *Pellenes nigrociliatus*  
*bellicosa* (*Enoplognatha*): *Theridion bellicosum*  
*bellicosum* (*Theridion*): Theridiidae



- bellicosus* (*Rugathodes*): *Theridion bellicosum*  
*benigna* (*Theridion*): *Dictyna arundinacea*  
*berlandi* (*Zodarion*): *Zodarion pseudoelegans*  
*Berlandina*: Gnaphosidae  
*berolinensis* (*Leptorchestes*): Salticidae  
*betteni* (*Theridion*): Theridiidae  
*Bianor*: Salticidae  
*bicephalus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*bicephalus* (*Prosoponcus*): *Diplocephalus bicephalus*  
*bicolor* (*Carrhotus*): *Carrhotus xanthogramma*  
*bicolor* (*Centromerinus*): *Centromerita bicolor*  
*bicolor* (*Centromerita*): Linyphiidae  
*bicolor* (*Centromerus*): *Centromerita bicolor*  
*bicolor* (*Dictyna*): Dictynidae  
*bicolor* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*bicolor* (*Linyphia*): *Centromerita bicolor*  
*bicolor* (*Marilynia*): *Dictyna bicolor*  
*bicolor* (*Misumena*): Thomisidae  
*bicolor* (*Philaeus*): *Carrhotus xanthogramma*  
*bicolor* (*Tmeticus*): *Centromerita bicolor*  
*bicolor concinnus* (*Centromerinus*): *Centromerita concinna*  
*bicuspis* (*Erigone*): *Panamomops sulcifrons*  
*bicuspis* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*bicuspis* (*Panamomops*): *Panamomops sulcifrons*  
*bidens* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes mansuetus*  
*bidentata* (*Diplocentria*): Linyphiidae  
*bifasciata* (*Pardosa*): Lycosidae  
*bifasciatus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*bifrons* (*Dismodicus*): Linyphiidae  
*bifrons* [err.] (*Dismodicus*): *Dismodicus fungiceps*  
*bigerrensis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*bihamatum* (*Gongyliidiellum*): *Scotargus pilosus*  
*biimpressum* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*bilineatus* (*Philaeus*): *Philaeus chrysops*  
*bilunulatus* (*Pellenes*): *Pellenes nigrociliatus*  
*bimaculata* (*Neottiura*): *Theridion bimaculatum*  
*bimaculatum* (*Neottiura*): *Theridion bimaculatum*  
*bimaculatum* (*Theridion*): Theridiidae  
*biovata* (*Erigone*): *Thyreosthenius biovatus*  
*biovatum* (*Peponocranium*): *Thyreosthenius biovatus*  
*biovatus* (*Thyreosthenius*): Linyphiidae  
*bipunctata* (*Steatoda*): Theridiidae  
*bipunctatum* (*Theridion*): *Steatoda bipunctata*  
*biscissa* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*bisissa* (*Colobocyba*): *Tapinocyba biscissa*  
*bisissus* (*Plaesiocraerus*): *Tapinocyba biscissa*  
*bistigma* (*Philodromus*): *Philodromus pulchellus*  
*bituberculata* (*Enidia*): *Hypomma bituberculatum*  
*bituberculata* (*Gibbaranea*): Araneidae  
*bituberculatum* (*Gonatium*): *Hypomma bituberculatum*  
*bituberculatum* (*Hypomma*): Linyphiidae  
*bituberculatus* (*Araneus*): *Gibbaranea bituberculata*  
*bituberculatus* (*Dismodicus*): *Hypomma bituberculatum*  
*bivittatus* (*Firmicus*): Thomisidae  
*bivittatus* (*Menemerus*): Salticidae  
*blackwalli* (*Drassus*): *Scotophaeus blackwalli*  
*blackwalli* (*Herpyllus*): *Scotophaeus blackwalli*  
*blackwalli* (*Lophocarenum*): *Trichopterna cito*  
*blackwalli* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*blackwalli* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*blackwalli* (*Theridion*): Theridiidae  
*blackwallii* (*Erigone*): *Trichopterna cito*  
*blanda* (*Lycosa*): *Pardosa blanda*  
*blanda* (*Mioxena*): Linyphiidae  
*blanda* (*Pardosa*): Lycosidae  
*blandum* (*Gongyliidiellum*): *Mioxena blanda*  
*bleodonticus* (*Atypus*): *Atypus affinis*  
*blitea* (*Ozyptila*): *Xysticus bliteus*  
*bliteus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*boesenbergi* (*Theridion*): Theridiidae  
*bogarti* (*Typhochrestus*): Linyphiidae  
*boiorum* (*Dictyna*): *Dictyna ammophila*  
*Bolyphantes*: Linyphiidae  
*bonneti* (*Xysticus*): Thomisidae  
*Bordea*: Linyphiidae  
*bourneti* (*Meta*): Tetragnathidae  
*bourneti* [err.] (*Meta*): *Meta menardi*  
*braccata* (*Dipoena*): Theridiidae  
*braccata* (*Euryopis*): *Dipoena braccata*  
*braccata* (*Lasaeola*): *Dipoena braccata*  
*braccatus* (*Drassus*): *Phaeoecelus braccatus*  
*braccatus* (*Phaeoecelus*): Gnaphosidae  
*bresnieri* (*Phlegra*): Salticidae  
*bressica* [err.] (*Hahnia*): *Hahnia pusilla*  
*brevidens* (*Brigittea*): *Dictyna brevidens*  
*brevidens* (*Dictyna*): Dictynidae  
*brevidens* (*Emblyna*): *Dictyna brevidens*  
*brevipalpis* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*brevipalpis* (*Erigone*): *Centromerus brevipalpis*  
*brevipalpus* (*Tmeticus*): *Centromerus brevipalpis*  
*brevipes* (*Ceratinella*): Linyphiidae  
*brevipes* (*Clubiona*): Clubionidae  
*brevipes* (*Erigone*): *Ceratinella brevipis*  
*brevipes* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*brevis* (*Ceratinella*): Linyphiidae  
*brevis* (*Erigone*): *Ceratinella brevis*  
*brevis* (*Pellenes*): Salticidae  
*brevitarsis* (*Analtella*): *Lathys narbonensis*  
*breviuscula* (*Micaria*): *Micaria alpina*  
*brevivulvatus* (*Centromerus*): *Centromerus brevipalpis*  
*britteni* (*Satlatlas*): Linyphiidae  
*broccha* (*Rhaebothorax*): *Mecynargus brocchus*  
*brocchus* (*Mecynargus*): Linyphiidae  
*brolemanni* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*bruennichi* (*Argiope*): Araneidae  
*bruennichi* (*Argyope*): *Argiope bruennichi*  
*bruennichi* (*Metargiope*): *Argiope bruennichi*  
*brunnea* (*Agelena*): *Agroeca brunnea*  
*brunnea* (*Agroeca*): Liocranidae  
*brunnichii* (*Argiope*): *Argiope bruennichi*

*bucculenta* (*Floronia*): Linyphiidae  
*bucculenta* (*Frontina*): *Floronia bucculenta*  
*bucculenta* (*Linyphia*): *Floronia bucculenta*  
*bucculenta* (*Tapinopa*): *Floronia bucculenta*  
*bucculentus* (*Stemonyphantes*): *Floronia bucculenta*  
*bucephala* (*Erigone*): *Pelecopsis bucephala*  
*bucephala* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*bucephalus* (*Exechophysis*): *Pelecopsis bucephala*  
*buchari* (*Philodromus*): Philodromidae  
*bufo* (*Ozyptila*): *Xysticus bufo*  
*bufo* (*Proxysticus*): *Xysticus bufo*  
*bufo* (*Xysticus*): Thomisidae  
*burgundicus* (*Bathyphantes*): *Bathyphantes gracilis*  
*buxi* (*Philodromus*): Philodromidae  
*byzanthina* (*Araneus*): *Neoscona adianta*

## C

*cacuminum* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*caecus* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*caementaria* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*caerulescens* (*Clubiona*): Clubionidae  
*caerulescens saxatilis* (*Clubiona*): *Clubiona saxatilis*  
*calcarifera* (*Wiehlea*): *Gongylidiellum calcariferum*  
*calcariferum* (*Gongylidiellum*): Linyphiidae  
*calenzanae* (*Xysticus*): *Xysticus kochi*  
*caligans* (*Ozyptila*): *Ozyptila praticola*  
*caliginosa* (*Lycosa*): *Trochosa hispanica*  
*callida* (*Prosthesima*): *Zelotes callidus*  
*callidus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*Callilepis*: Gnaphosidae  
*Callobius*: Amaurobiidae  
*cambridgei* (*Dysdera*): *Dysdera erythrina*  
*cambridgei* (*Ero*): Mimetidae  
*cambridgei* (*Heliophanus*): *Heliophanus tribulosus*  
*cambridgei* (*Xysticus*): *Xysticus luctator*  
*campbelli* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*campestris* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*candida* (*Hahnia*): Hahniidae  
*candida* (*Minicia*): Linyphiidae  
*candidum* (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium virescens*  
*canestrini* [err.] (*Micaria*): *Micaria cyrnea*  
*canestrinii* (*Hycitia*): *Marpissa canestrinii*  
*canestrinii* (*Marpissa*): Salticidae  
*canestrinii* (*Mendoza*): *Marpissa canestrinii*  
*canestrinii* (*Mithion*): *Marpissa canestrinii*  
*canosus* (*Pellenes*): Salticidae  
*cantabrica* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*cantabrorum* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*cantabrorum* (*Parachtes*): *Harpactocrates cantabrorum*  
*cantalicum* (*Gongylidium*): *Oedothorax gibbifer*  
*cantalicus* (*Oedothorax*): *Oedothorax gibbifer*  
*caperatus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*capitata* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*capitatum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis capitata*  
*capito* (*Erigone*): *Walckenaeria capito*

*capito* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*capito* (*Wideria*): *Walckenaeria capito*  
*capra* (*Erigone*): *Erigone dentigera*  
*capra* (*Tegenaria*): *Tegenaria fuesslini*  
*capucinus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*capucinus* (*Tmeticus*): *Centromerus capucinus*  
*Caracladus*: Linyphiidae  
*carbonaria* (*Aculepeira*): Araneidae  
*carbonaria* (*Epeira*): *Aculepeira carbonaria*  
*carbonarius* (*Araneus*): *Aculepeira carbonaria*  
*caricis* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*caricis* (*Sitticus*): Salticidae  
*carli* (*Sciastes*): Linyphiidae  
*carlittensis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*carmeli* (*Setaphis*): Gnaphosidae  
*carmeli* (*Zelotes*): *Setaphis carmeli*  
*carminans* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*carpenteri* (*Macrargus*): Linyphiidae  
*Carrhotus*: Salticidae  
*castaneipes* (*Diplocephalus*): *Monocephalus castaneipes*  
*castaneipes* (*Monocephalus*): Linyphiidae  
*castaneipes* (*Plaesiocraerus*): *Monocephalus castaneipes*  
*castrisiana* (*Phintella*): Salticidae  
*castrisiana* (*Telamonia*): *Phintella castrisiana*  
*caucasius* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*caudata* (*Textrix*): Agelenidae  
*cauta* (*Agynera*): Linyphiidae  
*cavalairensis* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*cavicola* (*Bordea*): Linyphiidae  
*Caviphantes*: Linyphiidae  
*cebennicus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*cebennicus* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes cebennicus*  
*celans* (*Agroeca*): *Scotina celans*  
*celans* (*Scotina*): Liocranidae  
*celerrima* (*Nomisia*): Gnaphosidae  
*celerrima* (*Pterotricha*): *Nomisia celerrima*  
*cellariorum* (*Oecobius*): Oecobiidae  
*cellulanus* (*Nesticus*): Nesticidae  
*Centromerita*: Linyphiidae  
*Centromerus*: Linyphiidae  
*Cepheia*: Mysmenidae  
*Ceratinella*: Linyphiidae  
*Ceratinopsis*: Linyphiidae  
*cerberus* (*Taranucnus*): *Troglohyphantes cerberus*  
*cerberus* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*Cercidia*: Araneidae  
*ceretanus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*ceretanus* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes ceretanus*  
*cernuus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*cernuus* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes cernuus*  
*ceropegia* (*Aculepeira*): Araneidae  
*ceropegia* (*Araneus*): *Aculepeira ceropegia*  
*ceropegia* (*Epeira*): *Aculepeira ceropegia*  
*ceropegius* (*Araneus*): *Aculepeira ceropegia*

- cervinus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*cespitem* (*Philodromus*): Philodromidae  
*Ceto*: Corinnidae  
*Chalcoscirtus*: Salticidae  
*chalybeius* (*Ballus*): *Ballus depressus*  
*Cheiracanthium*: Clubionidae  
*Chorizomma*: Dictynidae  
*chrysea* (*Agroeca*): *Agroeca cuprea*  
*chrysochlora* (*Tetragnatha*): *Tetragnatha obtusa*  
*chrysopogon* (*Leptorchestes*): *Leptorchestes mutilloides*  
*chrysops* (*Philaeus*): Salticidae  
*ciaisensis* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*cicur* (*Cicurina*): Dictynidae  
*cicurea* (*Cicurina*): *Cicurina cicur*  
*Cicurina*: Dictynidae  
*cincta* (*Aphantaulax*): Gnaphosidae  
*cinctus* (*Aphantaulax*): *Aphantaulax cincta*  
*cinctus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*cinctus* (*Tmeticus*): *Centromerus cinctus*  
*cinerea* (*Arctosa*): Lycosidae  
*cinerea* (*Berlandina*): Gnaphosidae  
*cinerea* (*Cicurina*): *Cicurina cicur*  
*cinerea* (*Lycosa*): *Arctosa cinerea*  
*cinerea* (*Pterotricha*): *Berlandina cinerea*  
*cinerea* (*Trochosa*): *Arctosa cinerea*  
*cinereofasciata* (*Phlegra*): Salticidae  
*cinereus* (*Attus*): *Attulus helveolus*  
*Cineta*: Linyphiidae  
*cingulata* (*Calliethera*): *Salticus cingulatus*  
*cingulatum* (*Epiblemum*): *Salticus cingulatus*  
*cingulatus* (*Attus*): *Sitticus saxicola*  
*cingulatus* (*Salticus*): Salticidae  
*cingulatus* (*Sitticus*): *Sitticus saxicola*  
*cinnaberina* (*Eresa*): *Eresus niger*  
*cinnaberinus* (*Eresus*): *Eresus niger*  
*circe* (*Araneus*): Araneidae  
*circe* (*Epeira*): *Araneus circe*  
*circumspecta* (*Prothesima*): *Zelotes tenuis*  
*circumspectus* (*Zelotes*): *Zelotes tenuis*  
*circumspectus* [err.] (*Zelotes*): *Zelotes ruscinensis*  
*cirratus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*cirratus* (*Piniphantes*): *Lepthyphantes cirratus*  
*cirrifrons* (*Troxochrus*): Linyphiidae  
*cirtensis* (*Didectoprocnemis*): Linyphiidae  
*cirtensis* (*Evansia*): *Didectoprocnemis cirtensis*  
*cito* (*Trichopterna*): Linyphiidae  
*citricola* (*Cyrtophora*): Araneidae  
*citrinellus* (*Thomisus*): Thomisidae  
*civica* (*Brigittea*): *Dictyna civica*  
*civica* (*Dictyna*): Dictynidae  
*civica* (*Prothesima*): *Zelotes civicus*  
*civicum* (*Theridion*): *Dictyna civica*  
*civicus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*civilis* (*Tegenaria*): *Tegenaria domestica*  
*clairi* (*Linyphia*): *Turinyphia clairi*  
*clairi* (*Turinyphia*): Linyphiidae  
*clathrata* (*Linyphia*): *Neriene clathrata*  
*clathrata* (*Neriene*): Linyphiidae  
*claustrarius* (*Amaurobius*): *Callobius claustrarius*  
*claustrarius* (*Callobius*): Amaurobiidae  
*claustrarius* (*Ciniflo*): *Callobius claustrarius*  
*claveata* (*Ozyptila*): *Ozyptila nigrita*  
*clercki* (*Dolomedes*): *Dolomedes plantarius*  
*clivicola* (*Melanophora*): *Zelotes clivicola*  
*clivicola* (*Prothesima*): *Zelotes clivicola*  
*clivicola* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*Clubiona*: Clubionidae  
*clypeatum* (*Brachycentrum*): *Pelecopsis susannae*  
*Cnephalocotes*: Linyphiidae  
*coarctata* (*Lycosoides*): Agelenidae  
*coarctata* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*coarctata* (*Textrix*): *Lycosoides coarctata*  
*coecus* (*Troglohyphantes*): *Troglohyphantes caecus*  
*Coelotes*: Amaurobiidae  
*cognatus* (*Drassodes*): *Haplodrassus cognatus*  
*cognatus* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*cognatus* [femelle] (*Drassus*): *Haplodrassus cognatus*  
*cognatus* [mâle] (*Drassus*): *Scotophaeus westringi*  
*coiffaiti* (*Lepthyphantes*): *Bordea cavicola*  
*Collinsia*: Linyphiidae  
*collinus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*collinus* (*Megalepthyphantes*): *Lepthyphantes collinus*  
*collinus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*coloradensis* (*Thanatus*): Philodromidae  
*comata* (*Linyphia*): *Centromerita bicolor*  
*complicatus* (*Improphantes*): *Lepthyphantes complicatus*  
*complicatus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*compta* (*Clubiona*): *Clubiona compta*  
*comptula* (*Euophrys*): *Euophrys rufibarbis*  
*comptulus* (*Xysticus*): *Xysticus nubilus*  
*compta* (*Clubiona*): Clubionidae  
*concertor* (*Drassodes*): *Haplodrassus concertor*  
*concertor* (*Drassus*): *Haplodrassus concertor*  
*concertor* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*concinna* (*Centromerita*): Linyphiidae  
*concinna* (*Tmeticus*): *Centromerita concinna*  
*concolor* (*Bathyphantes*): *Diplostyla concolor*  
*concolor* (*Callilepis*): Gnaphosidae  
*concolor* (*Diplostyla*): Linyphiidae  
*concolor* (*Liocranum*): Liocranidae  
*concolor* (*Stylophora*): *Diplostyla concolor*  
*condei* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*confluens* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*confusa* (*Calliethera*): *Salticus confusus*  
*confusus* (*Salticus*): Salticidae  
*congener* (*Icius*): Salticidae  
*congener* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*congenera* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*conica* (*Cyclosa*): Araneidae  
*conigera* (*Agyneta*): Linyphiidae  
*conigera* (*Microneta*): *Agyneta conigera*

- conigerum* (*Theridion*): Theridiidae  
*conjunctus* (*Salticus*): Salticidae  
*connatus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*consecuta* (*Archaeodictyna*): *Dictyna consecuta*  
*consecuta* (*Dictyna*): Dictynidae  
*conspersa* [femelle] (*Anyphaena*): *Anyphaena sabina*  
*conspersa* [mâle] (*Anyphaena*): *Anyphaena alboirrata*  
*conspicua* (*Kishidaia*): *Poecilochroa conspicua*  
*conspicua* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae  
*constellatus* (*Philodromus*): *Philodromus fuscolumbat*  
*convexa* (*Dipoena*): Theridiidae  
*convexa* (*Lasaeola*): *Dipoena convexa*  
*convexa* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*convexum* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*convolutus* (*Neon*): Salticidae  
*cor* (*Xysticus*): Thomisidae  
*coracina* (*Dipoena*): Theridiidae  
*corallipes* (*Gonatium*): *Gonatium paradoxum*  
*Coriarachne*: Thomisidae  
*corniculans* (*Erigone*): *Walckenaeria corniculans*  
*corniculans* (*Prosopotheca*): *Walckenaeria corniculans*  
*corniculans* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*corniger* (*Micryphantes*): *Sintula corniger*  
*corniger* (*Sintula*): Linyphiidae  
*cornigera* (*Sintula*): *Sintula corniger*  
*cornigera* [err.] (*Sintula*): *Sintula retroversus*  
*cornix* (*Theonina*): Linyphiidae  
*cornix* (*Theonoe*): *Theonina cornix*  
*cornuta* (*Enidia*): *Hypomma cornutum*  
*cornuta* (*Epeira*): *Larinioides cornutus*  
*cornutum* (*Gonatium*): *Hypomma cornutum*  
*cornutum* (*Hypomma*): Linyphiidae  
*cornutus* (*Araneus*): *Larinioides cornutus*  
*cornutus* (*Dismodicus*): *Hypomma cornutum*  
*cornutus* (*Larinioides*): Araneidae  
*corollata* (*Steatoda*): *Steatoda albomaculata*  
*corollatus* (*Lithyphantes*): *Steatoda albomaculata*  
*corrugis* (*Erigone*): *Hybocoptus corrugis*  
*corrugis* (*Hybocoptus*): Linyphiidae  
*corsica* (*Colobocyba*): *Tapinocyba corsica*  
*corsica* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*corsica* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*corsica* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*corsica* (*Tegenaria*): *Tegenaria fuesslini*  
*corsicos* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*corsicum* (*Micariosoma*): *Phrurolithus corsicus*  
*corsicum* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*corsicus* (*Amaurobius*): *Amaurobius ferox*  
*corsicus* (*Centromerus*): *Porrhomma corsicum*  
*corsicus* (*Heliophanus*): *Heliophanus flavipes*  
*corsicus* (*Phrurolithus*): Corinnidae  
*corsicus* (*Plaesiocraerus*): *Tapinocyba corsica*  
*corsicus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*corticalis* (*Araneus*): *Nuctenea corticalis*  
*corticalis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*corticalis* (*Epeira*): *Nuctenea corticalis*  
*corticalis* (*Harpactea*): Dysderidae  
*corticalis* (*Harpactes*): *Harpactea corticalis*  
*corticalis* (*Nuctenea*): Araneidae  
*corticaloides* (*Araneus*): *Nuctenea corticalis*  
*corticinus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*corticola* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*couseransense* (*Zodarion*): Zodariidae  
*crassiceps* (*Araeoncus*): Linyphiidae  
*crassiloba* (*Diplocephalus*): *Diplocephalus crassilobus*  
*crassiloba* (*Prosoponcus*): *Diplocephalus crassilobus*  
*crassilobus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*crassipes* (*Araeoncus*): *Araeoncus crassiceps*  
*crassirostris* (*Cnephalocotes*): *Mecopisthes crassirostris*  
*crassirostris* (*Mecopisthes*): Linyphiidae  
*cratera* (*Epeira*): *Agalenatea redii*  
*Cresmatoneta*: Linyphiidae  
*cribrata* (*Dysdera*): Dysderidae  
*cribrata* (*Pardosa*): Lycosidae  
*cribratus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*crinigerum* (*Theridion*): Theridiidae  
*cristata* (*Erigone*): *Diplocephalus cristatus*  
*cristatopalpus* (*Erigone*): Linyphiidae  
*cristatum* (*Gongylidium*): *Trematocephalus cristatus*  
*cristatus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*cristatus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*cristatus* (*Prosoponcus*): *Diplocephalus cristatus*  
*cristatus* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes cristatus*  
*cristatus* (*Thomisus*): *Xysticus cristatus*  
*cristatus* (*Trematocephalus*): Linyphiidae  
*cristatus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*crocata* (*Dysdera*): Dysderidae  
*crucifer* (*Bolyphantes*): Linyphiidae  
*crucifer* (*Incestophantes*): *Bolyphantes crucifer*  
*crucifer* (*Lepthyphantes*): *Bolyphantes crucifer*  
*crucigerus* (*Attus*): *Pellenes tripunctatus*  
*Crustulina*: Theridiidae  
*Cryphoeca*: Hahniidae  
*crypticola* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*Cryptodrassus*: Gnaphosidae  
*Cteniza*: Ctenizidae  
*cucullata* (*Erigone*): *Walckenaeria cucullata*  
*cucullata* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*cucullata* (*Wideria*): *Walckenaeria cucullata*  
*cucurbitina* (*Aranea*): *Araniella cucurbitina*  
*cucurbitina* (*Araniella*): Araneidae  
*cucurbitina* (*Epeira*): *Araniella cucurbitina*  
*cucurbitina* (*Erigone*): *Trichopterna cucurbitina*  
*cucurbitina* (*Trichopterna*): Linyphiidae  
*cucurbitinum* (*Lophocarenum*): *Trichopterna cucurbitina*  
*cucurbitinus* (*Araneus*): *Araniella cucurbitina*  
*culicinus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*culicinus* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes culicinus*

*culminicola* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*culminicola* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes monticola*  
*culminicola* (*Streptosphaenus*): *Diplocephalus culminicola*  
*cuneata* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*cuneata* (*Lycosa*): *Alopecosa cuneata*  
*cuneata* (*Tarentula*): *Alopecosa cuneata*  
*cupidon* (*Blaniargus*): *Micrargus cupidon*  
*cupidon* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*cuprea* (*Agroeca*): Liocranidae  
*cupreus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*cupreus* (*Drassus*): *Drassodes cupreus*  
*cupreus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*cursor* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*cursor* (*Lycosa*): *Alopecosa cursor*  
*cursor* (*Tarentula*): *Alopecosa cursor*  
*cursoria* (*Lycosa*): *Pardosa blanda*  
*cursoria* (*Pardosa*): *Pardosa blanda*  
*curta* (*Erigone*): *Silometopus curtus*  
*curtus* (*Cnephalocotes*): *Silometopus curtus*  
*curtus* (*Silometopus*): Linyphiidae  
*curvimana* (*Neottiura*): *Theridion curvimanum*  
*curvimanum* (*Theridion*): Theridiidae  
*curvimanus* (*Theridion*): *Theridion curvimanum*  
*cuspidata* (*Co:nicularia*): *Walckenaeria cuspidata*  
*cuspidata* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*cyanescens* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*Cybaeodes*: Liocranidae  
*Cybaeus*: Cybaeidae  
*cyclops* (*Erigone*): *Plaesianillus cyclops*  
*cyclops* (*Plaesianillus*): Linyphiidae  
*cyclops* (*Ploesianillus*): *Plaesianillus cyclops*  
*cyclops* (*Tapinocyba*): *Plaesianillus cyclops*  
*Cyclosa*: Araneidae  
*Cyrba*: Salticidae  
*cyrnea* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*cyrnea* (*Tegenaria*): *Tegenaria soriculata*  
*Cyrtarachne*: Araneidae  
*Cyrtophora*: Araneidae

## D

*Dactylopisthes*: Linyphiidae  
*dalmasi* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*dalmasi* (*Wideria*): *Walckenaeria dalmasi*  
*dalmatensis* (*Drassodes*): *Haplodrassus dalmatensis*  
*dalmatensis* (*Drassus*): *Haplodrassus dalmatensis*  
*dalmatensis* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*dalmatica* (*Epeira*): *Neoscona subfusca*  
*dalmatica* (*Neoscona*): *Neoscona subfusca*  
*dalmatica* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*dalmaticus* (*Araneus*): *Neoscona subfusca*  
*dalmaticus* (*Synageles*): Salticidae  
*dampfi* (*Heliophanus*): Salticidae  
*Dasumia*: Dysderidae  
*dearmata* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*debilis* (*Histoipona*): *Histoipona torpida*

*debilis* (*Philodromus*): *Philodromus pulchellus*  
*debilis* (*Tegenaria*): *Histoipona torpida*  
*decemnotata* (*Zygiella*): *Zygiella x-notata*  
*decens* (*Porrhomma*): *Porrhomma microphthalmum*  
*declinans* (*Zelotes*): *Zelotes segrex*  
*decollata* (*Erigone*): *Hybocoptus corrugis*  
*decollatus* (*Hybocoptus*): *Hybocoptus corrugis*  
*decolor* (*Improphantes*): *Lepthyphantes decolor*  
*decolor* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*decora* (*Agyneta*): Linyphiidae  
*decora* (*Clubiona*): *Clubiona genevensis*  
*decorus* (*Araneus*): *Singa neta*  
*degeeri* (*Pachygnatha*): Tetragnathidae  
*delphinensis* [femelle] (*Tmeticus*): *Centromerus sylvaticus*  
*delphinensis* [mâle] (*Tmeticus*): *Centromerus incilium*  
*Dendryphantes*: Salticidae  
*denisi* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*dentata* (*Erygona*): *Gnathonarium dentatum*  
*dentatidens* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*dentatidens* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes dentatidens*  
*dentatidens* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*dentatum* (*Gnathonarium*): Linyphiidae  
*dentatum* (*Gongylidium*): *Gnathonarium dentatum*  
*dentatus* (*Oedothorax*): *Gnathonarium dentatum*  
*dentatus* (*Trachynotus*): *Gnathonarium dentatum*  
*denticheles* (*Lessertia*): Linyphiidae  
*denticheles* (*Macrargus*): *Lessertia denticheles*  
*denticheles* (*Tmeticus*): *Lessertia denticheles*  
*denticulata* (*Textrix*): Agelenidae  
*denticulatum* (*Theridion*): *Theridion melanurum*  
*dentiger* (*Xysticus*): *Xysticus lineatus*  
*dentigera* (*Erigone*): Linyphiidae  
*dentigera* (*Euryopis*): Theridiidae  
*dentipalpis* (*Erigone*): Linyphiidae  
*dentipalpis* (*Gongylidium*): *Erigone dentipalpis*  
*depressa* (*Coriarachne*): Thomisidae  
*depressifrons* (*Acartauchenius*): Linyphiidae  
*depressus* (*Attus*): *Ballus depressus*  
*depressus* (*Ballus*): Salticidae  
*derhami* (*Tegenaria*): *Tegenaria domestica*  
*derisor* (*Acartauchenius*): *Trachelocamptus derisor*  
*derisor* (*Trachelocamptus*): Linyphiidae  
*deroueti* (*Tegenaria*): *Tegenaria nervosa*  
*Desidiopsis*: Dictynidae  
*desidiosus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*despaxi* (*Collinsia*): Linyphiidae  
*despaxi* (*Coryphaeolana*): *Collinsia despaxi*  
*Devade*: Dictynidae  
*devotus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*diabolicum* (*Porrhomma*): *Porrhomma convexum*  
*diademata* (*Epeira*): *Araneus diadematus*  
*diadematus* (*Araneus*): Araneidae  
*Diaea*: Thomisidae  
*Diastanillus*: Linyphiidae  
*diceros* (*Saloca*): Linyphiidae

- dicerus* (*Sintula*): Linyphiidae  
*Dictyna*: Dictynidae  
*Dicymbium*: Linyphiidae  
*Didectoprocnemis*: Linyphiidae  
*difficilis* (*Chalcoscirtus*): Salticidae  
*difficilis* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*difficilis* (*Drassus*): *Drassodes difficilis*  
*difficilis* (*Euophrys*): *Chalcoscirtus difficilis*  
*difficilis* (*Hahnia*): Hahniidae  
*digitatus* (*Typhochrestus*): Linyphiidae  
*digitatus* (*Typhochrestus*): *Typhochrestus digitatus*  
*digiticeps* (*Dactylopiastes*): Linyphiidae  
*digiticeps* (*Erigone*): *Dactylopiastes digiticeps*  
*dilata* (*Erigonopterna*): *Erigonoplus dilatus*  
*dilatus* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*diluta* (*Erigone*): *Centromerus dilutus*  
*diluta* (*Rhabdoria*): *Centromerus dilutus*  
*dilutus* (*Blaniargus*): *Micrargus dilutus*  
*dilutus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*dilutus* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*dilutus* (*Micrargus*): *Centromerus dilutus*  
*dilutus* (*Sintula*): *Centromerus dilutus*  
*dimidiata* (*Poecilochroa*): *Poecilochroa senilis*  
*dimidiatus* (*Diplocephalus*): *Diplocephalus graecus*  
*dimidiatus* (*Drassus*): *Poecilochroa senilis*  
*dimidiatus* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus graecus*  
*dimiensis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*diodia* (*Araneus*): *Zilla diodia*  
*diodia* (*Epeira*): *Zilla diodia*  
*diodia* (*Zilla*): Araneidae  
*diodius* (*Araneus*): *Zilla diodia*  
*Diplocentria*: Linyphiidae  
*Diplocephalus*: Linyphiidae  
*Diplostyla*: Linyphiidae  
*Dipoena*: Theridiidae  
*Dirksia*: Hahniidae  
*discedens* (*Araeoncus*): Linyphiidae  
*discedens* (*Erigone*): *Araeoncus discedens*  
*discedens* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*disjugata* (*Tapinopa*): Linyphiidae  
*Dismodicus*: Linyphiidae  
*dispar* (*Philodromus*): Philodromidae  
*displicata* (*Araniella*): Araneidae  
*dissimilis* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*dissimilis* (*Thanatus*): Philodromidae  
*distincta* (*Collinsia*): Linyphiidae  
*distincta* (*Coryphaeolana*): *Collinsia distincta*  
*distincta* (*Loxosceles*): *Loxosceles rufescens*  
*distinctum* (*Gongyliidium*): *Collinsia distincta*  
*distinctus* (*Coryphaeolanus*): *Collinsia distincta*  
*distinctus* (*Halorates*): *Collinsia distincta*  
*distinguendus* (*Sitticus*): Salticidae  
*diversa* (*Clubiona*): Clubionidae  
*diversa* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*dives* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*dives* (*Micarirolepis*): *Micaria dives*  
*Dolomedes*: Pisauridae  
*dolosa* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*domestica* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*domesticus* (*Oonops*): Oonopidae  
*domesticus* (*Tegenaria*): *Tegenaria domestica*  
*Donacochara*: Linyphiidae  
*donnezanus* (*Zelotes*): *Zelotes cyanescens*  
*dorsalis* (*Bathyphantes*): *Kaestneria dorsalis*  
*dorsalis* (*Cresmatoneta*): *Kaestneria dorsalis*  
*dorsalis* (*Kaestneria*): Linyphiidae  
*dorsalis* (*Stylophora*): *Kaestneria dorsalis*  
*dorsata* (*Diaea*): Thomisidae  
*dorsatus* (*Dendryphantes*): *Philaeus chrysops*  
*dorsuosus* (*Typhochrestus*): *Typhochrestus digitatus*  
*dorsuosus* [err.] (*Typhochrestus*): *Typhochrestus simoni*  
*Drapetisca*: Linyphiidae  
*Drassodes*: Gnaphosidae  
*drassoides* (*Dysdera*): *Harpactocrates drassoides*  
*drassoides* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*Drepanotylus*: Linyphiidae  
*Dresconella*: Linyphiidae  
*dromedaria* (*Epeira*): *Gibbaranea bituberculata*  
*dromedaria* (*Paidiscura*): *Theridion dromedarius*  
*dromedarius* (*Araneus*): *Gibbaranea bituberculata*  
*dromedarius* (*Theridion*): Theridiidae  
*dubia* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*dubius* (*Heliophanus*): Salticidae  
*dubius* (*Hybocoptus*): Linyphiidae  
*dubius* (*Typhochrestus*): Linyphiidae  
*duellica* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*dufourii* (*Araneus*): *Siwa dufouri*  
*dufourii* (*Larinia*): *Siwa dufouri*  
*dufourii* (*Siwa*): Araneidae  
*dulciacensis* (*Cornicularia*): *Walckenaeria dulciacensis*  
*dulciacensis* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*durandi* (*Clotho*): *Uroctea durandi*  
*durandi* (*Uroctea*): Oecobiidae  
*Dysdera*: Dysderidae  
*Dysderina*: Oonopidae  
*dysderoides* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*dzieduszyckii* (*Sitticus*): Salticidae
- E**  
*eborodunensis* (*Erigone*): *Diplocephalus helleri*  
*eborodunensis* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus helleri*  
*ecclesiasticus* (*Lepthyphantes*): *Bordea negrei*  
*Echemus*: Gnaphosidae  
*edentatum* (*Gongyliidium*): Linyphiidae  
*edentulus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*egeria* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*egregius* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*ejuncida* (*Tetragnatha*): *Tetragnatha nitens*  
*eleanora* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*electa* (*Melanophora*): *Zelotes electus*  
*electa* (*Prothesima*): *Zelotes electus*

*electus* (*Tmeticus*): *Centromerus prudens*  
*electus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*elegans* (*Antistea*): Hahniidae  
*elegans* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*elegans* (*Enyo*): *Zodarion elegans*  
*elegans* (*Erigone*): *Silometopus elegans*  
*elegans* (*Hahnia*): *Antistea elegans*  
*elegans* (*Silometopus*): Linyphiidae  
*elegans* (*Zodarion*): Zadariidae  
*elegans* [err.] (*Cnephalocotes*): *Silometopus reussi*  
*elevata* (*Spermophora*): Pholcidae  
*elevata* (*Spermophorides*): *Spermophora elevata*  
*elevatus* (*Dismodicus*): Linyphiidae  
*elevatus* [err.] (*Dismodicus*): *Dismodicus bifrons*  
*elongata* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*elongatum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis elongata*  
*emarginata* (*Enyo*): *Zodarion emarginatum*  
*emarginatum* (*Zodarion*): Zadariidae  
*emarginatus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*emphana* (*Linyphia*): *Nerienne emphana*  
*emphana* (*Nerienne*): Linyphiidae  
*emphana* (*Prolinyphia*): *Nerienne emphana*  
*encarpatus* (*Dendryphantes*): *Pseudicius encarpatus*  
*encarpatus* (*Pseudicius*): Salticidae  
*encifer* (*Heliophanus*): Salticidae  
*encifer* (*Tmeticus*): *Centromerus arcanus*  
*Enoplognatha*: Theridiidae  
*ensifer* (*Centromerus*): *Centromerus arcanus*  
*ensipotens* (*Erigone*): *Gonatium ensipotens*  
*ensipotens* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*Entelecara*: Linyphiidae  
*Eperigone*: Linyphiidae  
*episinoides* (*Euryopsis*): *Euryopsis acuminata*  
*Episinus*: Theridiidae  
*equestris* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*erberi* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*erebea* (*Melanophora*): *Zelotes erebeus*  
*erebea* (*Prothesima*): *Zelotes erebeus*  
*erebeus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*eremita* (*Nesticus*): Nesticidae  
*Eresus*: Eresidae  
*ericaeus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*ericaeus* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes ericaeus*  
*ericarum* (*Tegenaria*): *Tegenaria fuesslini*  
*ericeae* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes ericaeus*  
*ericicola* (*Erigone*): *Hybocoptus corrugis*  
*ericicola* (*Hybocoptus*): *Hybocoptus corrugis*  
*Erigone*: Linyphiidae  
*Erigonella*: Linyphiidae  
*Erigonoplus*: Linyphiidae  
*Ero*: Mimetidae  
*errans* [err.] (*Porrhomma*): *Porrhomma microphthalmum*  
*errata* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*erratica* (*Clubiona*): *Clubiona subsultans*  
*erratica* (*Euophrys*): Salticidae  
*erratica* (*Pseudeuophrys*): *Euophrys erratica*

*erraticum* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*erraticus* (*Attus*): *Euophrys erratica*  
*erraticus* (*Euophrys*): *Euophrys erratica*  
*erraticus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*erroneum* (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium erraticum*  
*erythrina* (*Dysdera*): Dysderidae  
*erythrina* (*Dysderina*): *Dysdera erythrina*  
*erythrina* (*Prosopotheca*): *Walckenaeria erythrina*  
*erythrina* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*erythropus* (*Dipoena*): Theridiidae  
*erythropus* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*erythropus* (*Lasaeola*): *Dipoena erythropus*  
*euchirus* (*Lepthyphantes*): *Meioneta saxatilis*  
*eugeni* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*eumenis* (*Bathyphantes*): Linyphiidae  
*Euophrys*: Salticidae  
*europaea* (*Adoxoneta*): *Centromerus europaeus*  
*europaea* (*Anthrobia*): *Centromerus europaeus*  
*europaeus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*Euryopsis*: Theridiidae  
*Evansia*: Linyphiidae  
*Evarcha*: Salticidae  
*excisa* (*Hilaira*): Linyphiidae  
*exigua* (*Prothesima*): *Zelotes exiguus*  
*exiguus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*exilis* (*Tapinocyba*): *Tapinocyba pallens*  
*exornata* (*Callilepis*): *Nomisia exornata*  
*exornata* (*Nomisia*): Gnaphosidae  
*exornata* (*Pterotricha*): *Nomisia exornata*  
*exornata* (*Pythonissa*): *Nomisia exornata*  
*expers* (*Heliophanus*): *Heliophanus melinus*  
*experta* (*Tallusia*): Linyphiidae  
*expertus* (*Centromerus*): *Tallusia experta*  
*expertus* (*Tmeticus*): *Tallusia experta*  
*expunctus* (*Agyphantes*): *Lepthyphantes expunctus*  
*expunctus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*extensa* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*exultans* (*Heliophanus*): *Heliophanus auratus*

## F

*fabrilis* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*fabrilis* (*Lycosa*): *Alopecosa fabrilis*  
*fagei* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*fagei* (*Nomisia*): Gnaphosidae  
*fagicola* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*fagicola* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*fagicola* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes fagicola*  
*falcata* (*Ergane*): *Evarcha falcata*  
*falcata* (*Evarcha*): Salticidae  
*falcatus* (*Attus*): *Evarcha falcata*  
*falcatus* (*Hasarius*): *Evarcha falcata*  
*falcifrons* (*Metopobactrus*): Linyphiidae  
*falcifrons* (*Metopobactrus*): *Metopobactrus falcifrons*  
*falconeri* (*Astenargus*): *Jacksonella falconeri*  
*falconeri* (*Jacksonella*): Linyphiidae  
*fallax* (*Philodromus*): Philodromidae

- falsificus* (*Menemerus*): Salticidae  
*familiale* (*Theridion*): Theridiidae  
*fasciata* (*Argiope*): *Argiope bruennichi*  
*fasciata* (*Epeira*): *Argiope bruennichi*  
*fasciata* (*Nephila*): *Argiope bruennichi*  
*fasciata* (*Phlegra*): Salticidae  
*fasciatus* (*Attus*): *Phlegra fasciata*  
*faustus* (*Latithorax*): Linyphiidae  
*faustus* (*Rhaebothorax*): *Latithorax faustus*  
*faustus* (*Semljicola*): *Latithorax faustus*  
*femella* (*Prosthesima*): *Zelotes femellus*  
*femellus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*femineus* (*Leptodrassus*): Gnaphosidae  
*femorialis* (*Pardosa*): Lycosidae  
*femorialis* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*fenestralis* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*fenestralis* (*Ciniflo*): *Amaurobius fenestralis*  
*ferox* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*ferruginea* (*Pardosa*): Lycosidae  
*ferruginea* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*ferrugineus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*fertoni* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*fervida* (*Dysdera*): *Dysdera erythrina*  
*fervida* (*Pardosa*): *Pardosa prativaga*  
*festiva* (*Aelurops*): *Aelurillus festivus*  
*festivum* (*Micariosoma*): *Phrurolithus festivus*  
*festivus* (*Aelurillus*): Salticidae  
*festivus* (*Aelurops*): *Aelurillus festivus*  
*festivus* (*Asianellus*): *Aelurillus festivus*  
*festivus* (*Phrurolithus*): Corinnidae  
*fidelis* (*Wadicosa*): Lycosidae  
*figurata* (*Arctosa*): Lycosidae  
*figurata* (*Lycosa*): *Arctosa figurata*  
*filicata* (*Lycosa*): *Arctosa perita*  
*Filistata*: Filistatidae  
*fimbriatus* (*Dolomedes*): Pisauridae  
*finitima* (*Euophrys*): *Euophrys vafra*  
*firma* (*Saaristoa*): Linyphiidae  
*Firmicus*: Thomisidae  
*firmus* (*Oreonetides*): *Saaristoa firma*  
*flahaulti* (*Labulla*): Linyphiidae  
*flammata* (*Evarcha*): *Evarcha falcata*  
*flammeola* (*Ero*): Mimetidae  
*flavescens* (*Dictyna*): *Nigma flavescens*  
*flavescens* (*Heterodictyna*): *Nigma flavescens*  
*flavescens* (*Nigma*): Dictynidae  
*flavicoma* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*flavidus* (*Hyptiotes*): Uloboridae  
*flavipes* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*flavipes* (*Heliophanus*): Salticidae  
*flavipes* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*flavipes* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes flavipes*  
*flavitarise* (*Micariosoma*): *Phrurolithus flavitaris*  
*flavitaris* (*Liophrurillus*): *Phrurolithus flavitaris*  
*flavitaris* (*Phrurolithus*): Corinnidae  
*flavomaculata* (*Euryopsis*): Theridiidae  
*flavomaculata* (*Lycosoides*): Agelenidae  
*flavomaculata* (*Textrix*): *Lycosoides flavomaculata*  
*flavomaculatum* (*Theridion*): *Euryopsis flavomaculata*  
*florentina* (*Segestria*): Segestriidae  
*floricola* (*Attus*): *Sitticus floricola*  
*floricola* (*Sitticus*): Salticidae  
*Floronia*: Linyphiidae  
*fluctuans* (*Erigone*): Linyphiidae  
*fodiens* (*Cteniza*): *Cteniza sauvagesi*  
*foenarium* (*Gongylidium*): *Collinsia inerrans*  
*foenarius* (*Coryphaeolanus*): *Collinsia inerrans*  
*foliola* (*Theonoe*): *Theonoe minutissima*  
*folium* (*Araneus*): *Larinioides folium*  
*folium* (*Larinioides*): Araneidae  
*fontium* (*Tegenaria*): *Tegenaria domestica*  
*foraminifer* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*foraminifer* (*Prosoponcus*): *Diplocephalus foraminifer*  
*foraminifera* (*Erigone*): *Diplocephalus foraminifer*  
*formicaria* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*formicaria* (*Myrmarachne*): Salticidae  
*formicarius* (*Myrmarachne*): *Myrmarachne formicaria*  
*formicarius* (*Pyroderes*): *Myrmarachne formicaria*  
*formicarius* (*Salticus*): *Myrmarachne formicaria*  
*formicinus* (*Thanatus*): Philodromidae  
*formicoeformis* (*Salticus*): *Leptorchestes berolinensis*  
*formosum* (*Theridion*): *Anelosimus vittatus*  
*fortuita* (*Prosthesima*): *Zelotes civicus*  
*fortunatus* (*Tmeticus*): *Collinsia inerrans*  
*fouresi* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*foveatus* (*Mecynargus*): Linyphiidae  
*fragilis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*fragilis* (*Mansuphantes*): *Lepthyphantes fragilis*  
*frenata* (*Linyphia*): *Floronia bucculenta*  
*frigida* (*Pardosa*): Lycosidae  
*frigidus* (*Attus*): *Sitticus distinguendus*  
*frigidus* (*Incestophantes*): *Lepthyphantes frigidus*  
*frigidus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*frigidus* (*Sitticus*): *Sitticus distinguendus*  
*fritillifer* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*frontalis* (*Attus*): *Euophrys frontalis*  
*frontalis* (*Euophrys*): Salticidae  
*frontata* (*Savignia*): Linyphiidae  
*frontata* (*Savignya*): *Savignia frontata*  
*fronticornis* (*Delorhipis*): *Savignia fronticornis*  
*fronticornis* (*Savignia*): Linyphiidae  
*Frontinellina*: Linyphiidae  
*frontosus* (*Hasarius*): *Mogrus frontosus*  
*frontosus* (*Mogrus*): Salticidae  
*frutetorum* (*Clubiona*): Clubionidae  
*frutetorum* (*Frontinella*): *Frontinellina frutetorum*  
*frutetorum* (*Frontinellina*): Linyphiidae  
*frutetorum* (*Linyphia*): *Frontinellina frutetorum*  
*fuesslini* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*fugax* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*fugax* (*Drassus*): *Drassodes fugax*  
*fugax* (*Walckenaeria*): *Walckenaeria dysderoides*



*fugax* (*Wideria*): *Walckenaeria dysderoides*  
*fulgens* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*fulva* (*Enidia*): *Hypomma fulvum*  
*fulva* (*Micrommata*): *Micrommata virescens*  
*fulvaster* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*fulvastra* (*Prothesima*): *Zelotes fulvaster*  
*fulvignathus* (*Heliophanus*): *Heliophanus flavipes*  
*fulvolineata* (*Alopecosa*): *Arctosa fulvolineata*  
*fulvolineata* (*Arctosa*): Lycosidae  
*fulvolineata* (*Leaena*): *Arctosa fulvolineata*  
*fulvolineata* (*Lycosa*): *Arctosa fulvolineata*  
*fulvolineata* (*Trochosa*): *Arctosa fulvolineata*  
*fulvonigra* (*Enyo*): *Zodarion fulvonigrum*  
*fulvonigrum* (*Zodarion*): Zodiariidae  
*fulvopilosa* (*Melanophora*): *Zelotes fulvopilosus*  
*fulvopilosa* (*Prothesima*): *Zelotes fulvopilosus*  
*fulvopilosus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*fulvotestaceum* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*fulvum* (*Hypomma*): Linyphiidae  
*fulvus* (*Drassus*): *Scotophaeus scutulatus*  
*funerea* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*fungiceps* (*Dismodicus*): Linyphiidae  
*furcata* (*Ero*): Mimetidae  
*furcata* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae  
*furcifer* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*furcifera* (*Lycosa*): *Pirata knorri*  
*furcillata* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*furcillatus* (*Tigellinus*): *Walckenaeria furcillata*  
*furfuraceum* (*Theridion*): Theridiidae  
*furtiva* (*Linyphia*): *Neriene furtiva*  
*furtiva* (*Neriene*): Linyphiidae  
*fusca* (*Enyo*): *Zodarion fuscum*  
*fusca* (*Segestria*): Segestriidae  
*fuscipalpa* (*Meioneta*): *Meioneta fuscipalpis*  
*fuscipalpis* (*Ischnyphantes*): *Meioneta fuscipalpis*  
*fuscipalpis* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*fuscipalpis* (*Microneta*): *Meioneta fuscipalpis*  
*fuscipes* (*Diplocephalus*): *Monocephalus fuscipes*  
*fuscipes* (*Dysdera*): Dysderidae  
*fuscipes* (*Erigone*): *Monocephalus fuscipes*  
*fuscipes* (*Monocephalus*): Linyphiidae  
*fuscipes* (*Phlegra*): *Phlegra cinereofasciata*  
*fuscipes* (*Plaesiocraerus*): *Monocephalus fuscipes*  
*fuscipes* (*Prothesima*): *Zelotes fuscipes*  
*fuscipes* (*Trachyzelotes*): *Zelotes fuscipes*  
*fuscipes* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*fuscipes castaneipes* (*Plaesiocraerus*): *Monocephalus castaneipes*  
*fuscolimbatus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*fuscomarginatus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*fuscomicans* (*Prothesima*): *Zelotes villicus*  
*fuscomicans* [sexe non précisé] (*Zelotes*): *Zelotes villicus*  
*fuscomicans* [femelle] (*Zelotes*): *Zelotes villicus*  
*fuscomicans* [mâle] (*Zelotes*): *Zelotes erebeus*  
*fuscorufa* (*Prothesima*): *Zelotes fuscorufus*  
*fuscorufus* (*Zelotes*): Gnaphosidae

*fuscotestacea* (*Prothesima*): *Zelotes fuscotestaceus*  
*fuscotestaceus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*fuscula* (*Clubiona*): *Clubiona brevipes*  
*fuscum* (*Gongylidium*): *Oedothorax retusus*  
*fuscum* (*Zodarion*): Zodiariidae  
*fuscus* (*Apostenus*): Liocranidae  
*fuscus* (*Oedothorax*): Linyphiidae

## G

*galerita* (*Entelecara*): *Baryphyma trifrons*  
*galerita* (*Lycosa*): *Wadicosa fidelis*  
*gallica* (*Entelecara*): *Entelecara congenera*  
*gallica* (*Enyo*): *Zodarion gallicum*  
*gallica* (*Eucta*): *Tetragnatha isidis*  
*gallica* (*Maso*): *Maso gallicus*  
*gallica* [err.] (*Enyo*): *Zodarion italicum*  
*gallicum* (*Zodarion*): Zodiariidae  
*gallicum* [err.] (*Zodarion*): *Zodarion italicum*  
*gallicus* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes mengei*  
*gallicus* (*Maso*): Linyphiidae  
*gallicus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*gallicus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*gambosa* (*Euophrys*): Salticidae  
*gemina* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*gemmosum* (*Theridiosoma*): Theridiosomatidae  
*genevensis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*geniculatus* (*Pellenes*): Salticidae  
*geniculosum* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*genistae* (*Theridion*): Theridiidae  
*gentile* (*Theridion*): Theridiidae  
*germanica* (*Clubiona*): Clubionidae  
*Gibbaranea*: Araneidae  
*gibbifer* (*Oedothorax*): Linyphiidae  
*gibbosa* (*Epeira*): *Gibbaranea gibbosa*  
*gibbosa* (*Gibbaranea*): Araneidae  
*gibbosum* (*Gongylidium*): *Oedothorax gibbosus*  
*gibbosus* (*Araneus*): *Gibbaranea gibbosa*  
*gibbosus* (*Argyrodes*): *Argyrodes argyrodes*  
*gibbosus* (*Oedothorax*): Linyphiidae  
*gibbulus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*gibbum* (*Pholcomma*): Theridiidae  
*giebeli* (*Pardosa*): Lycosidae  
*gigantea* (*Tegenaria*): *Tegenaria duellica*  
*glacialis* (*Oreonetides*): Linyphiidae  
*gladiola* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*gladiola* (*Mansuphantes*): *Lepthyphantes gladiola*  
*glaphyra* (*Erigone*): *Walckenaeria atrotibialis*  
*glaucinum* (*Theridion*): Theridiidae  
*glaucinus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*globiceps* (*Dictyna*): *Dictyna latens*  
*globipes* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*globipes* (*Trichopterna*): *Erigonoplus globipes*  
*globosa* (*Poeciloneta*): *Poeciloneta variegata*  
*globosa* (*Synaema*): *Synaema globosum*  
*globosa* (*Synema*): *Synaema globosum*  
*globosum* (*Synaema*): Thomisidae  
*globosum* (*Synema*): *Synaema globosum*

- globosus* (*Thomisus*): *Synaema globosum*  
*Glyphesis*: Linyphiidae  
*Gnaphosa*: Gnaphosidae  
*Gnathonarium*: Linyphiidae  
*goberti* (*Calliethera*): *Salticus scenicus*  
*Gonatum*: Linyphiidae  
*Gongylidiellum*: Linyphiidae  
*Gongylidium*: Linyphiidae  
*gonygaster* (*Theridion*): *Theridula opulenta*  
*gracilens* (*Agelena*): Agelenidae  
*gracilior* (*Agroeca*): *Agraecina striata*  
*gracilipes* (*Agroeca*): *Scotina gracilipes*  
*gracilipes* (*Scotina*): Liocranidae  
*gracilis* (*Bathypantes*): Linyphiidae  
*gracilis* (*Syedra*): Linyphiidae  
*gracilitibiale* (*Zodarium*): Zodariidae  
*gradata* (*Cineta*): Linyphiidae  
*gradata* (*Cinetata*): *Cineta gradata*  
*gradata* (*Erigone*): *Cineta gradata*  
*gradata* (*Grammonota*): *Cineta gradata*  
*graeca* (*Entelecara*): *Diplocephalus graecus*  
*graecus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*grallator* (*Xysticus*): Thomisidae  
*graminicola* (*Erigonidium*): *Hylyphantes graminicola*  
*graminicola* (*Gongylidium*): *Hylyphantes graminicola*  
*graminicola* (*Hylyphantes*): Linyphiidae  
*graminicola* (*Tmeticus*): *Hylyphantes graminicola*  
*grammica* (*Runcinia*): *Runcinia lateralis*  
*grammicus* (*Heliophanus*): *Heliophanus melinus*  
*granulum* (*Trogioneta*): Mysmenidae  
*gratosus* (*Thanatus*): *Thanatus sabulosus*  
*grisea* (*Clubiona*): *Clubiona reclusa*  
*grossa* (*Epeira*): *Araneus grossus*  
*grossa* (*Steatoda*): Theridiidae  
*grossa* (*Teutana*): *Steatoda grossa*  
*grossus* (*Araneus*): Araneidae  
*grouvellei* (*Microneta*): *Meioneta gulosa*  
*grouvellii* (*Erigone*): *Meioneta gulosa*  
*gulosa* (*Agyneta*): *Meioneta gulosa*  
*gulosa* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*gulosus* (*Ischnyphantes*): *Meioneta gulosa*  
*gurdus* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*guttata* (*Crustulina*): Theridiidae  
*guttata* (*Steatoda*): *Crustulina guttata*  
*guttatum* (*Theridion*): *Crustulina guttata*  
*guttatus* (*Attulus*): *Sitticus penicillatus*  
*guttigera* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*guttulata* (*Micaria*): Gnaphosidae
- H**  
*habilis* (*Erigone*): *Walckenaeria furcillata*  
*Habrocestum*: Salticidae  
*hackmani* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*hackmani* [err.] (*Trichoncus*): *Trichoncus varipes*  
*haglundii* (*Agroeca*): *Agroeca brunnea*  
*Hahnia*: Hahniidae  
*Halorates*: Linyphiidae  
*hamata* (*Singa*): Araneidae  
*hamatus* (*Araneus*): *Singa hamata*  
*hamatus* (*Icius*): Salticidae  
*hamatus* (*Singa*): *Singa hamata*  
*hamifer* (*Leptyphantes*): Linyphiidae  
*hankiewiczzi* (*Phoroncidia*): Theridiidae  
*hankiewiczzi* (*Ulesanis*): *Phoroncidia hankiewiczzi*  
*hannoniae* (*Theridion*): Theridiidae  
*Haplodrassus*: Gnaphosidae  
*hardi* (*Phaulothrix*): *Leptothrix hardy*  
*hardii* (*Tmeticus*): *Leptothrix hardy*  
*hardyi* (*Leptothrix*): Linyphiidae  
*Harpactea*: Dysderidae  
*Harpactocrates*: Dysderidae  
*Hasarius*: Salticidae  
*hastatus* (*Dendryphantes*): Salticidae  
*haymozi* (*Harpactea*): Dysderidae  
*hebes* (*Drassus*): *Haplodrassus macellinus*  
*hecticus* (*Heliophanus*): *Heliophanus flavipes*  
*heeri* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*Heliophanus*: Salticidae  
*helleri* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*helleri* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus helleri*  
*Helophora*: Linyphiidae  
*helveola* (*Hahnia*): Hahniidae  
*helveolus* (*Attulus*): Salticidae  
*helvetica* (*Gnaphosa*): *Gnaphosa leporina*  
*helveticus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*hemerobium* (*Theridion*): *Theridion hemerobius*  
*hemerobius* (*Theridion*): Theridiidae  
*henroti* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*henryi* (*Nomisia*): *Nomisia celerrima*  
*herbicola* (*Leptyphantes*): Linyphiidae  
*herbicola* (*Tenuiphantes*): *Leptyphantes herbicola*  
*herbigrada* (*Blaniargus*): *Micrargus herbigradus*  
*herbigrada* (*Erigone*): *Micrargus herbigradus*  
*herbigrada* (*Euphrys*): Salticidae  
*herbigrada* (*Lophomma*): *Micrargus herbigradus*  
*herbigrada* (*Micrargus*): *Micrargus herbigradus*  
*herbigrada* (*Neottiura*): *Theridion herbigrada*  
*herbigrada* (*Pardosa*): *Pardosa palustris*  
*herbigrada* (*Theridion*): Theridiidae  
*herbigradum* (*Lophomma*): *Micrargus herbigradus*  
*herbigradus* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*heri* (*Araneus*): *Hypsosinga heri*  
*heri* (*Hypsosinga*): *Hypsosinga heri*  
*heri* (*Hypsosinga*): Araneidae  
*heri* (*Singa*): *Hypsosinga heri*  
*Heriaeus*: Thomisidae  
*heterophthalma* [err.] (*Scotolathys*): *Lathys simplex*  
*heterophthalmus* (*Oxyopes*): Oxyopidae  
*hibernica* (*Collinsia*): Linyphiidae  
*hibernicus* (*Coryphaeolanus*): *Collinsia hibernica*  
*hiemalis* (*Araeoncus*): *Erigonella hiemalis*  
*hiemalis* (*Erigonella*): Linyphiidae  
*hiemalis* (*Troxochrus*): *Erigonella hiemalis*  
*Hilaira*: Linyphiidae

- hilare* (*Gonatum*): Linyphiidae  
*hilaris* (*Clubiona*): Clubionidae  
*hilarulus* (*Synageles*): Salticidae  
*hilarulus* (*Thomisus*): *Thomisus onustus*  
*hirsutissima* (*Devade*): Dictynidae  
*hirsutissima* (*Diotima*): *Devade hirsutissima*  
*hirsutus* (*Heriaeus*): *Heriaeus hirtus*  
*hirsutus* (*Lasiargus*): Linyphiidae  
*hirsutus* (*Thanatus*): *Thanatus striatus*  
*hirsutus* [err.] (*Heriaeus*): *Heriaeus melloteei*  
*hirta* (*Prothesima*): *Zelotes hirtus*  
*hirtus* (*Heriaeus*): Thomisidae  
*hirtus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*hirtus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*hispana* (*Harpactea*): Dysderidae  
*hispanica* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*hispanica* (*Trochosa*): Lycosidae  
*hispanus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*hispanus* (*Harpactes*): *Harpactea hispana*  
*hispanus* [err.] (*Drassus*): *Drassodes hypocrita*  
*Histopona*: Agelenidae  
*histrion* (*Attulus*): *Sitticus distinguendus*  
*histrion* (*Attus*): *Sitticus distinguendus*  
*histrion* (*Philodromus*): Philodromidae  
*histrionicus* (*Callietherus*): *Salticus scenicus*  
*Hogna*: Lycosidae  
*Holissus*: Dysderidae  
*Holocnemus*: Pholcidae  
*holosericea* (*Prothesima*): *Zelotes holosericeus*  
*holosericeus* (*Trachyzelotes*): *Zelotes holosericeus*  
*holosericeus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*hombergi* (*Dysdera*): *Harpactea hombergi*  
*hombergi* (*Harpactea*): Dysderidae  
*hombergi* (*Harpactes*): *Harpactea hombergi*  
*homonymus* (*Canariphantes*): *Lepthyphantes homonymus*  
*homonymus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*hortensis* (*Dictyna*): *Nigma hortensis*  
*hortensis* (*Linyphia*): Linyphiidae  
*hortensis* (*Lycosa*): *Pardosa hortensis*  
*hortensis* (*Neriene*): *Linyphia hortensis*  
*hortensis* (*Nigma*): Dictynidae  
*hortensis* (*Pardosa*): Lycosidae  
*horticola* (*Ozyptila*): *Ozyptila atomaria*  
*horticola* (*Xysticus*): *Ozyptila atomaria*  
*horvathi* (*Tmarus*): Thomisidae  
*huberti* (*Hypsocephalus*): Linyphiidae  
*huberti* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*huberti* (*Mecopisthes*): *Hypsocephalus huberti*  
*huberti* (*Spermophora*): Pholcidae  
*huberti* (*Spermophoridae*): *Spermophora huberti*  
*humilis* (*Apostenus*): Liocranidae  
*humilis* (*Araeoncus*): Linyphiidae  
*humilis* (*Diplocephalus*): *Araeoncus humilis*  
*humilis* (*Erigone*): *Araeoncus humilis*  
*humilis* (*Lathys*): Dictynidae  
*humilis* (*Lethia*): *Lathys humilis*  
*hungaricus* (*Cryptodrassus*): Gnaphosidae  
*huthwaiti* (*Leptorhoptrum*): *Leptorhoptrum robustum*  
*Hybocoptus*: Linyphiidae  
*Hygrolycosa*: Lycosidae  
*hygrophila* (*Epeira*): *Larinioides scolopetarius*  
*hygrophila* (*Lycosa*): *Pirata hygrophilus*  
*hygrophila* (*Pirata*): *Pirata hygrophilus*  
*hygrophilus* (*Pirata*): Lycosidae  
*Hylyphantes*: Linyphiidae  
*hypocrita* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*hypocrita* (*Drassus*): *Drassodes hypocrita*  
*Hypomma*: Linyphiidae  
*Hypsocephalus*: Linyphiidae  
*Hypsosinga*: Araneidae  
*Hyptiotes*: Uloboridae
- I
- iberica* (*Gnaphosa*): *Gnaphosa lapponum*  
*Iberina*: Hahniidae  
*ibex* (*Xysticus*): Thomisidae  
*Icius*: Salticidae  
*ictericus* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes eugeni*  
*ignava* (*Dysdera*): *Harpactocrates ignavus*  
*ignavus* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*ignavus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*ignavus* (*Mughiphantes*): *Lepthyphantes ignavus*  
*ignavus* (*Parachtes*): *Harpactocrates ignavus*  
*ignobilis* (*Araeoncus*): *Erigonella ignobilis*  
*ignobilis* (*Diplocephalus*): *Erigonella ignobilis*  
*ignobilis* (*Erigonella*): Linyphiidae  
*ignobilis* (*Troxochrus*): *Erigonella ignobilis*  
*illibatus* [femelle] (*Tmeticus*): *Meioneta innotabilis*  
*illibatus* [mâle] (*Tmeticus*): *Centromerus brevipalpis*  
*imperialis* (*Thya*): *Thyene imperialis*  
*imperialis* (*Thyene*): Salticidae  
*impigra* (*Linyphia*): *Microlinyphia impigra*  
*impigra* (*Microlinyphia*): Linyphiidae  
*impressum* (*Theridion*): Theridiidae  
*improbulus* (*Improphantes*): *Lepthyphantes improbulus*  
*improbulus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*impudica* (*Cicurina*): *Mastigusa arietina*  
*inaequipes* (*Dysdera*): *Harpactocrates inaequipes*  
*inaequipes* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*inaequipes* (*Parachtes*): *Harpactocrates inaequipes*  
*incerta* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*incilium* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*incisa* (*Prosopotheca*): *Walckenaeria incisa*  
*incisa* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*inclara* (*Erigone*): *Erigonoplus inclarus*  
*inclarus* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*incomposita* (*Steatoda*): Theridiidae  
*inconspicua* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*inconspicua* (*Araniella*): Araneidae  
*inconspicua* (*Epeira*): *Araniella inconspicua*  
*inconspicuus* (*Araneus*): *Araniella inconspicua*  
*incultus* (*Centromerus*): *Centromerus semiater*

*index (Bolephthyphantes)*: *Bolyphantes index*  
*index (Bolyphantes)*: Linyphiidae  
*indicator (Thaumatococcus)*: *Trachelocamptus indica-*  
*tor*  
*indicator (Trachelocamptus)*: Linyphiidae  
*indistincta (Devade)*: *Devade hirsutissima*  
*inedita (Erigone)*: *Pelecopsis inedita*  
*inedita (Pelecopsis)*: Linyphiidae  
*ineditum (Brachycentrum)*: *Pelecopsis inedita*  
*ineditum (Lophocarenum)*: *Pelecopsis inedita*  
*inermis (Coelotes)*: Amaurobiidae  
*inermis (Eurocoelotes)*: *Coelotes inermis*  
*inermis (Oonops)*: *Tapinesthis inermis*  
*inermis (Tapinesthis)*: Oonopidae  
*inermis (Tegenaria)*: Agelenidae  
*inerrans (Collinsia)*: Linyphiidae  
*inerrans (Milleriana)*: *Collinsia inerrans*  
*inerrans (Scotargus)*: *Collinsia inerrans*  
*infima (Calliethera)*: *Chalcoscirtus infimus*  
*infimus (Chalcoscirtus)*: Salticidae  
*infusca (Leptoneta)*: Leptonetidae  
*infuscatus (Drassus)*: *Haplodrassus silvestris*  
*innerans (Milleriana)*: *Collinsia inerrans*  
*innotabilis (Agyneta)*: *Meioneta innotabilis*  
*innotabilis (Meioneta)*: Linyphiidae  
*innotabilis (Syedrula)*: *Meioneta innotabilis*  
*innotata (Euophrys)*: Salticidae  
*inopina (Agroeca)*: Liocranidae  
*inopinata (Talavera)*: Salticidae  
*inornata (Dipoena)*: Theridiidae  
*inornata (Euryopsis)*: *Dipoena inornata*  
*inornata (Lasaeola)*: *Dipoena inornata*  
*inornatum (Phycosoma)*: *Dipoena inornata*  
*inquinina (Alopecosa)*: Lycosidae  
*inquinina (Lycosa)*: *Alopecosa inquinina*  
*insanum (Lophocarenum)*: *Pelecopsis elongata*  
*insecta (Colobocyba)*: *Tapinocyba insecta*  
*insecta (Erigone)*: *Tapinocyba insecta*  
*insecta (Tapinocyba)*: Linyphiidae  
*insectus (Plaesiocraerus)*: *Tapinocyba insecta*  
*insectus (Troxochrus)*: *Tapinocyba insecta*  
*insidiatrix (Ariadna)*: Segestriidae  
*insidiatrix (Filistata)*: Filistatidae  
*insignipalpis (Tuberta)*: *Tuberta maerens*  
*insignis (Helophora)*: Linyphiidae  
*insignis (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*insignis (Linyphia)*: *Helophora insignis*  
*insignis (Palliduphantes)*: *Lepthyphantes insignis*  
*insignis (Robertus)*: Theridiidae  
*insignita (Aelurops)*: *Aelurillus v-insignitus*  
*insignita (Lycosa)*: *Arctosa alpigena*  
*insignitus (Aelurillus)*: *Aelurillus v-insignitus*  
*instabile (Theridion)*: Theridiidae  
*instabile bellicosum (Theridion)*: *Theridion bellico-*  
*sum*  
*instabilis (Rugathodes)*: *Theridion instabile*  
*insulana (Cyclosa)*: Araneidae

*insularis (Chalcoscirtus)*: *Chalcoscirtus atratus*  
*interfector [err.] (Mimetus)*: *Mimetus laevigatus*  
*intermedius (Harpactocrates)*: Dysderidae  
*inuncans (Erigone)*: *Styloctetor romanus*  
*inuncans (Styloctetor)*: *Styloctetor romanus*  
*inuncus (Styloctetor)*: *Styloctetor romanus*  
*invalidus (Drassodes)*: *Haplodrassus invalidus*  
*invalidus (Drassus)*: *Haplodrassus invalidus*  
*invalidus (Haplodrassus)*: Gnaphosidae  
*isabellinus (Drassus)*: *Scotophaeus blackwalli*  
*isidis (Eucta)*: *Tetragnatha isidis*  
*isidis (Tetragnatha)*: Tetragnathidae  
*italica (Enyo)*: *Zodarion italicum*  
*italica (Leptoneta)*: *Protoleptoneta italica*  
*italica (Paraleptoneta)*: *Protoleptoneta italica*  
*italica (Protoleptoneta)*: Leptonetidae  
*italica (Steatoda)*: Theridiidae  
*italicum (Zodarion)*: Zodariidae  
*ixodoides (Cyrtarachne)*: *Cyrtarachne ixoides*  
*ixoides (Cyrtarachne)*: Araneidae  
*ixoides (Peltosoma)*: *Cyrtarachne ixoides*

## J

*Jacksonella*: Linyphiidae  
*jacksoni (Hypselistes)*: *Pocadicnemis jacksoni*  
*jacksoni (Pocadicnemis)*: Linyphiidae  
*jacksoni (Porrhomma)*: *Porrhomma egeria*  
*jeanneli (Leptoneta)*: Leptonetidae  
*jobi (Mysmena)*: *Mysmenella jobi*  
*jobi (Mysmenella)*: Mysmenidae  
*johannis lupi (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*johannis lupi (Mughiphantes)*: *Lepthyphantes johan-*  
*nislupi*  
*johannis lupi (Xysticus)*: *Xysticus bonneti*  
*jubata (Analtella)*: *Lathys jubata*  
*jubata (Lathys)*: Dictynidae  
*jucunda (Ergane)*: *Evarcha jucunda*  
*jucunda (Evarcha)*: Salticidae  
*jucundissima (Walckenaeria)*: *Walckenaeria nodosa*  
*jucundus (Hasarius)*: *Evarcha jucunda*  
*jugorum (Amaurobius)*: Amaurobiidae  
*jugorum (Erigone)*: Linyphiidae  
*jugorum (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*jugorum (Mughiphantes)*: *Lepthyphantes jugorum*  
*jugorum (Thanatus)*: *Thanatus striatus*  
*jugorum (Trabea)*: *Vesubia jugorum*  
*jugorum (Vesubia)*: Lycosidae  
*juncea (Pocadicnemis)*: Linyphiidae  
*justa (Erigone)*: *Erigonoplus justus*  
*justa (Trichopterna)*: *Erigonoplus justus*  
*justus (Erigonoplus)*: Linyphiidae  
*juvenis (Clubiona)*: Clubionidae

## K

*Kaestneria*: Linyphiidae  
*kempeleni (Xysticus)*: Thomisidae  
*kervillei (Pardosa)*: *Pardosa riparia*

*keyserlingi* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*keyserlingi* (*Microneta*): *Lepthyphantes keyserlingi*  
*knorri* (*Lycosa*): *Pirata knorri*  
*knorri* (*Pirata*): Lycosidae  
*kochi* (*Cornicularia*): *Walckenaeria kochi*  
*kochi* (*Erigone*): *Caracladus leberti*  
*kochi* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes nitidus*  
*kochi* (*Leviellus*): *Zygiella kochi*  
*kochi* (*Plaesiocraerus*): *Caracladus leberti*  
*kochi* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*kochi* (*Xylla*): *Zygiella kochi*  
*kochi* (*Xysticus*): Thomisidae  
*kochi* (*Zilla*): *Zygiella kochi*  
*kochi* (*Zygiella*): Araneidae  
*kochii* (*Heliophanus*): Salticidae  
*kollari* (*Dysdera*): *Dysdera subsquarrosa*  
*kosiorowiczi* (*Brigittea*): *Dictyna kosiorowiczi*  
*kosiorowiczi* (*Dictyna*): Dictynidae  
*krocha* (*Talavera*): Salticidae  
*kulczynskii* (*Clubiona*): Clubionidae  
*kulczynskii* (*Dysdera*): Dysderidae  
*kulczynskii* (*Gongyliidiellum*): *Lessertinella kulczynskii*  
*kulczynskii* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*kulczynskii* (*Lessertinella*): Linyphiidae  
*kulczynskii* (*Trichoncus*): *Trichoncus auritus*

## L

*labilis* (*Zelotes*): *Zelotes segrex*  
*Labulla*: Linyphiidae  
*labyrinthica* (*Agelena*): Agelenidae  
*laciniosa* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*laciniosa* (*Lycosa*): *Alopecosa laciniosa*  
*laciniosa* (*Tarentula*): *Alopecosa laciniosa*  
*lacustris* (*Arctosa*): Lycosidae  
*lacustris* (*Lycosa*): *Arctosa lacustris*  
*laesus* (*Silometopus*): *Silometopus reussi*  
*laeta* (*Euryopis*): Theridiidae  
*laetabunda* (*Ergane*): *Evarcha laetabunda*  
*laetabunda* (*Evarcha*): Salticidae  
*laetabundus* (*Hasarius*): *Evarcha laetabunda*  
*laetus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*laevigata* (*Dasumia*): Dysderidae  
*laevigatus* (*Mimetus*): Mimetidae  
*laevis* (*Neon*): *Neon levis*  
*laevis* [err.] (*Neon*): *Neon robustus*  
*laevitarsis* (*Centromerus*): *Centromerus levitarsis*  
*lalandei* (*Xysticus*): *Xysticus cribratus*  
*lamperti* (*Arctosa*): *Arctosa alpigena*  
*languida* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*languida* (*Wideria*): *Walckenaeria languida*  
*laniger* (*Attus*): *Euophrys lanigera*  
*lanigera* (*Euophrys*): Salticidae  
*lanigera* (*Pseudeuophrys*): *Euophrys lanigera*  
*lanio* (*Thomisus*): *Xysticus lanio*  
*lanio* (*Xysticus*): Thomisidae  
*lantosquensis* (*Dysdera*): *Dysdera erythrina*  
*lantosquensis* (*Erigone*): *Erigone atra*  
*lantosquensis* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*lapidicola* (*Drassus*): *Drassodes lapidosus*  
*lapidicolens* (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium virescens*  
*lapidicolens* (*Drassus*): *Drassodes lapidosus*  
*lapidosus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*lapidosus* (*Drassus*): *Drassodes lapidosus*  
*lapidosus cupreus* (*Drassodes*): *Drassodes cupreus*  
*lapidosus inermis* (*Drassus*): *Drassodes villosus*  
*lapponicus* (*Pellenes*): Salticidae  
*lapponum* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*laricum* (*Philodromus*): *Philodromus corticinus*  
*larifuga* (*Prosthesima*): *Zelotes rusticus*  
*Larinia*: Araneidae  
*Larinioides*: Araneidae  
*larva* (*Tegenaria*): *Tegenaria atrica*  
*Lasiargus*: Linyphiidae  
*lata* (*Dysdera*): Dysderidae  
*latebricola* (*Gongyliidiellum*): Linyphiidae  
*latebrosus* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*latens* (*Brigittea*): *Dictyna latens*  
*latens* (*Dictyna*): Dictynidae  
*lateralis* (*Runcinia*): Thomisidae  
*lateralis* (*Xysticus*): *Xysticus lanio*  
*Lathys*: Dictynidae  
*laticeps* (*Ceto*): Corinnidae  
*laticeps* (*Cetonana*): *Ceto laticeps*  
*latifrons* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*latifrons* (*Dipoena*): Theridiidae  
*latifrons* (*Erigone*): *Diplocephalus latifrons*  
*latifrons* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus latifrons*  
*latimana* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*latipes* (*Prosthesima*): *Setaphis carmeli*  
*latitans* (*Lycosa*): *Pirata latitans*  
*latitans* (*Pirata*): Lycosidae  
*latitans* (*Prosthesima*): *Zelotes praeficus*  
*Latithorax*: Linyphiidae  
*latreillei* (*Prosthesima*): *Zelotes latreillei*  
*latreillei* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*Latrodectus*: Theridiidae  
*laudatum* (*Lophomma*): *Micrargus laudatus*  
*laudatus* (*Blaniargus*): *Micrargus laudatus*  
*laudatus* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*laurae* (*Cyclosa*): *Nemoscolus laurae*  
*laurae* (*Nemoscolus*): Araneidae  
*laurae* (*Nemoscolus*): *Nemoscolus laurae*  
*laurae* (*Singa*): *Nemoscolus laurae*  
*leanora* (*Nemesia*): *Nemesia eleanora*  
*leberti* (*Caracladus*): Linyphiidae  
*leopardus* (*Arctosa*): Lycosidae  
*leopardus* (*Lycosa*): *Arctosa leopardus*  
*leopardus* (*Megarctosa*): *Arctosa leopardus*  
*leopardus* (*Pirata*): *Arctosa leopardus*  
*leopardus* (*Trochosa*): *Arctosa leopardus*  
*lepida* (*Harpactea*): Dysderidae  
*lepidum* (*Theridion*): *Theridion instabile*

- lepidus (Harpactes)*: *Harpactea lepida*  
*lepidus (Philodromus)*: Philodromidae  
*leporina (Gnaphosa)*: Gnaphosidae  
*leprieuri (Ozyptila)*: Thomisidae  
*leprosus (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*Lepthyphantes*: Linyphiidae  
*Leptodrassus*: Gnaphosidae  
*Leptoneta*: Leptonetidae  
*Leptorchestes*: Salticidae  
*Leptorhoptrum*: Linyphiidae  
*Leptothrix*: Linyphiidae  
*Lessertia*: Linyphiidae  
*Lessertinella*: Linyphiidae  
*letochae (Cheiracanthium)*: *Cheiracanthium elegans*  
*leucaspis (Clubiona)*: Clubionidae  
*leucoplagiata (Dipoena)*: *Mysmena leucoplagiata*  
*leucoplagiata (Mysmena)*: Mysmenidae  
*leucoplagiatum (Theridion)*: *Mysmena leucoplagiata*  
*leucopygius (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*leveillei (Coelotes)*: *Coelotes segestriformis*  
*levis (Neon)*: Salticidae  
*levis [err.] (Neon)*: *Neon reticulatus*  
*levitarsis (Centromerus)*: Linyphiidae  
*levitarsis (Tmeticus)*: *Centromerus levitarsis*  
*ligurica (Tapinocyba)*: Linyphiidae  
*ligurica (Tegenaria)*: Agelenidae  
*liguricus (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*liguricus (Palliduphantes)*: *Lepthyphantes liguricus*  
*ligurina (Micrommata)*: *Micrommata ligurinum*  
*ligurinum (Micrommata)*: Sparassidae  
*limbatus (Dolomedes)*: *Dolomedes fimbriatus*  
*limbatus (Philodromus)*: *Philodromus dispar*  
*limicola (Alioranus)*: *Alioranus pauper*  
*lineata (Agraecina)*: Liocranidae  
*lineata (Agroeca)*: *Agraecina lineata*  
*lineata (Larinia)*: Araneidae  
*lineata (Linyphia)*: *Stemonyphantes lineatus*  
*lineatipes (Thanatus)*: Philodromidae  
*lineatum (Theridion)*: *Enoplognatha ovata*  
*lineatus (Araneus)*: *Larinia lineata*  
*lineatus (Oxyopes)*: Oxyopidae  
*lineatus (Sitticus)*: *Sitticus rivalis*  
*lineatus (Stemonyphantes)*: Linyphiidae  
*lineatus (Xysticus)*: Thomisidae  
*lineatus nigripalpis (Oxyopes)*: *Oxyopes nigripalpis*  
*lineatus [err.] (Xysticus)*: *Xysticus kempeleni*  
*lineiventris (Heliophanus)*: Salticidae  
*linotina (Philoica)*: *Agroeca brunnea*  
*Linyphia*: Linyphiidae  
*Liocranum*: Liocranidae  
*lippiens (Phlegra)*: *Phlegra bresnieri*  
*listeri (Pachygnatha)*: Tetragnathidae  
*litera-v-insignitus (Aelurillus)*: *Aelurillus v-insignitus*  
*littoralis (Euophrys)*: Salticidae  
*livens (Diaea)*: Thomisidae  
*lividus (Pedanostethus)*: *Robertus lividus*  
*lividus (Philodromus)*: Philodromidae  
*lividus (Robertus)*: Theridiidae  
*lobata (Argiope)*: Araneidae  
*loketi (Pelecopsis)*: *Pelecopsis nemoralioides*  
*longespina (Asthenargus)*: *Asthenargus longispinus*  
*longestylus (Zelotes)*: Gnaphosidae  
*longicarpus (Diplocephalus)*: Linyphiidae  
*longicarpus (Plaesiocraerus)*: *Diplocephalus longi-*  
*carpus*  
*longidens (Tapinopa)*: Linyphiidae  
*longipalpis (Erigone)*: Linyphiidae  
*longipalpis (Philodromus)*: Philodromidae  
*longipes (Attus)*: *Sitticus longipes*  
*longipes (Prosthesima)*: *Zelotes longipes*  
*longipes (Sitticus)*: Salticidae  
*longipes (Zelotes)*: Gnaphosidae  
*longiseta (Cepheia)*: Mysmenidae  
*longiseta (Lepthyphantes)*: Linyphiidae  
*longiseta (Palliduphantes)*: *Lepthyphantes longiseta*  
*longiseta (Theonoe)*: *Cepheia longiseta*  
*longispina (Gongylidiellum)*: *Asthenargus longispinus*  
*longispinus (Asthenargus)*: Linyphiidae  
*longiuscula (Erigone)*: *Araeoncus longiusculus*  
*longiusculus (Araeoncus)*: Linyphiidae  
*longulus [femelle] (Sintula)*: *Centromerus arcanus*  
*longulus [mâle] (Sintula)*: *Centromerus serratus*  
*Lophomma*: Linyphiidae  
*loricata (Dysdera)*: *Dysderina loricata*  
*loricata (Dysderina)*: Oonopidae  
*loricata (Gamasomorpha)*: *Dysderina loricata*  
*loricatula (Gamasomorpha)*: *Dysderina loricata*  
*loricatula (Silhouettella)*: *Dysderina loricata*  
*loricatus (Oonops)*: *Dysderina loricata*  
*loricatus (Scotophaeus)*: *Sosticus loricatus*  
*loricatus (Sosticus)*: Gnaphosidae  
*loripes (Phlegra)*: Salticidae  
*Louisfagea*: Linyphiidae  
*louronensis (Zelotes)*: *Zelotes apricorum*  
*Loxosceles*: Sicariidae  
*lubricus (Oonops)*: Oonopidae  
*lucida (Altella)*: Dictynidae  
*lucida (Lethia)*: *Altella lucida*  
*lucifuga (Gnaphosa)*: Gnaphosidae  
*lucifuga (Mastigusa)*: Dictynidae  
*lucifuga (Pythonissa)*: *Gnaphosa lucifuga*  
*lucifuga (Taranucnus)*: *Troglohyphantes lucifuga*  
*lucifuga (Tetrilus)*: *Mastigusa lucifuga*  
*lucifuga (Troglohyphantes)*: Linyphiidae  
*lucifugus (Troglohyphantes)*: *Troglohyphantes luci-*  
*fuga*  
*lucina (Araneus)*: *Singa lucina*  
*lucina (Singa)*: Araneidae  
*luctator (Xysticus)*: Thomisidae  
*luctifica (Gnaphosa)*: Gnaphosidae  
*luctinosa (Pardosa)*: Lycosidae  
*luctuosus (Xysticus)*: Thomisidae  
*ludibundum (Zodarion)*: Zadariidae  
*ludibundus (Leptorchestes)*: *Synageles venator*

*ludibundus* (*Synageles*): *Synageles venator*  
*ludicrum* (*Peponocranium*): Linyphiidae  
*ludio* (*Euophrys*): *Talavera aequipes*  
*lugens* (*Walckenaeria*): *Walckenaeria incisa*  
*lugens* (*Zelotes*): *Zelotes ruscinensis*  
*lugubris* (*Episinus*): *Episinus truncatus*  
*lugubris* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*lugubris* (*Lycosa*): *Pardosa lugubris*  
*lugubris* (*Pardosa*): Lycosidae  
*lugubris occidentalis* (*Gnaphosa*): *Gnaphosa occidentalis*  
*lunata* (*Achaearanea*): Theridiidae  
*lunatum* (*Theridion*): *Achaearanea lunata*  
*lunatus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*lusatica* (*Agroeca*): Liocranidae  
*lusiscus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*lusiscus* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus lusiscus*  
*lusitanica* (*Malthonica*): Agelenidae  
*luteolineata* (*Euophrys*): Salticidae  
*luteolus* (*Bolyphantes*): Linyphiidae  
*luteomicans* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*luteomicans* (*Drassus*): *Drassodes luteomicans*  
*lutescens* (*Clubiona*): Clubionidae  
*lutescens* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*lutescens* (*Drassus*): *Drassodes lutescens*  
*lutetiana* (*Arctosa*): Lycosidae  
*lutetiana* (*Lycosa*): *Arctosa lutetiana*  
*lutetiana* (*Prothesima*): *Zelotes lutetianus*  
*lutetiana* (*Tricca*): *Arctosa lutetiana*  
*lutetianus* (*Drassyllus*): *Zelotes lutetianus*  
*lutetianus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*lutulenta* (*Lathys*): Dictynidae  
*Lycosa*: Lycosidae  
*Lycosoides*: Agelenidae  
*lyonneti* (*Trachyzelotes*): *Zelotes lyonneti*  
*lyonneti* (*Zelotes*): Gnaphosidae

## M

*macellinus* (*Drassodes*): *Haplodrassus macellinus*  
*macellinus* (*Drassus*): *Haplodrassus macellinus*  
*macellinus* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*macellus* (*Tibellus*): Philodromidae  
*Macrargus*: Linyphiidae  
*macrophthalma* (*Mastigusa*): Dictynidae  
*macrophthalmus* [err.] (*Tetrilus*): *Mastigusa arietina*  
*mactans tredecimguttatus* (*Latrodectus*): *Latrodectus tredecimguttatus*  
*maculata* (*Zora*): *Zora spinimana*  
*maculatipes* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*maculatus* (*Oecobius*): Oecobiidae  
*maculipes* (*Episinus*): Theridiidae  
*maderiana* (*Pisaura*): *Pisaura quadrilineata*  
*madidus* (*Cybaeodes*): Liocranidae  
*maerens* (*Evansia*): *Evansia merens*  
*maerens* (*Tuberta*): Hahniidae  
*major* (*Dictyna*): Dictynidae  
*major* (*Salticus*): Salticidae  
*major* (*Thanatus*): *Thanatus vulgaris*  
*mallezi* (*Hypomma*): *Hypomma fulvum*  
*Malthonica*: Agelenidae  
*manca* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*manderstjernae* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*mandibulare* (*Theridion*): *Enoplognatha mandibularis*  
*mandibularis* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*mandibularis* (*Steatoda*): *Enoplognatha mandibularis*  
*Mangora*: Araneidae  
*mania* (*Melanophora*): *Zelotes manius*  
*mania* (*Prothesima*): *Zelotes manius*  
*manicata* (*Lycosa*): *Trochosa hispanica*  
*manicata* (*Trochosa*): *Trochosa hispanica*  
*manicata* (*Zora*): Zoridae  
*manius* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*mansuetus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*mansuetus* (*Mansuphantes*): *Lepthyphantes mansuetus*  
*mansuetus* [err.] (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes simoni*  
*margaritae* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*margaritae* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes margaritae*  
*margaritatus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*marginata* (*Linyphia*): *Neriene radiata*  
*marginata* (*Neriene*): *Neriene radiata*  
*marginella* (*Minicia*): Linyphiidae  
*marginiceps* (*Zodarion*): Zodariidae  
*marginiceps* [err.] (*Zodarion*): *Zodarion pseudoolegans*  
*maritima* (*Enoplognatha*): *Enoplognatha mordax*  
*maritimum* (*Baryphyma*): Linyphiidae  
*maritimus* (*Philodromus*): *Philodromus lepidus*  
*maritimus* (*Tibellus*): Philodromidae  
*marmorata* (*Clubiona*): Clubionidae  
*marmorea* (*Epeira*): *Araneus marmoreus*  
*marmoreus* (*Araneus*): Araneidae  
*Maro*: Linyphiidae  
*Marpissa*: Salticidae  
*marqueti* (*Taranucnus*): *Troglohyphantes marqueti*  
*marqueti* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*martius* (*Latrodectus*): *Latrodectus tredecimguttatus*  
*Maso*: Linyphiidae  
*massiliensis* (*Zelotes*): *Zelotes ruscinensis*  
*Mastigusa*: Dictynidae  
*mastodon* (*Bathyphantes*): *Theonina cornix*  
*maura* (*Linyphia*): Linyphiidae  
*mauritanicus* (*Mesiotelus*): Liocranidae  
*mazarredoi* (*Iberina*): Hahniidae  
*mazaurici* (*Pedanostethus*): *Robertus mazaurici*  
*mazaurici* (*Robertus*): Theridiidae  
*Mecopisthes*: Linyphiidae  
*Mecynargus*: Linyphiidae  
*media* (*Zoropsis*): Zoridae  
*medianus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*medianus* [femelle, err.] (*Zelotes*): *Zelotes dentatidens*  
*mediocre* (*Gongylidiellum*): *Diplocentria mediocris*

- mediocre* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis mediocris*  
*mediocris* (*Diplocentria*): Linyphiidae  
*mediocris* (*Parapelecopsis*): *Pelecopsis mediocris*  
*mediocris* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*mediterranea* (*Spermophora*): Pholcidae  
*mediterranea* (*Spermophorides*): *Spermophora mediterranea*  
*mediterraneus* (*Robertus*): Theridiidae  
*medius* (*Attus*): *Dendryphantus hastatus*  
*medusa* (*Erigone*): *Minyriolus medusa*  
*medusa* (*Lophocarenum*): *Minyriolus medusa*  
*medusa* (*Minyriolus*): Linyphiidae  
*medusa* [err.] (*Lophocarenum*): *Pocadicnemis pumila*  
*meillonae* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*Meioneta*: Linyphiidae  
*melanocephala* (*Walckenaeria*): *Walckenaeria atrotibialis*  
*melanocephala* (*Wideria*): *Walckenaeria atrotibialis*  
*melanocephalus* (*Wideria*): *Walckenaeria atrotibialis*  
*melanogaster* (*Dipoena*): Theridiidae  
*melanopygius* (*Ostarius*): *Ostearius melanopygius*  
*melanopygius* (*Ostearius*): Linyphiidae  
*melanurum* (*Theridion*): Theridiidae  
*melinus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*mellotei* (*Heriaeus*): Thomisidae  
*membrosa* (*Neaetha*): Salticidae  
*membrosa* (*Neera*): *Neaetha membrosa*  
*menardi* (*Meta*): Tetragnathidae  
*Menemerus*: Salticidae  
*mengeri* (*Hahnia*): *Hahnia ononidum*  
*mengeri* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*mengeri* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis mengeri*  
*mengeri* (*Meta*): Tetragnathidae  
*mengeri* (*Metellina*): *Meta mengeri*  
*mengeri* (*Panamomops*): Linyphiidae  
*mengeri* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*mengeri* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes mengeri*  
*mengeri* (*Trichopterna*): *Pelecopsis mengeri*  
*merens* (*Evansia*): Linyphiidae  
*merianae* (*Meta*): Tetragnathidae  
*merianae* (*Metellina*): *Meta merianae*  
*meridionalis* (*Erigone*): *Erigone longipalpis*  
*meridionalis* (*Lathys*): *Lathys humilis*  
*meridionalis* (*Lethia*): *Lathys humilis*  
*meridionalis* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*Mesiotelus*: Liocranidae  
*Meta*: Tetragnathidae  
*metallicus* (*Heliophanus*): *Heliophanus cupreus*  
*metallicus* [err.] (*Heliophanus*): *Heliophanus patagiatutus*  
*meticulosa* (*Entelecara*): *Diplocephalus picinus*  
*Metopobactrus*: Linyphiidae  
*Micaria*: Gnaphosidae  
*michailovi* (*Evarcha*): Salticidae  
*Micrargus*: Linyphiidae  
*Microctenonyx*: Linyphiidae  
*Microlinyphia*: Linyphiidae  
*Micrommata*: Sparassidae  
*Microneta*: Linyphiidae  
*microphthalma* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*microphthalma* (*Porrhomma*): *Porrhomma microphthalmum*  
*microphthalmum* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*microps* (*Birgerius*): *Centromerus microps*  
*microps* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*microps* (*Rhabdoria*): *Centromerus microps*  
*microps* [err.] (*Drassodes*): *Haplodrassus kulczynskii*  
*microps* [err.] (*Haplodrassus*): *Haplodrassus kulczynskii*  
*midas* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*midas* (*Midia*): *Lepthyphantes midas*  
*mildei* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*Mimetus*: Mimetidae  
*miniata* (*Lycosa*): *Xerolycosa miniata*  
*miniata* (*Tarentula*): *Xerolycosa miniata*  
*miniata* (*Xerolycosa*): Lycosidae  
*Minicia*: Linyphiidae  
*minimum* (*Micariosoma*): *Phrurolithus minimus*  
*minimum* (*Phrurolithus*): Corinnidae  
*minor* (*Trachelas*): Corinnidae  
*minos* (*Leptoneta*): *Leptoneta infuscata*  
*Minosia*: Gnaphosidae  
*minusculus* (*Drassodes*): *Haplodrassus dalmatensis*  
*minusculus* (*Drassus*): *Haplodrassus dalmatensis*  
*minuta* (*Tegenaria*): *Tegenaria picta*  
*minutissima* (*Theonoe*): Theridiidae  
*minutus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*minutus* (*Maro*): Linyphiidae  
*Minyriolus*: Linyphiidae  
*Mioxena*: Linyphiidae  
*mirabilis* (*Ocyale*): *Pisaura mirabilis*  
*mirabilis* (*Pisaura*): Pisauridae  
*miser* [femelle ou sexe non précisé] (*Lepthyphantes*): *Aphileta misera*  
*miser* [mâle] (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes ericaeus*  
*misera* (*Aphileta*): Linyphiidae  
*misera* (*Euophrys*): *Euophrys erratica*  
*misera* (*Hilousia*): *Aphileta misera*  
*misera* (*Hillousia*): *Aphileta misera*  
*Misumena*: Thomisidae  
*Misumenops*: Thomisidae  
*mitis* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes stygius*  
*mitis* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*mitrata* (*Erigone*): *Walckenaeria mitrata*  
*mitrata* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*mitrata* (*Wideria*): *Walckenaeria mitrata*  
*mixta* (*Pardosa*): Lycosidae  
*modestus* (*Harpactes*): *Harpactea corticalis*  
*modica* (*Calliethera*): *Salticus modicus*  
*modicus* (*Salticus*): Salticidae  
*Moebelia*: Linyphiidae  
*moerens* (*Evansia*): *Evansia merens*  
*moggridgei* (*Cteniza*): Ctenizidae



*moggridgei* (*Nemesia*): *Cteniza moggridgei*  
*Mogrus*: Salticidae  
*molesta* (*Euophrys*): *Talavera aequipes*  
*molesta* (*Gnaphosa*): *Gnaphosa alpica*  
*mollis* (*Agyne*): *Meioneta mollis*  
*mollis* (*Aprolagus*): *Meioneta mollis*  
*mollis* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*monachus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*monachus* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes monachus*  
*Monaeses*: Thomisidae  
*Monocephalus*: Linyphiidae  
*monoceros* (*Erigone*): *Walckenaeria monoceros*  
*monoceros* (*Prosopotheca*): *Walckenaeria monoceros*  
*monoceros* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*monoceros* [err.] (*Erigone*): *Walckenaeria erythrina*  
*monodon* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes sanctivincenti*  
*montana* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*montana* (*Hahnia*): Hahniidae  
*montana* (*Linyphia*): *Neriene montana*  
*montana* (*Neriene*): Linyphiidae  
*montana* (*Parazygiella*): *Zygiella montana*  
*montana* (*Pelecopsis*): *Pelecopsis denisi*  
*montana* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*montana* (*Xylla*): *Zygiella montana*  
*montana* (*Zilla*): *Zygiella montana*  
*montana* (*Zygiella*): Araneidae  
*montanum* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*monticola* (*Anguliphantes*): *Lepthyphantes monticola*  
*monticola* (*Euophrys*): *Talavera monticola*  
*monticola* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*monticola* (*Lycosa*): *Pardosa monticola*  
*monticola* (*Pardosa*): Lycosidae  
*monticola* (*Robertus*): *Robertus scoticus*  
*monticola* (*Talavera*): Salticidae  
*monticola* (*Titanoeca*): Titanocidae  
*monticola* (*Zodarion*): *Zodarion marginiceps*  
*monticola mixta* (*Pardosa*): *Pardosa mixta*  
*montigena* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*mordax* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*morosa* (*Pardosa*): Lycosidae  
*morosus* (*Tiso*): *Tiso aestivus*  
*movens* (*Micaria*): *Micaria funerea*  
*mughi* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*mughi* (*Mughiphantes*): *Lepthyphantes mughi*  
*mundus* (*Thanatus*): *Thanatus arenarius*  
*murcidum* (*Gongylidiellum*): Linyphiidae  
*murcidus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*musci* (*Hahnia*): *Hahnia candida*  
*musci* (*Harpactea*): Dysderidae  
*musci* (*Harpactes*): *Harpactea musci*  
*muscorum* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*muscorum* (*Heliophanus*): *Heliophanus aeneus*  
*muscosa* (*Marpissa*): Salticidae  
*muscosus* (*Attus*): *Marpissa muscosa*  
*muscosus* (*Marpissus*): *Marpissa muscosa*  
*musculus* (*Drassus*): *Scotophaeus musculus*

*musculus* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*musiva* (*Paidiscura*): *Theridion musivum*  
*musivum* (*Theridion*): Theridiidae  
*mutabilis* (*Calliethera*): *Salticus mutabilis*  
*mutabilis* (*Prothesima*): *Zelotes mutabilis*  
*mutabilis* (*Salticus*): Salticidae  
*mutabilis* (*Trachyzelotes*): *Zelotes mutabilis*  
*mutabilis* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*mutica* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*muticus* (*Neon*): Salticidae  
*muticus* (*Pelecopsis*): *Pelecopsis mutica*  
*mutilloides* (*Leptorchestes*): Salticidae  
*mutilus* (*Panamomops*): Linyphiidae  
*mutinensis* (*Cresmatoneta*): Linyphiidae  
*mutinensis* (*Formicina*): *Cresmatoneta mutinensis*  
*myops* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*Myrmarachne*: Salticidae  
*Mysmena*: Mysmenidae  
*Mysmenella*: Mysmenidae  
*mystaceum* (*Theridion*): Theridiidae

## N

*nana* (*Filistata*): *Pritha nana*  
*nana* (*Pritha*): Filistatidae  
*narbonensis* (*Lathys*): Dictynidae  
*narbonensis* (*Lethia*): *Lathys narbonensis*  
*narbonensis* (*Lycosa*): Lycosidae  
*narbonensis* (*Tarentula*): *Lycosa narbonensis*  
*nasica* (*Rhomphaea*): *Argyrodes nasicus*  
*nasica* (*Argyrodes*): *Argyrodes nasicus*  
*nasicus* (*Argyrodes*): Theridiidae  
*nasicus* (*Ariamnes*): *Argyrodes nasicus*  
*nasutus* (*Acartauchenius*): *Trachelocamptus nasutus*  
*nasutus* (*Trachelocamptus*): Linyphiidae  
*nava* (*Hahnia*): Hahniidae  
*nava* [err.] (*Hahnia*): *Hahnia ononidum*  
*navaricus* (*Drassus*): *Sosticus loricatus*  
*navus* (*Oecobius*): Oecobiidae  
*Neaetha*: Salticidae  
*nebulosa* (*Linyphia*): *Lepthyphantes nebulosus*  
*nebulosus* (*Icius*): *Icius congener*  
*nebulosus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*nebulosus* (*Megalepthyphantes*): *Lepthyphantes nebulosus*  
*neglecta* (*Clubiona*): Clubionidae  
*neglecta* (*Erigone*): *Robertus neglectus*  
*neglecta* (*Pocadicnemis*): *Pocadicnemis juncea*  
*neglectus* (*Pedanostethus*): *Robertus neglectus*  
*neglectus* (*Robertus*): Theridiidae  
*negrei* (*Bordea*): Linyphiidae  
*negrei* (*Lepthyphantes*): *Bordea negrei*  
*Nematogmus*: Linyphiidae  
*Nemesia*: Nemesiidae  
*nemorale* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis nemoralis*  
*nemoralioides* (*Parapelecopsis*): *Pelecopsis nemoralis*  
*nemoralioides* (*Pelecopsis*): Linyphiidae

- nemoralis* (*Erigone*): *Pelecopsis nemoralis*  
*nemoralis* (*Lycosa*): *Xerolycosa nemoralis*  
*nemoralis* (*Parapelecopsis*): *Pelecopsis nemoralis*  
*nemoralis* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*nemoralis* (*Tarentula*): *Xerolycosa nemoralis*  
*nemoralis* (*Xerolycosa*): Lycosidae  
*nemoralis* (*Zora*): Zoridae  
*nemorivaga* (*Erigone*): *Gonatium nemorivagum*  
*nemorivaga* (*Gonatium*): *Gonatium nemorivagum*  
*nemorivagum* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*nemorosa* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*Nemoscolus*: Araneidae  
*Neon*: Salticidae  
*Neoscona*: Araneidae  
*Neriene*: Linyphiidae  
*nervosa* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*nesiotes* (*Cnephalocotes*): *Hypocephalus nesiotes*  
*nesiotes* (*Hypocephalus*): Linyphiidae  
*nesiotes* (*Mecopisthes*): *Hypocephalus nesiotes*  
*Nesticus*: Nesticidae  
*neta* (*Singa*): Araneidae  
*nicaeense* (*Lophocarenum*): *Mecopisthes nicaeensis*  
*nicaeensis* (*Dysdera*): Dysderidae  
*nicaeensis* (*Mecopisthes*): Linyphiidae  
*nicaeensis* (*Minyriolus*): *Mecopisthes nicaeensis*  
*nidicolens* (*Dendryphantes*): Salticidae  
*nidicolens* (*Eris*): *Dendryphantes nidicolens*  
*nidicolens* (*Macaroris*): *Dendryphantes nidicolens*  
*nigella* (*Ozyptila*): *Ozyptila pauxilla*  
*niger* (*Eresus*): Eresidae  
*nigerrima* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*nigerrimus* (*Erigonoplus*): *Erigonoplus inclarus*  
*Nigma*: Dictynidae  
*nigra* (*Erigone*): *Dicymbium nigrum*  
*nigra* (*Pardosa*): Lycosidae  
*nigriceps* (*Enyo*): *Zodarion nigriceps*  
*nigriceps* (*Lycosa*): *Pardosa nigriceps*  
*nigriceps* (*Pardosa*): Lycosidae  
*nigriceps* (*Zodarion*): Zadariidae  
*nigrina* (*Dipoena*): *Dipoena coracina*  
*nigrina* (*Lasaeola*): *Dipoena coracina*  
*nigrinum* (*Micariosoma*): *Phrurolithus nigrinus*  
*nigrinus* (*Bathyphantes*): Linyphiidae  
*nigrinus* (*Phrurolithus*): Corinnidae  
*nigrinus* (*Stylophora*): *Bathyphantes nigrinus*  
*nigripalpis* (*Euophrys*): Salticidae  
*nigripalpis* (*Oxyopes*): Oxyopidae  
*nigripes* (*Ischnyphantes*): *Meioneta nigripes*  
*nigripes* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*nigripes* (*Microneta*): *Meioneta nigripes*  
*nigrita* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*nigrita* (*Prothesima*): *Zelotes pusillus*  
*nigrita* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*nigritarsis* (*Euophrys*): Salticidae  
*nigritus* (*Hylyphantes*): Linyphiidae  
*nigrocaerulea* (*Erigone*): *Erigonoplus nigrocaeruleus*  
*nigrocaerulea* (*Trichopterna*): *Erigonoplus nigrocaeruleus*  
*nigrocaeruleus* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*nigrociliatus* (*Pellenes*): Salticidae  
*nigrocincta* (*Enoplognatha*): *Enoplognatha mandibularis*  
*nigrofusca* (*Enyo*): *Zodarion fulvonigrum*  
*nigrolimbata* (*Erigone*): *Minicia marginella*  
*nigromarginata* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*nigropictus* (*Bolyphantes*): Linyphiidae  
*nigropunctatum* (*Theridion*): Theridiidae  
*nigroreticulata* (*Dipoena*): Theridiidae  
*nigroreticulata* (*Euryopis*): *Dipoena nigroreticulata*  
*nigroreticulata* (*Lasaeola*): *Dipoena nigroreticulata*  
*nigrotibialis* (*Sydera*): Linyphiidae  
*nigrovariegatum* (*Theridion*): Theridiidae  
*nigrum* (*Dicymbium*): Linyphiidae  
*nilicola* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*ninnii* (*Dysdera*): Dysderidae  
*ninnii* (*Xysticus*): Thomisidae  
*nitens* (*Micaria*): *Micaria pulicaria*  
*nitens* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*nitidior* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*nitidithorax* (*Cnephalocotes*): *Silometopus nitidithorax*  
*nitidithorax* (*Silometopus*): Linyphiidae  
*nitidithorax* [err.] (*Silometopus*): *Silometopus curtus*  
*nitidula* (*Singa*): Araneidae  
*nitidulus* (*Araneus*): *Singa nitidula*  
*nitidulus* (*Singa*): *Singa nitidula*  
*nitidus* (*Improphantes*): *Lepthyphantes nitidus*  
*nitidus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*nivalis* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*nivicola* (*Dresconella*): Linyphiidae  
*nivicola* (*Lophocarenum*): *Dresconella nivicola*  
*nivicola* (*Trichopterna*): *Dresconella nivicola*  
*nivoyi* (*Hyctia*): *Marpissa nivoyi*  
*nivoyi* (*Marpissa*): Salticidae  
*nobilis* (*Steatoda*): Theridiidae  
*nocturna* (*Callilepis*): Gnaphosidae  
*nocturna* (*Pythonissa*): *Callilepis nocturna*  
*nocturna concolor* (*Callilepis*): *Callilepis concolor*  
*nodifer* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*nodosa* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*nodosa* (*Wideria*): *Walckenaeria nodosa*  
*Nomisia*: Gnaphosidae  
*notabilis* (*Icius*): *Icius subinermis*  
*notabilis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*notata* (*Xylla*): *Zygiella x-notata*  
*notia* (*Calliethera*): *Salticus conjunctus*  
*Notioscopus*: Linyphiidae  
*nubila* (*Dysdera*): Dysderidae  
*nubilus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*nubivaga* (*Berlandina*): Gnaphosidae  
*nubivaga* (*Callilepis*): *Berlandina nubivaga*  
*nubivaga* (*Pterotricha*): *Berlandina nubivaga*  
*nubivaga* (*Pythonissa*): *Berlandina nubivaga*  
*Nuctenea*: Araneidae  
*nudipalpis* (*Trachynella*): *Walckenaeria nudipalpis*  
*nudipalpis* (*Trachynotus*): *Walckenaeria nudipalpis*

*nudipalpis* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*numida* (*Anyphaena*): Anyphaenidae  
*numida* (*Tarentula*): *Alopecosa albofasciata*  
*nuncia* (*Entelecara*): *Diplocephalus graecus*  
*nuncia* (*Erigone*): *Diplocephalus graecus*  
*nutrix* (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium punctorium*

## O

*obesus* (*Coelotes*): *Coelotes segestriiformis*  
*oblitum* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*oblonga* (*Prothesima*): *Zelotes oblongus*  
*oblongiusculus* (*Paratibellus*): Philodromidae  
*oblongiusculus* (*Tibellus*): *Paratibellus oblongiusculus*  
*oblongus* (*Heriaeus*): *Heriaeus melloteei*  
*oblongus* (*Thanatus*): *Tibellus oblongus*  
*oblongus* (*Tibellus*): Philodromidae  
*oblongus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*obscura* (*Erigone*): *Cnephalocotes obscurus*  
*obscura* (*Titanoeca*): *Titanoeca quadriguttata*  
*obscuripalpis* (*Wideria*): *Walckenaeria stylifrons*  
*obscurus* (*Cnephalocotes*): Linyphiidae  
*obscurus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*obscurus* (*Obscuriphantes*): *Lepthyphantes obscurus*  
*obscurus* (*Trematocephalus*): Linyphiidae  
*obsoleta* (*Euophrys*): Salticidae  
*obsoleta* (*Pseudeuophrys*): *Euophrys obsoleta*  
*obtusa* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*obtusa* (*Trachynella*): *Walckenaeria obtusa*  
*obtusa* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*obtusus* (*Trachynotus*): *Walckenaeria obtusa*  
*occidentale* (*Gonatum*): Linyphiidae  
*occidentalis* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*occidentalis* (*Drassus*): *Haplodrassus macellinus*  
*occidentalis* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*occidentalis* (*Misumena*): *Misumena vatia*  
*occidentalis* (*Pardosa*): Lycosidae  
*occidentalis* (*Pythonissa*): *Gnaphosa occidentalis*  
*oceanica* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*ocellatus* (*Araneus*): *Larinioides patagiatus*  
*ocellatus* (*Larinioides*): *Larinioides patagiatus*  
*oculata* (*Allocosa*): Lycosidae  
*oculata* (*Cyclosa*): Araneidae  
*oculata* (*Lycosa*): *Allocosa oculata*  
*Oecobius*: Oecobiidae  
*Oedothorax*: Linyphiidae  
*oelandica* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*ohlerti* (*Achaeearanea*): Theridiidae  
*ohlerti* (*Theridion*): *Achaeearanea ohlerti*  
*Olios*: Sparassidae  
*olivacea* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*ollivieri* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*omissa* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*omoeda* (*Gibbaranea*): Araneidae  
*omoedus* (*Araneus*): *Gibbaranea omoeda*  
*onoidum* (*Hahnia*): Hahniidae  
*onustus* (*Thomisus*): Thomisidae  
*Oonopinus*: Oonopidae  
*Oonops*: Oonopidae  
*opaca* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*ophthalmica* (*Syedra*): *Syedra gracilis*  
*opilio* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*opilionoides* (*Pholcus*): Pholcidae  
*opisthographa* (*Araniella*): Araneidae  
*opisthographus* (*Araneus*): *Araniella opisthographa*  
*opulenta* (*Theridula*): Theridiidae  
*opuntiae* (*Cyrtophora*): *Cyrtophora citricola*  
*Orchestina*: Oonopidae  
*oredonensis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*oredonensis* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes oredonensis*  
*Oreonetides*: Linyphiidae  
*oreophila* (*Pardosa*): Lycosidae  
*oribata* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*ornata* (*Micrommata*): *Micrommata virescens*  
*orpheus* (*Taranucnus*): *Troglohyphantes orpheus*  
*orpheus* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*osellai* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*Ostearius*: Linyphiidae  
*ovata* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*ovatum* (*Theridion*): *Enoplognatha ovata*  
*ovatus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*Oxyopes*: Oxyopidae  
*Ozyptila*: Thomisidae

## P

*pabulator* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*pabulator* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*pabulator* (*Tmeticus*): *Centromerus pabulator*  
*pabulator* [err.] (*Coelotes*): *Coelotes pastor*  
*pabulatrix* (*Erigone*): *Centromerus pabulator*  
*Pachygnatha*: Tetragnathidae  
*paetula* (*Erigone*): *Mecynargus paetulus*  
*paetulus* (*Mecynargus*): Linyphiidae  
*paetulus* (*Rhaebothorax*): *Mecynargus paetulus*  
*paetulus* (*Typhochrestus*): *Mecynargus paetulus*  
*paetutus* (*Rhaebothorax*): *Mecynargus paetulus*  
*pagana* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*paganum* (*Gongylidiellum*): *Asthenargus paganus*  
*paganus* (*Asthenargus*): Linyphiidae  
*paillardii* (*Scotina*): *Scotina palliardii*  
*palilis* (*Pityohyphantes*): Linyphiidae  
*palitans* (*Pardosa*): *Pardosa vittata*  
*pallens* (*Colobocyba*): *Tapinocyba pallens*  
*pallens* (*Erigone*): *Tapinocyba pallens*  
*pallens* (*Paidiscura*): *Theridion pallens*  
*pallens* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*pallens* (*Theridion*): Theridiidae  
*palliardii* (*Scotina*): Liocranidae  
*pallidula* (*Epeira*): *Araneus pallidus*  
*pallidula* (*Clubiona*): Clubionidae  
*pallidula* (*Tegenaria*): *Tegenaria fuesslini*  
*pallidum* [err.] (*Porrhomma*): *Porrhomma convexum*  
*pallidus* (*Araneus*): Araneidae

- pallidus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*pallidus* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes pallidus*  
*pallidus* (*Zelotes*): *Zelotes tenuis*  
*pallidus* [err.] (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes nodifer*  
*pallipes* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*paludicola* (*Pardosa*): Lycosidae  
*paludigena* (*Oedothorax*): Linyphiidae  
*palustris* (*Lycosa*): *Pardosa palustris*  
*palustris* (*Pardosa*): Lycosidae  
*Panamomops*: Linyphiidae  
*pannonica* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*papalis* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes insignis*  
*paradoxa* (*Phoroncidia*): Theridiidae  
*paradoxa* (*Trabaea*): *Trabaea paradoxa*  
*paradoxa* (*Trabea*): Lycosidae  
*paradoxa* (*Ulesanis*): *Phoroncidia paradoxa*  
*paradoxum* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*paradoxus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*paradoxus* (*Cryptocleptes*): *Centromerus paradoxus*  
*paradoxus* (*Hyptiotes*): Uloboridae  
*paradoxus* (*Monaeses*): Thomisidae  
*paradoxus* (*Oroodes*): *Phoroncidia paradoxa*  
*parallela* (*Erigone*): *Pelecopsis parallela*  
*parallela* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*parallela* (*Zora*): Zoridae  
*parallelogrammus* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes decolor*  
*parallellum* (*Brachycentrum*): *Pelecopsis parallela*  
*parallellum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis parallela*  
*parallelus* (*Pelecopsis*): *Pelecopsis parallela*  
*parallelus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*parallelus* [err.] (*Tibellus*): *Tibellus oblongus*  
*parasiticus* (*Thyreosthenius*): Linyphiidae  
*Paratibellus*: Philodromidae  
*pardalis* (*Zora*): Zoridae  
*Pardosa*: Lycosidae  
*parietalis* (*Philodromus*): Philodromidae  
*parietina* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*parisiensis* (*Aulacocyba*): *Microctenonyx subitaneus*  
*parisiensis* (*Tapinocyba*): *Microctenonyx subitaneus*  
*paroculus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*partita* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*partitus* (*Pelecopsis*): *Pelecopsis partita*  
*parumpunctata* (*Erigone*): *Pelecopsis mengei*  
*parumpunctatum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis mengei*  
*parvula* (*Setaphis*): Gnaphosidae  
*parvulus* (*Bathyphantes*): Linyphiidae  
*pastor* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*pastor* [err.] (*Coelotes*): *Coelotes pabulator*  
*pastoralis* (*Alopecosa*): *Alopecosa alpicola*  
*pastoralis* (*Lycosa*): *Alopecosa alpicola*  
*pastoralis* (*Tarentula*): *Alopecosa alpicola*  
*patagiata* (*Epeira*): *Larinioides patagiatus*  
*patagiatus* (*Araneus*): *Larinioides patagiatus*  
*patagiatus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*patagiatus* (*Larinioides*): Araneidae  
*patricius* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae  
*patricius* (*Drassus*): *Poecilochroa patricia*  
*patula* (*Argenna*): Dictynidae  
*patula* (*Dictyna*): *Argenna patula*  
*patula* (*Protadia*): *Argenna patula*  
*paulae* (*Cnephalocotes*): *Hypsocephalus paulae*  
*paulae* (*Hypsocephalus*): Linyphiidae  
*paulae* (*Mecopisthes*): *Hypsocephalus paulae*  
*pauper* (*Alioranus*): Linyphiidae  
*pauper* (*Dactylopiastes*): *Alioranus pauper*  
*pauper* [err.] (*Alioranus*): *Microctenonyx subitaneus*  
*paupera* (*Erigone*): *Alioranus pauper*  
*pauzilla* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*pavesii* (*Orchestina*): Oonopidae  
*paykulli* (*Hasarius*): *Plexippus paykulli*  
*paykulli* (*Plexippus*): Salticidae  
*paykulliana* (*Steatoda*): Theridiidae  
*paykullianus* (*Lithyphantes*): *Steatoda paykulliana*  
*pecuarius* (*Diastanillus*): Linyphiidae  
*pecuarius* (*Thyreosthenius*): *Diastanillus pecuarius*  
*pedestris* (*Melanophora*): *Zelotes pedestris*  
*pedestris* (*Prothesima*): *Zelotes pedestris*  
*pedestris* (*Trachyzelotes*): *Zelotes pedestris*  
*pedestris* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*pelasgicum* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*Pelecopsis*: Linyphiidae  
*Pellenes*: Salticidae  
*pellucida* (*Cicurina*): *Cicurina cicur*  
*pellucidus* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes ericaeus*  
*peltata* (*Lepthyphantes*): *Nerienne peltata*  
*peltata* (*Linyphia*): *Nerienne peltata*  
*peltata* (*Nerienne*): Linyphiidae  
*penicillata* (*Erigone*): *Moebelia penicillata*  
*penicillata* (*Moebelia*): Linyphiidae  
*penicillatus* (*Attulus*): *Sitticus penicillatus*  
*penicillatus* (*Attus*): *Sitticus penicillatus*  
*penicillatus* (*Sitticus*): Salticidae  
*penicillatus* (*Styloctetor*): *Moebelia penicillata*  
*pennatum* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*pennyi* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*pennyi* [err.] (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium montanum*  
*Peponocranium*: Linyphiidae  
*perforatus* (*Asthenargus*): Linyphiidae  
*perileucus* (*Xysticus*): *Xysticus ninnii*  
*perita* (*Arctosa*): Lycosidae  
*perita* (*Lycosa*): *Arctosa perita*  
*perita* (*Tegenaria*): *Tegenaria picta*  
*perita* (*Trochosa*): *Arctosa perita*  
*permixtus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*permixtus* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus permixtus*  
*permixtus* (*Streptosphaenus*): *Diplocephalus permixtus*  
*perplexa* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*personata* (*Arctosa*): Lycosidae  
*personata* (*Lycosa*): *Arctosa personata*  
*personata* (*Misumena*): *Misumena vatia*  
*perversa* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae

- pervicax* (*Blaniargus*): *Micrargus pervicax*  
*pervicax* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*petraeum* (*Theridion*): Theridiidae  
*petraeum* [err.] (*Theridion*): *Theridion wiehlei*  
*petrensis* (*Euophrys*): *Talavera petrensis*  
*petrensis* (*Melanophora*): *Zelotes petrensis*  
*petrensis* (*Prosthesima*): *Zelotes petrensis*  
*petrensis* (*Talavera*): Salticidae  
*petrensis* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*petrobia* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*petrobia* (*Hahnia*): Hahnidae  
*peusi* (*Mecopisthes*): Linyphiidae  
*pexa* (*Euophrys*): Salticidae  
*Phaeoedus*: Gnaphosidae  
*phalangioides* (*Pholcus*): Pholcidae  
*phalerata* (*Asagena*): *Steatoda phalerata*  
*phalerata* (*Steatoda*): Theridiidae  
*Philaeus*: Salticidae  
*Philodromus*: Philodromidae  
*Phintella*: Salticidae  
*Phlegra*: Salticidae  
*Pholcomma*: Theridiidae  
*Pholcus*: Pholcidae  
*Phoroncidia*: Theridiidae  
*phragmitis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*phragmitis* (*Taranucnus*): *Troglohyphantes phragmitis*  
*phragmitis* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*Phrurolithus*: Corinnidae  
*phrygiana* (*Linyphia*): *Pityohyphantes phrygianus*  
*phrygianus* (*Pityohyphantes*): Linyphiidae  
*piceus* (*Atypus*): Atypidae  
*piceus* (*Zelotes*): *Zelotes reimoseri*  
*pycinus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*pycinus* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus pycinus*  
*picta* (*Hahnia*): Hahnidae  
*picta* (*Poecilochroa*): *Poecilochroa albomaculata*  
*picta* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*pictilis* (*Attus*): *Euophrys obsoleta*  
*pictilis* (*Euophrys*): *Euophrys obsoleta*  
*pictionicus* (*Mecopisthes*): Linyphiidae  
*pictum* (*Theridion*): Theridiidae  
*pictus* (*Neon*): Salticidae  
*piger* (*Tmarus*): Thomisidae  
*pilipes* (*Prosthesima*): *Zelotes atrocaeruleus*  
*pilosus* (*Scotargus*): Linyphiidae  
*pilosus* (*Trichoncoides*): Linyphiidae  
*pilula* (*Euryopis*): *Dipoena convexa*  
*pinastri* (*Theridion*): Theridiidae  
*pini* (*Xysticus*): *Xysticus audax*  
*pinicola* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*pinicola* (*Piniphantes*): *Lepthyphantes pinicola*  
*pinicola* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*pinicola* (*Textrix*): Agelenidae  
*pinicola* (*Theridion*): Theridiidae  
*piochardi* (*Tmarus*): Thomisidae  
*Pirata*: Lycosidae  
*piratica* (*Lycosa*): *Pirata piraticus*  
*piratica* (*Pirata*): *Pirata piraticus*  
*piratica tenuitarsis* (*Lycosa*): *Pirata tenuitarsis*  
*piraticus* (*Pirata*): Lycosidae  
*Pisaura*: Pisauridae  
*piscator* (*Gongylidium*): *Trichoncoides piscator*  
*piscator* (*Rhaebothorax*): *Trichoncoides piscator*  
*piscator* (*Trichoncoides*): Linyphiidae  
*piscatoria* (*Lycosa*): *Pirata piscatorius*  
*piscatoria* (*Pirata*): *Pirata piscatorius*  
*piscatorius* (*Pirata*): Lycosidae  
*Pistius*: Thomisidae  
*Pityohyphantes*: Linyphiidae  
*placidulus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*placidum* (*Gongylidiellum*): *Asthenargus placidus*  
*placidus* (*Asthenargus*): Linyphiidae  
*placidus* (*Oonops*): Oonopidae  
*Plaesianillus*: Linyphiidae  
*plantarius* (*Dolomedes*): Pisauridae  
*Plexippus*: Salticidae  
*pluchei* (*Holocnemus*): Pholcidae  
*plumalis* (*Berlandina*): Gnaphosidae  
*plumalis* (*Pterotricha*): *Berlandina plumalis*  
*plumalis* (*Pythonissa*): *Berlandina plumalis*  
*plumipes* (*Uloborus*): Uloboridae  
*Pocadicnemis*: Linyphiidae  
*Poecilochroa*: Gnaphosidae  
*Poeciloneta*: Linyphiidae  
*poecilus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*Polenecia*: Uloboridae  
*polita* (*Erigone*): *Walckenaeria incisa*  
*polita* (*Wideria*): *Walckenaeria incisa*  
*politus* (*Drassus*): *Scotophaeus blackwalli*  
*politus* (*Philodromus*): *Philodromus aureolus*  
*potatia* (*Marpissa*): Salticidae  
*potatius* (*Marpissus*): *Marpissa potatia*  
*Porrhomma*: Linyphiidae  
*portator* (*Drassus*): *Drassodes luteomicans*  
*poweri* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*praecelsa* (*Dipoena*): Theridiidae  
*praecox* (*Erigone*): *Tapinocyba praecox*  
*praecox* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*praedatus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*praefica* (*Prosthesima*): *Zelotes praeficus*  
*praefica* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*praeficus* (*Drassyllus*): *Zelotes praeficus*  
*praeficus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*pratense* (*Baryphyma*): Linyphiidae  
*pratensis* (*Baryphyma*): *Baryphyma pratense*  
*praticola* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*praticola* (*Xysticus*): *Ozyptila praticola*  
*prativaga* (*Pardosa*): Lycosidae  
*Pritha*: Filistatidae  
*probosus* (*Tmeticus*): *Centromerus serratus*  
*procax* (*Dipoena*): *Dipoena torva*  
*procax* (*Euryopis*): *Dipoena torva*  
*procax* (*Lasaeola*): *Dipoena torva*  
*procer* (*Diplocephalus*): Linyphiidae

- procer* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus procer*  
*procerus* (*Oonops*): Oonopidae  
*prodigialis* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes angustiformis*  
*producta* (*Polenecia*): Uloboridae  
*producta* (*Sybota*): *Polenecia producta*  
*productus* (*Uloborus*): *Polenecia producta*  
*prominens* (*Araneus*): *Cercidia prominens*  
*prominens* (*Cercidia*): Araneidae  
*prominens* (*Pocadicnemis*): *Lasiargus hirsutus*  
*prominulus* (*Metopobactrus*): Linyphiidae  
*promiscua* (*Erigone*): Linyphiidae  
*promptus* (*Attus*): *Marpissa pomatia*  
*prona* (*Dipoena*): Theridiidae  
*prona* (*Lasaeola*): *Dipoena prona*  
*propinqua* (*Hahnia*): *Antistea elegans*  
*propinquus* (*Salticus*): Salticidae  
*propinquus* (*Tibellus*): *Tibellus oblongus*  
*proserpina* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*proserpina* (*Porrhomma*): *Porrhomma convexum*  
*Protoleptoneta*: Leptonetidae  
*protuberans* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*protuberans* (*Plaesiocraerus*): *Diplocephalus protuberans*  
*provincialis* (*Dysdera*): *Dysdera erythrina*  
*provincialis* (*Scotinotylus*): Linyphiidae  
*proxima* (*Agroeca*): Liocranidae  
*proxima* (*Pardosa*): Lycosidae  
*prudens* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*prudens* (*Tmeticus*): *Centromerus prudens*  
*Pseudicius*: Salticidae  
*pseudoarciger* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*pseudoarciger* (*Mansuphantes*): *Lepthyphantes pseudoarciger*  
*pseudoclivicola* (*Zelotes*): *Zelotes gallicus*  
*pseudoelegans* (*Zodarion*): Zodariidae  
*pseudoneglecta* (*Clubiona*): Clubionidae  
*pseudorurestris* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*Psilochorus*: Pholcidae  
*pubescens* (*Attus*): *Sitticus pubescens*  
*pubescens* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*pubescens* (*Drassus*): *Drassodes pubescens*  
*pubescens* (*Heliophanus*): *Heliophanus tribulosus*  
*pubescens* (*Sitticus*): Salticidae  
*puella* (*Dictyna*): *Nigma puella*  
*puella* (*Heterodictyna*): *Nigma puella*  
*puella* (*Nigma*): Dictynidae  
*pulchellum* (*Theridion*): *Anelosimus pulchellus*  
*pulchellus* (*Anelosimus*): Theridiidae  
*pulchellus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*pulcher* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*pulcher* (*Mughiphantes*): *Lepthyphantes pulcher*  
*pulcher* (*Oonops*): Oonopidae  
*pulicaria* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*pullata* (*Agroeca*): *Agroeca cuprea*  
*pullata* (*Kaestneria*): Linyphiidae  
*pullata* (*Pardosa*): Lycosidae  
*pullatum* (*Habrocestum*): Salticidae  
*pullatus* (*Bathyphantes*): *Kaestneria pullata*  
*pullatus* (*Stylophora*): *Kaestneria pullata*  
*pullinus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*pullinus* (*Streptosphaenus*): *Diplocephalus pullinus*  
*pulverulenta* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*pulverulenta* (*Lycosa*): *Alopecosa pulverulenta*  
*pulverulenta* (*Tarentula*): *Alopecosa pulverulenta*  
*pumila* (*Erigone*): *Pocadicnemis pumila*  
*pumila* (*Pocadicnemis*): Linyphiidae  
*pumilio* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*pumilus* (*Drassyllus*): *Zelotes pumilus*  
*pumilus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*punctata* (*Dysdera*): Dysderidae  
*punctatum* (*Lophomma*): Linyphiidae  
*punctipes* (*Tetragnatha*): *Tetragnatha dearmata*  
*punctorium* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*purbeckensis* (*Pardosa*): *Pardosa agrestis*  
*pusilla* (*Dictyna*): Dictynidae  
*pusilla* (*Erigone*): *Minyriolus pusillus*  
*pusilla* (*Hahnia*): Hahniidae  
*pusilla* (*Linyphia*): *Microlinyphia pusilla*  
*pusilla* (*Microlinyphia*): Linyphiidae  
*pusilla* (*Prosthesima*): *Zelotes pusillus*  
*pusilla* (*Tegenaria*): *Tegenaria picta*  
*pusillus* (*Cnephlocotes*): *Mecopisthes silus*  
*pusillus* (*Drassyllus*): *Zelotes pusillus*  
*pusillus* (*Heterotriconcus*): *Trichoncus pusillus*  
*pusillus* (*Minyriolus*): Linyphiidae  
*pusillus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*pusillus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*pusio* (*Neon*): *Neon convolutus*  
*pusio* (*Sintula*): *Meioneta mollis*  
*pusio* (*Zodarion*): Zodariidae  
*pusiola* (*Segestria*): Segestriidae  
*puta* [err.] (*Lathys*): *Lathys stigmatisata*  
*puta* [err.] (*Lethia*): *Lathys stigmatisata*  
*pygmaea* (*Hypsosinga*): *Hypsosinga pygmaea*  
*pygmaea* (*Hypsosinga*): Araneidae  
*pygmaea* (*Singa*): *Hypsosinga pygmaea*  
*pygmaeum* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*pygmaeus* (*Araneus*): *Hypsosinga pygmaea*  
*pygmaeus* (*Hypsosinga*): *Hypsosinga pygmaea*  
*pygmaeus* (*Tapinocyboides*): Linyphiidae  
*pyramidalis* (*Euryopis*): *Theridion conigerum*  
*pyramidalis* (*Lasaeola*): *Theridion conigerum*  
*pyrenaea* (*Acantholycosa*): Lycosidae  
*pyrenaea* (*Cryphoeca*): *Dirksia pyrenaea*  
*pyrenaea* (*Dirksia*): Hahniidae  
*pyrenaea* (*Pardosa*): *Acantholycosa pyrenaea*  
*pyrenaea* (*Pelecopsis*): *Pelecopsis nemoralis*  
*pyrenaea* (*Plocamis*): *Episinus theridioides*  
*pyrenaea* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*pyrenaea* (*Wideria*): *Walckenaeria pyrenaea*  
*pyrenaea* [err.] (*Acantholycosa*): *Acantholycosa rupicola*  
*pyrenaeum* (*Brachycentrum*): *Pelecopsis nemoralis*

*pyrenaicum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis nemoralis*  
*pyrenaicus* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*pyrenaicus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*pyrenaicus* (*Mecynargus*): Linyphiidae  
*pyrenaicus* (*Mughiphantes*): *Lepthyphantes pyrenaicus*  
*pyrenaicus* (*Paracoelotes*): *Coelotes pyrenaicus*  
*pyrenaicus* (*Rhaebothorax*): *Mecynargus pyrenaicus*  
*pyrenaicus* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*pyrenaicus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*pyrenea* (*Pelecopsis*): *Pelecopsis nemoralis*

## Q

*quadrata* (*Epeira*): *Araneus quadratus*  
*quadratus* (*Araneus*): Araneidae  
*quadridentatus* (*Oreonetides*): Linyphiidae  
*quadriguttata* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*quadrilineata* (*Pisaura*): Pisauridae  
*quadripunctata* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*quadripunctatus* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*quinqueguttata* (*Euryopis*): Theridiidae

## R

*racovitzai* (*Desidiopsis*): Dictynidae  
*racovitzai* (*Mizaga*): *Desidiopsis racovitzai*  
*radiata* (*Hogna*): Lycosidae  
*radiata* (*Lycosa*): *Hogna radiata*  
*radiata* (*Marpissa*): Salticidae  
*radiata* (*Nemesia*): *Nemesia pannonica*  
*radiata* (*Neriene*): Linyphiidae  
*radicicola* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis radicola*  
*radicicola* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*radulifer* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*ramosa* (*Agyneta*): Linyphiidae  
*ramosus* (*Oxyopes*): Oxyopidae  
*rariipila* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*rauda* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*ravastellus* (*Harpactocrates*): Dysderidae  
*rayi* (*Attus*): *Neon rayi*  
*rayi* (*Erigone*): *Metopobactrus rayi*  
*rayi* (*Metopobactrus*): Linyphiidae  
*rayi* (*Neon*): Salticidae  
*rayi* (*Sauron*): *Metopobactrus rayi*  
*rayi* (*Thanatus*): Philodromidae  
*rayi* (*Trachela*): Corinnidae  
*raymondi* (*Cicurina*): *Cybaeus raymondi*  
*raymondi* (*Cybaeus*): Cybaeidae  
*razoumowskyi* (*Zelotes*): *Zelotes rusticus*  
*recepta* (*Nomisia*): Gnaphosidae  
*reclusa* (*Clubiona*): Clubionidae  
*reconditus* (*Zelotes*): *Zelotes egregius*  
*reconditus mediocris* (*Zelotes*): *Zelotes pyrenaicus*  
*rectiloba* (*Diplocephalus*): *Diplocephalus rectilobus*  
*rectiloba* (*Prosoponcus*): *Diplocephalus rectilobus*  
*rectilobus* (*Diplocephalus*): Linyphiidae  
*redii* (*Agalenatea*): Araneidae  
*redii* (*Aranea*): *Agalenatea redii*  
*redii* (*Araneus*): *Agalenatea redii*  
*redii* (*Epeira*): *Agalenatea redii*  
*regia* (*Epeira*): *Araneus circe*  
*reimoseri* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*remota* (*Erigone*): Linyphiidae  
*remotum* (*Zodariion*): Zodariidae  
*renidens* (*Lycosa*): *Alopecosa pulverulenta*  
*reprobis* (*Halorates*): Linyphiidae  
*reprobis* [err.] (*Halorates*): *Sciastes carli*  
*reticulata* (*Selamia*): Zodariidae  
*reticulata* (*Storena*): *Selamia reticulata*  
*reticulatus* (*Neon*): Salticidae  
*retroversa* (*Erigone*): *Sintula retroversus*  
*retroversa* (*Microneta*): *Sintula retroversus*  
*retroversus* (*Sintula*): Linyphiidae  
*retusa* (*Erigone*): *Oedothorax retusus*  
*retusum* (*Gongylidium*): *Oedothorax fuscus*  
*retusus* (*Drassus*): *Scotophaeus retusus*  
*retusus* (*Oedothorax*): Linyphiidae  
*retusus* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*reussi* (*Silometopus*): Linyphiidae  
*rhenana* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*rhodanicus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*Rhode*: Dysderidae  
*riparia* (*Achaeearanea*): Theridiidae  
*riparia* (*Lycosa*): *Pardosa riparia*  
*riparia* (*Pardosa*): Lycosidae  
*riparium* (*Theridion*): *Achaeearanea riparia*  
*rivalis* (*Sitticus*): Salticidae  
*rivulatus* (*Holocnemus*): *Holocnemus pluchei*  
*Robertus*: Theridiidae  
*robusta* (*Lycosa*): *Trochosa robusta*  
*robusta* (*Trochosa*): Lycosidae  
*robustum* (*Leptorhoptrum*): Linyphiidae  
*robustus* (*Neon*): Salticidae  
*robustus* (*Proxysticus*): *Xysticus robustus*  
*robustus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*rogenhoferi* (*Phlegra*): Salticidae  
*romana* (*Ceratinopsis*): *Styloctetor romanus*  
*romana* (*Micaria*): *Micaria albovittata*  
*romanus* (*Styloctetor*): Linyphiidae  
*romanus* (*Styloctetor*): *Styloctetor romanus*  
*roscidus* (*Coelotes*): *Coelotes segestriiformis*  
*rosea* (*Micrommata*): *Micrommata virescens*  
*rosenhaueri* (*Porrhomma*): Linyphiidae  
*roseum* (*Micrommata*): *Micrommata virescens*  
*rosserae* (*Clubiona*): Clubionidae  
*rossica* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*rostrata* (*Rhomphaea*): *Argyrodes rostratus*  
*rostratus* (*Argyrodes*): Theridiidae  
*rostratus* (*Ariamnes*): *Argyrodes rostratus*  
*rubellum* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*rubens* (*Gonatium*): Linyphiidae  
*rubicundula* (*Prosthesima*): *Zelotes fuscipes*  
*rubicundulus* (*Zelotes*): *Zelotes fuscipes*  
*rubicundus* (*Zelotes*): *Zelotes fuscipes*  
*rubidum* (*Zodariion*): Zodariidae  
*rubidus* (*Drassodes*): Gnaphosidae

- rubidus* (*Drassus*): *Drassodes rubidus*  
*rubrofasciata* (*Hygrolycosa*): Lycosidae  
*rubrofasciata* (*Lycosa*): *Hygrolycosa rubrofasciata*  
*rubrofasciata* (*Pardosa*): *Hygrolycosa rubrofasciata*  
*rudis* (*Attus*): *Dendryphantès rudis*  
*rudis* (*Dendryphantès*): Salticidae  
*rudis* (*Dysdera*): Dysderidae  
*rufescens* (*Loxosceles*): Sicariidae  
*ruffoi* (*Zodarium*): Zodariidae  
*rufibarbis* (*Euophrys*): Salticidae  
*ruficapillus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*rufidorsa* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*rufidorsum* (*Meioneta*): *Meioneta rufidorsa*  
*rufimana* (*Euophrys*): Salticidae  
*rufimanus* (*Attus*): *Euophrys rufimana*  
*rufimanus* (*Euophrys*): *Euophrys rufimana*  
*rufipes* (*Ballus*): Salticidae  
*rufipes* (*Gongylidium*): Linyphiidae  
*rufithorax* (*Erigone*): *Trichopterna rufithorax*  
*rufithorax* (*Heliophanus*): Salticidae  
*rufithorax* (*Lophocarenum*): *Trichopterna rufithorax*  
*rufithorax* (*Ouedia*): *Trichopterna rufithorax*  
*rufithorax* (*Pelecopterna*): *Trichopterna rufithorax*  
*rufithorax* (*Trichopterna*): Linyphiidae  
*rufolineatum* (*Theridion*): *Anelosimus aulicus*  
*rufula* (*Singa*): *Singa aussereri*  
*rufulus* (*Araneus*): *Singa aussereri*  
*rufus* (*Macrargus*): Linyphiidae  
*rufus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*rufus* (*Tmeticus*): *Macrargus rufus*  
*rufus* [err.] (*Philodromus*): *Philodromus albidus*  
*Runcinia*: Thomisidae  
*rupicapra* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*rupicola* (*Acantholycosa*): Lycosidae  
*rupicola* (*Attus*): *Sitticus rupicola*  
*rupicola* (*Labulla*): *Louisfagea rupicola*  
*rupicola* (*Liocranum*): Liocranidae  
*rupicola* (*Louisfagea*): Linyphiidae  
*rupicola* (*Pardosa*): *Acantholycosa rupicola*  
*rupicola* (*Pimoa*): *Louisfagea rupicola*  
*rupicola* (*Sitticus*): Salticidae  
*rupicola* [err.] (*Acantholycosa*): *Acantholycosa pyrenaica*  
*rupicola* [err.] (*Pardosa*): *Acantholycosa pyrenaica*  
*rurestris* (*Agynera*): *Meioneta rurestris*  
*rurestris* (*Erigone*): *Meioneta rurestris*  
*rurestris* (*Erygona*): *Meioneta rurestris*  
*rurestris* (*Ischnyphantes*): *Meioneta rurestris*  
*rurestris* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*rurestris* (*Microneta*): *Meioneta rurestris*  
*ruricola* (*Lycosa*): *Trochosa ruricola*  
*ruricola* (*Trochosa*): Lycosidae  
*rusciniensis* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*rustica* (*Prosthesima*): *Zelotes rusticus*  
*rusticulus* (*Oonops*): *Oonops pulcher*  
*rusticum* (*Theridion*): *Theridion varians*  
*rusticus* (*Urozelotes*): *Zelotes rusticus*  
*rusticus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*rutilans* (*Liocranum*): Liocranidae
- S**  
*Saaristo*: Linyphiidae  
*sabina* (*Anyphaena*): Anyphaenidae  
*sabulosus* (*Psammittis*): *Xysticus sabulosus*  
*sabulosus* (*Psammittis*): *Xysticus sabulosus*  
*sabulosus* (*Thanatus*): Philodromidae  
*sabulosus* (*Thomisus*): *Xysticus sabulosus*  
*sabulosus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*saccigera* (*Lycosa*): *Pardosa monticola*  
*saeva* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*Saitis*: Salticidae  
*salinarum* (*Philodromus*): Philodromidae  
*Saloca*: Linyphiidae  
*salsicola* (*Attulus*): *Yllenus salsicola*  
*salsicola* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*salsicola* (*Yllenus*): Salticidae  
*saltans* (*Pardosa*): Lycosidae  
*saltator* (*Attulus*): *Sitticus saltator*  
*saltator* (*Attus*): *Sitticus saltator*  
*saltator* (*Sitticus*): Salticidae  
*Salticus*: Salticidae  
*saltuaria* (*Pardosa*): Lycosidae  
*saltuum* (*Abacoproeces*): Linyphiidae  
*sanctivincenti* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*sanctivincenti* (*Linyphia*): *Lepthyphantes sanctivincenti*  
*sanctivincenti* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes sanctivincenti*  
*sanctuaria* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*sanguinea* (*Hyposinga*): *Hypsosinga sanguinea*  
*sanguinea* (*Hyposinga*): Araneidae  
*sanguinea* (*Singa*): *Hypsosinga sanguinea*  
*sanguineus* (*Araneus*): *Hypsosinga sanguinea*  
*sanguineus* (*Singa*): *Hypsosinga sanguinea*  
*sanguinipes* (*Dysdera*): *Dysdera westringi*  
*sanguinolentus* (*Cnephalocotes*): *Nematogmus sanguinolentus*  
*sanguinolentus* (*Nematogmus*): Linyphiidae  
*sarcinatus* (*Notioscopus*): Linyphiidae  
*sarda* (*Prosthesima*): *Zelotes sardus*  
*sardus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*Satilatlas*: Linyphiidae  
*saturation* (*Pardosa*): Lycosidae  
*satyrus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*satyrus* (*Tmeticus*): *Centromerus satyrus*  
*sauvages* (*Cteniza*): Ctenizidae  
*Savignia*: Linyphiidae  
*savignyi* (*Heriaeus*): *Heriaeus hirtus*  
*saxatile* (*Theridion*): *Achaearanea riparia*  
*saxatilis* (*Aprolagus*): *Meioneta saxatilis*  
*saxatilis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*saxatilis* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*saxetorum* (*Caviphantes*): Linyphiidae  
*saxicola* (*Sitticus*): Salticidae



- saxicola* (*Tigellinus*): *Trichoncus saxicola*  
*saxicola* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*saxicola* [err.] (*Trichoncus*): *Trichoncus varipes*  
*scabra* (*Dictyna*): *Dictyna latens*  
*scabricula* (*Dysdera*): Dysderidae  
*scabricula* (*Erigone*): *Troxochrus scabriculus*  
*scabricula* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*scabriculus* (*Troxochrus*): Linyphiidae  
*scabripes* (*Crustulina*): Theridiidae  
*scabripes* (*Steatoda*): *Crustulina scabripes*  
*scabrosa* (*Ceratinella*): Linyphiidae  
*scalaris* (*Epeira*): *Araneus marmoreus*  
*scenica* (*Calliethera*): *Salticus scenicus*  
*scenica* (*Micaria*): *Micaria rossica*  
*scenicum* (*Epiblemum*): *Salticus scenicus*  
*scenicus* (*Callietherus*): *Salticus scenicus*  
*scenicus* (*Salticus*): Salticidae  
*schaufussi* (*Enoplognatha*): *Enoplognatha mordax*  
*schenkeli* (*Metopobactrus*): Linyphiidae  
*schineri* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*schmitzi* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*schusteri* (*Callilepis*): Gnaphosidae  
*schutzae* (*Menemerus*): Salticidae  
*Sciastes*: Linyphiidae  
*scintillans* (*Micaria*): *Micaria albovittata*  
*scitula* (*Calliethera*): *Salticus scitulus*  
*scitulus* (*Salticus*): Salticidae  
*sclopetaria* (*Epeira*): *Larinioides sclopetarius*  
*sclopetarius* (*Araneus*): *Larinioides sclopetarius*  
*sclopetarius* (*Larinioides*): Araneidae  
*scopiferum* (*Porrhomma*): *Porrhomma convexum*  
*scopiger* (*Tmeticus*): *Allomengea scopigera*  
*scopigera* (*Allomengea*): Linyphiidae  
*scopigera* (*Mengea*): *Allomengea scopigera*  
*scopolii* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*Scotargus*: Linyphiidae  
*scoticus* (*Robertus*): Theridiidae  
*Scotina*: Liocranidae  
*Scotinotylus*: Linyphiidae  
*Scotophaeus*: Gnaphosidae  
*scrofa* (*Trichonchus*): *Trichoncus scrofa*  
*scrofa* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*scurrilis* (*Acartauchenius*): Linyphiidae  
*scutulatus* (*Drassus*): *Scotophaeus scutulatus*  
*scutulatus* (*Herpyllus*): *Scotophaeus scutulatus*  
*scutulatus* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*Scytodes*: Scytodidae  
*secreta* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*sedilloti* (*Dictyna*): *Dictyna consecuta*  
*sedilloti* (*Dipoena*): Theridiidae  
*sedula* (*Euophrys*): Salticidae  
*sedulus* (*Attus*): *Euophrys sedula*  
*Segestria*: Segestriidae  
*segestriformis* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*segestriformis* (*Paracoelotes*): *Coelotes segestriformis*  
*segmentata* (*Meta*): Tetragnathidae  
*segmentata* (*Metellina*): *Meta segmentata*  
*segmentata* (*Zilla*): *Meta segmentata*  
*segmentata mengei* (*Meta*): *Meta mengei*  
*segmentatum* (*Liocranum*): Liocranidae  
*segrex* (*Prosthesima*): *Zelotes segrex*  
*segrex* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*seguerae* (*Titanoeca*): *Titanoeca sequerae*  
*seidelii* (*Harpactes*): *Harpactea lepida*  
*seidlitzii* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*Selamia*: Zodariidae  
*sellarius* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*semiater* (*Araneus*): *Singa semiatra*  
*semiater* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*semiatra* (*Singa*): Araneidae  
*semicarinatus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*semiglabrata* (*Euophrys*): Salticidae  
*semiglabrata* (*Phlegra*): *Euophrys semiglabrata*  
*semilimbatus* (*Menemerus*): Salticidae  
*seminiger* (*Aphantaulax*): *Aphantaulax trifasciata*  
*seminigra* (*Aphantaulax*): *Aphantaulax trifasciata*  
*semipullatus* (*Heliophanus*): *Heliophanus lineiventris*  
*semitinctum* (*Theridion*): Theridiidae  
*semivittatus* (*Sitticus*): *Sitticus zimmermanni*  
*senilis* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae  
*senoculata* (*Segestria*): Segestriidae  
*senoculata* (*Spermophora*): Pholcidae  
*sequerae* (*Nurscia*): *Titanoeca sequerae*  
*sequerae* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*serena* (*Harpactea*): Dysderidae  
*sericata* (*Dipoena*): Theridiidae  
*sericata* (*Euryopis*): *Dipoena sericata*  
*sericata* (*Lasaeola*): *Dipoena sericata*  
*sericatus* (*Araneus*): *Larinioides sclopetarius*  
*sericea* (*Epeira*): *Argiope lobata*  
*serotina* (*Prosthesima*): *Zelotes longipes*  
*serotinus* (*Zelotes*): *Zelotes longipes*  
*serrata* (*Erigone*): *Centromerus serratus*  
*serratipes* (*Maso*): *Satilatlas brittini*  
*serratus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*serratus* (*Tmeticus*): *Centromerus serratus*  
*serratus* [err.] (*Centromerus*): *Centromerus albidus*  
*servula* (*Erigone*): *Glyphesis servulus*  
*servulus* (*Glyphesis*): Linyphiidae  
*servulus* (*Minyriolus*): *Glyphesis servulus*  
*Setaphis*: Gnaphosidae  
*setiger* (*Heriaeus*): Thomisidae  
*setosa* (*Orchestina*): Oonopidae  
*setosus* (*Taranucnus*): Linyphiidae  
*severus* (*Drassodes*): *Haplodrassus severus*  
*severus* (*Drassus*): *Haplodrassus severus*  
*severus* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*sexpustula* (*Lathys*): *Lathys sexpustulata*  
*sexpustulata* (*Lathys*): Dictynidae  
*sexpustulata* (*Lethia*): *Lathys sexpustulata*  
*siedlitzii* (*Cheiracanthium*): *Cheiracanthium seidlitzii*  
*sierrae* (*Cyclosa*): Araneidae  
*signifer* (*Drassodes*): *Haplodrassus signifer*

- signifer* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*silva* (*Erigone*): *Mecopisthes silva*  
*silacea* (*Pythonissa*): *Berlandina cinerea*  
*silesiaca* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*Silometopus*: Linyphiidae  
*silus* (*Mecopisthes*): Linyphiidae  
*sylvaticus* (*Centromerus*): *Centromerus sylvaticus*  
*sylvaticus* (*Tmeticus*): *Centromerus sylvaticus*  
*silvestris* (*Drassodes*): *Haplodrassus silvestris*  
*silvestris* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*silvestris* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*silvestris* (*Zora*): Zoridae  
*silvicola* (*Cryphoeca*): Hahniidae  
*silvicola* (*Zelotes*): *Zelotes cyanescens*  
*simile* (*Simitidion*): *Theridion simile*  
*simile* (*Theridion*): Theridiidae  
*similipes* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*similis* (*Agelena*): *Agelena gracilens*  
*similis* (*Amaurobius*): Amaurobiidae  
*similis* (*Ciniflo*): *Amaurobius similis*  
*similis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*similis* (*Drassus*): *Haplodrassus severus*  
*similis* [femelle] (*Centromerus*): *Centromerus sellarius*  
*simoni* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*simoni* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*simoni* (*Leptodrassus*): Gnaphosidae  
*simoni* (*Lycosa*): *Alopecosa simoni*  
*simoni* (*Mansuphantes*): *Lepthyphantes simoni*  
*simoni* (*Nemesia*): Nemesiidae  
*simoni* (*Orchestina*): Oonopidae  
*simoni* (*Physocyclus*): *Psilochorus simoni*  
*simoni* (*Psilochorus*): Pholcidae  
*simoni* (*Salticus*): *Salticus unciger*  
*simoni* (*Spermophora*): Pholcidae  
*simoni* (*Spermophorides*): *Spermophora simoni*  
*simoni* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*simoni* (*Typhochrestus*): Linyphiidae  
*simoni* (*Zelotes*): *Zelotes reimoseri*  
*simoni* [err.] (*Zodariion*): *Zodariion gallicum*  
*simonii* (*Erigone*): *Nematogmus sanguinolentus*  
*simplex* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*simplex* (*Lathys*): Dictynidae  
*simplex* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*simplex* (*Scotolathys*): *Lathys simplex*  
*simplicitarsis* (*Aprolagus*): *Meioneta simplicitarsis*  
*simplicitarsis* (*Meioneta*): Linyphiidae  
*simplicitarsis* (*Microneta*): *Meioneta simplicitarsis*  
*simulans* (*Achaearanea*): Theridiidae  
*simulans* (*Theridion*): *Achaearanea simulans*  
*Singa*: Araneidae  
*Sintula*: Linyphiidae  
*sinus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*sinus* (*Tmeticus*): *Centromerus sinus*  
*sisyphium* (*Theridion*): Theridiidae  
*Sitticus*: Salticidae  
*Siwa*: Araneidae  
*sloani* (*Salticus*): *Philaeus chrysops*  
*smaragdula* (*Micaria*): *Micaria coarctata*  
*sociabilis* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*socialis* (*Drapetisca*): Linyphiidae  
*socialis* (*Linyphia*): *Drapetisca socialis*  
*solers* (*Epeira*): *Agalenatea redii*  
*solitarius* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*solitarius* [err.] (*Coelotes*): *Coelotes pabulator*  
*solitarius* (*Troglohyphantes*): Linyphiidae  
*sordidata* (*Pardosa*): Lycosidae  
*sordidus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*soriculata* (*Lycosa*): *Alopecosa alpicola*  
*soriculata* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*soror* (*Enyo*): *Zodariion soror*  
*soror* (*Epeira*): *Araneus diadematus*  
*soror* (*Zodariion*): Zodariidae  
*soror* [err.] (*Zodariion*): *Zodariion gallicum*  
*Sosticus*: Gnaphosidae  
*spadicea* (*Gnaphosa*): *Gnaphosa dolosa*  
*speciosa* (*Donacochara*): Linyphiidae  
*Spermophora*: Pholcidae  
*sphagnicola* (*Pardosa*): Lycosidae  
*spinifer* (*Thomisus*): *Thomisus citrinellus*  
*spiniger* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*spiniger* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes spiniger*  
*spinimana* (*Zora*): Zoridae  
*spinimana* (*Zoropsis*): Zoridae  
*spinimanus* (*Zora*): *Zora spinimana*  
*spinimanus* (*Zoropsis*): *Zoropsis spinimana*  
*spinipalpis* (*Lycosa*): *Trochosa spinipalpis*  
*spinipalpis* (*Trochosa*): Lycosidae  
*spinipes* (*Ariadna*): *Ariadna insidiatrix*  
*spinivulva* (*Epeira*): *Araneus angulatus*  
*spinosa* [err.] (*Acantholycosa*): *Acantholycosa rupicola*  
*spinosissima* (*Minosia*): Gnaphosidae  
*spinosissima* (*Pterotricha*): *Minosia spinosissima*  
*spinosissima* (*Pythonissa*): *Minosia spinosissima*  
*spinulosa* (*Micaria*): *Micaria albovittata*  
*spinulosum* (*Liocranum*): *Mesitelus tenuissimus*  
*splendidissima* (*Chrysothrix*): *Micaria dives*  
*splendidissima* (*Micariolepis*): *Micaria dives*  
*spongitaris* (*Olios*): *Olios argelasius*  
*spongitaris* (*Sparassus*): *Olios argelasius*  
*stagnatilis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*staintoni* (*Tmarus*): Thomisidae  
*stativa* (*Anacotyle*): *Ceratinopsis stativa*  
*stativa* (*Ceratinopsis*): Linyphiidae  
*stativa* (*Erigone*): *Ceratinopsis stativa*  
*stativum* (*Lophomma*): *Ceratinopsis stativa*  
*stativus* (*Styloctetor*): *Ceratinopsis stativa*  
*Steatoda*: Theridiidae  
*stellio* (*Tmarus*): Thomisidae  
*Stemonyphantes*: Linyphiidae  
*sticta* (*Crustulina*): Theridiidae  
*stigmatica* (*Clubiona*): *Clubiona genevensis*  
*stigmatisata* (*Lathys*): Dictynidae

*stigmosa* (*Arctosa*): Lycosidae  
*stigmosa* (*Lycosa*): *Arctosa stigmosa*  
*stigmosa* (*Trochosa*): *Arctosa stigmosa*  
*straminea* (*Erigone*): *Pelecopsis mediocris*  
*stramineum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis mediocris*  
*strandii* (*Macrargus*): *Scotargus pilosus*  
*striata* (*Agraecina*): Liocranidae  
*striata* (*Agroeca*): *Agraecina striata*  
*striata* (*Agroecina*): *Agraecina striata*  
*striata* (*Alopecosa*): *Alopecosa striatipes*  
*striata* (*Eugnatha*): *Tetragnatha striata*  
*striata* (*Liocranoeca*): *Agraecina striata*  
*striata* (*Lycosa*): *Alopecosa striatipes*  
*striata* (*Tetragnatha*): Tetragnathidae  
*striatipes* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*striatipes* (*Lycosa*): *Alopecosa striatipes*  
*striatipes* (*Xysticus*): Thomisidae  
*striatus* (*Icius*): *Icius hamatus*  
*striatus* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes pulcher*  
*striatus* (*Thanatus*): Philodromidae  
*striatus* [err.] (*Sitticus*): *Sitticus rivalis*  
*striatus hamatus* (*Icius*): *Icius hamatus*  
*strigillata* (*Pardosa*): *Pardosa tatarica*  
*striolatum* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*stroemi* (*Stroemiellus*): *Zygiella stroemi*  
*stroemi* (*Zilla*): *Zygiella stroemi*  
*stroemi* (*Zygiella*): Araneidae  
*sturmi* (*Araneus*): Araneidae  
*sturmi* (*Atea*): *Araneus sturmi*  
*sturmi* (*Epeira*): *Araneus sturmi*  
*sturmi v-notata* (*Araneus*): *Araneus v-notatus*  
*stygius* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*stygius* (*Palliduphantes*): *Lepthyphantes stygius*  
*stylifrons* (*Erigone*): *Walckenaeria stylifrons*  
*stylifrons* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*stylifrons* (*Wideria*): *Walckenaeria stylifrons*  
*Styloctetor*: Linyphiidae  
*suaveolens* (*Neottiura*): *Theridion suaveolens*  
*suaveolens* (*Theridion*): Theridiidae  
*suavis* (*Prothesima*): *Setaphis parvula*  
*suavis* (*Setaphis*): *Setaphis parvula*  
*subaequalis* (*Blaniargus*): *Micrargus subaequalis*  
*subaequalis* (*Micrargus*): Linyphiidae  
*subaequalis* (*Nothocyba*): *Micrargus subaequalis*  
*subalpinus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*subelevata* (*Erigonella*): Linyphiidae  
*subfusca* (*Neoscona*): Araneidae  
*subinermis* (*Icius*): Salticidae  
*subitanea* (*Aulacocyba*): *Microctenonyx subitaneus*  
*subitanea* (*Tapinocyba*): *Microctenonyx subitaneus*  
*subitaneus* (*Microctenonyx*): Linyphiidae  
*subnigra* (*Argenna*): Dictynidae  
*subopaca* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*subsquarrosa* (*Dysdera*): Dysderidae  
*subsultans* (*Clubiona*): Clubionidae  
*subsultans* (*Pellenes*): *Pellenes geniculatus*

*subterranea* (*Chorizomma*): *Chorizomma subterraneum*  
*subterranea* (*Melanophora*): *Zelotes subterraneus*  
*subterranea* (*Porrhomma*): *Porrhomma rosenhaueri*  
*subterranea* (*Prothesima*): *Zelotes subterraneus*  
*subterraneum* (*Chorizomma*): Dictynidae  
*subterraneum* (*Porrhomma*): *Porrhomma rosenhaueri*  
*subterraneus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*subtilis* (*Agyneta*): Linyphiidae  
*subtilis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*subtilis* (*Erigone*): *Agyneta subtilis*  
*subtilis* (*Microneta*): *Agyneta subtilis*  
*succinus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*succinus* (*Sintula*): *Centromerus succinus*  
*sulcatus* (*Troxochrus*): *Thyreosthenius parasiticus*  
*sulcifrons* (*Panamomops*): Linyphiidae  
*sulfurea* (*Euophrys*): *Euophrys sulphurea*  
*sulphurea* (*Euophrys*): Salticidae  
*sulzeri* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*sulzeri* (*Lycosa*): *Alopecosa sulzeri*  
*sundevalli* (*Erigone*): *Maso sundevalli*  
*sundevalli* (*Maso*): Linyphiidae  
*superstes* (*Savignia*): Linyphiidae  
*susannae* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis susannae*  
*susannae* (*Pelecopsis*): Linyphiidae  
*susplicax* (*Araneus*): *Larinioides folium*  
*susplicax* (*Larinioides*): *Larinioides folium*  
*Syedra*: Linyphiidae  
*sylvaticus* (*Centromerus*): Linyphiidae  
*sylvestris* (*Drassodes*): *Haplodrassus silvestris*  
*sylvicola* (*Cryphaeca*): *Cryphaeca silvicola*  
*sylvicola* (*Cryphaeca*): *Cryphaeca silvicola*  
*Synaema*: Thomisidae  
*Synageles*: Salticidae

## T

*taeniatus* (*Menemerus*): Salticidae  
*taeniifer* (*Harpactes*): *Dasumia taeniifera*  
*taeniifera* (*Dasumia*): Dysderidae  
*Talavera*: Salticidae  
*Tallusia*: Linyphiidae  
*talpina* (*Prothesima*): *Zelotes talpinus*  
*talpinus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*tantula* (*Prothesima*): *Zelotes nilicola*  
*tantulus* (*Ballus*): *Bianor tantulus*  
*tantulus* (*Bianor*): Salticidae  
*tantulus* (*Sibianor*): *Bianor tantulus*  
*tantulus* (*Zelotes*): *Zelotes nilicola*  
*Tapinesthis*: Oonopidae  
*Tapinocyba*: Linyphiidae  
*Tapinocyboides*: Linyphiidae  
*Tapinopa*: Linyphiidae  
*Taranucnus*: Linyphiidae  
*tarsalis* (*Lycosa*): *Pardosa palustris*  
*tarsalis* (*Pardosa*): *Pardosa palustris*  
*tarsalis* (*Prothesima*): *Zelotes caucasicus*  
*tatarica* (*Pardosa*): Lycosidae

- tecta* (*Enoplognatha*): *Enoplognatha caricis*  
*Tegenaria*: Agelenidae  
*Telema*: Telemidae  
*tenebricola* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*tenebricola* (*Linyphia*): *Lepthyphantes tenebricola*  
*tenebricola* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes tenebricola*  
*tenebricola* [err.] (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes tenuis*  
*tenella* (*Telema*): Telemidae  
*tenera* (*Calliethera*): *Salticus zebraneus*  
*tenerrimus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*tenerrimus* (*Leptodrassus*): *Leptodrassus simoni*  
*tenuimana* (*Erigone*): Linyphiidae  
*tenuimanus* (*Erigone*): *Erigone tenuimana*  
*tenuipalpis* (*Linyphia*): Linyphiidae  
*tenuipes* (*Harpassa*): *Rhode tenuipes*  
*tenuipes* (*Rhode*): Dysderidae  
*tenuis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*tenuis* (*Linyphia*): *Lepthyphantes tenuis*  
*tenuis* (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes tenuis*  
*tenuis* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*tenuispina* (*Silometopus*): *Silometopus tenuispinus*  
*tenuispinus* (*Silometopus*): Linyphiidae  
*tenuissimum* (*Liocranum*): *Mesiotelus tenuissimus*  
*tenuissimus* (*Mesiotelus*): Liocranidae  
*tenuitarsis* (*Pirata*): Lycosidae  
*tepidariorum* (*Achaearanea*): Theridiidae  
*tepidariorum* (*Theridion*): *Achaearanea tepidariorum*  
*terebratus* (*Attus*): *Sitticus terebratus*  
*terebratus* (*Sitticus*): Salticidae  
*terrestris* (*Amaurobius*): *Coelotes terrestris*  
*terrestris* (*Clubiona*): Clubionidae  
*terrestris* (*Coelotes*): Amaurobiidae  
*terrestris* (*Euophrys*): Salticidae  
*terricola* (*Alopecosa*): *Trochosa terricola*  
*terricola* (*Lycosa*): *Trochosa terricola*  
*terricola* (*Trochosa*): Lycosidae  
*tescorum* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae  
*testacea* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*testacea* (*Filistata*): *Filistata insidiatrix*  
*testaceomarginata* (*Dipoena*): Theridiidae  
*testaceomarginata* (*Lasaeola*): *Dipoena testaceomarginata*  
*testaceus* (*Cybaeodes*): Liocranidae  
*Tetragnatha*: Tetragnathidae  
*tetrica* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*tetrica* [err.] (*Gnaphosa*): *Gnaphosa muscorum*  
*tetricus* [err.] (*Cybaeus*): *Cybaeus angustiarum*  
*Textrix*: Agelenidae  
*Thanatus*: Philodromidae  
*Theonina*: Linyphiidae  
*Theonoe*: Theridiidae  
*theridioides* (*Episinus*): Theridiidae  
*theridioides* (*Plocamis*): *Episinus theridioides*  
*Theridion*: Theridiidae  
*Theridiosoma*: Theridiosomatidae  
*Theridula*: Theridiidae  
*thinophila* (*Wideria*): *Walckenaeria stylifrons*  
*thomisoides* (*Epeira*): *Nuctenea umbratica*  
*Thomisus*: Thomisidae  
*thoracata* (*Erigone*): *Pelecopsis radiculicola*  
*thoracatum* (*Brachycentrum*): *Pelecopsis radiculicola*  
*thoracatum* (*Lophocarenum*): *Pelecopsis radiculicola*  
*thoracica* (*Enoplognatha*): Theridiidae  
*thoracica* (*Labulla*): Linyphiidae  
*thoracica* (*Linyphia*): *Labulla thoracica*  
*thoracica* (*Scytodes*): Scytodidae  
*thoracica* (*Steatoda*): *Enoplognatha thoracica*  
*thorelli* (*Baryphyna*): *Trichopterna thorelli*  
*thorelli* (*Entelecara*): *Trichopterna thorelli*  
*thorelli* (*Leviellus*): *Zygiella thorelli*  
*thorelli* (*Trichopterna*): Linyphiidae  
*thorelli* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*thorelli* (*Zygiella*): Araneidae  
*Thyene*: Salticidae  
*Thyreosthenius*: Linyphiidae  
*thyrsiger* (*Prosoponcus*): *Diplocephalus foraminifer*  
*Tibellus*: Philodromidae  
*tibiale* (*Dicymbium*): Linyphiidae  
*tigrina* (*Gnaphosa*): Gnaphosidae  
*timida* (*Enyo*): *Zodarion timidum*  
*timidum* (*Zodarion*): Zadariidae  
*tincta* (*Keijia*): *Theridion tinctum*  
*tinctum* (*Theridion*): Theridiidae  
*tirolensis* (*Erigone*): Linyphiidae  
*Tiso*: Linyphiidae  
*Titanoeca*: Titanoeidae  
*Tnarus*: Thomisidae  
*Tmeticus*: Linyphiidae  
*todillus* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*todillus* (*Synageles*): *Synageles dalmaticus*  
*tomentosa* (*Lycosa*): *Arctosa villica*  
*torpida* (*Histopona*): Agelenidae  
*torpida* (*Tegenaria*): *Histopona torpida*  
*torrentum* (*Pardosa*): Lycosidae  
*tortuosus* (*Xysticus*): Thomisidae  
*torva* (*Dipoena*): Theridiidae  
*trabalis* (*Alopecosa*): Lycosidae  
*trabalis* (*Lycosa*): *Alopecosa trabalis*  
*trabalis* (*Tarentula*): *Alopecosa trabalis*  
*Trabea*: Lycosidae  
*trabucensis* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*Trachelas*: Corinnidae  
*Trachelocamptus*: Linyphiidae  
*tredecimguttatus* (*Latrodectus*): Theridiidae  
*Trematocephalus*: Linyphiidae  
*triangularis* (*Linyphia*): Linyphiidae  
*triangularis maura* (*Linyphia*): *Linyphia maura*  
*triangularis tenuipalpis* (*Linyphia*): *Linyphia tenuipalpis*  
*trianguliferum* (*Theridion*): *Steatoda triangulosa*  
*triangulosa* (*Steatoda*): Theridiidae  
*triangulosa* (*Teutana*): *Steatoda triangulosa*

*tribulosus* (*Heliophanus*): Salticidae  
*Trichoncoides*: Linyphiidae  
*Trichoncus*: Linyphiidae  
*Trichopterna*: Linyphiidae  
*tricuspidata* (*Misumena*): *Misumenops tricuspidatus*  
*tricuspidata* (*Misumenops*): *Misumenops tricuspidatus*  
*tricuspidatus* (*Misumenops*): Thomisidae  
*tridentina* (*Tegenaria*): Agelenidae  
*trifasciata* (*Aphantaulax*): Gnaphosidae  
*trifidus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*trifrons* (*Baryphyma*): Linyphiidae  
*trifrons* (*Entelecara*): *Baryphyma trifrons*  
*trifrons* (*Minyrioloides*): *Baryphyma trifrons*  
*triguttata* (*Atea*): *Araneus triguttatus*  
*triguttata* (*Epeira*): *Araneus triguttatus*  
*triguttata* (*Micaria*): Gnaphosidae  
*triguttatus* (*Araneus*): Araneidae  
*triguttatus* (*Atea*): *Araneus triguttatus*  
*trilobata* (*Eperigone*): Linyphiidae  
*trimaculatus* (*Aphantaulax*): *Aphantaulax trifasciata*  
*tripunctatus* (*Pellenes*): Salticidae  
*tristis* (*Cnephalocotes*): Linyphiidae  
*tristis* (*Dipoena*): Theridiidae  
*tristis* (*Lasaeola*): *Dipoena tristis*  
*tristis* (*Titanoeca*): Titanoecidae  
*trituberculata* (*Cyclosa*): *Cyclosa insulana*  
*trivialis* (*Clubiona*): Clubionidae  
*Trochosa*: Lycosidae  
*trogloodytes* (*Drassodes*): *Haplodrassus signifer*  
*trogloodytes* (*Drassus*): *Haplodrassus signifer*  
*trogloodytes* (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes pallidus*  
*Troglohyphantes*: Linyphiidae  
*Trogloneta*: Mysmenidae  
*Troxochrus*: Linyphiidae  
*truncatifrons* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*truncatifrons* (*Erigone*): *Entelecara truncatifrons*  
*truncatifrons* (*Stajus*): *Entelecara truncatifrons*  
*truncatus* (*Episinus*): Theridiidae  
*truncatus* (*Pistius*): Thomisidae  
*truncatus* (*Salticus*): Salticidae  
*truncorum* (*Robertus*): Theridiidae  
*truncorum* (*Sitticus*): *Sitticus pubescens*  
*trux* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*tuberculata* (*Ero*): Mimetidae  
*tuberculifera* (*Cyrtarachne*): *Cyrtarachne ixoides*  
*tuberculiferum* (*Cyrtarachne*): *Cyrtarachne ixoides*  
*tuberculiferum* (*Peltosoma*): *Cyrtarachne ixoides*  
*tuberosum* (*Gongylidium*): *Oedothorax gibbosus*  
*tuberosus* (*Oedothorax*): *Oedothorax gibbosus*  
*Tuberta*: Hahniidae  
*turbinata* (*Entelecara*): Linyphiidae  
*Turinyphia*: Linyphiidae  
*turriger* (*Erigonoplus*): Linyphiidae  
*turrigera* (*Erigone*): *Erigonoplus turriger*  
*turrigera* (*Trichopterna*): *Erigonoplus turriger*  
*Typhochrestus*: Linyphiidae

*typhon* (*Drassus*): *Haplodrassus macellinus*  
*tyrolensis* (*Salticus*): *Myrmarachne formicaria*

## U

*uliginosus* (*Pirata*): Lycosidae  
*ullrichi* (*Araneus*): *Gibbaranea ullrichi*  
*ullrichi* (*Epeira*): *Gibbaranea ullrichi*  
*ullrichi* (*Gibbaranea*): Araneidae  
*ulmi* (*Thomisus*): *Xysticus ulmi*  
*ulmi* (*Xysticus*): Thomisidae  
*Uloborus*: Uloboridae  
*umbilicatus* (*Robertus*): *Robertus mazaurici*  
*umbraculorum* (*Ozyptila*): Thomisidae  
*umbratica* (*Achaeearanea*): *Achaeearanea ohlerti*  
*umbratica* (*Epeira*): *Nuctenea umbratica*  
*umbratica* (*Nuctenea*): Araneidae  
*umbraticola* (*Epeira*): *Nuctenea umbratica*  
*umbraticum* (*Theridion*): *Achaeearanea ohlerti*  
*umbraticus* (*Araneus*): *Nuctenea umbratica*  
*umbratilis* (*Dipoena*): Theridiidae  
*umbratilis* (*Drassodes*): *Haplodrassus umbratilis*  
*umbratilis* (*Haplodrassus*): Gnaphosidae  
*umbratilis* (*Lasaeola*): *Dipoena umbratilis*  
*uncata* (*Hilaira*): *Drepanotylus uncatatus*  
*uncatus* (*Drepanotylus*): Linyphiidae  
*unciger* (*Holissus*): Dysderidae  
*unciger* (*Salticus*): Salticidae  
*uncinata* (*Dictyna*): Dictynidae  
*uncinata* (*Neottiura*): *Theridion uncinatum*  
*uncinatum* (*Theridion*): Theridiidae  
*unicolor* (*Ceto*): *Ceto lateceps*  
*unicornis* (*Cornicularia*): *Walckenaeria unicornis*  
*unicornis* (*Erigone*): *Walckenaeria unicornis*  
*unicornis* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*univittatus* (*Attulus*): *Yllenus univittatus*  
*univittatus* (*Pseudomogrus*): *Yllenus univittatus*  
*univittatus* (*Yllenus*): Salticidae  
*urbana* (*Tegenaria*): *Tegenaria pagana*  
*Uroctea*: Oecobiidae  
*ursus* (*Thanatus*): *Thanatus striatus*

## V

*v-insignita* (*Phlegra*): *Aelurillus v-insignitus*  
*v-insignitus* (*Aelurillus*): Salticidae  
*v-insignitus* (*Aelurops*): *Aelurillus v-insignitus*  
*v-notatus* (*Araneus*): Araneidae  
*vafra* (*Euophrys*): Salticidae  
*vafra* (*Pseudeuophrys*): *Euophrys vafra*  
*vagans* (*Erigone*): Linyphiidae  
*vagans* (*Erigonia*): *Erigone vagans*  
*vagans* (*Erygona*): *Erigone vagans*  
*vagans* (*Gongylidium*): *Erigone vagans*  
*vagans* (*Prinerigone*): *Erigone vagans*  
*vagans* (*Tiso*): Linyphiidae  
*vaginata* (*Oreonetides*): *Oreonetides vaginatus*  
*vaginatus* (*Oreonetides*): Linyphiidae  
*vaginatus* (*Saaristoa*): *Oreonetides vaginatus*

*vagulus* (*Philodromus*): Philodromidae  
*valentulus* (*Neon*): Salticidae  
*validior* (*Drassodes*): *Drassodes hispanus*  
*validus* (*Herpyllus*): *Scotophaeus validus*  
*validus* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*vandeli* [femelle] (*Micaria*): *Micaria aenea*  
*vandeli* [mâle] (*Micaria*): *Micaria pulcra*  
*vaporariorum* (*Araeoncus*): Linyphiidae  
*vaporariorum* (*Erigone*): *Araeoncus vaporariorum*  
*variabilis* (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
*variabilis* (*Mughiphantes*): *Lepthyphantes variabilis*  
*variana* (*Arctosa*): Lycosidae  
*variana* (*Lycosa*): *Arctosa variana*  
*variana* (*Poecilochroa*): Gnaphosidae  
*varians* (*Theridion*): Theridiidae  
*variegata* (*Ero*): *Ero furcata*  
*variegata* (*Poeciloneta*): Linyphiidae  
*variegatus* (*Ballus*): Salticidae  
*variegatus* (*Bathyphantes*): *Poeciloneta variegata*  
*varipes* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*vasconicus* (*Trichoncus*): Linyphiidae  
*vasconicus hackmani* (*Trichoncus*): *Trichoncus hackmani*  
*vaticus* (*Misumena*): Thomisidae  
*vaticus* (*Thomisus*): *Misumena vaticus*  
*vegeta* (*Clubiona*): Clubionidae  
*velutina* (*Scytodes*): Scytodidae  
*venator* (*Attus*): *Synageles venator*  
*venator* (*Synageles*): Salticidae  
*venatrix* (*Pardosa*): *Wadicosa fidelis*  
*ventosa* (*Tapinocyba*): Linyphiidae  
*vernalis* (*Prothesima*): *Zelotes pumilus*  
*versicolor* (*Bassaniana*): *Coriarachne versicolor*  
*versicolor* (*Coriarachne*): Thomisidae  
*versuta* (*Steatoda*): *Steatoda grossa*  
*verticalis* (*Erigone*): *Metopobacterius verticalis*  
*verticalis* (*Metopobacterius*): Linyphiidae  
*vespertina* (*Melanophora*): *Zelotes vespertinus*  
*vespertina* [err.] (*Prothesima*): *Zelotes thorelli*  
*vespertinus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*vestita* (*Filistata*): *Pritha nana*  
*Vesubia*: Lycosidae  
*viaria* (*Microneta*): Linyphiidae  
*viator* (*Drassus*): *Scotophaeus validus*  
*viator* (*Scotophaeus*): *Scotophaeus validus*  
*vicarius* (*Drassus*): *Haplodrassus macellinus*  
*vicina* (*Brigittea*): *Dictyna vicina*  
*vicina* (*Dictyna*): Dictynidae  
*vidua* (*Allomengea*): Linyphiidae  
*vigilax* (*Cornicularia*): *Walckenaeria vigilax*  
*vigilax* (*Erigone*): *Walckenaeria vigilax*  
*vigilax* (*Walckenaeria*): Linyphiidae  
*vignai* (*Cybaeus*): Cybaeidae  
*villica* (*Arctosa*): Lycosidae  
*villica* (*Leaena*): *Arctosa villica*  
*villica* (*Lycosa*): *Arctosa villica*  
*villica* (*Prothesima*): *Zelotes villicus*

*villicus* (*Drassyllus*): *Zelotes villicus*  
*villicus* (*Zelotes*): Gnaphosidae  
*villosus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*villosus* (*Drassus*): *Drassodes villosus*  
*villosus* (*Thomisus*): *Heriaeus hirtus*  
*vinosa* (*Parasyrisca*): *Drassodes vinosus*  
*vinosus* (*Drassodes*): Gnaphosidae  
*vinosus* (*Drassus*): *Drassodes vinosus*  
*virescens* (*Cheiracanthium*): Clubionidae  
*virescens* (*Micrommata*): Sparassidae  
*virescens* (*Sparassus*): *Micrommata virescens*  
*viriatum* (*Heliophanus*): *Heliophanus melinus*  
*viridissima* (*Dictyna*): *Nigma viridissima*  
*viridissima* (*Nigma*): Dictynidae  
*vittata* (*Leptoneta*): Leptonetidae  
*vittata* (*Pardosa*): Lycosidae  
*vittatum* (*Theridion*): *Anelosimus vittatus*  
*vittatus* (*Anelosimus*): Theridiidae  
*vittiger* (*Bathyphantes*): Linyphiidae  
*viva* (*Erigone*): *Gongylidiellum vivum*  
*vivum* (*Gongylidiellum*): Linyphiidae  
*vivum* [err.] (*Gongylidiellum*): *Tapinocyba insecta*  
*vlijmi* (*Pardosa*): Lycosidae  
*vulgaris* (*Thanatus*): Philodromidae  
*vulgaris atratus* (*Thanatus*): *Thanatus atratus*

## W

*Wadicosa*: Lycosidae  
*wagleri* (*Pardosa*): Lycosidae  
*wagleri saturator* (*Pardosa*): *Pardosa saturator*  
*walckenaeri* (*Nigma*): *Nigma viridissima*  
*Walckenaeria*: Linyphiidae  
*walckenaerius* (*Uloborus*): Uloboridae  
*warburtoni* (*Allomengea*): *Allomengea vidua*  
*warburtoni* (*Mengea*): *Allomengea vidua*  
*welchi* (*Erigone*): Linyphiidae  
*westringi* (*Dysdera*): Dysderidae  
*westringi* (*Erigone*): *Maso sundevalli*  
*westringi* (*Maso*): *Maso sundevalli*  
*westringi* (*Scotophaeus*): Gnaphosidae  
*westringi* [err.] (*Dysdera*): *Dysdera lata*  
*wideri* (*Ceratinella*): Linyphiidae  
*wiehlei* (*Theridion*): Theridiidae

## X-Y-Z

*x-notata* (*Zilla*): *Zygiella x-notata*  
*x-notata* (*Zygiella*): Araneidae  
*x-notatus* (*Araneus*): *Zygiella x-notata*  
*xanthogramma* (*Carrhotus*): Salticidae  
*Xerolycosa*: Lycosidae  
*Xysticus*: Thomisidae  
*Yllenus*: Salticidae  
*zebranea* (*Calliethera*): *Salticus zebraneus*  
*zebraneus* (*Salticus*): Salticidae  
*zebrinus* [err.] (*Lepthyphantes*): *Lepthyphantes zim-mermanni*  
*Zelotes*: Gnaphosidae

Zilla: Araneidae  
 zimmermanni (*Euryopsis*): *Euryopsis laeta*  
 zimmermanni (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
 zimmermanni (*Sitticus*): Salticidae  
 zimmermanni (*Tenuiphantes*): *Lepthyphantes zimmermanni*  
 Zodarion: Zodariidae  
 zonatus (*Bolyphantes*): *Lepthyphantes zonatus*  
 zonatus (*Lepthyphantes*): Linyphiidae  
 Zora: Zoridae  
 Zoropsis: Zoridae  
 Zygiella: Araneidae

## Bibliographie

Les documents contenant des données sur la répartition des araignées en France sont précédés d'un astérisque (\*).

Le nombre d'espèces citées de France (avec des données inédites) dans chacun de ces documents est indiqué entre crochets. Si une seule espèce est citée, son nom est indiqué.

- \* Anonyme, 1992. — [note sur une capture d'*Atypus affinis* dans la Côte-d'Or]. — *Bulletin trimestriel de la Société d'histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun*. **141**: p. 41. [*Atypus affinis*].
- \* ALDERWEIRELDT, M., 2001. — Does *Sitticus striatus* Emerton, 1911 occur in Europe? Discovery of the first male. — *Newsletter of the British Arachnological Society*. **90**: p. 6. [*Sitticus striatus*].
- \* ALICATA, P. & CANTARELLA, T., 1987. — The genus *Ballus*: a revision of the european taxa described by Simon together with observations on the other species of the genus. — *Animalia*. **14** (13): 35-63. [2 esp.].
- \* AMANIEU & CAZAUX, 1963. — Nouveaux animaux observés dans la région d'Arcachon en 1962-1963. — *Procès-verbaux de la Société linnéenne de Bordeaux*. **100**: 163-173. [2 esp.].
- \* ASSELIN, A. & BAUDRY, J., 1989. — Les aranéides dans un espace agricole en mutation. — *Acta Oecologica*. **10** (2): 143-156. [91 esp.].
- \* ASSELIN, A., 1990. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. V. Linyphiinae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. **1**: 91-122. [56 esp.].
- AZARKINA, G., 2004. — New and poorly known Palaearctic species of the genus *Phlegra* Simon, 1876 (Araneae, Salticidae). — *Revue Arachnologique*. **14** (6): 73-108.
- \* BALAZUC, J. & DRESCO, E., 1952. — Araignées et opilions des grottes de l'Ardèche. — *Notes biospéologiques*. **7**: 83-91. [22 esp.].
- \* BALAZUC, J., MIRÉ, P. DE & SIGWALT, J., 1954. — Sixième, septième et huitième campagnes biospéologiques dans le Vivarais (août 1951, mai 1952, mai 1953). — *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*. **23** (6): 172-176. [7 esp.].
- BARRIENTOS, J.A. & RIBERA, C., 1988. — Algunas reflexiones sobre las especies del grupo *atrica*, en la Península Ibérica (Araneae, Agelenidae, Tegenaria). — *Revue Arachnologique*. **7** (4): 141-162.
- \* BAUDOIN, 1946. — Contribution à l'éthologie des Arthropodes de la zone intercodidale. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **71** (2): 109-113. [*Halorates reprobus*].
- \* BEAUCOURNU, J.-C. & MATILE, L., 1963a. — Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. 1. — *Annales de Spéléologie*. **18** (1): 117-135. [11 esp.].
- \* BEAUCOURNU, J.-C. & MATILE, L., 1963b. — Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. 2. — *Annales de Spéléologie*. **18** (3): 343-357. [13 esp.].
- \* BEAUCOURNU, J.-C. & MATILE, L., 1963c. — Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. 3. — *Annales de Spéléologie*. **18** (4): 519-531. [24 esp.].
- \* BECKER, L., 1879a. — Communications arachnologiques. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **22**, CR: XCV-XCVII. [8 esp.].
- \* BECKER, L., 1879b. — Communications arachnologiques. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **22**, CR: CLXIX-CLXXIV. [2 esp.].
- \* BECKER, L., 1880. — Communications arachnologiques. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **23**, CR: CXXXIX-CXLII. [95 esp.].
- \* BECKER, L., 1881. — Communications arachnologiques. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **25**, CR: XXVI-XXVIII. [51 esp.].
- \* BECKER, L., 1882. — Communications arachnologiques. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **26**, CR: XXXIV-XXXIX. [105 esp.].
- \* BELIN, A., 2001. — Inventaire des araignées (Arachnida, Araneae) de la Réserve naturelle du Marais d'Yves en Charente-Maritime (France). — *Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime*. **9** (1): 119-123. [99 esp.].
- \* BERENGER-LEVEQUE, P. & ROLLARD, C., 1994. — Les Arachnides d'une propriété urbaine. — *Actes du Muséum de Rouen*. **1994** (3): 41-67. [56 esp.].
- \* BERLAND, L., 1911. — Sur deux araignées recueillies à la Sorbonne: *Physocylus simoni* n.sp. et *Macrargus denticelis*. — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. (5) **6**: CX-CXV. [2 esp.].
- \* BERLAND, L., 1922. — Contribution à l'étude de la biologie des Arachnides (1<sup>er</sup> mémoire). — *Annales de la Société entomologique de France*. **91**: 193-208. [7 esp.].
- \* BERLAND, L., 1924. — Les araignées de Tatihou (Manche). — *Annales des sciences naturelles, zoologie*. (10) **7**: 335-336. [44 esp.].
- \* BERLAND, L., 1926. — Capture de quelques araignées rares en Provence. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1926** (17): 175-178. [6 esp.].
- \* BERLAND, L., 1928. — Arachnides des grottes de Recluses. — *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*. **1928**, 2-3: 145-146. [4 esp.].

- \* BERLAND, L., 1929. — Limites des zones méditerranéenne et sub-alpines dans l'est du département du Var. — *Compte Rendu Sommaire des séances de la Société de Biogéographie*. 6<sup>ème</sup> année, **45**: 23-26. [2 esp.].
- \* BERLAND, L., 1930. — Sur le *Latrodectus* 13-guttatus. — *Annales de la Société entomologique de France*. **99**: p. 4. [*Latrodectus tredecimguttatus*].
- \* BERLAND, L., 1931. — Remarques sur deux araignées de France. — *Annales de la Société entomologique de France*. **100**: 21-22. [2 esp.].
- \* BERLAND, L., 1933. — Sur quelques araignées trouvées dans les maisons à Versailles. — *Bulletin de la Société de sciences naturelles de Seine-et-Oise*. (3) **1** (1-2): 68-70. [3 esp.].
- \* BERLAND, L., 1935. — Araignées du col de la Cayolle. — *Revue française d'entomologie*. **2** (1): p. 28. [11 esp.].
- \* BERLAND, L., 1937. — Araignées du col de l'Iseran (Alpes de Savoie). — *Revue française d'entomologie*. **4** (3): 182-183. [20 esp.].
- \* BIGOT, L., 1957. — Un micromilieu important de Camargue: les coquilles vides de Mollusques. — *La Terre et la Vie*. **2-3**: 211-230. [24 esp.].
- \* BIGOT, L., 1965. — Essai d'écologie quantitative sur les invertébrés de la sansouire camarguaise. — *Mémoires de la Société zoologique de France*. **34**: 3-100. [56 esp.].
- \* BIGOT, L., 1977. — Contribution à la connaissance des zoocoénoses ripicoles de surface en Corse. — *Ecologia Mediterranea*. **3**: 5-12. [4 esp.].
- \* BIGOT, L., 1983. — Contribution à l'étude des peuplements des Invertébrés de milieux extrêmes. La plage et les dunes vives des côtes françaises. *Publication du ministère de l'Environnement et du cadre de vie*, Paris: 246 p. [12 esp.].
- \* BIGOT, L., 1993. — Effets d'embruns pollués par des tensioactifs sur le peuplement frondicole du taillis littoral à *Quercus ilex* dans l'île de Port-Cros (Var, France). — *Scientific Report of the Port-Cros national Park*. **15**: 219-231. [27 esp.].
- \* BIGOT, L. & BODOT, P., 1973. — Contribution à l'étude biocoenotique de la garrigue à *Quercus coccifera*. I. Étude descriptive de l'habitat et de la faune des Invertébrés inventoriés. — *Vie et Milieu*. **23** (1): 15-43. [56 esp.].
- \* BIGOT, L., LEGIER, P. & MUSSO, J.-J., 1977. — Les biocénoses des substrats meubles d'un haut de plage (Camargue). — *Ecologia Mediterranea*. **3**: 13-31. [3 esp.].
- \* BIGOT, L. & GUILLAUMONT, F., 1979. — Sur les communautés d'arthropodes et leurs rapports avec la végétation dans l'île de Porquerolles (Var). — *Travaux scientifiques du Parc National de Port-Cros*. **5**: 59-77. [14 esp.].
- \* BIGOT, L. & GAUTIER, G., 1981. — Originalité et intérêt écologique de la communauté ripicole et pélophile de surface. — *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de Marseille*. **41**: 13-30. [4 esp.].
- \* BIGOT, L. & GAUTIER, G., 1982a. — La communauté des Arthropodes des rives de l'Ouvèze (Vaucluse). — *Ecologia Mediterranea*. **8** (4): 11-36. [9 esp.].
- \* BIGOT, L., PICARD, J. & ROMAN, M.L., 1982b. — Contribution à l'étude des peuplements des Invertébrés des milieux extrêmes. 1. La plage et les dunes vives de l'Espiguette (Grau-du-Roi, Gard). — *Ecologia Mediterranea*. **8** (3): 3-29. [*Arctosa perita*].
- \* BIGOT, L., CHEMSEDDINE, M. & DELYE, G., 1983. — Contribution à la connaissance de la structure et de la dynamique de la communauté des arthropodes terrestres de la plaine désertifiée (ou coussou) de la Crau (Bouches du Rhône). — *Biologie-écologie méditerranéenne*. **10** (1-2): 119-144. [30 esp.].
- \* BIGOT, L. & FAVET, C., 1985. — La communauté ripicole des araignées de la Basse Durance. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **37**: 53-67. [7 esp.].
- \* BIGOT, L. & KABAKIBI, M., 1987a. — Évolution spatio-temporelle de la composition et de la structure du peuplement frondicole sur chêne-liège dans le Massif des Maures (Var). — *Bulletin d'écologie*. **18** (3): 157-168. [46 esp.].
- \* BIGOT, L., KABAKIBI, M. & LOISEL, R., 1987b. — Effet spécifique immédiat du débroussaillage sur le peuplement des arthropodes frondicoles d'une chênaie à chêne-liège des Maures (Var). — *Ecologia Mediterranea*. **13** (12): 23-28. [22 esp.].
- \* BIGOT, L., KABAKIBI, M. & LOISEL, R., 1988. — Effets différés du débroussaillage sur le peuplement frondicole des arthropodes du chêne-liège des Maures (Var). — *Ecologia Mediterranea*. **14** (12): 33-39. [26 esp.].
- \* BIRAT, J.-M. & ROCANIÈRE, C., 2001. — Observations sur *Atypus affinis* Eichwald, 1830 en région Lorraine. — *Arachnides*. **51**: 1-2. [*Atypus affinis*].
- \* BLICK, T., 1991. — Bathyphantes eumenis, neu für Deutschland und Frankreich, sowie Lepthyphantes notabilis aus Blockhalden (Araneae: Linyphiidae). — *Arachnologische Mitteilungen*. **2**: 31-32. [2 esp.].
- \* BLICK, T., 2000. — Inventaire des araignées en Petite Camargue Alsacienne. — *Annales Scientifiques de la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne*. **1996-2000**: 37-40. [210 esp.].
- BLICK, T., HÄNGGI, A. & THALER, K., 2002. — Checklist of the arachnids of Germany, Switzerland, Austria, Belgium and the Netherlands (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi). Version 2002 June 1. *Internet*: [http://www.AraGes.de\\_e.html](http://www.AraGes.de_e.html).
- \* BONARIC, J.-C., 1974. — Notes sur une araignée myrécômimétique du genre *Phrurolithus* (Araneae, Clubionidae). — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **99** (4): 637-643. [2 esp.].
- \* BONARIC, J.-C., 1985. — Le cycle vital de l'araignée *Pisaura mirabilis* et ses adaptations climatiques. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **110** (3): 269-274. [*Pisaura mirabilis*].
- \* BONARIC, J.-C., 1987. — Le cycle vital de l'araignée *Pisaura mirabilis* et ses adaptations au climat. — *Revue Arachnologique*. **7** (2): 71-77. [*Pisaura mirabilis*].
- \* BONNET, P., 1925. — Sur la présence de *Dolomedes fimbriatus* à Toulouse et de *Dolomedes limbatus* au lac de Lourdes (Hautes Pyrénées). — *Bulletin de la*



- Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **53**: 92-94. [3 esp.].
- \* BONNET, P., 1931. — Souillures occasionnées par la *Dictyna civica* sur un monument à Toulouse. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **61**: 361-362. [*Dictyna civica*].
- \* BONNET, P., 1932. — Notes sur *Eresus niger* et *Philaeus chrysoops* (Aranéides). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **64**: 175-178. [2 esp.].
- \* BONNET, P., 1939. — Élevage de *Filistata insidiatrix*. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **73**: 167-188. [*Filistata insidiatrix*].
- BONNET, P., 1945. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 1: 832 p.
- BONNET, P., 1955. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 2 (1): 1-918.
- BONNET, P., 1956. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 2 (2): 919-1926.
- BONNET, P., 1957. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 2 (3): 1927-3026.
- BONNET, P., 1958. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 2 (4): 3027-4230.
- BONNET, P., 1959. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 2 (5): 4231-5058.
- BONNET, P., 1961. — Bibliographia Araneorum. *Imp. Douladoure, Toulouse*. 3: 591 p.
- \* BONTE, D., 2000. — Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar de Boulonnais (Noord-Frankrijk). — *Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging*. **14** (2-3): 41-47. [67 esp.].
- \* BOSMANS, R., 1994. — Revision of the genus *Zodariion* Walckenaer, 1833 in the Iberian Peninsula and Balearic Islands (Araneae, Zodariidae). — *Eos*. **69**: 115-142. [3 esp.].
- \* BOSMANS, R., 1995. — Description de *Bordea*, nouveau genre endémique d'araignées des Pyrénées (Araneae: Linyphiidae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (4) **17** (1-2): 87-94. [*Bordea cavicola*].
- \* BOSMANS, R., 1997. — Revision of the genus *Zodariion* Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **10** (8): 265-294. [10 esp.].
- \* BOSMANS, R. & DEKEER, R., 1985a. — Catalogue des Araignées des Pyrénées. — *Document de travail de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique*. **23**: 1-68. [336 esp.].
- \* BOSMANS, R. & JACOBS, J., 1985b. — Description of the unknown male of *Xysticus ovatus* Simon from the French Pyrénées (Araneae: Thomisidae). — *Phegea*. **13** (4): 121-124. [*Xysticus ovatus*].
- \* BOSMANS, R., MAELFAIT, J.-P. & DE KIMPE, A., 1986. — Analysis of the spider communities in an altitudinal gradient in the French and Spanish Pyrénées. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **7** (3): 69-76. [130 esp.].
- \* BOSMANS, R. & DEKEER, R., 1987. — Quelques considérations biogéographiques sur les Araignées des Pyrénées (Arachnida: Araneae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **123**: 7-18. [89 esp.].
- \* BOSMANS, R., VANUYTVEN, H. & VAN KEER, J., 1994. — On two poorly known Theridion species, recently collected in Belgium for the first time (Araneae: Theridiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **9** (7): 236-240. [2 esp.].
- \* BOSMANS, R. & VAN KEER, J., 1999. — The genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 in the Mediterranean region (Araneae: Theridiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **11** (6): 209-241. [10 esp.].
- \* BOSMANS, R. & BLICK, T., 2000. — Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* in the West-palaearctic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae: Gnaphosidae). — *Memorie della Società entomologica italiana*. **78** (2): 443-476. [9 esp.].
- \* BOSMANS, R. & CASTRO, A. DE, 2002. — Dos arañas nuevas para España (Araneae: Theridiidae, Salticidae). — *Revista Ibérica de Aracnología*. **5**: 51-53. [*Neon robustus*].
- \* BOULLARD, M., 1980. — Une Araignée pourvue de deux 'pattes-botes'. — *L'Entomologiste*. **36** (6): 268-269. [*Pisaura mirabilis*].
- \* BOUMEZZOUGH, A. & MUSSO, J.-J., 1983. — Étude des communautés animales ripicoles du bassin de la rivière Aille (Var, France). — *Ecologia Mediterranea*. **9** (1): 31-56. [7 esp.].
- \* BOURNE, J.-D., 1974. — Un arachnide intéressant de la grotte de Verel de Montbel (Savoie). — *Hypogées*. **33**: 1-2. [*Meta menardi*].
- \* BOURNE, J.-D., 1977. — Contribution à l'étude du genre *Porrhomma* (Araneae, Linyphiidae). Caractères morphologiques, biométrie et écologie au niveau des populations de *P. convexum* (Westring) et *P. myops* (Simon). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **50**: 153-165. [2 esp.].
- \* BOURNE, J.-D., 1978. — Observations on the sexual behaviour of *Porrhomma egeria* Simon (Araneae: Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **4** (5): 221-225. [*Porrhomma egeria*].
- \* BRAUD, S., HERVÉ, C. & LEDOUX, J.-C., 2004. — De araneis Galliae I.4, *Gnaphosa opaca* Herman. — *Revue Arachnologique*. **15** (2): p. 19. [*Gnaphosa opaca*].
- \* BRAUD, S. & GABORY, O., 2005. — 300 espèces d'araignées dans 50 ha du bocage des Mauges, un aperçu de la diversité arachnologique angevine. — *Anjou Nature*. **1**: 73-81. [300 esp.].
- \* BRIGNOLI, P.M., 1971. — Beitrag zur Kenntnis der Mediterranen Pholcidae (Arachnida, Araneae). — *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin*. **47** (2): 255-267. [2 esp.].
- \* BRIGNOLI, P.M., 1974. — Ragni d'Italia XXI. Settimo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli di Sardegna e descrizione di una nuova specie di Corsica (Araneae). — *Revue suisse de zoologie*. **81**: 387-395. [*Tegenaria soriculata*].
- BRIGNOLI, P.M., 1975. — Ragni d'Italia. XXIII. Nuovi dati su alcune Haplogynae. — *Bollettino della Società entomologica italiana*. **107**: 170-178.
- \* BRIGNOLI, P.M., 1976. — Beiträge zur Kenntnis der Scytodidae (Araneae). — *Revue suisse de zoologie*. **83**: 125-191. [*Scytodes velutina*].

- \* BRIGNOLI, P.M., 1978. — Quelques notes sur les Agelenidae, Hahniidae, Oxyopidae et Pisauridae de France et d'Espagne (Araneae). — *Revue suisse de zoologie*. **85** (2): 265-294. [16 esp.].
- \* BRIGNOLI, P.M., 1979a. — Sur quelques araignées cavernicoles des Alpes maritimes françaises et italiennes (Araneae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **115**: 316-322. [7 esp.].
- \* BRIGNOLI, P.M., 1979b. — Sur quelques Dysderidae de France, d'Espagne et de Tunisie (Araneae). — *Vie et Milieu*. **28-29** (1 C): 111-116. [*Harpactea haymozi*].
- \* BRIGNOLI, P.M., 1982a. — Contribution à la connaissance des Filistatidae paléarctiques (Araneae). — *Revue Arachnologique*. **4** (1-4): 65-75. [*Filistata insidiatrix*].
- BRIGNOLI, P.M., 1982b. — On a few spiders from China (Araneae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **5** (8): 344-351.
- BRIGNOLI, P.M., 1983. — A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981. *Manchester*: 755 p.
- \* BRIGNOLI, P.M., 1984. — Zur Problematik der mediterranen Pisaura-Arten (Arachnida, Araneae, Pisauridae). — *Zoologischer Anzeiger*. **213**: 33-43. [2 esp.].
- \* BRISTOWE, W.S., 1928. — Inhabitants of Processionary Caterpillar nests. — *The Entomologist's Monthly Magazine*. **64**: p. 31. [*Clubiona genevensis*].
- BUCHAR, J., 1966. — Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). — *Vestník Československé společnosti zoologické*. **30**: 210-218.
- \* BUCHAR, J. & THALER, K., 1993. — Die Arten der Gattung *Acantholycosa* in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). — *Revue suisse de zoologie*. **100**: 327-341. [2 esp.].
- \* BUCHLI, H., 1962. — Note préliminaire sur l'accouplement des araignées mygalomorphes *Nemesia caementaria*, *Nemesia dubia* et *Pachylomerus piceus* (Ctenizidae). — *Vie et Milieu*. **13**: 167-178. [2 esp.].
- \* BUCHLI, H., 1965. — La conquête de terriers de mygales maçonnes par *Haplodrassus signifer* Koch araignée Gnaphoside. — *Vie et Milieu*. (C) **26**: 593-598. [2 esp.].
- \* BUCHLI, H., 1969. — Hunting behavior in the Ctenizidae. — *American Zoologist*. **9**: 175-193. [*Nemesia caementaria*].
- \* BUCHLI, H., 1970. — Notes sur le cycle de reproduction, la ponte et le développement post-embryonnaire de *Nemesia caementaria* Latr. (Ctenizidae, Mygalomorphae). — *Revue d'écologie et de biologie du sol*. **7** (1): 95-143. [2 esp.].
- \* CAILAR, J. DU, COUDERC, J. & BONNET, A., 1951. — Le bassin supérieur du Vidourle (Région de Saint-Hippolyte-du-Fort). — *Annales de spéléologie*. **6** (4): 121-159. [2 esp.].
- \* CANARD, A., 1979. — Données écologiques sur quelques Aranéides d'une lande sèche armoricaine. — *Revue Arachnologique*. **2** (6): 303-312. [64 esp.].
- \* CANARD, A., 1980. — Contribution à la connaissance de l'écologie des aranéides des landes armoricaines, bilan actuel des recherches. — *Bulletin d'écologie*. **11** (3): 527-533. [34 esp.].
- \* CANARD, A., 1982a. — Les araignées du Massif Armoricaïn. II. Les Mimétides. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **54** (1-4): 77-89. [2 esp.].
- \* CANARD, A., 1982b. — Essai d'étude écologique quantitative sur quelques groupes d'invertébrés épigés d'une lande sèche armoricaine. — *Bulletin d'écologie*. **13** (1): 49-64. [5 esp.].
- \* CANARD, A., 1983. — Les araignées du Massif Armoricaïn. III. Les Atypides. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **55** (1-4): 47-53. [*Atypus affinis*].
- \* CANARD, A., 1984. — Données sur la distribution spatio-temporelle des Theridiidae des landes armoricaines. — *Revue Arachnologique*. **5** (4): 169-183. [27 esp.].
- \* CANARD, A., 1989. — Contribution à l'étude des Aranéides du Parc Naturel Régional de la Corse. — *Travaux scientifiques du Parc naturel régional et des Réserves naturelles de Corse*. **20**: 1-52. [127 esp.].
- \* CANARD, A., 1990a. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. IV. Erigoninae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. 1: 43-90. [93 esp.].
- \* CANARD, A., 1990b. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. IX. Gnaphosidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. 1: 193-210. [26 esp.].
- \* CANARD, A., 1990c. — Heathland spider communities, a functional group study. — *Acta Zoologica Fennica*. **190**: 45-50. [23 esp.].
- CANARD, A., 2005. — Catalogue of Spiders from Europe and the Mediterranean basin. Parts I & II. — *Revue Arachnologique*. **15** (3): 1-255.
- CANARD, A. & CHANSIGAUD, V., 1997. — Catalogue provisoire des Araignées de France. — *Connaissances des Invertébrés*, Série Arachnides. **1** et **2**: 1-110.
- CANTARELLA, T., 1974. — Contributo alla conoscenza degli *Heliophanus* (Arachnida, Araneae, Salticidae) di Sicilia. — *Animalia*. **1**: 157-173.
- \* CASTELNAU, J., 1897. — Notes sur *Hyptiotes anceps* (Arachnides). — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. (3) **27** (318): 107-111. [*Hyptiotes paradoxus*].
- \* CAUSSANEL, C., 1970. — Contribution à l'étude du peuplement d'une plage et d'une dune landaise. — *Vie et Milieu*. (C) **21**: 59-104. [7 esp.].
- \* CAZALET, M., 1935. — Recherches bionomiques sur l'estuaire du Frémur (limite des Côtes-du-Nord et de l'Ille-et-Vilaine). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **12**: 205-237. [3 esp.].
- \* CHANSIGAUD, V., 1991. — Sortie du Groupe Lyonnais d'Arachnologie samedi 19 octobre 1991. — *Pénélope*. **3**: 40-41. [10 esp.].
- \* CHANSIGAUD, V., 1992. — Une sortie Pénélope. — *Pénélope*. **7-8**: p. 36. [26 esp.].

- \* CHANSIGAUD, V., LEDOUX, J.-C. & TRIBOULET, G., 1994. — Compte Rendu de la sortie du 11 et 12 juin. — *Pénélope*. **13**: 43-46. [44 esp.].
- \* CHRISTOPHE, T., 1973. — Premiers résultats obtenus à Montmorency (Val d'Oise) dans l'étude du peuplement d'araignées d'une litière de taillis de châtaigniers *Castanea sativa* L. *Compte Rendu de la deuxième réunion des arachnologues d'expression française du 1 au 3 juin 1973*; Université de Montpellier : 23-25. [12 esp.].
- \* CHRISTOPHE, T., 1974. — Étude écologique du peuplement d'araignées d'une litière de châtaigneraie (forêt de Montmorency, Val d'Oise). — *Publications du Laboratoire de zoologie de l'École Normale Supérieure de Paris*. **3**: 1-126. [53 esp.].
- \* CHRISTOPHE, T. & BLANDIN, P., 1977. — The spider community in the litter of a coppiced chesnut woodland (Forêt de Montmorency, Val d'Oise, France). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **4** (3): 132-140. [38 esp.].
- CHRYSANTHUS, F., 1965. — On the identity of *Coelotes atropos*, *saxatilis* and *terrestris* (Araneida, Agelenidae). — *Tijdschrift voor Entomologie*. **108**: 61-71.
- \* CLARK, D.J., DUFFEY, E. & DENIS, J., 1970. — Araignées vendéennes (7<sup>me</sup> note). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **45**: 53-63. [63 esp.].
- \* COCQUEMPOT, C. & CHAMBON, J.-P., 1984. — Recherches sur les biocénoses céréalières. VII. Les Arachnides capturés par piégeage dans la région parisienne. — *La Défense des Végétaux*. **229**: 300-309. [45 esp.].
- \* COCQUEMPOT, C. & CHAMBON, J.-P., 1989. — Inventaire aranéologique des biocénoses céréalières du Bassin Parisien (France). — *Bolletino di Zoologia agraria e di Bachicoltura*. (2) **21**: 27-43. [103 esp.].
- \* COCQUEMPOT, C. & CHAMBON, J.-P., 1990. — L'activité des Araignées et son incidence sur la limitation des populations de pucerons des biocénoses céréalières. — *Revue d'écologie et de biologie du sol*. **27** (2): 205-219. [7 esp.].
- \* COCQUEMPOT, C., CHAMBON, J.-P., REYNAUD, P. & FISCHER, L., 1991. — Incidence des traitements insecticides sur la faune aranéologique d'un champ de blé à l'épiaison. — *Agronomie*. **11**: 423-434. [108 esp.].
- \* COMMECY, X., 1992. — Observation d'épeire fasciée *Argiope bruennichi* dans la Somme. — *L'Entomologiste picard*. **1992**: p. 23. [*Argiope bruennichi*].
- \* CORNIC, J.-F., 1977. — Les araignées du Pin au Haras. Premiers résultats. — *Publication du Laboratoire de zoologie de l'INRA de Rouen*. **1976-77-4**: 1-14. [37 esp.].
- \* CORNIC, J.-F., 1978. — Première contribution à la connaissance des Araignées du Mont Ventoux. — *La Terre et la Vie*. Supplément **1978**: 281-294. [132 esp.].
- \* CORNIC, J.-F., LEDOUX, J.-C. & VILLEPOUX, O., 2004. — De araneis Galliae I.2, *Zelotes nilicola* O.P.-Cambridge. — *Revue Arachnologique*. **15** (2): p. 17. [*Zelotes nilicola*].
- \* COULON, L., 1934. — L'*Argiope fasciata* aux environs d'Elbeuf. — *Bulletin de la Société de sciences naturelles d'Elbeuf*. **1933** (52e année): 61-62. [*Argiope bruennichi*].
- \* COUTANCEAU, J.-P. & DUQUEF, M., 1992. — À propos de l'épeire fasciée. — *L'Entomologiste picard*. **1992**: p. 24. [*Argiope bruennichi*].
- \* COUTANT, O., 1990. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. XII. Salticidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. 1: 257-280. [38 esp.].
- CRAWFORD, R & LOCKET, G.H., 1976. — The occurrence of *Tegenaria gigantea* Chamberlin & Ivie (1935) in North America and western Europe. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (7): p. 199.
- DAHL, F., 1912. — Über die Fauna des Plagefenn-Gebietes. In CONWENTZ, H. (ed.), *Das Plagefenn bei Choren*. Berlin: 339-638.
- \* DAHL, F. & DAHL, M., 1927. — Die Tierwelt Deutschlands. Spinnentiere oder Arachnoidea. II: Lycosidae. *Gustav Fischer, Jena*: 136 p. [*Arctosa alpingena*].
- DAHLEM, B., GACK, C. & MARTENS, J., 1987. — Balzverhalten von Wolspinnen der Gattung *Alopecosa* (Arachnida: Lycosidae). — *Zoologische Beiträge*. **31**(2): 151-164.
- \* DALINGWATER, J.E., 1991. — Fresh fields in France. — *Newsletter of the British Arachnological Society*. **61**: 4-5. [5 esp.].
- \* DALMAS, C. DE, 1915. — Capture à Paris d'un *Physocyclus simoni* femelle et description d'un *Harpactocrates* nouveau des Alpes-Maritimes. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1915**: 303-306. [6 esp.].
- \* DALMAS, C. DE, 1916. — Révision du genre *Orchestina* E.S. (Arachn. Oonopidae). — *Annales de la Société entomologique de France*. **85**: 203-258. [8 esp.].
- \* DALMAS, C. DE, 1919. — Catalogue des Araignées du genre *Leptodrassus* (Gnaphosidae) d'après les matériaux de la collection E. Simon au Muséum National d'Histoire naturelle. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. **1919**: 243-250. [2 esp.].
- \* DALMAS, C. DE, 1920. — Captures d'Araignées rares dans la région parisienne. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1920**: 59-60. [5 esp.].
- \* DALMAS, C. DE, 1921. — Monographie des *Pterotricha*. — *Annales de la Société entomologique de France*. **89**: 233-328. [2 esp.].
- DEELEMEN-REINHOLD, C.L. & DEELEMEN, P.R., 1988. — Révision des *Dysderinae* (Araneae, *Dysderidae*), les espèces méditerranéennes occidentales exceptées. — *Tijdschrift voor Entomologie*. **131**: 141-269.
- \* DELFOSSE, E., 1999. — Notes sur la biologie et l'élevage de la petite mygale française *Atypus affinis* Eichwald, 1830 (Arachnida, *Mygalomorpha*, *Atypidae*). — *Arachnides*. **42**: 18-21. [*Atypus affinis*].
- \* DELFOSSE, E., 2000a. — À la recherche de la Lycose de Narbonne ou l'inventaire de la sortie de Narbonne du 23-06-1999 au 27-06-1999 (1<sup>ère</sup> partie). — *Bulletin de Phyllie*. **3**: 21-26. [8 esp.].
- \* DELFOSSE, E., 2000b. — À la recherche de la Lycose de Narbonne ou l'inventaire de la sortie de Nar-

- bonne du 23-06-1999 au 27-06-1999 (2<sup>ème</sup> et dernière partie). — *Bulletin de Phyllie*. **4**: 13-21. [17 esp.].
- \* DELFOSSE, E., 2004. — Une Mygale *Atypus affinis* Eichwald, 1830 en activité durant l'hiver (Arachnida Araneae Mygalomorphae Atypidae). — *Bulletin de Phyllie*. **21**: p. 42. [*Atypus affinis*].
- \* DENIS, J., 1930. — Les Araignées au fond des houillères. — *Annales de la Société entomologique de France*. **99**: 273-310. [9 esp.].
- \* DENIS, J., 1931a. — Notes diverses sur les Aranéides. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1931** (4): 53-59. [6 esp.].
- \* DENIS, J., 1931b. — À propos de la ponte de *Nemesia caementaria* Latr. (Aran. Aviculariidae). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1931**: 175-176. [*Nemesia caementaria*].
- \* DENIS, J., 1931c. — Sur l'accouplement d'*Antistea elegans* (Blackwall) (Aran. Agelenidae). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1931**: 233-236. [*Antistea elegans*].
- \* DENIS, J., 1932a. — Les Araignées au fond des houillères (2<sup>ème</sup> note). — *Annales de la Société entomologique de France*. **101**: 267-280. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1932b. — Araignées de quelques grottes des Pyrénées-Orientales. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **64**: 514-516. [8 esp.].
- \* DENIS, J., 1932c. — Sur la présence de *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi dans les Pyrénées-Orientales (Aran. Theridiidae). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **37** (15): 222-223. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1933a. — Liste d'Araignées recueillies dans le département du Var. — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **17**: 85-102. [78 esp.].
- \* DENIS, J., 1933b. — Chasses arachnologiques dans les Pyrénées-Orientales (région de Banyuls-sur-mer et Vallespir). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **65** (4): 529-591. [298 esp.].
- \* DENIS, J., 1933c. — Quelques Araignées nouvelles pour le département du Var. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **38** (20): 329-331. [5 esp.].
- \* DENIS, J., 1933d. — Remarques biogéographiques à propos des Araignées de la vallée du Tech. — *Compte Rendu Sommaire des séances de la Société de Biogéographie*. **81**: 24-26. [7 esp.].
- \* DENIS, J., 1934a. — Éléments d'une faune arachnologique de l'île de Port-Cros (Var). — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **18**: 136-158. [116 esp.].
- \* DENIS, J., 1934b. — Sur quelques Araignées des Pyrénées-Orientales. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **39**: 72-77. [3 esp.].
- \* DENIS, J., 1934c. — Araignées du Nord de la France. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **39** (9): 139-144. [16 esp.].
- \* DENIS, J., 1934d. — Quelques captures d'Araignées dauphinoises. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **39** (12): p. 191. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1935a. — Additions à la Faune Arachnologique de l'île de Port-Cros (Var). — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **19**: 114-122. [52 esp.].
- \* DENIS, J., 1935b. — Liste d'Araignées recueillies dans le département du Var (2<sup>ème</sup> note). — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **20**: 104-113. [76 esp.].
- \* DENIS, J., 1935c. — À propos de quelques Araignées du genre *Zodarion* Walck. appartenant à la faune française. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **67**: 51-68. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1935d. — Sur le dimorphisme possible d'une Erigone [note sur les Erigonides. I.]. — *Revue française d'entomologie*. **2**: 186-189. [*Pelecopsis inedita*].
- \* DENIS, J., 1936. — Liste d'Araignées recueillies dans le département du Var (3<sup>e</sup> note). — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **20**: 136-138. [22 esp.].
- \* DENIS, J., 1937a. — Araignées recueillies dans le département du Var (quatrième note). — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **21**: 166-168. [78 esp.].
- \* DENIS, J., 1937b. — Éléments d'une faune arachnologique de l'île de Port-Cros (Var). — *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*. **21**: 169-174. [44 esp.].
- \* DENIS, J., 1937c. — Une station nouvelle de *Dolomedes plantarius* et remarques sur *Arctosa stigmosa*. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **71**: 451-456. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1937d. — Araignées du Nord de la France (2<sup>ème</sup> note). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **42**: 147-152. [28 esp.].
- \* DENIS, J., 1937e. — Contribution à l'étude des araignées du genre *Zodarion* Walckenaer. *Festschrift für Prof. Dr. Embrik Strand*. **3**: 1-50. [8 esp.].
- DENIS, J., 1937f. — A contribution to the Knowledge of the Spider Fauna of the Andorra Valleys. — *Proceedings of the Zoological Society of London*. B-1937: 565-591.
- \* DENIS, J., 1938a. — Éléments d'une faune arachnologique de Bretagne. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **15**: 52-80. [177 esp.].
- \* DENIS, J., 1938b. — Sur la synonymie de quelques Araignées. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **72**: 379-389. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1939a. — Araignées de l'île de Sein. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **16**: 101-107. [44 esp.].
- \* DENIS, J., 1939b. — Sur quelques Araignées françaises recueillies en 1938. — *Revue française d'entomologie*. **6** (2): 73-79. [34 esp.].
- \* DENIS, J., 1940a. — Araignées de l'île d'Ouessant. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **17**: 115-120. [65 esp.].
- \* DENIS, J., 1940b. — Note sur les Araignées habitant les anfractuosités des côtes rocheuses. — *Revue française d'entomologie*. **7** (3): 114-117. [7 esp.].
- \* DENIS, J., 1941. — Araignées de l'île d'Yeu. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **66**: 154-164. [102 esp.].
- \* DENIS, J., 1942. — Notes sur les Erigonides. III. Sur les femelles de trois espèces d'*Entelecara*. — *Bulle-*

- tin de la Société entomologique de France. **47**: 91-94. [*Entelecara erythropus*].
- \* DENIS, J., 1943a. — Araignées du Nord de la France (3e note). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **48**: 105-108. [17 esp.].
- \* DENIS, J., 1943b. — Araignées du Sancerrois. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **078**: 65-70. [44 esp.].
- \* DENIS, J., 1943c. — Chasses arachnologiques dans les Pyrénées-Orientales (Région de Banyuls-sur-mer et Vallespir). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **78**: 117-127. [84 esp.].
- \* DENIS, J., 1943d. — Araignées du Nord de la France (4<sup>ème</sup> note). — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **68**: 129-131. [14 esp.].
- \* DENIS, J., 1943e. — Notes sur les Erigonides. VI. Sur *Silometopus reussi* (Thorell) E. Simon. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **68**: 123-126. [*Silometopus reussi*].
- \* DENIS, J., 1944a. — Sur quelques Theridion appartenant à la faune de France. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **49**: 111-117. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1944b. — Notes sur les Erigonides. IV. Sur les genres *Enidia* Smith et *Dismodicus* Simon (Arachnida). — *Revue française d'entomologie*. **11**: 21-29. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1944c. — Notes sur les Erigonides. V. Description de deux *Trichoncus* nouveaux (Arachnida). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **48**: 178-180. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1945a. — Sur les exigences de quelques Araignées hygrophiles. — *Compte Rendu Sommaire des séances de la Société de Biogéographie*. **22** (188): 45-48. [8 esp.].
- \* DENIS, J., 1945b. — Notes sur les Erigonides. X. Remarques sur le genre *Entelecara* E. Simon avec la description de formes nouvelles du genre *Plaesiocraerus* E. Simon. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **80**: 203-215. [6 esp.].
- \* DENIS, J., 1946a. — À propos de la présence d'un *Atypus* dans la région parisienne. — *L'Entomologiste*. **2** (2): 72-73. [*Atypus affinis*].
- \* DENIS, J., 1946b. — Sur quelques Araignées capturées récemment en France. — *Revue française d'entomologie*. **13** (1): 36-44. [24 esp.].
- \* DENIS, J., 1946c. — Notes sur les Erigonides. IX. La femelle de *Cnephalocotes obscurus* (Blackwall). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **51**: 11-12. [6 esp.].
- \* DENIS, J., 1947a. — Une curieuse anomalie sexuelle chez une Araignée. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **52** (3): 41-43. [*Lasiargus hirsutus*].
- \* DENIS, J., 1947b. — Araignées de France. I. Araignées de Vendée avec la description d'une espèce nouvelle des Pyrénées-Orientales. — *Revue française d'entomologie*. **14**: 145-155. [26 esp.].
- \* DENIS, J., 1947c. — Notes sur les Erigonides. XI. Les espèces françaises du genre *Oedothorax* Bertkau. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **82**: 131-158. [5 esp.].
- \* DENIS, J., 1947d. — Notes sur les Erigonides. XIV. Le mâle de *Minicia candida* Denis. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **72**: 143-145. [*Minicia candida*].
- \* DENIS, J., 1948a. — L'Argyronète dans le Centre de la France. — *L'Entomologiste*. **1** (4): 37-39. [*Argyroneta aquatica*].
- \* DENIS, J., 1948b. — Araignées de France. II. Araignées des Monts Dore. — *Revue française d'entomologie*. **15**: 236-249. [76 esp.].
- \* DENIS, J., 1948c. — Notes sur les Erigonides. VII. Remarques sur le genre *Araeoncus* Simon et quelques genres voisins. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **53**: 19-32. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1948d. — Notes sur les Erigonides. XVI. Essai sur la détermination des femelles d'Erigonides. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **83**: 129-157. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1949a. — Simple observation à propos du développement des déformations céphaliques chez certains mâles d'Araignées. — *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*. fev. **1949**, 18<sup>ème</sup> année (2): 31-32. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1949b. — Un nouveau cas d'anomalie sexuelle chez une araignée. — *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*. Juin **1949**, 18<sup>ème</sup> année (6): 126-127. [*Lepthyphantes tenuis*].
- \* DENIS, J., 1949c. — Sur quelques Araignées de Provence. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **74**: 16-18. [14 esp.].
- \* DENIS, J., 1949d. — À propos de la fréquence locale des *Dolomedes* (Araneidae). — *L'Entomologiste*. **4** (5-6): 220-221. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1949e. — Notes sur les Erigonides. XVII. Additions et rectifications au tableau de détermination des femelles. Descriptions d'espèces nouvelles. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **84**: 245-257. [3 esp.].
- \* DENIS, J., 1950a. — Araignées d'Alsace. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **55** (9): 137-141. [54 esp.].
- \* DENIS, J., 1950b. — Araignées de la région d'Orédon (Hautes-Pyrénées). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **85**: 77-113. [121 esp.].
- \* DENIS, J., 1950c. — Araignées de France. III. Araignées de Camargue. — *Revue française d'entomologie*. **17**: 62-78. [48 esp.].
- \* DENIS, J., 1950d. — Les Araignées domestiques. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **47**: 1-3. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1951a. — Sur quelques araignées de la Preste (Pyrénées-Orientales). — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. **88**, N. et R. n°3: 103-105. [6 esp.].
- \* DENIS, J., 1951b. — Captures d'Araignées halophiles et hygrophiles. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. Décembre **1951**: 147-152. [24 esp.].
- \* DENIS, J., 1951c. — Araignées de la région d'Orédon (note complémentaire). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **86**: 308-312. [35 esp.].

- \* DENIS, J., 1951d. — Sur le mâle d'Ariadna insidiatrix Sav. et Aud. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **86**: 153-155. [*Ariadna insidiatrix*].
- \* DENIS, J., 1952a. — Quelques Araignées paludicoles de Gironde. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **57**: 78-80. [42 esp.].
- \* DENIS, J., 1952b. — Araignées capturées en forêt de Saint-Amand. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **63**: 3-4. [16 esp.].
- \* DENIS, J., 1952c. — Araignées du massif du Carlit (Pyrénées-Orientales). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **87**: 51-73. [80 esp.].
- \* DENIS, J., 1953a. — Araignées des environs du Marcadau et du Vignemale (Hautes-Pyrénées). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **88**: 83-112. [70 esp.].
- \* DENIS, J., 1953b. — Quelques captures d'Araignées pyrénéennes — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **88**: 259-266. [75 esp.].
- \* DENIS, J., 1953c. — Une Araignée du genre Spermophora en Vendée. — *L'Entomologiste*. **1953** (9): p. 87. [*Spermophora senoculata*].
- \* DENIS, J., 1953d. — Capture dans le Pas-de-Calais d'une Araignée d'Europe Centrale. — *L'Entomologiste*. **1953** (11): p. 138. [*Trichoncus affinis*].
- \* DENIS, J., 1954a. — Araignées des environs d'Espingo (Haute-Garonne). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **89**: 137-153. [69 esp.].
- \* DENIS, J., 1954b. — Les Araignées de Camargue. — *La Terre et la Vie*. **1954** (1): 85-94. [54 esp.].
- \* DENIS, J., 1955a. — Les Erigones du Nord de la France. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **78**: 1-3. [26 esp.].
- \* DENIS, J., 1955b. — Les Erigones du Nord de la France (suite). — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **81**: 1-3. [33 esp.].
- \* DENIS, J., 1955c. — Recherches d'Araignées dans les Pyrénées centrales (de Barèges à Gavarnie). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **90**: 142-156. [73 esp.].
- \* DENIS, J., 1956. — Quelques Araignées de Clairmarais. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **83**: 2-3. [10 esp.].
- \* DENIS, J., 1957a. — Araignées du massif calcaire des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **92**: 245-258. [63 esp.].
- \* DENIS, J., 1957b. — Une nouvelle station française pour *Ostearius melanopygius*. — *L'Entomologiste*. **13** (2-3): 36-37. [*Ostearius melanopygius*].
- \* DENIS, J., 1958a. — Quelques Erigonides et Linyphiides de Clairmarais (P. d. C.). — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **99**: p. 2. [15 esp.].
- \* DENIS, J., 1958b. — Captures d'Araignées dans quelques grottes de France. — *Notes Biospéologiques*. **12**: 123-125. [11 esp.].
- DENIS, J., 1958c. — Quelques micro-araignées de Belgique. — *Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique*. **34** (29): 1-14.
- \* DENIS, J., 1959a. — Quelques Araignées cavernicoles des Pyrénées. — *Annales de Spéléologie*. **14** (1-2): 219-231. [37 esp.].
- \* DENIS, J., 1959b. — Quelques Araignées cavernicoles du département du Gers. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **31** (4): 353-354. [5 esp.].
- \* DENIS, J., 1959c. — Quelques Araignées de la Côte vendéenne principalement des plages de sable. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **64**: 136-139. [18 esp.].
- \* DENIS, J., 1959d. — Araignées des environs de Lescun (Basses-Pyrénées). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **94**: 346-356. [96 esp.].
- DENIS, J., 1959e. — Sur la synonymie des *Tegenaria* du groupe atrica. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **94**: 172-176.
- \* DENIS, J., 1960a. — Quelques captures d'Araignées pyrénéennes (II). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **95**: 124-144. [145 esp.].
- \* DENIS, J., 1960b. — Capture de *Physocyclus Simoni* Berland dans le nord de la France (Aran. Pholcidae). — *L'Entomologiste*. **16** (3): 51-52. [*Psilochorus simoni*].
- \* DENIS, J., 1961a. — Quelques Araignées intéressantes du nord de la France. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **114**: 1-2. [25 esp.].
- \* DENIS, J., 1961b. — Araignées du Capcir et du Donnezan. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **96**: 113-128. [139 esp.].
- \* DENIS, J., 1961c. — Description d'une Araignée nouvelle des Pyrénées-Orientales. — *Vie et Milieu*. **12** (2): 353-355. [3 esp.].
- \* DENIS, J., 1962a. — Quelques Araignées des environs d'Avignon. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Vaucluse*. **1957-1962**: p. 99. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1962b. — Éléments d'une faune arachnologique de Vendée. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **37**: 225-255. [224 esp.].
- \* DENIS, J., 1962c. — Capture de deux Araignées rarissimes. — *L'Entomologiste*. **18** (1): 13-15. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1962d. — Quelques Araignées intéressantes de Vendée. — *Revue française d'entomologie*. **29**: 78-85. [50 esp.].
- \* DENIS, J., 1962e. — Description de deux Araignées nouvelles des Pyrénées-Orientales. — *Vie et Milieu*. **12** (4): 673-675. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1962f. — Notes sur les Erigonides. XIX. *Centromerus albidus* E.S. et *Centromerus serratus* (O.P. Cambr.). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **97**: 255-259. [*Centromerus albidus*].
- \* DENIS, J., 1962g. — Notes sur les Erigonides. XXIII. À propos de *Dicymbium nigrum* (Bl.). — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **87**: 468-471. [*Dicymbium nigrum*].
- \* DENIS, J., 1963a. — Une Araignée nouvelle pour le Nord. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **128**: p. 1. [*Microlinyphia impigra*].

- \* DENIS, J., 1963b. — Quelques Araignées recueillies en forêt de Marchiennes. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **129**: 2-3. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1963c. — Compléments à la faune arachnologique de Vendée. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **38**: 99-117. [174 esp.].
- \* DENIS, J., 1963d. — La distribution géographique d'*Ostearius melanopygius*. — *Compte Rendu Sommaire des séances de la Société de Biogéographie*. **40** (352): 71-77. [*Ostearius melanopygius*].
- \* DENIS, J., 1963e. — Quelques Araignées recueillies par MM. B. Lanza et S. Carfi en France méridionale et dans les Pyrénées espagnoles. — *Vie et Milieu*. **13**: 599-601. [15 esp.].
- \* DENIS, J., 1963f. — Notes sur les Erigonides. XXV. À propos de deux espèces de Camargue. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **88**: 392-399. [3 esp.].
- \* DENIS, J., 1963g. — Notes sur les Erigonides. XXX. Le genre *Minicia* Thorell. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **100**: 181-205. [*Minicia candida*].
- \* DENIS, J., 1964a. — Un *Episinus* nouveau pour la faune de France (Araneidae Theridiidae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **36** (5): 611-613. [3 esp.].
- \* DENIS, J., 1964b. — Second supplément à la faune arachnologique de Vendée. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **39**: 159-176. [207 esp.].
- \* DENIS, J., 1964c. — Notes sur les Erigonides. XXVI. Notes synonymiques. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **99**: 61-67. [4 esp.].
- \* DENIS, J., 1964d. — À propos d'une capture de la Lycose de Narbonne. — *L'Entomologiste*. **20** (3): 75-76. [*Lycosa narbonensis*].
- DENIS, J., 1964e. — Notes sur les Erigonides. XXVII. Remarques sur les genres *Pelecopsis* Simon et *Trichopterna* Kulcz., avec la description du mâle de *Pelecopsis major* (D.). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **36** (3): 339-347.
- \* DENIS, J., 1965a. — Notes sur les Erigonides. XXVIII. Le genre *Trichoncus* (Araneae). — *Annales de la Société entomologique de France*. (N.S.) **1** (2): 425-477. [6 esp.].
- \* DENIS, J., 1965b. — Notes sur les Erigonides. XXIX. Une forme pyrénéenne d'*Erigonella subelevata* (L.Koch). — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **89**: 673-675. [*Erigonella subelevata*].
- \* DENIS, J., 1965c. — Éléments d'une faune arachnologique de Vendée (4<sup>ème</sup> note). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **40**: 177-187. [150 esp.].
- DENIS, J., 1965d. — Notes sur les Erigonides. XXXI. *Acartauchenius justus* (O.P. Cambridge) Araignée nouvelle pour la faune de Belgique. — *Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique*. **41**(14): 1-5.
- DENIS, J., 1965e. — Notes sur les Erigonides. XXXIII. À propos du genre *Scotargus* Simon (Araneae, Erigonidae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **37** (6): 975-982.
- \* DENIS, J., 1966a. — Éléments d'une faune arachnologique de Vendée (5<sup>ème</sup> note). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **41**: 189-190. [12 esp.].
- \* DENIS, J., 1966b. — Une mise au point sur les Araignées de l'île de Port-Cros. — *L'Entomologiste*. **22** (3-4): 45-48.
- \* DENIS, J., 1966c. — Notes sur les Erigonides (Araignées). XXXIV. Le genre *Trichoncoides* Denis. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **38** (3): 233-237. [*Trichoncoides pilosus*].
- DENIS, J., 1966d. — *Milleriana*, a new genus for a british spider. — *Bulletin of the British Spider Study Group*. **31**: p. 9.
- \* DENIS, J., 1967a. — Capture d'*Oonops domesticus* Dalmas en Vendée (Araneida, Oonopidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **42**: 179-180. [*Oonops domesticus*].
- \* DENIS, J., 1967b. — Notes sur les Érigonides. XXXVI. Le genre *Sintula* Simon. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **103**: 369-390. [2 esp.].
- \* DENIS, J., 1967c. — Notes sur les Érigonides. XXXVII. Le genre *Exechophysis* Simon, avec des notes sur quelques espèces appartenant à d'autres genres. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **72**: 310-322. [*Pelecopsis bucephala*].
- \* DENIS, J., 1967d. — Quelques captures d'Araignées pyrénéennes (III). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **103**: 32-50. [208 esp.].
- \* DENIS, J., 1967e. — Les Araignées de Loire-Atlantique. — *Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France*. **64**: 17-27. [41 esp.].
- \* DENIS, J., 1968a. — Araignées vendéennes (6<sup>ème</sup> note). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **43**: 237-240. [6 esp.].
- \* DENIS, J., 1968b. — À propos d'*Halorates reprobus* (O.P. Cambr.) (Araneae, Erigonidae). — *L'Entomologiste*. **24** (3): 79-82. [*Halorates reprobus*].
- DENIS, J., 1970. — Notes sur les Erigonides. XXXIX. A propos des *Diplocephalus* s. str. (Erigonidae, Araneae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **42** (2): 378-381.
- \* DENIS, J. & GUIBÉ, J., 1942. — Sur deux Araignées récoltées dans le département du Calvados: *Robertus truncorum* (L. Koch) et *Meioneta* (*Aprolagus*) *beata* (O.P. Cambr.). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **47**: 94-96. [2 esp.].
- \* DENIS, J. & DRESKO, E., 1946. — Une Araignée nouvelle pour la Faune de France. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **51**: 103-106. [*Ostearius melanopygius*].
- \* DEVILLE, J., 1902. — Exploration entomologique des grottes des Alpes-Maritimes. — *Annales de la Société entomologique de France*. **71**: 695-709. [*Nesticus eremita*].
- \* DI FRANCO, F., 1994. — Nuovi dati su *Zelotes paroculus* Simon, 1914 (Araneae, Gnaphosidae). — *Animalia*. **21** (13): 125-129. [*Zelotes paroculus*].
- DI FRANCO, F., 2002. — New data on four little-known species of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae, Gnaphosidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **12** (4): 196-200.

- DI FRANCO, F. & BLICK, T., 2002. — *Zelotes pyrenaicus*, replacement name for *Zelotes mediocris* Simon, 1914 (Araneae: Gnaphosidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **12** (8): p. 360.
- \* DOIGNON, P., 1976. — La faune du Massif de Fontainebleau. Compléments et synthèses. — *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*. **52** (5-6): 55-61. [210 esp.].
- \* DONDALE, C.D., 1972. — Laboratory breeding between European and North American populations of the spider *Philodromus rufus* Walckenaer (Araneida: Thomisidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **2**(4): 49-52. [*Philodromus rufus*].
- DONDALE, C.D., TURNBULL, A.L. & REDNER, J.H., 1964. — Revision of the Nearctic species of *Thanatus* C. L. Koch (Araneae: Thomisidae). — *The Canadian Entomologist*. **96**: 636-656.
- DONDALE, C.D. & REDNER, J.H., 1975. — The genus *Ozyptila* in North America (Araneida, Thomisidae). — *Journal of Arachnology*. **2**: 129-181.
- \* DRESKO, E., 1943. — Nouvelles observations sur les Araignées des grottes de Recluses. — *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*. **1943** (H.S.): 31-33. [5 esp.].
- \* DRESKO, E., 1946. — Sur quelques captures d'*Atypus* (Araneae, Atypidae). — *L'Entomologiste*. **2** (2): 70-72. [2 esp.].
- \* DRESKO, E., 1947a. — Recherches souterraines dans les Pyrénées centrales. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **84**: 182-196. [14 esp.].
- \* DRESKO, E., 1947b. — Sur la capture de *Meta bourneti* Sim. dans les environs de Paris (Arachn.). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **52** (4): 52-54. [*Meta bourneti*].
- \* DRESKO, E., 1947c. — La faunule arachnologique d'un tas de pavés et ses rapports avec le peuplement des cavités souterraines de la région parisienne. — *L'Entomologiste*. **3** (3): 123-127. [11 esp.].
- \* DRESKO, E., 1948. — Note sur *Dolomedes fimbriatus* Clerck en forêt de Fontainebleau (S-et-M.). — *L'Entomologiste*. **4** (3-4): 148-154. [*Dolomedes fimbriatus*].
- \* DRESKO, E., 1950. — Araignées capturées à Saint-Florentin (Yonne). — *L'Entomologiste*. **6** (6): 162-164. [13 esp.].
- \* DRESKO, E., 1951. — Sur quelques Leptyphantes cavernicoles et description d'une espèce nouvelle (Araneae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **23** (4): 363-367. [2 esp.].
- \* DRESKO, E., 1952a. — Araignées de Seine-et-Marne. — *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*. **28** (3): p. 31. [3 esp.].
- \* DRESKO, E., 1952b. — Remarques sur les Centromeres du groupe paradoxus et description de deux espèces nouvelles. — *Notes Biospéologiques*. **7**: 95-100. [3 esp.].
- \* DRESKO, E., 1953. — Note sur quelques Araignées cavernicoles du genre *Troglophyphantes* et description d'espèces nouvelles. *Congrès International de Spéléologie Paris*. **1953** (3): 295-300. [5 esp.].
- \* DRESKO, E., 1956. — Araignées et Opilions des cavités du département de la Côte-d'Or (1<sup>ère</sup> note). — *Sous le plancher*. sep.-déc. **1956** (5-6): 1-10. [12 esp.].
- \* DRESKO, E., 1957a. — Sur la capture de *Thyreosthenius Becki* (Cb.) à Paris (Araneae). — *L'Entomologiste*. **13** (6): 117-120. [4 esp.].
- \* DRESKO, E., 1957b. — Sur la capture de *Meta bourneti* en Bourgogne. — *Sous le plancher*. **1957** (2): 36-37. [*Meta bourneti*].
- \* DRESKO, E., 1957c. — Description d'une espèce nouvelle de *Tegenaria* et remarques sur *Tegenaria saeva* Black et *atrica* C. Koch (Araneae, Agelenidae). — *Vie et Milieu*. **8** (2): 211-220. [11 esp.].
- \* DRESKO, E., 1957d. — À propos de *Meta bourneti* Simon (Araneae Argiopidae). — *Studia spelaeologica*. Giugno **1957**: 83-90. [*Meta bourneti*].
- \* DRESKO, E., 1959a. — Araignées et Opilions capturés dans quelques cavités souterraines de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **31** (1): 88-94. [25 esp.].
- \* DRESKO, E., 1959b. — Sur quelques espèces du genre *Robertus* (Araneae, Theridiidae). Description de *R. alpinus* et *R. cardensis* spp.nov. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **31** (3): 242-247. [3 esp.].
- \* DRESKO, E., 1959c. — Araignées et Opilions capturés dans les cavités souterraines de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Jura et du Doubs. — *Sous le plancher*. **1959** (1): 1-7. [11 esp.].
- \* DRESKO, E., 1962. — Araignées capturées en France dans des grottes ou des cavités souterraines. — *Annales de Spéléologie*. **17** (1): 177-193. [42 esp.].
- \* DRESKO, E., 1966. — Étude de quelques espèces d'araignées du genre *Nesticus* (Fam. Nesticidae). — *Annales de Spéléologie*. **21** (3): 795-813. [2 esp.].
- \* DRESKO, E., 1971a. — Araignées de Bretagne. Le genre *Segestria* (fam. Dysderidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **46**: 225-228. [3 esp.].
- \* DRESKO, E., 1971b. — Araignées de Bretagne. Le genre *Tegenaria* (fam. Agelenidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **46**: 237-240. [4 esp.].
- \* DRESKO, E., 1972. — Araignées de Bretagne. Le genre *Dysdera* (fam. Dysderidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **47**: 245-256. [3 esp.].
- \* DRESKO, E., 1973. — Araignées de Bretagne. La famille Pholcidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **48**: 143-144. [2 esp.].
- \* DRESKO, E., 1974a. — Araignées de Bretagne. Le genre *Gnaphosa* (fam. Gnaphosidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **49**: 15-16. [2 esp.].
- \* DRESKO, E., 1974b. — Araignées de Bretagne. Les genres *Tetragnatha* et *Eugnatha* (fam. Tetragnathidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **49**: 17-20. [3 esp.].
- \* DRESKO, E., 1975. — Araignées de Bretagne. Le genre *Amaurobius* (fam. Amaurobiidae). — *Bulle-*



- tin de la Société scientifique de Bretagne*. **50** (1-4): 119-122. [3 esp.].
- \*DRESCO, E., 1979. — Étude des Leptoneta. Description de Leptoneta fouresi, araignée cavernicole nouvelle des Pyrénées françaises (Fam. Leptonetidae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **115** (34): 388-392. [*Leptoneta fouresi*].
- \*DRESCO, E., 1982. — Étude des Leptoneta. Leptoneta fagei Sim. (Araneae, Leptonetidae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **118**: 49-51. [*Leptoneta fagei*].
- \*DRESCO, E., 1983. — Étude des Leptoneta. Leptoneta olivacea Sim. (Araneae, Leptonetidae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **119**: 17-19. [*Leptoneta olivacea*].
- \*DRESCO, E., 1986. — Étude des Leptoneta. Leptoneta corsica Fage (Araneae, Leptonetidae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **122**: 35-39. [*Leptoneta corsica*].
- \*DRESCO, E., 1987. — Étude des Leptoneta: Leptoneta (Araneae, Leptonetidae) du sud-est de la France. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (4) **9**, A 3: 633-650. [7 esp.].
- \*DRESCO, E., 1989. — Étude des Leptoneta. À propos de Leptoneta convexa Sim. (Araneae, Leptonetidae). — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **125**: 99-103. [*Leptoneta convexa*].
- \*DRESCO, E. & JÉZÉQUEL, J.-F., 1961. — Attribution d'un rang spécifique à Leptyphantès zimmermanni Bertkau 1890 s.sp. spiniger E. Simon 1929 (Araneae, Linyphiinae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **33**: 105-108. [*Lepthyphantès zimmermanni*].
- \*DRESCO, E. & HUBERT, M., 1968. — Araneae Speluncarum Galliae. — *Annales de Spéléologie*. **23** (2): 483-500. [37 esp.].
- \*DRESCO, E. & CANARD, A., 1974. — Araignées de Bretagne. Le genre Herpyllus (=Scotophaeus) (famille Gnaphosidae). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **49**: 23-25. [2 esp.].
- \*DRESCO, E. & HUBERT, M., 1975. — Araneae Speluncarum Galliae. II. — *Annales de Spéléologie*. **30** (3): 441-450. [33 esp.].
- DRESCO, E. & CÉLÉRIER M. L., 1976. — Étude des Tégénaires. Tegenaria tyrrhenica. — *Annales de Spéléologie*. **31**: 223-228.
- \*DRON, G., 1993. — L'épeire fasciée dans l'ouest de la Somme. — *L'Entomologiste picard*. **1993**: p. 80. [*Argiope bruennichi*].
- \*DUFFEY, E., 1964. — Sand-dune spiders of the Vendée, France. — *Bulletin of the British Spider Study Group*. **24**: 1-3. [27 esp.].
- \*DUFFEY, E., BRAUD, S. & LEDOUX, J.-C., 2004. — De araneis Galliae I.7, Tapinocyboides pygmeus (Menge, 1869). — *Revue Arachnologique*. **15** (2): p. 22. [*Tapinocyboides pygmaeus*].
- \*DUPONT, L., 1934. — Notes complémentaires sur le travail de M. Coulon relatif à l'Argiope fasciata Oliv. = bruennichi Scop. À propos de sa capture aux Essarts par M. Hervieux. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles et du musée d'Elbeuf*. **1934** (53): 25-26. [*Argiope bruennichi*].
- \*DUQUEF, M., 1993. — Deux nouvelles stations pour l'épeire fasciée. — *L'Entomologiste picard*. **1993**: p. 82. [*Argiope bruennichi*].
- \*DUREPAIRE, P. & PREVOST, O., 1994. — Prédations d'odonates par les araignées dans la réserve naturelle du Pinail (Département de la Vienne). — *Martinia*. **10** (3): 41-45. [9 esp.].
- \*ÉDOUARD, 1917. — [Note sur la présence de l'Argiope fasciata aux environs du Havre] — *Bulletin de la Société linnéenne de Seine-Maritime*. **6**: p. 101. [*Argiope bruennichi*].
- \*EMERIT, M., 1977. — Cyrtarachne ixodoïdes, une Araignée rare du Midi de la France: la pointe de pénétration d'une sous-famille tropicale. — *Revue Arachnologique*. **1** (1): 23-31. [*Cyrtarachne ixoides*].
- EMERIT, M., 1992. — Les Mygales de France. — *Penelope*. **6**: 5-32.
- \*EMERIT, M., 2002. — Deux araignées curieuses et rares de la garrigue languedocienne: Argyrodes rostratus Simon, 1873 (Theridiidae) et Delorhipis sp. (Linyphiidae). — *Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault*. **142** (1): 13-18. [2 esp.].
- \*EMERIT, M., BONARIC, J.-C. & ROUDIL, R., 1985. — Les peuplements hivernaux d'Arthropodes des rhytidomes de Platanus acerifolia dans le Midi de la France. — *Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault*. **125**: 68-73. [50 esp.].
- \*EMERIT, M. & BONARIC, J.-C., 1990. — Richesse, diversité spécifiques et distribution d'abondance du peuplement arachnologique d'une garrigue languedocienne. — *Bulletin de la Société européenne d'arachnologie*. H.S. N°1: 125-133. [39 esp.].
- \*EMERIT, M., LEDOUX, J.-C. & TRIBOULET, G., 1994. — Excursion du 15 et du 16 octobre 1994 en Petite Camargue. — *Pénélope*. **15**: 4-8. [39 esp.].
- \*EMERIT, M., LEDOUX, J.-C. & PINAULT, G., 1997. — Araignées et Opilions de la réserve du ravin de Valbois (Jura). *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 45 p. [205 esp.] [concerne le département du Doubs].
- \*EMERIT, M. & LEDOUX, J.-C., 1999. — Contribution à l'étude du peuplement d'araignées et d'opilions de quatre formations naturelles du nord de la France. *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 60 p. [192 esp.].
- \*EMERIT, M. & PINAULT, G., 2000. — Une curieuse araignée troglobie des Pyrénées Orientales: Telema tenella Simon 1882. — *Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault*. **140** (1): 9-16. [*Telema tenella*].
- \*EMERIT, M. & LEDOUX, J.-C., 2003. — Araignées et opilions de la Réserve naturelle des Manneville (Eure). *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 21 p. [145 esp.].
- \*EMERIT, M. & LEDOUX, J.-C., 2004a. — De araneis Galliae I.3, Gnaphosa iberica Simon = Gnaphosa lapponum (Thorell). — *Revue Arachnologique*. **15** (2): 17-18. [*Gnaphosa lapponum*].

- \*EMERIT, M. & LEDOUX, J.-C., 2004b. — De araneis Galliae I.8, Tmarus horvathi Kulczynski. — *Revue Arachnologique*. **15** (2): 22-23. [*Tmarus horvathi*].
- \*EMERIT, M. & LEDOUX, J.-C., 2004c. — De araneis Galliae I.10, Pardosa sordidata (Thorell). — *Revue Arachnologique*. **15** (2): 24-25. [*Pardosa sordidata*].
- ESKOV, K.Y., 1990. — The spider genus Collinsia O. Pickard-Cambridge 1913 in the fauna of Siberia and the Soviet Far East (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). — *Senckenbergiana Biologica*. **70**: 287-298.
- ESKOV, K.Y., 1994. — Catalogue of the linyphiid spiders of northern Asia. *Pensoft*, Moscou: 144 p.
- ESKOV, K.Y. & MARUSIK, Y.M., 1995. — On the spiders from Saur Mt. range, eastern Kazakhstan (Arachnida: Araneae). — *Beiträge zur Araneologie*. **4**: 55-94.
- \*FABRE, J.-H., 1905. — Souvenirs entomologiques. Paris: 1182 p. [9 esp.].
- \*PAGE, L., 1909. — Un nouveau type d'araignée marine en Méditerranée: Desidiopsis racovitzai n. g., n. sp. — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. (4) **9**, N. et R.: LXXV-LXXXIV. [*Desidiopsis racovitzai*].
- \*PAGE, L., 1913. — Biospeologica: Études sur les araignées cavernicoles. II. Révision des Leptonetidae. — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. (5) **10**: 479-576. [3 esp.].
- \*PAGE, L., 1919. — Biospeologica: Études sur les araignées cavernicoles III. Le genre Troglodyphantes. — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. **58**: 55-148. [2 esp.].
- \*PAGE, L., 1931. — Biospeologica: Araneae. — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. **71**: 99-291. [40 esp.].
- \*PAGE, L., 1943. — Description d'une Leptonete de Corse suivie de remarques sur les Araignées cavernicoles du genre Stalita. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **15**: 171-174. [*Leptoneta corsica*].
- \*FAVET, C., 1984. — Contribution à l'étude écologique des populations ripicoles de Basse Durance. — *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de Marseille*. **44**: 47-61. [9 esp.].
- \*FELTGEN, E., 1906. — Notices sur les Araignées (suite 5). — *Fauna*. **16**: 129-131. [*Argiope bruennichi*].
- \*FLORENTIN, R., 1904. — La faune des grottes de Sainte-Reine. — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. (4) **34**: 176-179. [*Lepthyphantes leprosus*].
- \*GAUTIER, G., 1980. — Les communautés de coléoptères et d'araignées des biotopes humides dans le Parc national des Écrins. — *Ecologia Mediterranea*. **5**: 3-24. [8 esp.].
- \*GAUTIER, G., 1981. — Étude écologique des peuplements d'invertébrés des biotopes humides de la zone sud-ouest du Parc National des Écrins (Hautes-Alpes, Isère). — *Travaux scientifiques du Parc National des Écrins*. **1**: 125-159. [6 esp.].
- \*GERHARDT, U., 1928. — Biologische Studien an griechischen, corsischen und deutschen Spinnen. — *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere*. **10** (4): 576-675. [3 esp.].
- \*GERHARDT, U., 1930. — Biologische untersuchungen an Südfranzösischen Spinnen. — *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere*. **19**: 184-227. [4 esp.].
- \*GOODMAN, A.B., 1928. — The Black-bellied Tarantula Spider (*Lycosa narbonensis*). — *Proceedings of the South London entomological & natural history Society*. **1927-1928**: 109-111. [*Lycosa narbonensis*].
- \*GOULLIART, M., 1973. — Les quatre petites Dictyones (Araignées cribellates) communes dans notre région. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **190**: 4-5. [4 esp.].
- \*GOULLIART, M., 1979a. — Notions et souvenirs arachnologiques (suite). — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **212**: 1-7. [21 esp.].
- \*GOULLIART, M., 1979b. — Notions et souvenirs arachnologiques (suite des n° 211 et 212). — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **214**: 1-5. [22 esp.].
- \*GOULLIART, M., 1980. — Notions et souvenirs arachnologiques (suite et fin). — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **215**: 5-8. [16 esp.].
- \*GRASSHOFF, V.M., 1959. — Dysdera-Arten von Inseln des Mittelmeergebietes (Arach., Araneae) — *Senckenbergiana biologica*. **40** (34): 209-220. [2 esp.].
- \*GRASSHOFF, M., 1983. — Larinioides Caporiacco 1934, der korrekte Name für die sogenannte Araneus cornutus-Gruppe (Arachnida: Araneae). — *Senckenbergiana Biologica*. **64** (13): 225-229. [*Larinioides folium*].
- \*GRIMM, U., 1982. — Sibling species in the Zelotes subterranean-group and description of 3 new species of Zelotes from Europe (Arachnida: Araneae: Gnaphosidae). — *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*. **25**: 169-183. [*Zelotes devotus*].
- \*GRIMM, U., 1985. — Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). — *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*. (NF) **26**: 1-318. [5 esp.].
- \*GRIMM, U., 1986. — Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae). — *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*. (NF) **27**: 1-91. [2 esp.].
- \*GROS, E., 1982. — Note sur la biologie de quelques Pompilides (1<sup>ère</sup> partie). — *L'Entomologiste*. **38** (4-5): 193-201. [11 esp.].
- \*GROS, E., 1983a. — Note sur la biologie de quelques Pompilides (2<sup>ème</sup> partie). — *L'Entomologiste*. **39** (1): 24-35. [22 esp.].
- \*GROS, E., 1983b. — Note sur la biologie de quelques Pompilides (3<sup>e</sup> partie). — *L'Entomologiste*. **39** (3): 125-136. [11 esp.].
- \*GROS, E., 2004. — Notes comportementales sur 23 espèces de Pompilides de la faune franco-ibérique (Hymenoptera, Pompilidae) — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **109** (4): 387-408. [20 esp.].
- \*GUIBÉ, J., 1942. — À propos de la distribution géographique d'une espèce d'araignée (*Gnathonarium*

- dentatum Wid). — *Compte Rendu Sommaire des séances de la Société de Biogéographie*. **19** (162): 39-40. [7 esp.].
- \* GUIBÉ, J., 1943. — Contribution à la Faune arachnologique de Normandie, 1<sup>re</sup> note. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **48** (5): 76-78. [27 esp.].
- \* GUIBÉ, J., 1946. — Aperçu sur la faune arachnologique de la Normandie. — *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*. (9) **4**: 46-57. [287 esp.].
- GUY, Y., 1966. — Contribution à l'étude des araignées de la famille des Lycosidae et de la sous-famille des Lycosinae avec étude spéciale des espèces du Maroc. — *Travaux de l'Institut scientifique chérifien (zoologie)*. **33**: 1-174.
- \* HARM, M., 1971. — Revision der Gattung *Heliophanus* C. L. Koch (Arachnida: Araneae: Salticidae). — *Senckenbergiana Biologica*. **52**: 53-79. [*Heliophanus cupreus*].
- HARVEY, P.R., NELLIST, D.R. & TELFER, M.G., 2002. — Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae). *Biological Records Centre*, Huntingdon. Vol. 1 & 2: 406 p.
- \* HECIAK, S. & PROSZINSKI, J., 1984. — Redescriptions of one *Aelurillus* and two *Phlegra* species (Araneae, Salticidae) from Spain. — *Annales Zoologici*. **37** (14): 377-390. [*Euophrys lanigera*].
- \* HEIDT, E., FRAMENAU, V., HERING, D. & MANDERBACH, R., 1998. — Die Spinnen- und Laufkäferfauna auf ufernahen Schotterbänken von Rhône, Ain (Frankreich) und Tagliamento (Italien) (Arachnida: Araneae; Coleoptera: Carabidae). — *Entomologische Zeitschrift*. **108** (4): 142-153. [45 esp.].
- \* HEIMER, S. & MÜLLER, H.G., 1988. — Spiders from Corsica II. Redescription of *Tegenaria armigera* Simon 1873 (Arachnida, Araneida, Agelenidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **7** (7): 211-212. [*Tegenaria armigera*].
- HEIMER, S. & NENTWIG, W., 1991. — Spinnen Mitteleuropas. *Paul Parey, Berlin und Hamburg*: 543 p.
- \* HELSDINGEN, P.J. VAN, 1969. — A reclassification of the species of *Linyphia* based on the functioning of the genitalia. — *Zoologische Verhandlungen*. **105**: 1-303. [7 esp.].
- \* HELSDINGEN, P.J. VAN, 1995. — Nouvelles stations en France pour *Linyphia alpicola* et *Turiniphia clairi* (Araneae, Linyphiidae). — *Revue Arachnologique*. **10** (13): 219-222. [8 esp.].
- \* HELSDINGEN, P.J. VAN, THALER, K. & DELTSHEV, C., 1977. — The tenuis group of *Lepthyphantes Menge* (Araneae, Linyphiidae). — *Tijdschrift voor Entomologie*. **120**: 1-54. [2 esp.].
- \* HELSDINGEN, P.J. VAN, THALER, K. & DELTSHEV, C., 2001. — The European species of *Bolyphantes* with an attempt of a phylogenetic analysis (Araneae Linyphiidae). — *Memorie della Società entomologica italiana*. **80**: 3-35. [*Bolyphantes luteolus*].
- \* HENRY, C., 1981. — Étude biocénotique d'un marais du centre de la France. — *Bulletin d'écologie*. **12** (1): 9-28. [23 esp.].
- \* HILLYARD, P. D., 1975. — A collecting trip to La Sologne, France 18th-20th may 1975. — *The Secretary's News Letters of the British Arachnological Society*. **13**: 3-5. [90 esp.].
- \* HIPPA, H. & OKSALA, I., 1983. — Cladogenesis of the *Enoplognatha ovata* group (Araneae, Theridiidae), with description of a new Mediterranean species. — *Annales Entomologici Fennici*. **49**: 71-74. [*Enoplognatha afrodite*].
- \* HOLLANDER, J. DEN, VLIJM, L., DIJKSTRA, H. & VERHOEF, S.C., 1972. — Further notes on the occurrence of the Wolfspider genus *Pardosa* C.L. Koch, 1848 (Araneae, Lycosidae) in Southern France. — *Beaufortia*. **20** (264): 77-84. [14 esp.].
- \* HOLLANDER, J. DEN & DIJKSTRA, H., 1974. — *Pardosa vlijmi* sp. nov., a new ethospesies sibling *Pardosa proxima* (C.L. Koch, 1848), from France, with description of courtship display (Araneae, Lycosidae). — *Beaufortia*. **22** (289): 57-65. [2 esp.].
- HOLM, A., 1973. — On the spiders collected during the Swedish expeditions to Novaya Zemlya and Yenisey in 1875 and 1876. — *Zoologica Scripta*. **2**: 71-110.
- \* HUBERT, M., 1964a. — Localités nouvelles ou peu connues de quelques araignées cavernicoles françaises. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **36** (1): 86-96. [25 esp.].
- \* HUBERT, M., 1964b. — Remarques sur quelques espèces d'araignées du genre *Amaurobius* C. Koch, 1837 et description d'une espèce nouvelle. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **36** (6): 784-796. [6 esp.].
- \* HUBERT, M., 1966. — Remarques sur quelques espèces d'araignées appartenant au genre *Titanoeca* Thorell, 1870. — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **38** (3): 238-246. [3 esp.].
- \* HUBERT, M., 1969. — Étude du genre *Porrhomma* (Araneae, Linyphiidae). 1. *P. proserpina* (E.S.), *P. pygmaeum* (Bl.). — *Annales de Spéléologie*. **24** (1): 225-238. [*Porrhomma convexum*].
- \* IORIO, E., 2002. — Étude d'une colonie d'*Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789) [= *E. niger* (Petagna)] (Araneae, Labidognatha, Eresidae) sur la côte calcaire d'Arnaville (54). — *Bulletin de Phyllie*. **14**: 34-37. [*Eresus niger*].
- \* IORIO, E., 2003a. — *Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802) [Araneae, Labidognatha, Gnaphosidae] présente en grand nombre sur la côte calcaire de Lorry-Mardigny (Moselle-57). — *Bulletin de Phyllie*. **15**: 36-37. [*Gnaphosa lucifuga*].
- \* IORIO, E., 2003b. — Une nouvelle station supplémentaire en Lorraine pour *Atypus affinis* Eichwald, 1830 (Araneae, Orthognatha, Atypidae). — *Bulletin de Phyllie*. **15**: p. 36. [*Atypus affinis*].
- \* IORIO, E., 2003c. — Observation de *Nemesia eleonora* O. P.-Cambridge, 1873 dans les Alpes-Maritimes (06) (Arachnida, Araneae, Orthognatha, Nemesiidae). — *Bulletin de Phyllie*. **15**: 28-33. [2 esp.].
- \* IORIO, E., 2003d. — Quelques notes sur l'éthologie de l'araignée *Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1806) (Araneae, Labidognatha, Theridiidae). — *Bulletin de Phyllie*. **18**: 41-45. [*Steatoda paykulliana*].
- \* IORIO, E., 2004a. — Sur la prédation effectuée par deux espèces de Thomises (Arachnida, Araneae, Labidognatha, Thomisidae). — *Bulletin de Phyllie*. **22**: p. 42. [2 esp.].

- \* IORIO, E., 2004b. — À propos de la présence d'*Atypus piceus* (Sulzer, 1776) à Arnville (54) (Araneae, Mygalomorphae, Atypidae). — *Bulletin de Phyllie*. **19**: p. 50. [*Atypus piceus*].
- \* JACKSON, A.R., 1930. — Results of the Oxford University Expedition to Greenland, 1928. Araneae and opiliones collected by Major R. W. Hington; with some notes on Icelandic spiders. — *Annals and Magazine of Natural History*. (10) **6**: 639-656 [*Dicyna major*].
- \* JEANNEL, R., 1926. — Faune cavernicole de la France. Editions Paul Lechevalier, Paris: 334 p. [45 esp.].
- \* JÉZÉQUEL, J.-F., 1961. — Contribution à l'étude des Zelotes femelles (Araneidea, Labidognatha, Gnaphosidae) de la faune française (2<sup>ème</sup> note). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. (2) **33** (6): 594-610. [10 esp.].
- \* JOURDE, P. & THIRION, J.-M., 1999. — Contribution à l'inventaire des araignées (Arachnida, Araneae) de Charente-Maritime (France). — *Annales de la Société de sciences naturelles de Charente-Maritime*. **8** (8): 973-978. [95 esp.].
- \* JUBERTHIE, C., 1954. — Sur les cycles biologiques des araignées. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. **89**: 299-318. [17 esp.].
- \* JUBERTHIE, C., 1985. — Cycle vital de *Telema tenella* dans la grotte-laboratoire de Moulis et stratégies de reproduction chez les araignées cavernicoles. — *Mémoires de Biospéologie*. **12**: 77-89. [*Telema tenella*].
- \* JUBERTHIE, C., RUFFAT, G. & DIMITRIJEVIC, R., 1988. — Développement de *Leptyphantes sancti-vincenti* (Simon) araignée Linyphiidae souterraine. — *Mémoires de Biospéologie*. **15**: 203-209. [*Leptyphantes sancti-vincenti*].
- \* JUBERTHIE-JUPEAU, L. & LOPEZ, A., 1981. — Ultrastructure du tube séminifère chez *Leptoneta microphthalmia* Simon, 1872 (Araneae, Leptonetidae). — *Revue Arachnologique*. **3** (2): 65-73. [*Leptoneta microphthalmia*].
- \* KABOUCHE, B. & LEDOUX, J.-C., 1997. — Une excursion arachnologique dans le Massif de la Sainte-Victoire. — *Faune de Provence*. **18**: 7-9. [36 esp.].
- \* KERVILLE, H. GADEAU DE, 1894. — Recherches sur les faunes marine et maritime de la Normandie. 1<sup>er</sup> voyage. — *Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen*. **30** (1): 53-126. [*Argyroneta aquatica*].
- \* KERVILLE, H. GADEAU DE, 1898. — Recherches sur les faunes marine et maritime de la Normandie. 2<sup>ème</sup> voyage. — *Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen*. **33**: 309-451. [16 esp.].
- \* KERVILLE, H. GADEAU DE, 1900. — Recherches sur les faunes marine et maritime de la Normandie. 3<sup>e</sup> voyage. — *Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen*. (4) **36**: 143-283. [20 esp.].
- \* KERVILLE, H. GADEAU DE, 1927. — Recherches botaniques et zoologiques effectuées, en 1926 et 1927 dans le cirque d'Espingo et la partie supérieure du val du port de Vénasque (canton de Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne). — *Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen*. **62-63** (=1926-1927): 139-203. [5 esp.].
- \* KERVILLE, H. GADEAU DE, 1932. — Mélanges entomologiques. 5<sup>ème</sup> mémoire. Distribution altitudinale des Arthropodes récoltés, entre 600 et 2600 mètres sous les pierres, les feuilles mortes et les mousses dans le canton de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). — *Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen*. **66-67** (=1930-1931): 402-468. [20 esp.].
- \* KERVILLE, H. GADEAU DE, 1935. — Invertébrés récoltés dans sept grottes des départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **60**: 358-368. [4 esp.].
- \* KNOFLACH, B., 1992. — Neue Robertus-Funde in den Alpen: *R. mediterraneus* Eskov et *R. robertus* sp. (Arachnida, Aranei, Theridiidae). — *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*. **79**: 161-171. [*Robertus mediterraneus*].
- \* KNOFLACH, B., 1993a. — *Theridion conigerum* Simon - rediscovered in Austria (Araneida: Theridiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **9** (6): 205-208. [*Theridion conigerum*].
- \* KNOFLACH, B., 1993b. — Das Männchen von *Episnius theridioides* Simon (Arachnida: Araneae, Theridiidae). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **66**: 359-366. [*Episnius theridioides*].
- \* KNOFLACH, B., 1994. — Zur Genitalmorphologie und Biologie der *Crustulina*-Arten Europas (Arachnida: Araneae, Theridiidae). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **67**: 327-346. [*Crustulina guttata*].
- \* KNOFLACH, B., 1996a. — Die Arten der *Steatoda phalerata*-Gruppe in Europa (Araneae, Theridiidae). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **69**: 377-404. [2 esp.].
- \* KNOFLACH, B., 1996b. — *Steatoda incomposita* (Denis) from southern Europe, a close relative of *Steatoda albomaculata* (Degeer) (Araneae: Theridiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **10** (4): 141-145. [2 esp.].
- \* KNOFLACH, B., 1999. — The comb-footed spider genera *Neottiura* and *Coleosoma* in Europe (Araneae, Theridiidae). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **72**: 341-371. [5 esp.].
- \* KNOFLACH, B. & THALER, K., 2000. — Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae). I. — *Memorie della Società entomologica italiana*. **78** (2): 411-442. [3 esp.].
- \* KOVOOR, J. & MUNOZ-CUEVAS, A., 2000. — Diversité des Arachnides dans les îles d'Hyères (Porquerolles et Port-Cros, Var, France). Modifications au cours du XX<sup>e</sup> siècle. — *Zoosystema*. **22** (1): 33-69. [169 esp.].
- \* KRAUS, O., 1955. — Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach., Araneae). — *Senckenbergiana Biologica*. **36** (5-6): 371-394. [76 esp.].
- \* KRAUS, O., 1967. — *Mysmena jobi* n. sp., eine Symphytognathide in Mitteleuropa (Araneae, Symphytognathidae). — *Senckenbergiana Biologica*. **48** (56): 387-399. [*Mysmenella jobi*].
- \* KRAUS, O. & BAUR, H., 1974. — Die Atypidae der West-Paläarkt. Systematik, Verbreitung und Bio-

- logie (Arach.: Araneae). — *Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*. (NF) **17**: 85-116. [2 esp.].
- \* KREMER, P., 1989. — Ontogénie du placement chez *Zygiella x-notata* (Araneae, Araneidae): étude en laboratoire et en milieu naturel. — *Biology of behaviour*. **14** (4): 277-289. [*Zygiella x-notata*].
- KUBCOVA, L., 2004. — A new spider species from the group *Philodromus aureolus* (Araneae, Philodromidae) in Central Europe. — *Denisia*, **12**: 291-304.
- \* LACOMBLE, J., 1992. — Observations scientifiques, Entomologie, *Atypus affinis*. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Amis du Muséum d'Autun*. **141**: p. 41. [*Atypus affinis*].
- \* LANCELEVÉE, 1884. — Arachnides recueillis aux environs d'Elbeuf. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles et du musée d'Elbeuf*. **1884**: 88-146. [283 esp.].
- \* LE BERRE, M., RAMOUSSE, R. & LE GUELTE, L., 1981. — Éco-éthologie des Argiopidae: 1. Évolution temporelle d'une population d'*Araneus diadematus* Clerck dans son milieu naturel. — *Atti della Società Toscana di scienze naturali, Memorie*. (B) **88**, suppl.: 72-82. [*Araneus diadematus*].
- \* LEBORGNE, R. & PASQUET, A., 1998. — Gestion écologique des friches humides (Dambach et Baerenthal) par des bovidés rustiques (Highland Cattle): impact sur les peuplements d'araignées. — *Annales scientifiques de la Réserve de la biosphère des Vosges du Nord*. **6** (1997-1998): 49-68. [114 esp.].
- \* LEBORGNE, R. & PASQUET, A., 2005. — Time of oviposition and reproductive success in *Argiope bruennichi* (Araneae: Araneidae). — *European Journal of Entomology*. **102**: 169-174. [*Argiope bruennichi*].
- \* LECLERC, J. & BLANDIN, P., 1991. — L'importance des interactions dans une population de l'araignée *Lepthyphantes flavipes* (Blackwall) (Araneida: Linyphiidae). — *Canadian Journal of Zoology*. **69**: 2246-2249. [*Lepthyphantes flavipes*].
- \* LEDOUX, J.-C., 1963. — Sur quelques araignées récoltées près d'Avignon et de Montpellier. — *L'Entomologiste*. **19** (5-6): 100-101. [5 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 1967. — Notes d'aranéologie. 1. Quelques araignées du Midi de la France. — *L'Entomologiste*. **23** (3): 68-73. [7 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 1972. — Notes d'aranéologie. 2. Quelques captures intéressantes dans le sud-est de la France. — *Bulletin de la Société d'étude de sciences naturelles de Vaucluse*. **1970-1972**: 93-95. [6 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 1973a. — Notes d'aranéologie. 3. *Pardosa occidentalis* (Araneae, Lycosidae), espèce nouvelle pour la France. — *L'Entomologiste*. **29** (1): 11-15. [*Pardosa occidentalis*].
- \* LEDOUX, J.-C., 1973b. — Sur quelques araignées nouvelles ou peu connues de France. *Compte Rendu de la deuxième réunion des arachnologues d'expression française du 1 au 3 juin 1973*; Université de Montpellier: 75-77. [5 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 1977. — Redescription de *Pritha nana* (Simon) (Araneae, Filistatidae). — *Revue Arachnologique*. **1** (2): 65-74. [*Pritha nana*].
- \* LEDOUX, J.-C., 1979. — *Theridion mystaceum* et *T. betteni*, nouveaux pour la faune française (Araneae, Theridiidae). — *Revue Arachnologique*. **2** (6): 283-289. [3 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 1993. — Liste des araignées récoltées à l'occasion du stage d'aranéologie du 27 août au 7 septembre 1992 dans la Réserve Naturelle de Nohèdes (Pyrénées-Orientales). — *Bulletin de la Société européenne d'arachnologie*. **6**: 30-31. [69 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 2000. — Araignées des ripisilves du Rhône (Gard et Vaucluse). — *Bulletin de la Société d'étude de sciences naturelles de Vaucluse*. **1997-2000**: 13-38. [166 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., 2004a. — De araneis Galliae I.6, *Nomisia henryi* Denis 1934 = *N. celerrima* (Simon 1914). — *Revue Arachnologique*. **15** (2): p. 21. [*Nomisia celerrima*].
- \* LEDOUX, J.-C., 2004b. — De araneis Galliae I.9, *Tegenaria dalmatica* Kulczynski. — *Revue Arachnologique*. **15** (2): 23-24. [*Tegenaria dalmatica*].
- \* LEDOUX, J.-C., EMERIT, M. & PINAULT, G., 1995. — Les araignées de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. — *Travaux de la Réserve naturelle de la Massane*. **40**: 1-18. [161 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., EMERIT, M. & PINAULT, G., 1996a. — Les araignées et opilions de Nohèdes (Pyrénées Orientales). *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 36 p. [341 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., EMERIT, M. & PINAULT, G., 1996b. — Les araignées du massif des Aiguilles Rouges. *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 9 p. [103 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & EMERIT, M., 1996c. — Rapport sur les araignées récoltées en 1995 au massif des Aiguilles Rouges. *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 11 p. [179 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & RAPHAËL, B., 1999a. — Araignées de la réserve naturelle du Mas Larrieu (Argelès, Pyrénées Orientales). — *Travaux de la Réserve Naturelle du Mas Larrieu*. **7**: 1-17. [121 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & EMERIT, M., 1999b. — Observations sur le peuplement aranéologique de la réserve naturelle des Vallées de Grand-Pierre et de Vitain. — *Publication du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre*. **7**: 62-69. [208 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & EMERIT, M., 2001. — Certitudes et incertitudes sur la répartition des araignées: le cas de quelques espèces de la faune pyrénéenne. *Proceedings of the International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Arboussols (France), 30 August 1999 - 4 September 1999*: 47-57. [4 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & EMERIT, M., 2002. — Araignées de la réserve naturelle de Saint-Privé-Saint-Mesmin. *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 29 p. [170 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C., RAPHAËL, B. & EMERIT, M., 2003. — Araignées de la réserve naturelle de Jujols (Pyrénées Orientales). *Office pour l'information éco-entomologique du Languedoc-Roussillon*: 21 p. [180 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & EMERIT, M., 2004a. — De araneis Galliae I.11, *Evarcha michailovi* Logunov, 1992. — *Revue Arachnologique*. **15** (2): 25-26. [2 esp.].
- \* LEDOUX, J.-C. & ROLLARD, C., 2004b. — De araneis Galliae I.1, *Cryptodrassus hungaricus* (Balogh).

- *Revue Arachnologique*. **15** (2): p. 16. [*Cryptodrassus hungaricus*].
- LE DUCHAT D'AUBIGNY, J., 1979. — Inventaires de faune et de flore : bibliographie concernant la France, Arachnides sauf Acariens. *Université de Rennes, Laboratoire de zoologie et d'écologie*: 75 p.
- \* LEGENDRE, R., 1973. — Présence de la mygale *Atypus affinis* Eichwald 1830 Atypidae dans la région de Ceilhes (Hlt). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **1** (=42): 6-7. [*Atypus affinis*].
- \* LENICE, E., 1992. — Arachnides des Ardennes capturés et répertoriés selon le guide des Araignées et des Opilions d'Europe par D. Jones. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*. **82**: 59-60. [46 esp.].
- \* LE PERU, B., 2004. — Inventaire des araignées d'une vallée du Massif Central (France) (Arachnida, Araneae). — *Revue Arachnologique*. **15** (1): 1-14. [210 esp.].
- \* LEPRIEUR, C.-E., 1880. — Arachnides alsato-vosgiens. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar*. **20-21**: 441-443. [46 esp.][Même document que REIBER, 1880].
- \* LESNE, P., 1933. — À propos de *Physocyclus simoni* Berl. — *Bulletin de la Société de sciences naturelles de Seine-et-Oise*. (3) **1** (1-2): 102-103. [*Psilochorus simoni*].
- \* LESSERT, R. DE, 1904. — Observations sur les araignées du bassin du Léman et de quelques autres localités suisses. — *Revue suisse de zoologie*. **12**: 269-450. [106 esp.].
- \* LESSERT, R. DE, 1909. — Note sur deux araignées nouvelles de la famille des Argiopidae. — *Revue suisse de zoologie*. **17**: 79-83. [*Lessertinella kulczynskii*].
- \* LESSERT, R. DE, 1910. — Catalogue des Invertébrés de la Suisse. 3. Araignées. *Muséum d'histoire naturelle de Genève*: 639 p. [199 esp.].
- \* LETACQ, A.-L., 1913. — L'Argyronète dans le Marais de Briouze (Orne). — *Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen*. **48**: 38-41. [*Argyroneta aquatica*].
- LEHTINEN, P.T., 1967. — Classification of the Cribellates spiders. — *Annales Zoologici Fennici*. **4**: 199-468.
- LEVI, H.W., 1980. — The orb-weaver genus *Mecynogea*, the subfamily Metinae and the genera *Pachygnatha*, *Glenognatha* and *Azilia* of the subfamily Tetragnathinae north of Mexico (Araneae: Araneidae). — *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*. **149**: 1-74.
- LEVI, H.W., 1991. — The Neotropical and Mexican species of the orb-weaver genera *Araneus*, *Dubiepeira*, and *Aculepeira* (Araneae: Araneidae). — *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*. **152**: 167-315.
- LEVY, G., 1986. — Spiders of the genera *Siwa*, *Larinia*, *Lipocrea* and *Drexelia* (Araneae: Araneidae) from Israel. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **7** (1): 1-10.
- LEVY, G., 1998a. — Twelve genera of orb-weaver spiders (Araneae) from Israel. — *Israel Journal of Zoology*. **43**: 311-365.
- LEVY, G., 1998b. — The ground-spider genera *Setaphis*, *Trachyzelotes*, *Zelotes*, and *Drassyllus* (Araneae: Gnaphosidae) in Israel. — *Israel Journal of Zoology*. **44**: 93-158.
- LEVY, G., 1999. — Spiders of six uncommon drassoidine genera (Araneae: Gnaphosidae) from Israel. — *Israel Journal of Zoology*. **45**: 427-452.
- \* LEVY, G., 2002. — Spiders of the genera *Micaria* and *Aphantaulax* (Araneae, Gnaphosidae) from Israel. — *Israel Journal of Zoology*. **48**: 111-134. [*Aphantaulax trifasciata*].
- LOCKET, G.H., 1975. — The identity of Blackwall's *Tegenaria saeva* (Araneae, Agelenidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (4): 85-90.
- LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F., 1951. — British Spiders. *Ray Society, London*. Vol. 1: 310 p.
- LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F., 1953. — British Spiders. *Ray Society, London*. Vol. 2: 449 p.
- LOGUNOV, D.V., 1998. — *Pseudeuophrys* is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae). — *Revue Arachnologique*. **12** (11): 109-128.
- \* LOGUNOV, D.V., 2000. — A redefinition of the genera *Bianor* Peckham & Peckham, 1885 and *Harmochirus* Simon, 1885, with the establishment of a new genus *Sibianor* gen. n. (Aranei: Salticidae). — *Arthropoda Selecta*. **9** (4): 221-286. [3 esp.].
- \* LOGUNOV, D.V., 2004. — Notes on new and poorly known Palaearctic species of the genera *Neon*, *Sitticus* and *Synageles* (Araneae: Salticidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **13** (2): 33-40. [*Sitticus rivalis*].
- \* LOGUNOV, D.V. & KRONESTEDT, T., 1997. — A new Palearctic species of the genus *Sitticus* Simon, with notes on related species in the floricola group (Araneae, Salticidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **10** (7): 225-233. [*Sitticus rupicola*].
- \* LOGUNOV, D.V. & KRONESTEDT, T., 2003. — A review of the genus *Talavera* Peckham and Peckham, 1909 (Aranea, Salticidae). — *Journal of Natural History*. **37**: 1091-1154. [2 esp.].
- \* LOPEZ, A., 1973. — Les Aranéides du Biterrois. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **1** (= 42): 8-14. [3 esp.].
- \* LOPEZ, A., 1974. — Les Aranéides du Biterrois (suite). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **2** (= 43): 3-8. [4 esp.].
- \* LOPEZ, A., 1975. — Les Aranéides du Biterrois (suite). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **3** (= 44): 3-9. [5 esp.].
- \* LOPEZ, A., 1976. — Les araignées du Biterrois (suite). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **4** (= 45): 3-16. [7 esp.].
- \* LOPEZ, A., 1983. — État de nos connaissances sur l'araignée souterraine *Telema tenella* Simon (Telemide) 'fossile vivant' du Canigou. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **9** (= 50): 20-28. [*Telema tenella*].
- \* LOPEZ, A. & LLINARES, D., 1973. — À propos de quelques particularités histologiques observées chez

- Argyroneta aquatica Cl. (Araneae). — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **98** (2): 307-312. [*Argyroneta aquatica*].
- \* LOPEZ, A. & SALVAYRE, H., 1976. — L'araignée cavernicole pyrénéenne *Telema tenella* Simon et son habitat. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **4** (= 45): 17-26. [*Telema tenella*].
- \* LOPEZ, A., RIBERA, C., SALINES, S., GUILHAUMON, J. & MARCOU, F., 1977. — Recherches sur la faune cavernicole de l'arrondissement Béziers-Saint-Pons Note préliminaire (Aranéides, Crustacés). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **5** (=46): 26-44. [3 esp.].
- \* LOPEZ, A. & EMERIT, M., 1978a. — Le dimorphisme sexuel gnathocoxal de *Leptoneta microphthalmalma* Simon, 1872 (Araneae, Leptonetidae). — *Revue Arachnologique*. **2** (1): 1-15. [*Leptoneta microphthalmalma*].
- \* LOPEZ, A., MAZEL, R., MARCOU, F., FAURE, J., GUILHAUMON, J. & DELABIE, J., 1978b. — Recherches sur la faune cavernicole de l'arrondissement de Béziers-Saint-Pons, deuxième note (Arachnides, insectes). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **6** (= 47): 4-37. [6 esp.].
- \* LOPEZ, A. & MARCOU, F., 1979. — Synopsis de la faune souterraine en Montagne Noire: les invertébrés «cavernicoles» et leurs stations. — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **7** (= 48): 4-11. [13 esp.].
- \* LOPEZ, A. & MARCOU, F., 1981. — La répartition de deux *Meta* troglaphiles dans l'ouest de l'Hérault *Meta bournetii* Simon, 1922 et *Meta menardi* (Latreille, 1804) (Araneae, Araneidae, Metinae). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **8** (= 49): 4-11. [2 esp.].
- \* LOPEZ, A., EMERIT, M., MARCOU, F. & SALINES, S., 1985. — Faune de la grotte de Cailhol (Hérault). — *Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers*. N.S. **10** (= 51): 90-93. [4 esp.].
- \* LUCANTE, A., 1880a. — Catalogue raisonné des Arachnides observés jusqu'à ce jour dans les départements du sud-ouest de la France. — *Bulletin de l'Association scientifique de Gironde*, **1880** (4): 88-95, (5): 113-122, et *Bordeaux, Durand*: 47-63. [92 esp.].
- \* LUCANTE, A., 1880b. — Tableau synoptique des arachnides observés jusqu'à ce jour dans le sud-ouest de la France et leur distribution dans chaque département. — *Bulletin de l'Association scientifique de la Gironde*. **1880** (6): 137-143. [171 esp.].
- \* LUCAS, H., 1836. — [Description de l'*Attus venator*.] — *Magasin de zoologie de Guérin*. **6** (VIII): pl. 15. [*Synageles venator*].
- \* LUCAS, H., 1845. — [Note sur la *Clotho durandii*.] — *Annales de la Société entomologique de France*. (2) **8**: XXV-XXVI. [*Uroctea durandi*].
- \* LUCAS, H., 1847a. — [Note sur la ponte d'une *Scytodes thoracica*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **5**: VIII-IX. [*Scytodes thoracica*].
- \* LUCAS, H., 1847b. — [Note sur un individu d'*Epinus truncatus*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **5**: XLIII-XLIV. [*Epinus truncatus*].
- \* LUCAS, H., 1847c. — [Note sur une *Latrodectus martius* trouvée aux environs de Paris.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **7**: XLVIII-XLIX. [*Latrodectus tredecimguttatus*].
- \* LUCAS, H., 1847d. — [Note sur une variété de l'*Epeira diadema*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **9**: p. LXXVII. [*Araneus diadematus*].
- \* LUCAS, H., 1848. — [Note sur un *Latrodectus martius*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **6**: p. XCI. [*Latrodectus tredecimguttatus*].
- \* LUCAS, H., 1849a. — Description et figure d'une nouvelle espèce d'Aranéide appartenant au genre *Theiridion*. — *Annales de la Société entomologique de France*. (2) **7**: 179-184. [*Dictyna civica*].
- \* LUCAS, H., 1849b. — [Une Aranéide nouvelle pour la Faune parisienne: *Salticus formicaeformis*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **8**: p.LII. [*Leptorchestes berolinensis*].
- \* LUCAS, H., 1849c. — [Sur une Aranéide du genre *Eresus*: *E. cinnaberinus*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (2) **7**: p. LXXXI. [*Eresus niger*].
- \* LUCAS, H., 1853. — [Sur une variété de l'*Epeira scalaris*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (3) **1**: LIV-LV. [*Araneus marmoreus*].
- \* LUCAS, H., 1859. — [Note sur *Atypus sulzeri*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (3) **7**: CLXIX-CLXXII. [aucune espèce valide].
- \* LUCAS, H., 1863. — Note sur une variété de la *Segestria florentina*. — *Annales de la Société entomologique de France*. (4) **3**: 417-418. [*Segestria florentina*].
- \* LUCAS, H., 1864. — [Note sur *Atypus piceus* dans la forêt de Fontainebleau.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (4) **4**: p. LI. [*Atypus piceus*].
- \* LUCAS, H., 1868. — [Note sur les Crustacés et les Aranéides trouvés aux environs de Roscoff.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (4) **8**: XCI-XCIV. [21 esp.].
- \* LUCAS, H., 1870a. — [Notes sur *Thomisus citrinus* et sur *Attus doumerci*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (4) **10**: LIV-LV. [aucune espèce valide].
- \* LUCAS, H., 1870b. — [Aranéides signalées à Celles-Bains (Ardèche).] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (4) **10**: XCVIII-XCIX. [13 esp.].
- \* LUCAS, H., 1870c. — Quelques remarques sur les Aranéides qui habitent le Calvados, particulièrement les environs de Honfleur. — *Revue et Magasin de zoologie*. **22**: 229-232. [5 esp.].
- \* LUCAS, H., 1870d. — Quelques remarques sur les Aranéides qui habitent le Calvados, particulièrement les environs de Honfleur (suite). — *Revue et Magasin de zoologie*. **22**: 249-252. [34 esp.].

- \* LUCAS, H., 1870e. — Quelques remarques sur les Aranéides qui habitent le Calvados, particulièrement les environs de Honfleur. — *Revue et Magasin de zoologie*. 22: 266-269. [14 esp.].
- \* LUCAS, H., 1871a. — [Liste d'Aranéides rencontrées au Portrieux.] — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) 1: 457-459. [36 esp.].
- \* LUCAS, H., 1871b. — Quelques mots sur le *Marpissus muscosus* de Clerck, Aranéide de la tribu des Attides. — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) 1: 461-462. [*Marpissa muscosa*].
- \* LUCAS, H., 1871c. — [Note sur une Aranéide Théracéphose appartenant au genre *Atypus*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 1: LXXXII-LXXXIV. [*Atypus piceus*].
- \* LUCAS, H., 1872. — [Aranéides observées dans le département de l'Yonne.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 2: LII-LIV. [60 esp.].
- \* LUCAS, H., 1873a. — [Note sur le cocon de l'*Agraeca brunnea*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 3: CXIV-CXV. [*Agroeca brunnea*].
- \* LUCAS, H., 1873b. — [Note sur *Cheiracanthium nutrix*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 3: CCII-CCIII. [*Cheiracanthium puncturium*].
- \* LUCAS, H., 1874a. — Note sur l'habitat de deux Arachnides (*Plexippus* (*Attus*) *adansonii* et *Tetranychus lintearius*). — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) 3: 351-352. [*Hasarius adansonii*].
- \* LUCAS, H., 1874b. — [Note sur *Cteniza fodiens*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 4: LXXXVII-LXXXVIII. [*Cteniza sauvagesi*].
- \* LUCAS, H., 1874c. — [Note sur des Arachnides rencontrées dans le Calvados.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 4: CXXX-CXXXII. [28 esp.].
- \* LUCAS, H., 1875. — [Note sur des Arachnides rencontrées aux environs de Paris.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 5: CXXXII-CXXXIII. [57 esp.].
- \* LUCAS, H., 1876. — [Note sur des Aranéides recueillis aux environs de Paris.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 6: p.CLXI. [12 esp.].
- \* LUCAS, H., 1877a. — Un mot sur la nidification de la *Dysdera erythrina*. — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) 7: 49-52. [*Dysdera erythrina*].
- \* LUCAS, H., 1877b. — [Note sur des Arachnides rencontrées dans le Calvados.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 7: CLXXXVII-CLXXXIX. [23 esp.].
- \* LUCAS, H., 1878a. — Observations sur les Arachnides qui habitent la Champagne principalement les environs de Sézanne. — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) 8: 49-66. [47 esp.].
- \* LUCAS, H., 1878b. — Note sur quelques Arachnides rencontrées sur le littoral du département de la Manche. — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) 8: 191-200. [50 esp.].
- \* LUCAS, H., 1880. — [Note relative à une Aranéide de la tribu des Attides: *Euophrys erratica*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). (5) 10: p. CVIII. [*Euophrys erratica*].
- \* LUCAS, H., 1882a. — Note sur quelques Arachnides recueillis en Bretagne particulièrement aux environs de Préfaïlles. — *Annales de la Société entomologique de France*. (6) 2: 189-200. [48 esp.].
- \* LUCAS, H., 1882b. — [Note sur *Euophrys erratica*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (Bulletin). 1882: LXXXI-LXXXII. [*Euophrys erratica*].
- \* LUCZACK, J. & VEDOVINI, A., 1964. — Note préliminaire sur les Araignées cavernicoles des environs de Marseille. — *Vie et Milieu*. 15 (3): 709-714. [13 esp.].
- \* LUGETTI, G. & TONGIORGI, P., 1969. — Ricerche sul genere *Alopecosa* Simon (Araneae, Lycosidae). — *Atti della Società Toscana di scienze naturali*. (B) 76: 1-100. [2 esp.].
- \* MACHADO, A. DE B., 1949. — Araignées nouvelles pour la faune portugaise (III). — *Publicações do Instituto de zoologia do Porto*. 38: 1-69. [2 esp.].
- \* MAGNÉ, J., 1967. — La grotte des Cluzets, commune de Blasimon (Gironde). Etudes biospéléologique. — *Spelunca. Mémoires* 5: 285-288. [2 esp.].
- \* MAGNÉ, J., 1969. — Araignées et opilions des grottes de l'Entre-deux-mers (Gironde). — *Bulletin de Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux*. 18-19: 55-57. [6 esp.].
- \* MAIL, R.F., 1916. — [Note sur l'*Argiope fasciata*] — *Bulletin de la Société linnéenne de Seine-Maritime*. 2 (suppl.): 9-10. [*Argiope bruennichi*].
- \* MANACH, A., 1995. — Liste des Linyphiidae identifiées dans le Finistère de septembre 1994 à mai 1995. — *Pénélope*. 18: 44-45. [83 esp.].
- \* MARC, P., 1990a. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. X. Micariidae, Liocranidae, Clubionidae, Zoridae, Anyphaenidae, Eusparassidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. 61, H.S. 1: 211-234. [47 esp.].
- \* MARC, P., 1990b. — Données sur le peuplement d'aranéides des troncs de pins. — *Bulletin de la Société européenne d'arachnologie*. H.S. 1: 255-260. [41 esp.].
- \* MARPLES, M.J., 1935. — Notes on *Argiope bruennichi* and other pyrenean spiders. — *Journal of the Linnean Society of London*. 39: 195-202. [2 esp.].
- MARUSIK, Y.M., KOPONEN, S. & DANILOV, S.N., 2001. — Taxonomic and faunistic notes on linyphiids of Transbaikalia and south Siberia (Araneae, Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. 12 (2): 83-92.
- \* MAURER, R., 1981. — Zur Kenntnis der Gattung *Coelotes* (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern II. — *Bolletino del Museo civico di storia naturale di Verona*. 8: 165-183. [3 esp.].
- \* MAURER, R. & THALER, K., 1988. — Über bemerkenswerte Spinnen des Parc National du Mercantour (F) und seiner Umgebung (Arachnida: Araneae). — *Revue suisse de zoologie*. 95 (2): 329-352. [9 esp.].



- \* MAURER, R., 1992. — Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae)- Beschreibung von *C. montanus* n. sp. und *C. intermedius* n. sp. — *Revue suisse de zoologie*. **99** (1): 147-162. [*Cybaeus raymondi*].
- MELIC, A. & MORANO, E., 2002. — El reino animal en la península ibérica y las islas baleares, versión 25-01-2002. *Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas*. Internet: <http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es.php>.
- \* MERIGUET, B., 1999. — Observation d'*Atypus* cf. *affinis* à Melun intra-muros. — *Bulletin de Phyllie*. **2**: 18-19. [*Atypus affinis*].
- MERRETT, P., 1963. — On a soil-dwelling linyphiid spider, *Wiehlea calcarifera* (Simon). — *Annals and Magazine of natural history*. **13** (5): 625-630.
- MERRETT, P., 1980. — Notes on the variation, identification and distribution of British species of the *Tegenaria atrica* group (Araneae, Agelenidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **5** (1): 1-8.
- MERRETT, P., 1998. — *Lathys puta* (O. P.-Cambridge, 1863) is a junior synonym of *Argenna subnigra* (O. P.-Cambridge, 1861), not a senior synonym of *Lathys stigmatisata* (Menge, 1869) (Araneae: Dictynidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **11** (3): p. 120.
- \* MERRETT, P., 2001. — *Clubiona pseudoneglecta* Wunderlich, 1994, a clubionid spider new to Britain (Araneae: Clubionidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **12** (1): 32-34. [*Clubiona pseudoneglecta*].
- \* METZNER, H., 1997. — Neues zur Springspinnenfauna Deutschlands (Arachnida: Araneae: Salticidae). — *Entomologische Zeitschrift*. **107** (6): 258-264. [2 esp.].
- \* METZNER, H., 1999. — Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. — *Andrias*. **14**: 1-279. [13 esp.].
- \* MILLIDGE, A.F., 1975a. — Some new or little-known Erigonid spiders from southern Europe. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (5): 120-125. [3 esp.].
- \* MILLIDGE, A.F., 1975b. — Re-examination of the erigonine spiders '*Micrargus herbigradus*' and '*Pocadicnemis pumila*' (Araneae: Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (6): 145-155. [3 esp.].
- MILLIDGE, A.F., 1975c. — A taxonomic revision of the genus *Erigonoplus* Simon 1884 (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (4): 95-100.
- MILLIDGE, A.F., 1976. — Re-examination of the erigonine spiders *Micrargus herbigradus* and *Pocadicnemis pumila* (Araneae: Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (6): 145-155.
- MILLIDGE, A.F., 1977a. — The genera *Mecopisthes* Simon and *Hypsocephalus* n. gen. and their phylogenetic relationships (Araneae, Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **4** (3): 113-123.
- MILLIDGE, A.F., 1977b. — The conformation of the male palpal organs of linyphiid spiders, and its application to the taxonomic and phylogenetic analysis of the family (Araneae: Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **4** (1): 1-60.
- \* MILLIDGE, A.F., 1979. — Some erigonine spiders from southern Europe. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **4** (7): 316-328. [8 esp.].
- MILLIDGE, A.F., 1981. — A revision of the genus *Goniatium* (Araneae: Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **5** (6): 253-277.
- MILLIDGE, A.F., 1983. — The erigonine spiders of North America. Part 6. The genus *Walckenaeria* Blackwall (Araneae, Linyphiidae). — *Journal of Arachnology*. **11**: 105-200.
- MILLIDGE, A.F., 1988. — Genus *Prinerigone*, gen. nov. (Araneae, Linyphiidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **7** (7): p. 216.
- MORITZ, M., 1973. — Neue und seltene Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) aus der DDR. — *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. (NF) **20**: 173-220.
- \* MORTON, W., 1922. — Notes sur *Ctenyza* (fodiens) *sauvagei*, la mygale de Corse — *Revue d'histoire naturelle appliquée*. **3** (1): 9-12. [*Ctenyza sauvagesi*].
- \* MULLER, F. & SCHENKEL, E., 1895. — Verzeichnis des Spinnen von Basel und Umgegend. — *Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel*. **10**: 691-824. [110 esp.].
- \* MÜLLER, H.-G., 1985. — Faunistische Notizen über Spinnen aus der Provence und den französischen Alpen (Arachnida: Araneida). — *Neue Entomologische Nachrichten*. **17**: 43-51. [57 esp.].
- \* MÜLLER, H.-G., 1986. — Spinnen von der Insel Korsika, I. Das bisher unbekannte Männchen von *Syedra nigrotibialis* Simon 1884 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). — *Senckenbergiana biologica*. **67** (13): 183-185. [*Syedra nigrotibialis*].
- \* MÜLLER, H.-G. & HEIMER, S., 1991. — Spiders from Corsica III. Redescription of *Lepthyphantes longisetus* Simon, 1884 from the Tartagine Forest. — *Reichenbachia*. **28** (22): 109-112. [*Lepthyphantes longisetus*].
- \* MURPHY, J., 1994. — Brittany, May 1992: an impersonal view — *Newsletter of the British Arachnological Society*. **69**: 2-4. [78 esp.].
- \* MUSTER, C. & THALER, K., 2004a. — New species and records of Mediterranean Philodromidae (Arachnida, Araneae): I. *Philodromus aureolus* group. — *Denisia*. **12**, (N.S.14): 305-326. [6 esp.].
- MUSTER, C & THALER, K., 2004b. — The *Thanatus striatus* species group in the eastern Alps, with a description of *Thanatus firmetorum* sp. n. (Araneae: Philodromidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **12** (8): 376-382.
- \* NOËL, F., BRAUD, S. & MOURGAUD, G., 2005. — Étude du peuplement arachnologique des Basses Vallées Angevines par la méthode des pots-piège. — *Anjou Nature*. **1**: 83-91. [36 esp.].
- \* O'NEIL, G., 1979. — Novices in Corsica. — *The Secretary's News Letters of the British Arachnological Society*. **26**: 10-11. [7 esp.].

- ONO, H., 1988. — A revisional study of the spider family Thomisidae (Arachnida, Araneae) of Japan. — *National Science Museum, Tokyo*: 252 p.
- \* ORHANT, G., 1997. — Observation de l'Épeire fasciée (*Argiope bruennichi*) dans l'ouest du Pas-de-Calais. — *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*. **285**: p. 11. [*Argiope bruennichi*].
- OVTSHARENKO, V.I. & MARUSICK, Y.M., 1988. — Spiders of the family Gnaphosidae (Aranei) of the north-east of the USSR (the Magadan Province). — *Entomologicheskoe Obozrenie*. **67**: 204-217.
- OVTSHARENKO, V.I., PLATNICK, N.I. & SONG, D.X., 1992. — A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae). — *Bulletin of the American Museum of Natural History*. **212**: 1-88.
- OVTSHARENKO, V.I., PLATNICK, N.I. & MARUSIK, Y.M., 1995. — A review of the Holarctic ground spider genus *Parasyrisca* (Araneae, Gnaphosidae). — *American Museum Novitates*. **3147**: 1-55.
- OXFORD, G. & SMITH, C.J., 1987. — The distribution of *Tegenaria gigantea* Chamberlin & Ivie, 1935 and *T. saeva* Blackwall, 1844 (Araneae, Agelenidae) in Yorkshire. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **7** (4): 123-127.
- OXFORD, G. & PLOWMAN, A., 1991. — Do large house spiders *Tegenaria gigantea* and *T. saeva* (Araneae, Agelenidae) hybridise in the wild? A multivariate approach. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **8** (9): 293-296.
- OXFORD, G. & REILLO, P.R., 1994. — The world distributions of species within the *Enoplognatha ovata* group (Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **9** (7): 226-232.
- \* OXFORD, G. & MERRETT, P., 2000. — *Tegenaria ferruginea* (Panzer) in Britain, and differences from *T. parietina* (Foucroy) (Araneae: Agelenidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **11** (8): 331-334. [*Tegenaria ferruginea*].
- \* PASQUET, A., 1984. — Répartition de deux espèces d'araignées orbitèles, *Araneus marmoreus* (Clerk) et *A. diadematus* (Clerk), dans une prairie en friches. — *Biology of behaviour*. **9** (4): 321-331. [2 esp.].
- \* PASQUET, A. & LEBORGNE, R., 1992. — Contribution à la connaissance des peuplements d'araignées des prairies et friches des vallées des Vosges du Nord. — *Annales scientifiques de la Réserve de la biosphère des Vosges du Nord*. **2** (1992): 81-94. [163 esp.].
- PESARINI, C., 1993. — Note su alcuni Zodarion Walckenaer della fauna italiana, con descrizione di una nuova species (Araneae, Zodariidae). — *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*. **133**: 5-12.
- PESARINI, C., 2003. — Checklist of the Italian fauna on-line, Araneae. Version 2.0 december 2003. *Ministero dell'Ambiente et della Tutela del Territorio*. Internet: <http://www.faunaitalia.it.html>.
- \* PÉTILLON, J., YSNEL, F., LE GLEUT, S., LEFEUVRE, J.-C. & CANARD, A., 2004. — Responses of spider communities to salinity and flooding in a tidal salt marsh (Mont St-Michel Bay, France). — *Arthropoda Selecta*, H.S. **1**: 235-248. [73 esp.].
- \* PETIT, G., SCHACHTER, D. & SOYER, B., 1945. — Contribution à l'étude biologique de la Camargue: notes sur la faune lapidicole des bords des étangs en Camargue. — *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de Marseille*. **5** (3): 87-98. [11 esp.].
- \* PEYERIMHOFF, P. DE, 1906. — Recherches sur la faune cavernicole des Basses-Alpes. — *Annales de la Société entomologique de France*. **75**: 203-222. [4 esp.].
- \* PHISALIX, 1922. — Effet de la piqûre de la mygale de Corse (*Cteniza sauvagei*, Rossi) et modes de réaction de ses victimes. — *Revue d'histoire naturelle appliquée*. **3** (1): 28-32. [*Cteniza sauvagesi*].
- \* PICKARD-CAMBRIDGE, O., 1874. — On some new species of Drassides. — *Proceedings of the Zoological Society of London*. **1874**: 370-419. [2 esp.].
- \* PICKARD-CAMBRIDGE, O., 1875a. — On some new species of Erigone. Part 1. — *Proceedings of the Zoological Society of London*. **1875**: 190-224. [17 esp.].
- \* PICKARD-CAMBRIDGE, O., 1875b. — On some new species of Erigone. Part 2. — *Proceedings of the Zoological Society of London*. **1875**: 322-335. [46 esp.].
- \* PICKARD-CAMBRIDGE, O., 1898. — On some Spiders from Savoy. — *Proceedings of the Zoological Society of London*. **1898**: 487-491. [29 esp.].
- \* PIERRE, F. & THEODORIDES, J., 1947. — La cohabitation de *Dichirotrichus pubescens* Payk., de *Bleddius spectabilis* Kraatz (Coleoptera) et *Paragnatha formica* Hesse (Gnathiidae) dans le schorre, à l'estuaire de la Penzé (Finistère). — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **71**: 151-156. [*Erigone dentipalpis*].
- \* PIONNEAU, P., 1911. — Première contribution à la faune des Aranéides de la Loire-Inférieure. — *Bulletin de la Société de sciences naturelles de l'Ouest de la France*. (3) **1**: 141-143. [19 esp.].
- \* PLANET, L., 1905. — Histoire naturelle de la France. 14<sup>ème</sup> partie: Araignées. *Deyrolles, Paris*: 341p. [12 esp.].
- \* PLATNICK, N.I., 1975. — A revision of the Holarctic spider genus *Callilepis* (Araneae, Gnaphosidae). — *American Museum Novitates*. **2573**: 1-32. [*Callilepis nocturna*].
- \* PLATNICK, N.I. & MURPHY, J.A., 1984. — A revision of the spider genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae). — *American Museum Novitates*. **2792**: 1-30. [2 esp.].
- \* PLATNICK, N.I. & MURPHY, J.A., 1996. — A review of the zelotine ground spider genus *Setaphis* (Araneae, Gnaphosidae). — *American Museum Novitates*. **3162**: 1-23. [2 esp.].
- PLATNICK, N.I., 2004. — The world spider catalog, version 4.5. *American Museum of Natural History*. Internet: <http://research.amnh.org.html>.
- \* PLAZANET, J.-L., 1995. — À propos d'*Atypus affinis* Eichwald, 1830. — *Arachnides*. **25**: 7-8. [*Atypus affinis*].
- \* PONEL, P., 1983. — Contribution à la connaissance de la communauté des arthropodes psammophiles de l'isthme de Giens. — *Travaux scientifiques du Parc National de Port-Cros*. **9**: 149-182. [3 esp.].

- \* PONEL, P., 1984. — Recherches sur la communauté des Arthropodes terrestres des sables littoraux de la plage de la Palud (île de Port-Cros, Var). — *Travaux scientifiques du Parc national de Port-Cros*. **10**: 109-117. [2 esp.].
- \* PONEL, P. & BIGOT, L., 1993. — Premiers résultats de l'étude de la faune des Arthropodes frondicoles soumises aux embruns dans le Parc national de Port-Cros (Var, France). — *Scientific reports of the Port-Cros national Park*. **15**: 233-246. [25 esp.].
- PROSZYNSKI, J., 1962. — Spiders of the Zawada forestry on the Notec River. — *Fragmenta Faunistica*, Warszawa. **10**: 205-214.
- PROSZYNSKI, J., 1984. — Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae (Araneae). — *Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlcech*. **2**: 1-177.
- \* PRUDON, X., 1894. — Étude sur les Araignées de la région. — *Bulletin de la Société de sciences naturelles de l'Ain*. **1894** (1): 52-59. [5 esp.].
- \* RAHOLA, P., 2005. — Observations sur la biologie de *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) dans le Gard (sud de la France) (Hymenoptera, Sphecidae). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **110** (3): 331-336. [2 esp.].
- \* RAPHAËL, B., EMERIT, M. & BONARIC, J.-C., 1992. — Contribution à l'étude du peuplement aranéidien épigé des gorges de l'Ardèche (France). — *Revue Arachnologique*. **9** (11): 165-173. [96 esp.].
- \* RASTEL, D., 1998. — Confirmation de la présence d'*Atypus affinis* (Eichwald, 1830) en forêt de Rambouillet. — *Arachnides*. **36**: 12-13. [*Atypus affinis*].
- \* RAZET, P., 1953. — Notes de faunistique armoricaine (2<sup>me</sup> note). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **26**: 33-41. [*Argiope bruennichi*].
- \* REHFELDT, G., 1992. — Impact of predation by spiders on a territorial damselfly (Odonata: Calopterygidae). — *Oecologia*. **89**: 550-556. [4 esp.].
- \* REIBER, F., 1880. — Arachnides alsato-vosgiens. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar*. **20-21**: 441-443. [46 esp.][Même document que LEPRIEUR, 1880].
- \* REMY, A., 1950. — Grottes de Corse. — *Annales de spéléologie*. **5** (1): 3-47. [3 esp.].
- \* REMY, P., 1927. — Sur la faune des grottes de Sainte-Reine, près de Pierre-la-Treiche (Meurthe-et-Moselle). — *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*. **6** (15): 118-120. [6 esp.].
- \* REMY, P., 1932a. — Trois espèces intéressantes de la faune vosgienne. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Moselle*. **33** (4) 9: 47-54. [*Argiope bruennichi*].
- \* REMY, P., 1932b. — Contribution à l'étude de la faune cavernicole de Lorraine: les grottes de Sainte-Reine. — *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Moselle*. **33** (4) 9: 55-71. [6 esp.].
- \* REMY, P., 1946. — Notes faunistique. III. Insectes. Araignées. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **51**: 76-78. [*Argiope bruennichi*].
- \* RENNER, F., 1987. — Revision der europäischen Dolomedes-Arten (Araneida, Pisauridae). — *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde*. (A) **406**: 1-15. [2 esp.].
- ROBERTS, M.J., 1985. — The Spiders of Great Britain and Ireland. *Harley Books, Colchester*. Vol. 1: 229 p.
- ROBERTS, M.J., 1987. — The Spiders of Great Britain and Ireland. *Harley Books, Colchester*. Vol. 2: 204 p.
- ROBERTS, M.J., 1995. — Spiders of Britain & Northern Europe. *Collins, London*: 383 p.
- \* RODMAN, G.H., 1919. — The Egg-case of a Spider from Cannes. — *Proceedings of the Linnean Society of London*. **131**: 78-80. [3 esp.].
- \* ROEWER, C.F., 1926. — Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süßwasserfauna Korsicas. I. Arachnoidea. — *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin*. **12** (2): 271-273. [22 esp.].
- ROEWER, C.F., 1942. — Katalog der Araneae von 1758 bis 1940. *Bremen*. Band 1: 1040 p.
- ROEWER, C.F., 1951. — Neue Namen einiger Araneen-Arten. — *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen*. **32**: 437-456.
- ROEWER, C.F., 1954. — Katalog der Araneae von 1758 bis 1940. *Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles*. Band 2: 1751 p.
- \* ROLLARD, C., 1990a. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. VI. Nesticidae, Theridiosomatidae, Tetragnathidae, Metidae, Argiopidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. 1: 123-146. [43 esp.].
- \* ROLLARD, C., 1990b. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. VII. Uloboridae, Dictynidae, Eresidae, Amaurobiidae, Titanoecidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. 1: 147-158. [16 esp.].
- \* ROLLARD, C., 1990c. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. VIII. Argyronetidae, Agelenidae, Hahniidae, Lycosidae, Pisauridae, Oxyopidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **61**, H.S. 1: 159-192. [58 esp.].
- \* ROLLARD, C., 2000. — Rapport d'inventaire des araignées de la Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne. *Art Civil, Paris*: sans pagination. [117 esp.].
- \* ROSELLE, F. DU, 1887. — Contributions à la faune locale. — *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*. **8** (177): 229-232. [45 esp.].
- \* ROSELLE, F. DU, 1888a. — Contributions à la faune locale. Arachnides. — *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*. **9** (189): 37-38. [31 esp.].
- \* ROSELLE, F. DU, 1888b. — Contributions à la faune locale. Arachnides. — *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*. **9** (190): 55-57. [46 esp.].
- \* ROSELLE, F. DU, 1891. — Contribution à la faune locale. Arachnides. — *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*. **10**: 340-343. [43 esp.].
- \* ROYER, M., 1928. — Sur la présence dans l'Orvanne, à Ecuelles (Seine-et-Marne) de l'*Argyroneta aquatica* Cl. — *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*. **11**: 69-70. [*Argyroneta aquatica*].

- SAARISTO, M.I., 2001. — Dwarf hunting spiders or Oonopidae (Arachnida, Araneae) of the Seychelles. — *Insect Systematics Phylogeny and Evolution*. **32**: 307-358.
- SAARISTO, M.I. & TANASEVITCH, A.V., 1999. — Reclassification of the mughii-group of the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866 (sensu lato) (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae). — *Berichte der Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*. **86**: 139-147.
- \* SALMON, J., 1959. — Contribution à la biologie des eaux saumâtres: étude bionomique de la partie terminale de la rivière l'Ic à Binic (Côtes-du-Nord). — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. **34**: 81-126. [12 esp.].
- \* SCHALLER, M., 2000. — Liste des araignées dans la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, 13 septembre 2000. — *Annales scientifiques de la Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne*. **1996-2000**: 41-42. [51 esp.].
- \* SCHARFF, R.F., 1894. — Einige Bemerkungen über eine Reise in Corsica. — *Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main*. **1894**: 153-167. [16 esp.].
- SCHENKEL, E., 1963. — Ostasiatische Spinnen aus dem Muséum d'histoire naturelle de Paris. — *Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle de Paris (A, Zool.)* **25**: 1-481.
- \* SCHODDUYN, R., 1925. — Matériaux pour servir à l'étude biologique des cours d'eau de la Flandre française. — *Annales de biologie lacustre*. **14** (1-2): 281-350. [*Argyroneta aquatica*].
- SEGBERS, H., 1989. — A redescription of *Philodromus albidus* Kulczynski, 1911 (Araneae, Philodromidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **8** (2): 38-40.
- \* SEGBERS, H., 1992. — Nomenclatural notes on, and redescription of some little-known species of the *Philodromus aureolus* group (Araneae: Philodromidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **9** (1): 19-25. [2 esp.].
- \* SENGLLET, A., 1972. — Note sur les Spermophora (Araneae: Pholcidae) méditerranéens. — *Bulletin de la Société entomologique Suisse*. **45** (4): 307-319. [3 esp.].
- \* SENGLLET, A., 1973. — Note sur *Spermophora elevata* Simon et description d'une nouvelle espèce: *Spermophora simoni* (Araneae: Pholcidae). — *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*. **97**: 683-686. [*Spermophora simoni*].
- \* SENGLLET, A., 2001. — Copulatory mechanisms in *Hoplopholcus*, *Stygopholcus* (revalidated), *Pholcus*, *Spermophora* and *Spermophoridae* (Araneae, Pholcidae), with additional faunistic and taxonomic data. — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **74**: 43-67. [4 esp.].
- \* SENGLLET, A., 2004. — Copulatory mechanisms in *Zelotes*, *Drassyllus* and *Trachyzelotes* (Araneae, Gnaphosidae), with additional faunistic and taxonomic data on species from Southwest Europe. — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **77**: 87-119. [12 esp.].
- \* SIMON, E., 1874a. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 1: 266 p. [106 esp.].
- \* SIMON, E., 1874b. — Études arachnologiques. 3e mémoire. V. Révision des espèces européennes de la famille des Sparassidae. — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **4**: 243-279. [3 esp.].
- \* SIMON, E., 1874c. — [Observations sur les sexes de *Eresus cinnaberinus*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **4**: CCXVI-CCXVII. [*Eresus niger*].
- \* SIMON, E., 1874d. — [Note sur les Arachnides pris à l'île de Ré.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **4**: CVI-CVII. [16 esp.].
- \* SIMON, E., 1875a. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 2: 350 p. [134 esp.].
- \* SIMON, E., 1875b. — [Descriptions de deux nouvelles espèces: *Philodromus albo-pictus* et *Dicyna sedilloti*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **5**: CXLIX-CLI. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1875c. — [Note sur les Arachnides de la grotte des Baux près d'Arles.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **5**: CCVI-CCVII. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1875d. — [Descriptions de nouvelles espèces d'Arachnides d'Europe.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **5**: XCII-XCV. [9 esp.].
- \* SIMON, E., 1876a. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 3: 364 p. [180 esp.].
- \* SIMON, E., 1876b. — [Note sur des Arachnides de l'île de Ré rapportées par M. Bonnaire.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **6**: CXXXV-CXXXVI. [24 esp.].
- \* SIMON, E., 1876c. — [Description de cinq nouvelles espèces françaises d'Arachnides.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **6**: CLXXX-CLXXXIII. [5 esp.].
- \* SIMON, E., 1876d. — Description d'un *Coelotes* nouveau pour la faune française. — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **6**: p. 92. [*Coelotes segestriiformis*].
- \* SIMON, E., 1876e. — Révision des espèces européennes du groupe de la *Lycosa tarentula* Rossi. — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **6**: 57-91. [*Allocosa oculata*].
- \* SIMON, E., 1877a. — [Description de *Oxyptila baudieri* sp.nov.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **7**: XLI-XLII. [aucune espèce valide].
- \* SIMON, E., 1877b. — [Descriptions de deux Araignées nouvelles de la famille des Attidae.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **7**: LXXIV-LXXVI. [*Pellenes nigrociliatus*].
- \* SIMON, E., 1877c. — [Description de deux *Lycosa*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **7**: CIII-CIV. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1878a. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 4: 334 p. [174 esp.].
- \* SIMON, E., 1878b. — [Note sur *Tmarus stellio*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **8**: VI-VII. [*Tmarus stellio*].
- \* SIMON, E., 1878c. — [Note sur le *Latrodectus tredecim-guttatus*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **8**: p. XXIII. [*Latrodectus tredecimguttatus*].

- \* SIMON, E., 1878d. — [Description de *Lethia sexpustulata* sp.nov.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **8**: p.XCVIII. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1878e. — [Descriptions de nouvelles espèces d'Arachnides des genres *Xysticus* et *Drassus*.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **8**: CLVIII-CLX. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1878f. — Études arachnologiques. 8<sup>ème</sup> mémoire. XIV. Liste des espèces européennes et algériennes de la famille des Attidae composant la collection de M. le comte E. Keyserling. — *Annales de la Société entomologique de France*. (5) **8**: 201-212. [12 esp.].
- \* SIMON, E., 1879. — Arachnides nouveaux de France, d'Espagne et d'Algérie. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **4**: 251-263. [10 esp.].
- \* SIMON, E., 1880a. — [Captures d'Arachnides intéressantes faites aux environs de Paris.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **10**: p.XXI. [9 esp.].
- \* SIMON, E., 1880b. — [Description de *Diotima hirsutissima* sp.nov., captures d'Araignées dans l'Aisne et en Egypte.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (5) **10**: LIV-LVI. [3 esp.].
- \* SIMON, E., 1881a. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 5 (1): 1-179. [86 esp.].
- \* SIMON, E., 1881b. — Arachnides nouveaux ou rares de la faune française. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **6**: 82-91. [4 esp.].
- \* SIMON, E., 1881c. — Descriptions d'Arachnides nouveaux du genre *Erigone*. — *Bulletin de la Société zoologique de France*. **6**: 233-257. [25 esp.].
- \* SIMON, E., 1882. — Études arachnologiques. 13<sup>e</sup> mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des *Dysderidae*. — *Annales de la Société entomologique de France*. (6) **2**: 201-240. [25 esp.].
- \* SIMON, E., 1884a. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 5 (2): 181-420. [116 esp.].
- \* SIMON, E., 1884b. — Les Arachnides de France. *Roret, Paris*. 5 (3): 421-885. [194 esp.].
- \* SIMON, E., 1887a. — [Récoltes d'Arachnides dans la forêt de Chantilly et aux étangs de Commelles.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (6) **7**: CXIV-CXVI. [19 esp.].
- \* SIMON, E., 1887b. — [Note sur les Arachnides de la forêt de Villers-Cotterets.] — *Annales de la Société entomologique de France* (bulletin). (6) **7**: CXVI-CXVII. [6 esp.].
- \* SIMON, E., 1898a. — Descriptions d'Arachnides nouveaux des familles des *Agelenidae*, *Pisauridae*, *Lycosidae*, *Oxyopidae*. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **42**: 1-34. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1898b. — Liste des Arachnides observés dans la forêt de Fontainebleau et dans la vallée du Loing, en juillet 1896. — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. **28**: 172-174. [72 esp.].
- \* SIMON, E., 1898c. — Étude sur les Arachnides de la région des Maures (Var). — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. (3) **29** (337): 2-4. [136 esp.].
- \* SIMON, E., 1899. — Liste des Arachnides observés à Lyons-la-Forêt (Eure). — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. (3) **29** (340): 72-73. [88 esp.].
- \* SIMON, E., 1901. — Note sur des Arachnides capturés par M. Mazauric dans la grotte de Trabuc (Gard). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1901** (13): 238-239. [*Robertus mazaurici*].
- \* SIMON, E., 1907a. — Étude sur les araignées de la sous-section des haplogynes. — *Annales de la Société entomologique de Belgique*. **51**: 246-264. [4 esp.].
- \* SIMON, E., 1907b. — Biospeologica. III. Araneae, Chernetes et Opiliones (1<sup>e</sup> série). — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. (4) **6**: 537-553. [15 esp.].
- \* SIMON, E., 1909a. — Arachnides de Lyons-la-Forêt (Eure). — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. (4) **40** (470): 34-35. [83 esp.].
- \* SIMON, E., 1909b. — Arachnides de Lyons-la-Forêt (Eure) (fin). — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. (4) **40** (471): 50-51. [80 esp.].
- \* SIMON, E., 1910. — Biospeologica. XV. Araneae et Opiliones (2<sup>ème</sup> série). — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. (5) **5**: 49-66. [18 esp.].
- \* SIMON, E., 1911. — Biospeologica. XXIII. Araneae et Opiliones (3<sup>ème</sup> série). — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. (5) **9**: 177-206. [26 esp.].
- \* SIMON, E., 1913. — Biospeologica. XXX. Araneae et Opiliones (4<sup>ème</sup> série). — *Archives de zoologie expérimentale et générale*. **52**: 359-386. [27 esp.].
- \* SIMON, E., 1914. — Les Arachnides de France. *Paris, Roret*. 6 (1): 1-308. [380 esp.].
- \* SIMON, E., 1915a. — Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1914** (18): 469-471. [4 esp.].
- \* SIMON, E., 1915b. — Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France (deuxième note). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1914** (19): 478-479. [4 esp.].
- \* SIMON, E., 1916. — Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France (troisième note). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1916** (13): 209-211. [7 esp.].
- \* SIMON, E., 1918. — Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France (quatrième note). — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1918** (9): 152-155. [11 esp.].
- \* SIMON, E., 1922. — Description de deux Arachnides cavernicoles du midi de la France. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **1922**: 199-200. [2 esp.].
- \* SIMON, E., 1926. — Les Arachnides de France. *Paris, Roret*. 6 (2): 309-532. [231 esp.].
- \* SIMON, E., 1929. — Les Arachnides de France. *Paris, Roret*. 6 (3): 533-772. [227 esp.].
- \* SIMON, E., 1932. — Les Arachnides de France. *Paris, Roret*. 6 (4): 773-978. [199 esp.].
- \* SIMON, E., 1937. — Les Arachnides de France. *Paris, Roret*. 6 (5): 979-1298. [263 esp.].
- \* SOYER, B., 1953a. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale I. Quelques Araignées myrmécophages des environs de Marseille. — *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de Marseille*. **13**: 51-55. [13 esp.].

- \* SOYER, B., 1953b. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale II. Les Lycosides des collines et des terrains salés. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **19**: 15-19. [13 esp.].
- \* SOYER, B., 1955. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale III. Les araignées cribellates et haplogynes des collines et des terrains salés. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **20**: 31-37. [30 esp.].
- \* SOYER, B., 1959. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale IV. Les Salticides des collines et des terrains salés. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **22**: 36-40. [41 esp.].
- \* SOYER, B., 1963. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale. Les araignées Thomisides et Clubionides des collines et des terrains salés. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **23**: 27-34. [65 esp.].
- \* SOYER, B., 1964. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale IV. Une araignée de la zone supralittorale à galets de la Méditerranée française, *Gnaphosa spadicea* E.S. (avec la description de la femelle). — *Vie et Milieu*. Suppl. n°17: 355-357. [*Gnaphosa dolosa*].
- \* SOYER, B., 1965. — Notes de faunistique écologique sur les araignées des Albères (1<sup>ère</sup> note). — *Vie et Milieu*. **16** (1C): 632-633. [17 esp.].
- \* SOYER, B., 1966. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale. Les Gnaphosides des collines et des terrains salés. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **24**: 18-22. [33 esp.].
- \* SOYER, B., 1967. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale IX.- Sur quelques araignées du genre *Zelotes* Gistel. — *Bulletin de la Société entomologique de France*. **72**: 275-281. [5 esp.].
- \* SOYER, B., 1973. — Contribution à l'étude éthologique et écologique des Araignées de la Provence occidentale VIII.- Les Thérides des collines et des terrains salés. — *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*. **26**: 113-121. [34 esp.].
- \* SUEUR, F., 1992. — Premières données sur les araignées de la Somme. — *L'Entomologiste picard*. **1992**: p. 22. [8 esp.].
- \* SUEUR, F., 1993. — Nouvelles données sur les araignées de la Somme. — *L'Entomologiste picard*. **1993**: p. 81. [10 esp.].
- \* TAMBS-LYCHE, H., 1957. — Spiders from Banyuls. — *Vie et Milieu*. **8**: 111-113. [44 esp.].
- THALER, K., 1974. — Eine verkannte Kreuzspinne in Mitteleuropa: *Araneus folium* Schrank (Kulczynski 1901) und *Araneus cornutus* Clerck (Arachnida: Aranei, Araneidae). — *Zoologischer Anzeiger*. **193**: 256-261.
- \* THALER, K., 1975. — The genus *Opistoxys* Simon, a new synonym in Linyphiid spiders. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (5): 142-144. [*Porrhomma microphthalmum*].
- THALER, K., 1981. — Bermekenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Osterreich). — *Veröffentlichungen des Tiroler Museum Ferdinandeum Innsbruck*. **61**: 105-150.
- \* THALER, K., 1984. — Sechs neue mediterrane Zwergspinnen (Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). — *Archives des sciences Genève*. **37** (2): 193-210. [*Savignia superstes*].
- \* THALER, K., 1986. — Über *Lepthyphantes cirratus* n.sp. und die Formen der Untergruppe um *L. pinicola* Simon (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). — *Archives des sciences Genève*. **39** (2): 225-234. [*Lepthyphantes cirratus*].
- \* THALER, K., 1990. — Das Männchen von *Rhode aspinifera* (Nikolic) (Arachnida: Araneae, Dysderidae). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. **63**: 147-152. [*Rhode tenuipes*].
- \* THALER, K., 1994. — Vikariante Verbreitung im Artenkreis von *Lepthyphantes mansuetus* in Mitteleuropa (Araneida: Linyphiidae). — *Entomologia Generalis*. **18**: 171-185. [*Lepthyphantes simoni*].
- \* THALER, K., HELSDINGEN, P. VAN & DELTSHEV, C., 1994. — Vikariante Verbreitung im Artenkomplex von *Lepthyphantes annulatus* in Europa und ihre Deutung (Araneae, Linyphiidae). — *Zoologischer Anzeiger*. **232**: 111-127. [*Lepthyphantes frigidus*].
- THALER, K. & KNOFLACH, B., 2003. — Zur Faunistik der Spinnen (Araneae) von Österreich: *Orbicularia* p.p. (Araneidae, Tetragnathidae, Theridiosomatidae, Uloboridae). — *Linzer Biologische Beiträge*. **35**: 613-655.
- \* THÉLESPHORE, 1878. — Communications. *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. **9** (97): 14-15. [*Latrodectus tredecimguttatus*].
- \* THIRION, J.-M., 1998. — Note sur une première observation en Charente-Maritime de *Zoropsis spinimana* (Dufour), Aranéide. — *Annales de la Société de sciences naturelles de Charente-Maritime*. **8** (7): p. 887. [*Zoropsis spinimana*].
- \* THOMAS, A., 1988. — Échos du bout du monde. Nouvelles des réserves 1987. — *Penn ar Bed*. **1988**: 24-29. [*Meta menardi*].
- \* THOMAS, H., 1999. — *Nemesia simoni* Cambridge: une petite mygale discrète mais commune en Aquitaine. — *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*. **27** (1): 33-40. [*Nemesia simoni*].
- THORELL, T., 1871. — Remarks on synonyms of European spiders. Part II. *Uppsala*: 97-228.
- \* THORELL, T., 1875. — Diagnoses Araneorum Europaeorum aliquot novarum. — *Tijdschrift voor Entomologie*. **18**: 81-108. [2 esp.].
- \* TIBERGHEN, G., CANARD, A., ROLLARD, C. & YSNEL, F., 1993a. — Invertébrés du parc naturel régional de Corse: des richesses à inventorier. — *Insectes*. **90**: 5-8. [22 esp.].
- \* TIBERGHEN, G., CANARD, A., ROLLARD, C. & YSNEL, F., 1993b. — Invertébrés du parc naturel régional de Corse: des richesses à inventorier (seconde partie). Les réserves de Scandola, Lavezzi et Cerbicale. — *Insectes*. **91**: 23-27. [16 esp.].

- \* TONGIORGI, P., 1966. — Italian Wolf Spiders of the Genus *Pardosa* (Araneae: Lycosidae). — *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*. **134** (8): 275-334. [4 esp.].
- \* TONGIORGI, P., 1974. — Some notes on *Pardosa occidentalis* Simon (Araneae, Lycosidae). — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **3** (3): 62-63. [2 esp.].
- \* TÖPFER-HOFMANN, G., CORDES, D. & HELVERSEN, O.V., 2000. — Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. — *Bulletin of the British Arachnological Society*. **11** (7): 257-274. [2 esp.].
- TULLGREN, A., 1946. — Svenska spindelfauna: 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam. 5-7. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. *Entomologiska Föreningen i Stockholm*: 141 p.
- URONES, C., 1996. — Precisiones taxonomicas sobre algunas especies de Thomisida y Philodromidae (Araneae). — *Boletín de la Asociación Española de Entomología*. **20** (1-2): 31-39.
- \* VALLÉE, 1875. — L'Argyronète. — *La Feuille des Jeunes Naturalistes*. **5** (51): p. 37. [*Argyroneta aquatica*].
- \* VEILLON, R., 1997. — Les Araignées du Maine-et-Loire (49) (France), inventaire et cartographie provisoires. — *Bulletin de Synthèse de Mauges-Nature*. **5**: 1-157. [200 esp.].
- \* VERNEAU, N., 2000. — Les araignées de Corse: la famille des Eresidae. — *Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse*. **688-689**: 111-119. [*Eresus niger*].
- \* VILLEPOUX, O., 1986. — Répartition des Lycosides (Araneae, Lycosidae) dans quelques tourbières d'Auvergne. *Actas X Congreso internacional de arcnologia; Jaca (España) septiembre 1986*. I: 259-266. [15 esp.].
- \* VILLEPOUX, O., 1990a. — Répartition des Araignées épigées dans une tourbière à Sphaignes. — *Acta Zoologica Fennica*. **190**: 379-385. [18 esp.].
- \* VILLEPOUX, O., 1990b. — Les araignées de la réserve naturelle du Marais de Lavours. — *Bulletin de la Société européenne d'arachnologie*. H.S. n°1: 358-366. [128 esp.].
- \* VILLEPOUX, O. & DUHEM, B., 2004. — De araneis Galliae I.5, *Gnaphosa nigerrima* L. Koch. — *Revue Arachnologique*. **15** (2): 20-21. [*Gnaphosa nigerrima*].
- \* VIRÉ, A., 1896. — Faune des cavernes du Plateau central et du Jura. — *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*. **1896** (1): 323-328. [2 esp.].
- \* VIRÉ, A., 1902. — La faune et la flore souterraines du puit de Padirac (Lot). — *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*. **1902** (8): 601-607. [2 esp.].
- \* VLIJM, L., 1971. — Some notes on the occurrence of genus *Pardosa* (Lycosidae, Araneae) in southern France, Spain and Corsica. — *Zoologische Mededelingen*. **45** (24): 281-287. [12 esp.].
- WANG, X.P., 2002. — A generic-level revision of the spider subfamily Coelotinae (Araneae, Amaurobiidae). — *Bulletin of the American Museum of Natural History*. **269**: 1-150.
- WEISS, I. & BAUCHHENS, E., 1995. — *Centromerus silvicola* und *C. sellarius* (*C. similis*), eine nomenklatorische Richtigstellung. — *Arachnologische Mitteilungen*. **10**: 28-31.
- \* WESOŁOWSKA, W., 1986. — A revision of the genus *Heliophanus* C.L.Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). — *Annales Zoologici*. **40** (1): 1-254. [6 esp.].
- WIEHLE, H., 1956. — Spinnentiere oder Arachnoidea. 28. Familie Linyphiidae-Baldachinspinnen. — *Die Tierwelt Deutschlands*. **44**: 1-337.
- WUNDERLICH, J., 1972. — Zur Kenntnis der Gattung *Walckenaeria* Blackwall 1833 unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Subgenera un Arten (Arachnida, Araneae, Linyphiidae). — *Zoologische Beiträge*. (NF) **18**: 371-427.
- WUNDERLICH, J., 1975. — Dritter Beitrag zur Spinnenfauna Berlins (Arachnida: Araneae). — *Sber. Gesellschaft Naturforschender Freunde Berlin*. (N.F.) **15**: 39-57.
- \* WUNDERLICH, J., 1977. — Zur Synonymie südeuropäischer Spinnen (Arachnida: Araneida: Theridiidae, Linyphiidae, Gnaphosidae). — *Senckenbergiana Biologica*. **57** (46): 289-293. [*Erigone vagans*].
- \* WUNDERLICH, J., 1979. — Revision der europäischen Arten der Gattung *Micaria* Westring 1851, mit Anmerkungen zu den übrigen paläarktischen Arten (Arachnida, Araneida, Gnaphosidae). — *Zoologische Beiträge*. (NF) **25** (2): 233-341. [2 esp.].
- \* WUNDERLICH, J., 1980a. — Zur Kenntnis der Gattung *Pholcus* Walckenaer, 1805 (Arachnida: Araneae: Pholcidae). — *Senckenbergiana Biologica*. **60** (34): 219-227. [*Holocnemus pluchei*].
- \* WUNDERLICH, J., 1980b. — Linyphiidae aus Süd-Europa und Nord-Afrika (Arach., Araneae). — *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*. (NF) **23**: 319-337. [3 esp.].
- WUNDERLICH, J., 1984. — Seltene und bisher unbekannte Wolspinnen aus Mitteleuropa und Revision der *Pardosa saltuaria* Gruppe (Arachnida, Araneae, Lycosidae). — *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg*. (NF) **27**: 417-442.
- WUNDERLICH, J., 1985. — Zur Synonymie einiger europäischer Arten der Gattung *Pelecopsis* Simon 1864 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). — *Senckenbergiana Biologica*. **66** (13): 111-114.
- WUNDERLICH, J., 1986. — Spinnenfauna gestern und heute: Fossile Spinnen in Bernstein und ihre heute lebenden Verwandten. *Quelle & Meyer, Wiesbaden*: 283 p.
- WUNDERLICH, J., 1987. — Die Spinnen der Kanarischen Inseln und Madeiras. Adaptive Radiation, Biogeographie, Revisionen und Neubeschreibungen. *Triops Verlag, Langen*: 435 p.
- WUNDERLICH, J., 1991. — Die Spinnen-Fauna der Makaronesischen Inseln. Taxonomie, Ökologie, Biogeographie und Evolution. — *Beiträge zur Arachnologie*. **1**: 1-619.
- \* WUNDERLICH, J., 1994a. — Zur Kenntnis der Endemiten, zur Evolution und zur Biogeographie der Spinnen Korsikas und Sardinien, mit Neubeschreibungen (Arachnida: Araneae). — *Beiträge zur Arachnologie*. **4**: 353-383. [*Tegenaria femoralis*].

- \* WUNDERLICH, J., 1994b. — Zu Taxonomie und Biographie der Arten der Gattung *Oecobius* Lucas 1846, mit Neubeschreibungen aus der Mediterraneis und von der Arabischen Halbinsel (Arachnida: Araneae: Oecobiidae). — *Beiträge zur Araneologie*. 4: 585-608. [2 esp.].
- \* WUNDERLICH, J., 1994c. — Zur Taxonomie europäischer Gattungen der Zwergspinnen (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Erigoninae). — *Beiträge zur Araneologie*. 4: 643-654. [*Trichopterna rufithorax*].
- \* WUNDERLICH, J., 1994d. — Revision der *Titanoeca tristis*-Gruppe, mit zwei Neubeschreibungen aus der westlichen Paläarktis (Arachnida: Araneae: Titanoecidae). — *Beiträge zur Araneologie*. 4: 731-738. [*Titanoeca hispanica*].
- WUNDERLICH, J., 1994e. — Zur Kenntnis west-paläarktischer Arten der Gattungen *Psammitis* Menge 1875, *Xysticus* C. L. Koch 1835 und *Ozyptila* Simon 1864. — *Beiträge zur Araneologie*. 4: 749-774.
- WUNDERLICH, J., 1999. — *Liocranoeca*-eine bisher unbekannte Gattung der Feldspinnen aus Europa und Nordamerika (Arachnida: Araneae: Liocranidae). — *Entomologische Zeitschrift, Frankfurt am Main*. 109 (2): 67-70.
- \* YSNEL, F., 1990a. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. II. Atypidae, Oonopidae, Dysderidae, Segestriidae, Scytodidae, Zodariidae, Pholcidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. 61, H.S. 1: 9-18. [15 esp.].
- \* YSNEL, F., 1990b. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. III. Mimetidae, Theridiidae, Mysmenidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. 61, H.S. 1: 19-42. [49 esp.].
- \* YSNEL, F., 1990c. — Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France: catalogue et cartographie provisoire des espèces. XI. Philodromidae, Thomisidae. — *Bulletin de la Société scientifique de Bretagne*. 61, H.S. 1: 235-255. [35 esp.].

— Une rubrique taxonomie indique éventuellement les problèmes posés par l'espèce.

— Suit la rubrique répartition et, éventuellement, les rubriques altitude, habitat, période.

Répartition: elle commence par la liste des départements cités, classés par ordre alphabétique, avec pour chaque département, après le signe deux-points, la liste des références classées par ordre alphabétique. Les références d'auteurs différents sont séparées par un point-virgule, les références d'un même auteur sont séparées par une virgule. Lorsque plusieurs départements consécutifs ont les mêmes références, ces départements sont groupés et séparés par une virgule. Vient ensuite, séparée par un tiret long, la répartition selon SIMON (1914 à 1937), puis, séparée par un point, la liste des pays limitrophes, et enfin, séparée par un point, la distribution selon PLANICK, 2004. Les synonymes utilisés dans les travaux sont placés entre parenthèses, juste après la référence. Dans les rares cas où la synonymie ne concerne qu'un seul sexe, celui-ci est indiqué entre crochets. Les noms utilisés à tort sont entre crochets.

Altitude: les altitudes sont arrondies à la dizaine de mètres inférieure.

Habitat: les habitats sont classés par ordre alphabétique. Les constituants d'un même habitat sont séparés par une virgule. Les habitats différents sont séparés par un point-virgule. La présentation des références est la même que pour la répartition par département.

Période: elle peut contenir quatre parties: mâle, femelle, femelle avec cocon, femelle avec ses jeunes. Les mois consécutifs ayant la même référence sont regroupés. Lorsqu'il y a plus de deux mois consécutifs, seuls sont indiqués le premier et le dernier mois, séparés par la préposition «à» (par exemple «Avril à juin», les citations concernant explicitement les mois d'avril, mai et juin).

Des notes, placées entre crochets, donnent des informations particulières ou ponctuelles. Elles peuvent s'intercaler à différents endroits des rubriques.

Abréviation utilisée: err., pour «identification erronée».

## ATYPIDAE

### *Atypus affinis* Eichwald, 1830

#### *A. bleodonticus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (A. b.). Alpes-de-Haute-Provence: KRAUS & al., 1974. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1967d. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: Anonyme, 1992; LACOMBLE, 1992. Côtes-d'Armor: CANARD, 1983; YSNEL, 1990a. Eure: SIMON, 1909a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Finistère: CANARD, 1983; DENIS, 1939a; YSNEL, 1990a. Hérault: LEGENDRE, 1973. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1983; YSNEL, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KRAUS & al., 1974. Meurthe-et-Moselle: BIRAT & al., 2001. Meuse: IORIO, 2003b. Morbihan: CANARD, 1983; MURPHY, 1994; YSNEL, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): KRAUS & al., 1974. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; KRAUS & al., 1974; LEDOUX &

## Catalogue des espèces

### Présentation des données.

Pour certaine famille, une note indique les choix de nomenclature effectués au niveau des genres, ainsi que les espèces exclues du catalogue. Dans chaque famille, les genres et les espèces sont classés par ordre alphabétique. Pour chaque espèce, les données se succèdent de la manière suivante:

- Le nom de l'espèce, suivi du nom de son auteur.
- Les noms utilisés (et uniquement ceux-ci) dans les travaux pour citer cette espèce. Cette liste de noms peut être vide. Ces noms sont des synonymes ou des noms employés à tort en raison d'une erreur d'identification; dans ce dernier cas, les noms sont suivis de la mention [err.]. Les noms utilisés dans le catalogue de PLANICK, 2004 et la liste de CANARD, 2005 sont toujours indiqués, même en l'absence de données issues de ces documents.



*al.*, 1995, 1996a, 2003. Rhin (Haut-), Rhône: KRAUS & *al.*, 1974. "Seine": BERLAND, 1922; DELFOSSE, 1999, 2004; DENIS, 1946a; PLAZANET, 1995; RASTEL, 1998; ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: DRESKO, 1946; MERIGUET, 1999. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & *al.*, 2000; KRAUS & *al.*, 1974. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CANARD, 1983; DENIS, 1947b, 1962b, 1963c, 1964b. Vienne (Haute-): CANARD, 1983. Vosges: BIRAT & *al.*, 2001; KRAUS & *al.*, 1974. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Grande-Bretagne à Ukraine, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 1280 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois de chênes-verts, litière: KOVOOR & *al.*, 2000. Bois de hêtres: DENIS, 1959d. Bois, plantation de pins: DENIS, 1946a. Bord de rivière, murette: LEGENDRE, 1973. Coteau calcaire ensoleillé: VEILLON, 1997. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Coteau calcaire, lisière de forêt mixte: IORIO, 2003b. Éboulis: JOURDE & *al.*, 1999. Errant sur des rochers (mâle): CANARD, 1983. Errant sur un talus: DRESKO, 1946. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1947b, 1964b. Forêt de chênes: RASTEL, 1998. Forêt de chênes sur terrain calcaire, lisière: LE PERU, 2004. Forêt de pins: CANARD, 1983. Forêt, errant sur une route: DRESKO, 1946. Forêt, terrains sablonneux colonisés par la bruyère et la mousse: PLAZANET, 1995. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: CANARD, 1983. Jardin en milieu urbain: DELFOSSE, 1999; MERIGUET, 1999. Lande: CANARD, 1983. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Littoral, sous des galets: DENIS, 1939a. Maison: DENIS, 1963c. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse calcaire: BIRAT & *al.*, 2001. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Pelouse thermophile: JOURDE & *al.*, 1999. Pelouse à *Agrostis*: CANARD, 1983. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002. Près d'un jardin en milieu urbain: DELFOSSE, 2004. Sablière: BERLAND, 1922. Sous des rochers: LEDOUX & *al.*, 2003. Sous une grosse pierre plate: DENIS, 1959d. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Talus crayeux: SIMON, 1909a. Terrain argilo-sablonneux recouvert de mousses: BIRAT & *al.*, 2001. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DELFOSSE, 2004. Avril: DRESKO, 1946; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: DRESKO, 1946; RASTEL, 1998. Juin, août: CANARD, 1983. Septembre: CANARD, 1983; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Octobre: CORNIC, 1978; DENIS, 1963c; LE PERU, 2004. Novembre: CORNIC, 1978; DRESKO, 1946. Décembre: CANARD, 1983. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & *al.*, 2003. Mai: DENIS, 1934a. Juin: Anonyme, 1992; CANARD, 1983; EMERIT & *al.*, 1997; LACOMBLE, 1992; LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: DENIS, 1959d. Août: CANARD, 1983; LEGENDRE, 1973; VEILLON, 1997. Décembre: CANARD, 1983. — *Femelle avec cocon.* Juillet, août: CANARD, 1983. — *Femelle avec ses jeunes.* Décembre: CANARD, 1983.

#### *Atypus piceus* (Sulzer, 1776)

[KRAUS & *al.*, 1974 affirme qu'*Atypus piceus* est limitée à l'Europe centrale et aux Alpes du sud, bien qu'il cite l'espèce du Tarn-et-Garonne. CANARD, 1983 indique qu'*Atypus piceus* ne dépasserait pas à l'ouest une ligne oblique allant de la côte nord de l'Allemagne de l'Est jusqu'à la chaîne des Pyrénées.]. **Répartition.** Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Côtes-d'Ar-

mor: LUCAS, 1871a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Meurthe-et-Moselle: IORIO, 2004b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": LUCAS, 1871c, 1875. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DRESKO, 1946; LUCAS, 1864; SIMON, 1898b. Tarn-et-Garonne: KRAUS & *al.*, 1974. Var: BECKER, 1880. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. De l'Europe à la Moldavie, Iran. **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Errant sur une route: DRESKO, 1946. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Jardin: LUCAS, 1871c. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Sous les pins: SIMON, 1898b. Sur un chemin entre une lande et une chênaie acidophile: JOURDE & *al.*, 1999. **Période.** — *Mâle.* Juin: DRESKO, 1946. Août: LUCAS, 1864. Octobre: LUCAS, 1871c. — *Femelle.* Juin: EMERIT & *al.*, 1997. Septembre: LUCAS, 1875.

#### CTENIZIDAE

##### *Cteniza moggridgei* O. P.-Cambridge, 1874

###### *Nemesia m.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881; SIMON, 1914. Var: BECKER, 1880 (*N. m.*), 1882 (*N. m.*); SIMON, 1898c (*N. m.*). [SIMON, 1914 ne reprend pas les citations antérieures du Var, et note que Cagnes, dans les Alpes-Maritimes, est la localité la plus occidentale]. — Italie. **Habitat.** Talus en bord de route: BECKER, 1882.

##### *Cteniza sauvagesi* (Rossi, 1788)

###### *C. fodiens.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881; LUCAS, 1874b (*C. f.*). Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; MORTON, 1922; PHISALIX, 1922; ROEWER, 1926; SCHARFF, 1894; SIMON, 1914; TIBERGHEN & *al.*, 1993a, 1993b. — Sardaigne. **Habitat.** Bord de chemin: TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Bord de chemin, talus: CANARD, 1989. Bord de mer: TIBERGHEN & *al.*, 1993b. Bord de mer, rochers: CANARD, 1989. Bord de route, talus: MORTON, 1922. Chemins creux: TIBERGHEN & *al.*, 1993b. **Période.** — *Femelle.* Février: CANARD, 1989; KRAUS, 1955. Avril: KRAUS, 1955. Juillet: CANARD, 1989. Septembre: CANARD, 1989; KRAUS, 1955. Octobre: CANARD, 1989.

#### NMESIIDAE

##### *Nemesia albicomis* Simon, 1914

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1914. — Connue seulement de Corse.

##### *Nemesia arenicola* Simon, 1902

**Répartition.** Corse: SIMON, 1914. — Connue seulement de Corse.

##### *Nemesia caementaria* (Latreille, 1799)

**Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: BERLAND, 1922; BUCHLI, 1962, 1965, 1969, 1970; DENIS, 1931b, 1933b, 1960a, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1995; SIMON, 1914. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Espagne, Italie. Europe du Sud. **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Berges de ruisseaux: BUCHLI, 1962. Bord de chemin, talus: BUCHLI, 1970.

Formation à chênes-verts : LEDOUX & *al.*, 1995. Talus de chemin creux, vieux mur de pierres sèches : BUCHLI, 1965. Talus de chemins creux : BUCHLI, 1962. Talus en bord de route : BERLAND, 1922. Terrain argileux : BUCHLI, 1962. Vignes, mur de pierres sèches : BUCHLI, 1969. **Période.** — *Mâle.* Septembre, octobre : CORNIC, 1978. Novembre : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1967d. — *Femelle.* Février : DENIS, 1960a. Mars : DENIS, 1967d. Avril : DENIS, 1931b. Juin : BUCHLI, 1965, 1970. Novembre : BUCHLI, 1970 ; DENIS, 1967d.

*Nemesia carminans* (Latreille, 1818)

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône : BIGOT & *al.*, 1973 ; SIMON, 1914 ; SOYER, 1953a. Corse : SIMON, 1914. Var : DENIS, 1935b ; GROS, 1982, 1983b ; SIMON, 1914. Vaucluse : SIMON, 1914. — Italie. **Habitat.** Garrigue claire : SOYER, 1953a. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & *al.*, 1973. Pelouse : SOYER, 1953a. **Période.** — *Femelle.* Septembre : GROS, 1982, 1983b.

*Nemesia congener* O. P.-Cambridge, 1874

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SIMON, 1914 ; SOYER, 1953a. Var : BECKER, 1879b, 1880, 1882 ; DENIS, 1933a, 1934a ; KOVOOR & *al.*, 2000 ; SIMON, 1898c, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bord de plage : KOVOOR & *al.*, 2000. Garrigue claire ; pelouse : SOYER, 1953a. Talus : KOVOOR & *al.*, 2000. Talus en bord de route : BECKER, 1882. Terrains caillouteux, bord de chemin : DENIS, 1934a. **Période.** — *Mâle.* Avril : SIMON, 1914.

*Nemesia corsica* Simon, 1914

**Taxonomie.** Sous *N. corsica* n. nom. SIMON, 1914 note : «Je confondais autrefois plusieurs espèces sous le nom de *N. meridionalis* Costa, ce qui est dit de la distribution de l'espèce est à supprimer». Voir la note sous *N. maculatipes*. **Répartition.** Corse : CANARD, 1989 ; KRAUS, 1955 ; SIMON, 1914 ; TIBERGHEN & *al.*, 1993b. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Bord de chemin, talus : CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle.* Avril, septembre : KRAUS, 1955. — *Femelle.* Septembre : CANARD, 1989. — *Femelle avec ses jeunes.* Septembre : CANARD, 1989.

*Nemesia dubia* O. P.-Cambridge, 1874

**Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & *al.*, 1992 ; SIMON, 1914. Aude, Hérault : SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & *al.*, 1985a ; BUCHLI, 1962 ; DENIS, 1933b, 1967d ; GROS, 2004 ; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a ; SIMON, 1914 ; SOYER, 1965. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Berges de ruisseaux : BUCHLI, 1962. Bois de châtaigniers : SOYER, 1965. Formation à bruyères et genévriers : LEDOUX & *al.*, 1995. Garrigue à chênes-verts ; taillis de chênes-verts : RAPHAËL & *al.*, 1992. Talus de chemins creux ; terrain sablonneux : BUCHLI, 1962. **Période.** — *Mâle.* Janvier : DENIS, 1933b. Avril : DENIS, 1933b ; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin : SIMON, 1914. — *Femelle.* Février, mars : DENIS, 1967d. Août : GROS, 2004. Novembre : DENIS, 1967d. — *Femelle avec ses jeunes.* Janvier : DENIS, 1933b.

*Nemesia eleanora* O. P.-Cambridge, 1873

*N. eleanora.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BECKER, 1881 (*N. l.*) ; BUCHLI, 1970 ; IORIO, 2003c ; SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône : SIMON, 1914. Var : DENIS, 1935b ; SIMON, 1914. — Espagne, Italie. **Habitat.** Coteau exposé au soleil, talus en bordure de chemins ou pelouses sèches : IORIO, 2003c. **Période.** — *Mâle.* Mai : IORIO, 2003c. — *Femelle.* Mai : IORIO, 2003c. — *Femelle avec ses jeunes.* Juin : BUCHLI, 1970. Septembre, décembre : IORIO, 2003c.

*Nemesia fertoni* Simon, 1914

**Répartition.** Corse : SIMON, 1914. — Connue seulement de Corse et de Sardaigne.

*Nemesia incerta* O. P.-Cambridge, 1874

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

*Nemesia maculatipes* Ausserer, 1871

**Taxonomie.** Les deux espèces *Nemesia maculipes* Ausserer, 1871 et *N. meridionalis* (Costa, 1835) ont souvent été confondues, et la synonymie *N. maculatipes* = *N. meridionalis* parfois admise (EMERIT, 1992 ; TIBERGHEN & *al.*, 1993b ; CANARD & *al.*, 1997). [*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1914. — Espagne, Sardaigne, Maroc. **Habitat.** Bord de route, talus : CANARD, 1989. **Période.** — *Femelle.* Juillet : CANARD, 1989.

*Nemesia manderstjernae* L. Koch, 1871

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BECKER, 1881, 1882 ; SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1934b, 1943c. Var : GROS, 1982, 1983b, 2004 ; SIMON, 1898c, 1914. — Italie. **Habitat.** Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. **Période.** — *Femelle.* Juin : GROS, 2004. Juillet : GROS, 1982, 1983b.

*Nemesia meridionalis* (Costa, 1835)

**Taxonomie.** Voir les notes sous *N. corsica* et sous *N. maculatipes*. [*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Corse : TIBERGHEN & *al.*, 1993b. — Espagne, Italie.

*Nemesia pannonica* Herman, 1879

*N. radiata.*

**Répartition.** Corse : ROEWER, 1926 (*N. r.*). — Europe de l'Est. **Période.** — *Mâle.* Avril : ROEWER, 1926.

*Nemesia raripila* Simon, 1914

**Répartition.** Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; GROS, 2004 ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003 ; SIMON, 1914. — Espagne. **Altitude.** De 1000 m (SIMON, 1914) jusqu'à 1820 m (LEDOUX & *al.*, 2003). **Habitat.** Forêt de conifères : LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt de conifères, litière : LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de hêtres : LEDOUX & *al.*, 1995. Prairie : LEDOUX & *al.*, 2003. Sous-bois de feuillus : LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle.* Août : LEDOUX, 1993. Septembre : LEDOUX & *al.*, 1996a. Novembre : SIMON, 1914. — *Femelle.* Février : LEDOUX & *al.*, 1996a. Avril :

LEDOUX & al., 2003. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec ses jeunes*. Juillet: SIMON, 1914.

*Nemesia simoni* O. P.-Cambridge, 1874

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a, 1967d. Aude: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983. Dordogne: THOMAS, 1999. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d; KERVILLE, 1932; SIMON, 1914. Gers: SIMON, 1914. Gironde: BECKER, 1879b; SIMON, 1914; THOMAS, 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1967d; SIMON, 1914. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d. — Espagne. Portugal. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois de chênes et de charmes: THOMAS, 1999. Grotte: DENIS, 1967d. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Septembre: THOMAS, 1999. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1960a. Février, mars: DENIS, 1967d. Avril: DENIS, 1967d; THOMAS, 1999. Novembre: DENIS, 1967d.

#### FILISTATIDAE

La *Filistata truncata* décrite des Alpes-Maritimes par A. RISSO en 1826 est considérée comme *nomen dubium* par PLATNICK, 2004 d'après ROEWER, 1954 («nicht zu deuten!») et retirée de la liste des espèces valides.

*Filistata insidiatrix* (Forskål, 1775)

*F. testacea*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*F. t.*). Ardèche: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Corse: CANARD, 1989. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Pyrénées-Orientales: BERLAND, 1922; BONNET, 1939; BOSMANS & al., 1985a; BRIGNOLI, 1982; DENIS, 1933b, 1933d, 1967d; LEDOUX & al., 2003; TAMB-S-LYCHE, 1957. Var: BECKER, 1882 (*F. t.*); BERLAND, 1922, 1929; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992. — Région méditerranéenne, au nord jusqu'en Ardèche: SIMON, 1914. Espagne, Italie. De la Méditerranée au Turkménistan, Îles du Cap-Vert. **Habitat.** Bois de chênes-lièges: TAMB-S-LYCHE, 1957. Bord de torrent: CHANSIGAUD, 1992. Broussailles: CHANSIGAUD & al., 1994. Forêt de chênes-verts; friche: LEDOUX & al., 2003. Maison: DENIS, 1934a. Mur de pierres: CANARD, 1989. Murs: BERLAND, 1929; DENIS, 1934a. Murs des maisons: LEDOUX & al., 2003. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1934a. Sous une pierre: DENIS, 1933b; KOVOOR & al., 2000. Talus: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Mai: BRIGNOLI, 1982. Septembre: CANARD, 1989. Novembre: BERLAND, 1922. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mai: BERLAND, 1922; BRIGNOLI, 1982; DENIS, 1934a. Juin: BONNET, 1939. Juillet: CANARD, 1989; LEDOUX & al., 2003. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1935a, 1967d. Novembre: BERLAND, 1922. — *Femelle avec ses jeunes*. Janvier: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a. Décembre: DENIS, 1933b.

*Pritha nana* (Simon, 1868)

*Filistata n.*; *Filistata vestita*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*F. n.*); SIMON, 1914 (*F. n.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955 (*F. n.*). Corse: SIMON, 1914 (*F. v.*). Gard:

LEDOUX, 1977. Var: BERLAND, 1926 (*F. v.*); SIMON, 1914 (*F. n.*). Vaucluse: LEDOUX, 1977; SIMON, 1914 (*F. n.*). — Espagne, Italie, Suisse. Méditerranée. **Habitat.** Bord de talus: BERLAND, 1926. Bâtiments, sous le crépis des murs; garrigue, sous des grosses pierres; nids de pigeons: LEDOUX, 1977. **Période.** — *Mâle*. Mai: BERLAND, 1926; LEDOUX, 1977. Juin: LEDOUX, 1977. — *Femelle*. Février: LEDOUX, 1977. Mai: BERLAND, 1926; LEDOUX, 1977. Juin, octobre: LEDOUX, 1977.

#### SICARIIDAE

*Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820)

*L. distincta*.

**Taxonomie.** La synonymie *L. distincta* (Lucas, 1846) = *L. rufescens* est établie par BRIGNOLI, 1976. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955 (*L. d.*). Corse: CANARD, 1989. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*L. d.*), 1967d (*L. d.*). Var: DENIS, 1933a (*L. d.*), 1934a (*L. d.*), 1935a (*L. d.*); KOVOOR & al., 2000. — Région méditerranéenne: SIMON, 1914; région méditerranéenne occidentale: SIMON, 1914 (*L. d.*). Espagne, Italie. Cosmopolite. **Habitat.** Lieux arides, sous des pierres: KOVOOR & al., 2000. Maison: CANARD, 1989; SIMON, 1914. Rochers, anfractuosités: SIMON, 1914. Sous une pierre: DENIS, 1933b, 1934a; SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1967d. Mai: DENIS, 1934a. Septembre: DENIS, 1935a.

#### SCYTODIDAE

*Scytodes thoracica* (Latreille, 1802)

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973, 1983; KABOUCE & al., 1997; SOYER, 1955. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: CANARD, 1989. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a; YSNEL, 1990a. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Hérault: LOPEZ, 1974. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; LUCAS, 1882a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; DALMAS, 1920. Manche: LUCAS, 1878b. Nord: DENIS, 1931a; GOULLIART, 1979a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; GERHARDT, 1930; LUCAS, 1847a. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. "Seine": DALMAS, 1920; LUCAS, 1847a. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: BECKER, 1880, 1882; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; KOVOOR & al., 2000; LUCAS, 1847a; PONEL & al., 1993; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1968a. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique, Îles du Pacifique. **Altitude.** Jusqu'à 540 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bâtiment: DALMAS, 1920; DENIS, 1933b, 1935a; LUCAS, 1847a. Forêt, entrée de grotte: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Garrigue, sous des pierres: LOPEZ, 1974. Garrigue, sous les feuilles mortes: SOYER, 1955. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: DALMAS, 1920. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lit-

toral rocheux, entre les pierres : SOYER, 1955. Maison : BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; BRAUD & al., 2005; CLARK & al., 1970; DENIS, 1967e, 1968a; GOULLIART, 1979a; GUIBÉ, 1946; LENICE, 1992; LOPEZ, 1974; LUCAS, 1878b; ROSELLE, 1888b. Maquis, sous des pierres : BOSMANS & al., 1985a. Mur de maison, sur le lierre : DENIS, 1931a. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus* : KABOUCHE & al., 1997. Prairie sèche et caillouteuse : DELFOSSE, 2000b. Rochers : CANARD, 1989. Sous des pierres ou des écorces au sol : KOVOOR & al., 2000. Sous une pierre : CHANSIGAUD, 1992; DENIS, 1933b, 1934a; LUCAS, 1882a; MÜLLER, 1985. Zone caillouteuse sèche à végétation rase : BIGOT & al., 1983. [SIMON, 1914 indique : « Commun dans le Midi sous les pierres ; dans le Centre et le Nord se trouve isolément dans l'intérieur des maisons »]. **Période.** — *Mâle*. Juillet : MÜLLER, 1985. — *Femelle*. Mai : CLARK & al., 1970; DENIS, 1934a. Juin : CORNIC, 1978; DELFOSSE, 2000b. Août : DENIS, 1967d, 1968a; LUCAS, 1878b, 1882a. Septembre : CANARD, 1989; DENIS, 1935a. Octobre : KABOUCHE & al., 1997. — *Femelle avec cocon*. Août : CLARK & al., 1970.

*Scytodes velutina* Heineken & Lowe, 1832

**Répartition.** Corse : SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales : BRIGNOLI, 1976; DENIS, 1933b; GERHARDT, 1930; SOYER, 1965. — Espagne, Italie. Méditerranée, Îles du Cap-Vert. **Habitat.** Détritux secs : SIMON, 1914. Garrigue : SOYER, 1965. Sous une pierre : GERHARDT, 1930; SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Décembre : DENIS, 1933b; GERHARDT, 1930. — *Femelle*. Octobre : GERHARDT, 1930. Décembre : DENIS, 1933b.

LEPTONETIDAE

*Leptoneta abeillei* Simon, 1882

**Répartition.** Ardèche : BALAZUC & al., 1952; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1882, 1911, 1914. Gard : FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1914. — Espagne. **Habitat.** Grotte : BALAZUC & al., 1952; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1882, 1911, 1914. **Période.** — *Mâle*. Juillet : DRESCO & al., 1975. Août, septembre : DRESCO, 1962. — *Femelle*. Août : DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968. Septembre : DRESCO, 1962.

*Leptoneta alpica* Simon, 1882

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1882, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Détritux; mousses : SIMON, 1914.

*Leptoneta cavalairensis* Dresco, 1987

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Var : DRESCO, 1987. — Connue seulement de France.

*Leptoneta ciaisensis* Dresco, 1987

[Connue par un seul spécimen femelle].

**Répartition.** Alpes-Maritimes : DRESCO, 1987. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1000 m (DRESCO, 1987).

*Leptoneta condei* Dresco, 1987

**Répartition.** Alpes-Maritimes : DRESCO, 1987. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte : DRESCO, 1987. **Période.** — *Mâle*. Mars : DRESCO, 1987. — *Femelle*. Janvier : DRESCO, 1987.

*Leptoneta convexa* Simon, 1872

**Répartition.** Ariège : DENIS, 1959a, 1967d; DRESCO, 1989; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1913, 1914. Garonne (Haute-) : DENIS, 1959a. — Connue seulement de France. **Habitat.** Caverne : SIMON, 1914. Grotte : DENIS, 1959a, 1967d; DRESCO, 1989; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1913. **Période.** — *Mâle*. Février, avril, mai : DENIS, 1959a. — *Femelle*. Février : DENIS, 1967d. Avril, mai : DENIS, 1959a. Août : DRESCO, 1989. Septembre : DENIS, 1959a. Novembre : DRESCO, 1989.

*Leptoneta corsica* Fage, 1943

**Répartition.** Corse : DRESCO, 1986; FAGE, 1943; REMY, 1950. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Grotte : DRESCO, 1986; FAGE, 1943. Grotte, fissures des parois : REMY, 1950. **Période.** — *Mâle*. Octobre, novembre : DRESCO, 1986. — *Femelle*. Août, novembre : DRESCO, 1986.

*Leptoneta crypticola* Simon, 1907

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BRIGNOLI, 1979a; DRESCO, 1987; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1911, 1913, 1914. Var : DENIS, 1933c. — Italie. **Habitat.** Forêt, sous les grosses pierres : SIMON, 1914. Grotte : BRIGNOLI, 1979a; DRESCO, 1987; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1911, 1913, 1914. **Période.** — *Mâle*. Août : BRIGNOLI, 1979a. Septembre : DRESCO, 1987. — *Femelle*. Août : BRIGNOLI, 1979a. Septembre : DRESCO, 1987.

*Leptoneta fagei* Simon, 1914

**Répartition.** Gard : DRESCO, 1982; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1914. Hérault : CAILAR & al., 1951; DRESCO, 1982; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte : CAILAR & al., 1951; DRESCO, 1982; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926. **Période.** — *Mâle*. Octobre : DRESCO, 1982. — *Femelle*. Avril : DRESCO, 1982.

*Leptoneta fouresi* Dresco, 1979

**Répartition.** Garonne (Haute-) : DRESCO, 1979. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte : DRESCO, 1979. **Période.** — *Mâle*. Février, mars : DRESCO, 1979. — *Femelle*. Février, mars : DRESCO, 1979.

*Leptoneta infuscata* Simon, 1872

*L. minos.*

**Répartition.** Ariège : DENIS, 1953b, 1959a, 1960a, 1967d; DRESCO & al., 1968; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1882 (*L. m.*), 1907b (*L. m.*), 1910, 1911, 1913, 1914. Aude : FAGE, 1913, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1882 (*L. m.*), 1910, 1911, 1914. Garonne (Haute-) : DENIS, 1967d; DRESCO, 1947a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1914. Hérault : DRESCO & al., 1968; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; LOPEZ & al., 1977,

1978b, 1979, 1985; SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1932b, 1933b, 1960a, 1967d; FAGE, 1913; JEANNEL, 1926; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1882 (*L. m.*), 1911, 1913, 1914. — Espagne. Majorque. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Caverne: SIMON, 1914. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. Forêt de chênes-verts, au sol: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1932b, 1953b, 1959a, 1967d; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1913, 1931; JEANNEL, 1926; LOPEZ & al., 1977, 1978b, 1979, 1985; SIMON, 1882, 1907b, 1910, 1911, 1913. Litière: DENIS, 1933b. Mousses: DENIS, 1933b, 1967d; SIMON, 1914. Sous les grosses pierres: SIMON, 1914. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Talus, fissures: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1953b. Février, mars: DENIS, 1967d. Mai: DENIS, 1967d; DRESKO & al., 1968. Juin: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: DENIS, 1959a; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1967d. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1967d; DRESKO & al., 1968. — *Femelle.* Février: DENIS, 1967d. Mars: DENIS, 1960a, 1967d. Avril: DENIS, 1959a; LEDOUX & al., 1996a. Juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1953b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1960a; LEDOUX & al., 2003. Septembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1959a. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1967d.

*Leptoneta jeanneli* Simon, 1907

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953b, 1967d; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1910, 1911, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Caverne: SIMON, 1914. Grotte: DENIS, 1953b; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1910, 1911. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1953b. Août: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1953b. Août: DENIS, 1967d.

*Leptoneta lantosquensis* Dresko, 1987

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DRESKO, 1987. — Connue seulement de France.

*Leptoneta manca* Fage, 1913

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DRESKO, 1987. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DRESKO, 1987.

*Leptoneta microphthalmia* Simon, 1872

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1953b, 1959a, 1967d; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; LOPEZ & al., 1978a; SIMON, 1914. Aude: DENIS, 1959a. Garonne (Haute-): DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1947a; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE-JUPEAU & al., 1981; LOPEZ & al., 1978a; SIMON, 1910. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1400 m (DRESKO, 1947a). **Habitat.** Caverne: SIMON, 1914. Grotte: DENIS, 1953b, 1959a,

1967d; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE-JUPEAU & al., 1981; LOPEZ & al., 1978a; SIMON, 1910. Ruisseau souterrain: DENIS, 1959a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1953b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1959a. Février: DENIS, 1967d. Mars, avril: DENIS, 1959a. Mai: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1953b, 1959a. Septembre: DENIS, 1959a. Octobre: DENIS, 1959a, 1967d.

*Leptoneta olivacea* Simon, 1882

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: LUCZACK & al., 1964. "Seine": DRESKO, 1983. Var: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1882, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Caverne: SIMON, 1914. Galerie souterraine: DRESKO, 1983. Grotte: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; LUCZACK & al., 1964. **Période.** — *Femelle.* Décembre: DRESKO, 1983.

*Leptoneta proserpina* Simon, 1907

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DRESKO, 1987; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1913, 1914. Alpes-de-Haute-Provence, Hérault: DRESKO, 1987. — Connue seulement de France. **Habitat.** Caverne: SIMON, 1914. Grotte: DRESKO, 1987; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1913. Rivière souterraine: DRESKO, 1987. **Période.** — *Mâle.* Octobre: DRESKO, 1987. — *Femelle.* Mai, septembre: DRESKO, 1987.

*Leptoneta trabucensis* Simon, 1907

**Répartition.** Gard: FAGE, 1913, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907a, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Caverne: SIMON, 1914. Grotte: FAGE, 1913, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907a.

*Leptoneta vittata* Fage, 1913

[*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Var: FAGE, 1913; SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt, entre les feuillettes de micasciste recouverts de terre: SIMON, 1914. Grotte: FAGE, 1913.

*Protoleptoneta italica* (Simon, 1907)

*Leptoneta i.*; *Paraleptoneta i.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1907a (*L. i.*), 1914 (*P. i.*). — Italie. Autriche.

TELEMIDAE

*Telema tenella* Simon, 1882

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1932b, 1951a, 1959a; EMERIT & al., 2000; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE, 1985; LOPEZ, 1983; LOPEZ & al., 1976; SIMON, 1882, 1911, 1913, 1914. — Espagne. **Habitat.** Grotte: DENIS, 1932b, 1951a, 1959a; EMERIT & al., 2000; JEANNEL, 1926; JUBERTHIE, 1985; LOPEZ, 1983; LOPEZ & al., 1976; SIMON, 1911, 1913. Mine de cuivre: LOPEZ, 1983. **Période.** — *Femelle.* Novembre: DENIS, 1959a.

PHOLCIDAE

WUNDERLICH, 1991 crée le genre *Spermophorides* dans lequel il transfère l'espèce *Spermophora elevata*. D'autres espèces (*Spermophora huberti*, *S. mediterranea*, *S. simoni*) sont aussi transférées dans ce nouveau

genre par SENGLLET, 2001. Ces nouvelles dénominations n'ont pas été utilisées pour des citations en France; ces espèces sont maintenues ici dans le genre *Spermophora*.

***Holocnemus pluchei*** (Scopoli, 1763)

*H. rivulatus*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*H. r.*). Ardèche: DRESKO & al., 1975. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1874a (*H. r.*), 1914; WUNDERLICH, 1980a. Hérault: LOPEZ, 1973. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Var: BRIGNOLI, 1971; DENIS, 1933a; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: SIMON, 1874a (*H. r.*). — Midi de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Méditerranée. **Habitat.** Cactus et agaves: SIMON, 1874a. Garrigue: LOPEZ, 1973. Grotte: DRESKO & al., 1975. Maison; rochers: CANARD, 1989. Rochers, anfractuosités: SIMON, 1874a. Sous écorce d'eucalyptus: KOVOOR & al., 2000. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Trous des murailles: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Mars: DRESKO & al., 1975. Mai: DENIS, 1933b. Juillet: BRIGNOLI, 1971. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b. Juillet: BRIGNOLI, 1971.

***Pholcus opilionoides*** (Schrank, 1781)

**Répartition.** Ain: HUBERT, 1964a. Alpes (Hautes-): DRESKO & al., 1975; SIMON, 1874a. Alpes-Maritimes: SENGLLET, 2001. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a. Ardennes: LENICE, 1992. Aube: SIMON, 1874a. Aude: JEANNEL, 1926; SIMON, 1910. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Corse: SENGLLET, 2001; SIMON, 1874a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1909a. Gard: EMERIT & al., 1994. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a. Hérault: SENGLLET, 2001. Isère: SIMON, 1874a. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1933d; DRESKO & al., 1975; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1910. Seine-et-Marne: DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Var: DENIS, 1934a; SENGLLET, 2001; SIMON, 1898c. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne; bois de chênes, sous des pierres: EMERIT & al., 1997. Bâtiment: SIMON, 1874a. Carrière: DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Carrière de pierres à chaux: BOSMANS & al., 1985a. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Forêt de chênes et châtaigniers, litière; forêt de chênes-verts, sous les pierres: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, anfractuosités de rochers: DENIS, 1950b. Grotte: HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1910. Lande à genêts, sous des pierres: LEDOUX & al., 1996a. Maison: LENICE, 1992; SIMON, 1909a. Maquis de cistes, sous des pierres: LEDOUX & al., 1996a. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Murs et talus, anfractuosités: DENIS, 1933b. Murs, trous: SIMON, 1914. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Rochers, anfractuosités: SIMON, 1914. Sous une pierre: DENIS, 1934a; LESSERT, 1904; SIMON, 1874a, 1914. Trous des vieux murs: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Mai: LESSERT, 1904, 1910; SENGLLET, 2001. Juin: HUBERT, 1964a; SENGLLET, 2001.

Juillet: DENIS, 1950b; LEDOUX & al., 1996a. Août: HUBERT, 1964a. Décembre: LESSERT, 1910. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a; LESSERT, 1904, 1910; SENGLLET, 2001. Juin: DRESKO & al., 1975; LEDOUX & al., 1999a; SENGLLET, 2001. Juillet: DENIS, 1950b. Août: DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; LEDOUX & al., 2003. Septembre: EMERIT & al., 1997. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. Décembre: LESSERT, 1910. — *Femelle avec cocon*. Juin: EMERIT & al., 1997.

***Pholcus phalangioides*** (Fuesslin, 1775)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DRESKO, 1962; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b. Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: BALAZUC & al., 1952, 1954; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; FAGE, 1931; VIRÉ, 1896. Aude: FAGE, 1931. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; LUCZACK & al., 1964. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c. Charente: HUBERT, 1964a. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: BRIGNOLI, 1971; CANARD, 1989. Côte-d'Or: DRESKO, 1956, 1959c; HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; DRESKO, 1973. Drôme: JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Eure: SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; LUCAS, 1868; YSNEL, 1990a. Gard: BRIGNOLI, 1971; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Hérault: FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; LOPEZ, 1974; LOPEZ & al., 1979. Ile-et-Vilaine: YSNEL, 1990a. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot: FAGE, 1931. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: YSNEL, 1990a. Nord: DENIS, 1930; GOULLIART, 1979a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1932b, 1933b; HUBERT, 1964a; LEDOUX & al., 2003. Rhône: DRESKO & al., 1975. Savoie (Haute-): MULLER & al., 1895. "Seine": DALMAS, 1915; DRESKO, 1957a; HUBERT, 1964a. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn: FAGE, 1931. Tarn-et-Garonne: DRESKO, 1962. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Habitat.** Bâtiment: DENIS, 1964b; DRESKO, 1973; LOPEZ, 1974; SIMON, 1914. Cave: DENIS, 1933b; DRESKO, 1973; ROSELLE, 1887. Galerie souterraine: DRESKO, 1957a, 1959c; DRESKO & al., 1975. Grotte: BALAZUC & al., 1952, 1954; DENIS, 1932b, 1933b; DRESKO, 1956, 1962; DRESKO & al., 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; LOPEZ & al., 1979; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1907b, 1913, 1914; VIRÉ, 1896. Grotte, à l'entrée: LOPEZ, 1974. Maison: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; BRAUD & al., 2005; CANARD, 1989; DALMAS, 1915; DENIS, 1934a, 1939a, 1940a, 1941, 1964b, 1965c; DOIGNON, 1976; DRESKO, 1973; GOULLIART, 1979a; KOVOOR & al., 2000; LANCELEVÉE, 1884; LENICE, 1992; LUCAS, 1868, 1874c, 1878a, 1878b, 1882a; SIMON, 1874a, 1909a, 1914; VEILLON, 1997. Marécage: BELIN, 2001. Mine: DRESKO, 1962. Mine de charbon: DENIS, 1930. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1935a. Sur un mur: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Village: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DRESKO & al., 1975. Mars: DENIS, 1933b, 1963c, 1964b; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Avril: DENIS, 1930. Mai: DENIS, 1930; DRESKO,

1973. Juin : DENIS, 1941. Juillet : DENIS, 1940a, 1963c, 1964b; LEDOUX & al., 2003. Août : DENIS, 1964b; DRESKO, 1973; HUBERT, 1964a; LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre : BRIGNOLI, 1971; DENIS, 1963c, 1964b. Octobre : DENIS, 1935a; HUBERT, 1964a. Novembre : DENIS, 1965c. Décembre : DRESKO, 1962. — *Femelle*. Février : DENIS, 1930, 1965c. Mars : DENIS, 1964b; DRESKO, 1957a, 1959c; HUBERT, 1964a. Avril : DENIS, 1930, 1964b. Mai : DENIS, 1930; DRESKO, 1962, 1973. Juin : BRIGNOLI, 1971; DENIS, 1941. Juillet : DALMAS, 1915; DENIS, 1940a, 1963c, 1964b; VEILLON, 1997. Août : DENIS, 1964b; DRESKO, 1973; LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre : CANARD, 1989; DENIS, 1963c, 1964b. Octobre : DENIS, 1935a. Novembre : DENIS, 1965c. Décembre : HUBERT, 1964a. — *Femelle avec cocon*. Février : DENIS, 1930. Août, octobre : DENIS, 1963c.

*Psilochorus simoni* (Berland, 1911)

*Physocyclus s.*

**Répartition.** Aude : DENIS, 1967d (*P. s.*). Calvados : GUIBÉ, 1943 (*P. s.*), 1946 (*P. s.*). Côtes-d'Armor, Finistère : DRESKO, 1973 (*P. s.*). Hérault : LEDOUX, 1967 (*P. s.*). Ille-et-Vilaine : YSNEL, 1990a. Loire-Atlantique : BEAUCOURNU & al., 1963b (*P. s.*), 1963c (*P. s.*); DRESKO, 1959a (*P. s.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Nord : DENIS, 1960b (*P. s.*); GOULLIART, 1979a (*P. s.*). Orne : YSNEL, 1990a. Rhin (Haut-) : SCHALLER, 2000. Rhône : DALMAS, 1920 (*P. s.*). "Seine" : BERLAND, 1911 (*P. s.*), 1931 (*P. s.*), 1933 (*P. s.*); DALMAS, 1915 (*P. s.*), 1920 (*P. s.*); HUBERT, 1964a (*P. s.*); LESNE, 1933 (*P. s.*). Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Vendée : DENIS, 1966a (*P. s.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Bâtiment : DRESKO, 1973. Cave : BEAUCOURNU & al., 1963b; BERLAND, 1911; DRESKO, 1959a, 1973; GUIBÉ, 1943, 1946; LEDOUX, 1967; LESNE, 1933. Galerie souterraine : HUBERT, 1964a. Grotte : BEAUCOURNU & al., 1963c; DENIS, 1967d. Maison : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; BERLAND, 1931, 1933; BRAUD & al., 2005; DALMAS, 1915; DENIS, 1960b, 1966a; DRESKO, 1973; GOULLIART, 1979a. Maison, cave : DALMAS, 1920. **Période.** — *Mâle*. Mars : DENIS, 1967d. Avril : LEDOUX, 1967. Mai, juillet : DRESKO, 1973. Septembre : DALMAS, 1920; DRESKO, 1973. Octobre : GUIBÉ, 1943. Novembre : LEDOUX, 1967. — *Femelle*. Mars : DENIS, 1960b; DRESKO, 1959a. Avril : LEDOUX, 1967. Juillet : DALMAS, 1915; DENIS, 1966a; DRESKO, 1973. Septembre : DALMAS, 1920; DRESKO, 1973. Octobre : GUIBÉ, 1943. Novembre : LEDOUX, 1967. — *Femelle avec cocon*. Mars : DENIS, 1960b.

*Spermophora elevata* Simon, 1873

*Spermophorides e.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1874a. Corse : CANARD, 1989; SENGLET, 1972, 2001 (*S. e.*); SIMON, 1874a, 1914. Var : BECKER, 1882; DENIS, 1933a; SIMON, 1898c. — Provence : SIMON, 1914. Italie. Ouest-Méditerranée (*S. e.*). **Habitat.** Buissons : SIMON, 1874a. Détritus secs : SIMON, 1914. Litière; sous les rochers : CANARD, 1989. Sous une pierre : SIMON, 1874a, 1914. **Période.** — *Mâle*. Mai : SENGLET, 1972. — *Femelle*. Mai : SENGLET, 1972. Septembre : SENGLET, 2001.

*Spermophora huberti* Senglet, 1972

*Spermophorides h.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Var : SENGLET, 1972. — Espagne. **Habitat.** Anfractuosités de rochers à l'ombre de grands arbres; sous des herbes sèches : SENGLET, 1972. **Période.** — *Mâle*. Juin : SENGLET, 1972. — *Femelle*. Juin : SENGLET, 1972.

*Spermophora mediterranea* Senglet, 1972

*Spermophorides m.*

**Répartition.** Corse : SENGLET, 1972; TIBERGHEN & al., 1993a. Var : KOVOOR & al., 2000; SENGLET, 2001 (*S. m.*). — Espagne. **Habitat.** Lieu humide : TIBERGHEN & al., 1993a. Lieux humides, sous des souches d'arbres : KOVOOR & al., 2000. Sous des herbes sèches : SENGLET, 1972. **Période.** — *Mâle*. Mai : SENGLET, 1972. Juin : SENGLET, 2001. — *Femelle*. Mai : SENGLET, 1972. Juin : SENGLET, 2001.

*Spermophora senoculata* (Dugès, 1836)

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1874a. Ardèche : DRESKO & al., 1975. Ariège : DENIS, 1953b. Bouches-du-Rhône, Hérault : SIMON, 1874a. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b. Vaucluse : SIMON, 1874a. Vendée : DENIS, 1953c, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Languedoc et Provence : SIMON, 1914. Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bâtiment : SIMON, 1874a, 1914. Grotte : DENIS, 1953b; DRESKO & al., 1975. Maison : BRAUD & al., 2005; DENIS, 1953c, 1962b, 1962d, 1964b, 1965c; SIMON, 1874a, 1914. Sous une pierre : DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle*. Juillet : DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — *Femelle*. Juin à août : DENIS, 1964b. Septembre : DENIS, 1962d. Octobre : DENIS, 1965c.

*Spermophora simoni* Senglet, 1973

*Spermophorides s.*

**Répartition.** Corse : SENGLET, 2001 (*S. s.*); TIBERGHEN & al., 1993a. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Maquis : TIBERGHEN & al., 1993a. Sous une pierre : SENGLET, 2001. **Période.** — *Femelle*. Mai : SENGLET, 2001.

SEGESTRIIDAE

*Ariadna insidiatrix* Sav. & Aud., 1825

*A. spinipes.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SOYER, 1955 (*A. s.*). Corse : CANARD, 1989; SIMON, 1914 (*A. s.*). Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b (*A. s.*); LEDOUX, 1967. Var : BECKER, 1880 (*A. s.*); DENIS, 1934a (*A. s.*). — Littoral méditerranéen : SIMON, 1914 (*A. s.*). Espagne, Italie. Méditerranée. **Habitat.** Bord de mer, falaise : DENIS, 1934a. Bord de mer, rochers : CANARD, 1989; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1967. Sous une pierre : DENIS, 1934a. **Période.** — *Mâle*. Mai : DENIS, 1934a. Juillet : LEDOUX, 1967. — *Femelle*. Juillet, septembre, octobre : CANARD, 1989.

*Segestria bavarica* C. L. Koch, 1843

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence : MÜLLER, 1985. Aude : DELFOSSE, 2000a. Cal-

vados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Côtes-d'Armor: DRESCO, 1971a; YSNEL, 1990a. Finistère: DRESCO, 1971a. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: DRESCO, 1971a; MARC, 1990b; YSNEL, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: LUCAS, 1878b. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: YSNEL, 1990a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1961b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": GROS, 1983a; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: SIMON, 1898b. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1964b. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Alvéoles d'un poteau en ciment: DENIS, 1964b. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Dune, oyats: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, sur un chêne: DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, sous les pierres: DENIS, 1961b. Maison: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1964b. Marécage: BELIN, 2001. Mur: LUCAS, 1878b. Murailles: LUCAS, 1878a. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1933b. Sous les écorces de cerisiers: LANCELEVÉE, 1884. Sous une pierre: DENIS, 1941, 1962b; MÜLLER, 1985. **Période.** — *Mâle.* Juillet: MÜLLER, 1985. Août: DRESCO, 1971a; LUCAS, 1878b. Septembre: CLARK & al., 1970. — *Femelle.* Avril: DRESCO, 1971a. Juillet: DRESCO, 1971a; GROS, 1983a. Août: DRESCO, 1971a; LUCAS, 1878a, 1878b. Septembre: MÜLLER, 1985. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941, 1962b, 1964b.

#### *Segestria florentina* (Rossi, 1790)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Calvados: LUCAS, 1863, 1870c. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; ROEWER, 1926; SIMON, 1914. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a. Finistère: LUCAS, 1868. Gard: EMERIT & al., 1994. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990a. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a; YSNEL, 1990a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: LUCAS, 1878b. Morbihan: YSNEL, 1990a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. "Seine": PLANET, 1905; SIMON, 1914. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: BECKER, 1880, 1882; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1936, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1963c, 1965c; DRESCO, 1971a; YSNEL, 1990a. — Midi de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe à Géorgie. **Altitude.** Jusqu'à 910 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune, dans un tas de galets: DENIS, 1963c. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Creux d'arbres: SIMON, 1914. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Maison: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; BRAUD & al., 2005; DENIS, 1965c. Marécage: BELIN, 2001. Mur: LUCAS, 1863, 1868, 1878b, 1882a. Murs et tamaris: EMERIT & al., 1994. Pelouse à *Brachypodium ramosum*: LEDOUX & al., 1996a. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1933b. Sous écorces de pins: DENIS, 1934a. Sous l'écorce d'un pin: KOVOOR & al., 2000. Sous les écorces: SIMON, 1914. Sur un mur:

BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LUCAS, 1870c. Tronc de chêne: CANARD, 1989. Trous des murs: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1933b. Août: LUCAS, 1863, 1878b, 1882a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin: DRESCO, 1971a. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: LUCAS, 1878b, 1882a. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a.

#### *Segestria fusca* Simon, 1882

**Répartition.** Aude: SIMON, 1882, 1914. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973, 1983; KABOUCHE & al., 1997. Gard: LEDOUX, 1963. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1882, 1914. Var: BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993. — Espagne, Italie. Portugal. **Altitude.** 460 m (KABOUCHE & al., 1997). **Habitat.** Bord d'étang: LEDOUX, 1963. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus*: KABOUCHE & al., 1997. Sous une pierre: SIMON, 1914. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Octobre: LEDOUX, 1963.

#### *Segestria pusiola* Simon, 1882

**Répartition.** Corse: SIMON, 1882, 1914. — Espagne. Algérie. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1914.

#### *Segestria senoculata* (Linnaeus, 1758)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Aude: DELFOSSE, 2000a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870c. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1914. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; DRESCO, 1971a. Eure: SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; DRESCO, 1971a; YSNEL, 1990a. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; YSNEL, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924. Morbihan: YSNEL, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904; MULLER & al., 1895. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: DENIS, 1937a; KOVOOR & al., 2000. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2020 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bois, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Creux d'arbres et de rochers: SIMON, 1914. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de chênes et châtaigniers, litière; forêt de chênes-verts, sous les pierres: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins, sous des pierres:



BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt de pins, troncs : MARC, 1990b. Forêt de sapins et de hêtres : BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, sous les pierres : SIMON, 1914. Forêt, troncs : DOIGNON, 1976. Gorge humide, mousses : BOSMANS & *al.*, 1985a. Jardin en milieu urbain : VEILLON, 1997. Lande à genêts : LEDOUX & *al.*, 1996a. Littoral, falaises, dans une fissure : DENIS, 1940a. Marécage : BELIN, 2001. Murs : LUCAS, 1882a. Pelouse à plantain caréné : LEDOUX & *al.*, 1995. Pont sur un torrent : DENIS, 1960a. Rhododendrons, sous les pierres : LEDOUX & *al.*, 1996c. Rochers, anfractuosités : DENIS, 1933b, 1952c. Sous l'écorce d'un vieux chêne : LUCAS, 1872. Sous les écorces : DENIS, 1933b. Sous un amas de briques : BERLAND, 1924. Sous une pierre : DENIS, 1933b, 1940a. **Période.** — *Mâle*. Janvier, février : DENIS, 1933b. Juillet : DENIS, 1938a. Août : LUCAS, 1882a; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Avril : DRESKO, 1971a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai : TAMBS-LYCHE, 1957. Juillet : DENIS, 1938a, 1940a, 1952c, 1960a; LEDOUX & *al.*, 1996c. Août : DENIS, 1952c; DRESKO, 1971a; LUCAS, 1882a. Septembre : KRAUS, 1955; LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre : DRESKO, 1971a. Novembre : LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1940a.

## DYSDERIDAE

*Dasumia laevigata* (Thorell, 1873)

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône : SIMON, 1914; SOYER, 1955. Var : DENIS, 1934a; SIMON, 1914. Vaucluse : SIMON, 1914. — Europe. **Habitat.** Bois de conifères, détritiques : SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Mai : DENIS, 1934a. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1934a.

*Dasumia taeniifera* Thorell, 1875*Harpactes taeniifer*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var : SIMON, 1898c (*H. t.*). — Italie. **Habitat.** Sous une pierre : SIMON, 1898c.

*Dysdera cribrata* Simon, 1882

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1882, 1914. Alpes-Maritimes : BECKER, 1882; SIMON, 1882, 1914. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1882, 1914. Pyrénées-Orientales : TAMBS-LYCHE, 1957. — Espagne. **Période.** — *Mâle*. Mai : TAMBS-LYCHE, 1957.

*Dysdera crocata* C. L. Koch, 1838

**Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & *al.*, 1992. Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1957, 1965; PETIT & *al.*, 1945; SOYER, 1955. Calvados : GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime : BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corse : CANARD, 1989; GRASSHOFF, 1959; SIMON, 1914. Côtes-d'Armor : DRESKO, 1972. Doubs : EMERIT & *al.*, 1997. Eure : SIMON, 1909a. Finistère : DENIS, 1940a; DRESKO, 1972. Gard : SIMON, 1913. Gironde : DENIS, 1951b. Ille-et-Vilaine : MARC, 1990b. Loire-Atlantique : LUCAS, 1882a; YSNEL, 1990a. Maine-et-Loire : BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924; KERVILLE, 1898; PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan : YSNEL, 1990a. Nord : DENIS, 1930, 1932a. Orne : YSNEL, 1990a. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b, 1967d. "Seine" : DALMAS, 1920; ROLLARD, 2000. Seine-Mari-

time : BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. Var : BECKER, 1880; DENIS, 1934a, 1935a; KOVOOR & *al.*, 2000. Vendée : CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; YSNEL, 1990a. Yonne : DRESKO, 1950. — Toute la France : SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Altitude.** 250 m (RAPHAËL & *al.*, 1992). **Habitat.** Arrière-dune : DENIS, 1964b. Arrière-dune, sous des pierres : DENIS, 1962b, 1965c. Base d'un tronc de pin : CANARD, 1989. Bois : BRAUD & *al.*, 2005. Bord d'étang : PETIT & *al.*, 1945. Carrière : DRESKO, 1950. Carrière de calcaire : VEILLON, 1997. Dune : CLARK & *al.*, 1970. Estuaire, sous des joncs coupés : DENIS, 1951b. Forêt de pins : DENIS, 1965c. Forêt de pins maritimes, détritiques : CLARK & *al.*, 1970. Forêt de pins, litière et mousses : DENIS, 1962b. Forêt de pins, troncs : MARC, 1990b. Grotte : SIMON, 1913. Jardin : BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. Littoral, marais salé : PÉTILLON & *al.*, 2004. Marécage : BELIN, 2001. Marécage salé : BIGOT, 1965. Mine de charbon : DENIS, 1930, 1932a. *Salicornietum* : BIGOT, 1957, 1965. Serre : VEILLON, 1997. Sous un amas de briques : BERLAND, 1924. Sous une pierre : CANARD, 1989; EMERIT & *al.*, 1997; KERVILLE, 1898; LUCAS, 1882a. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & *al.*, 1992. *Therobrachypodium* : BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle*. Février : CANARD, 1989; DENIS, 1934a. Avril : DENIS, 1962b; DRESKO, 1972. Mai : DENIS, 1965c. Août : DENIS, 1962b. Septembre : DENIS, 1951b. — *Femelle*. Mars : DRESKO, 1972. Avril : DENIS, 1962b; DRESKO, 1972. Mai : DENIS, 1930, 1965c. Juin : DENIS, 1930, 1964b; EMERIT & *al.*, 1997; VEILLON, 1997. Août : DENIS, 1962b; DRESKO, 1972; LUCAS, 1882a. Septembre : CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1951b; DRESKO, 1950. Octobre : CANARD, 1989; DENIS, 1963c.

*Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802)

*D. cambridgei*; *D. fervida*; *D. lantosquensis*; *D. provincialis*; *Dysderina e.*

**Répartition.** Ain : HEIDT & *al.*, 1998. Alpes-Maritimes : SIMON, 1882 (*D. l.*), 1914. Ardèche : RAPHAËL & *al.*, 1992; SIMON, 1914. Ariège : DENIS, 1960a, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône : BIGOT & *al.*, 1973, 1983; DENIS, 1954b; LUCZACK & *al.*, 1964; SIMON, 1914; SOYER, 1955. Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870c. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1882 (*D. f.*), 1914. Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a; DRESKO, 1972; LUCAS, 1871a; YSNEL, 1990a. Doubs : EMERIT & *al.*, 1997. Eure : SIMON, 1899, 1909a. Finistère : BIGOT, 1983; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; DRESKO, 1972; LUCAS, 1868; YSNEL, 1990a. Gard : SIMON, 1914. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a. Hérault : EMERIT & *al.*, 1985, 1990; LOPEZ & *al.*, 1979; SIMON, 1914. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979 (*D. e.*), 1980; DENIS, 1938a; MARC, 1990b; YSNEL, 1990a. Loir-et-Cher : LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique : DENIS, 1967e; LUCAS, 1882a. Maine-et-Loire : BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche : KERVILLE, 1900; LUCAS, 1877a, 1878b; YSNEL, 1990a. Marne : LUCAS, 1878a. Mayenne : YSNEL, 1990a. Morbihan : DRESKO, 1972; YSNEL, 1990a. Nord : GOULLIART, 1979a. Pas-de-Calais : BONTE, 2000. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1953b, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b,

1963e, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*D. c.*), 1910 (*D. c.*). "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (*D. e.*); LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1882 (*D. p.*), 1898c (*D. p.*), 1914. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992 (*D. e.*); LEDOUX, 2000; SIMON, 1914. Vendée: DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1963c, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe jusqu'à la Géorgie. **Altitude.** Jusqu'à 2650 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a, 1959d; LUCAS, 1875. Bois de chênes, litière: EMERIT & al., 1997. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bois de pins: DENIS, 1952c. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de mer, sous une pierre: KERVILLE, 1900. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bord de ruisseau: DENIS, 1961b. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Crevasses des grands rochers: BOSMANS & al., 1985a. Dune: DENIS, 1963c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Dune, sous des pierres: DENIS, 1962b. Éboulis calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt claire, pelouse: LEDOUX, 2000. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes et châtaigniers; forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, litière de chênes: DENIS, 1963c. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Grotte: LOPEZ & al., 1979; LUCZACK & al., 1964. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: DENIS, 1938a. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, sable: BIGOT, 1983. Mousses: SIMON, 1909a. Murailles: LUCAS, 1878a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Plage, galets; plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Ripisilve, litière: LEDOUX, 2000. Sous de la paille: ROSELLE, 1888b. Sous une pierre: BOSMANS & al., 1985a; CHANSIGAUD, 1992; DENIS, 1934a, 1957a; GOULLIART, 1979a; LUCAS, 1868, 1870c, 1877a, 1878b, 1882a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Vieux murs: GOULLIART, 1979a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c; LEDOUX, 2000. Avril: DENIS, 1962b; DRESKO, 1972; LEDOUX, 2000. Mai: DENIS, 1934a, 1962b, 1965c, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1933b, 1941, 1954a; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON,

1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1957a, 1963e. Août: DENIS, 1959c, 1962b; DRESKO, 1972; LUCAS, 1868, 1870c. Septembre: DENIS, 1963c, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: DENIS, 1965c; DRESKO, 1972; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1953b, 1963c. Avril: DENIS, 1962b; DRESKO, 1972; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai: DENIS, 1934a, 1938a, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1962b, 1967d; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1950b, 1952c, 1957a, 1960a, 1961b, 1963c, 1963e; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1967d; DRESKO, 1972; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1868, 1870c, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre: DENIS, 1951c, 1959c, 1962b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875. Octobre: DENIS, 1962b, 1967d. Novembre: DENIS, 1965c; DRESKO, 1972; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1962b. Juillet: DENIS, 1952c, 1960a, 1963c. Août: DENIS, 1962b. — *Femelle avec ses jeunes.* Août: LUCAS, 1877a.

#### *Dysdera fuscipes* Simon, 1882

**Répartition.** Gironde: SIMON, 1882, 1914. Landes: DRESKO, 1972. Morbihan: SIMON, 1882, 1914. — Espagne. Portugal. **Période.** — *Mâle.* Avril: DRESKO, 1972.

#### *Dysdera kulczynskii* Simon, 1914

[Femelle inconnue]. **Répartition.** [Aucune localité précise. SIMON, 1914 indique «Midi de la France»]. — Italie.

#### *Dysdera lata* Wider, 1834

*D. westringi* [err.].

**Répartition.** Corse: SIMON, 1914 [*D. westringi*, err. selon PLATNICK, 2004]. — De la Méditerranée à la Géorgie.

#### *Dysdera nicaeensis* Thorell, 1873

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Var: SIMON, 1898c. Vaucluse: SIMON, 1914. — Italie.

#### *Dysdera ninnii* Canestrini, 1868

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1914. Corse: KRAUS, 1955; ROEWER, 1926; SIMON, 1914. Var: SIMON, 1914. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe du Sud à Ukraine. **Altitude.** Jusqu'à 700 m (KRAUS, 1955). **Période.** — *Femelle.* Mars: ROEWER, 1926. Avril: KRAUS, 1955; ROEWER, 1926.

#### *Dysdera nubila* Simon, 1882

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989; GRASSHOFF, 1959; KRAUS, 1955; SIMON, 1882, 1914. — Italie. **Altitude.** 1100 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Litière: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle.* Avril: KRAUS, 1955. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle.* Avril: KRAUS, 1955. Septembre: CANARD, 1989; KRAUS, 1955.

***Dysdera punctata*** C. L. Koch, 1838

**Répartition.** Var: SIMON, 1898c. [Remarque: la citation de SIMON, 1898c n'est pas reprise par SIMON, 1914]. — Espagne. Europe du Sud-est à la Géorgie.

***Dysdera rudis*** Simon, 1882

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Var: SIMON, 1882, 1914 [Les deux citations de SIMON se rapportent à un même spécimen]. — [ROEWER, 1942, indique de façon erronée cette espèce du Maroc; cette erreur est reprise par PLATNICK, 2004 et CANARD, 2005].

***Dysdera scabricula*** Simon, 1882

**Répartition.** Var: SIMON, 1882, 1914. — Espagne.

***Dysdera subsquarrosa*** Simon, 1914*D. kollari.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Var: BECKER, 1880 (*D. k.*). — Pyrénées: SIMON, 1914. Espagne. Italie. **Altitude.** 1600 m (BOSMANS & al., 1985a).

***Dysdera westringi*** O. P.-Cambridge, 1872*D. sanguinipes.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1882 (*D. s.*). [La citation de Corse par SIMON, 1914 est erronée selon PLATNICK, 2004, et se rapporte à *D. lata*. Mais PLATNICK, 2004 valide la citation de SIMON, 1882 sous le nom *D. sanguinipes* (= *D. westringi*); or, la citation de 1914 semble n'être qu'une répétition de la citation de 1882. Cette contradiction doit faire douter de la présence de cette espèce en Corse. Par ailleurs DEELEMANN-REINHOLD & al., 1988 indique: « nous n'avons pas pu préciser l'identité de *D. sanguinipes* Simon 1882 synonymisé par Roewer (1942: 296) avec *D. westringii*; le tube au MNHP portant l'étiquette '*D. sanguinipes*' ne contenait qu'une patte, qui est d'ailleurs rouge' ]. — Espagne, Italie. Est-Méditerranée.

***Harpactea arguta*** (Simon, 1907)*Harpactes argutus.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Var: SIMON, 1907a (*H. a.*), 1914 (*H. a.*). — Italie.

***Harpactea corticalis*** (Simon, 1882)*Harpactes c.*; *Harpactes modestus.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1882 (*H. m.*), 1914 (*H. c.*). Ariège: DENIS, 1960a (*H. c.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955 (*H. c.*). Corse: SIMON, 1882 (*H. c.*), 1914 (*H. c.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914 (*H. c.*). Var: KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1882 (*H. m.*), 1914 (*H. c.*). — Italie. Europe du Sud. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (DENIS, 1960a). **Période.** — *Femelle.* Août: DENIS, 1960a.

***Harpactea haymozi*** Brignoli, 1979

**Répartition.** Ardèche: BRIGNOLI, 1979b. [Localité: Saint-Péray, près de Valence]. — Connue seulement de France. **Altitude.** 300 m (BRIGNOLI, 1979b). **Habitat.** Humus: BRIGNOLI, 1979b. **Période.** — *Mâle.* Août: BRIGNOLI, 1979b. — *Femelle.* Août: BRIGNOLI, 1979b.

***Harpactea hispana*** (Simon, 1882)*Harpactes hispanus.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1882 (*H. h.*), 1914 (*H. h.*). — Espagne.

***Harpactea hombergi*** (Scopoli, 1763)*Dysdera h.*; *Harpactes h.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*H. h.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*H. h.*); LUCAS, 1870c (*D. h.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*H. h.*); LUCAS, 1871a (*D. h.*); YSNEL, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899 (*H. h.*), 1909a (*H. h.*). Finistère: DENIS, 1938a (*H. h.*), 1940a; YSNEL, 1990a. Gironde: DENIS, 1951b. Hérault: EMERIT & al., 1985 (*H. h.*). Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; YSNEL, 1990a. Isère: SIMON, 1913 (*H. h.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e (*H. h.*); LUCAS, 1882a (*D. h.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1898 (*H. h.*); LUCAS, 1878b (*D. h.*). Marne: LUCAS, 1878a (*D. h.*). Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a (*H. h.*), 1963c (*H. h.*); DRESCO, 1959a (*H. h.*). Morbihan, Orne: YSNEL, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*H. h.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910 (*H. h.*). "Seine": CHRISTOPHE, 1974; DRESCO, 1947c (*H. h.*); LUCAS, 1875 (*D. h.*); PLANET, 1905 (*H. h.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*H. h.*); SIMON, 1898b (*H. h.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*H. h.*). Var: DENIS, 1936 (*H. h.*); MÜLLER, 1985. Vendée: DENIS, 1941, 1962b (*H. h.*), 1963c (*H. h.*), 1964b, 1965c (*H. h.*); YSNEL, 1990a. Vosges: DENIS, 1958b (*H. h.*). — Toute la France: SIMON, 1914 (*H. h.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe à Ukraine. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a, 1941; LUCAS, 1875. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de rivière, sous *Calluna*: BOSMANS & al., 1985a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bord de ruisseau, litière: LEDOUX & al., 2003. Brindilles sèches, bâtiment, sur un mur intérieur: DENIS, 1963c. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESCO, 1947c. Dune: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes sur terrain calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c. Forêt de pins, mousses sèches: MÜLLER, 1985. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, sous les écorces de chênes: PLANET, 1905. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DENIS, 1958b; SIMON, 1913. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Jardin, sous un tas de bois: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Maison: DENIS, 1963c; LE PERU, 2004; ROSELLE, 1888b. Maquis, sous des pier-

res: BOSMANS & *al.*, 1985a. Marécage: BELIN, 2001. Mousses: SIMON, 1909a, 1914. Mur: LUCAS, 1878b. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. Sous l'écorce d'un chêne-liège: DENIS, 1933b. Sous les écorces: SIMON, 1914. Sous une grosse pierre: LUCAS, 1878a. Sous une pierre: DENIS, 1933b, 1940a; KERVILLE, 1898; LUCAS, 1870c, 1882a; VEILLON, 1997. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b. Février: DENIS, 1953b, 1965c. Mars: LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b; DRESKO, 1947c, 1959a; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1933b, 1936. Juin: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1963c. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: DENIS, 1951b, 1963c; LUCAS, 1875; MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1958b. Novembre: LEDOUX & *al.*, 2003. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Février: DENIS, 1953b. Mars: DENIS, 1953b, 1963c. Avril: DENIS, 1962b; DRESKO, 1947c; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Mai: DENIS, 1965c, 1967e. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997. Juillet: DENIS, 1940a, 1963c; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1963c; LUCAS, 1870c, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996c; LUCAS, 1875; MÜLLER, 1985. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1933b, 1938a.

***Harpactea lepida*** (C. L. Koch, 1838)

*Harpactes lepidus*; *Harpactes seidelii*.

**Répartition.** Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895 (*H. s.*). [SIMON, 1914 indique, sous le nom *Harpactes lepidus*: «Cette espèce n'a pas encore été observée en territoire français, mais elle s'y trouve très probablement»]. — Allemagne, Suisse. Europe jusqu'à la Moldavie.

***Harpactea muscicola*** (Simon, 1882)

*Harpactes m.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1882 (*H. m.*), 1914 (*H. m.*). — Connue seulement de Corse.

***Harpactea serena*** (Simon, 1907)

**Répartition.** Aude, Pyrénées-Orientales, Var: SIMON, 1907a, 1914. — Espagne.

***Harpactocrates apennicola*** Simon, 1914

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1914. — Italie.

***Harpactocrates cantabrorum*** Simon, 1914

*Parachtes c.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1960a; SIMON, 1914. — Espagne (*P. c.*). **Altitude.** De 1400 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 1780 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bois, sous des pierres: DENIS, 1957a. **Période.** — *Femelle.* Mars: DENIS, 1960a. Août: DENIS, 1953a. Novembre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1957a.

***Harpactocrates drassoides*** (Simon, 1882)

*Dysdera d.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1914. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*D. d.*); DALMAS, 1915.

Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Savoie: SIMON, 1914. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c; SIMON, 1914. — Espagne, Italie, Suisse. Ouest-Europe. **Altitude.** [au-dessus de 1500 m selon DALMAS, 1915]. **Habitat.** Aulnes, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de conifères: DALMAS, 1915. Forêt, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Août: SIMON, 1914. Septembre: DALMAS, 1915; SIMON, 1914. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996c. Août: SIMON, 1914. Septembre: EMERIT & *al.*, 1997; SIMON, 1914.

***Harpactocrates gurdus*** Simon, 1914

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. — Espagne.

***Harpactocrates ignavus*** (Simon, 1882)

*Dysdera ignava*; *Parachtes i.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1953b, 1967d; SIMON, 1914. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1882 (*D. i.*), 1914. — Espagne (*P. i.*). **Altitude.** De 1000 m jusqu'à 2000 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Forêt de hêtres, sous les pierres et mousses: SIMON, 1914. Mousses: DENIS, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Septembre: KRAUS, 1955. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1967d. Septembre: KRAUS, 1955. Octobre: DENIS, 1967d.

***Harpactocrates inaequipes*** (Simon, 1882)

*Dysdera i.*; *Parachtes i.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1882 (*D. i.*), 1914. — Italie.

***Harpactocrates intermedius*** Dalmas, 1915

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1915. — Italie. **Altitude.** [au-dessus de 1500 m selon DALMAS, 1915]. **Habitat.** Forêt de conifères: DALMAS, 1915.

***Harpactocrates radulifer*** Simon, 1914

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. — Espagne.

***Harpactocrates ravastellus*** Simon, 1914

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1953b, 1960a, 1967d. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; DRESKO, 1947a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1967d; SIMON, 1914. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1959d; SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1914. — Espagne. **Altitude.** De 1100 m (LEDOUX & *al.*, 1996a) jusqu'à 2400 m (DENIS, 1953b). **Habitat.** Bois, sous des pierres: DENIS, 1959d. Broussailles de rhododendron: BOSMANS & *al.*, 1985a. Carrière: DENIS, 1967d. Forêt: DENIS, 1960a. Forêt de conifères; forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de hêtres et de sapins, mousses, sous les pierres, sous les écorces: SIMON, 1914. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & *al.*, 1987. Forêt de pins: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, litière: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1967d. Mousses: DENIS, 1967d. Prairie alpestre: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie rudérale; prairie à rhododendron: BOSMANS & *al.*, 1987. Sous une pierre: DENIS, 1950b.

**Période.** — *Mâle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1954a, 1967d. Août: LEDOUX, 1993; SIMON, 1914. Septembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1914. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1953b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1954a, 1967d. Juillet: DENIS, 1960a. Août: LEDOUX, 1993; SIMON, 1914. Septembre: DENIS, 1951c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1914. Octobre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b, 1959d.

*Holissus unciger* Simon, 1882

**Répartition.** Corse: SIMON, 1882, 1914. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Forêt de hêtres: SIMON, 1914.

*Rhode tenuipes* (Simon, 1882)

*Harpassa t.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1882 (*H. t.*), 1914 (*H. t.*); THALER, 1990. — Connue seulement de Corse. **Altitude.** 600 m (THALER, 1990). **Habitat.** Forêt de châtaigniers et de chênes: THALER, 1990. Sous les pierres en haute montagne: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Octobre: THALER, 1990. — *Femelle*. Octobre: THALER, 1990.

OONOPIDAE

Le catalogue de CANARD & al., 1997 cite deux espèces d'origine tropicale, *Ischnothyreus lymphaseus* et *Triaeris stenaspis*, qui selon SIMON, 1914 « vivent dans les serres chaudes du Muséum de Paris, où elles paraissent acclimatées ». Ces espèces n'ont pas été retenues ici.

*Dysderina loricata* (Simon, 1873)

*Dysdera l.*; *Gamasomorpha l.*; *Gamasomorpha loricatula*; *Oonops loricatus*; *Silhouettella loricatula*.

**Taxonomie.** La synonymie de *Dysderina loricata* (Simon, 1873) est complexe. L'espèce est décrite sous le nom *Oonops loricatus*. ROEWER, 1942 considère que le nom est préoccupé et renomme l'espèce *Dysderina loricatula*. Cette espèce est ensuite transférée dans le genre *Gamasomorpha* par WUNDERLICH, 1987, puis dans le genre *Silhouettella* par SAARISTO, 2001. Mais BONNET, 1956 maintient la priorité de *Oonops loricatus*, de même que BRIGNOLI, 1975. **Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SIMON, 1914; SOYER, 1955 (*D. l.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1914. Var: BECKER, 1880 (*O. l.*); KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*G. l.*), 1914. Vaucluse: SIMON, 1914. — Allemagne, Italie (*G. loricatula*). De l'Europe à l'Asie Centrale, Afrique du Nord, Canaries (*S. l.*). **Habitat.** Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Sous une pierre: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle*. Avril, mai: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Avril, mai: DENIS, 1933b.

*Oonopinus angustatus* (Simon, 1882)

*Oonops a.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SIMON, 1914. Corse: SIMON, 1882 (*O. a.*). Hérault: EMERIT & al.,

1985; SIMON, 1882 (*O. a.*), 1914. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1914. Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1882 (*O. a.*), 1898c (*O. a.*). [DENIS, 1934a remarque que SIMON, 1914 ne reprend pas les citations antérieures de cette espèce du Var]. — Espagne. Algérie. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (LEDOUX & al., 2003). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de hêtres, litière; pelouse à *Brachypodium ramosum*: LEDOUX & al., 1996a. Plage, dans une coquille de *Cardium*: DENIS, 1950c. **Période.** — *Mâle*. Septembre: SIMON, 1914. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1934a, 1950c. Septembre: SIMON, 1914. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

*Oonops amoenus* Dalmas, 1916

**Répartition.** Aude, Corse, Pyrénées-Orientales: DALMAS, 1916. Vendée: DENIS, 1962b. — Connue seulement de France. **Habitat.** Maison: DENIS, 1962b. **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1962b.

*Oonops domesticus* Dalmas, 1916

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Finistère: DENIS, 1939a, 1940a. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1943a, 1950d. "Seine": DALMAS, 1916, 1920. Var: DENIS, 1935a; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1967a, 1968a; YSNEL, 1990a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Ouest-Europe jusqu'à l'Ukraine. **Habitat.** Bois de chênes et de pins, litière: KOVOOR & al., 2000. Bâtiment: DALMAS, 1920. Maison: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1940a, 1943a, 1950d, 1967a, 1968a; GUIBÉ, 1946; LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Octobre: DENIS, 1968a. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1943a. Février: LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1940a. Septembre: DENIS, 1935a, 1967a, 1968a; LE PERU, 2004. Octobre, décembre: LE PERU, 2004.

*Oonops lubricus* Dalmas, 1916

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1916. — Connue seulement de France. **Altitude.** 800 m (DALMAS, 1916). **Période.** — *Mâle*. Août: DALMAS, 1916. — *Femelle*. Août: DALMAS, 1916.

*Oonops placidus* Dalmas, 1916

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1916. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Corse: CANARD, 1989; DALMAS, 1916. Pyrénées-Orientales: DALMAS, 1916; DENIS, 1933b; GERHARDT, 1930; LEDOUX & al., 1995. Var: DENIS, 1933a. — Italie. **Altitude.** 250 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bois, litière: CANARD, 1989. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Garrigue, litière: SOYER, 1955. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b. Octobre: GERHARDT, 1930. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b. Septembre: CANARD, 1989. Octobre: GERHARDT, 1930.

*Oonops procerus* Simon, 1882

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1951a; DRESKO & al., 1968; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1882, 1914. — Espagne. **Altitude.** De 750 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 1600 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord de ruisseau, litière: LEDOUX & al., 2003. Bord de ruisseau, pierres; forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes et châtaigniers, litière; forêt de chênes-verts, litière: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de hêtres, herbes et litière: DENIS, 1961b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1951a; DRESKO & al., 1968. Lieu humide: LEDOUX & al., 2003. Sous les grosses pierres: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle.* Février: LEDOUX & al., 1996a. Avril: LEDOUX & al., 2003. Mai à juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 2003. Septembre, novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Février: LEDOUX & al., 1996a. Avril: DRESKO & al., 1968; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai, juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Août: LEDOUX & al., 2003. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Novembre: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1933b.

*Oonops pulcher* Templeton, 1835*O. rusticulus.*

**Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Corse: DALMAS, 1916 (*O. r.*); SIMON, 1914. Loire-Atlantique: YSNEL, 1990a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1937d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. "Seine": DALMAS, 1915. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Var: SIMON, 1898c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe jusqu'à l'Ukraine, Afrique du Nord, Tasmanie. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Détritus: SIMON, 1914. Maison: BRAUD & al., 2005; DALMAS, 1915; DENIS, 1937d. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DALMAS, 1915.

*Orchestina pavesii* (Simon, 1873)

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Hérault, Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1914. [DENIS, 1933a déclare au sujet de la citation de cette espèce du Var par SIMON, 1914: «identité douteuse, pouvant se rapporter à *O. simoni* Dalmas, les deux espèces étant autrefois confondues en une seule.». — Espagne, Italie. De l'Espagne à la Slovaquie, Algérie, Canaries. **Habitat.** Sous une pierre: DENIS, 1934a. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a.

*Orchestina setosa* Dalmas, 1916

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1916. — Italie. **Période.** — *Femelle.* Avril: DALMAS, 1916.

*Orchestina simoni* Dalmas, 1916

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1916. Bouches-du-Rhône: DALMAS, 1916; SOYER, 1955. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. — Espagne, Italie. Grèce. **Habitat.** Côte rocheuse, zone des halophytes: SOYER, 1955. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1933b. Mai: DALMAS, 1916. — *Femelle.* Mai: DALMAS, 1916. **Tapinesthis inermis** (Simon, 1882)

*Oonops i.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1920; SIMON, 1914. Aude: DENIS, 1967d. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Maine-et-Loire: DALMAS, 1920. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. "Seine": BERLAND, 1933; DALMAS, 1920. Var: SIMON, 1882 (*O. i.*), 1914. Vaucluse: SIMON, 1914. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Europe (USA, introduit). **Habitat.** Forêt: DALMAS, 1920. Garrigue: SOYER, 1955. Maison: BERLAND, 1933. Pelouse sèche: SOYER, 1955. **Période.** — *Mâle.* Octobre: DENIS, 1967d.

## MIMETIDAE

L'espèce *Mimetis metoides* Simon, 1871, citée dans CANARD & al., 1997, est considérée *nomen nudum* par BONNET, 1957 qui note: «Il est étonnant que SIMON n'ait pas repris le nom de cette espèce dans ses ouvrages ultérieurs. Sans doute s'agit-il d'une forme assez voisine de *M. laevigatus*». Cette espèce est exclue de la liste.

*Ero aphana* (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; DENIS, 1954b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1881a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gironde: SIMON, 1881a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1982a; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: CANARD, 1982a; YSNEL, 1990b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: MURPHY, 1994; SIMON, 1881a; YSNEL, 1990b. Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1881a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Var: BIGOT & al., 1987a; DENIS, 1934a, 1935a, 1935b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: SIMON, 1881a. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique (Queensland, introduit). **Altitude.** Jusqu'à 800 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1964b. Bois: DENIS, 1941. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: DENIS, 1954b. Buissons et herbes: SIMON, 1932. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Dune: DENIS, 1965c. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1963c. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts; forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: BRAUD

& al., 2005. Lande à *Ulex*: CANARD, 1982a. Lieux humides: KOVOOR & al., 2000. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse à *Agrostis*: CANARD, 1982a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. **Période**. — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: CANARD, 1982a. Juillet: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Mai: DENIS, 1965c. Juin: CANARD, 1982a; DENIS, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Août: DENIS, 1964b; LEDOUX, 1993. Octobre: DENIS, 1935a.

*Ero cambridgei* Kulczynski, 1911

**Répartition**. Calvados: ASSELIN & al., 1989. Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990b. Dordogne: SIMON, 1932. Eure: EMERIT & al., 2003. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Marne: SIMON, 1932. Morbihan: YSNEL, 1990b. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1932. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Vienne (Haute-): SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Paléarctique. **Habitat**. Bois: BRAUD & al., 2005. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Friche: VEILLON, 1997. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période**. — *Mâle*. Octobre: EMERIT & al., 1999. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 1999. Novembre: EMERIT & al., 2003.

*Ero flammeola* Simon, 1881

**Répartition**. Corse: SIMON, 1881a, 1932. — Espagne, Italie, Portugal, Grèce.

*Ero furcata* (Villers, 1789)

*E. variegata*.

**Répartition**. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*E. v.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Gard: LEDOUX, 2000. Gironde: DENIS, 1951b, 1952a. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1982a; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: CANARD, 1982a; YSNEL, 1990b. Orne: YSNEL, 1990b. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1943c; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888a. Var: KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (*E. v.*). — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique.

**Altitude**. Jusqu'à 1280 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat**. Arrière-dune, dans la végétation: CANARD, 1982a. Bois: SIMON, 1881a. Bois de conifères: SIMON, 1932. Bord d'étang: CANARD, 1982a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: CANARD, 1989; DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, litière très humide: DENIS, 1963c. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Haie; haie, litière: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1941. Jardin: LE PERU, 2004. Lande basse, litière d'ajoncs; lande sèche: CANARD, 1982a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lieux humides: KOVOOR & al., 2000. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: DENIS, 1938a, 1952a; ROSELLE, 1888a. Pelouse: BERLAND, 1924. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse à *Agrostis*: CANARD, 1982a. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Plage, oyats: DENIS, 1963c. *Populeum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Prairie: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a, 2002; SIMON, 1881a, 1932. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996a. **Période**. — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1952a. Mai: LE PERU, 2004. Juin: CANARD, 1982a. Août: LE PERU, 2004. Septembre: CANARD, 1982a; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: CANARD, 1982a, 1989; DENIS, 1963c; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000. Décembre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1952a, 1963c. Février, mars: CANARD, 1982a. Avril: CANARD, 1982a; LEDOUX & al., 1996a. Mai: CANARD, 1982a. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: CANARD, 1982a; DENIS, 1938a. Août: CANARD, 1982a. Septembre: CANARD, 1982a; DENIS, 1951b; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: CANARD, 1982a; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000.

*Ero tuberculata* (De Geer, 1778)

*E. aurantiaca*.

**Répartition**. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a, 1932; TIBERGHEN & al., 1993b. Drôme: SIMON, 1932 (*E. a.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: DENIS, 1933a. Vendée: DENIS, 1964b (*E. a.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat**. Bois humides: SIMON, 1881a, 1932. Bord de rivière; forêt de pins: CANARD, 1989. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Forêt, clairière et bord des chemins: LANCELEVÉE, 1884. Prés marécageux: SIMON, 1881a, 1932. **Période**. — *Mâle*. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Août: DENIS, 1964b. Octobre: CANARD, 1989. Décembre: DENIS, 1933b.

*Mimetus laevigatus* (Keyserling, 1863)

*M. interfactor* [err.].

[Les citations de SIMON, 1881 sous le nom de *M. interfactor* sont des erreurs d'identification selon PLATNICK, 2004. *M. interfactor* est en fait synonyme de *M. syllepsicus* Hentz]. **Répartition**. Alpes-Maritimes:

SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône : SIMON, 1881a [*M. interfactor*, err. selon PLATNICK, 2004], 1932. Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1881a [*M. interfactor*, err. selon PLATNICK, 2004], 1932 ; TIBERGHEN & al., 1993b. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b. Var : BERLAND, 1926 ; DENIS, 1935b ; SIMON, 1881a [*M. interfactor*, err. selon PLATNICK, 2004], 1932. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat**. Buissons : CANARD, 1989. Buissons secs : SIMON, 1881a, 1932. Sous une pierre : BERLAND, 1926. **Période**. — *Mâle*. Mai : BERLAND, 1926. — *Femelle*. Mai : BERLAND, 1926. Juin : DENIS, 1933b.

#### ERESIDAE

L'espèce *Seothyra perelegans* Simon, 1906 a été indiquée à tort de France dans BONNET, 1958, selon CANARD, 2005. Présente en Afrique du Sud selon PLATNICK, 2004, elle est exclue de la liste.

#### *Eresus niger* (Petagna, 1787)

*Eresa cinnaberina*; *E. cinnaberinus*.

**Taxonomie**. Le nom *E. niger*, utilisé par la plupart des auteurs, est maintenu ici. **Répartition**. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1955. Charente-Maritime : JOURDE & al., 1999 (*E. c.*). Corse : SIMON, 1914 ; VERNEAU, 2000. Hérault : EMERIT & al., 1990. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Meurthe-et-Moselle : IORIO, 2002 (*E. c.*). Morbihan : ROLLARD, 1990b. Pyrénées-Orientales : BERLAND, 1922 ; BONNET, 1932 ; DENIS, 1933b, 1967d ; GOULLIART, 1979a ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1995, 1996a ; TAMBS-LYCHE, 1957. "Seine" : LUCAS, 1849c (*E. c.*) ; ROLLARD, 2000 ; SIMON, 1874c (*E. c.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*Eresa c.*) ; SIMON, 1898b. Var : DENIS, 1933a, 1934a, 1935a ; SIMON, 1898c. Vaucluse : CORNIC, 1978. — Presque toute la France : SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*E. c.*). Paléarctique (*E. c.*). **Altitude**. Jusqu'à 1400 m (CORNIC, 1978). **Habitat**. Bord de plage, sous des pierres : GOULLIART, 1979a. Bâtiment : VERNEAU, 2000. Dune : JOURDE & al., 1999. Formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt : DOIGNON, 1976. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 1996a. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Jardin : VERNEAU, 2000. Lieux incultes et découverts : SIMON, 1914. Pelouse calcaire : IORIO, 2002. Pelouse, sous des pierres : VERNEAU, 2000. Prairies alpêtres : SIMON, 1914. Sous une pierre : BONNET, 1932 ; DENIS, 1934a ; SIMON, 1914. **Période**. — *Mâle*. Août : CORNIC, 1978. Septembre : BONNET, 1932 ; CORNIC, 1978 ; DENIS, 1967d ; LUCAS, 1849c ; SIMON, 1914. Octobre : CORNIC, 1978. Novembre : VERNEAU, 2000. — *Femelle*. Mai : BONNET, 1932 ; DENIS, 1934a. Juillet : TAMBS-LYCHE, 1957. Août : LEDOUX, 1993. Septembre : DENIS, 1935a ; SIMON, 1874c. [Selon SIMON, 1914, la femelle se trouve adulte toute l'année dans son terrier].

#### OECOBIIDAE

#### *Oecobius annulipes* Lucas, 1846

**Taxonomie**. Les deux espèces *Oecobius annulipes* Lucas, 1846 et *O. navus* Blackwall, 1859 ont souvent été confondues. D'après PLATNICK, 2004, *O. annulipes*

ne se trouve qu'en Algérie. Selon WUNDERLICH, 1987 toutes les citations d'*O. annulipes* antérieures à 1987 sont en fait des *O. navus*. Les citations de ces espèces sont toutefois placées sous les noms d'espèce utilisés dans les travaux originaux. **Répartition**. Alpes-Maritimes : BECKER, 1881. Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1973 ; SOYER, 1955. Corse : CANARD, 1989 ; LEDOUX, 1963 ; SIMON, 1875a, 1914. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b. Var : BECKER, 1880, 1882 ; DENIS, 1934a, 1935b ; KOVOOR & al., 2000 ; LEDOUX, 1963. — Littoral méditerranéen : SIMON, 1914. Italie. Algérie. **Habitat**. Bois de chênes, litière : KOVOOR & al., 2000. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Lieux secs et arides, sous les pierres : SIMON, 1875a. Maison : DENIS, 1934a. Maquis de bruyères : KOVOOR & al., 2000. Sous une pierre : DENIS, 1934a. **Période**. — *Mâle*. Juillet : CANARD, 1989. — *Femelle*. Juillet : CANARD, 1989. Décembre : DENIS, 1933b.

#### *Oecobius cellariorum* (Dugès, 1836)

**Répartition**. Hérault : SIMON, 1875a, 1914. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; SIMON, 1875a, 1914. [WUNDERLICH, 1994b indique «sud de la France»]. — Espagne, Italie. Cosmopolite. **Habitat**. Bâtiment : DENIS, 1933b. Maison : SIMON, 1875a. **Période**. — *Mâle*. Mai : DENIS, 1933b.

#### *Oecobius maculatus* Simon, 1870

[La citation de l'Hérault par LEDOUX, 1963 est erronée selon LEDOUX, 1967, et se rapporte à une espèce nouvelle non décrite]. **Répartition**. Alpes-de-Haute-Provence : WUNDERLICH, 1994b. Corse : SIMON, 1875a. Hérault : LEDOUX, 1963. — Espagne. De la Méditerranée à l'Azerbaïdjan. **Habitat**. Sous une pierre : SIMON, 1875a. **Période**. — *Femelle*. Juin : LEDOUX, 1963. Juillet : WUNDERLICH, 1994b.

#### *Oecobius navus* Blackwall, 1859

**Taxonomie**. Cette espèce a été confondue avec *O. annulipes*. Voir la note sous *O. annulipes*. **Répartition**. [Aucune citation faite sous le nom *O. navus*]. — Belgique, Espagne. Cosmopolite.

#### *Uroctea durandi* (Latreille, 1809)

*Clotho d.*

**Répartition**. Ardèche : LUCAS, 1870b ; RAPHAËL & al., 1992 ; SIMON, 1875a. Ariège : DENIS, 1960a. Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1973 ; KABOUCHE & al., 1997. Drôme : SIMON, 1914. Gard : LUCAS, 1845 (*C. d.*). Hérault : LOPEZ, 1973 ; LUCAS, 1845 (*C. d.*) ; SIMON, 1875a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; DENIS, 1933b, 1933d, 1967d ; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003 ; SIMON, 1875a ; TAMBS-LYCHE, 1957. Var : DENIS, 1931a, 1934a, 1935a ; KOVOOR & al., 2000 ; SIMON, 1898c, 1914. Vaucluse : CHANSIGAUD, 1992 ; CORNIC, 1978 ; SIMON, 1875a. — Région méditerranéenne jusque dans la Drôme au nord, jusqu'à St-Raphaël à l'est : SIMON, 1914. Espagne, Italie. Méditerranée. **Altitude**. Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1960a). **Habitat**. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus* : KABOUCHE & al., 1997. Collines arides, sous les pierres : SIMON, 1875a. Formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes : BOSMANS &



*al.*, 1985a, 1987. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & *al.*, 1973. Garrigue, sous des pierres: LOPEZ, 1973. Garrigues, sous des pierres: KOVOOR & *al.*, 2000. Lande à genêts, sous les grosses pierres: LEDOUX & *al.*, 1996a. Maison: CHANSIGAUD, 1992. Pelouse à *Brachypodium ramosum*, sous les grosses pierres: LEDOUX & *al.*, 1996a. Sous l'écorce de chênes-lièges: DENIS, 1931a. Sous une pierre: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b. Mai: SIMON, 1875a. Octobre: DENIS, 1967d. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a, 1967d. Août: DENIS, 1967d. Octobre: KABOUCHE & *al.*, 1997. — *Femelle avec cocon.* Août à octobre: CORNIC, 1978. — *Femelle avec ses jeunes.* Janvier, février: DENIS, 1933b. Août: SIMON, 1875a.

## ULOBORIDAE

### *Hyptiotes flavidus* (Blackwall, 1862)

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Dordogne, Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1999a, 2003. Var: KABOUCHE & *al.*, 1997; KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992. Vendée: DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b. — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie, Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (LEDOUX & *al.*, 2003). **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & *al.*, 1999a. Forêt: LEDOUX & *al.*, 1999b. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962d, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, sur un chêne: DENIS, 1963c. Forêt à *Quercus* sur plateau calcaire: KABOUCHE & *al.*, 1997. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. **Période.** — *Mâle.* Août: DENIS, 1964b. Septembre: DENIS, 1962d, 1964b; MÜLLER, 1985. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1962b. Août: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999b, 2003. Septembre: DENIS, 1962d, 1964b. Octobre: DENIS, 1963c; KABOUCHE & *al.*, 1997. — *Femelle avec cocon.* Septembre: DENIS, 1962d.

### *Hyptiotes paradoxus* (C. L. Koch, 1834)

#### *H. anceps.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1874a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1973; SOYER, 1955. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997; SIMON, 1874a. Eure: SIMON, 1909a. Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1874a. Hérault: CASTELNAU, 1897 (*H. a.*). Isère: SIMON, 1874a. Landes: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1874a. Var: BIGOT & *al.*, 1979; DENIS, 1934a, 1935a, 1935b, 1937a. Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Bois: BRAUD & *al.*, 2005. Buissons: CANARD, 1989. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT &

*al.*, 1973. Genévriers: CANARD, 1989. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Pins: SIMON, 1909a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: SIMON, 1874a. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1962b.

### *Polenecia producta* (Simon, 1873)

#### *Sybota p.*; *Uloborus productus.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1874a (*U. p.*), 1914 (*S. p.*). [BRIGNOLI, 1979a cite cette espèce de Sardaigne; elle ne figure pourtant pas dans la liste des espèces d'Italie]. — Espagne. De la Méditerranée à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Buissons secs: SIMON, 1874a.

### *Uloborus plumipes* Lucas, 1846

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1874a, 1914. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874a, 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1914. — Région méditerranéenne de Menton à Cerbère: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Ancien Monde. **Habitat.** Broussailles sèches: SIMON, 1874a. Forêt de pins; rochers: CANARD, 1989. Trous des vieux murs: SIMON, 1874a. **Période.** — *Femelle.* Juillet: CANARD, 1989.

### *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1874a. Ardèche: LUCAS, 1870b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955. Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874a. Gard: EMERIT & *al.*, 1994. Gers: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & *al.*, 1990; LOPEZ, 1973. Isère: SIMON, 1874a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot-et-Garonne: DALINGWATER, 1991. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a, 2003. "Seine": SIMON, 1874a. Seine-et-Marne: SIMON, 1874a, 1914. Var: DENIS, 1933a, 1935b, 1937a. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1874a. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Presque toute la France, sauf dans le Nord: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999a. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de chemin, buissons: CANARD, 1989. Broussailles: LOPEZ, 1973. Dune: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Friche: LEDOUX & *al.*, 2003. Garrigue calcaire: EMERIT & *al.*, 1990. Lieux secs: SIMON, 1874a. Pelouse calcaire: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002. Rochers, anfractuosités: SIMON, 1874a. *Salicornietum*: EMERIT & *al.*, 1994. Tourbière: VEILLON, 1997. Trous des murs: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1935b, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999a; SIMON, 1874a; VEILLON, 1997. Juillet: MÜLLER, 1985. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965c. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1963c. Août: CANARD, 1989. — *Femelle avec cocon.* Août: DENIS, 1962b.

## NESTICIDAE

*Nesticus cellulanus* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ain: DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Alpes (Hautes-): SIMON, 1913. Alpes-Maritimes: SIMON, 1907b. Alpes-de-Haute-Provence: PEYERIMHOFF, 1906. Ardèche: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1966. Ariège: DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1910, 1911, 1913. Aude: DRESKO, 1966; SIMON, 1910, 1911. Aveyron: DRESKO, 1966. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1875c. Charente: HUBERT, 1964a. Charente-Maritime: DRESKO, 1966; DRESKO & al., 1968. Côte-d'Or: DRESKO, 1956, 1959c; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: DRESKO, 1966; ROLLARD, 1990a. Dordogne: SIMON, 1911. Doubs: DRESKO, 1966; EMERIT & al., 1997. Drôme: SIMON, 1913. Gard: SIMON, 1911. Garonne (Haute-): DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1947a, 1966. Gers: DENIS, 1959b. Gironde: DRESKO, 1966; DRESKO & al., 1968; MAGNÉ, 1969. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Indre, Indre-et-Loire: DENIS, 1958b. Isère: DRESKO & al., 1975. Jura: DRESKO, 1959c, 1962, 1966; HUBERT, 1964a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot: SIMON, 1911; VIRÉ, 1902. Lot-et-Garonne: DRESKO & al., 1968. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1968, 1975. Meurthe-et-Moselle: DRESKO & al., 1968. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Nord: DENIS, 1930. Orne: ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DRESKO & al., 1968; KERVILLE, 1935; SIMON, 1913. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959a; DRESKO, 1966; SIMON, 1907b, 1910. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1932b, 1933b, 1951a, 1959a, 1967d; DRESKO, 1966; LEDOUX, 1993; SIMON, 1910, 1911, 1913. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1968. Savoie (Haute-): DRESKO, 1962. Saône-et-Loire: DRESKO, 1959c; HUBERT, 1964a. "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; DRESKO, 1947c, 1957a. Seine-Maritime: DRESKO, 1966; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: BERLAND, 1928; DRESKO, 1943. Somme: ROSELLE, 1888a. Tarn: DRESKO & al., 1968, 1975. Tarn-et-Garonne: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975. Vendée: ROLLARD, 1990a. Vienne: DENIS, 1958b. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de hêtres, éboulis: EMERIT & al., 1997. Bois, mousses: DRESKO, 1966. Carrière: BEAUCOURNU & al., 1963b; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1959c, 1966; HUBERT, 1964a. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Cave: SIMON, 1881a, 1929. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt, entrée de grotte: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, sous les grosses pierres: SIMON, 1929. Galerie souterraine: DRESKO, 1957a. Gorges: DRESKO, 1966. Grotte: BALAZUC & al., 1952; BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963b, 1963c; BERLAND, 1928; DENIS, 1932b,

1933b, 1951a, 1958b, 1959a, 1959b, 1967d; DRESKO, 1943, 1947a, 1956, 1959a, 1959c, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; KERVILLE, 1935; LANCELEVÉE, 1884; MAGNÉ, 1969; PEYERIMHOFF, 1906; SIMON, 1875c, 1881a, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1929; VIRÉ, 1902. Litière ou mousses très humides: DENIS, 1933b. Marais, détritiques: SIMON, 1929. Mine: DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1962, 1966. Mine de charbon: DENIS, 1930. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ruisseau souterrain: DENIS, 1959a. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1958b. Mars: HUBERT, 1964a. Avril: DRESKO, 1962. Mai: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959c. Juin: DRESKO, 1959c, 1962, 1966; DRESKO & al., 1975; EMERIT & al., 1997. Juillet: DRESKO, 1966; DRESKO & al., 1968. Août: DRESKO, 1962. Septembre: DRESKO & al., 1975. Octobre: DRESKO, 1966; DRESKO & al., 1968; LEDOUX & al., 2002; MAGNÉ, 1969. Novembre: DRESKO & al., 1968, 1975. Décembre: DRESKO, 1962. — *Femelle.* Janvier: DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Février: DENIS, 1958b; DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a; MAGNÉ, 1969. Mars: DENIS, 1959a; DRESKO, 1957a, 1959a, 1959c, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Avril: BERLAND, 1928; DENIS, 1959a; DRESKO, 1959a, 1962, 1966; DRESKO & al., 1975. Mai: DENIS, 1959b, 1967d; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Juin: DENIS, 1959a; DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Juillet: DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; MAGNÉ, 1969. Août: DENIS, 1967d; DRESKO, 1943, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; LEDOUX, 1993; MAGNÉ, 1969. Septembre: DRESKO, 1959c, 1966; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Octobre: DRESKO, 1959c, 1962, 1966; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Novembre: DRESKO, 1959a, 1962, 1966; DRESKO & al., 1975. Décembre: DRESKO, 1959c, 1962, 1966. — *Femelle avec cocon.* Août: DRESKO, 1943, 1962. Septembre: DRESKO & al., 1975.

*Nesticus eremita* Simon, 1879

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BRIGNOLI, 1979a; DEVILLE, 1902; DRESKO, 1962, 1966; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1913, 1929. Alpes-de-Haute-Provence: DRESKO, 1966; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1929. Ardèche: BALAZUC & al., 1952, 1954; DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & al., 1975; JEANNEL, 1926; RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1911, 1913, 1929. Bouches-du-Rhône: DRESKO, 1962, 1966; JEANNEL, 1926; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1913, 1929. Corse: DRESKO, 1966. Drôme: SIMON, 1929. Gard: DRESKO, 1966; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1929. Hérault: DRESKO, 1966; LEDOUX, 1967. Isère: JEANNEL, 1926; SIMON, 1913, 1929. Rhône: DRESKO & al., 1975. Var: DENIS, 1935b; DRESKO, 1962, 1966; SIMON, 1879, 1881a, 1929. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 250 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Cave très humide: LEDOUX, 1967. Galerie souterraine: DRESKO & al., 1975. Grotte: BALAZUC & al., 1952, 1954; BRIGNOLI, 1979a; DEVILLE, 1902; DRESKO, 1962, 1966; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1879, 1881a, 1911, 1913, 1929. Rivière souterraine: DRESKO, 1966. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mars: DRESKO, 1962. Mai:

DRESCO, 1966. Juillet: DRESCO, 1962, 1966. Septembre, décembre: DRESCO, 1966. — *Femelle*. Janvier: DRESCO, 1966. Février: DRESCO, 1966; DRESCO & al., 1975. Mars: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975. Avril: DRESCO, 1966; LEDOUX, 1967. Mai: DRESCO, 1962, 1966. Juin: DRESCO, 1966; DRESCO & al., 1975. Juillet: DRESCO, 1962, 1966; DRESCO & al., 1975. Août: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Septembre: DRESCO, 1962, 1966. Octobre: HUBERT, 1964a. Novembre: LEDOUX, 1967. Décembre: DRESCO, 1966; DRESCO & al., 1975. — *Femelle avec cocon*. Mai: DRESCO, 1966.

## THERIDIIDAE

Certaines espèces, maintenues ici dans le genre *Theridion*, sont placées par des auteurs dans d'autres genres: *Keijia* (*T. tinctum*), *Neottiura* (*T. bimaculatum*, *T. curvimanum*, *T. herbigrada*, *T. suaveolens*, *T. uncinatum*), *Rugathodes* (*T. bellicosum*, *T. instabile*), *Paidiscura* (*T. dromedarius*, *T. pallens*), *Simitidion* (*T. simile*).

Deux espèces, mentionnées par CANARD & al., 1997, sont exclues de la liste: *Robertus cardesensis* Dresco, 1959, récoltée en Espagne dans la province d'Oviedo, n'a pas été citée de France; *Theridion candefactum* Walckenaer, 1842, considérée *nomen dubium* par PLATNICK, 2004 d'après ROEWER, 1954 [«nicht zu deuten»].

*Achaearanea lunata* (Clerck, 1757)

*Theridion formosum*; *Theridion lunatum*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973 (*T. l.*). Corrèze: JUBERTHIE, 1954 (*T. l.*); LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909a (*T. f.*). Finistère: DENIS, 1938a (*T. l.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: LUCAS, 1878a (*T. f.*). Morbihan: YSNEL, 1990b. Nord: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*T. l.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*T. l.*); LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*T. f.*); SCHALLER, 2000. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. f.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*T. f.*); SIMON, 1898b (*T. f.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*T. f.*). Var: DENIS, 1933a (*T. l.*), 1934a (*T. l.*), 1935a (*T. l.*); KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992 (*T. l.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1914 (*T. l.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bois de chênes: SOYER, 1973. Bois, entre les troncs: SIMON, 1881a, 1914. Bord de fontaine: CHANSIGAUD, 1992. Bâtiment: JUBERTHIE, 1954. Bâtiment, bord de fenêtre: DENIS, 1963c. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt, ajoncs: DENIS, 1964b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Forêt, sur un pin: DENIS, 1950b. Gorge

humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004; LUCAS, 1878a; SIMON, 1881a. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Maquis: SOYER, 1973. Marais, roseaux secs: LANCELEVÉE, 1884. Murs; rochers: SIMON, 1914. Sur le mur extérieur d'une maison: LE PERU, 2004. Talus, anfractuosités: DENIS, 1934a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Troncs de chênes: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a; EMERIT & al., 2003. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1964b, 1965c; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1933b, 1964b; LE PERU, 2004. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1965c. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1938a, 1962b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; SOYER, 1973. Juillet: DENIS, 1933b, 1950b, 1963c; LE PERU, 2004. Août: DENIS, 1964b; LUCAS, 1878a. — *Femelle avec cocon*. Juin, juillet: DENIS, 1964b. Août: DENIS, 1963c. — *Femelle avec ses jeunes*. Septembre: DENIS, 1964b.

*Achaearanea ohlerti* (Thorell, 1870)

*A. umbratica*; *Theridion o.*; *Theridion umbraticum*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): HELSDINGEN, 1995 (*T. o.*); SIMON, 1881a (*T. u.*), 1914 (*T. u.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*A. u.*), 1996c (*A. u.*). "Seine": SIMON, 1914 (*T. u.*). — Allemagne, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (HELSDINGEN, 1995). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de conifères: SIMON, 1914. Mélèzes; rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. Sous une écorce de peuplier: SIMON, 1914. **Période.** — *Femelle*. Mai: SIMON, 1914. Août: LEDOUX & al., 1996b.

*Achaearanea riparia* (Blackwall, 1834)

*Theridion riparium*; *Theridion saxatile*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*T. s.*). Isère: SIMON, 1881a (*T. r.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a (*T. r.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d (*T. s.*); SIMON, 1881a (*T. r.*). Seine, Somme: SIMON, 1881a (*T. r.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914 (*T. s.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 960 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Au pied des rochers et des murs: SIMON, 1914. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Jardin: SIMON, 1881a. Rochers, anfractuosités; sous une pierre: DENIS, 1959d. Sous-bois: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1959d, 1960a. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1959d.

*Achaearanea simulans* (Thorell, 1875)

*Theridion s.*

[*A. simulans* a parfois été considérée comme une sous-espèce de *A. tepidariorum*. Certaines données placées sous *A. t.* pourraient donc se rapporter à *A. s.*] **Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Nord: DENIS, 1944a (*T. s.*); EMERIT & al., 1999. Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Prairie plantée de peupliers: DENIS, 1944a.

Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1944a. — *Femelle*. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Juillet: LEDOUX, 2000.

*Achaearanea tepidariorum* (C. L. Koch, 1841)

*Theridion t.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b (*T. t.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*T. t.*). Cher: DENIS, 1943b (*T. t.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1930 (*T. t.*), 1932a (*T. t.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d. Var: DENIS, 1933a (*T. t.*); KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978 (*T. t.*). Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1914 (*T. t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** En plein air: DENIS, 1943b. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1962d. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, graminées: DENIS, 1964b. Haie: BRAUD & al., 2005. Maison: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c. Maisons, murs extérieurs: SIMON, 1881a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Mine de charbon: DENIS, 1930, 1932a. Plantation de peupliers: BOSMANS & al., 1985a. Serre: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1881a, 1914. [Selon SIMON, 1914: «rarement à l'air libre et seulement dans le Midi»]. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1943b. Juillet: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c, 1964b. — *Femelle*. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1962d.

*Anelosimus aulicus* (C. L. Koch, 1838)

*A. aulicum*; *Kochiura aulica*; *Theridion aulicum*; *Theridion rufolineatum*.

[Nommée *Kochiura aulica* dans CANARD, 2005].

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*T. r.*), 1882 (*T. a.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1953a (*T. a.*), 1973 (*T. a.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*T. a.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*T. r.*). Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a (*T. a.*), 1914 (*T. a.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Finistère: YSNEL, 1990b. Hérault: EMERIT & al., 1990 (*T. a.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979 (*T. a.*), 1980 (*T. a.*), 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loire-Atlantique: SIMON, 1881a (*T. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: SIMON, 1881a (*T. a.*), 1914 (*T. a.*); YSNEL, 1990b. Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*T. a.*); LEDOUX & al., 1995. Var: BECKER, 1880 (*T. r.*), 1882 (*T. a.*); DENIS, 1933a (*T. a.*), 1934a (*T. a.*), 1935a (*T. a.*), 1937a (*T. a.*); KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*T. a.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*T. a.*). Vendée: CLARK & al., 1970 (*T. a.*); DENIS, 1962b (*A. a.*), 1963c (*A. a.*), 1964b (*T. a.*); DUFFEY, 1964 (*T. a.*); YSNEL, 1990b. — Midi de la France et l'ouest jusque dans le Morbihan: SIMON, 1914 (*T. a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Canaries, des Îles du Cap-Vert à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 720 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1964b. Buissons: CANARD, 1989. Dune: DENIS, 1962b. Formation à chênes-verts: LEDOUX &

al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins sur dune: DUFFEY, 1964. Forêt, chênes-verts: DENIS, 1964b. Garrigue: SOYER, 1973. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue, buissons: SOYER, 1953a. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande: CANARD, 1984, 1990c; VEILLON, 1997. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Maquis: KOVOOR & al., 2000. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Plateau calcaire, sous les ombellifères: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1933b. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1934a. Juin: CANARD, 1984; CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1964b. Juillet: CANARD, 1984. Septembre: DENIS, 1962b. Octobre: CANARD, 1984; DENIS, 1962b. Novembre: CANARD, 1984. — *Femelle*. Mars: CANARD, 1984. Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1933b. Juin: CANARD, 1984; CORNIC, 1978; DENIS, 1962b, 1964b. Juillet: CANARD, 1984, 1989; CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b. Août: CANARD, 1984. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1935a. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: CANARD, 1984. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1962b.

*Anelosimus pulchellus* (Walckenaer, 1802)

*Theridion pulchellum*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973 (*T. p.*). Calvados: LUCAS, 1870e (*T. p.*). Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a (*T. p.*), 1914 (*T. p.*). Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*T. p.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*T. p.*); SIMON, 1909a (*T. p.*). Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911 (*T. p.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*T. p.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*T. p.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. p.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*T. p.*). Var: BECKER, 1880 (*T. p.*); BIGOT, 1993 (*T. p.*); DENIS, 1933a (*T. p.*), 1934a (*T. p.*); KOVOOR & al., 2000. — Toute la France: SIMON, 1914 (*T. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Europe à Russie, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Buissons: CANARD, 1989. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Garrigue: SOYER, 1973. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis: KOVOOR & al., 2000. **Période.** — *Mâle*. Avril, mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juillet: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. Juillet: CANARD, 1989. Août: LUCAS, 1870e. Septembre: CANARD, 1989; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1934a.

*Anelosimus vittatus* (C. L. Koch, 1836)

*Theridion formosum*; *Theridion vittatum*.

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*T. v.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*T. v.*). Corse: CANARD, 1989; ROEWER, 1926 (*T. f.*); SIMON, 1881a (*T. v.*), 1914 (*T. v.*). Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990b. Eure: EMERIT & al., 2003. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; MARC, 1990b; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*T. v.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Haut-): REIBER, 1880 (*T. f.*). Savoie (Haute-): MULLER & al., 1895 (*T.*

f). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (T. v.). Var: KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1941 (T. v.), 1962b (T. v.), 1964b (T. v.). Vienne: DUREPAIRE & al., 1994. — Toute la France: SIMON, 1914 (T. v.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1941. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Cistes: SIMON, 1881a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins, sur un chêne: DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Lande: CANARD, 1984, 1990c; VEILLON, 1997. Lande humide: DUREPAIRE & al., 1994. Maquis: KOVOOR & al., 2000. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: EMERIT & al., 2003. Sous une feuille: CANARD, 1989. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Taillis de chênes: SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle.* Mars: ROEWER, 1926. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1933b; EMERIT & al., 2003. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1964b. Juillet: CANARD, 1984. — *Femelle.* Avril: CANARD, 1984; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1933b. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1941; EMERIT & al., 1999. Juillet: CANARD, 1984; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1914. Juillet: CANARD, 1989.

### *Argyrodes argyroides* (Walckenaer, 1842)

*A. gibbosus.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BERLAND, 1926 (A. g.); SIMON, 1914 (A. g.). Corse: BERLAND, 1922 (A. g.); CANARD, 1989 (A. g.); GERHARDT, 1928 (A. g.); LEDOUX, 1967 (A. g.); SIMON, 1881a, 1914 (A. g.). Var: BERLAND, 1926 (A. g.); KOVOOR & al., 2000 (A. g.). — Espagne, Italie. Méditerranée à Afrique de l'Ouest, Seychelles. **Habitat.** Plateau calcaire: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle.* Juin: BERLAND, 1922. Juillet: CANARD, 1989; LEDOUX, 1967. Août: CANARD, 1989. — *Femelle.* Juin: BERLAND, 1922. Juillet: CANARD, 1989; LEDOUX, 1967. Septembre: CANARD, 1989.

### *Argyrodes nasicus* (Simon, 1873)

*A. nasica*; *Ariamnes argenteolus*; *Ariamnes n.*; *Rhomphaea argenteola*; *Rhomphaea nasica*.

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989 (*A. nasica*); SIMON, 1881a (*A. a.*), 1881a (*Ariamnes n.*), 1914 (*R. a.*), 1914 (*R. n.*). Var: KOVOOR & al., 2000. — Espagne, Italie. Méditerranée, Afrique, Ste Hélène. **Habitat.** Buissons: CANARD, 1989; SIMON, 1914. Chênes: KOVOOR & al., 2000.

### *Argyrodes rostratus* (Simon, 1873)

*Ariamnes r.*; *Rhomphaea rostrata*.

**Répartition.** Corse: SIMON, 1881a (*A. r.*), 1914 (*R. r.*). Dordogne: EMERIT, 2002. Gironde: SIMON, 1881a (*A. r.*), 1914 (*R. r.*). Hérault: EMERIT, 2002. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914 (*R. r.*). Var: BERLAND, 1926

(*R. r.*). — Espagne. Méditerranée. **Habitat.** Chênes: SIMON, 1881a. Garrigue: EMERIT, 2002. Sur le bruyères: SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle.* Juin: BERLAND, 1926. — *Femelle.* Octobre: EMERIT, 2002.

### *Crustulina guttata* (Wider, 1834)

*Steatoda g.*; *Theridion guttatum*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ariège: DENIS, 1961b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870c (T. g.). Corse: KNOFLACH, 1994. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (T. g.); YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Finistère: DENIS, 1938a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1984; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1951c, 1953a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1953b, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1961b, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; MACHADO, 1949. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976. Var: BECKER, 1880 (S. g.); KOVOOR & al., 2000; MÜLLER, 1985; SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (T. g.). — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2050 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau, litière: LEDOUX & al., 2003. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Détrit: SIMON, 1914. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1987. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1951c, 1964b, 1965c. Forêt de pins, herbes et litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, litière de chênes: DENIS, 1963c. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Lande: CANARD, 1984. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lieu très humides, sous les écorces: KOVOOR & al., 2000. Litière: LEDOUX & al., 1996a. Litière très humide: DENIS, 1963c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Mousses et détrit: SIMON, 1881a. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: DENIS, 1953a; LUCAS, 1870c; MÜLLER, 1985; SIMON, 1881a, 1914. Taillis de chênes-verts, litière: SOYER, 1973. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b. Février: DENIS, 1965c. Mai: DENIS, 1962b. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1938a, 1962b. Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1962b. Septembre: DENIS, 1951c; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: LEDOUX & al., 1996a, 2003. — *Femelle.* Janvier: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1963c. Février: DENIS,

1953b. Mars: DENIS, 1964b. Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Juin: CANARD, 1984; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1959d, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; MÜLLER, 1985. Août: DENIS, 1953a, 1962b; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1870c. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997; KNOFLACH, 1994; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: DENIS, 1965c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1964b.

***Crustulina scabripes* Simon, 1881**

*Steatoda* s.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1881a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SIMON, 1881a; SOYER, 1973. Corse: CANARD, 1989; SCHARFF, 1894; SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 2003. Var: BECKER, 1880 (*S. s.*); DENIS, 1933a, 1935b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1881a, 1898c. — Provence: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (DENIS, 1933b). **Habitat.** Bois, litière: CANARD, 1989. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Garrigue, litière: SOYER, 1973. Lieu très humides, sous les écorces: KOVOOR & al., 2000. Littoral, zone halophile: SOYER, 1973. Maquis, sous des pierres: CANARD, 1989. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. **Période.** — *Femelle.* Septembre: CANARD, 1989. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

***Crustulina stricta* (O. P.-Cambridge, 1861)**

**Répartition.** Aude: SIMON, 1881a. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; SIMON, 1881a; SOYER, 1973. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Eure: EMERIT & al., 2003. Gard: LEDOUX, 2000. Gers: SIMON, 1881a. Gironde: DENIS, 1951b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Manche: PÉTILLON & al., 2004; YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a; SOYER, 1973. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1881a; SOYER, 1973. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1965c. — Midi de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Holarctique. **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Dune: SOYER, 1973. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais salant: SIMON, 1881a, 1914. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; SIMON, 1914. Marécages, sous les pierres: SIMON, 1881a. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sur la boue sèche, herbes: DENIS, 1965c. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1881a. Mai: DENIS, 1965c. — *Femelle.* Avril: SIMON, 1881a. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Septembre: DENIS, 1951b. Octobre: LEDOUX & al., 1999a. Novembre: LEDOUX, 2000.

***Dipoena braccata* (C. L. Koch, 1841)**

*Euryopsis b.*; *Lasaeola b.*

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aube: SIMON, 1881a (*L. b.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Corse: SIMON, 1881a (*L. b.*), 1914. Côte-d'Or: SIMON, 1881a (*L. b.*). Doubs: EMERIT

& al., 1997. Gers: SIMON, 1881a (*L. b.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. b.*); REIBER, 1880 (*E. b.*); SIMON, 1881a (*L. b.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1881a (*L. b.*), 1898b. Var, Vienne (Haute-): SIMON, 1881a (*L. b.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe, Méditerranée. **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Buissons de conifères: SIMON, 1914. Garrigue: SOYER, 1973. Pelouse à thym: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle.* Juin: EMERIT & al., 1997. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1950a; EMERIT & al., 1997.

***Dipoena convexa* (Blackwall, 1870)**

*Euryopsis pilula*; *Lasaeola c.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a (*L. c.*). Ardèche: SIMON, 1881a (*L. c.*), 1914. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SIMON, 1881a (*L. c.*); SOYER, 1973. Corse: SIMON, 1881a (*L. c.*), 1914. Gers: SIMON, 1881a (*L. c.*). Gironde: SIMON, 1881a (*L. c.*), 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 2003. Var: BECKER, 1880 (*E. p.*); SIMON, 1881a (*L. c.*), 1898c. — Midi de la France jusque dans l'Ardèche et la Gironde: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Méditerranée. **Habitat.** Buissons: SIMON, 1914. Garrigue: SOYER, 1973. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Littoral, *Crithmo-station*: SOYER, 1973. Sous une pierre: SIMON, 1881a. **Période.** — *Femelle.* Novembre: LEDOUX & al., 2003.

***Dipoena coracina* (C. L. Koch, 1837)**

*D. nigrina*; *Lasaeola nigrina*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a (*L. n.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers: SIMON, 1881a (*L. n.*). Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a (*L. n.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-), Rhin (Haut-): LESSERT, 1910 (*D. n.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*D. n.*), 1910 (*D. n.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. n.*). Var: SIMON, 1881a (*L. n.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Ouest-Europe à Ukraine. **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Conifères: SIMON, 1914. Lande: CANARD, 1984. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Marais salants, Salsolacées: SIMON, 1914. Prairie: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2003. Mai: LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 2002.

***Dipoena erythropus* (Simon, 1881)**

*Lasaeola e.*

**Répartition.** Nièvre: DENIS, 1943b. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a (*L. e.*), 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1914. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Vendée: DENIS, 1941. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Forêt: SIMON, 1914. Sur *Picea excelsa*: DENIS, 1943b. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1941, 1943b, 1950a. Juillet: DENIS, 1933b.

***Dipoena inornata*** (O. P.-Cambridge, 1861)*Euryopis i.*; *Lasaeola i.*; *Phycosoma inornatum*.

[Nommée *Phycosoma inornatum* dans CANARD, 2005]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a (*L. i.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Hérault: EMERIT & al., 1990. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a (*L. i.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Var: BECKER, 1880 (*E. i.*); SIMON, 1881a (*L. i.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois de conifères: SIMON, 1881a, 1914. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1933b. Novembre: LEDOUX, 2000.

***Dipoena latifrons*** Denis, 1950

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. — Connue seulement de France. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1950a.

***Dipoena melanogaster*** (C. L. Koch, 1837)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; SIMON, 1881a. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1881a. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aube: SIMON, 1881a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1881a, 1914. Côtes-d'Armor: SIMON, 1881a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers, Gironde, Landes: SIMON, 1881a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot-et-Garonne: SIMON, 1881a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: SIMON, 1881a; YSNEL, 1990b. Oise: SIMON, 1881a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1881a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: SIMON, 1881a. Var: DENIS, 1934a, 1935b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1881a. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b. Vienne (Haute-): SIMON, 1881a. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, de l'Afrique du Nord à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bruyères: DENIS, 1934a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1964b. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987; MÜLLER, 1985. Forêt de chênes et châtaigniers; forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt, sur un pin: DENIS, 1964b. Garrigue: SOYER, 1973. Génévriers, pins: SIMON, 1914. Génévriers, pins, chênes et aubépines: SIMON, 1881a. Haie: BRAUD & al., 2005. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992; SOYER, 1973. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juin: DENIS, 1964b; EME-

RIT & al., 1997. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin: DENIS, 1933b, 1964b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Août: LEDOUX & al., 2003.

***Dipoena nigroreticulata*** (Simon, 1879)*Euryopis n.*; *Lasaeola n.*

**Répartition.** Seine-et-Marne: SIMON, 1879 (*E. n.*), 1881a (*L. n.*), 1914. — Allemagne. Europe. **Habitat.** Forêt; génévriers: SIMON, 1914.

***Dipoena praecelsa*** Simon, 1914

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

***Dipoena prona*** (Menge, 1868)*Lasaeola p.*

**Répartition.** Aube, Gironde: SIMON, 1881a (*L. p.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Somme: SIMON, 1881a (*L. p.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique (*L. p.*). **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1933b.

***Dipoena sedilloti*** (Simon, 1885)

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Charente: SIMON, 1914. — Espagne. Algérie, Tunisie.

***Dipoena sericata*** (Simon, 1879)*Euryopis s.*; *Lasaeola s.*

[Connue par un seul spécimen femelle. SIMON, 1914 note: «Il ne me paraît pas impossible que *D. sericata* ne soit autre que la femelle de *D. procax*» (= *D. torva*)]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1879 (*E. s.*), 1881a (*L. s.*), 1914. — Connue seulement de France.

***Dipoena testaceomarginata*** (Simon, 1881)*Lasaeola t.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a (*L. t.*), 1914. Var: SIMON, 1881a (*L. t.*). — Provence: SIMON, 1914. Espagne, Italie. **Habitat.** Buissons: SIMON, 1914. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1881a. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1881a.

***Dipoena torva*** (Thorell, 1875)*D. procax*; *Euryopis procax*; *Lasaeola procax*.

**Répartition.** Seine-et-Marne: SIMON, 1879 (*E. p.*), 1881a (*L. p.*), 1914 (*D. p.*). Var: DENIS, 1935b (*D. p.*), 1949c (*D. p.*). — Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1949c.

***Dipoena tristis*** (Hahn, 1831)*Lasaeola t.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1881a (*L. t.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gironde: SIMON, 1881a (*L. t.*). Morbihan: DENIS, 1938a. Oise:



SIMON, 1881a (*L. t.*), 1887a (*L. t.*). Orne: YSNEL, 1990b. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. "Seine": SIMON, 1881a (*L. t.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. t.*); SIMON, 1881a (*L. t.*). Seine-et-Marne, Vienne (Haute-): SIMON, 1881a (*L. t.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*L. t.*). De l'Europe au Tadjikistan (*L. t.*). **Habitat.** Bois de chênes, litière: EMERIT & *al.*, 1997. Bois secs, conifères: SIMON, 1914. Bois secs, pins et genévriers: SIMON, 1881a. Forêt: DENIS, 1938a; LANCELEVÉE, 1884. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Jardin; prairie très humide: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004.

*Dipoena umbratilis* (Simon, 1873)

*Lasaeola auberti*; *Lasaeola u.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a (*L. u.*), 1914. Ardèche: SIMON, 1914. Corse: SIMON, 1881a (*L. u.*), 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1914. Var: DENIS, 1935a; SIMON, 1881a (*L. a.*), 1914. Vaucluse: SIMON, 1881a (*L. u.*), 1914. — Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée. **Altitude.** 850 m (DENIS, 1933b). **Habitat.** Forêt, mousses: SIMON, 1881a. Mousses et plantes basses: SIMON, 1914. Mousses humides: SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Octobre: SIMON, 1881a. — *Femelle.* Mai à juillet: DENIS, 1933b.

*Enoplognatha afrodite* Hippa & Oksala, 1983

**Répartition.** Charente-Maritime: BOSMANS & *al.*, 1999. Corse: BOSMANS & *al.*, 1999; HIPPA & *al.*, 1983. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1999; HIPPA & *al.*, 1983; LEDOUX & *al.*, 1995. Sèvres (Deux-): BOSMANS & *al.*, 1999. — Europe du Sud. **Altitude.** 300 m (HIPPA & *al.*, 1983). **Habitat.** Bord de route: HIPPA & *al.*, 1983. Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Maquis, herbes: BOSMANS & *al.*, 1999. Rochers, anfractuosités; sous des pierres en zone alpine: HIPPA & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: BOSMANS & *al.*, 1999. — *Femelle.* Mai: BOSMANS & *al.*, 1999; HIPPA & *al.*, 1983. Juin: BOSMANS & *al.*, 1999.

*Enoplognatha caricis* (Fickert, 1876)

*E. tecta.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Aube: SIMON, 1884a, 1914. Cher: DENIS, 1943b. Eure: EMERIT & *al.*, 2003 (*E. t.*). Oise, "Seine": SIMON, 1914. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a, 1914. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884a, 1914. Somme: SIMON, 1884a, 1914. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*E. t.*). Holarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois; bord d'étang: SIMON, 1914. Bord de rivière, roseaux: DENIS, 1943b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Marais, détritus: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003; SIMON, 1914; VILLEPOUX, 1990b. **Période.** — *Femelle.* Mai: EMERIT & *al.*, 2003.

*Enoplognatha diversa* (Blackwall, 1859)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BOSMANS & *al.*, 1999. — Espagne. Madère, Canaries, du Maroc à la Grèce.

*Enoplognatha gemina* Bosmans & Van Keer, 1999

**Répartition.** Corse, Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1999. — Espagne. Méditerranée. **Période.** — *Mâle.* Avril, mai, novembre: BOSMANS & *al.*, 1999.

*Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala, 1982

**Répartition.** Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & *al.*, 2004. Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bord d'étang: VEILLON, 1997. Clôture; haie: BRAUD & *al.*, 2005. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996c, 2002. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 2003. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c.

*Enoplognatha mandibularis* (Lucas, 1846)

*E. nigrocincta*; *Steatoda m.*; *Theridion mandibulare.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: BOSMANS & *al.*, 1999; SIMON, 1884a. Aude: BOSMANS & *al.*, 1999. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BOSMANS & *al.*, 1999; SOYER, 1973. Cantal: SIMON, 1884a. Charente: SIMON, 1914. Charente-Maritime: BOSMANS & *al.*, 1999; SIMON, 1874d (*T. m.*), 1884a, 1914. Corse: BOSMANS & *al.*, 1999; SCHARFF, 1894; SIMON, 1884a, 1884a (*E. n.*), 1914. Finistère: YSNEL, 1990b. Gironde: SIMON, 1884a, 1884a (*E. n.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*S. m.*); SIMON, 1884a. Maine-et-Loire: NOËL & *al.*, 2005. Morbihan: SIMON, 1884a, 1914; YSNEL, 1990b. Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1999; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1995; SIMON, 1884a; TAMBS-LYCHE, 1957. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884a, 1914. Var: BECKER, 1880 (*S. m.*); BOSMANS & *al.*, 1999; DENIS, 1934a; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1884a, 1898c. Vaucluse: SIMON, 1884a. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c, 1968a. — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Dune: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Lande: CANARD, 1984. Littoral, zone halophile: SOYER, 1973. Maison: DENIS, 1968a. Marécage salé: BIGOT, 1965. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & *al.*, 1995. Pelouses sèches à *Brachypodium*: SOYER, 1973. Plage: DENIS, 1962b; TAMBS-LYCHE, 1957. Plage, oyats: DENIS, 1963c. Prairie: NOËL & *al.*, 2005. Rivière à sec, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1999. *Salicornietum*:



BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre: BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1934a, 1962b, 1963c. Sur sol sableux, au pied des arbres et buissons: KOVOOR & al., 2000. Terrains sablonneux, sous les pierres: SIMON, 1914. Terrains sablonneux, sous les pierres ou à la base des plantes: SIMON, 1884a. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1957, 1965. **Période**. — *Mâle*. Février: DENIS, 1967d. Mai: BOSMANS & al., 1999. Septembre: DENIS, 1968a. Octobre: DENIS, 1962b, 1963c. Novembre: DENIS, 1962b. Décembre: DENIS, 1933b, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1934a, 1967d. Mars: DENIS, 1964b. Avril: BOSMANS & al., 1999. Mai: BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1934a, 1965c; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: DENIS, 1965c. Août: LUCAS, 1882a. Octobre, novembre: DENIS, 1962b. Décembre: DENIS, 1933b, 1964b. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1934a. Décembre: DENIS, 1964b.

*Enoplognatha mordax* (Thorell, 1875)

*E. maritima*; *E. schaufussi*.

**Répartition**. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*E. s.*); SOYER, 1973 (*E. m.*). Calvados: SIMON, 1884a (*E. m.*). Charente-Maritime: SIMON, 1884a (*E. m.*), 1914 (*E. m.*). Côtes-d'Armor: SALMON, 1959 (*E. m.*). Loire-Atlantique: BOSMANS & al., 1999. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004; YSNEL, 1990b (*E. s.*). Morbihan: SIMON, 1884a (*E. m.*); YSNEL, 1990b (*E. s.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*E. m.*), 1910 (*E. m.*); SIMON, 1914 (*E. m.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991 (*E. s.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989 (*E. m.*); SIMON, 1914 (*E. m.*). Somme: SIMON, 1884a (*E. m.*), 1914 (*E. m.*). Var: SIMON, 1914 (*E. m.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*E. m.*). Vendée: DENIS, 1941 (*E. s.*); YSNEL, 1990b (*E. s.*). — Région maritime de la Somme à la Charente-maritime, et de la Méditerranée: SIMON, 1914 (*E. m.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Habitat**. Bord d'étang: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: SIMON, 1914. Dune et plage, *Salsola*: SIMON, 1884a. Friche: VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Littoral: SALMON, 1959. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais salant: SIMON, 1914. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1973. Peupliers; prairie; roseaux: NOËL & al., 2005. Salicornes: DENIS, 1950c. **Période**. — *Mâle*. Mai: BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1950c. Juin: LEDOUX, 2000; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Avril: VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1950c. Juin: VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1941.

*Enoplognatha nigromarginata* (Lucas, 1846)

**Répartition**. Corse: SIMON, 1884a, 1914. — Espagne, Italie. De l'Espagne à la Grèce, Maroc, Algérie. **Habitat**. Berges et talus humides: SIMON, 1884a. Talus humides: SIMON, 1914.

*Enoplognatha oelandica* (Thorell, 1875)

**Répartition**. Charente-Maritime, Loire-Atlantique: BOSMANS & al., 1999. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Vendée: BOSMANS & al., 1999. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Habitat**. Forêt de pins sur dune: BOSMANS & al.,

1999. **Période**. — *Mâle*. Mars: BOSMANS & al., 1999. — *Femelle*. Mars, mai: BOSMANS & al., 1999.

*Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757)

*Theridion lineatum*; *Theridion ovatum*.

[Certaines citations anciennes de cette espèce pourraient se rapporter à *E. latimana* (décrite en 1982) ou à *E. aphrodite* (décrite en 1983)]. **Répartition**. Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973 (*T. o.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*T. o.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; ROEWER, 1926 (*T. l.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*T. o.*); YSNEL, 1990b. Doubs: BOSMANS & al., 1999; EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1938a (*T. o.*), 1939a (*T. o.*), 1940a (*T. o.*); YSNEL, 1990b. Gard: EMERIT & al., 1994. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: DENIS, 1938a (*T. o.*); YSNEL, 1990b. Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (*T. o.*). Nord: DENIS, 1952b (*T. o.*); GOULLIART, 1979b (*T. o.*). Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1955c (*T. o.*), 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1933b (*T. o.*), 1951a (*T. o.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): REIBER, 1880 (*T. l.*). Savoie (Haute-): BOSMANS & al., 1999. "Seine": CHRISTOPHE, 1973 (*T. o.*), 1974 (*T. o.*); CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984 (*T. o.*), 1989. Var: DENIS, 1933a (*T. o.*); KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1941 (*T. o.*), 1962b, 1963c, 1964b, 1966a. [Selon OXFORD & al., 1994 la citation de Corse par CANARD, 1989 serait probablement *E. afroditte*]. — Toute la France: SIMON, 1914 (*T. o.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1870 m (DENIS, 1961b). **Habitat**. Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1964b. Bois: DENIS, 1941. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois, buissons: GOULLIART, 1979b. Bord de route, herbes et fougères: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1952b, 1960a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, lièze: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, chênes-verts; forêt, chênes: DENIS, 1963c. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Grotte: DENIS, 1951a. Haie: BRAUD & al., 2005; GOULLIART, 1979b. Jardin: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; GOULLIART, 1979b. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT

& al., 1994. Lisière de forêt : LE PERU, 2004. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Maison : DENIS, 1963c. Marécage : DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999, 2003; HENRY, 1981; VILLEPOUX, 1990b. Mousses très humides : DENIS, 1955c. Prairie : BOSMANS & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Pâturage : LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve : LEDOUX & al., 2002. Sous-bois : VEILLON, 1997. Sur un mur : DENIS, 1966a. Taillis de chênes : SOYER, 1973. Tourbière : EMERIT & al., 1999. Verger : LEDOUX & al., 1996a. Végétation de *Buxus*, *Rubus* et fougères : BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Mars : ROEWER, 1926. Mai : DENIS, 1933b. Juin : BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1933b, 1938a, 1952b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Juillet : BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984, 1989; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1959d, 1960a, 1961b, 1963c, 1966a; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Août : CANARD, 1984. — *Femelle*. Mars : ROEWER, 1926. Juin : CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1952b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet : BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1939a, 1940a, 1955c, 1959d, 1960a, 1961b, 1963c, 1964b, 1967e; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Août : CANARD, 1984, 1989; DENIS, 1964b; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Septembre : BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1963c, 1964b; EMERIT & al., 1997, 2003. Octobre : CANARD, 1984; DENIS, 1963c. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1960a.

*Enoplognatha quadripunctata* Simon, 1884

**Répartition.** Corse : BOSMANS & al., 1999. — Espagne. Méditerranée. **Altitude.** 850 m (BOSMANS & al., 1999). **Habitat.** Bois de châtaigniers : BOSMANS & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Mai : BOSMANS & al., 1999.

*Enoplognatha testacea* Simon, 1884

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1884a. Ardèche : DRESKO, 1962; RAPHAËL & al., 1992. Aude : BOSMANS & al., 1999; SIMON, 1884a. Bouches-du-Rhône : BOSMANS & al., 1999; SIMON, 1884a; SOYER, 1973. Charente : SIMON, 1914. Charente-Maritime : BOSMANS & al., 1999. Corse : BOSMANS & al., 1999; SIMON, 1884a. Gard : LEDOUX, 2000. Gironde : SIMON, 1884a. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Var : DENIS, 1933a, 1934a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse : SIMON, 1884a. — Midi de la France et l'ouest jusque dans les Charentes : SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie. De l'Europe du Sud à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (BOSMANS & al., 1999). **Habitat.** Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt : SIMON, 1914. Forêt de chênes-lièges, litière : BOSMANS & al., 1999. Forêt de chênes-verts : LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995. Friche : SIMON, 1914. Friches, sous les pierres : SIMON, 1884a. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Garrigue, litière : SOYER, 1973. Grotte : DRESKO, 1962. Pelouse à *Brachypodium* : SOYER, 1973. Pelouse à plantain caréné : LEDOUX & al., 1995. *Populetum albae*, herbes : LEDOUX, 2000. Prairie : LEDOUX & al., 2003. Sous les pierres, détritiques : SIMON, 1914. Sous une pierre : DENIS, 1934a. **Période.** — *Mâle*. Jan-

vier, mars : DENIS, 1933b. Mai : BOSMANS & al., 1999. Novembre : LEDOUX & al., 1996a. Décembre : DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mars : DRESKO, 1962. Avril : BOSMANS & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Mai : BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1934a. Juin : BOSMANS & al., 1999. Novembre : LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2003. — *Femelle avec cocon*. Février : DENIS, 1933b. Mai : DENIS, 1934a.

*Enoplognatha thoracica* (Hahn, 1833)

*Steatoda* t.

**Répartition.** Aisne : SIMON, 1884a. Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Ardèche : BOSMANS & al., 1999. Ariège : BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1960a, 1961b. Aube : SIMON, 1884a. Aude : BOSMANS & al., 1999. Bouches-du-Rhône : BOSMANS & al., 1999; SOYER, 1973. Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b (*S. t.*). Cantal : SIMON, 1884a. Charente-Maritime, Corse : BOSMANS & al., 1999. Côtes-d'Armor : CANARD, 1984; DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Doubs : EMERIT & al., 1997. Finistère : CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a. Garonne (Haute-) : KERVILLE, 1932. Ille-et-Vilaine : BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique : LUCAS, 1882a (*S. t.*). Lot : BOSMANS & al., 1999. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004; SIMON, 1884a. Morbihan : BOSMANS & al., 1999; SIMON, 1884a; YSNEL, 1990b. Oise : SIMON, 1887a. Orne : SIMON, 1884a; YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais : BONTE, 2000. Puy-de-Dôme : SIMON, 1884a. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & al., 1999; SIMON, 1884a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1999; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a; SIMON, 1884a. Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910. "Seine" : BOSMANS & al., 1999; COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000; SIMON, 1884a. Seine-et-Marne : COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1884a. Somme : ROSELLE, 1888a. Vendée : BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France : SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1930 m (BOSMANS & al., 1999). **Habitat.** Arrière-dune : DENIS, 1965c. Bois : DENIS, 1941. Bois de chênes, litière : EMERIT & al., 1997. Champ de céréales : COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Dune : DENIS, 1941, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux : BONTE, 2000. Dune, sous des pierres : DENIS, 1941. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges, litière : BOSMANS & al., 1999. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins : DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt de pins, pierres : BOSMANS & al., 1999. Forêt, sous les pierres, sur les troncs : DOIGNON, 1976. Fougères : DENIS, 1940a. Friche : PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Friches, sous les pierres : SIMON, 1884a, 1914. Lande : CANARD, 1984, 1990c; DENIS, 1940a. Lieux humides et sablonneux, sous les pierres : LUCAS, 1877b. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Maison : DENIS, 1965c. Marécage : DENIS, 1941; ROSELLE, 1888a. Pelouse : BERLAND, 1924.

Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1973. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sables littoraux: BOSMANS & al., 1999. Sous une pierre: DENIS, 1939a, 1940a, 1963c. Sous-bois, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996a. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Touffes de camomille: DENIS, 1940a. **Période.** — *Mâle*. Avril: BOSMANS & al., 1999; DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: BONTE, 2000; BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1965c; LESSERT, 1904, 1910. Juin: BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997; LESSERT, 1904, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1939a, 1940a. Août: BOSMANS & al., 1999. — *Femelle*. Février: DENIS, 1965c. Avril: DENIS, 1964b. Mai: BONTE, 2000; BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1965c; LESSERT, 1904, 1910. Juin: BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1941; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1960a, 1961b, 1963c. Août: BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; LUCAS, 1882a. Septembre: BOSMANS & al., 1999; CANARD, 1984; DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997; LUCAS, 1877b. Octobre: CANARD, 1984. Novembre: DENIS, 1965c. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1938a, 1964b. Juillet: DENIS, 1939a, 1960a, 1961b, 1963c, 1964b.

*Episinus albescens* Denis, 1965

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Landes: DENIS, 1964a. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt de pins, dans un pot de résine: DENIS, 1964a. **Période.** — *Femelle*. Août: DENIS, 1964a.

*Episinus algericus* Lucas, 1846

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1963c, 1964b. — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Nord-ouest de l'Afrique. **Habitat.** Bâtiment: DENIS, 1963c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Garrigue: SOYER, 1973. Maison; sur un poteau en ciment: DENIS, 1964b. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1973. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. Juillet: DENIS, 1964b. Août: DENIS, 1963c. Septembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Août, septembre: DENIS, 1964b.

*Episinus angulatus* (Blackwall, 1836)

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1938a. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": COCQUEMPOUT & al., 1991. Seine-et-Marne: COCQUEMPOUT & al., 1989. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne,

Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe jusqu'en Russie. **Altitude.** Jusqu'à 700 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOUT & al., 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune; forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, litière: DENIS, 1964b. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande: VEILLON, 1997. Marécage; prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve, bord d'étang; ripisilve, sous des lierres: LEDOUX, 2000. Sur la boue sèche, herbes: DENIS, 1965c. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1967e; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000.

*Episinus maculipes* Cavanna, 1876

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Corse: CANARD, 1989; KNOFLACH & al., 2000. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Var: KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Angleterre à l'Algérie. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord de rivière: CANARD, 1989. Bâtiment: DENIS, 1964b. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts; forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: MÜLLER, 1985. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt de pins, herbes et sur les chênes-verts: DENIS, 1962b. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Lande: CANARD, 1984. Litière et mousses: EMERIT & al., 1997. Maison: BRAUD & al., 2005. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Mai: KNOFLACH & al., 2000; LEDOUX, 2000. Juillet: CANARD, 1989; MÜLLER, 1985. Août, septembre: DENIS, 1962b. — *Femelle*. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1964b. Août: DENIS, 1962b. Septembre: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1963c.

*Episinus theridioides* Simon, 1873

*Plocamis pyrenaica*; *Plocamis t.*

**Taxonomie.** La synonymie *E. pyrenaicus* (Simon, 1914, de *Plocamis*) = *E. theridioides* est établie par BOSMANS & al., 2002. **Répartition.** Corse: KNOFLACH, 1993b; SIMON, 1881a, 1914 (*P. t.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a, 1914 (*P. p.*). — Espagne. Sardaigne. **Altitude.** De 800 m (SIMON, 1881a) jusqu'à 1400 m (KNOFLACH, 1993b). **Habitat.** Forêt de hêtres; forêt de pins: KNOFLACH, 1993b. Forêt de *Pinus laricio*, sous les écorces: SIMON, 1914. Forêt de sapins, sous les écorces tombées: SIMON, 1881a. Prairie, sous les grosses pierres: SIMON, 1881a, 1914. **Période.** — *Mâle*. Octobre: KNOFLACH, 1993b. — *Femelle*. Octobre: KNOFLACH, 1993b.

*Episinus truncatus* Latreille, 1809*E. lugubris*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a (*E. l.*). Ariège: DENIS, 1960a. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a (*E. l.*), 1914. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909a. Gers, Gironde: SIMON, 1881a (*E. l.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: SIMON, 1881a (*E. l.*); YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1847b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b (*E. l.*). Somme: ROSELLE, 1891. Var: DENIS, 1933a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Champ: LEDOUX & al., 1991. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1891. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Genêts, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996a. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Lande: CANARD, 1984. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse: BERLAND, 1924. Pins et fougères: CANARD, 1989. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1933b, 1941; EMERIT & al., 1997; LEDOUX, 2000. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1959d, 1960a, 1963c. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1941; EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1959d, 1963c. Août: LEDOUX & al., 2003. Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Euryopsis acuminata* (Lucas, 1846)*E. acuminatus*; *E. episinoides*.

**Taxonomie.** L'espèce *Euryopsis acuminata* (Lucas, 1846) est désignée sous le nom *E. episinoides* (Walckenaer, 1847) par PLATNICK, 2004. Selon cet auteur le nom *Theridion acuminatum* utilisé par Lucas en 1846 est préoccupé par *Theridion acuminatum* Wider, 1834 [actuellement *Entelecara acuminata*]. Mais *Euryopsis acuminata* a toujours été utilisé par tous les auteurs sans que cela ne pose de problèmes. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1973; DENIS, 1954b; SOYER, 1953a (*E. a.*), 1973. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a, 1914. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Hérault: EMERIT & al., 1985. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a, 2003; SIMON, 1914. Var: BECKER, 1880. — Midi de la France: SIMON, 1914. Italie. Méditerranée, Chine (*E. e.*). **Habitat.** Arrière-dune; aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Broussailles:

CHANSIGAUD & al., 1994. Dune: DENIS, 1954b; LEDOUX & al., 1999a. Friches, sous les pierres: SIMON, 1914. Garrigue: SOYER, 1953a, 1973. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Marécage salé: BIGOT, 1965. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Prairie: LEDOUX & al., 1999a, 2003. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre: DENIS, 1933b. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Juillet: CANARD, 1989. Août: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1933b. Juin: LEDOUX & al., 1999a. Juillet: CANARD, 1989. Décembre: DENIS, 1933b.

*Euryopsis dentigera* Simon, 1879

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Alpes-de-Haute-Provence, Var: SIMON, 1879, 1881a, 1914. — Espagne. Bulgarie, Suède.

*Euryopsis flavomaculata* (C. L. Koch, 1836)*Theridion flavomaculatum*.

**Répartition.** Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1881a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1881a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a. Gers: SIMON, 1881a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Indre-et-Loire, Isère: SIMON, 1881a. Marne: SIMON, 1881a. Morbihan: YSNEL, 1990b. Oise: SIMON, 1881a. Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": LUCAS, 1875; SIMON, 1881a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1881a. Somme: SIMON, 1881a. Vendée: DENIS, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872 (*T. f.*). — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1875. Bois, mousses: SIMON, 1881a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Lande: CANARD, 1984. Mousses: SIMON, 1909a. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1938a, 1964b; LESSERT, 1910. — *Femelle.* Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997. Septembre: LUCAS, 1875.

*Euryopsis laeta* (Westring, 1861)*E. zimmermanni*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Côte-d'Or: SIMON, 1881a (*E. z.*), 1914. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Morbihan: MURPHY, 1994; SIMON, 1881a (*E. z.*), 1914; YSNEL, 1990b. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*E. z.*), 1910 (*E. z.*); SIMON, 1914. Seine-et-Marne: SIMON, 1898b (*E. z.*), 1914. Vaucluse: SIMON, 1914. Vendée: DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Europe jusqu'au Tadjikistan. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Dune: DENIS, 1962d. Dune, oyats et *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Forêt de pins, clairière, herbes: DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c. Forêt de pins, litière très sèche: DENIS, 1964b. Forêt de pins, sous des pieds

d'*Helichrysum* sur un talus sablonneux : DENIS, 1962b. Lande : CANARD, 1984. Lieux sablonneux très chauds : SIMON, 1914. Sous une pierre : DENIS, 1963c. **Période**. — *Mâle*. Mai : DENIS, 1965c. Juin : DENIS, 1964b ; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Juin : DENIS, 1964b. Juillet : DENIS, 1962d, 1963c.

*Euryopsis quinqueguttata* Thorell, 1875

*E. albomaculata* ; *E. argenteomaculata*.

**Répartition**. Aube, Aveyron, Cantal : SIMON, 1879 (*E. argenteomaculata*), 1881a (*E. argenteomaculata*), 1914. Charente-Maritime : SIMON, 1876b (*E. albomaculata*), 1879 (*E. argenteomaculata*), 1881a (*E. argenteomaculata*), 1914. Oise : SIMON, 1881a (*E. argenteomaculata*), 1914. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Seine, Seine-et-Marne : SIMON, 1879 (*E. argenteomaculata*), 1881a (*E. argenteomaculata*), 1914. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe jusqu'au Turkménistan. **Habitat**. Forêt ; lieux sablonneux et secs : SIMON, 1914.

*Keijia* (voir *Theridion*)

*Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790)

*L. mactans tredecimguttatus* ; *L. martius*.

**Répartition**. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1973. Corse : O'NEIL, 1979 (*L. m. t.*) ; SIMON, 1881a, 1914 ; TIBERGHEN & al., 1993a. Gard : LEDOUX, 1963 ; SIMON, 1878c ; THÉLESPHORE, 1878. Hérault : SIMON, 1881a, 1914. Loir-et-Cher : LUCAS, 1848 (*L. m.*). Morbihan : SIMON, 1878c, 1881a, 1914. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1932c, 1933b. "Seine" : LUCAS, 1847c (*L. m.*). Var : BERLAND, 1930 ; DENIS, 1931a. Vaucluse, Vendée : SIMON, 1878c, 1881a, 1914. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à la Chine. **Habitat**. Dune : TIBERGHEN & al., 1993a. Étang desséché : THÉLESPHORE, 1878. Plage, *Eryngium* : SIMON, 1881a. Sous les touffes d'*Eryngium maritimum* : SIMON, 1878c. Sous une pierre : SIMON, 1914. Tas de galets : SOYER, 1973. À la base des plantes dures et touffues : SIMON, 1914. **Période**. — *Femelle*. Janvier : DENIS, 1932c. Mars : DENIS, 1931a. Septembre : LEDOUX, 1963. — *Femelle avec cocon*. Janvier : DENIS, 1933b.

*Neottiura* (voir *Theridion*)

*Paidiscura* (voir *Theridion*)

*Pholcomma gibbum* (Westring, 1851)

**Répartition**. Ain, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1881a. Ariège : DENIS, 1967d ; SIMON, 1881a. Aube : SIMON, 1881a. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1954b. Calvados : GUIBÉ, 1946. Cantal : SIMON, 1881a. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1881a, 1914. Eure : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1899, 1909a. Finistère : CANARD, 1984 ; YSNEL, 1990b. Gard : EMERIT & al., 1994 ; LEDOUX, 2000. Gironde : SIMON, 1881a. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1984 ; YSNEL, 1990b. Isère : SIMON, 1881a. Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 ; LEDOUX & al., 1999b. Lot-et-Garonne : SIMON, 1881a. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Morbihan : YSNEL, 1990b. Orne : SIMON, 1881a. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1953b. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1933b, 1967d ; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910. "Seine" : SIMON, 1881a. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON,

1881a. Seine-et-Marne, Var : SIMON, 1881a. Vendée : DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France : SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie, Ukraine, Afrique du Nord. **Altitude**. Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat**. Bois : DENIS, 1941. Bois, litière : BRAUD & al., 2005. Bois, mousses : SIMON, 1914. Clôture : BRAUD & al., 2005. Détritux humides : DENIS, 1965c. Dune, oyats secs : DENIS, 1964b. Forêt : LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins, chênes-verts : DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière ; forêt de pins, mousses humides très épaisses ; forêt, litière et mousses humides : DENIS, 1964b. Grotte : DENIS, 1967d. Haie, litière : BRAUD & al., 2005. Lande : CANARD, 1984. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins : EMERIT & al., 1994. Lisière de forêt humide, mousses : LE PERU, 2004. Litière : LEDOUX & al., 1996a. Litière sèche : DENIS, 1963c. Mousses : SIMON, 1909a. *Populetum albae*, litière et herbes : LEDOUX, 2000. **Période**. — *Mâle*. Janvier : CANARD, 1984 ; DENIS, 1963c. Février : CANARD, 1984 ; DENIS, 1953b. Mars : CANARD, 1984 ; DENIS, 1964b, 1967d ; LESSERT, 1904, 1910. Avril : DENIS, 1964b ; LEDOUX & al., 1996a. Mai, août : DENIS, 1967d. Novembre : CANARD, 1984 ; DENIS, 1967d ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX, 2000. Décembre : DENIS, 1964b. — *Femelle*. Janvier : CANARD, 1984 ; LE PERU, 2004. Février : CANARD, 1984 ; DENIS, 1953b, 1965c. Mars : CANARD, 1984 ; DENIS, 1964b. Avril : DENIS, 1962b, 1964b ; LEDOUX & al., 1996a. Mai : CANARD, 1984 ; DENIS, 1933b, 1967d. Juin : DENIS, 1933b, 1964b ; LESSERT, 1904, 1910. Juillet : DENIS, 1963c. Août : DENIS, 1967d. Septembre : CANARD, 1984 ; DENIS, 1967d. Novembre : CANARD, 1984 ; DENIS, 1965c, 1967d ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX, 2000 ; LEDOUX & al., 1996a. Décembre : DENIS, 1967d.

*Phoroncidia hankiewiczzi* (Kulczynski, 1911)

*Ulesanis h.*

[Mâle inconnu]. **Répartition**. Hérault : SIMON, 1914 (*U. h.*). Var : BERLAND, 1931 (*U. h.*). — Espagne. Portugal. **Habitat**. Forêt d'oliviers : BERLAND, 1931. Forêt de *Pinus laricio* : SIMON, 1914.

*Phoroncidia paradoxa* (Lucas, 1846)

*Oroodes paradoxus* ; *Ulesanis p.*

**Répartition**. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1881a (*O. p.*), 1914 (*U. p.*). Bouches-du-Rhône : SIMON, 1914 (*U. p.*) ; SOYER, 1973 (*U. p.*). Corse : SIMON, 1881a (*O. p.*), 1914 (*U. p.*) ; TIBERGHEN & al., 1993a. Gers, Gironde : SIMON, 1881a (*O. p.*), 1914 (*U. p.*). Landes : SIMON, 1914 (*U. p.*). Lot-et-Garonne : SIMON, 1881a (*O. p.*), 1914 (*U. p.*). Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1914 (*U. p.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a (*U. p.*). Seine-et-Marne : SIMON, 1881a (*O. p.*), 1914 (*U. p.*). Vendée : DENIS, 1964b (*U. p.*). — Espagne, Italie. Europe, Afrique du Nord. **Altitude**. Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat**. Ajoncs et bruyères : SIMON, 1914. Arbustes et genévriers : TIBERGHEN & al., 1993a. Forêt de chênes : SIMON, 1914. Forêt de pins, chênes-verts : DENIS, 1964b. Garrigue ; taillis de chênes-verts : SOYER, 1973. **Période**. — *Femelle*. Août : DENIS, 1964b.

**Robertus arundineti** (O. P.-Cambridge, 1871)*Pedanostethus a.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Aisne: SIMON, 1884a (*P. a.*). Ardèche: DRESKO, 1959b. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884a (*P. a.*). Corse: SIMON, 1884a (*P. a.*), 1914. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Finistère: CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1940a; YSNEL, 1990b. Hérault: SIMON, 1884a (*P. a.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946. Morbihan: YSNEL, 1990b. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884a (*P. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. "Seine": SIMON, 1884a (*P. a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. a.*); SIMON, 1884a (*P. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*P. a.*); SIMON, 1884a (*P. a.*), 1898b (*P. a.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*P. a.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vosges: SIMON, 1884a (*P. a.*). — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois, mousses: DRESKO, 1959b; SIMON, 1914. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de rivière, gravières: HEIDT & al., 1998. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Détritiques d'inondation: DENIS, 1967d. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Mousses: SIMON, 1884a. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1940a. **Période.** — *Mâle.* Février: CANARD, 1984. Mars: SIMON, 1884a. Mai: CANARD, 1984. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1961b. Septembre: SIMON, 1884a. Octobre, novembre: CANARD, 1984. — *Femelle.* Février: CANARD, 1984. Mars: DENIS, 1933b. Avril: CANARD, 1984; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a, 1967d; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1940a, 1961b. Août: CANARD, 1984; DENIS, 1960a. Septembre à novembre: CANARD, 1984.

**Robertus insignis** O. P.-Cambridge, 1907

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. — Allemagne, Grande-Bretagne, Italie. Europe, Russie. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Marécage: VILLEPOUX, 1990b.

**Robertus lividus** (Blackwall, 1836)*Pedanostethus l.*

**Répartition.** Ain, Aisne, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884a (*P. l.*). Ardèche: JEANNEL, 1926; SIMON, 1911. Ariège: DENIS, 1953b, 1960a, 1961b, 1967d; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a (*P. l.*), 1910 (*P. l.*), 1911. Aube: SIMON, 1884a (*P. l.*). Aude: DENIS, 1967d; SIMON, 1884a (*P. l.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884a (*P. l.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1959b. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*P. l.*); SIMON, 1884a (*P. l.*), 1909a (*P. l.*). Finistère: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a, 1967d. Gers: SIMON,

1884a (*P. l.*). Hérault: JEANNEL, 1926; SIMON, 1910 (*P. l.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Isère: SIMON, 1884a (*P. l.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: YSNEL, 1990b. Nord: EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a (*P. l.*). Orne: DRESKO, 1959b; SIMON, 1884a (*P. l.*); YSNEL, 1990b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a, 1959d, 1960a; DRESKO, 1959b; SIMON, 1884a (*P. l.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1884a (*P. l.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a; YSNEL, 1990b. Savoie: MÜLLER, 1985. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884a (*P. l.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. l.*); SIMON, 1884a (*P. l.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*P. l.*); DRESKO, 1959b; SIMON, 1884a (*P. l.*). Somme: SIMON, 1884a (*P. l.*). Var: KOVOOR & al., 2000; MÜLLER, 1985; SIMON, 1884a (*P. l.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 3000 m (SIMON, 1884a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bois, sous des pierres: DENIS, 1959d. Bord de mare: DENIS, 1962b. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de mélèzes, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de pins: DENIS, 1963c. Forêt de pins, bord de ruisseau, sous les pierres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de pins, mousses sèches: MÜLLER, 1985. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Forêt, litière: DRESKO, 1959b. Friche: PASQUET & al., 1992. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963c; DENIS, 1967d; DRESKO, 1959a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1910, 1911. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Litière très sèche: DENIS, 1963c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884. Mousses: SIMON, 1884a, 1909a, 1914. Nid de taupes: DRESKO, 1959b. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2002, 2003; PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre; prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, bord d'étang: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c; MÜLLER, 1985; SIMON, 1884a, 1914. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février: CANARD, 1984; DRESKO, 1959b. Mars: CANARD, 1984; DENIS, 1967d; DRESKO, 1959b. Avril: CANARD, 1984; LEDOUX & al., 2003. Mai: CANARD, 1984; EMERIT & al., 2003. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1967d; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996c. Août: CANARD, 1984; LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX

& al., 2002. Novembre, décembre: CANARD, 1984. — *Femelle*. Janvier: CANARD, 1984; DENIS, 1963c, 1967d. Février: CANARD, 1984; DRESKO, 1959b. Mars: CANARD, 1984; DENIS, 1960a, 1967d; DRESKO, 1959a, 1959b. Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1962b. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1953b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1954a, 1967d; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b, 1963c; LEDOUX, 2000. Août: CANARD, 1984; DRESKO, 1959b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1962b; DRESKO, 1959b; LEDOUX & al., 1996c; MÜLLER, 1985. Octobre: CANARD, 1984; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: CANARD, 1984; DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: CANARD, 1984; DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1963c.

### *Robertus mazaurici* (Simon, 1901)

*Pedanostethus m.*; *R. umbilicatus*.

**Taxonomie.** La synonymie *R. umbilicatus* Denis, 1961 = *R. mazaurici* est établie par KNOFLACH & al., 2000. **Répartition.** Ardèche: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1959b, 1962; DRESKO & al., 1968. Ariège: DENIS, 1961b (*R. u.*), 1967d (*R. u.*). Aude: FAGE, 1931. Aveyron: DRESKO, 1959b. Gard: DRESKO, 1959b; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1901 (*P. m.*), 1911, 1914. Hérault: CAILAR & al., 1951; DRESKO, 1959b; FAGE, 1931; KNOFLACH & al., 2000; LOPEZ & al., 1979. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d (*R. u.*); LEDOUX & al., 1996a (*R. u.*), 2003. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1250 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Détritus d'inondation: DENIS, 1967d. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères, sous les pierres; forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Grotte: BALAZUC & al., 1952; CAILAR & al., 1951; DRESKO, 1959b; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; KNOFLACH & al., 2000; LOPEZ & al., 1979; SIMON, 1901, 1911, 1914. Mine: DRESKO, 1959b; DRESKO & al., 1968. Rivière souterraine: DRESKO, 1962. **Période.** — *Mâle*. Juillet: LEDOUX & al., 2003. Août, décembre: DRESKO, 1959b. — *Femelle*. Février: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959b; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959b. Avril, mai: DRESKO, 1959b. Juin: DENIS, 1967d; KNOFLACH & al., 2000; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DRESKO, 1959b. Août: DRESKO, 1959b, 1962. Septembre: DRESKO & al., 1968. Octobre: DRESKO, 1959b. Novembre: DRESKO, 1959b; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1961b; DRESKO, 1959b.

### *Robertus mediterraneus* Eskov, 1987

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): KNOFLACH, 1992. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. — Italie, Suisse, Méditerranée, Russie. **Altitude.** De 700 m (KNOFLACH, 1992) jusqu'à 1600 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: KNOFLACH, 1992.

### *Robertus neglectus* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Erigone neglecta*; *Pedanostethus n.*

**Répartition.** Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. n.*); SIMON, 1884a (*P. n.*). Aude: DENIS, 1967d. Corse: SIMON, 1884a (*P. n.*), 1914. Maine-et-Loire: BRAUD &

al., 2005. Oise: SIMON, 1884a (*P. n.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884a (*P. n.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884a (*P. n.*). Somme: SIMON, 1884a (*P. n.*). Vendée: DENIS, 1941. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 700 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Mousses: SIMON, 1884a, 1914. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1941. Octobre: DENIS, 1967d.

### *Robertus scoticus* Jackson, 1914

*R. monticola*.

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984. Jura: SIMON, 1914 (*R. m.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: YSNEL, 1990b. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt de sapins: SIMON, 1914. Garrigue: SOYER, 1973. Lande: CANARD, 1984. **Période.** — *Femelle*. Février: DENIS, 1967d. Décembre: DENIS, 1961b.

### *Robertus truncorum* (L. Koch, 1872)

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Calvados: DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1943, 1946. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2730 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996b. Bois, litière: DENIS & al., 1942. Détritus: GUIBÉ, 1943. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Litière: GUIBÉ, 1943. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996b. Rhododendrons, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. **Période.** — *Mâle*. Août: DENIS, 1953a. Décembre: DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1943. — *Femelle*. Février: DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1943. Juillet: LEDOUX & al., 1996c; MÜLLER, 1985. Août: DENIS, 1953a; LEDOUX & al., 1996b. Décembre: DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1943.

*Rugathodes* (voir *Theridion*)

*Simitidion* (voir *Theridion*)

### *Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)

*Lithyphantes albomaculatus*; *Lithyphantes corollatus*; *S. albocincta*; *S. corollata*.

**Répartition.** Ain: KNOFLACH, 1996b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985 (*L. a.*). Ariège: DENIS, 1961b (*L. a.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983 (*L. a.*); SOYER, 1953a (*L. a.*), 1973 (*L. a.*). Corse: SCHARFF, 1894 (*L. c.*). Eure: SIMON, 1909a (*L. c.*). Hérault: EMERIT & al., 1985 (*L. a.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*L. a.*), 1952c (*L. a.*), 1967d (*L. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. a.*); SIMON, 1898b (*L. c.*). Var: BECKER, 1880 (*S. c.*); DENIS, 1933a (*L. a.*), 1937a (*L. a.*); GROS, 1983a (*L. a.*); KOVOOR & al., 2000 (*S. a.*). Vendée: YSNEL, 1990b. — Toute la France: SIMON, 1914 (*L. a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Altitude.** Jusqu'à 2430 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord



de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friches sèches, sous les pierres: SIMON, 1881a, 1914. Garrigue; littoral, zone halophile: SOYER, 1973. Pelouse: SOYER, 1953a. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1973. Prairie alpestre: SIMON, 1914. Prairies alpestres, sous les pierres: SIMON, 1881a. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période**. — *Mâle*: DENIS, 1933b, 1967d. — *Femelle*: Mai: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1952c; GROS, 1983a; KNOFLACH, 1996b; MÜLLER, 1985.

*Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758)

*Theridion bipunctatum*.

**Répartition**. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Calvados: LUCAS, 1874c (*T. b.*), 1877b. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909a. Finistère: LUCAS, 1868 (*T. b.*). Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Marne: LUCAS, 1878a. Nord: GOULLIART, 1979b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904; MULLER & al., 1895. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1891. Yonne: LUCAS, 1872 (*T. b.*). — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1620 m (DENIS, 1960a). **Habitat**. Bois, sous les écorces des vieux arbres: SIMON, 1881a. Bâtiment: DENIS, 1950b; GOULLIART, 1979b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, sous les pierres, sur les troncs: DOIGNON, 1976. Jardin: LUCAS, 1878a. Jardin, dans un tas de bois: LE PERU, 2004. Maison: DENIS, 1959d, 1960a; LE PERU, 2004; SIMON, 1881a, 1914. Rochers, anfractuosités: LESSERT, 1904. Rochers, dans les fentes: SIMON, 1881a. Sous une pierre: LUCAS, 1868. Sur le mur extérieur d'une maison: LE PERU, 2004. Taillis de chênes blancs: SOYER, 1973. **Période**. — *Mâle*: Mai: LE PERU, 2004. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle*: Avril, mai: LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b, 1959d, 1960a. Août: LUCAS, 1868, 1878a. Septembre: LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1877b. Octobre: LE PERU, 2004.

*Steatoda grossa* (C. L. Koch, 1838)

*S. versuta*; *Teutana g.*

**Répartition**. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973 (*T. g.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*T. g.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: SIMON, 1881a (*T. g.*). Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990b. Finistère: DRESCO, 1957a (*T. g.*). Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*S. v.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924 (*T. g.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*T. g.*). "Seine": DRESCO, 1957a (*T. g.*); PLANET, 1905 (*T. g.*). Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994 (*T. g.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*T. g.*). Var: DENIS, 1934a (*T. g.*), 1935b (*T. g.*), 1937a (*T. g.*); KOVOOR & al., 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941 (*T. g.*), 1962b (*T. g.*), 1962d (*T. g.*), 1963c (*T. g.*), 1964b (*T. g.*), 1966a (*T. g.*). — Toute la France: SIMON, 1914

(*T. g.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Cosmopolite. **Altitude**. Jusqu'à 500 m (SOYER, 1973). **Habitat**. Bâtiment, grenier: DENIS, 1933b, 1934a. Cave: DRESCO, 1957a; PLANET, 1905; SIMON, 1914. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Galerie souterraine: DRESCO, 1957a. Grotte: PLANET, 1905; SIMON, 1914. Jardin: LUCAS, 1882a. Maison: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; BRAUD & al., 2005; CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1962d, 1963c, 1966a. Maisons, caves: SIMON, 1881a. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse, sous des pierres: SOYER, 1973. Plage, sous les amas de varech: BERLAND, 1924. Serre: VEILLON, 1997. Sous une pierre: DENIS, 1934a; DRESCO, 1957a. **Période**. — *Mâle*: Juin: DENIS, 1941, 1966a. Juillet: DENIS, 1962b. Août: LUCAS, 1882a. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle*: Juin: DENIS, 1964b. Juillet: VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1962d.

*Steatoda incomposita* (Denis, 1957)

*S. albocincta* [err.].

**Répartition**. Corse: KNOFLACH, 1996b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a [*S. albocincta*, err. selon LEDOUX, communication personnelle]. — Espagne. Portugal. **Altitude**. De 1100 m jusqu'à 1600 m (KNOFLACH, 1996b). **Habitat**. Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Sous une pierre: KNOFLACH, 1996b. **Période**. — *Femelle*: Septembre: KNOFLACH, 1996b.

*Steatoda italica* Knoflach, 1996

**Répartition**. Corse: KNOFLACH, 1996a. Gard, Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. — Italie. **Habitat**. Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. **Période**. — *Mâle*: Juin: KNOFLACH, 1996a; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*: Juin: LEDOUX & al., 1999a.

*Steatoda nobilis* (Thorell, 1875)

**Répartition**. Corse: CANARD, 1989. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Var: KOVOOR & al., 2000. — Espagne, Grande-Bretagne. Madère, Canaries (Angleterre, introduit). **Habitat**. Bord de rivière, *Populetum albae*; dune: LEDOUX & al., 1999a. Forêt de pins, base d'un tronc: CANARD, 1989. Village, palmiers ou agaves: KOVOOR & al., 2000. **Période**. — *Femelle*: Octobre: CANARD, 1989; LEDOUX & al., 1999a.

*Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1805)

*Lithyphantes paykullianus*.

**Répartition**. Alpes-Maritimes: IORIO, 2003c, 2003d. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973 (*L. p.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. p.*); LUCAS, 1877b. Corse: CANARD, 1989; SCHARFF, 1894 (*L. p.*); SIMON, 1881a (*L. p.*), 1914 (*L. p.*); TIBERGHEN & al., 1993b. Finistère: YSNEL, 1990b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e (*L. p.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: MURPHY, 1994; YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1932c (*L. p.*), 1933b (*L. p.*). Var: DENIS, 1933a (*L. p.*), 1935b (*L. p.*). Vendée: DENIS, 1963c (*L. p.*), 1964b (*L. p.*); DUFFEY, 1964 (*L. p.*). — Midi de la France: SIMON, 1914 (*L. p.*). Espagne, Italie, Suisse. Europe, de la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat**. Ancien verger, dans un terrier; carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Coteau calcaire, talus en bordure de



chemins, entre les pierres ou les racines: IORIO, 2003d. Coteau exposé au soleil, talus en bordure de chemins: IORIO, 2003c. Dune: DUFFEY, 1964. Entrée d'un terrier de lapin: DENIS, 1964b. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lieux arides, sous les pierres: SIMON, 1914. Pentés arides, sous les pierres: SIMON, 1881a. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1933b. Sous une pierre: DENIS, 1933b, 1963c, 1967e; LUCAS, 1878a. Talus, anfractuosités: DENIS, 1933b. Torrent à sec: CANARD, 1990. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Août: VEILLON, 1997. — *Femelle.* Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1964b, 1967e; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1984; VEILLON, 1997. Août: CANARD, 1984; LUCAS, 1878a. Septembre: DENIS, 1963c; LUCAS, 1877b. — *Femelle avec cocon.* Mars: DENIS, 1933b.

*Steatoda phalerata* (Panzer, 1801)

*Asagena p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (A. p.). Ariège: DENIS, 1960a (A. p.), 1961b (A. p.); KNOFLACH, 1996a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983 (A. p.); DENIS, 1954b (A. p.); SOYER, 1953a (A. p.), 1973 (A. p.). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1914 (A. p.). Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; LUCAS, 1871a (A. p.); YSNEL, 1990b. Eure: SIMON, 1909a (A. p.). Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (A. p.); KERVILLE, 1927 (A. p.), 1932 (A. p.). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924 (A. p.); LUCAS, 1878b (A. p.). Marne: LUCAS, 1878a (A. p.). Morbihan: YSNEL, 1990b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (A. p.); DENIS, 1950b (A. p.), 1951c (A. p.), 1953a (A. p.), 1955c (A. p.), 1960a (A. p.); KNOFLACH, 1996a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (A. p.), 1959d (A. p.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (A. p.), 1952c (A. p.), 1961b (A. p.); KNOFLACH, 1996a; LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (A. p.); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (A. p.). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (A. p.), 1910 (A. p.). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (A. p.). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (A. p.). Somme: ROSELLE, 1888b (A. p.). Var: DENIS, 1935b (A. p.), 1936 (A. p.). Vendée: DENIS, 1962b (A. p.), 1963c (A. p.). Yonne: LUCAS, 1872 (A. p.). — Toute la France: SIMON, 1914 (A. p.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2230 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de mer, rochers: CANARD, 1989. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: ROSELLE, 1888b. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1951c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1881a. Jardin, sur un mur ou sur sol sablonneux: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lieu aride et sablonneux: LUCAS, 1878b. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse: BERLAND, 1924; SOYER, 1953a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Pelouse, sous des

pierres: DENIS, 1959d. Pelouses à asphodèles: SOYER, 1973. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sol très humide, sous une pierre: DENIS, 1959d. Sous des grands rochers: BOSMANS & al., 1985a. Sous une pierre: DENIS, 1963c; KERVILLE, 1927; SIMON, 1914. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1935b. Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1955c; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LUCAS, 1878b. Septembre: KNOFLACH, 1996a. Novembre: CANARD, 1984. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: CANARD, 1984. Juin: DENIS, 1935b; LESSERT, 1904. Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b. Août: LUCAS, 1878a. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1951c. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b, 1960a, 1963c.

*Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802)

*Teutana t.*; *Theridion trianguliferum.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*Teutana t.*). Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985 (*Teutana t.*). Ardèche: BALAZUC & al., 1952 (*Teutana t.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*Teutana t.*); SOYER, 1973 (*Teutana t.*). Calvados: LUCAS, 1874c (*Theridion t.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989. Gard: EMERIT & al., 1994 (*Teutana t.*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*Theridion t.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: LUCAS, 1878a. Nord: GOULLIART, 1979b (*Teutana t.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*Teutana t.*), 1953b (*Teutana t.*), 1967d (*Teutana t.*); LEDOUX & al., 1996a. "Seine": LUCAS, 1876. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*Teutana t.*). Somme: ROSELLE, 1888a (*Teutana t.*). Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a (*Teutana t.*), 1934a (*Teutana t.*), 1935a (*Teutana t.*), 1935b (*Teutana t.*), 1936 (*Teutana t.*), 1937a (*Teutana t.*). Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992 (*Teutana t.*). Vendée: DENIS, 1962b (*Teutana t.*). — Toute la France: SIMON, 1914 (*Teutana t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1876. Bord de fontaine: CHANSIGAUD, 1992. Bâtiment: GOULLIART, 1979b. Dune: DENIS, 1962b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Fiches, sous les pierres [dans le midi]: SIMON, 1914. Garrigue: DENIS, 1953b. Grenier: ROSELLE, 1888a. Grotte: BALAZUC & al., 1952. Littoral, *Crithmo-stacion*, cavités des rochers: SOYER, 1973. Maison: BRAUD & al., 2005; CANARD, 1989; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1874c, 1878a, 1882a; SIMON, 1881a, 1914. Marécage: BELIN, 2001. Marécage salé: BIGOT, 1965. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Murs et tamaris: EMERIT & al., 1994. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Sous une pierre: DENIS, 1933b, 1934a; SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Septembre: MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1935a. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b, 1967d. Août: DENIS, 1962b; LUCAS, 1878a, 1882a. Septembre: CANARD, 1989; MÜLLER, 1985. Octobre: LUCAS, 1876. Novembre: DENIS, 1953b. Décembre: DENIS, 1933b.

*Theonoe minutissima* (O. P.-Cambridge, 1879)*T. foliola*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1881a (*T. f.*), 1926. Ariège: DENIS, 1960a, 1967d; SIMON, 1926. Aube: SIMON, 1881a (*T. f.*), 1926. Finistère: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984. Landes: SIMON, 1926. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1967d. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*T. f.*). Vaucluse: LEDOUX, 1972. Vienne (Haute-): SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Europe, Russie, Ukraine. **Habitat.** Bois: SIMON, 1881a. Bord de rivière, forêt: LEDOUX, 1972. Forêt: DENIS, 1960a. Forêt, mousses: SIMON, 1926. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Lande: CANARD, 1984. Mousses: DENIS, 1967d. Mousses très humides: DENIS, 1955c. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1960a. Mai: DENIS, 1960a, 1967d. Juin, novembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Février: DENIS, 1960a. Mars, mai, juin: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1955c. Novembre: DENIS, 1967d.

*Theridion bellicosum* (Simon, 1873)

*Enoplognatha bellicosa*; *Rugathodes bellicosus*; *T. instabile bellicosum*.

**Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Orne: YSNEL, 1990b. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1914 (*T. i. b.*). Vendée: DENIS, 1962d (*E. b.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*R. b.*). Europe, Russie (*R. b.*). **Habitat.** Blocs de pierres: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de pins: DENIS, 1962d. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon*. Août: DENIS, 1962d.

*Theridion betteni* Wiehle, 1960

**Répartition.** Ardèche: LEDOUX, 1979. Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. — Allemagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** De 650 m (LEDOUX, 1979) jusqu'à 900 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Éboulis, sous les rochers: LEDOUX, 1979. Mur: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle*. Juillet: LEDOUX, 1979; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a.

*Theridion bimaculatum* (Linnaeus, 1767)*Neottiura bimaculata*; *Neottiura b.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; KNOFLACH, 1999 (*N. bimaculata*); SIMON, 1881a, 1914. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003 (*N. bimaculata*); LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; DENIS, 1940a; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002 (*N. bimaculata*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*N. bimaculata*); VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1951c. Pyrénées-Atlan-

tiques: DENIS, 1959a, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003 (*N. bimaculata*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*N. bimaculata*); MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: KOVOOR & al., 2000 (*N. bimaculata*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b (*N. b.*), 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*N. b.*); *N. bimaculata*). Holarctique (*N. bimaculata*). **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1941. Bois de chênes; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois humides: SIMON, 1881a. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de rivière: KNOFLACH, 1999. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1984, 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1941, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt de pins: DENIS, 1951c, 1962b, 1965c. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Friche: KNOFLACH, 1999; LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Grotte: DENIS, 1959a. Herbes humides: DENIS, 1941. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888b. Plage, oyats: DENIS, 1964b. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2002; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1881a. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: LUCAS, 1878b. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous une feuille: CANARD, 1989. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1965c. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; KNOFLACH, 1999; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1984. — *Femelle*. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1959a. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; KNOFLACH, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1963c, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: CANARD, 1984; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1878b. Septembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 2002. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1959d, 1964b.

*Theridion blackwalli* O. P.-Cambridge, 1871

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1887b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a. Ardennes: LENICE, 1992. Aube: SIMON, 1881a. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1881a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; YSNEL, 1990b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: YSNEL, 1990b. Oise, Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1881a. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne,

Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie, Ukraine, Afrique du Nord. **Habitat.** Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Jardin: LENICE, 1992.

*Theridion boesenbergi* Strand, 1904

**Répartition.** Savoie (Haute-): SIMON, 1914. — Allemagne, Suisse. Europe, Russie, Ukraine. **Altitude.** 1800 m (SIMON, 1914). **Habitat.** Épicéa: SIMON, 1914.

*Theridion conigerum* Simon, 1914

*Euryopsis pyramidalis*; *Lasaeola pyramidalis*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1881a (*L. p.*), 1914. Ariège: KNOFLACH, 1993a. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1879 (*E. p.*), 1881a (*L. p.*), 1914. — Allemagne. Europe. **Altitude.** 700 m (KNOFLACH, 1993a). **Habitat.** Bois de châtaigniers, sous une pierre: SIMON, 1879. Buissons: SIMON, 1914. Lande: KNOFLACH, 1993a. **Période.** — *Femelle.* Juin: KNOFLACH, 1993a.

*Theridion crinigerum* Simon, 1881

**Répartition.** Corse: SIMON, 1881a, 1914. — Italie. Algérie, Maroc. **Habitat.** Marécage: SIMON, 1881a, 1914.

*Theridion curvimanum* Simon, 1914

*Neottiura curvimana*; *T. curvimanus*.

**Répartition.** Gard: LEDOUX & al., 1996a. Landes: KNOFLACH, 1999 (*N. c.*); SIMON, 1914 (*T. c.*). Pyrénées-Orientales: KNOFLACH, 1999 (*N. c.*); LEDOUX & al., 1996a, 2003 (*N. c.*). — Espagne (*N. c.*). Algérie (*N. c.*). **Altitude.** Jusqu'à 1050 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de chênes-lièges, herbes: SIMON, 1914. Lande à genêts; pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a.

*Theridion dromedarius* (Simon, 1880)

*Paidiscura d.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: KNOFLACH & al., 2000 (*P. d.*). — Espagne (*P. d.*). Afrique du Nord à Moyen-Orient, Îles du Cap-Vert (*P. d.*).

*Theridion familiare* O. P.-Cambridge, 1871

**Répartition.** Aube: SIMON, 1881a. Lozère: DENIS, 1965c. Morbihan: YSNEL, 1990b. Oise, Somme: SIMON, 1881a. Vendée: DENIS, 1965c. [Citation de Lozère par DENIS, 1965c d'après la collection SIMON]. — Nord et centre de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Maison: DENIS, 1965c; SIMON, 1881a, 1914. **Période.** — *Femelle.* Mars: DENIS, 1965c.

*Theridion furfuraceum* Simon, 1914

[SIMON, 1914 indique qu'il confondait autrefois cette espèce avec *T. varians* Hahn, cette confusion ne concernant que les mâles]. **Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. [SIMON, 1914 indique «Toute la France», comme pour *T. varians*]. — Italie. Algérie, Syrie. **Habitat.** Éboulis: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c.

*Theridion genistae* Simon, 1873

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1973. Corse: SIMON, 1881a, 1914. Var: BECKER, 1880; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; SIMON, 1881a, 1914. — Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée à Ouzbékistan. **Habitat.** Ajoncs, genêts et bruyères; forêt: SIMON, 1914. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Garrigue: SOYER, 1973. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Littoral, *Crithmo-staticion*: SOYER, 1973. *Ulex*, genêts épineux et bruyères: SIMON, 1881a.

*Theridion gentile* Simon, 1881

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1881a, 1914. — Italie. Algérie.

*Theridion glaucinum* Simon, 1881

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Isère: SIMON, 1881a, 1914. — Connue seulement de France.

*Theridion hannoniae* Denis, 1944

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône: BOSMANS & al., 1994. Nord: DENIS, 1944a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Europe, Afrique du Nord, Madère, Canaries. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Éboulis: LEDOUX & al., 1996a. Terril envahi par une végétation rudérale, sous des pierres: DENIS, 1944a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1944a; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Avril: BOSMANS & al., 1994. Juillet: DENIS, 1944a; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 1996a.

*Theridion hemerobius* Simon, 1914

*T. hemerobium*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BOSMANS & al., 1994; SOYER, 1973 (*T. h.*). Corse, Gironde, Landes: SIMON, 1914. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b (*T. h.*). Loire-Atlantique: BOSMANS & al., 1994. Loiret: LEDOUX & al., 2002 (*T. h.*). Marne: BOSMANS & al., 1994. Morbihan: BOSMANS & al., 1994; MURPHY, 1994. Nord, Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999 (*T. h.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*T. h.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. USA, Canada, Europe (*T. h.*). **Habitat.** Bois de chênes, écorces: SOYER, 1973. Bord de l'eau, ponts; bord de rivière: BOSMANS & al., 1994. Forêt de pins: SIMON, 1914. Marais salant; mare: BOSMANS & al., 1994. Marécage: BOSMANS & al., 1994; EMERIT & al., 1999. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: BOSMANS & al., 1994. Juin: BOSMANS & al., 1994; EMERIT & al., 1999. — *Femelle.* Mai: BOSMANS & al., 1994. Juin: BOSMANS & al., 1994; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002.

*Theridion herbigrada* (Simon, 1873)

*Neottiura h.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: KNOFLACH, 1999 (*N. h.*); SIMON, 1914. Corse: KNOFLACH, 1999 (*N. h.*); SIMON, 1881a, 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. — Italie (*N. h.*). De Madère à Israël, Chine

(*N. h.*) **Habitat.** Herbes sèches sous les oliviers: SIMON, 1881a, 1914. Sur un châtaignier: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b.

*Theridion impressum* L. Koch, 1881

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Finistère: DENIS, 1938a. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1960a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; MULLER & al., 1895. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984. Var: BIGOT & al., 1987a; KOVOOR & al., 2000. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins: MÜLLER, 1985. Friche: VEILLON, 1997. Lieux assez humides: SOYER, 1973. Prairie; prairie tourbeuse; rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1933b, 1938a; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1960a; MÜLLER, 1985. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: MÜLLER, 1985. Août: LEDOUX & al., 1996b.

*Theridion instabile* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Rugathodes instabilis.*; *T. lepidum.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1914. Cher: DENIS, 1943b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; SIMON, 1914. Manche, Morbihan: YSNEL, 1990b. Nord: DENIS, 1934c, 1943a, 1963b. Oise: SIMON, 1881a (*T. l.*), 1914. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a (*T. l.*), 1914. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*R. i.*). Seine-Maritime, Seine-et-Marne: SIMON, 1914. Somme: SIMON, 1881a (*T. l.*), 1914. Vendée: DENIS, 1941. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*R. i.*). Europe, Russie, Ukraine (*R. i.*). **Habitat.** Bois: SIMON, 1914. Bord d'étang, roseaux: DENIS, 1943a. Bord de rivière, bois de hêtres et chênes: EMERIT & al., 1997. Bord marécageux de rivière: SIMON, 1914. Bruyères: DENIS, 1941. Forêt: DENIS, 1963b. Friche: PASQUET & al., 1992. Marais, roseaux: DENIS, 1943b. Marécage: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 1999, 2003; HENRY, 1981; SIMON, 1914. Roseaux: SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1943a. Juin: DENIS, 1963b; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1881a. Août: SIMON, 1881a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1943a. Juin: DENIS, 1943b; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1881a. Août: DENIS, 1934c; SIMON, 1881a. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: DENIS, 1934c. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941.

*Theridion melanurum* Hahn, 1831

*T. denticulatum.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973 (*T. d.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*T. d.*); LUCAS, 1877b (*T. d.*). Corrèze: JUBERTHIE, 1954 (*T. d.*); LE PERU, 2004.

Corse: SIMON, 1881a (*T. d.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*T. d.*); LUCAS, 1871a (*T. d.*); YSNEL, 1990b (*T. d.*). Eure: SIMON, 1909a (*T. d.*). Hérault: EMERIT & al., 1985 (*T. d.*); LEDOUX, 1979 (*T. d.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; MARC, 1990b (*T. d.*); YSNEL, 1990b (*T. d.*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*T. d.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: KERVILLE, 1900 (*T. d.*). Morbihan: YSNEL, 1990b (*T. d.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*T. d.*), 1953a (*T. d.*), 1955c (*T. d.*), 1960a (*T. d.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*T. d.*), 1952c (*T. d.*). Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*T. d.*); REIBER, 1880 (*T. d.*). Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*T. d.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*T. d.*). Var: DENIS, 1934a (*T. d.*), 1937a (*T. d.*); KOVOOR & al., 2000; LEDOUX, 1979 (*T. d.*). Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992 (*T. d.*); CORNIC, 1978 (*T. d.*). Vendée: CLARK & al., 1970 (*T. d.*); DENIS, 1941 (*T. d.*), 1962b (*T. d.*), 1964b (*T. d.*), 1965c (*T. d.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*T. d.*). — Toute la France: SIMON, 1914 (*T. d.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique, Açores. **Altitude.** Jusqu'à 2130 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Blocs de rochers: DENIS, 1952c, 1953a. Bord de mer: KERVILLE, 1900. Bord de route, creux des rochers: DENIS, 1955c. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bâtiment: DENIS, 1933b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Dune: DENIS, 1941. Dune, chênes-verts: DENIS, 1962b. Éboulis: DENIS, 1953a. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Garrigue: SOYER, 1973. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1973. Maison: CHANSIGAUD, 1992; LANCELEVÉE, 1884. Mur extérieur d'une maison: LE PERU, 2004. Murailles, angles: SIMON, 1881a. Murs: SIMON, 1914. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1950b; SIMON, 1881a, 1914. Sous les corniches: SIMON, 1881a. Sous les pierres en haute montagne: SIMON, 1914. Sur le houx: JUBERTHIE, 1954. Sur un mur: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; DENIS, 1962b, 1964b. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1973. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1934a, 1965c; LE PERU, 2004. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1941, 1964b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1934a, 1965c; LE PERU, 2004. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b, 1955c. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LUCAS, 1882a. Septembre: CLARK & al., 1970; LUCAS, 1877b.

*Theridion musivum* Simon, 1873

*Paidiscura musiva.*

**Taxonomie.** L'espèce *T. musivum* a été transférée dans le genre *Paidiscura* par WUNDERLICH, 1987, puis replacée dans le genre *Theridion* par KNOFLACH & al., 2000. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1881a. Corse: SIMON, 1881a, 1914. Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1881a. — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie (*P. m.*). Méditerranée. **Habitat.** Buissons: SIMON, 1914. Herbes sèches; *Posidonia* secs: DENIS, 1934a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a.

*Theridion mystaceum* L. Koch, 1870

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ardèche: LEDOUX, 1979. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Gard: LEDOUX, 1979. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; MARC, 1990b; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; LEDOUX, 1979. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de chênes; bois de hêtres, éboulis: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Friche: MURPHY, 1994. Genêts: LEDOUX, 1979. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin, dans un tas de bois: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Mur extérieur d'une maison: LE PERU, 2004. *Quercetum ilicis*: LEDOUX, 1979. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Sur un mur: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. Sur un platane: CHANSIGAUD, 1992. **Période.** — *Mâle.* Avril: CANARD, 1984. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 1979. Juin: CANARD, 1984; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle.* Mai: CANARD, 1984; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1979. Juin: CANARD, 1984; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1979; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Juillet: CANARD, 1984; LEDOUX & al., 1996a. Août: CANARD, 1984; LEDOUX, 1979; LEDOUX & al., 2003. Septembre: CANARD, 1984.

*Theridion nigropunctatum* Lucas, 1846

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a, 1914. Gironde: SIMON, 1881a, 1914. Landes, Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b. Var: BECKER, 1880; SIMON, 1881a, 1914. — Espagne, Italie, Méditerranée. **Habitat.** Arbustes: CANARD, 1989. Buissons; forêt; hautes herbes: SIMON, 1914. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle.* Avril, juin: DENIS, 1933b.

*Theridion nigrovariegatum* Simon, 1873

**Répartition.** Ariège: SIMON, 1914. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1914. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers: SIMON, 1881a, 1914. Lozère: DENIS, 1939b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1881a, 1914. Rhône: SIMON, 1914. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1914. Var: DENIS, 1937a. Vaucluse: SIMON, 1881a, 1914. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Buissons: SIMON, 1914. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003.

Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1939b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1939b; LEDOUX & al., 2003. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1939b; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: EMERIT & al., 1997.

*Theridion pallens* (Blackwall, 1834)*Paidiscura p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1881a, 1914. Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909a. Finistère: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*P. p.*). Morbihan, Orne: YSNEL, 1990b. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: DENIS, 1933a; KOVOOR & al., 2000; MÜLLER, 1985. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*P. p.*). Europe, Russie (*P. p.*). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1941. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Chênes-verts: SIMON, 1881a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1941. Forêt de chênes: LE PERU, 2004. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1964b, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b, 1963c. Forêt de pins, mousses sèches: MÜLLER, 1985. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Marécage: EMERIT & al., 2003. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1933b; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1962b, 1964b. — *Femelle.* Janvier, mars: CANARD, 1984. Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1965c; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1941, 1962b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1963c. Août: DENIS, 1962b, 1963c; LEDOUX & al., 2003. Septembre: EMERIT & al., 1997; MÜLLER, 1985. Octobre, novembre: CANARD, 1984. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1962b.

*Theridion petraeum* L. Koch, 1872

[Cette espèce a été confondue avec *T. wiehlei* jusqu'en 1938, selon DENIS, 1944a]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1881a. Ardèche: SIMON, 1881a, 1914. Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1881a. Corse: SIMON, 1881a, 1914. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: SIMON, 1881a. [La citation des Pyrénées-Orientales par DENIS, 1933b est erronée selon DENIS, 1943c, et se

rapporte à *T. wiehlei*]. — Alpes du Dauphiné et de la Provence; Midi jusque dans l'Ardèche: SIMON, 1914. Espagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Lieux sablonneux: SIMON, 1914. Lieux sablonneux, sous les plantes basses et les pierres: SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle.* Juin, octobre: SIMON, 1881a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin, octobre: SIMON, 1881a.

*Theridion pictum* (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Eure: SIMON, 1909a. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895; SCHALLER, 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Dune, oyats: DENIS, 1964b. Forêt, buissons et arbres: SIMON, 1914. Forêts épaisses: SIMON, 1881a. Friche: PASQUET & al., 1992. Marécage: EMERIT & al., 1999; HENRY, 1981; VILLEPOUX, 1990b. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1881a. Juin: DENIS, 1933b, 1964b; SIMON, 1881a. Juillet: SIMON, 1881a. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1881a. Juin: CORNIC, 1978; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1881a. Juillet: SIMON, 1881a.

*Theridion pinastri* L. Koch, 1872

**Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers: SIMON, 1881a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: YSNEL, 1990b. Nord: DENIS, 1961a. Orne: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Var: SIMON, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1881a. Vosges: SIMON, 1881a. — Est, centre et Midi de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Conifères: SIMON, 1881a, 1914. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande: CANARD, 1984. Lisière de forêt: DENIS, 1961a. Marécage: MURPHY, 1994. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1961a; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1881a. Juillet: SIMON, 1881a. — *Femelle.* Juin: LEDOUX, 2000; SIMON, 1881a. Juillet: SIMON, 1881a.

*Theridion pinicola* Simon, 1873

**Répartition.** Corse: SIMON, 1881a, 1914. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Pins: SIMON, 1881a. *Pinus laricio*: SIMON, 1914.

*Theridion semitinctum* Simon, 1914

[Mâle inconnu]. **Répartition.** [Aucune localité précisée]. — Provence: SIMON, 1914. Espagne. Baléares.

*Theridion simile* C. L. Koch, 1836

*Simitidion* s.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: BIGOT

& al., 1973; SOYER, 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Eure: SIMON, 1899, 1909a. Finistère: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1982b, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (S. s.); VEILLON, 1997. Morbihan: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: BECKER, 1880, 1882; BIGOT & al., 1987a; DENIS, 1934a, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (S. s.). Holarctique (S. s.). **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1875. Bruyères: SIMON, 1881a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Friche: SIMON, 1881a; VEILLON, 1997. Garrigue: SOYER, 1973. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Genêts et bruyères: SIMON, 1914. Lande: CANARD, 1982b, 1984, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1973. **Période.** — *Mâle.* Avril: CANARD, 1984; DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1934a. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1938a. Juillet, août, octobre: CANARD, 1984. — *Femelle.* Mai: CANARD, 1984; DENIS, 1933b, 1934a. Juin: CANARD, 1984; CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1999. Juillet: CANARD, 1984. Août: CANARD, 1984, 1989. Septembre: LUCAS, 1875.

*Theridion sisyphium* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Aude: DENIS, 1961b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; LUCAS, 1870e. Corréze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1881a, 1914. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: YSNEL, 1990b. Nord: DENIS, 1952b. Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1910. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887. Var: DENIS, 1933a. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vienne: DURE-

PAIRE & *al.*, 1994. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2150 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996c. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a. Buis: DENIS, 1959d. Bâtiment: DENIS, 1954a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1952b, 1961b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt de mélèzes: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de pins: DENIS, 1951c. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Friche buissonneuse: ASSELIN & *al.*, 1989. Genévriers: DENIS, 1950b. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1984. Lande humide: DUREPAIRE & *al.*, 1994. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Lisière de forêt: ROSELLE, 1887. Noisetiers: DENIS, 1954a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996c. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie tourbeuse: LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhododendrons: DENIS, 1954a; LEDOUX & *al.*, 1996b. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. Sur les pins: DENIS, 1950b. Sur un genévrier: DENIS, 1957a. Tourbière: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1933b, 1938a; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a; LEDOUX & *al.*, 1996c. Août: LEDOUX & *al.*, 2003; LUCAS, 1878a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1957a, 1960a, 1961b; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996c. Août: DENIS, 1952c; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c, 2003; LUCAS, 1870e, 1878a. Septembre: DENIS, 1951c; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1952c, 1954a, 1955c, 1959d, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1952c, 1953a. — *Femelle avec ses jeunes.* Juillet: DENIS, 1960a.

#### *Theridion suaveolens* Simon, 1879

##### *Neottiura s.*

**Répartition.** Dordogne: KNOFLACH, 1999 (*N. s.*). Gironde: SIMON, 1879, 1881a, 1914. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Landes: SIMON, 1914. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002 (*N. s.*). Morbihan: YSNEL, 1990b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; SIMON, 1879, 1881a, 1914. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse (*N. s.*). Europe, Russie (*N. s.*). **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bois, clairière: SIMON, 1879, 1881a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989, 1991. Forêt: SIMON, 1914. Fougères sèches ou genêts secs: DENIS, 1933b. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Marais salant: MURPHY, 1994. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & *al.*, 1996a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002. Rochers, sur une toile de *Steatoda*: LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: CANARD, 1984. — *Femelle.* Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a,

2002. Juillet: CANARD, 1984; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: CANARD, 1984; LEDOUX, 1993. — *Femelle avec cocon.* Juin: LEDOUX & *al.*, 2002.

#### *Theridion tinctum* (Walckenaer, 1802)

##### *Keijia tinctoria.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1973; DENIS, 1954b; SOYER, 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a, 1914. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a. Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; EMERIT & *al.*, 1994. Hérault: EMERIT & *al.*, 1990. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1984, 1990c; MARC, 1990b; YSNEL, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Manche: BERLAND, 1924. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): MULLER & *al.*, 1895. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: BECKER, 1880, 1882; BIGOT, 1993; BIGOT & *al.*, 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1933a, 1934a, 1937a; KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique (*K. t.*). **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Bois: DENIS, 1941; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & *al.*, 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, pins: SIMON, 1881a. Bruyères: DENIS, 1934a. Buissons: CANARD, 1989. Bétulaie, branches: EMERIT & *al.*, 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1963c. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & *al.*, 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Fougères: LEDOUX & *al.*, 1996a. Garrigue calcaire: EMERIT & *al.*, 1990. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & *al.*, 1973. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LUCAS, 1878a. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & *al.*, 1994. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Marécage: EMERIT & *al.*, 1999; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: BERLAND, 1924. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. Taillis de chênes: SOYER, 1973. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1934a, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1938a, 1964b; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2002. Juillet: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 2003. Août: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Avril: LEDOUX



& al., 2003. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: CANARD, 1984; DENIS, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1938a. Août: LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1878a. Septembre: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LUCAS, 1875. Octobre: DENIS, 1963c.

*Theridion uncinatum* Lucas, 1846

*Neottiura uncinata*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1973. Corse: KNOFLACH, 1999 (*N. u.*); SIMON, 1881a, 1914; TIBERGHEN & al., 1993a. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000 (*N. u.*). — Espagne, Italie (*N. u.*). Méditerranée (*N. u.*). **Habitat.** Dune: TIBERGHEN & al., 1993a. Herbes sèches: DENIS, 1934a; SIMON, 1914. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1973. Prairie: SIMON, 1881a. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1934a.

*Theridion varians* Hahn, 1831

*T. rusticum*.

[SIMON, 1914 indique qu'il confondait autrefois *T. furfuraceum* Hahn avec cette espèce, cette confusion ne concernant que les mâles]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Alpes-Maritimes: SIMON, 1881a (*T. r.*). Ariège: DENIS, 1960a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; LUCAS, 1874c. Charente-Maritime: SIMON, 1881a (*T. r.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1881a, 1881a (*T. r.*), 1914. Côtes-d'Armor: CANARD, 1984; DENIS, 1938a; YSNEL, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Finistère: DENIS, 1938a. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Gers, Gironde: SIMON, 1881a (*T. r.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1984, 1990c; YSNEL, 1990b. Isère: SIMON, 1881a (*T. r.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b; SIMON, 1881a (*T. r.*). Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot: SIMON, 1881a (*T. r.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: DENIS, 1938a; SIMON, 1881a (*T. r.*); YSNEL, 1990b. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: YSNEL, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1953b, 1967d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1952c, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1881a (*T. r.*), 1914. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888a. Var: DENIS, 1933a, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1881a (*T. r.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1881a (*T. r.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2170 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996c. Bois: DENIS, 1952c. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de chênes; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de route, herbes et fougères: BOSMANS & al., 1985a. Buissons: SIMON, 1914. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Coteau cal-

caire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: DENIS, 1938a; ROSELLE, 1888a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de pins: DENIS, 1963c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, éboulis: DENIS, 1950b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Forêt, chênes: DENIS, 1964b. Friche: VEILLON, 1997. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Grotte: DENIS, 1967d. Haie: BRAUD & al., 2005; LE PERU, 2004; SIMON, 1881a. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1984, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & al., 1999; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1950b. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Verger: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Juin: CANARD, 1984; CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1950b, 1952c, 1964b. — *Femelle*. Mai: CANARD, 1984; LE PERU, 2004. Juin: CANARD, 1984; CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: CANARD, 1984; DENIS, 1950b, 1961b, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1996c, 2003. Août: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2003. Septembre: DENIS, 1953b, 1962b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b, 1964b.

*Theridion wiehlei* Schenkel, 1938

*T. petraeum* [err.].

[Cette espèce a été confondue avec *T. petraeum* jusqu'en 1938, selon DENIS, 1944a]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b [*T. petraeum*, err. selon DENIS, 1943c]. — Allemagne, Espagne, Suisse. Algérie. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1933b.

*Theridula opulenta* (Walckenaer, 1842)

*Theridion gonygaster*.

[Certains auteurs séparent *Theridula gonygaster* (Simon, 1873) et *T. opulenta* en deux espèces, mais SIMON, 1914, les considère synonymes]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*T. g.*); SIMON, 1881a (*T. g.*). Corse: SIMON, 1881a (*T. g.*), 1914. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a (*T. g.*). — Midi de la France: SIMON, 1914. Cosmopolite. **Habitat.** Buissons: SIMON, 1914. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882.

Theridiosomatidae

*Theridiosoma gemmosum* (L. Koch, 1878)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Charente: SIMON, 1926. Corse: SIMON, 1881a, 1926. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990a. Dordogne: SIMON, 1926. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Gironde: SIMON, 1881a. Landes: SIMON, 1926. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: SIMON, 1926. Oise: SIMON, 1881a, 1926. Orne: SIMON, 1881a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881a, 1926. Rhin (Bas-): LEBOR-



GNE & al., 1998. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. "Seine" : ROLLARD, 2000 ; SIMON, 1881a, 1926. Seine-et-Marne : SIMON, 1926. Vienne (Haute-) : SIMON, 1881a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Amérique du Nord, Europe jusqu'à la Géorgie. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois de hêtres, éboulis : EMERIT & al., 1997. Bois humides : SIMON, 1926. Bord d'étang : DENIS, 1938a. Bord de l'eau, plantes aquatiques : SIMON, 1881a. Bord de rivière, bois de hêtres et chênes : EMERIT & al., 1997. Bétulaie : EMERIT & al., 2003. Forêt, près des mares : SIMON, 1926. Marécage : EMERIT & al., 1999, 2003 ; SIMON, 1926 ; VILLEPOUX, 1990b. Pâturage : LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve : LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Juin : DENIS, 1938a ; EMERIT & al., 1997 ; SIMON, 1881a. — *Femelle.* Mai : EMERIT & al., 2003. Juin : DENIS, 1938a ; EMERIT & al., 1997, 1999 ; LEDOUX & al., 2002.

## MYSMENIDAE

*Cepheia longiseta* (Simon, 1881)

*Theonoe l.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c ; SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; SIMON, 1926. Var : SIMON, 1881a (*T. l.*), 1926. — Italie. Europe du Sud. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre ; dune : DENIS, 1950c. Forêt : SIMON, 1881a. Herbes sèches : SIMON, 1926. **Période.** — *Femelle.* Mai : DENIS, 1950c. Décembre : DENIS, 1933b.

*Mysmena leucoplagiata* (Simon, 1879)

*Dipoena l.* ; *Theridion leucoplagiatum.*

**Répartition.** Corse : SIMON, 1926. Morbihan : YSNEL, 1990b. Var : SIMON, 1898c. — Région méditerranéenne : SIMON, 1926. Espagne, Italie. Europe du Sud. **Habitat.** Bois de chênes et de châtaigniers : SIMON, 1881a. Bois de chênes et de châtaigniers, sous les pierres et les fagots : SIMON, 1879 (*T. l.*). Bois de chênes, de châtaigniers et de conifères, sous les pierres et dans les détritux végétaux secs : SIMON, 1926. Fagots ; sous une pierre : SIMON, 1881a (*D. l.*).

*Mysmenella jobi* (Krauss, 1967)

*Mysmena j.*

**Répartition.** Doubs : EMERIT & al., 1997 (*M. j.*). Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1999a (*M. j.*). Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. [Citée de France méridionale par KRAUSS, 1967]. — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne : EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, *Populetum albae* : LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Femelle.* Septembre : EMERIT & al., 1997. — *Femelle avec cocon.* Juin : LEDOUX & al., 1999a.

*Trogloneta granulum* Simon, 1922

**Répartition.** Ardèche : FAGE, 1931. Lot : FAGE, 1931 ; SIMON, 1922, 1926. — Allemagne. Europe. **Habitat.** Grotte : FAGE, 1931 ; SIMON, 1922, 1926.

## LINYPHIIDAE

Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'espèces du genre *Lepthyphantes* ont été transférées dans d'autres

genres, ceux-ci souvent nouvellement créés. Concernant la faune française, la listes des espèces transférées est la suivante, d'après PLATNICK, 2004 :

*Agyphantes* : *expunctus* ;  
*Anguliphantes* : *angulipalpis*, *monticola* ;  
*Bolyphantes* : *zonatus* ;  
*Canariphantes* : *homonymus* ;  
*Improphantes* : *complicatus*, *decolor*, *improbulus*, *nitidus* ;  
*Incestophantes* : *frigidus* ;  
*Mansuphantes* : *fragilis*, *gladiola*, *mansuetus*, *pseudocarciger*, *simoni* ;  
*Megalepthyphantes* : *collinus*, *nebulosus* ;  
*Midia* : *midas* ;  
*Mughiphantes* : *arlandi*, *aurantiipes*, *ignavus*, *johannislupi*, *jugorum*, *mughi*, *pulcher*, *pyrenaeus*, *variabilis* ;  
*Obscuriphantes* : *obscurus* ;  
*Oryphantes* : *angulatus* ;  
*Pallidiphantes* : *alutacius*, *angustiformis*, *arenicola*, *cebennicus*, *ceretanus*, *cernuus*, *culicinus*, *dentatidens*, *ericaeus*, *fagicola*, *insignis*, *liguricus*, *longiseta*, *margaritae*, *oredonensis*, *pallidus*, *sanctivincenti*, *stygius* ;  
*Piniphantes* : *cirratus*, *pinicola* ;  
*Tenuiphantes* : *alacris*, *cristatus*, *flavipes*, *herbicola*, *mengeri*, *monachus*, *spiniger*, *tenebricola*, *tenuis*, *zimmernanni*.

Ces nouvelles dénominations ont été très peu utilisées à ce jour. Toutes ces espèces sont maintenues ici dans le genre *Lepthyphantes*.

Trois espèces du genre *Trichopterna* (*T. justa*, *T. nigrocaerulea*, *T. turrigera*) ont été transférées dans le genre *Erigonoplus* par MILLIDGE, 1975c ; ces espèces avaient déjà été citées sous le genre *Erigonoplus* par SIMON, 1884b. Ce transfert est adopté ici.

Les espèces suivantes, mentionnées dans le catalogue de CANARD & al., 1997, sont exclues de la liste : *Linyphia delicatula* Walckenaer, 1841 et *L. lugubris* Walckenaer, 1841, notées « nicht zu deuten ! » par ROEWER, 1954 et considérées *nomina dubia* par PLATNICK, 2004. *Meioneta arietans* (O. P.-Cambridge, 1872) figure dans le catalogue de CANARD & al., 1997 avec une référence à SIMON, 1929, mais cet auteur indique, sous *Ischnyphantes* (= *Meioneta*) *a.* : « espèce jusqu'ici étrangère à la France ». Les espèces *Hilaira montigena* (L. Koch, 1872), *Panamomops tauricornis* (Simon, 1881) et *Pelecopsis eminula* (Simon, 1926) sont de même étrangères à la France.

*Abacoproeces saltuum* (L. Koch, 1872)

**Répartition.** Ain : SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt : SIMON, 1926.

*Acartauchenius depressifrons* Simon, 1884

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1884b, 1926. — Espagne.

*Acartauchenius scurrilis* (O. P.-Cambridge, 1872)

**Répartition.** Isère : SIMON, 1884b, 1926. Morbihan : CANARD, 1990a. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; LEDOUX & al., 1995. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910 ; SIMON, 1926. Seine, Somme : SIMON, 1884b, 1926. Vaucluse : SIMON, 1926. Vendée : DENIS, 1963c, 1964b.

— Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (SIMON, 1926). **Habitat.** Bord de rivière; dune: SIMON, 1926. Dune, sous une pierre recouvrant une fourmilière: DENIS, 1964b. Forêt à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Lieux sablonneux et secs: SIMON, 1884b. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Sous une pierre: DENIS, 1963c. Terrains sableux, sous les pierres: SIMON, 1926. Vigne abandonnée, *Helichrysum*: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1933b. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1964b. Octobre: DENIS, 1963c.

*Agnyphantas* (voir *Lepthyphantas*)

*Agyneta cauta* (O. P.-Cambridge, 1902)

**Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt, au sol; rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet, août: LEDOUX & al., 1996c.

*Agyneta conigera* (O. P.-Cambridge, 1863)

*Microneta c.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1884b (*M. c.*), 1929. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Corse: SIMON, 1929. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gard, Lozère: SIMON, 1929. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: ASSELIN, 1990. Oise: SIMON, 1884b (*M. c.*), 1929. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884b (*M. c.*), 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": SIMON, 1884b (*M. c.*), 1929. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, Congo. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, mousses et buissons, sur les *Ulex* et *Juniperus*: SIMON, 1929. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Mousses: GUIBÉ, 1943; SIMON, 1884b. Sous les épicéas, herbes et mousses sèches: DENIS, 1948b. *Ulex*: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Mai: GUIBÉ, 1943. Juin: SIMON, 1929. Juillet: DENIS, 1948b. — *Femelle.* Mai: GUIBÉ, 1943. Juin: SIMON, 1929. Juillet: DENIS, 1948b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Septembre: EMERIT & al., 1997.

*Agyneta decora* (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** "Seine": ROLLARD, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Paléarctique.

*Agyneta ramosa* Jackson, 1912

[DENIS, 1967d indique à propos de sa citation: «Il peut paraître téméraire d'introduire une espèce dans la faune française sur la capture d'une seule femelle appartenant à un genre difficile»]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Eure: EMERIT & al., 2003. Nord: EMERIT & al., 1999. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.**

— *Mâle.* Mai: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1967d. Juin: EMERIT & al., 1999.

*Agyneta subtilis* (O. P.-Cambridge, 1863)

*Erigone s.*; *Microneta s.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1884b (*M. s.*), 1929. Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*); SIMON, 1929. Calvados: GUIBÉ, 1946. Drôme: SIMON, 1929. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Isère, Jura, Lozère: SIMON, 1929. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Nord: DENIS, 1943a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1961b. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*M. s.*), 1910 (*M. s.*); SIMON, 1929. "Seine": COCQUEMPOIT & al., 1991; SIMON, 1884b (*M. s.*), 1929. Var: DENIS, 1949c. Vendée: DENIS, 1947b. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOIT & al., 1991. Dune: DENIS, 1947b. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1929. Friche: VEILLON, 1997. Herbes et litière: DENIS, 1943a. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Sous des genêts: DENIS, 1948b. Tourbière: DENIS, 1950a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1943a. Juin: DENIS, 1947b, 1950a; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1961b. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1949c; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1948b; LESSERT, 1904, 1910. Octobre: SIMON, 1929.

*Alioranus pauper* (Simon, 1881)

*A. limicola*; *Dacrylopiastes p.*; *Erigone paupera*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*D. p.*), 1926. Aude: SIMON, 1926. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; DENIS, 1948d (*A. l.*), 1950c; SIMON, 1881c (*E. p.*), 1884b (*D. p.*), 1926. Corse: SIMON, 1881c (*E. p.*), 1884b (*D. p.*), 1926. Finistère: DENIS, 1939a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1881c (*E. p.*), 1884b (*D. p.*), 1926. Var: DENIS, 1935a; SIMON, 1884b (*D. p.*), 1926. [La citation du Var par DENIS, 1939a est erronée selon DENIS, 1966b, et se rapporte à *Aulacocyba* (= *Microctenonyx subitanea*).] — Italie. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Anciens marais salants, sous une rosace de *Statice limonium*: DENIS, 1948d. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Lieux secs, sous les touffes de plantes: SIMON, 1884b. Marais salant; marais saumâtre; sables à coquilles, salicornes: DENIS, 1950c. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Sous les pierres des collines sèches: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Janvier, octobre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Janvier: SIMON, 1926. Mai: DENIS, 1948d, 1950c. Juillet: DENIS, 1939a. Octobre: SIMON, 1926.

*Allomengea scopigera* (Grube, 1859)

*Mengea s.*; *Tmeticus scopiger*.

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884a (*T. s.*), 1929 (*M. s.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique.

*Allomengea vidua* (L. Koch, 1879)

*A. warburtoni*; *Mengea warburtoni*.

**Taxonomie.** La synonymie *A. warburtoni* (O. P.-Cambridge, 1889) = *A. vidua* est établie par HOLM, 1973. **Répartition.** Eure: EMERIT & al., 2003. Loiret: LEDOUX & al., 2002 (*A. w.*). Maine-et-Loire: NOËL

& al., 2005. Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (A. w.). Nord: DENIS, 1934c (M. w.). Seine-Maritime: SIMON, 1929 (M. w.). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bord de rivière, phragmitaie: LEDOUX & al., 2002. Marécage: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 2003. Prairie: NOËL & al., 2005. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. **Période.** — *Femelle.* Septembre: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002.

*Anguliphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Aphileta misera* (O. P.-Cambridge, 1882)

*Hilousia m.*; *Hillousia m.*; *Lepthyphantes miser* [femelle ou sexe non précisé].

**Taxonomie.** Selon SIMON, 1929 la synonymie *Lepthyphantes miser* = *A. misera* n'est valable que pour les femelles, les mâles se rapportant à *L. ericaeus*. Les citations faites sous le nom *L. miser* doivent donc être considérées avec réserve. Voir la note sous *Lepthyphantes ericaeus*. **Répartition.** Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*L. m.*). Finistère: DENIS, 1938a (*Hilousia m.*). Ile-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (*Hillousia m.*). Nord: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*Hilousia m.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998 (*Hillousia m.*); PASQUET & al., 1992. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. m.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie. Holarctique. **Habitat.** Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Marécage: DENIS, 1938a. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Octobre: EMERIT & al., 1999. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1938a, 1948b. Octobre: EMERIT & al., 1999.

*Araeoncus altissimus* Simon, 1884

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1949c. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1884b, 1926. — Italie. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1959d. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Grotte, à l'entrée: SIMON, 1926. Herbes humides: DENIS, 1933b. Petit ruisseau, bords sablonneux: SIMON, 1884b. Sol sablonneux sec, sous des pierres: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b; SIMON, 1884b. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1949c. Mai: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1959d.

*Araeoncus crassiceps* (Westring, 1861)

*A. crassipes*.

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (A. c.). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 2000 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Prairie: LEDOUX & al., 1996a; PASQUET & al., 1992. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle.* Mai, juillet: LEDOUX & al., 1996a.

*Araeoncus discedens* (Simon, 1881)

*Erigone d.*

**Répartition.** Cantal: SIMON, 1881c (*E. d.*), 1884b, 1926. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Puy-de-

Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1952c; SIMON, 1884b, 1926. — Espagne, Italie. **Altitude.** De 1600 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 2150 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang; bord d'étang, prairie: BOSMANS & al., 1985a. Bord d'étang, tourbière: DENIS, 1952c. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1953a. Herbes humides: DENIS, 1948b. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière: DENIS, 1948b. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1948b. Août: DENIS, 1953a, 1953b. — *Femelle avec cocon.* Août: DENIS, 1952c.

*Araeoncus humilis* (Blackwall, 1841)

*Diplocephalus h.*; *Erigone h.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b. Ariège: DENIS, 1960a, 1967d. Aube: SIMON, 1884b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b. Cher: DENIS, 1943b. Corse: PICAARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. h.*); SIMON, 1884b, 1926. Côtes-d'Armor: SALMON, 1959. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1909a. Finistère: MANACH, 1995 (*D. h.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Gironde: SIMON, 1884b. Ile-et-Vilaine: DENIS, 1938a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005. Marne, Morbihan: SIMON, 1884b. Nord: DENIS, 1955a. Oise, Orne: SIMON, 1884b. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1967d; SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1884b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Savoie: HEIDT & al., 1998. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976. Somme, Var, Vaucluse: SIMON, 1884b. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, Nouvelle-Zélande. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (DENIS, 1967d). **Habitat.** Bord de lac, herbes humides: DENIS, 1950a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Dune: DENIS, 1962b. Dune, litière: DENIS, 1950c. Dune, oyats: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt: DENIS, 1960a. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, ajoncs; forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Grotte: DENIS, 1967d. Herbes très humides; joncs humides: DENIS, 1948b. Littoral: SALMON, 1959. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marais, mousses et détritus: SIMON, 1926. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Mousses: SIMON, 1884b. Prairie: LEDOUX & al., 2002; NOËL & al., 2005. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Tourbière: DENIS, 1948b, 1950a. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1943b. Juillet: DENIS, 1962b. Octobre: DENIS, 1963c. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1967d. Mars: DENIS, 1938a. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1943b, 1948b, 1950a, 1967d; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1948b, 1960a, 1962b, 1964b. Octobre: DENIS, 1963c, 1967d. Novembre: DENIS, 1967d. Décembre: DENIS, 1964b.

*Araeoncus longiusculus* (O. P.-Cambridge, 1875)*Erigone longiuscula*.**Répartition.** Corse: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. l.*); SIMON, 1884b, 1926; TIBERGHEN & al., 1993b. — Italie.*Araeoncus vaporariorum* (O. P.-Cambridge, 1875)*Erigone v.***Répartition.** Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985; SIMON, 1884b, 1926. Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b, 1926. Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. v.*); SIMON, 1884b, 1926. Savoie: BERLAND, 1937. — Italie. **Altitude.** De 1700 m (MÜLLER, 1985) jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Prairie alpestre près des neiges: SIMON, 1884b, 1926. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. **Période.** — *Mâle.* Septembre: MÜLLER, 1985. — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937. Septembre: MÜLLER, 1985.*Asthenargus longispinus* (Simon, 1914)*A. longespina*; *Gongylidiellum longispina*.**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1915b (*G. l.*), 1926 (*A. l.*). — Espagne, France. **Habitat.** Forêt de pins, mousses: SIMON, 1926.*Asthenargus paganus* (Simon, 1884)*Gongylidiellum paganum*.**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*G. p.*), 1926. Ariège: SIMON, 1926. Cantal: SIMON, 1884b (*G. p.*), 1926. Jura, Loire: SIMON, 1926. Maine-et-Loire: NOËL & al., 2005. Rhône: SIMON, 1926. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1680 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Forêt de conifères, mousses épaisses: SIMON, 1926. Forêt de sapins, mousses épaisses: SIMON, 1884b. Mêlèzes: LEDOUX & al., 1996b. Peupliers: NOËL & al., 2005. **Période.** — *Mâle.* Octobre, novembre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1996b. Octobre, novembre: SIMON, 1926.*Asthenargus perforatus* Schenkel, 1929**Répartition.** Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — Allemagne, Suisse, Europe.*Asthenargus placidus* (Simon, 1884)*Gongylidiellum placidum*.[Femelle inconnue]. **Répartition.** Cantal: SIMON, 1884b (*G. p.*), 1926. — Connue seulement de France. **Habitat.** Mousses: SIMON, 1884b, 1926.*Baryphyma maritimum* (Crocker & Parker, 1970)**Répartition.** Pas-de-Calais: BONTE, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Europe. **Habitat.** Estuaire, schorre: BONTE, 2000.*Baryphyma pratense* (Blackwall, 1861)*B. pratensis*.**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946 (*B. p.*). Eure: EMERIT & al., 2003. Gironde: DENIS, 1952a (*B. p.*).Manche: SIMON, 1926 (*B. p.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. [La citation de l'Aisne par SIMON, 1884b est erronée selon SIMON, 1926]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Europe jusqu'à la Biélorussie. **Habitat.** Marécage: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999, 2003; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1952a. Mai: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Février: DENIS, 1952a. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999.*Baryphyma trifrons* (O. P.-Cambridge, 1863)*Entelecara galerita*; *Entelecara t.*; *Minyrioloides t.***Répartition.** Aisne: SIMON, 1926 (*E. t.*). Aube: SIMON, 1884b (*E. g.*), 1926 (*E. t.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*M. t.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Seine, Somme: SIMON, 1884b (*E. t.*), 1926 (*E. t.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Holarctique. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926. Friche: VEILLON, 1997. Tourbière: DENIS, 1948b. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1948b.*Bathyphantes approximatus* (O. P.-Cambridge, 1871)*Stylophora a.***Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1943, 1946 (*S. a.*). Cher: DENIS, 1943b. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1929 (*S. a.*). Finistère: MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1934c, 1943a, 1943d, 1952b, 1961a. Pas-de-Calais: DENIS, 1956. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884a, 1929 (*S. a.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bois humides: SIMON, 1884a. Bois marécageux: SIMON, 1929. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de lac: DENIS, 1956. Bord de rivière, carex: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, sable vaseux, sous des pierres: DENIS, 1943b. Bord marécageux de rivière: SIMON, 1929. Forêt, bord d'une mare; forêt, herbes: DENIS, 1961a. Friche: VEILLON, 1997. Herbes humides: DENIS, 1943d. Marais, herbes: GUIBÉ, 1943. Marécage: DENIS, 1934c, 1943a, 1952a, 1952b; EMERIT & al., 2003; SIMON, 1884a, 1929; VILLEPOUX, 1990b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1934c, 1952a. Mars: DENIS, 1934c. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1961a. Septembre: DENIS, 1934c. Octobre: DENIS, 1943d; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1934c. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1934c, 1952a. Mars: DENIS, 1934c. Mai: SIMON, 1943a; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1943b, 1961a. Septembre, novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1934c; GUIBÉ, 1943.*Bathyphantes eumenis* (L. Koch, 1879)**Répartition.** Vosges: BLICK, 1991. — Holarctique. **Altitude.** 680 m (BLICK, 1991). **Habitat.** Terril: BLICK, 1991.

***Bathyphantes gracilis*** (Blackwall, 1841)*B. burgundicus*.

[SIMON, 1929 a confondu sous le nom *B. gracilis* les deux espèces *B. gracilis* et *B. parvulus*]. **Répartition.** Ain: SIMON, 1884a, 1884a (*B. b.*); VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884a. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1884a, 1884a (*B. b.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SIMON, 1884a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1942, 1946; SIMON, 1884a. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1884a, 1929. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1884a, 1899, 1909a. Eure-et-Loire: SIMON, 1884a. Finistère: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a, 1940a; MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: ASSELIN, 1990; BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004. Marne: SIMON, 1884a. Morbihan: ASSELIN, 1990. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1930, 1932a; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; DENIS, 1937d; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; SIMON, 1884a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d; SIMON, 1884a, 1884a (*B. b.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990; DOIGNON, 1976; SIMON, 1884a, 1884a (*B. b.*). Somme: SIMON, 1884a. Var: DENIS, 1933a, 1934a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: SIMON, 1884a (*B. b.*). — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1870 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois: BRAUD & al., 2005. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Bord de rivière: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, herbes et fougères: BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau: DENIS, 1940a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Détritiques humides: DENIS, 1965c. Dune: DENIS, 1962b, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Dune, oyats et *Helichrysum*; dune, sous les tamaris: DENIS, 1963c. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Forêt: DENIS, 1964b. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, ruisseau, touffes de végétation: DENIS, 1950a. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005; NOËL & al.,

2005. Herbes et joncs humides: DENIS, 1948b. Herbes humides: DENIS, 1941, 1963c. Jardin: LE PERU, 2004. Jardin, détritiques: SIMON, 1929. Lande: VEILLON, 1997. Lieux humides: SIMON, 1884a, 1929. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & al., 1970. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral, marécage: DENIS, 1959c. Maison: DENIS, 1941. Marécage: DENIS, 1938a, 1952a, 1959d; EMERIT & al., 1999, 2003; GUIBÉ, 1942; VILLEPOUX, 1990b. Mine de charbon: DENIS, 1930, 1932a. Pelouse: BERLAND, 1924. Peupliers: NOËL & al., 2005. Plage, galets: DENIS, 1959c. Plantation de peupliers: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 1996c, 1999a, 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prairie rase: LEDOUX & al., 1996a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Talus très humide, mousses: DENIS, 1959d. Terrains vagues, sous les décombres: SIMON, 1929. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1952a, 1963c. Mars: DENIS, 1938a, 1952a. Avril: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1965c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1940a. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: DENIS, 1932a; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1952a, 1963c; LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a, 1952a, 1964b; GUIBÉ, 1942. Avril: LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1934a, 1950c, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1948b, 1950a, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1932a, 1938a, 1940a, 1959d. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1959c, 1963c; EMERIT & al., 1999, 2003; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1967d.

***Bathyphantes nigrinus*** (Westring, 1851)*Stylophora n.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Aube: SIMON, 1884a, 1929 (*S. n.*). Cher: DENIS, 1943b. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1929 (*S. n.*). Meurthe-et-Moselle: SIMON, 1929 (*S. n.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nièvre: DENIS, 1943b. Nord: DENIS, 1943a, 1943d, 1961a; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a, 1929 (*S. n.*). Orne: SIMON, 1929 (*S. n.*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; PASQUET & al., 1992. "Seine": SIMON, 1929 (*S. n.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; SIMON, 1929 (*S. n.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois humides: SIMON, 1884a. Bord de rivière, grève, cailloux; bord de rivière, herbes sèches: DENIS, 1943b. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Forêt: DENIS, 1961a. Forêt de chênes et hêtres, litière: LE PERU,

2004. Forêt, bord d'étang : DENIS, 1950a. Forêt, étangs et fossés humides : SIMON, 1929. Friche : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992. Herbes humides : DENIS, 1943d. Marais, détritiques : DENIS, 1943a. Marécage : SIMON, 1929. Prairie en friche ; prairie très humide : LE PERU, 2004. Rivière, sur un banc de sable : DENIS, 1943b. Tourbière : EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février : EMERIT & al., 1999 ; LE PERU, 2004. Mars : DENIS, 1961a ; EMERIT & al., 1999. Avril : DENIS, 1943a ; EMERIT & al., 1999. Juin : DENIS, 1943b, 1961a. Août, septembre : LE PERU, 2004. Octobre : EMERIT & al., 1999 ; LE PERU, 2004. Novembre : LE PERU, 2004. — *Femelle.* Février : EMERIT & al., 1999 ; LE PERU, 2004. Mars : DENIS, 1961a. Avril : DENIS, 1943a ; LE PERU, 2004. Mai : SIMON, 1929. Juin : DENIS, 1943b, 1950a. Juillet : DENIS, 1961b. Août : LE PERU, 2004. Octobre : DENIS, 1943d. Novembre : EMERIT & al., 2003.

***Bathyphantes parvulus*** (Westring, 1851)

[SIMON, 1929 a confondu sous le nom *B. gracilis* les deux espèces *B. gracilis* et *B. parvulus*]. **Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Calvados : GUIBÉ, 1946. Cher : DENIS, 1943b. Gironde : DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine : ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Manche : BERLAND, 1924 ; PÉTILLON & al., 2004. Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Nord : DENIS, 1963b. Orne : ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Somme : SIMON, 1884a. Vendée : DENIS, 1959c, 1962b, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Dune : DENIS, 1962b. Forêt : DENIS, 1963b. Forêt de pins, chênes-verts : DENIS, 1964b. Friche : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Littoral, marécage : DENIS, 1959c. Marécage : DENIS, 1952a ; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse : BERLAND, 1924. Prairie : LEDOUX & al., 2002 ; PASQUET & al., 1992. Prairie calcaire : EMERIT & al., 1999. Prairie humide : LEDOUX & al., 1996a. Prairie marécageuse desséchée : DENIS, 1962b. Prairie, au sol : LEDOUX & al., 1999b. Pâturage : LEBORGNE & al., 1998. Roseaux : DENIS, 1943b. Tourbière : GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle.* Mai : DENIS, 1965c ; LEDOUX & al., 1999b. Juin : EMERIT & al., 1999. Juillet : DENIS, 1962b. Août : DENIS, 1964b. — *Femelle.* Mars : DENIS, 1952a. Mai : LEDOUX & al., 1999b. Juin : DENIS, 1943b ; LEDOUX & al., 2002. Juillet : DENIS, 1962b. Septembre : LEDOUX & al., 1996a.

***Bathyphantes vittiger*** Simon, 1884

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes : SIMON, 1884a, 1929. Ariège : DENIS, 1959a. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 ; SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & al., 1985a ; SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales : SIMON, 1884a, 1929. — Connue seulement de France. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bord de torrent : SIMON, 1884a. Bord des torrents, mousses et sous les pierres : SIMON, 1929. Grotte : DENIS, 1959a. Mousses très humides ; sous une pierre : SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle.* Novembre : DENIS, 1959a.

***Bolyphantes alticeps*** (Sundevall, 1833)

**Répartition.** Charente : SIMON, 1929. Eure : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1929. Garonne (Haute-) : DENIS, 1953b. Loire : SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 ; DENIS, 1951c, 1953a, 1955c. Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhône : SIMON, 1929. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Auvergne ; Jura ; Alpes de Savoie, du Dauphiné et de Provence ; Pyrénées : SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1951c). **Habitat.** Aulnes : LEDOUX & al., 1996b. Aulnes, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Forêt d'épicéas : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 1996a. Herbes sèches : LANCELEVÉE, 1884. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Mélèzes : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Prairie : LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 2003. Prairie humide : BOSMANS & al., 1985a. Rhododendrons : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Sous une pierre : DENIS, 1951c. **Période.** — *Mâle.* Août : LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 2003. Septembre : DENIS, 1951c ; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. — *Femelle.* Juillet : DENIS, 1955c. Août : DENIS, 1953a ; LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 2003. Septembre : DENIS, 1951c, 1953b ; LEDOUX & al., 1996a, 1996c.

***Bolyphantes crucifer*** (Menge, 1866)

*Incestophantes c.* ; *Lepthyphantes c.*

**Répartition.** "Seine" : SIMON, 1929. Seine-et-Marne : SIMON, 1884a (*L. c.*), 1929. — Italie. Paléarctique (*I. c.*). **Habitat.** Bois secs, entre les racines des pins : SIMON, 1884a. Forêt de conifères secs, troncs d'arbres : SIMON, 1929.

***Bolyphantes index*** (Thorell, 1856)

*Bolephthyphantes i.*

**Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Gard : SIMON, 1929. Isère : SIMON, 1884a. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales : SIMON, 1929. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996c. — Alpes de Savoie et du Dauphiné ; Pyrénées : SIMON, 1929. Allemagne, Espagne, Italie (*B. i.*). Groenland, Paléarctique (*B. i.*). **Altitude.** 250 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Hêtres : SIMON, 1884a. Prairie : LEDOUX & al., 1996c. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Femelle.* Septembre : LEDOUX & al., 1996c.

***Bolyphantes luteolus*** (Blackwall, 1833)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Cantal : SIMON, 1884a. Corse : SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; HELSDINGEN & al., 2001 ; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Auvergne ; Alpes de Savoie, du Dauphiné et de Provence : SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** De 1400 m (HELSDINGEN & al., 2001) jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Aulnes : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Forêt de conifères ; lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Prairie : LEDOUX & al., 1996b, 2003. Rhododendrons : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Sous une pierre : BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Août :

LEDOUX & *al.*, 1996b. Septembre: HELSDINGEN & *al.*, 2001; LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle*. Mai: LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c. Novembre: LEDOUX & *al.*, 1996a.

***Bolyphantes nigropictus* Simon, 1884**

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a, 1929. Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1929. Corse: SIMON, 1884a, 1929. Drôme: SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1995; SIMON, 1929. Var: SIMON, 1884a, 1929. Vaucluse: SIMON, 1929. — Espagne, Italie. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (DENIS, 1933b). **Habitat.** Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de conifères: SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Avril, décembre: DENIS, 1933b.

***Bordea cavicola* (Simon, 1884)**

*Lepthyphantes coiffaiti*.

**Taxonomie.** La synonymie *Lepthyphantes coiffaiti* Denis, 1953 = *B. cavicola* est établie par BOSMANS, 1995. **Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b (*L. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS, 1995; BOSMANS & *al.*, 1985a (*L. c.*). — Espagne. **Altitude.** 1600 m (BOSMANS, 1995; BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Sous une pierre: BOSMANS, 1995. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1953b. Juin: BOSMANS, 1995.

***Bordea negrei* (Dresco, 1951)**

*Lepthyphantes ecclesiasticus*; *Lepthyphantes n.*

**Taxonomie.** La synonymie *Lepthyphantes ecclesiasticus* Denis, 1959 = *B. negrei* est établie par BOSMANS, 1995. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d (*L. n.*); DRESCO, 1951 (*L. n.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1967d (*L. n.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1959a (*L. e.*); DRESCO, 1951 (*L. n.*), 1962 (*L. e.*); DRESCO & *al.*, 1968 (*L. n.*). — Espagne. **Habitat.** Grotte: DENIS, 1959a, 1967d; DRESCO, 1951, 1962; DRESCO & *al.*, 1968. **Période.** — *Mâle*. Février, juin: DRESCO, 1951. — *Femelle*. Février: DRESCO, 1951. Juin: DENIS, 1967d; DRESCO, 1951. Septembre: DENIS, 1959a; DRESCO, 1962. Octobre: DRESCO & *al.*, 1968.

*Canariphantes* (voir *Lepthyphantes*)

***Caracladus avicula* (L. Koch, 1869)**

*C. aviculus*; *Erigone a.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. a.*); SIMON, 1884b (*C. a.*), 1926 (*C. a.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; SIMON, 1926 (*C. a.*). — Allemagne, Italie, Suisse, Autriche. **Altitude.** De 1400 m (SIMON, 1884b) jusqu'à 1680 m (LEDOUX & *al.*, 1996b). **Habitat.** Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt de mélèzes, mousses: SIMON, 1884b. Mélèzes: LEDOUX & *al.*, 1996b. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b; SIMON, 1884b. — *Femelle*. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b; SIMON, 1884b.

***Caracladus leberti* (Roewer, 1942)**

*Erigone kochi*; *Plaesiocraerus kochi*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1926 (*P. k.*). Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. k.*); SIMON, 1884b (*P. k.*), 1926 (*P. k.*). Isère: SIMON, 1884b (*P. k.*), 1926 (*P. k.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. — Italie, Suisse. Ouest-Europe. **Habitat.** Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1926. Forêt de sapins, mousses: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle*. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996c.

***Caviphantes saxetorum* (Hull, 1916)**

**Répartition.** Savoie: HEIDT & *al.*, 1998. — Allemagne, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bord de rivière, graviers: HEIDT & *al.*, 1998.

***Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833)**

*Centromerinus b.*; *Centromerus b.*; *Linyphia b.*; *Linyphia comata*; *Tmeticus b.*

**Répartition.** Ain: DENIS, 1958b. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946 (*Centromerinus b.*); LUCAS, 1874c (*L. c.*). Corse: SIMON, 1884a (*T. b.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*T. b.*); SIMON, 1909a (*T. b.*). Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gironde: DENIS, 1951b. Illet-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979. Manche: KERVILLE, 1898 (*T. b.*); LUCAS, 1878b (*L. b.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Centromerinus b.*), 1961b, 1967d (*Centromerinus b.*); LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie: MÜLLER, 1985. "Seine": LUCAS, 1876 (*L. b.*). Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*T. b.*). Seine-et-Marne: COCQUEMOT & *al.*, 1984, 1989; DOIGNON, 1976 (*T. b.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*T. b.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*Centromerinus b.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, Canada. **Altitude.** Jusqu'à 2250 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1876. Bord de névé: DENIS, 1960a. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Champ de céréales: COCQUEMOT & *al.*, 1984, 1989. Détritrus: SIMON, 1884a, 1929. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Grotte: DENIS, 1958b. Jardin: BERENGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. Lande sèche: CANARD, 1979. Litière: SIMON, 1929. Litière sèche: SIMON, 1884a. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Mousses: SIMON, 1909a. Mousses et herbes humides: DENIS, 1950b. Prairie humide: LUCAS, 1878b. Prairie tourbeuse: LEDOUX & *al.*, 1996a. Sous une pierre: DENIS, 1950b, 1951c; LUCAS, 1874c; MÜLLER, 1985; SIMON, 1884a, 1929. Tourbière, mousses: DENIS, 1951c. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: DENIS, 1951c. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1954a. Juillet: DENIS, 1955c, 1957a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: DENIS, 1953a, 1960a; LUCAS, 1878b. Septembre: DENIS, 1951c; MÜLLER, 1985. Octobre: LUCAS, 1876.

*Centromerita concinna* (Thorell, 1875)

*Centromerinus bicolor concinnus*; *Tmeticus concinnus*.

**Répartition.** Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990. Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Ille-et-Vilaine, Morbihan: ASSELIN, 1990. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1884a (*T. c.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*T. c.*); SIMON, 1884a (*T. c.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*C. b. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bord d'étang: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: CORNIC, 1977. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. **Période.** — *Femelle.* Août: DENIS, 1967d.

*Centromeris albidus* Simon, 1929

*C. serratus* [err.].

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1962f, 1967d. Aude: FAGE, 1931; SIMON, 1929. Garonne (Haute-): DENIS, 1962f, 1967d. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1967d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b [*C. serratus*, err. selon DENIS, 1934b], 1943c; LEDOUX & al., 1996a, 2003. — Espagne, Grande-Bretagne. Europe. **Altitude.** 1250 m (LEDoux & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de chênes-verts; forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, litière et mousses: DENIS, 1962f. Grotte: FAGE, 1931; SIMON, 1929. Mousses: DENIS, 1933b, 1962f, 1967d. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1962f, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1962f, 1967d. Février: DENIS, 1962f, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1933b, 1962f, 1967d. Avril: DENIS, 1962f; LEDOUX & al., 2003. Mai: DENIS, 1933b. Juin, novembre: LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1962f.

*Centromeris arcanus* (O. P.-Cambridge, 1873)

*C. ensifer*; *Sintula longulus* [femelle]; *Tmeticus a.*; *Tmeticus encifer*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985 (*C. e.*); SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929. Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*S. l.* [femelle]), 1929. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1929. Ariège: DRESKO, 1962. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884a (*T. a.*), 1929. Eure: EMERIT & al., 2003. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1951c; SIMON, 1884b (*S. l.* [femelle]), 1929. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1884a (*T. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1960a; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhône, Savoie (Haute-): SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Bois de mélèzes, mousses: SIMON, 1884b. Broussailles de rhododendron; crevasses des grands rochers: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de sapins: SIMON, 1929. Forêt, litière: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DRESKO, 1962. Marécage: EMERIT & al., 2003. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & al.,

1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. **Période.** — *Mâle.* Septembre: DENIS, 1951c; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DRESKO, 1962. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Novembre: DENIS, 1960a.

*Centromeris balazuci* Dresko, 1952

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Ardèche: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1952b. Bouches-du-Rhône: DRESKO, 1962. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1952b, 1962. **Période.** — *Femelle.* Mars: DRESKO, 1962. Août: DRESKO, 1952b.

*Centromeris brevivalpis* (Menge, 1866)

*Centromeris aequalis*; *C. aequalis*; *C. brevivalvatus*; *Erigone b.*; *Tmeticus brevivalpus*; *Tmeticus illibatatus* [mâle].

**Taxonomie.** L'espèce *Centromeris brevivalpis* (Menge, 1866) a une synonymie assez confuse. Elle a été citée sous le nom *Erigone aequalis* par WESTRING (1851), mais l'identification est erronée selon THORELL, 1871 qui établit la synonymie *E. aequalis* Westring = *E. brevivalpis* Menge, 1866. L'espèce est renommée *C. brevivalvatus* par DAHL, 1912, et à ce propos BONNET, 1956 note: «On ne voit pas pourquoi Dahl a créé ce terme, puisque Thorell, et les auteurs suivants, considéraient l'*Erigone aequalis* de Westring comme synonyme de *brevivalpis*». L'espèce est désignée *C. brevivalvatus* dans PLATNICK, 2004 et *C. aequalis* dans LOCKET & al., 1953, HEIMER & al., 1991, ROBERTS, 1987. **Répartition.** Aisne, Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a (*T. b.*), 1929. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1929. Aube: SIMON, 1884a (*T. b.*), 1929. Calvados: ASSELIN & al., 1989 (*C. a.*); GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1884a (*T. i.* [mâle]), 1929. Drôme: SIMON, 1929. Eure: EMERIT & al., 2003 (*C. a.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*C. a.*). Isère: SIMON, 1884a (*T. b.*), 1929. Jura: SIMON, 1929. Nord: DENIS, 1961a (*C. a.*). Oise, Rhône: SIMON, 1929. Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. b.*); SIMON, 1929. "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (*C. a.*); CHRISTOPHE & al., 1977 (*C. a.*); SIMON, 1884a (*T. b.*), 1929. Seine-et-Marne: SIMON, 1884a (*T. b.*), 1929. Vaucluse: SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*C. b.*; *Centromeris a.*). Paléarctique (*C. b.*). **Habitat.** Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Forêt: DENIS, 1961a; SIMON, 1929. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. **Période.** — *Mâle.* Septembre: SIMON, 1929. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1961a. Mai: EMERIT & al., 2003. Septembre: SIMON, 1929. Novembre: EMERIT & al., 2003.

*Centromeris capucinus* (Simon, 1884)

*Tmeticus c.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Aube: SIMON, 1929. Aude: SIMON, 1884a (*T. c.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884a (*T. c.*), 1929. Calvados: GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Loire:



SIMON, 1929. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1929. Rhône, Vaucluse: SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: SIMON, 1929. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1938a.

*Centromerus cinctus* (Simon, 1884)

*Tmeticus c.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1929. Corse: SIMON, 1884a (*T. c.*), 1929. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1929. — Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929.

*Centromerus dilutus* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone diluta*; *Micryphantes d.*; *Rhabdoria diluta*; *Sintula d.*

**Répartition.** Ain, Aisne: SIMON, 1884b (*S. d.*). Ariège: DENIS, 1960a (*R. d.*), 1967d. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. d.*); SIMON, 1884b (*S. d.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b (*R. d.*), 1967d. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979, 1980, 1982b. Isère: SIMON, 1884b (*S. d.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990. Oise: SIMON, 1884b (*S. d.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*R. d.*); LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*M. d.*), 1910 (*M. d.*). "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; SIMON, 1884b (*S. d.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*S. d.*); SIMON, 1884b (*S. d.*). Somme: SIMON, 1884b (*S. d.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bois, mousses: SIMON, 1929. Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Détritiques humides; dune: DENIS, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière très humide: DENIS, 1963c. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976; LE PERU, 2004. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980, 1982b. Mousses: DENIS, 1960a; SIMON, 1884b. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous les épicéas, herbes et mousses sèches: DENIS, 1948b. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Terrain calcaire: DENIS, 1960a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c, 1967d; LE PERU, 2004. Février:

DENIS, 1967d. Mars: LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1964b. Mai: LESSERT, 1904, 1910. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1962b, 1967d; EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c, 1967d; LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1965c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1933b, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1933b, 1962b, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1933b, 1960a, 1967d. Juin: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1948b. Août: DENIS, 1953b. Octobre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Décembre: DENIS, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004.

*Centromerus europaea* (Simon, 1911)

*Adoxoneta europaea*; *Anthrobia europaea*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: JEANNEL, 1926 (*Anthrobia e.*); SIMON, 1911 (*Anthrobia e.*), 1929 (*Adoxoneta e.*). — Espagne. Algérie, Balkans. **Habitat.** Grotte: JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1929.

*Centromerus fagicola* Denis, 1948

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois de hêtres, litière: DENIS, 1948b. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1948b.

*Centromerus incilium* (L. Koch, 1881)

*Tmeticus delphinensis* [mâle].

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1929. Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a (*T. d.* [mâle]), 1929. Alpes-de-Haute-Provence, Drôme: SIMON, 1929. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979. Isère: SIMON, 1884a (*T. d.* [mâle]), 1929. Jura: SIMON, 1929. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire: SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1550 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1929. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: SIMON, 1929. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: SIMON, 1929. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Centromerus levitarsis* (Simon, 1884)

*C. laevitarsis*; *Tmeticus l.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884a (*T. l.*), 1929. Nord: EMERIT & al., 1999 (*C. l.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*C. l.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998 (*C. l.*). Vaucluse: SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bord d'étang: SIMON, 1929. Marais, détritiques: SIMON, 1884a. Marécage: SIMON, 1929. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Octobre: SIMON, 1884a. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Octobre: SIMON, 1884a.

**Centromerus microps** (Simon, 1911)*Birgerius m.*; *Rhabdoria m.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1953b; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926 (*R. m.*); SIMON, 1911 (*R. m.*), 1929. Garonne (Haute-): DRESKO & al., 1968. Pyrénées-Atlantiques: FAGE, 1931. — Espagne (*B. m.*). **Habitat.** Grotte: DENIS, 1953b; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1929. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1953b. Août: DRESKO & al., 1968.

**Centromerus pabulator** (O. P.-Cambridge, 1875)*Erigone pabulatrix*; *Tmeticus p.*

**Répartition.** Ardennes, Ardèche, Drôme, Eure: SIMON, 1929. Isère: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884a (*T. p.*). Jura, Loire: SIMON, 1929. Oise: SIMON, 1884a (*T. p.*), 1929. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Rhône: SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904. "Seine": SIMON, 1884a (*T. p.*), 1929. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. p.*); SIMON, 1884a (*T. p.*), 1929. Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884a (*T. p.*), 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Europe, Russie, Ukraine. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1996b; SIMON, 1929. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: LESSERT, 1904. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996a, 1996c.

**Centromerus paradoxus** (Simon, 1884)*Cryptocleptes p.*

**Répartition.** Ardèche: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1952b, 1962; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926 (*C. p.*); SIMON, 1884a (*C. p.*), 1929. Drôme: FAGE, 1931; SIMON, 1929. Gard: DRESKO, 1952b; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Isère: DRESKO, 1952b. — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Grotte: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1952b, 1962; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1929. **Période.** — *Femelle.* Août: DRESKO, 1962.

**Centromerus prudens** (O. P.-Cambridge, 1873)*Tmeticus electus*; *Tmeticus p.*

**Répartition.** Ardèche: BALAZUC & al., 1952; SIMON, 1929. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b, 1967d; SIMON, 1929. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884a (*T. p.*), 1929. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gironde: SIMON, 1929. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979. Jura: SIMON, 1929. Lot: DRESKO & al., 1968. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a. Morbihan: ASSELIN, 1990. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1959a, 1967d; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1959a; DRESKO, 1962; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1929. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO,

1959a, 1962. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1929. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Tarn: SIMON, 1929. Tarn-et-Garonne: SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929. Vendée: DENIS, 1963c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2490 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bord de lac: DENIS, 1951c. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b. Bord de névé: DENIS, 1960a, 1967d. Bord de rivière, sous *Calluna*; bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Crevasses des grands rochers: BOSMANS & al., 1985a. Dune, détrit: DENIS, 1963c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: SIMON, 1884a, 1929. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Genêts: LEDOUX & al., 1996a. Grotte: BALAZUC & al., 1952; BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1968. Grotte, à l'entrée: DENIS, 1959a. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Litière de châtaigniers: DENIS, 1933b. Marais, détrit: SIMON, 1929. Mare, sous des pierres: DENIS, 1953a. Marécages, détrit: SIMON, 1884a. Mousses: DENIS, 1967d. Pelouse rase, sous des pierres: DENIS, 1953a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b, 1963c. Mars: DENIS, 1933b. Mai: SIMON, 1884a. Août: DENIS, 1960a. Septembre: DENIS, 1951c. Décembre: DRESKO, 1962. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b. Mars: DENIS, 1933b, 1959a. Avril: DENIS, 1959a; DRESKO, 1959a; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1933b; SIMON, 1884a. Juin: DENIS, 1933b, 1967d. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1961b, 1967d; DRESKO & al., 1968. Août: DENIS, 1953a, 1960a, 1967d; DRESKO & al., 1968. Septembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DRESKO, 1962. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1933b; DRESKO, 1962.

**Centromerus satyrus** (Simon, 1884)*Tmeticus s.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. Alpes-de-Haute-Provence: LUCZACK & al., 1964. Ardèche: DRESKO, 1952b, 1962; SIMON, 1929. Bouches-du-Rhône: DRESKO, 1952b; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1929. Seine-et-Marne: SIMON, 1884a (*T. s.*), 1929. Var: SIMON, 1929. — Italie. **Habitat.** Détrit secs: SIMON, 1929. Forêt: SIMON, 1884a, 1929. Grotte: DRESKO, 1952b, 1962; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle.* Septembre: DRESKO, 1962.

**Centromerus sellarius** (Simon, 1884)*C. similis* [femelle].

**Taxonomie.** DENIS, 1933b a cité, avec un doute, l'espèce *Centromerus similis* Kulczynski à propos de deux femelles récoltées dans les Pyrénées-Orientales. WEISS & al., 1995 établit la synonymie *C. similis* Kulczynski [femelle] = *C. sellarius* (Simon, 1884). **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. Ariège: DENIS, 1953b, 1960a, 1967d; DRESKO, 1962; SIMON, 1929. Aude: DENIS, 1967d. Drôme: SIMON, 1929. Garonne (Haute-): DRESKO, 1947a; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Loire: SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1951c, 1953a; DRESKO, 1962;

SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1960a; SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (C. s. [femelle]); LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** De 1100 m (BOSMANS & al., 1986) jusqu'à 2000 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bord d'un névé, sous des pierres: DENIS, 1953a. Forêt: DENIS, 1960a; SIMON, 1929. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1951c. Grotte: DENIS, 1967d; DRESKO, 1962; FAGE, 1931. Litière; mousses humides: DENIS, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1953b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b, 1967d. Février: DENIS, 1967d. Mars: DENIS, 1960a, 1967d. Mai: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1960a; DRESKO, 1962. Août: DENIS, 1953a. Septembre: DENIS, 1951c. Octobre: SIMON, 1929. Novembre: DENIS, 1967d. Décembre: DRESKO, 1962.

### *Centromerus semiater* (L. Koch, 1879)

#### *C. incultus.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b (C. i.). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Marécage: VILLEPOUX, 1990b.

### *Centromerus serratus* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone serrata*; *Sintula balteatus*; *Sintula longulus* [mâle]; *Tmeticus probosus*; *Tmeticus s.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1884b (S. b.). Aisne: SIMON, 1884a (T. s.). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a (T. p.), 1884b (S. l. [mâle]). Ariège: DENIS, 1967d; FAGE, 1931. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (E. s.); SIMON, 1884a (T. p.), 1884a (T. s.), 1884b (S. b.). Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Oise: SIMON, 1884a (T. s.). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1959a; SIMON, 1884b (S. l. [mâle]). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; SIMON, 1884a (T. p.), 1884a (T. s.), 1884b (S. b.). Seine-et-Marne: SIMON, 1884a (T. s.). Var: SIMON, 1898c (S. b.). Vendée: DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. [La citation des Pyrénées-Orientales par DENIS, 1933b est erronée selon DENIS, 1934b, et se rapporte à *C. albidus*]. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois de mélèzes, mousses: SIMON, 1884b. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bois, mousses: SIMON, 1929. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes, mousses: LE PERU, 2004. Forêt de pins: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt de pins, mousses humides: DENIS, 1965c. Grotte: DENIS, 1959a; FAGE, 1931. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Jardin, détritiques humides: DENIS, 1965c. Litière de pins; litière très sèche sous des fagots de chênes-verts: DENIS, 1963c. Mousses: SIMON, 1884b. Mousses humides très épaisses: DENIS, 1964b. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Sous-bois, litière: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c, 1967d. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Novembre: DENIS, 1965c; LE PERU, 2004. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.*

Janvier: DENIS, 1963c, 1967d. Février: DENIS, 1965c, 1967d; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1963c, 1964b. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1959a. Juillet: DENIS, 1963c, 1967d. Novembre: DENIS, 1965c, 1967d. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon.* Mars: DENIS, 1964b.

### *Centromerus sinus* (Simon, 1884)

#### *Tmeticus s.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Cantal: SIMON, 1884a (T. s.), 1929. Drôme, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Ravin profond et humide, mousses: SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle.* Octobre: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Octobre: DENIS, 1967d.

### *Centromerus subalpinus* Lessert, 1907

**Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. — Allemagne, Suisse. Autriche. **Habitat.** Forêt, au sol; rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c.

### *Centromerus succinus* (Simon, 1884)

#### *Sintula s.*

**Répartition.** Aube, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (S. s.), 1929. Vaucluse: SIMON, 1929. — Suisse. Ouest-Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929. Forêt de hêtres, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, bord de fontaine: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1884b. Novembre: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1929. — *Femelle.* Mai, novembre: SIMON, 1929.

### *Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841)

*C. sylvaticus*; *Tmeticus delphinensis* [femelle]; *Tmeticus sylvaticus*.

**Répartition.** Ain, Aisne: SIMON, 1884a (T. s.). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a (T. d. [femelle]). Ariège: DENIS, 1960a (C. s.), 1967d (C. s.). Aube: SIMON, 1884a (T. s.). Aude: DENIS, 1967d (C. s.). Calvados, Cantal: SIMON, 1884a (T. s.). Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (T. s.). Finistère: MANACH, 1995 (C. s.). Gard: LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d (C. s.). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (C. s.); CANARD, 1979; SIMON, 1884a (T. s.). Isère: SIMON, 1884a (T. d. [femelle]), 1884a (T. s.). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b (C. s.). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: ASSELIN, 1990 (C. s.). Nord: EMERIT & al., 1999 (C. s.). Oise: SIMON, 1884a (T. s.). Orne: ASSELIN, 1990 (C. s.). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999 (C. s.). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1967d (C. s.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a (C. s.). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904 (C. s.), 1910 (C. s.). "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; SIMON, 1884a (T. s.). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (T. s.); SIMON, 1884a

(*T. s.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; DOIGNON, 1976 (*T. s.*); SIMON, 1884a (*T. s.*). Somme: SIMON, 1884a (*T. s.*). Vendée: DENIS, 1962b (*C. s.*), 1963c (*C. s.*), 1964b (*C. s.*), 1965c (*C. s.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*C. s.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1310 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996b. Bois humides, mousses: SIMON, 1884a. Bois, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989. Dune: DENIS, 1964b. Forêt: DENIS, 1967d; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & *al.*, 1977. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, sous des pierres: DENIS, 1960a. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: LE PERU, 2004. Jardin, détritiques humides: DENIS, 1965c. Lande sèche: CANARD, 1979. Litière: DENIS, 1967d, 1967d. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Maison: BRAUD & *al.*, 2005. Mousses: DENIS, 1967d, 1967d. *Populeum albae*, litière; *Populeum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & *al.*, 1996b, 2002. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Sous-bois de noisetiers: LEDOUX & *al.*, 1996a. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. Vieilles bouses: DENIS, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mars: DENIS, 1964b. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Octobre: DENIS, 1962b, 1967d; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: DENIS, 1965c, 1967d; LEDOUX, 2000. Décembre: DENIS, 1964b, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c; LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1965c; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mars: DENIS, 1964b, 1967d; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1965c, 1967d; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1960a. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004. Octobre: DENIS, 1962b, 1963c, 1967d; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: DENIS, 1962b, 1965c, 1967d; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996a; LESSERT, 1904, 1910. Décembre: DENIS, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004.

#### *Ceratinella brevipes* (Westring, 1851)

##### *Erigone b.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1884b, 1926. Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. b.*); SIMON, 1884b, 1926. Alpes-Maritimes: SIMON, 1926. Cantal: SIMON, 1884b, 1926. Cher: DENIS, 1943b. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Gironde: SIMON, 1884b, 1926. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Landes: SIMON, 1926. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire: SIMON, 1926. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lozère: SIMON, 1926. Manche, Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: DENIS, 1955a; EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1884b, 1926. Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1951c. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1926. Rhin (Bas-): LEBORGNE &

*al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): SIMON, 1926. "Seine": SIMON, 1884b, 1926. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Somme, Var: SIMON, 1884b, 1926. Vendée: CLARK & *al.*, 1970. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Ajoncs, bruyères, genévriers: SIMON, 1926. Bois, bruyères: DENIS, 1943b. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & *al.*, 1996a. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1926; VILLEPOUX, 1990b. Marécages, détritiques: SIMON, 1884b. Plage, rouleaux de *Fucus* secs: CLARK & *al.*, 1970. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Prairies alpestres, sous les pierres: SIMON, 1884b. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & *al.*, 2002. Mai, juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre: DENIS, 1951c. Octobre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Janvier: SIMON, 1926. Février: EMERIT & *al.*, 1999. Avril: CLARK & *al.*, 1970. Mai: EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre: SIMON, 1926.

#### *Ceratinella brevis* (Wider, 1834)

##### *Erigone b.*

**Répartition.** Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. b.*); SIMON, 1884b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b. Ariège: DENIS, 1959a, 1960a, 1967d. Aube: SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente: SIMON, 1884b. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1884b, 1926. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1899, 1909a. Eure-et-Loire: SIMON, 1884b. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a; SIMON, 1884b. Isère: SIMON, 1884b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d, 1955a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; SIMON, 1884b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b, 1960a; SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1884b; SOYER, 1965. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: DENIS, 1946c; DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b. Var: MÜLLER, 1985. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (LEDOUX & *al.*, 1996c). **Habitat.** Bois de hêtres: SOYER, 1965. Bois, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Détritiques d'inondation: DENIS, 1946c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1961b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas, litière: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de chênes-verts; forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 2003.

Forêt de conifères, litière : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins, herbes et litière : DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière : DENIS, 1963c, 1964b. Forêt humide, mousses : LE PERU, 2004. Forêt, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Forêt, mousses : DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b. Friche : PASQUET & al., 1992. Grotte : DENIS, 1959a. Jardin : LE PERU, 2004. Lande sèche : CANARD, 1979. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Lande, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Marécage : DENIS, 1938a, 1952a. Mousses : DENIS, 1967d; SIMON, 1926. Prairie : LEDOUX & al., 1996a, 1996c; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Terrain vague : BOSMANS & al., 1985a. Tourbière : EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Janvier : DENIS, 1952a; LE PERU, 2004. Février : LEDOUX & al., 1996a. Mars : LE PERU, 2004. Avril : EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Mai : LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1961b; LE PERU, 2004. Août : LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996c. Septembre : DENIS, 1959a; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996c; MÜLLER, 1985. Octobre : DENIS, 1963c, 1967d. Novembre : LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Janvier : DENIS, 1952a, 1960a; LE PERU, 2004. Février : DENIS, 1946c, 1953b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Mars : DENIS, 1953b, 1960a, 1964b; LE PERU, 2004. Avril : DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Mai : LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juin : DENIS, 1933b, 1938a, 1954a, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Août : LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2003. Septembre : LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Octobre : EMERIT & al., 1999. Novembre : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre : DENIS, 1967d.

#### *Ceratinella scabrosa* (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Ain : HEIDT & al., 1998; SIMON, 1884b, 1926. Aisne, Alpes-Maritimes : SIMON, 1884b, 1926. Calvados : ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1943, 1946. Dordogne : SIMON, 1926. Eure : EMERIT & al., 2003. Loir-et-Cher : SIMON, 1926. Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Marne : SIMON, 1926. Nièvre : DENIS, 1943b. Nord : DENIS, 1939b, 1955a. Oise : SIMON, 1884b, 1926. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b, 1951c; SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1960a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987. Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992. Rhône : SIMON, 1926. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1926. "Seine" : SIMON, 1884b, 1926. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Seine-et-Marne : COCQUEMPOT & al., 1989; SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Bois humides, mousses : SIMON, 1884b. Bois marécageux, mousses et détritiques : SIMON, 1926. Bois, litière : DENIS, 1943b. Bord de rivière, graviers : HEIDT & al., 1998. Bord de torrent, mousses : DENIS, 1950b. Bétulaie, au sol : EMERIT & al., 2003. Champ de céréales : COCQUEMPOT & al., 1989. Forêt : DENIS, 1939b, 1955a; SIMON, 1926. Friche : PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Marécage : EMERIT & al., 1999. Mousses : GUIBÉ, 1943; LESSERT, 1904. Mousses des rochers : SIMON, 1926. Prairie : PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre : BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale : BOSMANS & al., 1987. **Période.** — *Mâle.*

Mars : DENIS, 1960a. Mai : DENIS, 1939b; SIMON, 1926. Juin : LESSERT, 1904, 1910. Septembre : GUIBÉ, 1943. — *Femelle.* Mars : DENIS, 1960a; GUIBÉ, 1943. Mai : EMERIT & al., 2003. Juin : DENIS, 1943b; EMERIT & al., 1999; LESSERT, 1910. Juillet : DENIS, 1950b. Septembre : DENIS, 1951c; GUIBÉ, 1943.

#### *Ceratinella wideri* (Thorell, 1871)

**Répartition.** Seine-et-Marne : SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Forêt : SIMON, 1926. Forêts humides, mousses : SIMON, 1884b.

#### *Ceratinopsis stativa* (Simon, 1881)

*Anacotyle s.*; *Erigone s.*; *Lophomma stativum*; *Styloctetor stativus*.

**Répartition.** Aisne, Aube : SIMON, 1884b (*L. s.*), 1926 (*A. s.*). Corse : SIMON, 1881c (*E. s.*), 1926 (*A. s.*). Dordogne : SIMON, 1926 (*A. s.*). Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979, 1990a. Morbihan : CANARD, 1990a. Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992. — Grande-Bretagne, Italie. Holarctique (*S. s.*). **Habitat.** Lande sèche : CANARD, 1979. Prairie : PASQUET & al., 1992. **Période.** — *Femelle.* Août : SIMON, 1926.

#### *Cineta gradata* (Simon, 1881)

*Cinetata g.*; *Erigone g.*; *Grammonota g.*

**Taxonomie.** Le genre *Cineta* Simon, 1884, type *C. genistae* (Simon, 1881), est considéré comme *nomen dubium* par PLATNICK, 2004. À propos de *C. genistae*, WUNDERLICH, 1994c indique : « Von der Typusart von *Cineta - Erigone genistae* Simon 1881 von Korsika - ist nur das subad. Männchen bekannt, das mir aus dem MNHN (Nr. 4409.2) vorlag. Es ist nicht Kongenerisch mit *gradata* », et cet auteur crée le nouveau genre *Cinetata* pour recueillir l'unique espèce *gradata*. Le nom *Cineta gradata*, utilisé pendant une centaine d'années, est maintenu ici. **Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes : SIMON, 1884b (*G. g.*), 1926. Ariège : SIMON, 1926. Cantal : SIMON, 1881c (*E. g.*), 1884b (*G. g.*), 1926. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a, 2003. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse (*C. g.*). Europe (*C. g.*). **Habitat.** Forêt de conifères : LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères, branches : SIMON, 1926. Forêt de pins et de sapins, branches basses et touffues : SIMON, 1884b. Sapins : SIMON, 1881c. **Période.** — *Femelle.* Juillet : LEDOUX & al., 1996a. Août : LEDOUX & al., 2003.

#### *Cnephlocotes obscurus* (Blackwall, 1834)

*Erigone obscura*.

**Répartition.** Aube : PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. o.*); SIMON, 1884b, 1926. Calvados : GUIBÉ, 1943, 1946; SIMON, 1884b, 1926. Charente : SIMON, 1884b, 1926. Finistère : MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1990a. Jura : SIMON, 1926. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b; SIMON, 1884b, 1926. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Nord : DENIS, 1934c, 1955a. Oise, Orne : SIMON, 1884b, 1926. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986; SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX &

*al.*, 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): SIMON, 1926. "Seine": SIMON, 1884b, 1926. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Seine-et-Marne: DENIS, 1946c; SIMON, 1884b, 1926. Somme: SIMON, 1884b, 1926. Vendée: DENIS, 1964b. Yonne: SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987). **Habitat.** Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Détrit: GUIBÉ, 1943. Détrit d'inondation: DENIS, 1946c. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Marécage: DENIS, 1934c; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1926. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002; PASQUET & *al.*, 1992. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Sous une pierre: GUIBÉ, 1943. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1946c. Mars: GUIBÉ, 1943. Juin: DENIS, 1964b. Septembre: DENIS, 1934c; SIMON, 1926. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1926. — *Femelle.* Janvier: GUIBÉ, 1943. Février: LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1926.

#### *Cnephalocotes tristis* Denis, 1954

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 2000 m (DENIS, 1954a). **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1954a.

#### *Collinsia despaxi* (Denis, 1950)

##### *Coryphaeolana d.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*C. d.*). — Espagne. **Altitude.** 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Tourbière, mousses: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1950b. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1950b.

#### *Collinsia distincta* (Simon, 1884)

*Coryphaeolana d.*; *Coryphaeolanus distinctus*; *Gongylidium distinctum*; *Halorates distinctus*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & *al.*, 1998. Aisne: SIMON, 1884b (*G. d.*), 1926 (*Coryphaeolanus d.*). Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a (*Coryphaeolana d.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne (*H. d.*). Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1050 m (DENIS, 1950a). **Habitat.** Bord de lac, détrit: DENIS, 1950a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & *al.*, 1998. Bord de rivière, sous les carex: LEDOUX & *al.*, 2002. Prairie: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & *al.*, 2002. Juin: DENIS, 1950a. — *Femelle.* Avril, juin: LEDOUX & *al.*, 2002.

#### *Collinsia hibernica* (Simon, 1926)

##### *Coryphaeolanus hibernicus*.

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926 (*C. h.*). — Connue seulement de France.

#### *Collinsia inerrans* (O. P.-Cambridge, 1885)

*Coryphaeolanus foenarius*; *Gongylidium foenarium*; *Milleriana i.*; *Milleriana innerans*; *Scotargus i.*; *Tmeticus fortunatus*.

**Taxonomie.** Le nom *Collinsia inerrans* (O. P.-Cambridge, 1885) est adopté ici, le genre *Milleriana*, créé par DENIS, 1966d pour y placer l'espèce *inerrans* (du genre *Scotargus*), étant mis en synonymie de *Collinsia* par ESKOV, 1990. Cette espèce a été confondue avec *Scotargus pilosus*; voir la note sous *S. pilosus*. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*G. f.*), 1926 (*S. i.*). Ardèche: SIMON, 1926 (*S. i.*). Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989 (*M. i.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a (*M. innerans*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003 (*M. i.*). Finistère: MANACH, 1995 (*M. innerans*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a (*M. innerans*). Loiret: COCQUEMPOT & *al.*, 1984 (*S. i.*); LEDOUX & *al.*, 2002 (*M. i.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005 (*M. i.*). Manche, Morbihan: CANARD, 1990a (*M. innerans*). Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999 (*M. i.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a (*M. i.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1926 (*C. f.*). Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*T. f.*); SIMON, 1926 (*S. i.*). "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991 (*M. i.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977 (*S. i.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1984 (*S. i.*), 1989 (*M. i.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois de conifères, mousses épaisses: SIMON, 1926. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1984, 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Haie, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003. Prairie: ASSELIN & *al.*, 1989; BOSMANS & *al.*, 1985a; CORNIC, 1977; LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1926. Prairie calcaire: EMERIT & *al.*, 1999. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Tas de foin: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: SIMON, 1884b. — *Femelle.* Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002.

#### *Cresmatoneta mutinensis* (Canestrini, 1868)

##### *Formicina m.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1881a (*F. m.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1973; DENIS, 1950c; SIMON, 1881a (*F. m.*). Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1881a (*F. m.*), 1929; TIBERGHEN & *al.*, 1993b. Gard: EMERIT & *al.*, 1994. Gers: SIMON, 1881a (*F. m.*). Isère: SIMON, 1881a (*F. m.*), 1929. Lot-et-Garonne: SIMON, 1881a (*F. m.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a. Var: DENIS, 1935b; SIMON, 1881a (*F. m.*). — Midi de la France jusque dans l'Isère: SIMON, 1929. Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bord de canal: DENIS, 1950c. Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & *al.*, 1973. Joncs: TIBERGHEN & *al.*, 1993b. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marécage; prairie: SIMON, 1929. Ripisilve: EMERIT & *al.*, 1994. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1950c. Octobre: EMERIT & *al.*, 1994. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Août: CANARD, 1989. Octobre: EMERIT & *al.*, 1994.

***Dactylopiastes digiticeps*** (Simon, 1881)*Erigone d.***Répartition.** Bouches-du-Rhône: SIMON, 1881c (*E. d.*), 1884b, 1926. — Europe.***Diastanillus pecuarius*** (Simon, 1884)*Thyreosthenius p.***Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b; SIMON, 1926. Gard: SIMON, 1926. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; SIMON, 1884b (*T. p.*), 1926. — Autriche. **Altitude.** De 1550 m (DENIS, 1950b) jusqu'à 2350 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt, sous les pierres: SIMON, 1926. Sous une pierre recouvrant une fourmilière: DENIS, 1953a, 1955c, 1957a, 1959d; SIMON, 1884b. Tourbière: DENIS, 1952c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1950b. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1955c, 1957a, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1961b.***Dicymbium nigrum*** (Blackwall, 1834)*Erigone nigra.***Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b. Ariège: DENIS, 1960a, 1962g, 1967d. Aube: SIMON, 1884b. Aveyron: JEANNEL, 1926; SIMON, 1911. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884b. Cher: DENIS, 1962g. Corrèze: LE PERU, 2004. Dordogne: DENIS, 1962g. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1899, 1909a. Finistère: DENIS, 1940a; MANACH, 1995. Gard: JEANNEL, 1926; SIMON, 1911. Garonne (Haute-): DENIS, 1962g, 1967d. Gironde: SIMON, 1884b. Ile-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: LUCAS, 1878b (*E. n.*); SIMON, 1884b. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1955a, 1961a, 1962g; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1962g; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. "Seine": DENIS, 1962g; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b. Somme: SIMON, 1884b. Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois d'épicéas: DENIS, 1948b. Bois humides, mousses: SIMON, 1926. Bord de l'eau: SIMON, 1884b, 1926. Bord de ruisseau, joncs: DENIS, 1962g. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1961a. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes et hêtres, litière; forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Grotte: JEANNEL,1926; SIMON, 1911. Herbes humides: DENIS, 1933b, 1948b, 1959d. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 2003. Mousses: DENIS, 1933b. Mousses très humides: DENIS, 1962g. Pailles: DENIS, 1967d. Prairie: ASSELIN & al., 1989; CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1999. Prairie très humide: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sol humide, sous une pierre: DENIS, 1959d. Sous des genêts: DENIS, 1948b. Sous une pierre: LUCAS, 1878b. Sur le sable humide, herbes: DENIS, 1962g. Terrier de taupe: DENIS, 1967d. Tourbière: DENIS, 1950a. Vieilles bouses: DENIS, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1967d. Février: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Mars: EMERIT & al., 1999. Juin: DENIS, 1933b, 1948b, 1962g; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1959d; LE PERU, 2004. Août: LE PERU, 2004; LUCAS, 1878b. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Décembre: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. — *Femelle.* Février: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004. Avril, mai: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b, 1948b, 1950a; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1940a, 1959d, 1960a, 1962b; LE PERU, 2004. Août, septembre: LE PERU, 2004. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Décembre: LE PERU, 2004.***Dicymbium tibiale*** (Blackwall, 1836)**Répartition.** Eure: LANCELEVÉE, 1884. Finistère: MANACH, 1995. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1955a. Orne: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b, 1926. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Savoie (Haute-), "Seine": SIMON, 1926. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Vienne (Haute-): SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois humides, mousses: SIMON, 1926. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Prairie: CORNIC, 1977. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Femelle.* Octobre: LEDOUX & al., 2002.***Didectoprocne cirtensis*** (Simon, 1884)*Evansia c.***Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Vaucluse: SIMON, 1926 (*E. c.*). — Algérie. **Habitat.** Forêt; plage; sous une pierre: SIMON, 1926.***Diplocentria bidentata*** (Emerton, 1882)**Répartition.** Orne: CANARD, 1990a. — Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse. Holarctique.***Diplocentria mediocris*** (Simon, 1884)*Gongyliidiellum mediocre.***Répartition.** Isère: SIMON, 1884b (*G. m.*), 1926 (*G. m.*). — Allemagne, Italie, Europe. **Habitat.** Forêt de conifères, mousses épaisses: SIMON, 1926. Forêt de sapins, mousses épaisses: SIMON, 1884b.

***Diplocephalus arvernus*** Denis, 1948

**Répartition.** Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1750 m jusqu'à 1860 m (DENIS, 1948b). **Habitat.** Bord de ruisseau, mousses très humides; herbes très humides; sous une pierre: DENIS, 1948b. **Période.** — *Femelle.* Juin, juillet: DENIS, 1948b.

***Diplocephalus bicephalus*** (Simon, 1884)

*Prosoponcus b.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1884b (*P. b.*), 1926. — Bulgarie. **Habitat.** Mousses humides: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b. Mai: SIMON, 1884b.

***Diplocephalus connatus*** Bertkau, 1889

*D. adjacens*; *Streptosphaenus adjacens*.

**Répartition.** Cher: DENIS, 1943b (*D. a.*). Côtes-d'Armor, Finistère: DENIS, 1938a (*D. a.*). Gironde: SIMON, 1926 (*S. a.*). Nièvre: DENIS, 1943b (*D. a.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*D. a.*). — Allemagne, Grande-Bretagne, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de rivière, sous des pierres: DENIS, 1943b. Forêt: SIMON, 1926. Mare, sur un banc de sable; rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1938a, 1943b.

***Diplocephalus crassilobus*** (Simon, 1884)

*D. crassiloba*; *Prosoponcus crassiloba*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*D. c.*). — Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Mousses: SIMON, 1884b, 1926. **Période.** — *Mâle.* Septembre: SIMON, 1884b.

***Diplocephalus cristatus*** (Blackwall, 1833)

*Erigone cristata*; *Prosoponcus c.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. c.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924. Nord: DENIS, 1955a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a; MULLER & al., 1895. Savoie: HEIDT & al., 1998. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910. "Seine": DENIS, 1945a; SIMON, 1926. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. [DENIS, 1970 doute de la validité des citations du Puy-de-Dôme par DENIS, 1948b et des Hautes-Pyrénées par DENIS, 1953b]. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique, Nouvelle-Zélande, Îles Falkland. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, gravières: HEIDT & al., 1998. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Jardin: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; SIMON, 1926. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Pelouse: BERLAND, 1924. Prairie humide: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926. Sous une pierre: DENIS, 1948b; LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juin:

LEDoux & al., 2002. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1945a. Juillet: DENIS, 1948b, 1953b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

***Diplocephalus culminicola*** Simon, 1884

*Streptosphaenus c.*

**Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a, 1955c; SIMON, 1884b, 1926 (*S. c.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2240 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 3160 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Caillasse sèche: DENIS, 1957a. Près des névés: SIMON, 1884b. Sol humide, sous des pierres: DENIS, 1953a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1954a, 1957a. Août: DENIS, 1953a; SIMON, 1884b. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1954a, 1955c. Août: DENIS, 1953a.

***Diplocephalus foraminifer*** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone foraminifera*; *Prosoponcus f.*; *Prosoponcus thryxiger*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*P. f.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*P. f.*), 1926. Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. f.*); SIMON, 1926. Ariège: DENIS, 1961b, 1967d; SIMON, 1926. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a, 1955c, 1967d; SIMON, 1884b (*P. f.*), 1926. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b (*P. t.*), 1926. Savoie: MÜLLER, 1985. — Espagne, Italie. Europe. **Altitude.** De 990 m (DENIS, 1955c) jusqu'à 2900 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1955c. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1961b. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Près des névés, sous les pierres: SIMON, 1884b, 1926. Sol très humide, sous des pierres: DENIS, 1953a. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. **Période.** — *Mâle.* Janvier, mars: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1955c, 1961b. Août: DENIS, 1953a; SIMON, 1884b. Septembre: MÜLLER, 1985. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1954a, 1955c, 1961b. Août: DENIS, 1967d. Septembre: MÜLLER, 1985.

***Diplocephalus graecus*** (O. P.-Cambridge, 1872)

*D. dimidiatus*; *Entelecara graeca*; *Entelecara nuncia*; *Erigone nuncia*; *Plaesiocraerus dimidiatus*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1949c (*D. d.*), 1950c; SIMON, 1881c (*Erigone n.*), 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). Corse: SIMON, 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). Hérault: SIMON, 1881c (*Erigone n.*), 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). Loiret: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984 (*E. g.*); LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: DENIS, 1964c. Oise: SIMON, 1926 (*E. g.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*E. g.*), 1945b (*P. d.*); LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991 (*E. g.*); SIMON, 1881c (*Erigone n.*), 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984 (*E. g.*), 1989 (*E. g.*), 1990 (*E. g.*); SIMON, 1881c (*Erigone n.*), 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). Var: DENIS, 1934a (*E. g.*), 1945b (*P. d.*); SIMON, 1881c (*Erigone n.*), 1884b (*Entelecara n.*), 1926 (*E. g.*). Vendée: DENIS, 1964b. — Italie. Europe du Sud, Afrique du Nord. **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b.



Bois de peupliers: DENIS, 1949c. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990, 1991. Forêt, chênes: DENIS, 1964b. Forêt, clairière; friche: SIMON, 1926. Herbes humides: DENIS, 1964c. Herbes sèches: DENIS, 1945b. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Sables, au pied des herbes: DENIS, 1950c. **Période.** — *Mâle*. Juin, septembre, octobre: SIMON, 1881c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1945b, 1950c, 1964c. Juin: DENIS, 1949c, 1964b; LEDOUX & al., 2002. Décembre: DENIS, 1964b.

***Diplocephalus helleri*** (L. Koch, 1869)

*Erigone eborodunensis*; *Plaesiocraerus eborodunensis*; *Plaesiocraerus h.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*P. e.*), 1884b (*P. h.*), 1926 (*P. h.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*P. h.*), 1926 (*P. h.*). Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. e.*); SIMON, 1926 (*P. h.*). Ardèche: SIMON, 1884b (*P. h.*), 1926 (*P. h.*). Isère: SIMON, 1884b (*P. e.*), 1926 (*P. h.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; SIMON, 1926 (*P. h.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** De 2350 m (LEDOUX & al., 1996b) jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1926). **Habitat.** Près des neiges: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

***Diplocephalus latifrons*** (O. P.-Cambridge, 1863)

*Erigone l.*; *Plaesiocraerus alpinus* [err.]; *Plaesiocraerus l.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b [*Plaesiocraerus alpinus*, err. selon SIMON, 1926]. Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*P. l.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*P. l.*); SIMON, 1884b (*P. l.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Isère: SIMON, 1884b (*P. l.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1955a. Oise: SIMON, 1884b (*P. l.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1955c. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1884b (*P. l.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. l.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884b (*P. l.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*P. l.*); SIMON, 1884b (*P. l.*). Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1926 (*P. l.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois: DENIS, 1959d, 1967d. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois d'épicéas, herbes: DENIS, 1948b. Bois de sapins, mousses; bord de mare: SIMON, 1884b. Bord de rivière, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1961b. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Bord des sources: SIMON, 1884b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas, litière: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de chênes et hêtres, litière: LE PERU, 2004. Forêt de hêtres, herbes: DENIS, 1948b. Forêt,

litière: EMERIT & al., 1997. Fossé, sous les roseaux couchés: DENIS, 1962b. Mousses: SIMON, 1884b, 1926. Plantation de peupliers: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Sur *Juniperus phoenicea*: DENIS, 1950c. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1967d. Février: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b. Juillet: DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Février: DENIS, 1967d. Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1948b, 1962b; EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1955c, 1959d; LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: DENIS, 1962b. Décembre: DENIS, 1967d.

***Diplocephalus longicarpus*** (Simon, 1884)

*Plaesiocraerus l.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*P. l.*), 1926 (*P. l.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*P. l.*); SIMON, 1884b (*P. l.*), 1926 (*P. l.*). — Italie. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926. Mousses humides: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle*. Janvier, février, mai, septembre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Janvier, février, mai, septembre: SIMON, 1926.

***Diplocephalus lusiscus*** (Simon, 1872)

*Plaesiocraerus l.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1959a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884b (*P. l.*), 1910, 1926 (*P. l.*). Garonne (Haute-): SIMON, 1926 (*P. l.*). Pyrénées (Hautes-): JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1911, 1913, 1926 (*P. l.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b; FAGE, 1931 (*P. l.*); JEANNEL, 1926; SIMON, 1926 (*P. l.*). — Allemagne, Belgique. **Habitat.** Grotte: DENIS, 1953b, 1959a; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884b, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1926. **Période.** — *Mâle*. Novembre: DENIS, 1959a. — *Femelle*. Novembre: DENIS, 1953b, 1959a.

***Diplocephalus permixtus*** (O. P.-Cambridge, 1871)

*Plaesiocraerus p.*; *Streptosphaenus p.*

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946 (*S. p.*); SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*S. p.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1939a, 1940a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Nièvre: DENIS, 1943b. Nord: DENIS, 1943d, 1955a. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*S. p.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*P. p.*); SIMON, 1926 (*S. p.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bord de mare: DENIS, 1940a. Détritrus: GUIBÉ, 1943. Dune, sous les oyats: DENIS, 1937d. Forêt: SIMON, 1926. Herbes humides: DENIS, 1948b. Marais, sous des roseaux couchés: DENIS, 1943d. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003; ROSELLE, 1891. Mousses épaisses: SIMON, 1884b. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Sous un tas d'herbes: DENIS, 1943b. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1940a. Octobre: DENIS, 1943d. Novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: GUIBÉ, 1943. — *Femelle*. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1937d, 1943b, 1948b; EMERIT & al., 1999. Septembre: EMERIT

& al., 1997, 2003. Octobre : DENIS, 1943d. Novembre : EMERIT & al., 2003.

***Diplocephalus picinus*** (Blackwall, 1841)

*Entelecara meticulousa*; *Plaesiocraerus p.*

**Répartition.** Calvados : GUIBÉ, 1943, 1946 (*P. p.*). Cher : DENIS, 1943b. Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & al., 1997. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; SIMON, 1918 (*E. m.*), 1926 (*E. m.*). Morbihan : DENIS, 1938a. Nord : DENIS, 1945b (*P. p.*), 1955a; EMERIT & al., 1999. Oise : SIMON, 1926 (*P. p.*). Pas-de-Calais : DENIS, 1956, 1961a. Puy-de-Dôme : DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. "Seine" : CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977. Seine-Maritime : CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*P. p.*); SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Seine-et-Marne : COCQUEMOT & al., 1989; DENIS, 1946c (*P. p.*). Vendée : DENIS, 1962b, 1962d. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois : BRAUD & al., 2005. Bois de hêtres, chênes et charmes, litière : EMERIT & al., 1997. Bois, bord de ruisseau : DENIS, 1943b. Bord d'étang : DENIS, 1938a. Champ de céréales : COCQUEMOT & al., 1989. Détritus d'inondation : DENIS, 1946c. Forêt : DENIS, 1955a, 1956, 1961a; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1926. Forêt de châtaigniers : CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière : CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt, litière humide : DENIS, 1938a. Fossé, détritius : GUIBÉ, 1943. Herbes sèches et litière : DENIS, 1945b. Marécage : DENIS, 1962b, 1962d. Prairie : CORNIC, 1977; SIMON, 1918. Talus humides, herbes : DENIS, 1948b. Tourbière : EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai : DENIS, 1945b. Juin : DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1926. Juillet : SIMON, 1926. — *Femelle.* Février : DENIS, 1946c. Mars : GUIBÉ, 1943. Mai : DENIS, 1945b. Juin : DENIS, 1938a, 1943b, 1948b; EMERIT & al., 1997, 1999; SIMON, 1926. Juillet : DENIS, 1959d, 1962b, 1962d; SIMON, 1926.

***Diplocephalus procer*** (Simon, 1884)

*Plaesiocraerus p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône : SIMON, 1926 (*P. p.*). Var : SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Vaucluse : SIMON, 1926 (*P. p.*). — Italie. Europe du Sud. **Habitat.** Forêt de pins : SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Mai, novembre : SIMON, 1926. — *Femelle.* Mai, novembre : SIMON, 1926.

***Diplocephalus protuberans*** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Plaesiocraerus p.*

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-) : SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Ariège : DENIS, 1961b, 1967d; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884b (*P. p.*), 1911, 1926 (*P. p.*). Gard : SIMON, 1926 (*P. p.*). Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a; DRESKO, 1947a (*P. p.*); SIMON, 1926 (*P. p.*). Gers : DENIS, 1959b. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1953b; SIMON, 1884b (*P. p.*). Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*P. p.*), 1952c; SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*P.*

*p.*). — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** De 800 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 2330 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois de conifères, mousses : SIMON, 1926. Bois de sapins, mousses humides : SIMON, 1884b. Bord d'étang, fissures de la boue : DENIS, 1952c. Bord de lac, sous des pierres; bord de torrent, sous les pierres et mousses : DENIS, 1950b. Forêt de pins, bord de ruisseau, sous les pierres; gorge humide, mousses : BOSMANS & al., 1985a. Grotte : DENIS, 1959b; DRESKO, 1947a; SIMON, 1911. Herbes humides : DENIS, 1933b. Litière : DENIS, 1967d. Prairie : BOSMANS & al., 1985a. Rivière souterraine : JEANNEL, 1926. Tourbière, mousses : DENIS, 1951c. **Période.** — *Mâle.* Février, mars : DENIS, 1967d. Mai : DENIS, 1933b, 1967d. Juillet : DENIS, 1950b. Septembre : DENIS, 1951c. — *Femelle.* Février, mars : DENIS, 1967d. Mai : DENIS, 1933b, 1959b, 1967d. Juin : DENIS, 1954a. Juillet : DENIS, 1950b, 1953b, 1961b. Août : DENIS, 1952c. Septembre : DENIS, 1951c. — *Femelle avec cocon.* Juillet : DENIS, 1950b.

***Diplocephalus pullinus*** Simon, 1918

*Streptosphaenus p.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** [Aucune localité précise. SIMON, 1926 (*S. p.*) indique « Alpes du Dauphiné » pour la récolte d'un seul spécimen mâle]. — Connue seulement de France.

***Diplocephalus rectilobus*** (Simon, 1884)

*D. rectiloba*; *Prosoponcus rectiloba*.

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1884b (*P. r.*), 1926 (*D. r.*). Savoie (Haute-) : SIMON, 1926 (*D. r.*). — Connue seulement de France.

***Diplostyla concolor*** (Wider, 1834)

*Bathyphantes c.*; *Stylophora c.*

**Répartition.** Ariège : DENIS, 1960a (*B. c.*). Calvados : ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*S. c.*). Corse : SIMON, 1884a (*B. c.*), 1929 (*S. c.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a (*B. c.*). Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*B. c.*); SIMON, 1899 (*B. c.*), 1909a (*B. c.*). Finistère : ASSELIN, 1990; DENIS, 1940a (*B. c.*); MANACH, 1995. Gironde : DENIS, 1952a (*B. c.*). Hérault : LOPEZ & al., 1978b, 1979. Ille-et-Vilaine : ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique : JUBERTHIE, 1954 (*B. c.*). Loiret : LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche : ASSELIN, 1990; BERLAND, 1924 (*B. c.*); PÉTILLON & al., 2004. Morbihan : ASSELIN, 1990. Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Orne : ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais : DENIS, 1958a (*B. c.*); EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme : DENIS, 1948b (*B. c.*). Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 (*S. c.*); DENIS, 1960a (*B. c.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*S. c.*), 1961b (*B. c.*), 1967d (*B. c.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Rhin (Bas-) : DENIS, 1950a (*B. c.*); LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (*B. c.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (*B. c.*). Savoie : HEIDT & al., 1998. "Seine" : CHRISTOPHE, 1974 (*B. c.*); COCQUEMOT & al., 1991; DRESKO, 1947c (*S. c.*). Seine-Maritime : CORNIC, 1977 (*B. c.*); LANCELEVÉE, 1884 (*B. c.*). Seine-et-Marne : COCQUEMOT & al., 1989; DOIGNON,

1976 (*B. c.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*B. c.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941 (*B. c.*), 1962b (*B. c.*), 1964b (*B. c.*), 1965c (*B. c.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*S. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (DENIS, 1960a; LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de mare: DENIS, 1941. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, gravières: HEIDT & al., 1998. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Champ: ROSELLE, 1891. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: DENIS, 1958a; LANCELEVÉE, 1884. Forêt claire, pelouse: LEDOUX, 2000. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt, bord d'étang: DENIS, 1950a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, mousses très humides: DENIS, 1961b. Fossé: JUBERTHIE, 1954. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1884a, 1929; VEILLON, 1997. Grotte: LOPEZ & al., 1978b, 1979. Lande: VEILLON, 1997. Litière: EMERIT & al., 1997. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Maison: BRAUD & al., 2005. Marécage: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1929. Marécages, sous les pierres et les détritrus: SIMON, 1884a. Pelouse: BERLAND, 1924. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 1996a, 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1940a; LEDOUX & al., 1996a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous les pierres et les détritrus: SIMON, 1929. Sous une pierre: DENIS, 1948b. Tas de pierres: JUBERTHIE, 1954. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b. Février: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2003; VEILLON, 1997. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1948b, 1950a, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1960a, 1961b. Septembre: DENIS, 1962b, 1967d; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b, 1952a. Février: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Avril: DRESKO, 1947c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1941, 1948b, 1950a; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1961b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000.

#### *Dismodicus bifrons* (Blackwall, 1841)

*D. elevatus* [err.].

**Répartition.** Aisne, Aube: SIMON, 1884b, 1926. Calvados: ASSELIN & al., 1989. Cher: DENIS, 1943b [*D. elevatus*, err. selon DENIS, 1944b], 1944b. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1926. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Marne: SIMON, 1926. Morbihan: CANARD, 1990a. Nièvre: DENIS, 1943b [*D. elevatus*, err. selon DENIS, 1944b], 1944b. Nord: DENIS, 1939b [*D. elevatus*, err. selon

DENIS, 1944b], 1955b. Oise: SIMON, 1887a, 1926. Pas-de-Calais: DENIS, 1956, 1958a, 1961a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. "Seine": DENIS, 1944b; SIMON, 1884b, 1926. Somme: ROSELLE, 1891; SIMON, 1926. [La citation des Pyrénées-Orientales par DENIS, 1933b est erronée selon DENIS, 1944b, et se rapporte à *D. fungiceps*]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de chênes; bois de hêtres: EMERIT & al., 1997. Bois touffus: SIMON, 1884b. Bord de rivière, roseaux: DENIS, 1944b. Forêt: DENIS, 1939b, 1955b, 1956, 1958a, 1961a. Forêt, bord d'étang: DENIS, 1950a. Forêt, buissons et hautes herbes: SIMON, 1926. Herbes sèches: DENIS, 1944b. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & al., 1999. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche; prairie très humide: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1939b; LE PERU, 2004; SIMON, 1926. Juin: EMERIT & al., 1997; SIMON, 1926. — *Femelle*. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1943b, 1944b, 1950a; EMERIT & al., 1997, 1999; SIMON, 1926.

#### *Dismodicus elevatus* (C. L. Koch, 1838)

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884b, 1926. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Lozère, Meuse: SIMON, 1926. Nord: DENIS, 1963b. Oise: SIMON, 1926. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b, 1926. [Les citations du Cher et de la Nièvre par DENIS, 1943b, celle du Nord par DENIS, 1939b, sont erronées selon DENIS, 1944b, et se rapportent à *D. bifrons*]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Branches basses des pins: SIMON, 1884b. Épicéas: DENIS, 1948b. Forêt: DENIS, 1963b. Forêt de conifères: SIMON, 1926. Jardin: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Mai: LE PERU, 2004. Juin: SIMON, 1926. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1948b, 1963b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; SIMON, 1926.

#### *Dismodicus fungiceps* Denis, 1944

*D. bifrons* [err.].

**Répartition.** Dordogne, Lot-et-Garonne: DENIS, 1944b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b [*D. bifrons*, err. selon DENIS, 1944b], 1944b. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois de châtaigniers, bord d'un petit ruisseau; bord de l'eau, herbes, joncs et roseaux: DENIS, 1944b. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1933b, 1944b. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1944b. Juin: DENIS, 1944b.

#### *Donacochara speciosa* (Thorell, 1875)

**Répartition.** Eure: EMERIT & al., 2003. Nord: DENIS, 1943d, 1955b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Seine, Somme: SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Marais, branches basses de *Salix*; marais, sous des roseaux couchés: DENIS, 1943d. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003; SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle*. Octobre: DENIS, 1943d. Novembre:

EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle*. Septembre: EMERIT & *al.*, 1999. Octobre: DENIS, 1943d.

***Drapetisca socialis*** (Sundevall, 1833)

*Linyphia s.*

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; MARC, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Morbihan: ASSELIN, 1990. Nord: GOULLIART, 1979a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; LEBORGNE & *al.*, 1998. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; LUCAS, 1875 (*L. s.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Yonne: DRESCO, 1950. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (DENIS, 1953b; LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996b. Bois: LUCAS, 1875. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, écorces: CHANSIGAUD, 1991. Bois, troncs d'arbres: SIMON, 1884a. Bétulaie, herbes: EMERIT & *al.*, 2003. Carrière: DRESCO, 1950. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes et hêtres, troncs d'arbres: LE PERU, 2004. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996c. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. Sur le tronc des arbres: GOULLIART, 1979a. Troncs de hêtres: SIMON, 1909a. Troncs des arbres à écorces lisses: SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996b. Septembre: DRESCO, 1950; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle*. Août: LE PERU, 2004. Septembre: DENIS, 1953b; EMERIT & *al.*, 1997, 2003; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c; LUCAS, 1875.

***Drepanotylus uncatulus*** (O. P.-Cambridge, 1873)

*Hilaira uncata*.

**Répartition.** Cantal: SIMON, 1884a (*H. u.*), 1926 (*H. u.*). Finistère: MANACH, 1995. Loire: SIMON, 1926 (*H. u.*). Nord: DENIS, 1955b. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2100 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois de sapins, mousses: SIMON, 1884a. Bord d'étang: BOSMANS & *al.*, 1985a. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1948b. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1926. Tourbière: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle*. Octobre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1948b. Octobre: SIMON, 1926.

***Dresconella nivicola*** (Simon, 1884)

*Lophocarenum n.*; *Trichopterna n.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b; SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*T. n.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. — Connue seulement de France. **Altitude.** De

1920 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 2500 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bord d'étang, sous des pierres noyées du rivage: DENIS, 1952c. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b. Près des neiges: SIMON, 1884b, 1926. Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1950b. Août: DENIS, 1952c; SIMON, 1884b. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1950b, 1957a.

***Entelecara acuminata*** (Wider, 1834)

*Erigone altifrons*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. a.*); SIMON, 1884b. Aube: SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Eure-et-Loire: SIMON, 1884b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Manche: KERVILLE, 1898. Nord: DENIS, 1955b. Oise: SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: DENIS, 1955b, 1956, 1961a; EMERIT & *al.*, 1999. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b. Somme: ROSELLE, 1888a. Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1884b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Vienne (Haute-): SIMON, 1884b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, chênes: DENIS, 1938a. Bord de mare: LANCELEVÉE, 1884. Branches basses des pins; bruyères: SIMON, 1884b. Bruyères, ajoncs, branches basses des pins: SIMON, 1926. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Forêt: DENIS, 1956, 1961a, 1964b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1965c. Herbes sèches: DENIS, 1934a. Lande à genêts: ROSELLE, 1888a. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: DENIS, 1934a. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: DENIS, 1934a, 1965c; LESSERT, 1904, 1910. Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: DENIS, 1934a, 1965c; EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1941; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LESSERT, 1904, 1910. Octobre: DENIS, 1963c.

***Entelecara aestiva*** Simon, 1918

**Répartition.** Charente: SIMON, 1918, 1926. Corse: MILLIDGE, 1979. Dordogne: SIMON, 1926. Maine-et-Loire: SIMON, 1918, 1926. Nord: DENIS, 1961a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1999a. [Les citations du Morbihan par DENIS, 1938a et de la Nièvre par DENIS, 1943b sont erronées selon DENIS, 1945b, et se rapportent à *Hylyphantes nigritus*]. — Espagne, Italie. **Habitat.** Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & *al.*, 1999a. Forêt; forêt, sous un tronc abattu: DENIS, 1961a. Mousses très humides: DENIS, 1955c. Prairie: SIMON, 1918, 1926. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1933b. Juin: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1999a; MILLIDGE, 1979. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b. Juin: DENIS, 1933b, 1961a; MILLIDGE, 1979. Juillet: DENIS, 1955c.

*Entelecara cacuminum* Denis, 1954

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 3000 m (DENIS, 1954a). **Période.** — *Femelle.* Juillet : DENIS, 1954a.

*Entelecara congenera* (O. P.-Cambridge, 1879)

*E. gallica.*

**Répartition.** Doubs : EMERIT & al., 1997. [Citée de « plusieurs localités françaises non précisées » par SIMON, 1918 (*E. g.*) et par SIMON, 1926]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois de chênes : EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Femelle.* Juin : EMERIT & al., 1997.

*Entelecara errata* O. P.-Cambridge, 1913

**Répartition.** Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a. — Grande-Bretagne. Europe, Russie. **Altitude.** 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de chênes : LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle.* Mai, juillet : LEDOUX & al., 1996a.

*Entelecara erythropus* (Westring, 1851)

**Répartition.** Aisne : SIMON, 1884b, 1926. Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Calvados : DENIS, 1942. Charente : SIMON, 1926. Dordogne : DENIS, 1945b. Finistère : DENIS, 1938a. Marne : SIMON, 1926. Morbihan : CANARD, 1990a. Nord : DENIS, 1945b, 1955b. Orne : CANARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-) : SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1952c. Rhin (Haut-) : DENIS, 1950a. Seine, Somme : SIMON, 1884b, 1926. Vienne (Haute-), Yonne : SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2290 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Ajoncs et genêts : DENIS, 1938a. Bois marécageux : SIMON, 1926. Bois, au pied des arbres : DENIS, 1945b. Bord d'étang, sous des pierres : DENIS, 1952c. Bord de rivière, galets : RAPHAËL & al., 1992. Haie de buis ; herbes sèches ; litière ; marais, sous l'écorce d'un saule : DENIS, 1945b. Tourbière : DENIS, 1950a. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin : DENIS, 1945b. Août : DENIS, 1952c. — *Femelle.* Mai : DENIS, 1945b. Juin : DENIS, 1938a, 1945b, 1950a. Juillet : DENIS, 1945b.

*Entelecara flavipes* (Blackwall, 1834)

**Répartition.** Cher : DENIS, 1943b, 1945b. Dordogne : SIMON, 1926. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1884b, 1926. Gironde : SIMON, 1926. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Oise : SIMON, 1884b, 1887a, 1926. Orne : CANARD, 1990a ; SIMON, 1884b, 1926. Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992. "Seine" : COCQUEMPOT & al., 1991 ; DENIS, 1945b ; SIMON, 1884b, 1926. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1926. Seine-et-Marne : SIMON, 1884b, 1926. Somme : ROSELLE, 1888a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Habitat.** Ancienne vigne ; bois de chênes : EMERIT & al., 1997. Bois, clairière : SIMON, 1884b. Bois, herbes et litière ; bois, sur un noisetier : DENIS, 1943b, 1945b. Champ de céréales : COCQUEMPOT & al., 1991. Forêt : SIMON, 1926. Friche : PASQUET & al., 1992. Prairie : LEDOUX & al., 2002 ; PASQUET & al., 1992 ; SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Avril : SIMON, 1926. Juin : DENIS, 1943b, 1945b ;

EMERIT & al., 1997. — *Femelle.* Juin : DENIS, 1943b, 1945b ; EMERIT & al., 1997 ; LEDOUX & al., 2002. Septembre : EMERIT & al., 1997.

*Entelecara omissa* O. P.-Cambridge, 1902

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Loir-et-Cher : HENRY, 1981. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Marécage : HENRY, 1981 ; VILLEPOUX, 1990b.

*Entelecara schmitzi* Kulczynski, 1905

**Répartition.** Dordogne : DENIS, 1945b. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1943c, 1945b. — Madère. **Habitat.** Ajoncs ; herbes sèches ; sur un chêne : DENIS, 1945b. **Période.** — *Femelle.* Juin : DENIS, 1945b.

*Entelecara truncatifrons* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone t.* ; *Stajus t.*

**Répartition.** Corse : PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. t.*) ; SIMON, 1884b (*S. t.*), 1926 (*S. t.*). Gard : SIMON, 1926 (*S. t.*). — Algérie.

*Entelecara turbinata* Simon, 1918

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Ariège : SIMON, 1918, 1926. — Connue seulement de France.

*Eperigone trilobata* (Emerton, 1882)

**Répartition.** Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. — Allemagne, Belgique, Suisse. Holarctique.

*Erigone arctica* (White, 1852)

**Répartition.** Manche : CANARD, 1990a. Pas-de-Calais : BONTE, 2000. Seine-Maritime : BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Holarctique. **Habitat.** Estuaire, schorre : BONTE, 2000. Jardin : BERENGER-LEVEQUE & al., 1994. **Période.** — *Mâle.* Mai : BONTE, 2000. — *Femelle.* Mai : BONTE, 2000.

*Erigone atra* Blackwall, 1833

*E. lantosquensis.*

**Taxonomie.** Certaines espèces du genre *Erigone* ont parfois été confondues. À propos des espèces *E. atra*, *E. longipalpis*, *E. remota* et *E. tirolensis*, SIMON, 1926 indique : « Je renonce à donner les caractères de ces quatre espèces, ceux qui ont été indiqués me paraissent plutôt individuels que spécifiques ». La répartition de ces espèces est à prendre avec réserve. **Répartition.** Ain : HEIDT & al., 1998 ; VILLEPOUX, 1990b. Aisne : SIMON, 1884b. Alpes-Maritimes : SIMON, 1884b (*E. l.*). Ariège : DENIS, 1960a. Aube : SIMON, 1884b. Calvados : ASSELIN & al., 1989 ; GUIBÉ, 1946 ; SIMON, 1884b. Corrèze : LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor : CANARD, 1990a ; DENIS, 1938a ; SALMON, 1959. Eure : EMERIT & al., 2003 ; LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1884b. Finistère : CANARD, 1990a ; DENIS, 1938a, 1940a ; MANACH, 1995. Ile-et-Vilaine : CANARD, 1990a ; DENIS, 1938a. Isère : SIMON, 1884b. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loiret : COCQUEMPOT & al., 1984 ; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; NOËL & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924 ; CANARD, 1990a ; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan :

- CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1955b; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; DENIS, 1956, 1961a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a; MULLER & al., 1895. Savoie: HEIDT & al., 1998. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; DENIS, 1945a; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990; SIMON, 1884b. Somme: DENIS, 1955b; SIMON, 1884b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b. Vosges: SIMON, 1884b. — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1952c, 1962b. Bord d'étang, mousses humides: DENIS, 1948b. Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de lac, détritiques: DENIS, 1950a. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1948b, 1950b. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, sur la vase: SALMON, 1959. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt: DENIS, 1956, 1961a. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: VEILLON, 1997. Lieux humides: SIMON, 1926. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: DENIS, 1959d. Peupliers: NOËL & al., 2005. Prairie: ASSELIN & al., 1989; CORNIC, 1977; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a, 1996b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Roseaux: NOËL & al., 2005. Sous une pierre: DENIS, 1959d. Tourbière: DENIS, 1948b, 1950b, 1952c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: LE PERU, 2004. Mars: EMERIT & al., 1999. Avril: EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1945a, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1950b, 1952c, 1959d; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1962b. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003; LE PERU, 2004. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: BONTE, 2000; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1945a, 1948b, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1950b, 1952c, 1959d, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1962b; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: EMERIT & al., 1999. Novembre: EMERIT & al., 2003.
- Erigone cristatopalpus* Simon, 1884**
- Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b, 1926. Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935; SIMON, 1884b, 1926. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** De 1860 m (LEDOUX & al., 1996b) jusqu'à 2300 m (BERLAND, 1935). **Habitat.** Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996b. Sous une pierre: BERLAND, 1935. **Période.** — *Mâle.* Août: BERLAND, 1935; LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1996b.
- Erigone dentigera* O. P.-Cambridge, 1874**
- E. capra.*
- Taxonomie.** La synonymie *E. capra* Simon, 1884 = *E. dentigera* est établie par ESKOV, 1994. **Répartition.** Isère: SIMON, 1884b (*E. c.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*E. c.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c (*E. c.*). — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1926 (*E. c.*). Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse (*E. c.*). Holarctique. **Altitude.** 1980 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Tourbière: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a, 1996c.
- Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)**
- Gongylidium d.*
- Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1942, 1946. Cher: DENIS, 1943b. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1884b, 1926. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; MANACH, 1995; PIERRE & al., 1947. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; CANARD, 1990a; KERVILLE, 1898; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1955b, 1961a. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1953a, 1953b, 1955c, 1967d. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Savoie: HEIDT & al., 1998; MÜLLER, 1885. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; COCQUEMPOT & al., 1991; DENIS, 1945a; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976 (*G. d.*). Somme: ROSELLE, 1891. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée:

DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Arrière-dune, buisson: DENIS, 1964b. Bord d'étang: BOSMANS & al., 1985a, 1985a; DENIS, 1938a, 1952c. Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de lac: DENIS, 1950b. Bord de lac tourbeux, mousses et herbes: DENIS, 1955c. Bord de lac, détritus: DENIS, 1950a. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1948b. Bord de mare: DENIS, 1940a, 1941. Bord de mare, sous des pierres: DENIS, 1953a. Bord de rivière: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1938a, 1953b; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, prairie humide: DENIS, 1939a. Bord de rivière, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1967d. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau, mousses: DENIS, 1948b. Bord de ruisseau, sous des pierres; bord de torrent, mousses: DENIS, 1950b. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Détritus d'inondation: DENIS, 1967d. Dune: LEDOUX & al., 1999a; ROSELLE, 1891. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, schorre: PIERRE & al., 1947. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt: DENIS, 1961a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt, bord de ruisseau, sous des galets: DENIS, 1950a. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1948b, 1950b. Jardin: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979. Lieux humides: SIMON, 1884b, 1926. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003; GUIBÉ, 1942; ROSELLE, 1891; VILLEPOUX, 1990b. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse: CANARD, 1989. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Pelouse, creux: DENIS, 1957a. Peupliers: NOËL & al., 2005. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Plage, sous les algues; plage, sur le sable: DENIS, 1964b. Prairie: ASSELIN & al., 1989; BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a, 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a, 1985a; BRAUD & al., 2005; DENIS, 1940a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a, 1996b. Prairie très humide: DENIS, 1950b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, pelouse: LEDOUX, 2000. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Sous un tas de pierres: DENIS, 1940a. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997; MÜLLER, 1985. Sur un mur: DENIS, 1964b. Talus humides, herbes: DENIS, 1948b. Tourbière: DENIS, 1950b, 1952c; LEDOUX & al., 1996a. Zone intercodidale, au pied des touffes de *Fucus*: BERLAND, 1924. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Mars: GUIBÉ, 1942. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1943b, 1945a, 1948b, 1950a, 1964b, 1967d; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1955c, 1961b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a; PIC-

KARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Février: CANARD, 1989. Mars: GUIBÉ, 1942. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1945a, 1948b, 1950a, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1939a, 1940a, 1950b, 1953b, 1955c, 1957a, 1961b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1953a, 1953b; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1959c; EMERIT & al., 1997; MÜLLER, 1985. Novembre: LEDOUX, 2000.

#### *Erigone fluctuans* O. P.-Cambridge, 1875

[Femelle inconnue. Cette espèce, proche d'*Erigone subtilis* (= *Agyneta s.*), n'est pas reprise par SIMON, 1929. Elle est citée dans PLATNICK, 2004, mais est considérée *nomen dubium* par CANARD, 2005]. **Répartition.** "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b. — Connue seulement de France.

#### *Erigone jugorum* Simon, 1884

**Répartition.** Ariège: SIMON, 1926. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; SIMON, 1926. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a, 1967d; SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a, 1960a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; SIMON, 1926. — Espagne. **Altitude.** De 1700 m (Bosmans & al., 1985a) jusqu'à 2560 m (DENIS, 1967d). **Habitat.** Bord d'étang, sous des pierres; bord d'un névé, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de lac tourbeux, mousses et herbes; bord de lac, herbes humides: DENIS, 1955c. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b, 1953a, 1955c. Bord de ruisseau: SIMON, 1926. Bord de torrent: DENIS, 1955c. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Sol très humide, sous des pierres; sous les pierres en bordure de névé: DENIS, 1954a. Sous une pierre: DENIS, 1950b. Tourbière: DENIS, 1950b, 1952c, 1955c. Tourbière, mousses: DENIS, 1953a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a. Août: DENIS, 1952c, 1953a, 1967d. Septembre: DENIS, 1960a. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1954a.

#### *Erigone longipalpis* (Sundevall, 1830)

##### *E. meridionalis.*

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres *Erigone*. Voir la note sous *E. atra*. **Répartition.** Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985. Aude: SIMON, 1884b (*E. m.*), 1926. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BIGOT, 1983. Côtes-d'Armor: SALMON, 1959. Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Gironde: SIMON, 1884b. Hérault: SIMON, 1926. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Manche: CANARD, 1990a; GUIBÉ, 1946; KERVILLE, 1898; PÉTILLON & al., 2004; SIMON, 1926. Morbihan: SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Somme: SIMON, 1884b. Vendée: DENIS, 1959c, 1962b. Vosges:



SIMON, 1884b, 1926. — Toute la région maritime du nord et de l'ouest: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (MÜLLER, 1985). **Habitat.** Bord de mer: SIMON, 1884b. Boue saumâtre, herbes: DENIS, 1962b. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Littoral: SALMON, 1959. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral marécageux: SIMON, 1926. Littoral, pré salé: DENIS, 1959c. Plage: BIGOT, 1983. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Terrains salés: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Juin: LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1959c. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1959c. Septembre: MÜLLER, 1985.

*Erigone promiscua* (O. P.-Cambridge, 1873)

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Finistère: MANACH, 1995. Gironde: SIMON, 1884b. Marne: SIMON, 1926. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Vendée: DENIS, 1962b. — Région maritime du sud-ouest dans les Landes: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Europe, Russie. **Habitat.** Dune et arrière-dune avec marais tourbeux; estuaire, schorre: BONTE, 2000. Marais salant: SIMON, 1884b. Sable: DENIS, 1962b. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000. Septembre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000. Novembre: DENIS, 1962b.

*Erigone remota* L. Koch, 1869

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres *Erigone*. Voir la note sous *E. atra*. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b. Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935; SIMON, 1926. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1951c. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1926. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** De 2000 m jusqu'à 3000 m (SIMON, 1926). **Habitat.** Bord de lac, sous des pierres; bord de ruisseau, mousses: DENIS, 1950b. Bord de torrent, herbes humides: DENIS, 1951c. Sous une pierre: BERLAND, 1935. **Période.** — *Mâle.* Août: BERLAND, 1935. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1950b. Septembre: DENIS, 1951c.

*Erigone tenuimana* Simon, 1884

*E. tenuimanus*.

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926 (*E. t.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b (*E. t.*), 1926 (*E. t.*). Drôme: SIMON, 1926 (*E. t.*). — Suisse.

*Erigone tirolensis* L. Koch, 1872

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres *Erigone*. Voir la note sous *E. atra*. **Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926. — Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Holarctique.

*Erigone vagans* (Audouin, 1826)

*Erigonia v.*; *Erygona v.*; *Gongylidium v.*; *Prinerigone v.*

**Taxonomie.** L'espèce *Erigone vagans* (Sav. & Aud., 1825) a été transférée dans le nouveau genre *Prinerigone*

par MILLIDGE, 1988. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998 (*P. v.*); VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1953b, 1960a, 1961b, 1967d. Aube, Aude: SIMON, 1884b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983 (*Erigonia v.*), 1985; DENIS, 1950c; SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b. Corse: SIMON, 1884b; WUNDERLICH, 1977. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gironde: DENIS, 1951b, 1952a; SIMON, 1884b. Hérault: SIMON, 1884b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loire-Atlantique: SIMON, 1884b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Lot: SIMON, 1884b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*P. v.*); NOËL & al., 2005, 2005 (*P. v.*). Manche: CANARD, 1990a; GUIBÉ, 1946. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b. Orne: SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000 (*P. v.*); EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a; SIMON, 1884b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a; SIMON, 1884b. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; DENIS, 1945a; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976 (*G. v.*); SIMON, 1884b. Somme: SIMON, 1884b. Var: DENIS, 1934a, 1935a; SIMON, 1884b, 1898c. Vaucluse: BIGOT & al., 1985; FAVET, 1984; LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1964b. Vosges: SIMON, 1884b. Yonne: LUCAS, 1872 (*Erygona v.*); SIMON, 1884b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*P. v.*). Ancien Monde (*P. v.*). **Altitude.** Jusqu'à 2550 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Bord d'étang: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1938a, 1952c, 1962b. Bord d'étang, prairie: BOSMANS & al., 1985a. Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de l'eau: LESSERT, 1910; SIMON, 1884b. Bord de lac tourbeux: DENIS, 1950b. Bord de lac tourbeux, mousses et herbes: DENIS, 1955c. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1948b, 1950b, 1955c. Bord de mare: DENIS, 1941. Bord de rivière: DENIS, 1953b; FAVET, 1984; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, sable: BIGOT & al., 1985. Bord de rivière, sous des pierres; bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1950b, 1952c, 1953a. Bord de torrent, mousses: DENIS, 1950b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés; estuaire, terrain salé: DENIS, 1951b. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins, ajoncs: DENIS, 1962b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Forêt, litière: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1967d. Herbes humides: DENIS, 1934a, 1950b, 1953a. Jardin: CLARK & al., 1970. Lande à genêts: LEDOUX



& *al.*, 1996a. Lieux humides: LUCAS, 1872. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marécage: EMERIT & *al.*, 1999, 2003; SIMON, 1926; VILLEPOUX, 1990b. Plage: SIMON, 1926. Plage, rouleaux de *Fucus* secs: CLARK & *al.*, 1970. Plage, sous les algues: DENIS, 1964b. Plantation de peupliers: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1999a; NOËL & *al.*, 2005, 2005. Prairie alpestre: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie humide: DENIS, 1940a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & *al.*, 1996a. Prairie très humide: DENIS, 1950b. Ripisilve, pelouse: LEDOUX, 2000. Roseaux: NOËL & *al.*, 2005. Tourbière: DENIS, 1952c. Tourbière, mousses: DENIS, 1950b. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1952a; LEDOUX, 2000. Avril: CLARK & *al.*, 1970. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1950c. Juin: DENIS, 1941, 1945a, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1950b, 1952c, 1955c, 1960a, 1961b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1953a, 1962b; LESSERT, 1910; WUNDERLICH, 1977. Septembre: DENIS, 1951b, 1953b. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000. — *Femelle*. Mars: LEDOUX, 2000. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1934a, 1950c, 1967d; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1945a, 1948b, 1964b; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002. Juillet: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1950b, 1952c, 1954a, 1955c, 1960a, 1962b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1953a, 1960a, 1962b; WUNDERLICH, 1977. Septembre: DENIS, 1951b, 1953b, 1960a; EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a. Novembre: LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle avec cocon*. Août: DENIS, 1952c.

#### *Erigone welchi* Jackson, 1911

[DENIS, 1955c indique à propos de sa citation: « Si la détermination est exacte, et je pense qu'elle peut être considérée comme telle, c'est une acquisition intéressante pour la faune française »]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. — Grande-Bretagne. Irlande à Estonie, Moldavie. **Altitude.** De 1950 m (LEDOUX & *al.*, 1996b) jusqu'à 2160 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Prairie tourbeuse: LEDOUX & *al.*, 1996b. Tourbière: DENIS, 1955c. **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1955c. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b.

#### *Erigonella hiemalis* (Blackwall, 1841)

*Araeoncus h.*; *Troxochrus h.*

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1943 (A. h.), 1946 (T. h.). Corrèze: LE PERU, 2004. Jura, Loire: SIMON, 1926 (T. h.). Nord: DENIS, 1943a (A. h.), 1955a. Oise: SIMON, 1884b (T. h.), 1926 (T. h.). Pas-de-Calais: DENIS, 1958a, 1961a; EMERIT & *al.*, 1999. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois calcicole de hêtres: EMERIT & *al.*, 1999. Forêt: DENIS, 1958a, 1961a. Forêt, mousses épaisses: SIMON, 1926. Herbes et litière: DENIS, 1943a. Marécage: EMERIT & *al.*, 1999. Mousses: GUIBÉ, 1943. Mousses épaisses: SIMON, 1884b. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Février, mars: GUIBÉ, 1943. Mai: DENIS, 1943a. Octobre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Février, mars: GUIBÉ, 1943. Avril: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1958a; EMERIT & *al.*, 1999. Octobre: SIMON, 1926.

#### *Erigonella ignobilis* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Araeoncus i.*; *Diplocephalus i.*; *Troxochrus i.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884b (T. i.), 1926 (T. i.). Calvados: GUIBÉ, 1943 (A. i.), 1946 (A. i.); SIMON, 1884b (T. i.), 1926 (T. i.). Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: MANACH, 1995 (D. i.). Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Oise: SIMON, 1884b (T. i.), 1926 (T. i.). Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. "Seine": SIMON, 1884b (T. i.), 1926 (T. i.). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (T. i.); SIMON, 1884b (T. i.), 1926 (T. i.). Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884b (T. i.), 1926 (T. i.). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Détritus: GUIBÉ, 1943. Forêt: SIMON, 1926. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998. Marais, détritus: SIMON, 1884b, 1926. Marécage: EMERIT & *al.*, 1999, 2003; LANCELEVÉE, 1884. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. **Période.** — *Mâle*. Décembre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Février: EMERIT & *al.*, 1999. Avril: GUIBÉ, 1943. Mai: EMERIT & *al.*, 2003.

#### *Erigonella subelevata* (L. Koch, 1869)

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1965b, 1967d. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 2200 m (DENIS, 1965b, 1967d). **Habitat.** Bord d'un névé: DENIS, 1965b, 1967d. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1965b, 1967d.

#### *Erigonoplus alticeps* (Denis, 1951)

*Erigonopterna a.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Gironde: DENIS, 1951b (E. a.). — Connue seulement de France. **Habitat.** Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DENIS, 1951b.

#### *Erigonoplus dilatatus* (Denis, 1949)

*Erigonopterna dilata.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a (E. d.). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1995. — Connue seulement d'Andorre et de France. **Altitude.** 1630 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & *al.*, 1995. **Période.** — *Femelle*. Août: DENIS, 1953a.

#### *Erigonoplus globipes* (L. Koch, 1872)

*Trichopterna g.*

**Répartition.** Jura: SIMON, 1926 (T. g.). Yonne: SIMON, 1884b, 1926 (T. g.). — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926. Prairie humide: SIMON, 1884b.

#### *Erigonoplus inclarus* (Simon, 1881)

*Erigone inclarus*; *E. nigerrimus*.

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1881c (E. i.), 1884b, 1884b (E. n.), 1926. — Connue seulement de Corse.

#### *Erigonoplus justus* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone justa*; *Trichopterna justa*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b, 1926 (T. j.). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (E. j.);

SIMON, 1884b, 1926 (*T. j.*). [DENIS, 1965d doute de la citation des Alpes-Maritimes par SIMON]. — Allemagne, Belgique.

***Erigonoplus nigrocaeruleus*** (Simon, 1881)

*Erigone nigrocaerulea*; *Trichopterna nigrocaerulea*.

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1881c (*E. n.*), 1884b, 1926 (*T. n.*). — Connue seulement de Corse.

***Erigonoplus simplex*** MILLIDGE, 1979

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a. — Italie. **Altitude.** 1120 m (BOSMANS & *al.*, 1985a).

***Erigonoplus turriger*** (Simon, 1881)

*Erigone turrigera*; *Trichopterna turrigera*.

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1881c (*E. t.*), 1884b, 1926 (*T. t.*). — Connue seulement de France. **Habitat.** Bord de rivière; marécage: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1884b. Octobre: SIMON, 1881c, 1884b.

***Evansia merens*** O. P.-Cambridge, 1900

*E. maerens*; *E. moerens*.

**Répartition.** Gard: SIMON, 1926 (*E. maerens*). Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*E. moerens*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1926 (*E. maerens*). — Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Forêt, fourmilières de *Formica fusca*: SIMON, 1926. Fourmilière: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1960a. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1948b.

***Floronia bucculenta*** (Clerck, 1757)

*Frontina b.*; *Linyphia b.*; *Linyphia frenata*; *Stemomyphantes bucculentus*; *Tapinopa b.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c (*L. b.*), 1874c (*L. f.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*L. b.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: ASSELIN, 1990 (*T. b.*); LUCAS, 1868 (*L. b.*); MANACH, 1995 (*T. b.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*T. b.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*L. b.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b (*L. b.*). Marne: LUCAS, 1878a (*L. b.*). Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910 (*S. b.*); MÜLLER & *al.*, 1895 (*L. b.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*S. b.*), 1910 (*S. b.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*L. b.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*F. b.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1891 (*F. b.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*L. b.*). — France septentrionale et centrale: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (BOSMANS & *al.*, 1986). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Au pied des peupliers: LUCAS, 1878a. Bois: LUCAS, 1875. Bois humides: SIMON, 1884a. Bois marécageux,

plantes élevées: SIMON, 1929. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Forêt: ROSELLE, 1891. Forêt, buissons, bord de mare: DOIGNON, 1976. Lande: LUCAS, 1868. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de bois: LUCAS, 1874c, 1874c. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; ROSELLE, 1891; SIMON, 1884a; VILLEPOUX, 1990b. Prairie en friche; prairie très humide: LE PERU, 2004. Sous-bois: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Août: LUCAS, 1868, 1878b, 1882a. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle.* Juin: EMERIT & *al.*, 1999. Août: LE PERU, 2004; LUCAS, 1868, 1878a, 1878b, 1882a; VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & *al.*, 1997, 2003; LUCAS, 1875. Octobre: LE PERU, 2004.

***Frontinellina frutetorum*** (C. L. Koch, 1834)

*Frontinella f.*; *Linyphia f.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: PLANET, 1905 (*L. f.*). Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985 (*L. f.*). Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992 (*L. f.*). Ariège: DENIS, 1961b (*L. f.*). Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corse: CANARD, 1989 (*L. f.*); SIMON, 1884a (*L. f.*), 1929 (*L. f.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*L. f.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Finistère: DENIS, 1938a (*L. f.*). Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Gironde: SIMON, 1929 (*L. f.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a (*L. f.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*L. f.*); LEDOUX & *al.*, 1999b (*F. f.*). Loire-Atlantique: DENIS, 1967e (*L. f.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a (*L. f.*); MURPHY, 1994. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b (*L. f.*); LEDOUX & *al.*, 1995 (*F. f.*), 1996a (*F. f.*), 2003 (*F. f.*). "Seine": ROLLARD, 2000 (*F. f.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. f.*). Var: DENIS, 1935b (*L. f.*), 1936 (*L. f.*), 1937a (*L. f.*); SIMON, 1898c (*L. f.*). Vendée: DENIS, 1962b (*L. f.*), 1964b (*L. f.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*L. f.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Arbustes et haies: SIMON, 1929. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Buissons épineux: PLANET, 1905. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1938a; SIMON, 1929. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Forêt, litière et mousses: BOSMANS & *al.*, 1985a. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; RAPHAËL & *al.*, 1992. Haie: BRAUD & *al.*, 2005; SIMON, 1884a. Lande: DENIS, 1938a. Pelouse calcaire: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & *al.*, 1996a. Terrain vague: BOSMANS & *al.*, 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1936, 1962b. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1964b. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1967e. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1962b. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1961b, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a; MÜLLER, 1985.

***Glyphesis servulus*** (Simon, 1881)

*Erigone servula*; *Minyriolus s.*

**Répartition.** Aisne, Oise: SIMON, 1881c (*E. s.*), 1884b (*M. s.*), 1926. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1881c (*E. s.*), 1884b (*M. s.*), 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Europe. **Habitat.** Bois,

mousses: SIMON, 1926. Forêt, mousses humides: SIMON, 1881c. Marais, détrit: SIMON, 1881c, 1884b, 1926. Mousses humides: SIMON, 1884b, 1926. *Sphagnum*: SIMON, 1926. **Période**. — *Mâle*. Mars, octobre: SIMON, 1881c.

***Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834)**

*Erygona dentata*; *Gongylidium d.*; *Oedothorax dentatus*; *Trachynotus dentatus*.

**Répartition**. Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; DENIS, 1950c. Calvados: GUIBÉ, 1942, 1946. Corse: SIMON, 1884b (*G. d.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909a (*T. d.*). Finistère: DENIS, 1940a; MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1955b, 1961a; EMERIT & al., 1999. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (*O. d.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a; MULLER & al., 1895 (*G. d.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*O. d.*). "Seine": DENIS, 1945a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*G. d.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*G. d.*). Somme: DENIS, 1955b; ROSELLE, 1888b (*G. d.*). Vendée: DENIS, 1959c, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872 (*E. d.*). — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat**. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Bord de l'eau: SIMON, 1926. Bord de l'eau, à la base des plantes et détrit: SIMON, 1884b. Bord de lac, détrit: DENIS, 1950a. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b. Bord de rivière: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, gravières: HEIDT & al., 1998. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt: DENIS, 1961a. Forêt, buissons: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992. Lieux humides: LUCAS, 1872. Littoral, pré salé: DENIS, 1959c. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marécage: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999, 2003; GUIBÉ, 1942; ROSELLE, 1888b; VILLEPOUX, 1990b. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Plantation de peupliers: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: EMERIT & al., 1999. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sable humide, sous les salicornes: DENIS, 1963c. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période**. — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b, 1952a. Février: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a, 1952a; EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1942. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1950c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1945a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1959c. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: EMERIT & al., 1999;

LEDOUX & al., 1999a. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b, 1952a. Février: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a, 1952a; GUIBÉ, 1942. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1950c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1945a, 1950a, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1933b, 1940a, 1950b, 1959c. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1999a. Novembre: EMERIT & al., 2003.

***Gonatum bimpresum* Simon, 1884**

**Répartition**. Corse: SIMON, 1926. — Italie.

***Gonatum ensipotens* (Simon, 1881)**

*Erigone e.*

**Répartition**. Drôme: SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1881c (*E. e.*), 1884b, 1926. Vaucluse: SIMON, 1926. — Allemagne, Espagne, Italie. Europe du Sud-Ouest. **Habitat**. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. **Période**. — *Mâle*. Novembre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b. Novembre: SIMON, 1926.

***Gonatum geniculosum* Simon, 1918**

**Répartition**. Alpes-Maritimes: SIMON, 1918, 1926. — Connue seulement de France. **Altitude**. De 1500 m jusqu'à 1800 m (SIMON, 1926). **Habitat**. Forêt: SIMON, 1926.

***Gonatum hilare* (Thorell, 1875)**

**Taxonomie**. SIMON, 1926 confondait les deux espèces *G. hilare* et *G. nemorivagum* sous le nom *G. hilare*. Cette confusion a existé jusqu'à la séparation des deux espèces par MILLIDGE, 1981. La répartition de ces espèces est donc à prendre avec réserve. **Répartition**. Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: SIMON, 1926. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse, Lozère, Puy-de-Dôme, Rhône, Var: SIMON, 1926. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat**. Buissons: SIMON, 1926. **Période**. — *Femelle*. Octobre: SIMON, 1926.

***Gonatum nemorivagum* (O. P.-Cambridge, 1875)**

*Erigone nemorivaga*; *G. nemorivaga*.

**Taxonomie**. Cette espèce a été confondue avec *G. hilare*. Voir la note sous *G. hilare*. **Répartition**. Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*G. n.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. n.*). Corse, Var: SIMON, 1884b (*G. n.*). — Espagne. Europe du Sud.

***Gonatum occidentale* Simon, 1918**

**Répartition**. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1918, 1926. — Espagne. Algérie.

***Gonatum paradoxum* (L. Koch, 1869)**

*G. corallipes*.

**Répartition**. Alpes-Maritimes: SIMON, 1926 (*G. c.*). Aube, Calvados, Cantal: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926 (*G. c.*). Charente, Dordogne: SIMON, 1926 (*G. c.*). Doubs: EMERIT & al., 1997 (*G. c.*). Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1926 (*G. c.*). Isère: SIMON, 1884b (*G. c.*). Oise: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926 (*G. c.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*G. c.*), 1996c (*G. c.*);

SIMON, 1926 (*G. c.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*G. c.*); SIMON, 1926 (*G. c.*). Vendée: DENIS, 1963c (*G. c.*). — Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: SIMON, 1926. Buissons de chênes et d'aulnes: SIMON, 1884b, 1926. Éboulis: LEDOUX & al., 1996b. Forêt, dans des lierres au sol: ROSELLE, 1891. Forêt, litière: DENIS, 1963c. Marécage: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1926. Prairie; rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Août: LEDOUX & al., 1996b; SIMON, 1926. Septembre: DENIS, 1963c; SIMON, 1926. — *Femelle.* Mai: EMERIT & al., 2003. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c; SIMON, 1926. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1926.

***Goniatum rubellum*** (Blackwall, 1841)

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aveyron: SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884b. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899, 1909a. Marne: SIMON, 1884b. Nord: DENIS, 1955b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1050 m (DENIS, 1950a). **Habitat.** Aulnes, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de lac, détritrus: DENIS, 1950a. Branches basses des sapins et des pins: SIMON, 1884b. Forêt: DENIS, 1955b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996c. Lisière de forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Mêlèzes: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1950a. Août: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996c. Novembre: LE PERU, 2004.

***Goniatum rubens*** (Blackwall, 1833)

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b. Cantal, Charente: SIMON, 1884b. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1909a. Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1955b. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. "Seine": SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b. Somme, Tarn-et-Garonne: SIMON, 1884b. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2310 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Au pied des *Vaccinium* et des bruyères: SIMON, 1884b. Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: DENIS, 1955b, 1963c; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères: LEDOUX & al.,

1996a. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: LE PERU, 2004. Litière: SIMON, 1884b. Marécage: DENIS, 1962b. Prairie en friche, mousses; prairie très humide: LE PERU, 2004. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1962b. Août, octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Février: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Avril: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b. Juillet: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Août: LE PERU, 2004. Septembre: DENIS, 1963c; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LE PERU, 2004. Novembre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a.

***Gongyliellum calcariferum*** Simon, 1884

*Wiehlea calcarifera.*

**Taxonomie.** L'espèce *Gongyliellum calcariferum* Simon, 1884 a été transférée dans le genre monospécifique *Wiehlea* par MERRETT, 1963. **Répartition.** Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979 (*W. c.*), 1990a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1962c, 1967d (*W. c.*); LEDOUX & al., 1996a (*W. c.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne (*W. c.*). Ouest-Europe (*W. c.*). **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 1996a. Lande sèche: CANARD, 1979. Mousses: SIMON, 1884b, 1926. Terre: DENIS, 1962c. **Période.** — *Mâle.* Février: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884b, 1926. Octobre: DENIS, 1962c, 1967d.

***Gongyliellum edentatum*** Müller, 1951

**Répartition.** Vaucluse: MILLIDGE, 1979. — Allemagne, Italie. Centre et Sud Europe. **Altitude.** 1500 m (MILLIDGE, 1979). **Habitat.** Litière de hêtres: MILLIDGE, 1979. **Période.** — *Femelle.* Mai: MILLIDGE, 1979.

***Gongyliellum latebricola*** (O. P.-Cambridge, 1871)

[DENIS, 1958c note: « Bien que cette espèce largement distribuée soit loin d'être rare, une certaine incertitude semble exister sur l'identité de la femelle;...; des femelles de plusieurs espèces sont mélangées sous ce nom dans la collection Simon et la figure 787 des 'Arachnides de France' (1926) a été prise sur un individu de *G. vivum* »]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1884b. Calvados: ASSELIN & al., 1989. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: CANARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Isère: SIMON, 1884b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: DENIS, 1958a, 1961a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; SIMON, 1884b. — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois: DENIS, 1967d. Bois, mousses: SIMON, 1926. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Forêt: DENIS, 1958a, 1961a. Forêt humide, mousses;

jardin: LE PERU, 2004. Marais, détritit: SIMON, 1926. Mousses: SIMON, 1884b. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche, mousses; prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. **Période.** — *Mâle*. Avril, mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1958a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1967d. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Août: LE PERU, 2004. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1967d.

#### *Gongyliellum murcidum* Simon, 1884

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: SIMON, 1926. Ariège: DENIS, 1953b, 1960a, 1967d. Aube: SIMON, 1884b, 1926. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Cher: DENIS, 1943b. Corse: SIMON, 1884b, 1926. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Landes: SIMON, 1926. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; MURPHY, 1994. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: SIMON, 1926. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1943d, 1955b; EMERIT & al., 1999. Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1959a, 1960a; SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959a, 1959d, 1960a; SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; SOYER, 1965. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): SIMON, 1926. "Seine": SIMON, 1884b, 1926. Seine-et-Marne: SIMON, 1926. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1400 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1959d. Bois de hêtres: SOYER, 1965. Bord d'étang: SIMON, 1926. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord marécageux de rivière: SIMON, 1926. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt, détritit: SIMON, 1884b. Forêt, litière; forêt, litière et mousses: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, mousses: SIMON, 1926. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1953b, 1959a. Herbes et feuilles mortes humides: DENIS, 1933b. Herbes humides: DENIS, 1948b. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marais, détritit: SIMON, 1884b. Marais, roseaux: DENIS, 1943b. Marais, sous des roseaux couchés: DENIS, 1943d. Marécage: DENIS, 1952a; MURPHY, 1994; VILLEPOUX, 1990b. Mousses: DENIS, 1967d. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve, pelouse: LEDOUX, 2000. *Sphagnum* d'une source: SIMON, 1926. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1960a; SIMON, 1926. Mars: DENIS, 1959a, 1960a. Mai: DENIS, 1933b. Juin: DENIS, 1943b. Juillet: DENIS, 1960a. Octobre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1952a; SIMON, 1926. Mars: DENIS, 1952a, 1959a, 1960a. Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1943b, 1948b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1953b, 1959d; LEDOUX, 2000. Octobre: DENIS, 1943d; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000.

#### *Gongyliellum vivum* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone viva*.

[DENIS, 1958c indique que *G. latebricola* et *G. vivum* ont pu être confondues par certains auteurs]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. v.*); SIMON, 1884b. Aude: DENIS, 1967d. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1884b, 1926. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1955b; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. v.*); SIMON, 1884b. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b. [La citation du Nord par DENIS, 1934c est erronée selon DENIS, 1937d, et se rapporte à *Troxochrus insectus* (= *Tapinocyba i.*)]. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Berges de petites mares: SIMON, 1884b. Bois marécageux, mousses: SIMON, 1926. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Détritit de roseaux: SIMON, 1884b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Lande sèche: CANARD, 1979. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: EMERIT & al., 2003. Prairie: CORNIC, 1977; PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 1999a. Novembre: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 1999. Novembre: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 2003.

#### *Gongyliidium rufipes* (Linnaeus, 1758)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Aube: SIMON, 1884b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1909a. Finistère: MANACH, 1995. Gers: SIMON, 1884b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne (Haute-): SIMON, 1884b. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1955b; EMERIT & al., 1999. Oise, Orne: SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: DENIS, 1956, 1958a, 1961a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. "Seine": SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: SIMON, 1884b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 700 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois humides, mousses: SIMON, 1884b, 1926. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Forêt: DENIS,

1956, 1958a, 1961a. Forêt, bord d'étang: DENIS, 1950a. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marais, détritus: SIMON, 1926. Marécage: EMERIT & al., 2003; VILLEPOUX, 1990b. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Février, mars: EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: LE PERU, 2004. Septembre: EMERIT & al., 1999. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle*. Février, mars: EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Septembre: EMERIT & al., 1999. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002.

***Halorates reprobus*** (O. P.-Cambridge, 1879)

**Répartition.** Côtes-d'Armor: DENIS, 1968b; SALMON, 1959. Finistère: BAUDOIN, 1946; DENIS, 1939a, 1940a. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1968b. Manche: BERLAND, 1924; DENIS, 1968b; SIMON, 1926. Vendée: DENIS, 1940b. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Europe, Russie. **Habitat.** Estuaire, au niveau de l'*Obionetum*: SALMON, 1959. Estuaire, sous la croûte des algues séchées: DENIS, 1939a. Littoral, grottes dans une falaise, sur les parois ou entre les galets humides ou sous les algues: DENIS, 1940a. Littoral, grottes, sous des galets: DENIS, 1940b. Littoral, zone du *Fucus vesiculosus*: SIMON, 1926. Zone intercodidale, au pied des touffes de *Fucus*: BERLAND, 1924. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1940a. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1939a, 1940a.

***Helophora insignis*** (Blackwall, 1841)

*Linyphia i.*

**Répartition.** Isère: SIMON, 1884a (*L. i.*), 1929 (*L. i.*). Nord: DENIS, 1943d (*L. i.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1730 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de conifères; forêt de hêtres, litière: LEDOUX & al., 1996a. Hautes herbes et buissons bas: SIMON, 1929. Noisetiers: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1943d.

*Heterotrichoncus* (voir *Trichoncus*)

***Hilaira excisa*** (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Oise: SIMON, 1884a, 1926. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1920 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996b. Bois, mousses épaisses: SIMON, 1884a. Bord de torrent, sous les pierres et mousses: DENIS, 1950b. Forêt, mousses épaisses: SIMON, 1926. Herbes humides: DENIS, 1950b. Prairie; rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1950b.

Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1950b. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

***Hybocoptus corrugis*** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone c.*; *Erigone decollata*; *Erigone ericicola*; *H. decollatus*; *H. ericicola*.

**Taxonomie.** La synonymie *H. decollatus* (Simon, 1881) = *H. corrugis* est établie par WUNDERLICH, 1994a. **Répartition.** Corse: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. c.*); SIMON, 1884b, 1926. Gironde: SIMON, 1881c (*E. d.*), 1884b (*H. d.*), 1926 (*H. d.*). Landes: SIMON, 1926 (*H. d.*). Morbihan: MURPHY, 1994 (*H. d.*). Var: BECKER, 1880 (*E. d.*); DENIS, 1933a (*H. d.*), 1934a (*H. d.*); SIMON, 1881c (*E. e.*), 1884b (*H. e.*), 1926 (*H. d.*). Vendée: CANARD, 1990a (*H. d.*); DENIS, 1947b (*H. d.*), 1962d (*H. d.*), 1964b (*H. d.*), 1965c (*H. d.*). — Espagne. Europe. **Habitat.** Bois: SIMON, 1884b. Bruyères: SIMON, 1881c, 1884b. Forêt au bord d'une dune, chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962d, 1965c. Forêt, ajoncs et houx: DENIS, 1947b. Forêt, buissons, bruyères, ajoncs; plage, buissons: SIMON, 1926. Plage, *Ulex*: SIMON, 1884b. Sous une pierre: DENIS, 1934a. Sous-bois, buissons: SIMON, 1881c. **Période.** — *Mâle*. Avril: SIMON, 1881c, 1926. Mai: DENIS, 1965c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: DENIS, 1947b, 1964b. Juillet, août: DENIS, 1964b.

***Hybocoptus dubius*** Denis, 1950

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre, herbes; dune, au pied de la végétation sur le sable: DENIS, 1950c. **Période.** — *Femelle*. Mai: DENIS, 1950c.

***Hylyphantes graminicola*** (Sundevall, 1830)

*Erigonidium g.*; *Gongylidium g.*; *Tmeticus g.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1884b (*G. g.*). Ariège: DENIS, 1967d (*E. g.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*T. g.*). Charente: SIMON, 1884b (*G. g.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a (*E. g.*). Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*G. g.*); SIMON, 1884b (*G. g.*). Finistère: DENIS, 1938a (*T. g.*), 1939a (*T. g.*). Gironde: SIMON, 1884b (*G. g.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1955b (*T. g.*); EMERIT & al., 1999. Orne: CANARD, 1990a (*E. g.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a (*E. g.*). "Seine": SIMON, 1884b (*G. g.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*G. g.*); SIMON, 1884b (*G. g.*). Seine-et-Marne: DENIS, 1946c (*T. g.*); SIMON, 1884b (*G. g.*). Somme: SIMON, 1884b (*G. g.*). Vendée: DENIS, 1962b (*T. g.*). — Presque toute la France: SIMON, 1926 (*T. g.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 370 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ajoncs et genêts: DENIS, 1938a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois, hautes herbes: DENIS, 1938a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, herbes humides: DENIS, 1939a. Buissons et hautes herbes: SIMON, 1926. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Détritus d'inondation:

DENIS, 1946c. Grotte: BOSMANS & al., 1985a. Marécage: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1884b; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a; BRAUD & al., 2005. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1939a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. — *Femelle*. Février: DENIS, 1946c. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 2002. Août: DENIS, 1962b. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002.

***Hylyphantes nigrinus*** (Simon, 1881)

*Entelecara aestiva* [err.].

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1887b. Aube: SIMON, 1884b, 1926. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: SIMON, 1926. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Landes: SIMON, 1926. Morbihan: DENIS, 1938a [*Entelecara aestiva*, err. selon DENIS, 1945b], 1945b. Nièvre: DENIS, 1943b [*Entelecara aestiva*, err. selon DENIS, 1945b], 1943b, 1945b. Oise: SIMON, 1884b, 1887a, 1926. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1884b, 1926. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1926. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois humides: SIMON, 1926. Bois, litière: DENIS, 1938a. Bord de route, herbes et fougères: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Chênes: DENIS, 1943b. Forêt: DENIS, 1938a, 1945b; LANCELEVÉE, 1884. Litière de chênes: DENIS, 1943b, 1945b. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Prairie très humide: LE PERU, 2004. *Ulex*: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle*. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1943b; EMERIT & al., 1997. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1938a, 1938a, 1943b, 1943b, 1945b; EMERIT & al., 1997. Septembre: EMERIT & al., 1997.

***Hypomma bituberculatum*** (Wider, 1834)

*Dismodicus bituberculatus*; *Enidia bituberculata*; *Gonatium b.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Aube: SIMON, 1884b (*G. b.*). Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b (*G. b.*). Charente: SIMON, 1884b (*G. b.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a (*D. b.*); DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*G. b.*); SIMON, 1884b (*G. b.*). Eure-et-Loire: SIMON, 1884b (*G. b.*). Finistère: MANACH, 1995 (*D. b.*). Gironde: DENIS, 1952a (*E. b.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a (*D. b.*). Loir-et-Cher: HENRY, 1981 (*E. b.*); LEDOUX & al., 1999b. Nord: DENIS, 1944b, 1955b (*E. b.*); EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b (*G. b.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1937d, 1955b (*E. b.*); EMERIT & al., 1999. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a (*E. b.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884b (*G. b.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*G. b.*); SIMON, 1884b (*G. b.*). Somme:

SIMON, 1884b (*G. b.*). Vendée: DENIS, 1962b (*E. b.*). Yonne: SIMON, 1884b (*G. b.*). — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois humides: SIMON, 1926. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Friche: PASQUET & al., 1992. Marécage: DENIS, 1944b, 1952a, 1962b; EMERIT & al., 1999, 2003; HENRY, 1981; SIMON, 1926; VILLEPOUX, 1990b. Prairie humide: SIMON, 1884b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Mai: EMERIT & al., 2003. Juillet: DENIS, 1962b. Septembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1962b. Septembre: EMERIT & al., 2003.

***Hypomma cornutum*** (Blackwall, 1833)

*Dismodicus cornutus*; *Enidia cornuta*; *Gonatium c.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Aube: SIMON, 1884b (*G. c.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*G. c.*); SIMON, 1884b (*G. c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a, 1990a (*D. c.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1963b (*E. c.*). Oise: SIMON, 1884b (*G. c.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1958a (*E. c.*), 1961a (*E. c.*); EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a (*E. c.*). "Seine": SIMON, 1884b (*G. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*G. c.*); SIMON, 1884b (*G. c.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*G. c.*); SIMON, 1884b (*G. c.*). — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Branches basses des conifères: SIMON, 1926. Branches basses des pins: SIMON, 1884b. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: DENIS, 1958a, 1961a, 1963b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Marécage: EMERIT & al., 1999; VILLEPOUX, 1990b. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1938a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1963b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004.

***Hypomma fulvum*** (Bösenberg, 1902)

*Enidia fulva*; *H. mallezi*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Cher: DENIS, 1943b. Loir-et-Cher: HENRY, 1981 (*E. f.*). Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Nord: DENIS, 1943a (*H. m.*), 1943d (*E. f.*), 1944b, 1955b (*E. f.*); EMERIT & al., 1999. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a (*E. f.*). "Seine": DENIS, 1946b (*E. f.*). Vendée: DENIS, 1962b (*E. f.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord d'étang, sous les roseaux: DENIS, 1944b. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Fossé, sous les roseaux couchés: DENIS, 1962b. Marécage: DENIS, 1943a, 1943b, 1943d, 1944b; EMERIT & al., 1999; HENRY, 1981; MURPHY, 1994; VILLEPOUX, 1990b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1943d, 1944b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Juin: DENIS, 1943d. —

*Femelle*. Avril: DENIS, 1943d, 1944b; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: DENIS, 1943a. Juin: DENIS, 1943b, 1943d; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: DENIS, 1962b.

***Hypocephalus huberti*** (MILLIDGE, 1975)

*Mecopisthes h.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: MILLIDGE, 1975a (*M. h.*). — Connue seulement de Corse. **Altitude.** De 900 m jusqu'à 1100 m (MILLIDGE, 1975a). **Habitat.** Bois mixte, litière: MILLIDGE, 1975a. **Période.** — *Femelle*. Juin: MILLIDGE, 1975a.

***Hypocephalus nesiotés*** (Simon, 1914)

*Cnephalocotes n.*; *Mecopisthes n.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1915a (*C. n.*), 1926 (*M. n.*). — Connue seulement de Corse.

***Hypocephalus paulae*** (Simon, 1918)

*Cnephalocotes p.*; *Mecopisthes p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1918 (*C. p.*), 1926 (*M. p.*). — Italie, Suisse.

*Improphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Incestophantes* (voir *Lepthyphantes*)

***Jacksonella falconeri*** (Jackson, 1908)

*Astenargus f.*

**Répartition.** Côtes-d'Armor, Morbihan: CANARD, 1990a (*A. f.*). Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Habitat.** Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998.

***Kaestneria dorsalis*** (Wider, 1834)

*Bathyphantes d.*; *Cresmatoneta d.*; *Stylophora d.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aube: SIMON, 1884a (*B. d.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*S. d.*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003; SIMON, 1929 (*S. d.*). Finistère: MANACH, 1995 (*C. d.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*C. d.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Nord: EMERIT & *al.*, 1999. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a (*B. d.*). "Seine": SIMON, 1884a (*B. d.*), 1929 (*S. d.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1929 (*S. d.*). Vendée: DENIS, 1964b (*B. d.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord marécageux de rivière: SIMON, 1929. Bétulaie, branches: EMERIT & *al.*, 2003. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Marécage: SIMON, 1884a, 1929; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999; SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1964b. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002. — *Femelle*. Avril: LEDOUX & *al.*, 2002. Juin: EMERIT & *al.*, 1999. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002.

***Kaestneria pullata*** (O. P.-Cambridge, 1863)

*Bathyphantes pullatus*; *Stylophora pullatus*.

**Répartition.** Aisne: DENIS, 1939b (*B. p.*); SIMON, 1884a (*B. p.*), 1929 (*S. p.*). Cher: DENIS, 1943b (*B.*

*p.*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: DENIS, 1938a (*B. p.*). Gironde: DENIS, 1952a (*B. p.*). Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*B. p.*). Landes: SIMON, 1929 (*S. p.*). Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: EMERIT & *al.*, 1999. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (*B. p.*); EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*B. p.*). Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*B. p.*). "Seine": SIMON, 1884a (*B. p.*), 1929 (*S. p.*). Somme: DENIS, 1946b (*B. p.*); ROSELLE, 1891 (*B. p.*); SIMON, 1929 (*S. p.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bois, mousses et litière: DENIS, 1943b. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998. Herbes humides: DENIS, 1948b. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Marécage: DENIS, 1938a, 1939b, 1946b, 1952a; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; ROSELLE, 1891; SIMON, 1884a, 1929. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Tourbière: DENIS, 1948b; EMERIT & *al.*, 1999; SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1939b; LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: EMERIT & *al.*, 1999. Septembre: EMERIT & *al.*, 1999, 2003. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999; SIMON, 1884a. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1952a. Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mars: DENIS, 1938a. Avril: DENIS, 1939b. Mai: DENIS, 1937d; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1943b, 1948b; EMERIT & *al.*, 1999. Septembre: DENIS, 1946b; EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999; SIMON, 1884a. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003.

***Labulla flahaulti*** Simon, 1914

**Répartition.** Ariège: SIMON, 1929. Gard: SIMON, 1915b, 1929. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; KERVILLE, 1932. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1915b, 1929. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1915b, 1929. — Espagne. **Altitude.** De 1350 m (KERVILLE, 1932) jusqu'à 2100 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bord d'étang: BOSMANS & *al.*, 1985a. Éboulis: LEDOUX & *al.*, 1996a. Entre les rhododendrons et les rocs: DENIS, 1954a. Forêt de hêtres et de conifères: SIMON, 1929. Forêt de hêtres et de sapins, sous le rebord des talus en corniche: SIMON, 1915b. Forêt de hêtres, litière: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Prairie alpestre; prairie sèche: BOSMANS & *al.*, 1985a. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1954a. — *Femelle*. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a.

***Labulla thoracica*** (Wider, 1834)

*Linyphia t.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Calvados: LUCAS, 1874c (*L. t.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESCO, 1956. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: SIMON, 1899, 1909a. Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1995. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Habitat.** Aulnes, au sol: LEDOUX &



*al.*, 1996c. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Éboulis: EMERIT & *al.*, 1997. Forêt: SIMON, 1884a. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, sous les pierres, sur les troncs: DOIGNON, 1976. Gros arbres, entre les racines: SIMON, 1929. Grotte: DRESKO, 1956. Jardin: LE PERU, 2004. Lisière de bois: LUCAS, 1874c. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1967d. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996c. Octobre: LE PERU, 2004. Novembre: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Décembre: LE PERU, 2004.

***Lasiargus hirsutus* (Menge, 1869)**

*Pocadicnemis prominens*.

**Taxonomie.** La synonymie *Pocadicnemis prominens* (Simon, 1884) = *L. hirsutus* est établie par MILLIDGE, 1976. **Répartition.** Landes, "Seine": SIMON, 1884b (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Vendée: DENIS, 1946b, 1947a, 1947b, 1962d, 1963c, 1965c. — Allemagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Dune: DENIS, 1965c. Forêt de pins: DENIS, 1947a. Forêt de pins, clairière, herbes: DENIS, 1965c. Forêt de pins, herbes sèches et litière: DENIS, 1962d. Forêt de pins, litière: DENIS, 1946b. Forêt, endroits sablonneux, herbes; forêt, litière; forêt, sous les pierres: DENIS, 1947b. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1947b. Septembre: DENIS, 1963c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1947b, 1965c. Août: DENIS, 1946b.

***Latithorax faustus* (O. P.-Cambridge, 1900)**

*Rhaebothorax f.*; *Semljicola f.*

**Répartition.** Oise: SIMON, 1926 (*R. f.*). — Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse (*S. f.*). Paléarctique (*S. f.*). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926.

***Lepthyphantes agnellus* Maurer & Thaler, 1988**

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER & *al.*, 1988. — Italie. **Altitude.** De 2400 m jusqu'à 2530 m (MAURER & *al.*, 1988). **Habitat.** Parmi des gros blocs de pierres: MAURER & *al.*, 1988. **Période.** — *Femelle*. Août: MAURER & *al.*, 1988.

***Lepthyphantes alacris* (Blackwall, 1853)**

*Tenuiphantes a.*

**Répartition.** Finistère: MANACH, 1995. Isère: SIMON, 1884a. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. a.*). Paléarctique (*T. a.*). **Habitat.** Aulnes, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Mélèzes, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. — *Femelle*. Août: LEDOUX & *al.*, 1996c.

***Lepthyphantes alutacius* (Simon, 1884)**

*Palliduphantes a.*

**Répartition.** Ain, Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1884a, 1929. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Charente: DENIS, 1958b; SIMON, 1929. Cher: DENIS, 1943b. Finistère: SIMON,

1929. Garonne (Haute-): DRESKO, 1962. Gironde, Isère, Landes, Maine-et-Loire, Marne: SIMON, 1929. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. "Seine": SIMON, 1884a, 1929. Tarn: DRESKO & *al.*, 1968; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Vaucluse: SIMON, 1929. Vendée: DENIS, 1947b. — Espagne, Italie. Europe (*P. a.*). **Altitude.** Jusqu'à 1930 m (LEDOUX & *al.*, 1996b). **Habitat.** Bois, herbes humides: DENIS, 1948b. Bois, litière: DENIS, 1943b. Forêt: SIMON, 1929. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & *al.*, 1987. Forêt de pins: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de pins, sous des pierres; forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, mousses: DENIS, 1947b. Grotte: DENIS, 1958b; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Marécage: SIMON, 1929. Mine: DENIS, 1967d. Nid de taupe: GUIBÉ, 1943. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996b. Prairie humide: SIMON, 1929. Prairie sèche: BOSMANS & *al.*, 1985a. Terrier de taupe: SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1967d. Juin: DENIS, 1943b, 1947b, 1948b. Août: SIMON, 1929. Octobre: DENIS, 1958b. Novembre: SIMON, 1929. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1967d; GUIBÉ, 1943. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b. Novembre: DRESKO & *al.*, 1968; SIMON, 1929.

***Lepthyphantes angulatus* (O. P.-Cambridge, 1881)**

*Oryphantes a.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne (*O. a.*). Paléarctique (*O. a.*). **Période.** — *Femelle*. Mai: LEDOUX & *al.*, 1996a.

***Lepthyphantes angulipalpis* (Westring, 1851)**

*Anguliphantes a.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884a. Jura, Oise: SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Suisse (*A. a.*). Paléarctique (*A. a.*).

***Lepthyphantes angustiformis* (Simon, 1884)**

*L. prodigialis*; *Palliduphantes a.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1884a, 1884a (*L. p.*), 1929. — Connue seulement de Corse et de Sardaigne.

***Lepthyphantes arenicola* (Denis, 1962)**

*Palliduphantes a.*

**Répartition.** Vendée: DENIS, 1962b. — Suisse. **Habitat.** Herbes rares et bruyères sous *Tamarix anglica*: DENIS, 1962b. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DENIS, 1962b.

***Lepthyphantes arlaudi* (Denis, 1954)**

*Mughiphantes a.*

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 3040 m (DENIS, 1954a). **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1954a.

***Lepthyphantes aurantiipes* Simon, 1929**

**Taxonomie.** La synonymie *L. aurantiipes* Simon, 1929 = *L. handschini* Schenkel, 1919 est indiquée par HEIMER & *al.*, 1991, reprise par PLATNICK, 2004, mais

rejetée par SAARISTO & al., 1999; elle n'est pas admise ici. [BONNET, 1957 note à propos de la citation de SIMON, 1929: « En citant cette espèce, Simon semble la considérer comme déjà nommée; mais il ne donne pas de référence antérieure, et je n'en ai pas découvert; en conséquence, je la considère ici comme une nouvelle espèce »]. **Répartition.** Savoie (Haute-): SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Altitude.** 2400 m (SIMON, 1929). **Habitat.** Touffe de sedum: SIMON, 1929.

*Lepthyphantes bigerrensis* Simon, 1929

**Répartition.** Garonne (Haute-): SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1951c; SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois: DENIS, 1959d. Forêt de pins: DENIS, 1951c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1959d. Septembre: DENIS, 1951c. — *Femelle.* Septembre: DENIS, 1951c.

*Lepthyphantes carlittensis* Denis, 1952

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2290 m (DENIS, 1952c) jusqu'à 2500 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord d'étang, sous des pierres noyées du rivage: DENIS, 1952c. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1952c.

*Lepthyphantes cebennicus* (Simon, 1929)

*Palliduphantes c.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Gard: SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Connue seulement de France. **Habitat.** Prairie: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Mâle.* Juin: SIMON, 1929. Août: LEDOUX & al., 1996b.

*Lepthyphantes ceretanus* (Denis, 1962)

*Palliduphantes c.*

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1962e. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle.* Décembre: DENIS, 1962e.

*Lepthyphantes cernuus* (Simon, 1884)

*Palliduphantes c.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1884a, 1929. Garonne (Haute-): DRESKO, 1947a; FAGE, 1931. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1929. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Bois: DENIS, 1957a. Bois de peupliers et d'aulnes: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères; forêt de hêtres, pierres et litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins, sous des pierres; gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DRESKO, 1947a; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: BOSMANS & al., 1985a. Sous-bois: LEDOUX &

al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1957a. Septembre, novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Février, avril, mai, juin, novembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Lepthyphantes cirratus* (Thaler, 1986)

*Piniphantes c.*

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Corse: THALER, 1986. — Connue seulement de Corse. **Altitude.** 1100 m (THALER, 1986). **Habitat.** Forêt mixte, bord de ruisseau: THALER, 1986. **Période.** — *Mâle.* Octobre: THALER, 1986.

*Lepthyphantes collinus* (L. Koch, 1872)

*Megalepthyphantes c.*

**Répartition.** Aube, Côte-d'Or: SIMON, 1884a, 1929. Nord: DENIS, 1937d. Var: SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse (*M. c.*). Paléarctique (*M. c.*). **Habitat.** Collines calcaires sèches, sous les grosses pierres: SIMON, 1929. Mine de charbon: DENIS, 1937d.

*Lepthyphantes complicatus* (Emerton, 1882)

*Impropyphantes c.*; *L. audax.*

**Répartition.** Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998 (*L. a.*). — Grande-Bretagne, Suisse (*I. c.*). Holarctique (*I. c.*). **Habitat.** Friche; pâturage: LEBORGNE & al., 1998.

*Lepthyphantes corsicos* Wunderlich, 1980

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Corse: WUNDERLICH, 1980b. — Connue seulement de Corse.

*Lepthyphantes cristatus* (Menge, 1866)

*Tenuiphantes c.*

**Répartition.** Ain, Aube: SIMON, 1884a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1962. Eure: HELSDINGEN & al., 1977. Gers, Isère: SIMON, 1884a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire: LEDOUX & al., 2002. Morbihan: ASSE-LIN, 1990. Pas-de-Calais: DENIS, 1958a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1884a. "Seine": SIMON, 1884a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a. Seine-et-Marne: SIMON, 1884a. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. c.*). Paléarctique (*T. c.*). **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996c. Bord de lac, herbes humides: DENIS, 1950a. Forêt: DENIS, 1958a; LANCELEVÉE, 1884; LE PERU, 2004. Forêt de chênes et hêtres, litière; forêt humide: LE PERU, 2004. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Grotte: DRESKO, 1962. Lande, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996c. Litière sèche; mousses: SIMON, 1929. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996c. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Février: LE PERU, 2004. Mars: DRESKO, 1962. Août: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: LE PERU, 2004. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.*

Février: LE PERU, 2004. Mars: DRESKO, 1962. Juin: DENIS, 1950a. Juillet, août: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: LE PERU, 2004. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002.

***Lepthyphantes culicinus*** (Simon, 1884)

*Palliduphantes c.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1929. Aisne, Aube: SIMON, 1884a, 1929. Eure: SIMON, 1899, 1909a, 1929. Isère, Lozère, Maine-et-Loire: SIMON, 1929. Oise: SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. "Seine": SIMON, 1884a, 1929. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1929. Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884a, 1929. Vaucluse: SIMON, 1929. Vendée: DENIS, 1962b. — Italie. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1929. Mousses: SIMON, 1899. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Terrier de taupe: SIMON, 1929. **Période.** — Mâle. Juin: DENIS, 1962b.

***Lepthyphantes decolor*** (Westring, 1861)

*Improphtantes d.*; *L. parallelogrammus.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929 (*L. p.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884a (*L. p.*), 1929 (*L. p.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Var: SIMON, 1898c (*L. p.*). — Littoral de la Méditerranée de Menton à Banyuls: SIMON, 1929. Allemagne, Espagne, Italie (*f. d.*). Europe, Afrique du Nord (*f. d.*). **Altitude.** 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de conifères; lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — Femelle. Mai, août: LEDOUX & al., 1996a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

***Lepthyphantes dentatidens*** (Simon, 1929)

*Palliduphantes d.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BRIGNOLI, 1979a; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: BRIGNOLI, 1979a; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1929. **Période.** — Mâle. Septembre: DRESKO & al., 1968. — Femelle. Janvier, septembre: DRESKO & al., 1968.

***Lepthyphantes ericaeus*** (Blackwall, 1853)

*L. ericaeus*; *L. miser* [mâle]; *L. pellucidus*; *Palliduphantes e.*

**Taxonomie.** Selon SIMON, 1929, les citations faites par SIMON, 1884a sous le nom *L. miser* (= *Aphileta misera*) se rapportent à *L. ericaeus*, lorsqu'il s'agit de spécimens mâles. Certaines données placées sous l'espèce *A. misera* pourraient donc en fait concerner *L. ericaeus*. Toutefois comme SIMON, 1929 ne dit rien au sujet des femelles et ne cite pas *Aphileta misera*, les données sous *L. miser* sont ici toutes placées sous *L. ericaeus*. Les départements cités par SIMON, 1884a sous *L. miser* sont d'ailleurs tous repris par SIMON, 1929 sous *L. ericaeus*. **Répartition.** Aisne: SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*L. e.*). Dordogne: SIMON, 1929 (*L. e.*). Eure:

EMERIT & al., 2003; SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Finistère: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a (*L. e.*); MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979, 1980. Jura, Loire, Maine-et-Loire: SIMON, 1929 (*L. e.*). Manche: BERLAND, 1924 (*L. e.*); SIMON, 1929 (*L. e.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Nord: DENIS, 1934c (*L. e.*), 1943a. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*L. e.*); SIMON, 1929 (*L. e.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1884a (*L. p.*), 1929 (*L. e.*). Seine-Maritime: SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Somme: SIMON, 1884a (*L. m.* [mâle]), 1929 (*L. e.*). Vendée: DENIS, 1964b. Vienne (Haute-): SIMON, 1929 (*L. e.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Europe, Russie (*P. e.*). **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois; bord d'étang: DENIS, 1938a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: SIMON, 1884a, 1929. Forêt: SIMON, 1929. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Herbes humides: DENIS, 1948b. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lisière de forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Marais, détritus: SIMON, 1884a, 1929. Marécage: DENIS, 1934c, 1938a; EMERIT & al., 2003. Pelouse: BERLAND, 1924. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Sous les genêts: DENIS, 1948b. **Période.** — Mâle. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mars: SIMON, 1929. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1948b; SIMON, 1929. Octobre: SIMON, 1929. Novembre: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Décembre: DENIS, 1934c. — Femelle. Janvier: DENIS, 1934c. Mai: DENIS, 1943a; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1948b, 1964b; EMERIT & al., 1999. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1929. Novembre: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1934c.

***Lepthyphantes eugeni*** Roewer, 1942

*L. antrorum*; *L. ictericus.*

**Taxonomie.** La place de cette espèce dans le genre *Lepthyphantes* est incertaine. Elle est décrite sous le nom *L. ictericus* par SIMON, 1929, d'une grotte des Hautes-Pyrénées, sur un mâle (perdu accidentellement) et deux femelles. Le nom étant préoccupé, ROEWER, 1942 renomme l'espèce *L. eugeni*. DRESKO, 1951, après avoir examiné les spécimens femelles d'un tube étiqueté *L. ictericus* de la collection Simon, renomme l'espèce *L. antrorum* (= *L. ictericus* Simon). Mais BOSMANS, 1995, commentant les descriptions de *L. ictericus* par SIMON, 1929, indique: «Le mâle et la femelle de *L. ictericus* ne sont donc pas conspécifiques. La femelle appartient à une espèce voisine des *Centromerus*, et le mâle est celui de *Bordea* (= *Lepthyphantes negrei*). [Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DRESKO, 1951 (*L. a.*); SIMON, 1929 (*L. i.*). — Espagne. **Habitat.** Grotte: DRESKO, 1951; SIMON, 1929.

***Lepthyphantes expunctus*** (O. P.-Cambridge, 1875)*Agnypchantes e.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Ardèche: SIMON, 1929. Ariège: DENIS, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1967d; SIMON, 1929. Savoie: SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse (A. e.). Paléarctique (A. e.). **Altitude.** De 1750 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 2400 m (DENIS, 1967d). **Habitat.** Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de conifères, branches basses: SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1960a. Septembre: DENIS, 1967d.

***Lepthyphantes fagicola*** (Simon, 1929)*Palliduphantes f.*

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c; DRESKO & al., 1968; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1929. — Espagne. **Altitude.** De 900 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 1500 m (SIMON, 1929). **Habitat.** Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1929. Grotte: DRESKO & al., 1968. **Période.** — *Femelle.* Juin: DRESKO & al., 1968.

***Lepthyphantes flavipes*** (Blackwall, 1854)*Tenuiphantes f.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BRIGNOLI, 1979a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1968. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LECLERC & al., 1991; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*T. f.*). Sarthe: DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1968. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; DRESKO, 1947c; ROLLARD, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. f.*). Paléarctique (*T. f.*). **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnes; aulnes, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de chênes; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois mixte de *Carpinus betulus* et de *Quercus petraea*: LECLERC & al., 1991. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de ruisseau, pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière: DRESKO & al., 1968. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Détritit: SIMON, 1929. Détritit humides: DENIS, 1965c. Dune: DENIS, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS

& al., 1985a. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de conifères, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins, herbes sèches et litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, bord d'étang: DENIS, 1950a. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Forêt, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Friche: VEILLON, 1997. Grotte: BRIGNOLI, 1979a; DRESKO, 1959a, 1959c; DRESKO & al., 1968. Jardin; lisière de forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & al., 2003. Mousses: SIMON, 1929. Noisetiers: LEDOUX & al., 1996a. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a; BRAUD & al., 2005. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Février: LE PERU, 2004. Avril: DRESKO, 1947c; LEDOUX & al., 1996a. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Septembre: DRESKO, 1959c; EMERIT & al., 1997, 2003; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DRESKO & al., 1968; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004. Décembre: DRESKO & al., 1968. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b, 1964b; DRESKO, 1947c, 1959a; LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1950a, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 2002. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: BRIGNOLI, 1979a; DENIS, 1962b; LE PERU, 2004. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004. Décembre: LE PERU, 2004.

***Lepthyphantes fragilis*** (Thorell, 1875)*Mansuphantes f.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a, 1929. Savoie: SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse (*M. f.*). Europe (*M. f.*). **Habitat.** Forêt, mousses: SIMON, 1884a, 1929.

***Lepthyphantes frigidus*** (Simon, 1884)*Incestophantes f.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1929; THALER & al., 1994. Savoie: THALER & al., 1994. — Alpes de Savoie et du Dauphiné: SIMON, 1929. Italie, Suisse (*I. f.*). Europe (*I. f.*). **Altitude.** De 1730 m (LEDOUX & al., 1996a) jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1929. Prairie près des neiges: SIMON, 1929. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Près des glaciers: SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle.* Juillet, novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: THALER & al., 1994. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

**Lepthyphantes gladiola** (Simon, 1884)*Mansuphantes g.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a, 1929. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1884a, 1929; WUNDERLICH, 1980b. — Italie. **Altitude.** De 1700 m jusqu'à 1900 m (WUNDERLICH, 1980b). **Habitat.** Bord de rivière: CANARD, 1989. À proximité de la neige: WUNDERLICH, 1980b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: CANARD, 1989. — *Femelle.* Juillet: CANARD, 1989.

**Lepthyphantes hamifer** Simon, 1884

**Répartition.** Var: SIMON, 1884a, 1929. — Paléarctique.

**Lepthyphantes herbicola** (Simon, 1884)*Tenuiphantes h.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a, 1929. Ardèche: HELSDINGEN & al., 1977; RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1949c; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1929. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1884a, 1929. Drôme: SIMON, 1929. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1929. Var: DENIS, 1934a, 1935a; SIMON, 1884a. — Espagne, Italie (*T. h.*). **Altitude.** Jusqu'à 700 m (HELSDINGEN & al., 1977). **Habitat.** Bord de rivière: CANARD, 1989. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins; forêt de pins et de châtaigniers: HELSDINGEN & al., 1977. Forêt, détritiques secs, litière: SIMON, 1929. Garrigue: DENIS, 1949c. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Grotte: DENIS, 1949c; LUCZACK & al., 1964. Mousses; sous une pierre: DENIS, 1934a. Taillis de chênes-verts: DENIS, 1949c. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1934a, 1949c. Juin: DENIS, 1949c. Juillet: CANARD, 1989; HELSDINGEN & al., 1977. Septembre: DENIS, 1935a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a, 1949c. Juin: DENIS, 1949c. Juillet: HELSDINGEN & al., 1977.

**Lepthyphantes homonymus** (Denis, 1934)*Canariphantes h.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1934b, 1943c. — Espagne. Portugal, Algérie (*C. h.*). **Période.** — *Mâle.* Décembre: DENIS, 1934b.

**Lepthyphantes huberti** Wunderlich, 1980

**Répartition.** Corse: WUNDERLICH, 1980b. — Connue seulement de Corse. **Altitude.** De 1700 m jusqu'à 1900 m (WUNDERLICH, 1980b). **Habitat.** À proximité de la neige: WUNDERLICH, 1980b.

**Lepthyphantes ignavus** (Simon, 1884)*Mughiphantes i.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. Isère: SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1929. — Espagne, Italie. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929.

**Lepthyphantes improbulus** (Simon, 1929)*Improphantes i.*

**Répartition.** Loire (Haute-): LEDOUX & al., 2001. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Italie (*I. i.*). Paléarctique (*I. i.*). **Altitude.** De 1750 m jusqu'à

2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Sous des grands rochers; sous une pierre: BOSMANS & al., 1985a.

**Lepthyphantes insignis** (O. P.-Cambridge, 1913)*L. papalis*; *Palliduphantes i.*

**Répartition.** Finistère: MANACH, 1995. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Orne: ASSELIN, 1990. Seine-Maritime: CORNIC, 1977. Vaucluse: SIMON, 1929 (*L. p.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe (*P. i.*). **Habitat.** Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & al., 2002.

**Lepthyphantes johannislupi** (Denis, 1953)*Mughiphantes j.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2340 m jusqu'à 2590 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Sous une pierre: DENIS, 1953a. **Période.** — *Mâle.* Août: DENIS, 1953a. — *Femelle.* Août: DENIS, 1953a.

**Lepthyphantes jugorum** (Denis, 1954)*Mughiphantes j.*

**Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1967d. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2000 m jusqu'à 3040 m (DENIS, 1954a). **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1954a. Août: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1954a.

**Lepthyphantes keyserlingi** (Ausserer, 1867)*Microneta k.*

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*M. k.*), 1929. Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche: SIMON, 1929. Aube: SIMON, 1884b (*M. k.*), 1929. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gard: SIMON, 1929. Isère: SIMON, 1884b (*M. k.*), 1929. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1961b. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. Vaucluse: SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Friches sèches, sous les pierres: SIMON, 1884b, 1929. Prairie: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Avril: LESSERT, 1904, 1910. Mai: DENIS, 1933b; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1961b. Septembre: EMERIT & al., 1997. Décembre: LESSERT, 1910.

**Lepthyphantes leprosus** (Ohlert, 1865)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Alpes-de-Haute-Provence: DRESKO, 1962; SIMON, 1884a. Ardèche: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1962; HUBERT, 1964a. Ariège: JEANNEL, 1926; SIMON, 1911. Aube: SIMON, 1884a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884a. Doubs: DRESKO, 1962. Drôme: FAGE, 1931. Eure: SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1939a; MANACH, 1995. Isère: SIMON, 1884a. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; BRAUD & al., 2005; DRESKO, 1959a. Marne: SIMON, 1884a. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a,

1963c; DRESKO, 1959a. Meurthe-et-Moselle: DRESKO, 1962; FLORENTIN, 1904; REMY, 1927, 1932b. Morbihan: SIMON, 1884a. Nord: DENIS, 1930, 1934c. Oise: SIMON, 1884a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b. Pyrénées-Atlantiques: JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b. Pyrénées-Orientales: JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1910. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; PASQUET & al., 1992. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962. Savoie: DRESKO & al., 1975. Savoie (Haute-): MULLER & al., 1895. "Seine": DALMAS, 1915; DRESKO, 1947c; SIMON, 1884a. Seine-Maritime: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884a, 1898b. Somme: ROSELLE, 1891. Tarn: DRESKO & al., 1968. Var: SIMON, 1884a. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique, Chili. **Habitat.** Bâtiment: DENIS, 1950b, 1962b. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1962. Carrière, galerie souterraine: BEAUCOURNU & al., 1963b. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Cave: DENIS, 1934c; SIMON, 1884a, 1929. Cavités souterraines: SIMON, 1929. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Grotte: BALAZUC & al., 1952; BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; FLORENTIN, 1904; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; REMY, 1927, 1932b; SIMON, 1884a, 1907b, 1910, 1911, 1913. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: ROSELLE, 1891. Maison: BERENGER-LEVEQUE & al., 1994; DALMAS, 1915; DENIS, 1963c, 1965c. Mine de charbon: DENIS, 1930, 1934c. Prairie: PASQUET & al., 1992. Sous les herbes sèches: SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DRESKO, 1962. Février: DENIS, 1965c. Mars: DRESKO, 1959a. Mai: DRESKO, 1962. Juillet: DALMAS, 1915; DENIS, 1962b. Septembre: DENIS, 1962b. Décembre: DRESKO, 1962. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1962b; DRESKO, 1959a. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1965c; DRESKO, 1959a. Avril: DENIS, 1963c; DRESKO, 1947c. Juin: DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Juillet: DENIS, 1939a, 1950b, 1962b; DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1975. Août: DRESKO, 1962. Septembre: DENIS, 1962b. Novembre: DENIS, 1962b; DRESKO, 1959a. Décembre: DRESKO, 1962.

#### *Lepthyphantes leucopygius* Denis, 1939

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Lozère: DENIS, 1939b. — Connue seulement de France. **Habitat.** Falaise, dans une profonde anfractuosité: DENIS, 1939b. **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1939b.

#### *Lepthyphantes liguricus* (Simon, 1929)

##### *Palliduphantes l.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. — Italie. Europe (*P. l.*).

#### *Lepthyphantes longiseta* (Simon, 1884)

##### *Palliduphantes l.*

**Répartition.** Corse: MULLER & al., 1991; SIMON, 1884a, 1929. — Connue seulement de Corse et de

l'île d'Elbe. **Habitat.** Forêt, litière: MULLER & al., 1991. **Période.** — *Mâle*. Juin: MULLER & al., 1991. — *Femelle*. Juin: MULLER & al., 1991.

#### *Lepthyphantes mansuetus* (Thorell, 1875)

##### *L. bidens*; *Mansuphantes m.*

[Selon SIMON, 1929 les citations de SIMON, 1884a sous le nom de *L. mansuetus* sont erronées et se rapportent à *L. simoni*]. **Répartition.** Aube, Cantal: SIMON, 1884a (*L. b.*), 1929. Corrèze: LE PERU, 2004. Drôme, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme: SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884a (*L. b.*), 1929. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse (*M. m.*). Paléarctique (*M. m.*). **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1929. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: LEDOUX & al., 1996a. Prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Sous une pierre: LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle*. Janvier à mars: LE PERU, 2004. Septembre, novembre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Février: LE PERU, 2004. Mars: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2003. Mai, juillet, septembre: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LE PERU, 2004. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. Décembre: LE PERU, 2004.

#### *Lepthyphantes margaritae* (Denis, 1934)

##### *Palliduphantes m.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1934b, 1943c. — Espagne. **Altitude.** 2500 m (DENIS, 1961b). **Période.** — *Mâle*. Décembre: DENIS, 1934b. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1961b.

#### *Lepthyphantes meillonae* Denis, 1953

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1780 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Prairie, sous des pierres: DENIS, 1953a. **Période.** — *Femelle* avec cocon. Août: DENIS, 1953a.

#### *Lepthyphantes mengei* (Kulczynski, 1887)

##### *L. gallicus*; *Tenuiphantes m.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1929 (*L. g.*). Alpes-de-Haute-Provence: MULLER, 1985; SIMON, 1929 (*L. g.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*L. g.*). Corrèze: LE PERU, 2004; SIMON, 1929 (*L. g.*). Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a. Dordogne: SIMON, 1929 (*L. g.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: ASSELIN, 1990. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; DRESKO, 1947a (*L. g.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979. Jura, Landes, Loire: SIMON, 1929 (*L. g.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle: SIMON,

1929 (*L. g.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: DENIS, 1958a; EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*L. g.*); LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1953a (*L. g.*), 1960a; SIMON, 1929 (*L. g.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1952c (*L. g.*), 1967d; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a; SIMON, 1929 (*L. g.*). Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*T. m.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; SIMON, 1929 (*L. g.*). “Seine”: ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. Var: DENIS, 1949c (*L. g.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1964b. Vienne (Haute-): SIMON, 1929 (*L. g.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. m.*). Paléarctique (*T. m.*). **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (LEDOUX & *al.*, 1996c). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996b. Aulnes, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Bois de chênes et charmes, litière; bois de hêtres et chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1938a; LEDOUX & *al.*, 2002. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Forêt: DENIS, 1958a; SIMON, 1929. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & *al.*, 1987. Forêt de pins: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de pins, herbes sèches: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Fougères: DENIS, 1948b. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Grotte: DRESKO, 1947a. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Marécage: EMERIT & *al.*, 1999; SIMON, 1929. Mélèzes: LEDOUX & *al.*, 1996b. Prairie: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie sèche: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Rhododendrons, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. Sur un rhododendron: DENIS, 1952c. Taillis de chênes: DENIS, 1949c. Verger: LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle.* Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mai: SIMON, 1929. Juin: EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1949c, 1960a; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c. Août: DENIS, 1952c; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Septembre: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c; SIMON, 1929. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1948b; EMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: DENIS, 1949c, 1954a, 1960a, 1961b, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c. Août: DENIS, 1953a; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c; MÜLLER, 1985; SIMON, 1929. Octobre: LE PERU, 2004. Novembre: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a.

### *Lepthyphantes midas* (Simon, 1884)

*Midia m.*

**Répartition.** Seine-et-Marne: SIMON, 1884a, 1929. — Grande-Bretagne (*M. m.*). Europe (*M. m.*). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929.

### *Lepthyphantes minutus* (Blackwall, 1833)

**Répartition.** Ain, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a, 1899, 1909a. Finistère: MANACH, 1995. Gironde: SIMON, 1884a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Orne: ASSELIN, 1990. Puy-de-Dôme: SIMON, 1884a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Sarthe: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a. “Seine”: CHRISTOPHE, 1974; ROLLARD, 2000; SIMON, 1884a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne, Var: SIMON, 1884a. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c, 1966a. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** 200 m (DENIS, 1953b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Bois de conifères, mousses: SIMON, 1929. Bâtiment: DENIS, 1962b, 1964b. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a. Carrière, galerie souterraine: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b. Cavités souterraines: SIMON, 1929. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Cour, sous un tas de bois: DENIS, 1963c. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt claire, sol: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, sous l'écorce d'un arbre mort: LE PERU, 2004. Grotte: BEAUCOURNU & *al.*, 1963c. Jardin, dans un tas de bois: LE PERU, 2004. Maison: DENIS, 1964b, 1965c. Maison, sur une fenêtre: DENIS, 1966a. Sous les troncs de hêtres abattus: SIMON, 1899. **Période.** — *Mâle.* Septembre, octobre: LE PERU, 2004. Novembre: DENIS, 1962b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1953b. Avril: DRESKO, 1959a. Mai: DENIS, 1965c. Juin: EMERIT & *al.*, 1997. Juillet, août: DENIS, 1964b. Septembre: DENIS, 1963c; LEDOUX & *al.*, 1996a. Novembre: LEDOUX & *al.*, 2003. Décembre: DENIS, 1964b.

### *Lepthyphantes monachus* (Simon, 1884)

*Tenuiphantes m.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1929. — Italie, Suisse (*T. m.*). Europe (*T. m.*). **Altitude.** [SIMON, 1929 indique: près du sommet du Canigou]. **Habitat.** Sous des touffes de *Saxifraga* et de sedum: SIMON, 1929.

### *Lepthyphantes monticola* (Kulczynski, 1881)

*Anguliphantes m.*; *L. culminicola.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a (*L. c.*). Alpes-Maritimes, Gard: SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. — Alpes du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1929. Allemagne, Italie, Suisse (*A. m.*). Europe (*A. m.*). **Altitude.** 2400 m (LEDOUX & *al.*,

1996c). **Habitat.** Prairie: SIMON, 1884a. Prairie, sous les pierres et à la base des plantes: SIMON, 1929. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Femelle.* Juillet, septembre: LEDOUX & al., 1996c.

*Lepthyphantes mughii* (Fickert, 1875)

*Mughiphantes m.*

**Répartition.** Isère: SIMON, 1884a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Alpes de Savoie, du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1929. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse (*M. m.*). Europe, Russie (*M. m.*). **Altitude.** 1680 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996c. Buissons de hêtres: SIMON, 1884a. Buissons et branches basses des arbres: SIMON, 1929. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Prairie; rhododendrons, au sol: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

*Lepthyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830)

*Linyphia nebulosa*; *Megalepthyphantes n.*

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Finistère: ASSELIN, 1990. Nord: DENIS, 1934c. Oise: SIMON, 1884a, 1929. "Seine": LUCAS, 1875 (*L. n.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*M. n.*). Holarctique (*M. n.*). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Carrière: SIMON, 1884a, 1929. Cavités souterraines: SIMON, 1929. Jardin, sur un mur: LENICE, 1992. **Période.** — *Femelle.* Septembre: LUCAS, 1875.

*Lepthyphantes nitidior* Simon, 1929

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1929. — Connue seulement de France.

*Lepthyphantes nitidus* (Thorell, 1875)

*Improphantes n.*; *L. kochi*.

**Taxonomie.** La synonymie *L. kochi* (Kulczynski, 1898) = *L. nitidus* est établie par MORITZ, 1973. **Répartition.** Aube, Jura: SIMON, 1929 (*L. k.*). — Alpes du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1929. Allemagne, Italie, Suisse (*I. n.*). Europe (*I. n.*).

*Lepthyphantes nodifer* Simon, 1884

*L. pallidus* [err.].

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Isère: SIMON, 1884a. Jura: SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b [*L. pallidus*, err. selon LEDOUX & al., 1996c], 1996c. — Alpes: SIMON, 1929. Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1929. Forêt, au sol; mélèzes, au sol: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c.

*Lepthyphantes notabilis* Kulczynski, 1887

*L. aciculifer.*

**Répartition.** Ardèche: BALAZUC & al., 1952 (*L. a.*); DRESKO, 1962 (*L. a.*); SIMON, 1929 (*L. a.*). Côte-

d'Or: DRESKO, 1962 (*L. a.*). Drôme: SIMON, 1929 (*L. a.*). Hérault: LOPEZ & al., 1978b (*L. a.*), 1979 (*L. a.*). Vosges: BLICK, 1991. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Centre Europe. **Altitude.** 680m (BLICK, 1991). **Habitat.** Grotte: BALAZUC & al., 1952; DRESKO, 1962; LOPEZ & al., 1978b, 1979; SIMON, 1929. Terril: BLICK, 1991. À l'air libre sous une souche humide: SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle.* Août, novembre: DRESKO, 1962.

*Lepthyphantes obscurus* (Blackwall, 1841)

*Obscuriphantes o.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): HELSDINGEN, 1995; SIMON, 1884a, 1929. Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a, 1929. Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ariège: SIMON, 1929. Aube: SIMON, 1884a, 1929. Aude: DELFOSSÉ, 2000a. Cantal: SIMON, 1884a, 1929. Cher: DENIS, 1943b. Corse: SIMON, 1884a, 1929. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1929. Finistère: MANACH, 1995. Gard: SIMON, 1929. Isère: SIMON, 1884a, 1929. Landes, Lozère, Manche: SIMON, 1929. Morbihan: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a; SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1929. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; SIMON, 1929. "Seine": COCQUEMPOIT & al., 1991; SIMON, 1884a, 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*O. o.*). Paléarctique (*O. o.*). **Altitude.** Jusqu'à 2020 m (DENIS, 1952c). [SIMON, 1929 indique: jusqu'au sommet du Canigou]. **Habitat.** Aulnes, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Bois: DENIS, 1943b, 1957a. Bois de hêtres et chênes: EMERIT & al., 1997. Bord de lac, bois de pins: DENIS, 1952c. Champ de céréales: COCQUEMPOIT & al., 1991. Conifères: SIMON, 1884a. Épicéas: DENIS, 1948b. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996b. Prairie: LEDOUX & al., 1996c. Prairie, sous les genêts: LEDOUX & al., 1996a. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1884a. Juin: DENIS, 1938a, 1948b; SIMON, 1884a. Juillet: SIMON, 1929. Août: DENIS, 1957a; LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884a. Juin: DENIS, 1943b; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1884a. Juillet: DENIS, 1952c. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

*Lepthyphantes ollivieri* Denis, 1957

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1500 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1957a. **Période.** — *Femelle.* Août: DENIS, 1957a.

*Lepthyphantes opilio* Simon, 1929

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Altitude.** 2400 m (DENIS, 1967d). **Habitat.** Prairie: SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1967d.



***Lepthyphantes oredonensis*** (Denis, 1950)*Palliduphantes o.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1951c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1960a. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1700 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 1860 m (DENIS, 1950b, 1951c). **Habitat.** Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1951c. Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Femelle.* Mars: DENIS, 1960a. Juillet: DENIS, 1950b, 1957a, 1960a, 1967d. Septembre: DENIS, 1951c.

***Lepthyphantes pallidus*** (O. P.-Cambridge, 1871)*L. troglodytes*; *Palliduphantes p.*

**Taxonomie.** À propos de *L. troglodytes* (L. Koch, 1872) et *L. pallidus* (O. P.-Cambridge, 1871), SIMON, 1929 note: «Je ne trouve rien de positif pour distinguer les femelles des deux espèces». La synonymie *L. troglodytes* = *L. pallidus* est établie par WIEHLE, 1956. **Répartition.** Ain: DENIS, 1958b; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; SIMON, 1884a. Aisne: SIMON, 1884a. Alpes-Maritimes: JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1907b. Ariège: DENIS, 1959a, 1967d; HUBERT, 1964a. Aube: SIMON, 1884a. Aveyron: DRESKO, 1962. Bouches-du-Rhône, Calvados: SIMON, 1884a. Charente: DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1956, 1959c, 1962. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; EMERIT & al., 1997; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a. Drôme: HUBERT, 1964a (*L. t.*); JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1959a. Gironde: SIMON, 1884a. Isère: DRESKO, 1962; HUBERT, 1964a; SIMON, 1884a. Jura: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963c; BRAUD & al., 2005; DRESKO, 1959a, 1962; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Marne (Haute-): SIMON, 1884a. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; FAGE, 1931. Meurthe-et-Moselle: DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a; REMY, 1927, 1932b. Morbihan: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a. Oise: SIMON, 1884a. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: DENIS, 1958a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962. Savoie (Haute-): DRESKO & al., 1968; LEDOUX & al., 1996c. Saône (Haute-): DRESKO, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a. Saône-et-Loire: DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; HUBERT, 1964a; SIMON, 1884a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884a. Seine-et-Marne: COCQUEMPO & al., 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1884a. Somme: SIMON, 1884a. Tarn: FAGE, 1931. Tarn-et-Garonne: HUBERT, 1964a; SIMON, 1884a. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1964b, 1965c. Vienne, Vosges: DENIS, 1958b. Yonne: JEANNEL, 1926; SIMON, 1910. [La citation de Haute-Savoie par LEDOUX & al., 1996b est erronée selon LEDOUX & al., 1996c, et se rapporte à *L. nodifer*].

— Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique (*P. p.*). **Habitat.** Bois de hêtres, éboulis, sous les pierres et dans les souches: EMERIT & al., 1997. Bois de hêtres, litière: DENIS, 1948b. Bois sombre, mousses: SIMON, 1884a. Carrière: DRESKO, 1959a. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a. Carrière, galerie souterraine: BEAUCOURNU & al., 1963b. Cave: SIMON, 1884a. Cavité artificielle: DRESKO & al., 1975. Cavité souterraine: SIMON, 1884a. Champ de céréales: COCQUEMPO & al., 1989. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: DENIS, 1938a, 1950a, 1958a, 1967d; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, mousses: DENIS, 1965c. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, clairière, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Forêt, mousses épaisses: SIMON, 1929. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DENIS, 1958b, 1959a; DRESKO, 1956, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a, 1964a; JEANNEL, 1926; REMY, 1927, 1932b; SIMON, 1907b, 1910, 1911, 1913. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais, détritus: SIMON, 1884a. Marécage: EMERIT & al., 1999. Mine: DENIS, 1959a; HUBERT, 1964a. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2002. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre: DENIS, 1941. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DRESKO, 1959a. Février: HUBERT, 1964a. Mars: DRESKO, 1959a. Avril: DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a. Mai: DRESKO & al., 1968; REMY, 1927, 1932b. Juin: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1997; HUBERT, 1964a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1948b; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Août: DRESKO, 1962. Septembre: HUBERT, 1964a. Octobre: DRESKO & al., 1968, 1975; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DRESKO, 1959a, 1959c; HUBERT, 1964a. Décembre: DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a, 1962. Février: EMERIT & al., 1999; HUBERT, 1964a. Mars: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Avril: DENIS, 1959a, 1962b; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a. Mai: DENIS, 1965c; DRESKO, 1962; HUBERT, 1964a. Juin: DENIS, 1938a, 1950a, 1959a; DRESKO, 1959c, 1962; EMERIT & al., 1997; HUBERT, 1964a; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1948b, 1967d; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a, 1964a; LEDOUX & al., 1996c. Août: DRESKO, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a. Septembre: DENIS, 1958b, 1959a; DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a, 1964a; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DENIS, 1958b; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Décembre: DRESKO, 1962; HUBERT, 1964a. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941.

***Lepthyphantes pinicola*** (Simon, 1884)*Piniphantes p.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a, 1929. Alpes-Maritimes, Drôme: SIMON, 1929. Gironde, Isère:

SIMON, 1884a, 1929. Landes : SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a, 2003 ; SIMON, 1929. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Seine-et-Marne : SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*P. p.*). Paléarctique (*P. p.*). **Altitude.** Jusqu'à 2380 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Forêt de conifères : LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères, litière et mousses : SIMON, 1929. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Novembre : LEDOUX & al., 1996a, 2003. — *Femelle.* Août : LEDOUX & al., 1996b. Septembre : LEDOUX & al., 1996a. Novembre : LEDOUX & al., 1996a, 2003.

***Lepthyphantes pseudoarciger*** Wunderlich, 1985

*Mansuphantes p.*

**Répartition.** Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Suisse (*M. p.*). **Altitude.** De 2200 m jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Forêt d'épicéas : LEDOUX & al., 1996b. Forêt d'épicéas, au sol ; sous une pierre : LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Septembre : LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet : LEDOUX & al., 1996c. Août : LEDOUX & al., 1996b. Septembre : LEDOUX & al., 1996c.

***Lepthyphantes pulcher*** (Kulczynski, 1881)

*L. striatus* ; *Mughiphantes p.*

**Répartition.** Isère : SIMON, 1884a (*L. s.*). — Alpes de Savoie et du Dauphiné : SIMON, 1929. Allemagne, Italie, Suisse (*M. p.*). Centre Europe (*M. p.*).

***Lepthyphantes pyrenaicus*** (Denis, 1953)

*Mughiphantes p.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1953a. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2730 m jusqu'à 2960 m (DENIS, 1953a). **Période.** — *Mâle.* Août : DENIS, 1953a. — *Femelle.* Août : DENIS, 1953a.

***Lepthyphantes sanctivincenti*** (Simon, 1872)

*L. monodon* ; *Linyphia s.* ; *Palliduphantes s.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1884a, 1929. Alpes-Maritimes : DRESKO, 1962. Alpes-de-Haute-Provence : DRESKO, 1962 ; JEANNEL, 1926 ; PEYERIMHOFF, 1906 (*L. s.*) ; SIMON, 1884a, 1913, 1929. Ardèche : BALAZUC & al., 1952, 1954 ; JEANNEL, 1926 ; SIMON, 1913, 1929. Aude : FAGE, 1931. Aveyron : DRESKO, 1962. Bouches-du-Rhône : DRESKO, 1962 ; LUCZACK & al., 1964. Côte-d'Or : SIMON, 1884a (*L. m.*), 1929. Drôme : DRESKO, 1962 ; DRESKO & al., 1975 ; FAGE, 1931 ; JEANNEL, 1926 ; SIMON, 1913, 1929. Gard : FAGE, 1931 ; SIMON, 1929. Hérault : DRESKO, 1962 ; FAGE, 1931 ; JEANNEL, 1926 ; JUBERTHIE & al., 1988 ; LOPEZ & al., 1978b, 1979, 1985 ; SIMON, 1884a, 1929. Isère : DRESKO, 1962 ; SIMON, 1884a (*L. m.*), 1884a, 1929. Var : DRESKO, 1962 ; JEANNEL, 1926 ; SIMON, 1884a, 1929. Vaucluse : SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois, mousses épaisses : SIMON, 1884a. Forêt sombre, mousses : SIMON, 1929. Grotte : BALAZUC & al., 1952, 1954 ; DRESKO, 1962 ; DRESKO & al., 1975 ; FAGE, 1931 ; JEANNEL, 1926 ; JUBERTHIE & al., 1988 ; LOPEZ & al., 1978b, 1979, 1985 ; LUCZACK & al., 1964 ; PEYERIMHOFF, 1906 ; SIMON, 1884a, 1913, 1929. **Période.** — *Mâle.* Avril : DRESKO, 1962. Juillet : DRESKO, 1962 ; DRESKO & al., 1975 ; JUBERTHIE & al., 1988. Septembre : DRESKO, 1962. Octobre : JUBERTHIE & al., 1988. — *Femelle.* Février : DRESKO, 1962. Mars : JUBERTHIE & al., 1988. Août, septembre : DRESKO, 1962. Octobre : JUBERTHIE & al., 1988.

THIE & al., 1988. — *Femelle.* Février : DRESKO, 1962. Mars : SIMON, 1929. Juillet : DRESKO, 1962 ; JUBERTHIE & al., 1988. Août, septembre : DRESKO, 1962. Octobre : JUBERTHIE & al., 1988.

***Lepthyphantes simoni*** (Kulczynski, 1894)

*L. mansuetus* [err.] ; *Mansuphantes s.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Aube : SIMON, 1884a [*L. mansuetus*, err. selon SIMON, 1929]. Calvados : GUIBÉ, 1946. Cantal, Isère : SIMON, 1884a [*L. mansuetus*, err. selon SIMON, 1929]. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1995, 1996a. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910 ; THALER, 1994. Seine, Seine-et-Marne : SIMON, 1884a [*L. mansuetus*, err. selon SIMON, 1929]. — Presque toute la France : SIMON, 1929. Italie, Suisse (*M. s.*). Ouest-Europe (*M. s.*). **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Détritius : SIMON, 1929. Forêt de chênes ; forêt de feuillus : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995. Mousses : SIMON, 1929. Prairie : SIMON, 1884a. Sous-bois, litière : LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Février : LEDOUX & al., 1996a. Novembre : THALER, 1994. — *Femelle.* Février : LEDOUX & al., 1996a. Mars : LESSERT, 1910. Juillet, septembre : LEDOUX & al., 1996a.

***Lepthyphantes spiniger*** (Simon, 1929)

*Tenuiphantes s.*

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; LEDOUX, 1993. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 350 m jusqu'à 1900 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Forêt de bouleaux et de hêtres : BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de sapins et de hêtres ; forêt mixte, troncs de sapins ; forêt, entrée de grotte ; forêt, litière ; gorge humide, mousses ; prairie sèche ; végétation de *Buxus*, *Rubus* et fougères : BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Août : LEDOUX, 1993.

***Lepthyphantes stygius*** (Simon, 1884)

*L. mitis* ; *Palliduphantes s.*

**Répartition.** Aude : SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales : JEANNEL, 1926 (*L. m.*) ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1913 (*L. m.*), 1929. — Espagne. Açores (*P. s.*). **Altitude.** 1280 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Genêts : LEDOUX & al., 1996a. Grotte : JEANNEL, 1926 ; SIMON, 1913, 1929. Marais salants, détritius : SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle.* Septembre : LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Avril, novembre : LEDOUX & al., 1996a.

***Lepthyphantes tenebricola*** (Wider, 1834)

*Linyphia t.* ; *Tenuiphantes t.*

[Selon SIMON, 1929 les citations de SIMON, 1884a sous le nom *L. tenebricola* sont erronées et se rapportent à *L. tenuis*]. **Répartition.** Ardèche : BALAZUC & al., 1952 ; RAPHAËL & al., 1992. Ariège : DENIS, 1960a, 1967d. Calvados : LUCAS, 1874c (*L. t.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : CANARD, 1989. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1899, 1909a. Gard : LEDOUX, 2000. Loire-Atlantique : LUCAS, 1882a (*L. t.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Manche : KERVILLE, 1900 ; LUCAS, 1878b (*L. t.*). Marne : LUCAS, 1878a (*L. t.*). Mayenne : DRESKO & al., 1968. Morbihan, Orne : ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais : DENIS, 1958a. Puy-de-Dôme : DENIS, 1948b ; LE PERU,

2004. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b, 1960a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; DENIS, 1961b ; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine" : LUCAS, 1875 (*L. t.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 ; SIMON, 1898b. Somme : ROSELLE, 1891. Var : SIMON, 1898c. Vendée : DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Yonne : LUCAS, 1872 (*L. t.*). — Toute la France : SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. t.*). Paléarctique (*T. t.*). **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Bois : DENIS, 1960a ; LUCAS, 1875. Bois de hêtres ; bois de hêtres, chênes et charmes : EMERIT & al., 1997. Bois, herbes humides : DENIS, 1948b. Bois, litière : CANARD, 1989. Bois, mousses : SIMON, 1929. Bord de mer : KERVILLE, 1900. Bord de ruisseau, pierres : BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau, sous des pierres : DENIS, 1950b. Clôture : BRAUD & al., 2005. Dune : DENIS, 1962b. Forêt : DENIS, 1958a, 1961b. Forêt d'épicéas : LEDOUX & al., 1996b. Forêt d'épicéas, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Forêt de chênes et hêtres, litière : LE PERU, 2004. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins : BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins, clairière, dans les herbes couchées : DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière : DENIS, 1964b. Forêt humide, mousses : LE PERU, 2004. Forêt, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Friche : VEILLON, 1997. Grotte : BALAZUC & al., 1952 ; DRESKO & al., 1968. Haie : LUCAS, 1874c. Lande : LUCAS, 1882a. Litière : DENIS, 1967d ; LEDOUX & al., 1996a. Litière de hêtres : DENIS, 1948b. Maison : DENIS, 1962b, 1965c. Maquis, litière : CANARD, 1989. Marécage : ROSELLE, 1891. Mousses : SIMON, 1909a. Ombellifères : LANCELEVÉE, 1884. *Populetum albae*, litière : LEDOUX, 2000. Prairie : LEDOUX & al., 1996b. Prairie en friche, mousses : LE PERU, 2004. Prairie sèche : BOSMANS & al., 1985a. Prairie très humide : LE PERU, 2004. Rhododendrons, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Sous les écorces de cerisiers : LANCELEVÉE, 1884. Sous les épicéas, herbes : DENIS, 1948b. Sous une pierre : LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Avril : DENIS, 1962b ; LE PERU, 2004. Juin : DENIS, 1948b. Juillet : DENIS, 1960a, 1961b ; DRESKO & al., 1968 ; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août : LEDOUX & al., 1996b ; LUCAS, 1878b. Septembre : CANARD, 1989 ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Février : DENIS, 1965c. Mars : DENIS, 1964b. Avril : DENIS, 1962b ; LE PERU, 2004. Mai : LEDOUX & al., 1996a. Juin : DENIS, 1948b, 1962b ; EMERIT & al., 1997 ; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1950b, 1960a ; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août : LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996b ; LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre : CANARD, 1989 ; DENIS, 1967d ; LEDOUX & al., 1996a, 1996c ; LUCAS, 1875. Novembre : DENIS, 1965c ; LEDOUX, 2000.

***Lepthyphantes tenerrimus*** Simon, 1929

**Répartition.** Pyrénées-Orientales : SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Mousses et détritus : SIMON, 1929.

***Lepthyphantes tenuis*** (Blackwall, 1852)

*L. tenebricola* [err.] ; *Linyphia t.* ; *Tenuiphantes t.*

**Répartition.** Ain : HEIDT & al., 1998. Alpes (Hautes-) : DRESKO, 1962 ; HELSDINGEN, 1995 ; MÜLLER,

1985. Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Ariège : DENIS, 1960a, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c ; KABOUCHE & al., 1997. Calvados : ASSELIN & al., 1989 ; GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime : BELIN, 2001 ; JOURDE & al., 1999. Cher : DENIS, 1943b. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1884a [*L. tenebricola*, err. selon SIMON, 1929]. Côtes-d'Armor : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : EMERIT & al., 2003 ; SIMON, 1909a. Finistère : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a ; MANACH, 1995. Gard : LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a. Gironde : DENIS, 1951b. Ille-et-Vilaine : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1940a. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loiret : COCQUEMOT & al., 1984 ; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Manche : ASSELIN, 1990 ; BERLAND, 1924 ; PÉTILLON & al., 2004 (*T. t.*). Morbihan : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1938a. Nord : EMERIT & al., 1999. Orne : ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais : BONTE, 2000 ; DENIS, 1937d ; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme : DENIS, 1948b ; LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 ; DENIS, 1950b, 1959a, 1960a. Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; DENIS, 1933b, 1961b, 1967d ; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003 ; SOYER, 1965. Rhin (Bas-) : DENIS, 1950a ; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000 (*T. t.*) ; DENIS, 1950a. "Seine" : CHRISTOPHE, 1974 ; CHRISTOPHE & al., 1977 ; COCQUEMOT & al., 1991 ; DRESKO, 1947c ; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994 ; CORNIC, 1977. Seine-et-Marne : COCQUEMOT & al., 1984, 1989, 1990. Var : DENIS, 1934a, 1935b. Vaucluse : LEDOUX, 2000. Vendée : CLARK & al., 1970 ; DENIS, 1940b, 1941, 1949b, 1959c, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c, 1966a. Yonne : LUCAS, 1872 (*L. t.*). — Toute la France : SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. t.*). Europe, Afrique du Nord (ailleurs introduit) (*T. t.*). **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne : EMERIT & al., 1997. Arrière-dune : DENIS, 1964b, 1965c ; LEDOUX & al., 1999a. Bois : BRAUD & al., 2005 ; DENIS, 1941, 1959d, 1960a. Bois calcicole de hêtres : EMERIT & al., 1999. Bois, litière : BRAUD & al., 2005. Bord d'étang : DENIS, 1938a. Bord d'étang saumâtre : DENIS, 1950c. Bord de lac : DENIS, 1960a. Bord de mer, végétation halophile : DENIS, 1949b. Bord de rivière : LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules : LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, graviers : HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, herbes humides : DENIS, 1939a. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus* : KABOUCHE & al., 1997. Bord de ruisseau : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1941. Bord de ruisseau, mousses et sous les pierres : DENIS, 1950b. Bord de ruisseau, pierres : BOSMANS & al., 1985a. Bruyères : DENIS, 1948b. Carrière, sous un tas de pierres calcaires : DRESKO, 1947c. Champ de céréales : COCQUEMOT & al., 1984, 1989, 1990, 1991. Clôture : BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Détritus : SIMON, 1884a, 1929. Dune : DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux : BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs coupés : DENIS, 1951b. Estuaire, sous la croûte des algues séchées : DENIS, 1939a. Fagots : SIMON, 1884a, 1929. Formation à chê-

nes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1960a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1987. Forêt de chênes pubescents et d'érables: SOYER, 1965. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, herbes sèches: DENIS, 1950a. Forêt, litière et mousses: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, sur un chêne: DENIS, 1963c. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Grotte: DENIS, 1941, 1959a; DRESKO, 1962. Haie: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1941, 1948b. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Jardin en milieu urbain: VEILLON, 1997. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lieu humide: DENIS, 1940a. Litière sèche: SIMON, 1884a. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & al., 1970. Littoral, falaise humide: DENIS, 1941. Littoral, grotte dans la falaise: DENIS, 1940b. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral, marécage: DENIS, 1959c. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Maison: DENIS, 1966a. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1938a, 1950c, 1962b; EMERIT & al., 1999, 2003. Mousses: SIMON, 1929. Mousses sèches: DENIS, 1934a. Pelouse: BERLAND, 1924. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Plage, galets; plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Plantation de peupliers: BOSMANS & al., 1985a. *Populetum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; CORNIC, 1977; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002, 2003. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Sous les épicéas, herbes sèches: DENIS, 1948b. Sous une pierre: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1934a, 1940a; MÜLLER, 1985. Sur la boue sèche, herbes: DENIS, 1965c. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Végétation sèche: DENIS, 1940a. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1963c; LEDOUX, 2000. Février: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1959a, 1964b. Avril: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2003. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1934a, 1950c, 1965c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1948b, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1939a, 1940a, 1950b, 1959c, 1966a; LEDOUX, 2000. Août: DENIS, 1960a. Septembre: DENIS, 1951b, 1963c; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Février: DENIS, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1964b. Avril: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b; DRESKO, 1947c; EMERIT

& al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1934a, 1950c, 1965c; EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1943b, 1948b, 1950a, 1954a; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002, 2003; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1948b, 1950b, 1959c, 1959d, 1960a, 1961b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: DRESKO, 1962; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2003. Septembre: DENIS, 1951b, 1959c, 1960a, 1963c; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985; VEILLON, 1997. Octobre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1999; KABOUCHE & al., 1997; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997.

#### *Lepthyphantes todillus* Simon, 1929

[Femelle inconnue]. **Répartition.** [Aucune localité précise. SIMON, 1929 indique: «Alpes du Dauphiné. Un mâle mêlé à nos *L. culminicola (monticola)*»]. — Connue seulement de France.

#### *Lepthyphantes variabilis* Kulczynski, 1887

*Mughiphantes* v.

**Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. — Allemagne, Italie, Suisse (*M. v.*). Europe centrale (*M. v.*). **Habitat.** Blocs de pierres: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Femelle*. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

#### *Lepthyphantes zimmermanni* (Bertkau, 1890)

*L. zebrinus* [err.]; *Tenuiphantes* z.

[Les citations sous *L. zebrinus* sont erronées selon SIMON, 1929; *L. zebrinus* est en fait un synonyme de *L. decolor*]. **Répartition.** Ain, Aisne, Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Ariège: DENIS, 1960a, 1967d. Aube: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Calvados: ASSELIN & al., 1989; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Cantal: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1959c; HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 [*L. zebrinus*, err.]; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Eure-et-Loire: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1947a; DRESKO & al., 1961, 1968; HUBERT, 1964a. Gironde: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; MARC, 1990b; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Isère: DRESKO, 1962; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Jura: HUBERT, 1964a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Nièvre: DRESKO, 1959c. Nord: EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1960a, 1967d; DRESKO & al., 1961. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS,

1957a, 1959d; DRESKO & al., 1961; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1952c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; ROLLARD, 2000; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; DRESKO & al., 1968; LANCELEVÉE, 1884 [*L. zebrinus*, err.]; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Seine-et-Marne: COCQUEMPOU & al., 1984; DOIGNON, 1976 [*L. zebrinus*, err.]; SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Somme, Tarn-et-Garonne: SIMON, 1884a [*L. zebrinus*, err.]. Var: DENIS, 1935b. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. z.*). Europe, Russie (*T. z.*). **Altitude.** Jusqu'à 2380 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnes: LEDOUX & al., 1996b. Blocs de pierres: LEDOUX & al., 1996c. Bois: DENIS, 1957a, 1959d. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres et chênes, bord de rivière; bois de hêtres, chênes et charmes; bois de hêtres, sous les pierres et dans les souches: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1951c. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de ruisseau, pierres; broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière souterraine: DRESKO, 1959c. Champ de céréales: COCQUEMPOU & al., 1984. Clôture: BRAUD & al., 2005. Doline: DRESKO & al., 1961. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Éboulis: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996c. Forêt: ASSELIN & al., 1989; LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de conifères, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987; DENIS, 1951c, 1964b. Forêt de pins, herbes sèches: DENIS, 1962b. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt de sapins et de hêtres; forêt, entrée de grotte; forêt, litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, litière sèche: SIMON, 1929. Forêt, sous des pierres ou dans les mousses: LE PERU, 2004. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Fougères: LEDOUX & al., 1996a. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1959a; DRESKO, 1947a, 1962; DRESKO & al., 1961, 1968; HUBERT, 1964a. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Litière: DENIS, 1967d. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003. Mousses: DENIS, 1967d. Mélèzes, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Oyats: DENIS, 1964b. Paroi rocheuse suintante, mousses épaisses: DENIS, 1960a. Prairie: CORNIC, 1977. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Rocher, mousses humides: DENIS, 1952c. Sous une pierre: DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Mai: DRESKO & al., 1968; EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1957a, 1960a; DRESKO & al., 1961. Août: DENIS, 1957a, 1962b, 1967d; DRESKO &

al., 1961; HUBERT, 1964a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: DENIS, 1951c; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; EMERIT & al., 1997, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Janvier: LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959c; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1950b, 1957a, 1959d, 1960a; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1961; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août: DENIS, 1952c, 1957a, 1964b, 1967d; DRESKO & al., 1961; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1951c, 1959a; DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1961, 1968; EMERIT & al., 1997, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Octobre: DENIS, 1963c, 1967d; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 2003; HUBERT, 1964a; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1964b, 1967d.

#### *Lepthyphantes zonatus* (Simon, 1884)

*Bolyphantes z.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche: SIMON, 1929. Bouches-du-Rhône, Hérault: SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1929. Var: DENIS, 1934a, 1935a, 1949c; SIMON, 1884a, 1929. — Espagne, Italie, Portugal (*B. z.*). **Habitat.** Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Mousses et détritiques: SIMON, 1929. Taillis de chênes: DENIS, 1949c. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Septembre: DENIS, 1935a.

#### *Leptorhoptrum robustum* (Westring, 1851)

*L. huthwaiti.*

**Répartition.** Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Savoie: MÜLLER, 1985. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Seine-Maritime: SIMON, 1926 (*L. h.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (MÜLLER, 1985). **Habitat.** Friche: PASQUET & al., 1992. Marécage: SIMON, 1926. Prairie: LEDOUX & al., 1996b. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. **Période.** — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: MÜLLER, 1985.

#### *Leptothrix hardyi* (Blackwall, 1850)

*Phaulothrix hardi*; *Tmeticus hardii.*

**Répartition.** Cantal: SIMON, 1884a (*T. h.*), 1926 (*P. h.*). Maine-et-Loire: SIMON, 1926 (*P. h.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Paléarctique. **Habitat.** Bois de sapins, mousses: SIMON, 1884a.

#### *Lessertia denticelis* (Simon, 1884)

*Macrargus d.*; *Tmeticus d.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a (*T. d.*), 1926. Alpes-de-Haute-Provence: DRESKO & al., 1975. Ardèche: DRESKO & al., 1968; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1926. Ariège: DENIS, 1953b, 1959a, 1967d; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1926. Gard: DRESKO, 1962; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911. Hérault: SIMON, 1926. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU &

*al.*, 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a. Nord: DENIS, 1930, 1934c, 1955b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; SIMON, 1926. Rhône: DRESKO & *al.*, 1975. "Seine": BERLAND, 1911 (*M. d.*); SIMON, 1926. Var: DENIS, 1933a, 1934a; SIMON, 1884a (*T. d.*), 1926. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Canaries, Madère, Canada, Nouvelle-Zélande. **Habitat.** Bois sombre, mousses: SIMON, 1926. Bord de source: BOSMANS & *al.*, 1985a. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a. Carrière, galerie souterraine: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b. Cour, sur un tas de pierres et de feuilles: BERLAND, 1911. Galerie souterraine: DRESKO & *al.*, 1975. Grotte: BEAUCOURNU & *al.*, 1963c; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1926. Herbes humides: DENIS, 1934a. Marais, détritiques: SIMON, 1926. Marais, détritiques végétaux très humides: DENIS, 1934c. Mine: DRESKO, 1962. Mine de charbon: DENIS, 1930, 1955b. Ruisseau souterrain: DENIS, 1959a. Sous une pierre: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Février: DRESKO & *al.*, 1975. Mars: DENIS, 1933b, 1967d; DRESKO, 1959a. Mai: DENIS, 1934a; DRESKO, 1962. Août: DRESKO & *al.*, 1968. Septembre: DENIS, 1953b. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Janvier: DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a. Février: DRESKO & *al.*, 1975. Mars: DENIS, 1959a; DRESKO, 1959a. Avril: DENIS, 1933b; DRESKO & *al.*, 1975. Mai: DRESKO, 1962. Août: DRESKO & *al.*, 1968. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle avec cocon.* Avril: DENIS, 1933b.

*Lessertinella kulczynskii* (Lessert, 1909)

*Gongylidiellum k.*

**Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1962c, 1967d. Savoie (Haute-): LESSERT, 1909 (*G. k.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Autriche. **Habitat.** Bord de rivière, détritiques: LESSERT, 1909. Détritiques d'inondation: DENIS, 1962c, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1962c, 1967d. Mars: LESSERT, 1909.

*Linyphia alpicola* van Helsdingen, 1969

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Savoie: HELSDINGEN, 1995. — Allemagne, Italie, Suisse. Centre Europe. **Altitude.** De 1550 m jusqu'à 1900 m (HELSDINGEN, 1995). **Habitat.** Forêt: HELSDINGEN, 1995. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: HELSDINGEN, 1995. — *Femelle.* Juillet, août: HELSDINGEN, 1995.

*Linyphia hortensis* Sundevall, 1830

*Nerienne h.*

**Répartition.** Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909a. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: DENIS, 1958a; EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986 (*N. h.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1933d; LEDOUX, 1993. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1891. — Tout le nord

et le centre de la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois: BRAUD & *al.*, 2005; SIMON, 1884a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & *al.*, 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, herbes: SIMON, 1929. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Forêt: ASSELIN & *al.*, 1989; DENIS, 1958a. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Gorge humide, mousses: BOSMANS & *al.*, 1985a. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: ROSELLE, 1891. Prairie humide: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Sous les épicéas: DENIS, 1948b. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002. Juin: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Août: LEDOUX, 1993. — *Femelle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b, 1948b; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: LE PERU, 2004.

*Linyphia maura* Thorell, 1875

*L. triangularis maura.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929 (*L. t. m.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*L. t. m.*); SIMON, 1929 (*L. t. m.*). Corse: CANARD, 1989. Gard: DENIS, 1962a (*L. t. m.*). Hérault: HELSDINGEN, 1969. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1929 (*L. t. m.*). Var: DENIS, 1935a (*L. t. m.*); SIMON, 1929 (*L. t. m.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Pelouse sèche, parsemée de chênes-verts et de *Viburnum tinus*: DENIS, 1962a. **Période.** — *Mâle.* Octobre: HELSDINGEN, 1969. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Septembre: DENIS, 1935a. Octobre: HELSDINGEN, 1969.

*Linyphia tenuipalpis* Simon, 1884

*L. triangularis tenuipalpis.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Bouches-du-Rhône: HELSDINGEN, 1969. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Drôme, Gard, Hérault: HELSDINGEN, 1969. Pyrénées-Orientales: HELSDINGEN, 1969; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a. — Toute la France: SIMON, 1929 (*L. t. t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (HELSDINGEN, 1969). **Habitat.** Formation à chênes-verts; forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Maquis de cistes: LEDOUX & *al.*, 1996a. Marécage: BELIN, 2001. **Période.** — *Mâle.* Juillet: HELSDINGEN, 1969; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: HELSDINGEN, 1969. — *Femelle.* Août: HELSDINGEN, 1969. Septembre: HELSDINGEN, 1969; LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre, novembre: HELSDINGEN, 1969.

*Linyphia triangularis* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: HELSDINGEN, 1969. Ariège: DENIS, 1953b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1973; KABOUCHE & *al.*, 1997. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d. Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; HELSDINGEN, 1969; SIMON, 1884a, 1929. Côte-d'Or: HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a. Doubs:

EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909a. Finistère: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: DENIS, 1938a. Nord: DENIS, 1932a, 1952b; EMERIT & al., 1999. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: DENIS, 1958a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1961b, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a, 1934a; PONEL & al., 1993. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, introduit aux USA. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnes: LEDOUX & al., 1996b. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1941; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: CHANSIGAUD, 1991; VEILLON, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1938a, 1953b; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus*: KABOUCHÉ & al., 1997. Bord de route, herbes et fougères: BOSMANS & al., 1985a. Bord de ruisseau: LUCAS, 1878a. Bruyères; buissons: CANARD, 1989. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1950a, 1952b, 1958a, 1961b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères; forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHÉ & al., 1997. Forêt de pins, clairière, herbes: DENIS, 1965c. Forêt de résineux, allée: VEILLON, 1997. Forêt humide: LE PERU, 2004. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Grotte: HUBERT, 1964a. Haie: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1884a. Jardin: LE PERU, 2004; LUCAS, 1878a. Lande: LUCAS, 1870d. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de bois: LUCAS, 1878a. Marécage: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1999, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Mine de charbon: DENIS, 1932a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996c, 2002. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Verger: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: HUBERT, 1964a. Juillet: DENIS, 1964b. Août: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1878a; VEILLON, 1997. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1967d; EMERIT & al., 1999; HELSDINGEN,

1969; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875; SIMON, 1929; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Août: LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1870d, 1878a; VEILLON, 1997. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1953b, 1963c, 1967d; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; HELSDINGEN, 1969; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; LUCAS, 1875; SIMON, 1929; VEILLON, 1997. Octobre: CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1932a, 1963c; EMERIT & al., 1999; HELSDINGEN, 1969; KABOUCHÉ & al., 1997; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1964b.

#### *Lophomma punctatum* (Blackwall, 1841)

**Répartition.** Aisne: DENIS, 1939b; SIMON, 1884b, 1926. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884b, 1926. Cher: DENIS, 1943b. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1940a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loire: SIMON, 1926. Manche: CANARD, 1990a. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b, 1926. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nièvre: SIMON, 1884b, 1926. Nord: DENIS, 1934c, 1943a, 1943d, 1955b; EMERIT & al., 1999. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1884b, 1926. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Somme: DENIS, 1946b; SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bord de mare: SIMON, 1926. Bord de ruisseau: DENIS, 1943b. Forêt, mousses très humides: SIMON, 1926. Friche: PASQUET & al., 1992. Herbes humides: DENIS, 1943d. Marais, au bord de l'eau: SIMON, 1884b. Marécage: DENIS, 1934c, 1943a, 1943d, 1946b; EMERIT & al., 1999, 2003; LANCELEVÉE, 1884. Prairie humide, joncs: DENIS, 1948b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle.* Mars: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1939b. Juillet: DENIS, 1934c, 1940a. Septembre: DENIS, 1934c, 1946b; EMERIT & al., 2003. Octobre: DENIS, 1943d; SIMON, 1926. Novembre: DENIS, 1943d; EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1934c. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1934c. Février, mars: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1939b; EMERIT & al., 1999. Mai: DENIS, 1943a; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1943b, 1948b; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1940a. Septembre: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 2003. Octobre: DENIS, 1943d; EMERIT & al., 1999. Novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1934c.

#### *Louisfagea rupicola* (Simon, 1884)

*Labulla r.*; *Pimoidae r.*

**Taxonomie.** La situation de l'espèce *Louisfagea rupicola* (Simon, 1884) est confuse. Elle a été placée successivement dans les genres *Labulla*, *Louisfagea* et *Pimoidae*, et dans les familles Argioidae, Metidae, Linyphiidae, puis Pimoidae. Une seule citation est faite récemment, sous le nom *Louisfagea r.*, qui est retenu ici. **Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER & al., 1988; SIMON, 1884a (*L. r.*), 1929 (*L. r.*). Var: DENIS, 1949c (*L. r.*); SIMON, 1898c (*L. r.*), 1929 (*L. r.*). — Italie (*P. r.*). **Altitude.** De 1200 m jusqu'à 1970 m (MAU-



RER & al., 1988). **Habitat.** Forêt de mélèzes, éboulis: MAURER & al., 1988. Rochers très humides, mousses: SIMON, 1884a, 1929. Taillis de chênes: DENIS, 1949c. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: MAURER & al., 1988. — *Femelle.* Juillet: MAURER & al., 1988.

**Macrargus carpenteri** (O. P.-Cambridge, 1894)

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle.* Novembre: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle.* Novembre: LEDOUX & al., 2003.

**Macrargus rufus** (Wider, 1834)

*Tmeticus r.*

**Répartition.** Ain, Aisne, Aube: SIMON, 1884a (*T. r.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1884a (*T. r.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899 (*T. r.*), 1909a (*T. r.*). Finistère: MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Isère: SIMON, 1884a (*T. r.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990. Oise: SIMON, 1884a (*T. r.*). Orne: ASSELIN, 1990. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): DRESKO & al., 1975. “Seine”: CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; SIMON, 1884a (*T. r.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. r.*); SIMON, 1884a (*T. r.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; SIMON, 1884a (*T. r.*). — Presque toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bois, mousses: SIMON, 1929. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et hêtres, mousses: LE PERU, 2004. Forêt de hêtres, clairière: DENIS, 1948b. Grotte: DRESKO & al., 1975. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous les troncs de hêtres abattus: SIMON, 1899, 1909a. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Mars: DRESKO & al., 1975. Octobre: LEDOUX & al., 2002. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1948b. Septembre: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1967d.

*Mansuphantes* (voir *Lepthyphantes*)

**Maro minutus** O. P.-Cambridge, 1906

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ille-et-Vilaine, Orne: ASSELIN, 1990. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. — Allemagne, Belgique, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1730 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. **Période.** — *Femelle.* Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

**Maso gallicus** Simon, 1894

*M. gallica.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*M. g.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*M. g.*). Corse: CANARD, 1989 (*M. g.*). Doubs: EMERIT & al., 1997 (*M. g.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a (*M. g.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: CANARD, 1990a (*M. g.*); MURPHY, 1994. Nord: DENIS, 1955a (*M. g.*), 1961a (*M. g.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000; DENIS, 1937d (*M. g.*), 1955a (*M. g.*), 1958a (*M. g.*), 1961a (*M. g.*); EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d (*M. g.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. “Seine”: COCQUEMPOT & al., 1991 (*M. g.*). Var: DENIS, 1935b (*M. g.*). Vendée: DENIS, 1941 (*M. g.*), 1962b, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1926 (*M. g.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord de canal: DENIS, 1950c. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1955a, 1958a, 1961a. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Plateau calcaire: CANARD, 1989. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1941; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1959d, 1962b.

**Maso sundevalli** (Westring, 1851)

*Erigone s.*; *Erigone westringi*; *M. westringi.*

**Répartition.** Aisne, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal, Charente: SIMON, 1884b. Corse: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*); SIMON, 1884b. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Gard: LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gers: SIMON, 1884b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a; MARC, 1990b. Isère: SIMON, 1884b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1955a, 1961a; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1881c (*E. w.*), 1884b, 1884b (*M. w.*), 1887a (*M. w.*). Orne: CANARD, 1990a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1955a, 1956, 1961a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. “Seine”: SIMON, 1881c (*E. w.*), 1884b, 1884b (*M. w.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1884b, 1884b (*M. w.*), 1898b. Var: SIMON, 1884b, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Ven-



dée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1280 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b. Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière de pierres à chaux: BOSMANS & al., 1985a. Forêt: DENIS, 1955a, 1956, 1961a; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1884b. Forêt de bouleaux et de hêtres; forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de feuillus, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres, herbes: DENIS, 1948b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Friche: PASQUET & al., 1992. Litière: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: DENIS, 1938a, 1962b. Mousses et détritus: SIMON, 1884b. *Populetum albae*, litière: LEDOUX, 2000. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1948b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1948b, 1954a. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1962b. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a, 1948b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1948b, 1959d, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a.

#### *Mecopisthes crassirostris* (Simon, 1884)

*Cnephalocotes c.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Gard: SIMON, 1884b (*C. c.*), 1926. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; SIMON, 1926. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Mousses: DENIS, 1933b. Plage, sous une salicorne: DENIS, 1950c. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale; prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1950c.

#### *Mecopisthes nicaeensis* (Simon, 1884)

*Lophocarenum nicaeense*; *Minyriolus n.*

[*Femelle* inconnue]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*M. n.*). — Italie.

#### *Mecopisthes peusi* Wunderlich, 1972

**Répartition.** Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990a. Maine-et-Loire: NOËL & al., 2005. Morbihan, Vendée: CANARD, 1990a. — Allemagne, Grande-Bretagne, Europe. **Habitat.** Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Peupliers: NOËL & al., 2005.

#### *Mecopisthes pictonicus* Denis, 1949

**Taxonomie.** La situation de l'espèce *Mecopisthes pictonicus* est sujet de désaccord. L'espèce est décrite de Vendée par DENIS, 1949e, qui indique: «L'épigyne

de cette espèce est assez confuse», et fait le rapprochement avec *M. crassirostris* (Simon) et *M. silus* (O. P.-Cambridge), puis il ajoute: «Il est vraisemblable que la distinction de ces espèces se révélera difficile à l'occasion». DENIS, 1962b, après avoir indiqué qu'il ne pouvait distinguer ses spécimens *M. pictonicus* de *M. silus*, conclut, sous *M. silus*: «*M. pictonicus* doit donc être considéré comme synonyme de cette espèce». Mais PLATNICK, 2004 rejette cette synonymie. MILLIDGE, 1977a indique: «Thaler has suggested on the basis of Denis' figures that *pictonicus* may be a senior synonym of *peusi*». Étant donnés ces désaccords, *M. pictonicus* est maintenue dans la liste des espèces valides. [Mâle inconnu]. **Répartition.** Vendée: DENIS, 1949e. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois de pins, litière; sous des arbustes, mousses sur le sable: DENIS, 1949e. **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1949e.

#### *Mecopisthes silus* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Cnephalocotes pusillus*; *Erigone sila*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*); SIMON, 1884b (*C. p.*), 1926. Aude: SIMON, 1926. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; SIMON, 1884b (*C. p.*), 1926. Corse: SIMON, 1884b (*C. p.*), 1926. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*); SIMON, 1884b (*C. p.*), 1926. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1999a. Dune: DENIS, 1964b, 1965c; LEDOUX & al., 1999a. Dune, oyats et sous les tamaris: DENIS, 1963c. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c. Marais salant: SIMON, 1926. Mousses et lichens: SIMON, 1884b. Plage, oyats: DENIS, 1963c, 1964b. *The-robrachypodion*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars, avril: DENIS, 1964b. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars, avril: DENIS, 1964b. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1999a. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c. Décembre: DENIS, 1964b.

#### *Mecynargus brocchus* (L. Koch, 1872)

*Rhaebothorax broccha*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*R. b.*). — Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Bord de lac: SIMON, 1926.

#### *Mecynargus foveatus* (Dahl, 1912)

**Répartition.** Loire (Haute-), Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. — Allemagne, Suisse. Europe centrale à Ukraine. **Habitat.** Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & al., 2003.

#### *Mecynargus paetulus* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone paetula*; *Rhaebothorax p.*; *Rhaebothorax paetulus*; *Typhochrestus p.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1926 (*R. paetulus*). Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884b (*T. p.*). Isère: SIMON, 1884b (*T. p.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*R. p.*), 1996c (*R. p.*).

— Alpes de l'Isère et des Hautes-Alpes: SIMON, 1926 (*R. paetutus*). Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude**. 2380 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat**. Marécage: SIMON, 1926. **Période**. — *Mâle*. Octobre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Août: LEDOUX & al., 1996b. Octobre: SIMON, 1926.

***Mecynargus pyrenaicus*** (Denis, 1950)

*Rhaebothorax p.*

[Mâle inconnu]. **Répartition**. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*R. p.*). — Connue seulement de France. **Altitude**. 2500 m (DENIS, 1950b). **Habitat**. Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période**. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1950b.

*Megalephyphantes* (voir *Lepthyphantes*)

***Meioneta beata*** (O. P.-Cambridge, 1906)

*M. affinis*.

**Répartition**. Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1943, 1946. Cher: DENIS, 1943b. Corrèze: LE PERU, 2004. Finistère: MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nièvre: DENIS, 1943b. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*M. a.*). Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1965c. — Grande-Bretagne, Italie, Paléarctique (*M. a.*). **Altitude**. Jusqu'à 1220 m (DENIS, 1961b). **Habitat**. Bord de rivière, banc de sable, dans les pierres: DENIS, 1943b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière très sèche: DENIS, 1965c. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Plage, rouleaux de *Fucus* secs: CLARK & al., 1970. Plage, sous les algues: DENIS, 1965c. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Sous des genêts: DENIS, 1948b. Talus, herbes: DENIS & al., 1942; GUIBÉ, 1943. **Période**. — *Mâle*. Avril: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b. — *Femelle*. Avril: CLARK & al., 1970; LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1943b, 1948b, 1965c. Juillet: DENIS, 1961b; DENIS & al., 1942. Octobre: DENIS, 1962b. Décembre: GUIBÉ, 1943.

***Meioneta equestris*** (L. Koch, 1881)

**Répartition**. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. — Allemagne, Italie, Suisse. Europe centrale, Ukraine. **Habitat**. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. **Période**. — *Mâle*. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

***Meioneta fuscipalpis*** (C. L. Koch, 1836)

*Ischnyphantes f.*; *M. fuscipalpa*; *Microneta f.*

**Répartition**. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1929 (*I. f.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 2003. Rhin (Bas-), Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*Microneta f.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929 (*I. f.*). Allemagne, Belgique, Espagne,

Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*M. f.*). Paléarctique (*M. f.*). **Altitude**. Jusqu'à 2300 m (DENIS, 1960a). **Habitat**. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Bord d'étang: BOSMANS & al., 1985a. Bord de lac, herbes humides: DENIS, 1950a. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1950b. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Éboulis: DENIS, 1959d. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b, 1964b. Lieux humides, troncs de peupliers et platanes: SIMON, 1929. Maison: DENIS, 1965c. Mousses humides: DENIS, 1933b. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Sable: DENIS, 1950c. Sous une pierre: DENIS, 1963c. **Période**. — *Mâle*. Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1933b, 1950a. Juillet: DENIS, 1957a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1963c. Juin: DENIS, 1933b, 1950a. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1950b, 1955c, 1959d, 1960a, 1963c. Août: DENIS, 1965c. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1964b.

***Meioneta gulosa*** (L. Koch, 1869)

*Agyneta g.*; *Erigone grouvellii*; *Ischnyphantes gulosus*; *Microneta grouvellei*.

**Répartition**. Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985 (*A. g.*); SIMON, 1884b (*M. g.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*M. g.*). Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. g.*). Ariège: DENIS, 1961b. Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & al., 1997. Corse: SIMON, 1884b (*M. g.*), 1929 (*I. g.*). Eure-et-Loire: SIMON, 1884b (*M. g.*). Hérault: EMERIT & al., 1985. Isère: SIMON, 1884b (*M. g.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1960a; SIMON, 1929 (*I. g.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1929 (*I. g.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; SIMON, 1929 (*I. g.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (*M. g.*). — Alpes; Cévennes; Pyrénées: SIMON, 1929 (*I. g.*). Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 2530 m (DENIS, 1953a). **Habitat**. Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1948b. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Éboulis: DENIS, 1953a. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Herbes humides: DENIS, 1948b. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus*: KABOUCHE & al., 1997. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie très humide: DENIS, 1950b. Prairie, sous les genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairies alpêtres: SIMON, 1884b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: DENIS, 1948b, 1950b; LEDOUX & al., 1996c; MÜLLER, 1985. **Période**. — *Mâle*. Avril, mai: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1957a, 1961b. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1948b; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: MÜLLER, 1985. Octobre: KABOUCHE & al., 1997.

***Meioneta innotabilis*** (O. P.-Cambridge, 1863)

*Agyneta i.*; *Syedrula i.*; *Tmeticus illibatus* [femelle].

**Répartition.** Corse: SIMON, 1884a (*T. i.* [femelle]), 1929 (*S. i.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*A. i.*); MARC, 1990b (*A. i.*). Isère, Maine-et-Loire, Savoie (Haute-): SIMON, 1929 (*S. i.*). Vendée: DENIS, 1962d (*S. i.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. **Période.** — *Femelle.* Septembre: DENIS, 1962d.

***Meioneta mollis*** (O. P.-Cambridge, 1871)

*Agyneta m.*; *Aprolagus m.*; *Sintula aerius*; *Sintula pusio*.

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884b (*S. a.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*Aprolagus m.*). Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990. Doubs: EMERIT & al., 1997. Finistère: DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Gironde: SIMON, 1884b (*S. a.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005 (*Agyneta m.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Oise: SIMON, 1884b (*S. a.*). Orne: ASSELIN, 1990. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884b (*S. a.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1884b (*S. a.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*S. a.*); SIMON, 1884b (*S. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*S. a.*); SIMON, 1884b (*S. a.*). Somme: SIMON, 1884b (*S. p.*). Var: DENIS, 1934a (*Aprolagus m.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: DRESKO, 1950. — Toute la France: SIMON, 1929 (*Aprolagus m.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2150 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b. Carrière: DRESKO, 1950. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1934a. Jardin: DENIS, 1965c. Lac tourbeux: DENIS, 1950b. Litière et herbes coupées sèches; litière humide: DENIS, 1963c. Marécage: SIMON, 1884b, 1929. Peupliers: NOËL & al., 2005. Prairie: CORNIC, 1977; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1929. Prairie-rase: LEDOUX & al., 1996a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Roseaux: NOËL & al., 2005. Sous des genêts: DENIS, 1948b. Sous une pierre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1997. Sur une route: DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1964b. Août: SIMON, 1884b. Septembre: DENIS, 1963c; DRESKO, 1950; EMERIT & al., 1997. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: DENIS, 1938a, 1948b. Juillet: DENIS, 1950b, 1959d, 1962b; LEDOUX, 2000. Août: DENIS, 1963c. Septembre: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Novembre: DENIS, 1962b. Décembre: DENIS, 1964b.

***Meioneta nigripes*** (Simon, 1884)

*Ischnyphantes n.*; *Microneta n.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*M. n.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a; SIMON,

1929 (*I. n.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. — Alpes du Dauphiné et de la Provence: SIMON, 1929 (*I. n.*). Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Canada, Groenland, Paléarctique. **Altitude.** De 2020 m (DENIS, 1952c, 1957a) jusqu'à 2780 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bord de lac: DENIS, 1952c. Caillasse très sèche: DENIS, 1957a. Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1957a. Août: DENIS, 1950b, 1953a.

***Meioneta pseudorurestris*** (Wunderlich, 1980)

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. — Espagne. Chypre. **Altitude.** De 1100 m jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986).

***Meioneta rufidorsa*** Denis, 1961

*M. rufidorsum*.

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b (*M. r.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1967d (*M. r.*). — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1800 m (DENIS, 1961b) jusqu'à 2480 m (DENIS, 1967d). **Habitat.** Pelouse, sous des pierres: DENIS, 1961b. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1961b.

***Meioneta rurestris*** (C. L. Koch, 1836)

*Agyneta r.*; *Erigone r.*; *Erygona r.*; *Ischnyphantes r.*; *Microneta r.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*Erigone r.*); BERLAND, 1935 (*I. r.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*I. r.*); SIMON, 1929 (*I. r.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1884b (*M. r.*), 1929 (*I. r.*). Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*M. r.*); SIMON, 1909a (*M. r.*). Finistère: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a, 1967d. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: ASSELIN, 1990; KERVILLE, 1898 (*M. r.*); LUCAS, 1878b (*Erigone r.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord, Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Savoie: MÜLLER, 1985 (*A. r.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*M. r.*). Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976 (*M. r.*); SIMON, 1898b (*M. r.*). Var: BECKER, 1880 (*Erigone r.*); DENIS, 1934a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872 (*Erygona r.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*I. r.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique.

**Altitude.** Jusqu'à 3030 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bord d'étang; bord d'étang, prairie: BOSMANS & al., 1985a. Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de lac tourbeux: DENIS, 1955c. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1967d. Bord de ruisseau: LUCAS, 1878b. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Cultures: DENIS, 1933b. Dune: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b; LEDOUX & al., 1999a. Dune, litière: DENIS, 1950c. Écorces de châtaigniers: DENIS, 1933b. Formation à bruyères et genévriers: formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1961b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: CANARD, 1989; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. Forêt, litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Haie: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1933b, 1934a, 1941, 1950b. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lieux humides: LUCAS, 1872. Littoral, marécage: DENIS, 1959c. Maison: BRAUD & al., 2005. Marécage: DENIS, 1952a; VILLEPOUX, 1990b. Mousses, herbes, détritiques: SIMON, 1929. Oyats secs: DENIS, 1963c. Pelouse: CANARD, 1989. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Plage: DENIS, 1962b. Plage, oyats: DENIS, 1963c. Plage, sous les algues: DENIS, 1964b. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 1999a, 2003; PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rase: LEDOUX & al., 1996a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve; ripisilve, dans une touffe de *Scirpus*: LEDOUX, 2000. Sable: DENIS, 1950c. Sous une pierre: BERLAND, 1935; DENIS, 1934a; MÜLLER, 1985. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Torrent, galets: LEDOUX & al., 1996b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. [SIMON, 1929 note: «Trouvé dans le Calvados par temps calme flottant sur la mer à plus d'un kilomètre de la côte»]. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1952a, 1963c, 1967d. Février: EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1964b. Avril: LEDOUX, 2000. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1950c. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1955c, 1959d, 1960a, 1961b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Août: BERLAND, 1935; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1878b. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a;

MÜLLER, 1985. Octobre: CANARD, 1989; DENIS, 1963c; LEDOUX & al., 1999a. Novembre: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1952a, 1963c, 1967d. Février: CANARD, 1989; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1964b. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1934a, 1950c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1961b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1996c, 2003. Août: DENIS, 1952c, 1953b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996b, 2003. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Octobre: CANARD, 1989; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1954a.

#### *Meioneta saxatilis* (Blackwall, 1844)

*Aprolagus s.*; *Lepthyphantes euchirus*.

**Répartition.** Dordogne: SIMON, 1929 (A. s.). Doubs: EMERIT & al., 1997. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1939b (A. s.), 1943a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Somme: SIMON, 1884a (L. e.), 1929 (A. s.). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (DENIS, 1950a). **Habitat.** Bois: SIMON, 1884a, 1929. Bois, litière; clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Forêt: DENIS, 1939b. Forêt de pins, herbes sur sable: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Haie: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1948b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Tourbière: DENIS, 1950a. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1939b, 1943a. Juin: DENIS, 1948b, 1950a. Juillet: DENIS, 1962b. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1948b, 1964b; LEDOUX, 2000. Juillet: DENIS, 1962b. Août: SIMON, 1929. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: DENIS, 1962b.

#### *Meioneta simplicitarsis* (Simon, 1884)

*Aprolagus s.*; *Microneta s.*

**Répartition.** Jura, Landes: SIMON, 1929 (A. s.). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-), Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (M. s.), 1929 (A. s.). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Bois, herbes très humides: DENIS, 1948b. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: SIMON, 1929. Herbes humides: DENIS, 1948b. Sur le sable: SIMON, 1929. Sur le sable, à la base des plantes: SIMON, 1884b. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1948b. Octobre: SIMON, 1929.

#### *Metopobatrax falcifrons* Simon, 1884

*Metopobatrax f.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (M. f.), 1987 (M. f.); DENIS, 1933b (M. f.); LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884b, 1926. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1200 m (DENIS, 1933b) jusqu'à 1980 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habi-**

**tat.** Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins, mousses: SIMON, 1926. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Grotte, à l'entrée dans des détritiques humides: SIMON, 1884b, 1926. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Litière: DENIS, 1933b. Marécage: LEDOUX & al., 1996a. Mousses: DENIS, 1933b. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril, mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a.

**Metopobactrus prominulus** (O. P.-Cambridge, 1872)

[Selon DENIS, 1960a, les citations faites par DENIS, 1948b et 1959d, sous le nom *M. verticalis* pourraient se rapporter à *M. prominulus*]. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Aube, Calvados, Charente: SIMON, 1884b, 1926. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: SIMON, 1926. Finistère: CANARD, 1990a. Gard, Gironde: SIMON, 1926. Ile-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Landes: SIMON, 1926. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Orne: CANARD, 1990a; SIMON, 1926. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Seine, Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884b, 1926. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vienne (Haute-): SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Arbustes: DENIS, 1950a. Bois d'épicéas, herbes et mousses sèches: DENIS, 1948b. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, mousses et lichens des vieux trous d'arbres: SIMON, 1926. Herbes humides: DENIS, 1948b. Mousses: SIMON, 1884b. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000. Juillet: DENIS, 1948b. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1950a; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1948b, 1960a, 1961b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

**Metopobactrus rayi** (Simon, 1881)

*Erigone r.*; *Sauron r.*

**Taxonomie.** L'espèce *Metopobactrus rayi* (Simon, 1881) a été transférée par MARUSIK & al., 2001 dans le nouveau genre *Sauron* créé par ESKOV & al., 1995. **Répartition.** Aube: SIMON, 1881c (*E. r.*), 1884b, 1926. — Allemagne (*S. r.*). Europe (*S. r.*).

**Metopobactrus schenkeli** Thaler, 1976

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. — Espagne, Italie, Suisse. **Altitude.** De 900 m jusqu'à 1900 m (BOSMANS & al., 1986).

**Metopobactrus verticalis** (Simon, 1881)

*Erigone v.*

[DENIS, 1960a émet des doutes sur toutes ses citations de *M. verticalis*, qui pourraient en fait se rapporter à *M. prominulus*]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1881c (*E. v.*), 1884b, 1926. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1948b. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1500 m (DENIS, 1948b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1959d. Bruyères; litière: DENIS, 1948b. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1948b. Juillet: DENIS, 1959d.

**Micrargus apertus** (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: MILLIDGE, 1975b. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Paléarctique.

**Micrargus cupidon** (Simon, 1913)

*Blaniargus c.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): FAGE, 1931 (*B. c.*); JEANNEL, 1926 (*B. c.*); SIMON, 1913 (*B. c.*), 1926 (*B. c.*). — Espagne. **Habitat.** Grotte: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1913, 1926.

**Micrargus dilutus** (Denis, 1948)

*Blaniargus d.*

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*B. d.*). — Connue seulement de France. **Habitat.** Prairie, herbes: DENIS, 1948b. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1948b.

**Micrargus dissimilis** Denis, 1950

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. — Connue seulement de France. **Habitat.** Marais saumâtre, sous une rosace de *Statice limonium*; marais, sous les joncs sur la boue fluide: DENIS, 1950c. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c.

**Micrargus herbigrada** (Blackwall, 1854)

*Blaniargus herbigrada*; *Erigone herbigrada*; *Lophomma herbigrada*; *Lophomma herbigradum*; *M. herbigrada*.

**Répartition.** Ain: DRESKO & al., 1975; SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Aisne: SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985. Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. herbigrada*), 1926 (*B. h.*). Ardèche: BALAZUC & al., 1952 (*B. h.*), 1954 (*B. h.*). Ariège: DENIS, 1959a, 1961b, 1967d. Aube: SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*B. h.*). Cantal: SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: SIMON, 1899 (*L. herbigrada*), 1909a (*L. herbigrada*). Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1960a, 1967d. Ile-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Isère: SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Jura: SIMON, 1926 (*B. h.*). Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1955b (*M. h.*), 1961a. Oise: SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*B. h.*); LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*M. h.*), 1953a, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1959d (*M. h.*), 1960a, 1967d; HUBERT, 1964a (*B. h.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b (*B. h.*), 1960a; LEDOUX & al., 1996a, 2003 (*M. h.*); SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Rhin (Bas-): DENIS, 1950a (*M. h.*); LEBORGNE & al., 1998. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESERT, 1904 (*L. herbigrada*), 1910 (*L. herbigradum*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. h.*); SIMON, 1926 (*B.*

h.). "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*L. herbigrada*); SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DENIS, 1946c (B. h.); DOIGNON, 1976 (*L. herbigrada*); SIMON, 1884b (*L. herbigrada*). Vosges: DENIS, 1958b. — Presque toute la France: SIMON, 1926 (B. h.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2250 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996b. Bois: DENIS, 1959d. Bois, mousses: SIMON, 1884b. Bord de ruisseau; bord de ruisseau, prairie; bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bord de torrent, sous les pierres et mousses: DENIS, 1950b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Détritrus d'inondation: DENIS, 1946c. Forêt: DENIS, 1955b, 1961a; LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas, litière: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, bord de ruisseau: DENIS, 1950a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976; SIMON, 1926. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: BALAZUC & al., 1952, 1954; DENIS, 1958b, 1959a, 1967d; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Lande sèche: CANARD, 1979. Litière de hêtres: DENIS, 1948b. Mousses: DENIS, 1967d. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 1996b, 2002, 2003. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sol humide, sous des pierres: DENIS, 1953a. Sous des grands rochers: BOSMANS & al., 1985a. Sous les genêts: LEDOUX & al., 1996a. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1960a; LE PERU, 2004. Avril: LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1960a; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1967d; MÜLLER, 1985. Octobre: SIMON, 1926. Novembre: DENIS, 1967d. Décembre: DENIS, 1961b, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1967d. Février: DENIS, 1946c. Mars: DENIS, 1960a; LE PERU, 2004. Avril: LEDOUX & al., 2002, 2003. Mai: LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1948b, 1950a, 1967d. Juillet: DENIS, 1948b, 1950b, 1959d, 1960a, 1967d; DRESKO & al., 1975. Août: DENIS, 1953a; LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: DENIS, 1959a; MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1960a; SIMON, 1926. Novembre: DENIS, 1967d. Décembre: DENIS, 1961b, 1967d.

*Micrargus laudatus* (O. P.-Cambridge, 1881)

*Blaniargus l.*; *Lophomma laudatum*.

[Selon DENIS, 1939a, SIMON, 1926 a confondu les espèces *Blaniargus* (= *Micrargus*) *laudatus* et *Nothocyba* (= *Micrargus*) *subaequalis*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b (*L. l.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Finistère: DENIS, 1939a (*B. l.*). Isère: SIMON, 1884b (*L. l.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Oise: SIMON, 1884b (*L. l.*). Pyrénées

(Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1884b (*L. l.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. "Seine": SIMON, 1884b (*L. l.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*L. l.*). — Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Dune: ROSELLE, 1891. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de pins: DENIS, 1950b. Lieux assez secs, mousses et sous les pierres: SIMON, 1884b. Prairie: PASQUET & al., 1992. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1939a, 1950b.

*Micrargus pervicax* (Denis, 1947)

*Blaniargus p.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Vendée: DENIS, 1947b (*B. p.*), 1962b. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt de pins, herbes et litière: DENIS, 1962b. Forêt, talus sablonneux, dans les herbes: DENIS, 1947b. **Période.** — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Juin: DENIS, 1947b.

*Micrargus subaequalis* (Westring, 1851)

*Blaniargus s.*; *Nothocyba s.*

[Selon DENIS, 1939a, SIMON, 1926 a confondu les espèces *Blaniargus* (= *Micrargus*) *laudatus* et *Nothocyba* (= *Micrargus*) *subaequalis*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*N. s.*). Ariège: DENIS, 1959a, 1960a, 1967d; SIMON, 1926 (*N. s.*). Charente, Corse: SIMON, 1926 (*N. s.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Isère: SIMON, 1926 (*N. s.*). Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Nord: DENIS, 1955b. Oise, Orne: SIMON, 1926 (*N. s.*). Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*B. s.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1926 (*N. s.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1926 (*N. s.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Somme: SIMON, 1926 (*N. s.*). Var: DENIS, 1949c (*B. s.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune; forêt: SIMON, 1926. Friche: LEBORGNE & al., 1998; VEILLON, 1997. Lieux secs, sous les pierres: SIMON, 1926. Pelouse: DENIS, 1959d. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 2003. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ruisseau souterrain: DENIS, 1959a. Sous une pierre: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2003. Juin: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1997; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1949c. Juin: DENIS, 1948b. Juillet: DENIS, 1959a, 1959d. Août: DENIS, 1960a. Novembre: DENIS, 1967d.

*Microctenonyx subitaneus* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Alioranus pauper* [err.]; *Aulacocyba parisiensis*; *Aulacocyba subitanea*; *Tapinocyba parisiensis*; *Tapinocyba subitanea*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*T. s.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*A. s.*).

Ariège: DENIS, 1953b (A. s.). Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse: SIMON, 1884b (T. s.). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (T. s.); SIMON, 1884b (T. s.). Gard: LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-): DENIS, 1959a (A. s.). Gers, Gironde: SIMON, 1884b (T. s.). Maine-et-Loire: SIMON, 1926 (A. p.). Nord: DENIS, 1955b (A. s.). Oise: SIMON, 1884b (T. s.). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (A. s.), 1953a (A. s.). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1926 (A. s.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (A. s.); LEDOUX & al., 1996a, 1999a; SIMON, 1884b (T. s.). Rhône: SIMON, 1926 (A. p.). "Seine": SIMON, 1884b (T. p.), 1884b (T. s.), 1926 (A. p.). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (T. s.). Somme: SIMON, 1884b (T. s.). Var: DENIS, 1934a [*Alioranus pauper*, err. selon DENIS, 1966b], 1935b (A. s.); SIMON, 1884b (T. s.). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1965c (A. s.). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique (ailleurs introduit). **Altitude.** Jusqu'à 2320 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bois: SIMON, 1926. Bord de rivière, *Populeum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1950b. Cave: SIMON, 1884b. Détrit: SIMON, 1884b, 1926. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Grotte: DENIS, 1953b, 1959a. Herbes humides: DENIS, 1934a. Jardin: SIMON, 1884b, 1926. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Maison: DENIS, 1965c. *Populeum albae*, litière: LEDOUX, 2000. Prairie: LEDOUX & al., 1996a. Ripisilve, sous des pierres: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: DENIS, 1934a. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1934a; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1953a. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1959a. — *Femelle.* Janvier: LEDOUX, 2000. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1934a; LEDOUX & al., 1996a. Juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1950b. Août: DENIS, 1953b. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1999a. Novembre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a.

*Microlinyphia impigra* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Linyphia i.*

**Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Isère: SIMON, 1884a (L. i.), 1929 (L. i.). Landes: SIMON, 1929 (L. i.). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: ASSELIN, 1990. Nord: DENIS, 1963a (L. i.). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Somme: ROSELLE, 1891 (L. i.); SIMON, 1929 (L. i.). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, sous les carex: LEDOUX & al., 2002. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: DENIS, 1963a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: EMERIT & al., 2003; ROSELLE, 1891. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1929. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1963a; LEDOUX & al., 2002. Août: ROSELLE, 1891; SIMON, 1929. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: LEDOUX & al., 2002. Septembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX & al., 2002.

*Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)

*Linyphia p.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (L. p.). Calvados: ASSELIN & al., 1989 (L. p.). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: SIMON, 1884a (L. p.), 1929 (L. p.). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (L. p.). Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (L. p.); KERVILLE, 1927 (L. p.). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005. Morbihan, Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (L. p.); LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (L. p.), 1963e (L. p.). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (L. p.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (L. p.); LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (L. p.). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (L. p.). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910 (L. p.); PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (L. p.). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984 (L. p.), 1989; DOIGNON, 1976 (L. p.); SIMON, 1898b (L. p.). Somme: ROSELLE, 1891 (L. p.). Vendée: DENIS, 1964b (L. p.), 1965c (L. p.). — Toute la France: SIMON, 1929 (L. p.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2100 m (BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1957a. Bord d'étang; bord d'étang, prairie: BOSMANS & al., 1985a. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de ruisseau, herbes: DENIS, 1950b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1965c. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Haie: NOËL & al., 2005. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; VILLEPOUX, 1990b. Marécage salé: BIGOT, 1965. Oyats: DENIS, 1964b. Parmi les plantes basses: KERVILLE, 1927. Prairie: LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003; NOËL & al., 2005; SIMON, 1884a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: SIMON, 1929. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Tourbière: DENIS, 1948b; LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1964b. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1963e. — *Femelle.* Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1964b; LESSERT, 1910. Mai: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1957a; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898.

*Microneta viaria* (Blackwall, 1841)

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1967d. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909a. Finis-



tère: DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Gard: LEDOUX, 2000. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; MARC, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ASSELIN, 1990. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1891. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Yonne: DRESKO, 1950. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois sablonneux, litière sèche: SIMON, 1929. Bois, au sol: CHANSIGAUD, 1991. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de lac, herbes humides: DENIS, 1950a. Carrière: DRESKO, 1950. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Éboulis: LEDOUX & al., 1996c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: ASSELIN & al., 1989; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1891. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, litière: BOSMANS & al., 1985a; LE PERU, 2004. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Lisière de forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Litière de hêtres: DENIS, 1948b. Litière et mousses: EMERIT & al., 1997. Litière sèche: SIMON, 1884b. Maison: DENIS, 1964b. Marécage: EMERIT & al., 2003. *Populetum albae*, litière et pelouse: LEDOUX, 2000. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, sous des pierres: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: DENIS, 1965c. Sous-bois, litière: LEDOUX & al., 1996a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Verger: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b; LEDOUX, 2000. Février: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997. Septembre: DRESKO, 1950; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b; LEDOUX, 2000. Février: DENIS, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1964b; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Mai: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: DENIS, 1948b; LEDOUX & al.,

1996a, 1996c, 2003. Août: LE PERU, 2004. Septembre: DRESKO, 1950; EMERIT & al., 1997, 2003; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1964b.

*Midia* (voir *Lepthyphantes*)

*Minicia candida* Denis, 1946

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1963f, 1963g. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2001. Vendée: CANARD, 1990a; DENIS, 1946b, 1947d, 1949a, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964; MURPHY, 1994. — Italie. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 2001). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Arrière-dune, dans de haute herbes sèches et sous des *Tamarix anglica*: DENIS, 1947d. Bord de plage: DENIS, 1963c. Dune: DENIS, 1949a, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964; MURPHY, 1994. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, lisière: DENIS, 1962d. Forêt, sur sol sablonneux: DENIS, 1946b. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse à *Brachypodium phoenicoides*: DENIS, 1963f, 1963g. Vigne abandonnée, *Helichrysum*: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars, avril: DENIS, 1964b. Mai: DENIS, 1965c. Juillet: DENIS, 1947d, 1963c. Août: DENIS, 1964b. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962d, 1964b. Mai: DENIS, 1963f, 1963g, 1965c. Juin: DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1947d, 1963c. Août: DENIS, 1946b. Septembre, octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c. Décembre: DENIS, 1964b.

*Minicia marginella* (Wider, 1834)

*Erigone nigrolimbata.*

**Répartition.** Ain, Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b, 1926. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1884b, 1926. Ardèche: SIMON, 1926. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. n.*); SIMON, 1884b, 1926. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1926. Cantal, Charente: SIMON, 1884b, 1926. Dordogne: SIMON, 1926. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Eure-et-Loire: SIMON, 1884b, 1926. Gard: LEDOUX, 2000; SIMON, 1926. Gironde, Isère: SIMON, 1884b, 1926. Landes: SIMON, 1926. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: SIMON, 1926. Lozère: DENIS, 1939b. Oise: SIMON, 1884b, 1926. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1926. "Seine": SIMON, 1884b, 1926. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b, 1926. Var: DENIS, 1935b; SIMON, 1884b, 1926. Vendée: CANARD, 1990a; DENIS, 1941, 1946b, 1947b, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (DENIS, 1933b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1963c, 1964b. Bois: DENIS, 1941. Buissons: SIMON, 1926. Collines sèches: SIMON, 1884b. Dune: DENIS, 1963c,



1964b, 1965c. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1926. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de hêtres, lisière: DENIS, 1948b. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins, mousses humides très épaisses: DENIS, 1964b. Forêt, litière: DENIS, 1947b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Forêt, sur sol sablonneux: DENIS, 1946b. Friche: SIMON, 1884b. Genévriers et *Ulex*; hautes herbes: SIMON, 1926. Herbes humides: DENIS, 1933b. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marais salant: SIMON, 1926. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Plage, oyats: DENIS, 1963c. *Populetum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2003; PASQUET & al., 1992. Pré sur dune: DUFFEY, 1964. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Sous des végétaux secs: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1964b. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1933b, 1947b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1964b. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1926. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1964b. Avril: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1933b, 1941, 1947b, 1948b, 1965c; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1939b; MÜLLER, 1985. Août: DENIS, 1946b; LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1926. Septembre: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; SIMON, 1926. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1964b.

#### *Minyriolus medusa* (Simon, 1881)

*Erigone m.*; *Lophocarenum m.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. m.*), 1926 (*L. m.*). Var: SIMON, 1881c (*E. m.*), 1884b (*L. m.*), 1926 (*L. m.*). [La citation du Var par DENIS, 1937b sous le nom *Lophocarenum m.* est erronée selon DENIS, 1966b, et se rapporte à *Pocadicnemis pumila*]. — Europe.

#### *Minyriolus pusillus* (Wider, 1834)

*Erigone pusilla*.

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1884b, 1926. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Isère: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Morbihan: DENIS, 1938a. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904, 1910. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: MÜLLER, 1985. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne,

Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères; forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins, mousses sèches: MÜLLER, 1985. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, litière: DENIS, 1938a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, sous les pierres, dans les mousses: BOSMANS & al., 1985a. Friche: PASQUET & al., 1992. Mousses: SIMON, 1884b. Mousses et détritiques: SIMON, 1926. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Sous les épicéas, herbes et mousses: DENIS, 1948b. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Mars à mai: LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1948b. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. — *Femelle*. Février: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Mars, avril: LE PERU, 2004. Mai: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1948b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1948b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. Décembre: LE PERU, 2004.

#### *Mioxena blanda* (Simon, 1884)

*Gongyliidiellum blandum*.

**Répartition.** Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1884b (*G. b.*), 1926. Vendée: DENIS, 1946b, 1962b. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Bois: SIMON, 1926. Bois sablonneux, mousses: SIMON, 1884b. Prairie: PASQUET & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1946b, 1962b. Octobre: SIMON, 1884b.

#### *Moebelia penicillata* (Westring, 1851)

*Erigone p.*; *Styloctetor penicillatus*.

**Répartition.** Ardèche: SIMON, 1926 (*S. p.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1926 (*S. p.*). Calvados: GUIBÉ, 1943 (*S. p.*), 1946 (*S. p.*). Dordogne, Eure: SIMON, 1926 (*S. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Marne: SIMON, 1926 (*S. p.*). Pyrénées-Atlantiques, "Seine": SIMON, 1884b (*S. p.*), 1926 (*S. p.*). Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989; SIMON, 1926 (*S. p.*). Var: SIMON, 1884b (*S. p.*), 1926 (*S. p.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989. Forêt, sur les écorces de chênes, de châtaigniers, de pins; forêt, sur un tronc d'orme: SIMON, 1926. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous des écorces de platanes: GUIBÉ, 1943. Troncs des pins et des pommiers, lichens: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle*. Mars, mai: SIMON, 1926. Juin: LEDOUX & al., 2002. Décembre: GUIBÉ, 1943. — *Femelle*. Mars, mai: SIMON, 1926.

*Monocephalus castaneipes* (Simon, 1884)

*Diplocephalus c.*; *Plaesiocraerus c.*; *Plaesiocraerus fuscipes castaneipes*.

**Répartition.** Ardèche: SIMON, 1884b (*P. c.*). Eure: SIMON, 1899 (*D. c.*), 1909a (*P. c.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 2003; SIMON, 1884b (*P. c.*). — Presque toute la France, moins la région pyrénéenne: SIMON, 1926 (*P. f. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Habitat.** Bord des torrents, mousses humides: SIMON, 1884b. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & *al.*, 2003. Jardin, détrit: SIMON, 1899. **Période.** — *Femelle*. Avril, novembre: LEDOUX & *al.*, 2003.

*Monocephalus fuscipes* (Blackwall, 1836)

*Diplocephalus f.*; *Erigone f.*; *Plaesiocraerus f.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b (*P. f.*). Ariège: DENIS, 1960a, 1967d. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946 (*P. f.*); SIMON, 1884b (*P. f.*). Cantal: SIMON, 1884b (*P. f.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a (*D. f.*); MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loiret: COCQUEMPOT & *al.*, 1984. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1961a. Oise: SIMON, 1884b (*P. f.*). Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1951c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1957a, 1960a, 1967d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. f.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. f.*); SIMON, 1884b (*P. f.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; DOIGNON, 1976 (*P. f.*); SIMON, 1884b (*P. f.*). Var: SIMON, 1926 (*P. f.*). — Presque toute la France: SIMON, 1926 (*P. f.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & *al.*, 1999. Bois de conifères, mousses: SIMON, 1926. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois de pins, sous des pierres: DENIS, 1960a. Bruyères: BOSMANS & *al.*, 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1984, 1989. Forêt: ASSELIN & *al.*, 1989; DENIS, 1961a; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de pins: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1951c. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, litière: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, mousses: BOSMANS & *al.*, 1985a; DOIGNON, 1976. Grotte: DENIS, 1967d. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Litière: EMERIT & *al.*, 1997. Mousses: EMERIT & *al.*, 1997; SIMON, 1884b. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie tourbeuse: sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle*. Février: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mars: DENIS, 1960a. Avril: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Mai: LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre: DENIS, 1951c; EMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 1996a. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle*. Février: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mars: DENIS, 1960a; LE PERU, 2004. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Mai: LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1961a, 1967d; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LEDOUX &

*al.*, 1996a. Juillet: DENIS, 1957a, 1960a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre: EMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003.

*Mughiphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Nematogmus sanguinolentus* (Walckenaer, 1842)

*Cnephalocotes s.*; *Erigone simonii*.

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Nord: DENIS, 1955b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000 (*C. s.*); EMERIT & *al.*, 1999 (*C. s.*). Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1888a. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1850 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Buissons et hautes herbes: SIMON, 1926. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1955b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1964b. Forêt, herbes sèches: DENIS, 1950a. Litière de hêtres: DENIS, 1948b. Marais salant: MURPHY, 1994. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888a. Sur un genévrier: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1933b. Juin: EMERIT & *al.*, 1999. — *Femelle*. Mai: BONTE, 2000. Juin: DENIS, 1948b, 1950a; EMERIT & *al.*, 1999.

*Neriere clathrata* (Sundevall, 1830)

*Linyphia c.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & *al.*, 1998. Ariège: DENIS, 1967d (*L. c.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*L. c.*); KABOUCHE & *al.*, 1997. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946 (*L. c.*). Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: HELSDINGEN, 1969. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*L. c.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*L. c.*); SIMON, 1899 (*L. c.*), 1909a (*L. c.*). Finistère: ASSELIN, 1990 (*L. c.*); DENIS, 1938a (*L. c.*), 1940a (*L. c.*); MANACH, 1995 (*L. c.*). Gironde: DENIS, 1952a (*L. c.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*L. c.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*L. c.*); LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924 (*L. c.*); PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: ASSELIN, 1990 (*L. c.*). Nord: DENIS, 1952b (*L. c.*); EMERIT & *al.*, 1999; GOULLIART, 1979a (*L. c.*). Orne: ASSELIN, 1990 (*L. c.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1958a (*L. c.*); EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*L. c.*); LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1953b (*L. c.*), 1960a (*L. c.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d (*L. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b (*L. c.*); LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a (*L. c.*); LEBORGNE & *al.*, 1998 (*L. c.*); PASQUET & *al.*, 1992 (*L. c.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880 (*L. c.*); REIBER, 1880 (*L. c.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*L. c.*). Seine-Maritime: BERANGER-LEVE-

QUE & al., 1994; CORNIC, 1977 (*L. c.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989 (*L. c.*); DOIGNON, 1976 (*L. c.*); SIMON, 1898b (*L. c.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*L. c.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941 (*L. c.*), 1962b (*L. c.*), 1963c (*L. c.*), 1964b (*L. c.*), 1965c (*L. c.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*L. c.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDoux & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a; GOULLIART, 1979a; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de rivière: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus*: KABOUICHE & al., 1997. Buissons: GOULLIART, 1979a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune, sous les tamaris: DENIS, 1964b. Forêt: DENIS, 1950a, 1952b, 1958a, 1963c. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lande: VEILLON, 1997. Lieux humides: SIMON, 1884a. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Littoral, falaise humide: DENIS, 1941. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: DENIS, 1952a, 1959d; EMERIT & al., 1999, 2003; ROSELLE, 1887; SIMON, 1929. Pelouse: BERLAND, 1924. Plantation de peupliers: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 2002. Prairie en friche; prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, pelouse: LEDOUX, 2000. Sous les épiciéas: DENIS, 1948b. Sous-bois: VEILLON, 1997. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière: EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1952a. Février: EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1964b. Avril: EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1950c; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1964b; LEDOUX, 2000. Septembre: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1952a. Février, mars: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1964b; HELSDINGEN, 1969; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1965c, 1967d; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1948b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1959d, 1960a, 1964b. Septembre: DENIS, 1953b; EMERIT & al., 2003; LUCAS, 1875. Octobre: EMERIT & al., 1999; KABOUICHE & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Décembre: DENIS, 1964b.

*Neriene emphana* (Walckenaer, 1842)

*Linyphia e.*; *Prolinyphia e.*

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1961b (*L. e.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs:

EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1909a (*L. e.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (*L. e.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a (*L. e.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1961b (*L. e.*); LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a (*L. e.*). Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*L. e.*); REIBER, 1880 (*L. e.*). Savoie (Haute-): HELSDINGEN, 1969; LEDOUX & al., 1996c. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991 (*P. e.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1898b (*L. e.*). — Centre et nord de la France, Cévennes, Alpes, Pyrénées: SIMON, 1929 (*L. e.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (SIMON, 1929). **Habitat.** Bois: SIMON, 1884a. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois froids: SIMON, 1929. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères, branches; forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, houx: SIMON, 1884a. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Houx: SIMON, 1898b. Jardin: LENICE, 1992. Lisière de forêt; lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Mousses: DENIS, 1950b. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996c. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1957a, 1961b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Août: LE PERU, 2004. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Juin: HELSDINGEN, 1969; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1957a, 1961b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993.

*Neriene furtiva* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Linyphia f.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a (*L. f.*), 1961b (*L. f.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (*L. f.*); DENIS, 1950c (*L. f.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989 (*L. f.*). Corse: SIMON, 1884a (*L. f.*), 1929 (*L. f.*). Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990 (*L. f.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*L. f.*). Landes: HELSDINGEN, 1969. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990 (*L. f.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b (*L. f.*); LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (*L. f.*). "Seine": ROLLARD, 2000. Vendée: DENIS, 1947b (*L. f.*), 1962d (*L. f.*), 1964b (*L. f.*), 1965c (*L. f.*). — Midi de la France: SIMON, 1929 (*L. f.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Afrique du Nord, Russie, Ukraine. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Ancienne vigne; bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois de peupliers et d'aulnes: BOSMANS & al., 1985a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Forêt: DENIS, 1947b; HELSDINGEN, 1969. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins: DENIS, 1962d, 1964b, 1965c. Friche: PASQUET & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1999a, 2002. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1933b, 1950c. Juin: DENIS, 1933b, 1947b; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1950c, 1965c. Juin:

DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1960a, 1961b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1962d; LEDOUX & al., 2003.

*Nerienne montana* (Clerck, 1757)

*Linyphia m.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Calvados: ASSELIN & al., 1989 (*L. m.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1899 (*L. m.*), 1909a (*L. m.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*L. m.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*L. m.*); LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ASSELIN, 1990 (*L. m.*). Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ASSELIN, 1990 (*L. m.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d (*L. m.*). Rhin (Bas-): DENIS, 1950a (*L. m.*). Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. m.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*L. m.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*L. m.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Creux des arbres ou entre les racines: SIMON, 1884a. Forêt: ROSELLE, 1887. Forêt de chênes et hêtres; forêt humide: LE PERU, 2004. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Lande: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & al., 1999; VILLEPOUX, 1990b. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous les touffes de bruyères: SIMON, 1884a. Tourbière: EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. Vieux murs: SIMON, 1884a. **Période.** — *Femelle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1997; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1959d. Août: LE PERU, 2004.

*Nerienne peltata* (Wider, 1834)

*Lepthyphantes p.*; *Linyphia p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*Linyphia p.*). Ariège: DENIS, 1960a (*Linyphia p.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989 (*Lepthyphantes p.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: TIBERGHEN & al., 1993a (*Linyphia p.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: MANACH, 1995 (*Linyphia p.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*Linyphia p.*); LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (*Linyphia p.*), 1953a (*Linyphia p.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Linyphia p.*); LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*Linyphia p.*). Somme: ROSELLE, 1888a (*Linyphia p.*). Var: DENIS, 1935b (*Linyphia p.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*Linyphia p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Groenland, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: SCHALLER, 2000. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Buissons de conifères: SIMON, 1929. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Conifères: SIMON, 1884a. Forêt de chênes et hêtres: LE PERU, 2004. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins laricio: TIBERGHEN & al., 1993a. Forêt,

clairière: DOIGNON, 1976. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marécage: ROSELLE, 1888a. Rhododendrons: DENIS, 1953a. Sous les épicéas: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle.* Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1960a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1953a.

*Nerienne radiata* (Walckenaer, 1842)

*Linyphia marginata*; *N. marginata.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: HELSDINGEN, 1969. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*L. m.*). Calvados: LUCAS, 1870d (*L. m.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*L. m.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*L. m.*); SIMON, 1909a (*L. m.*). Finistère: DENIS, 1938a (*L. m.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994, 1994 (*N. m.*); EMERIT & al., 1994. Hérault: HELSDINGEN, 1969. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*L. m.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*L. m.*); LEDOUX & al., 1999b. Lot: HELSDINGEN, 1969. Morbihan: ASSELIN, 1990 (*L. m.*); DENIS, 1938a (*L. m.*). Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ASSELIN, 1990 (*L. m.*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c (*L. m.*), 1960a (*L. m.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b (*L. m.*), 1959d (*L. m.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*L. m.*); LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910 (*L. m.*). "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: CORNIC, 1977 (*L. m.*); LANCELEVÉE, 1884 (*L. m.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. m.*). Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992. — Toute la France: SIMON, 1929 (*L. m.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1350 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Ajoncs et genêts: DENIS, 1933b. Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: DENIS, 1960a. Bois de chênes; bois de hêtres: EMERIT & al., 1997. Bois, clairière: SIMON, 1884a, 1929. Carrière de pierres à chaux: BOSMANS & al., 1985a. Collines sèches, buissons: SIMON, 1929. Forêt: DENIS, 1938a; HELSDINGEN, 1969; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: LUCAS, 1870d. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 1996c. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994, 1994. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b; HELSDINGEN, 1969; LESSERT, 1910. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1933b, 1938a; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1959d, 1960a. Août: LUCAS, 1870d. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b; HELSDINGEN, 1969; LESSERT, 1910. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1933b, 1938a; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1955c, 1959d, 1960a; LE PERU, 2004. Août: LUCAS, 1870d. Septembre: HELSDINGEN, 1969.

*Notioscopus sarcinatus* (O. P.-Cambridge, 1872)

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b, 1926. Loire, Loiret: SIMON, 1926. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois, herbes très humides: DENIS, 1948b. Forêt: SIMON, 1926. Marais, détritiques: SIMON, 1884b. Marécage: SIMON, 1926. Prairie très humide, mousses: LE PERU, 2004. **Période.** — *Femelle.* Avril: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b.

*Obscuriphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Oedothorax agrestis* (Blackwall, 1853)

*Erigone a.*; *Gongylidium agreste*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; SIMON, 1884b (*G. a.*). Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Aube, Cantal: SIMON, 1884b (*G. a.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: DENIS, 1947c. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*G. a.*); SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1940a; MANACH, 1995. Isère: SIMON, 1884b (*G. a.*). Lot-et-Garonne: DENIS, 1947c. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b (*G. a.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; PASQUET & al., 1992. Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*G. a.*); SIMON, 1884b (*G. a.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Somme: SIMON, 1884b (*G. a.*). Var: DENIS, 1937a. Yonne: SIMON, 1884b (*G. a.*). — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 350 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de mare: DENIS, 1940a. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt, bord de ruisseau: DENIS, 1950a. Grève: GUIBÉ, 1946. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Prairie: PASQUET & al., 1992. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1938a, 1947c. Juillet: DENIS, 1940a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1937a. Juin: DENIS, 1947c, 1950a; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1940a.

*Oedothorax apicatus* (Blackwall, 1850)

*Gongylidium apicatum*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Aisne, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b (*G. a.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1967d. Aube, Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884b (*G. a.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; DENIS, 1947c; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b (*G. a.*). Charente-Maritime: SIMON, 1884b (*G. a.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Finistère: DENIS, 1947c; MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1951b, 1952a; SIMON, 1884b (*G. a.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Lot: SIMON, 1884b (*G. a.*). Lot-et-Garonne: DENIS, 1947c. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: DENIS, 1947c; GUIBÉ, 1946; PÉTILLON & al., 2004. Marne, Morbihan: SIMON, 1884b (*G. a.*). Nièvre: DENIS, 1947c. Nord: DENIS, 1947c,

1955b; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b (*G. a.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1884b (*G. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; SIMON, 1884b (*G. a.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a. Savoie: HEIDT & al., 1998. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; DENIS, 1945a, 1947c; SIMON, 1884b (*G. a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*G. a.*); SIMON, 1884b (*G. a.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990. Somme, Var: SIMON, 1884b (*G. a.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1947c, 1959c, 1962b, 1963c. Yonne: SIMON, 1884b (*G. a.*). — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1980 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord d'étang: BOSMANS & al., 1985a. Bord de l'eau: SIMON, 1884b. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1967d. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coquille d'*Helix*: DENIS, 1947c. Dune: LEDOUX & al., 1999a. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés; estuaire, terrain salé: DENIS, 1951b. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Friche: VEILLON, 1997. Herbes humides: DENIS, 1963c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral, marécage: DENIS, 1959c. Littoral, vases salées: GUIBÉ, 1946. Marécage: EMERIT & al., 1999; LANCELEVÉE, 1884. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Peupliers: NOËL & al., 2005. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Plage: GUIBÉ, 1946. Plage, sous les rouleaux de *Fucus*: DENIS, 1938a. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sable, sous des pierres: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b, 1967d. Mars: DENIS, 1952a. Mai: DENIS, 1947c. Juin: DENIS, 1945a, 1947c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1938a, 1962b; LEDOUX, 2000. Septembre: DENIS, 1947c, 1951b, 1963c. Octobre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Janvier, février: DENIS, 1967d. Mars: DENIS, 1952a, 1967d. Avril: EMERIT & al., 1999. Mai: DENIS, 1967d. Juin: DENIS, 1945a, 1947c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1962b, 1963c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1959c. Septembre: DENIS, 1947c, 1951b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1947c.

*Oedothorax fuscus* (Blackwall, 1834)

*Gongylidium retusum*.

[Selon DENIS, 1933b, SIMON, 1884b a inversé les espèces *Gongylidium fuscum* et *G. retusum*, d'où cette synonymie étonnante]. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; SIMON, 1884b (*G. r.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*G. r.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b (*G. r.*). Ariège: DENIS, 1967d. Aube, Aude: SIMON, 1884b (*G. r.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1985; DENIS, 1950c; SIMON,

1884b (*G. r.*), 1926. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; DENIS, 1947c; GUIBÉ, 1942, 1946; SIMON, 1884b (*G. r.*). Cantal: DENIS, 1947c; SIMON, 1884b (*G. r.*). Cher: DENIS, 1943b, 1947c. Côte-d'Or: SIMON, 1884b (*G. r.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a; SALMON, 1959. Dordogne: DENIS, 1947c. Drôme: BIGOT & *al.*, 1985. Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: BIGOT, 1983; CANARD, 1990a; DENIS, 1938a, 1940a; MANACH, 1995. Gers: SIMON, 1884b (*G. r.*). Gironde: DENIS, 1952a; SIMON, 1884b (*G. r.*). Hérault: SIMON, 1884b (*G. r.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a; SIMON, 1884b (*G. r.*). Isère, Loir-et-Cher: SIMON, 1884b (*G. r.*). Loire-Atlantique: CANARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot-et-Garonne: DENIS, 1947c. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; NOËL & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; CANARD, 1990a; DENIS, 1947c; PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b (*G. r.*). Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nièvre: DENIS, 1947c. Nord: DENIS, 1947c, 1955b, 1961a; EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1884b (*G. r.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1947c, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; SIMON, 1884b (*G. r.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1947c; LEDOUX & *al.*, 1999a; SIMON, 1884b (*G. r.*). Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; DENIS, 1945a, 1947c; SIMON, 1884b (*G. r.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*G. r.*); SIMON, 1884b (*G. r.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; SIMON, 1884b (*G. r.*). Somme: SIMON, 1884b (*G. r.*). Var: BOUMEZZOUGH & *al.*, 1983; DENIS, 1934a, 1935a, 1937a; SIMON, 1884b (*G. r.*). Vaucluse: BIGOT & *al.*, 1985; FAVET, 1984. Vendée: CANARD, 1990a; DENIS, 1941, 1947c, 1959c, 1963c, 1964b. Yonne: SIMON, 1884b (*G. r.*). — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Afrique du Nord, Açores, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de l'eau: SIMON, 1926. Bord de l'eau, herbes et détrit: SIMON, 1884b. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1948b, 1950b. Bord de mare: DENIS, 1941. Bord de rivière: BOSMANS & *al.*, 1985a; FAVET, 1984; LEDOUX & *al.*, 2002. Bord de rivière, galets: BIGOT & *al.*, 1985. Bord de rivière, graviers: HEIDT & *al.*, 1998. Bord de rivière, sous des pierres: DENIS, 1967d. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Détrit d'inondation: DENIS, 1967d. Dune: DENIS, 1950c; LEDOUX & *al.*, 1999a. Dépôt d'ordures: MANACH, 1995. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt: DENIS, 1961a; LANCELEVÉE, 1884. Forêt, bord de ruisseau, sous des galets: DENIS, 1950a. Forêt, chênes-verts: DENIS, 1964b. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; VEILLON, 1997. Grotte: DENIS, 1967d. Haie: NOËL & *al.*, 2005. Herbes humides: DENIS, 1934a, 1935a. Lande: VEILLON, 1997. Littoral: SALMON, 1959. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Littoral, marécage: DENIS, 1959c. Littoral, vase salée des shorres: BIGOT, 1983. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marais, sous la croûte salée séchée: DENIS,

1938a. Marécage: EMERIT & *al.*, 1999, 2003; GUIBÉ, 1942. Pelouse: BERLAND, 1924. Peupliers: NOËL & *al.*, 2005. Plage, sous les algues: DENIS, 1964b. Plantation de peupliers: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie: ASSELIN & *al.*, 1989; CORNIC, 1977; LEDOUX & *al.*, 2002; NOËL & *al.*, 2005; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005; DENIS, 1940a. Prairie sèche: EMERIT & *al.*, 1999. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Roseaux: NOËL & *al.*, 2005. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. Vase saumâtre, végétation: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b, 1967d. Mars: GUIBÉ, 1942. Avril: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: DENIS, 1934a, 1947c, 1950c, 1967d; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1943b, 1945a, 1947c, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1947c, 1950b. Août: DENIS, 1959c. Septembre: DENIS, 1947c; EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1967d. Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mars: DENIS, 1938a, 1952a; GUIBÉ, 1942. Avril: DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1934a, 1947c, 1950c, 1967d; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1941, 1945a, 1947c, 1948b, 1950a, 1967d; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1947c, 1950b. Août: DENIS, 1959c. Septembre: EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: DENIS, 1963c; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003.

#### *Oedothorax gibbifer* (Kulczynski, 1882)

*Gongylidium cantalicum*; *O. cantalicus*.

**Taxonomie.** La synonymie *O. cantalicus* (Simon, 1884) = *O. gibbifer* est établie par DENIS, 1947c. **Répartition.** Cantal: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926 (*O. c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Oise: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926 (*O. c.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b; SIMON, 1926 (*O. c.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926 (*O. c.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b (*O. c.*), 1996c (*O. c.*). — Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996b. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1950b. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b.

#### *Oedothorax gibbosus* (Blackwall, 1841)

*Gongylidium gibbosum*; *Gongylidium tuberosum*; *O. tuberosus*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b (*G. t.*). Aube: SIMON, 1884b (*G. g.*), 1884b (*G. t.*). Calvados: DENIS, 1947c (*O. t.*); GUIBÉ, 1946 (*O. t.*). Cantal: SIMON, 1884b (*G. g.*), 1884b (*G. t.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a (*O. t.*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*G. g.*), 1884 (*G. t.*); SIMON, 1884b (*G. g.*), 1884b (*G. t.*), 1926 (*O. t.*). Finistère: MANACH, 1995, 1995 (*O. t.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: DENIS, 1947c, 1947c (*O. t.*), 1955b, 1955b (*O. t.*); EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1884b (*G. g.*), 1884b (*G. t.*). Puy-de-Dôme: DENIS, 1947c, 1947c (*O. t.*), 1948b, 1948b (*O. t.*); LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales:

BOSMANS & *al.*, 1985a (*O. t.*); LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a, 1950a (*O. t.*). "Seine": DENIS, 1947c; SIMON, 1884b (*G. g.*), 1884b (*G. t.*), 1926 (*O. t.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (*G. t.*). Somme: SIMON, 1884b (*G. g.*), 1884b (*G. t.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Yonne: SIMON, 1884b (*G. g.*). — Toute la France: SIMON, 1926 (*O. t.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bord de l'eau: SIMON, 1884b, 1884b. Bord de lac, herbes humides: DENIS, 1950a, 1950a. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003; SIMON, 1926. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie humide, joncs: DENIS, 1948b. Prairie très humide, mousses: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Tourbière: DENIS, 1947c, 1947c, 1948b, 1948b, 1950a; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1947c; EMERIT & *al.*, 1999. Avril: DENIS, 1947c, 1947c. Mai: DENIS, 1947c, 1947c; EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1947c, 1948b, 1950a. Juillet, octobre: LEDOUX, 2000. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1947c. Mai: DENIS, 1947c, 1947c; EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1947c, 1947c, 1948b, 1948b, 1950a, 1950a; EMERIT & *al.*, 1999. Juillet: LEDOUX, 2000. Septembre: EMERIT & *al.*, 2003. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000.

#### *Oedothorax paludigena* Simon, 1926

**Répartition.** Bouches-du-Rhône, Corse: MILLIDGE, 1975a. [MILLIDGE, 1975a indique: «It seems probable that *Oe. paludigena* must be the dominant *Oedothorax* species in coastal marshes in the western Mediterranean»]. — Italie. **Habitat.** Littoral, zone halophile: MILLIDGE, 1975a. **Période.** — *Mâle.* Juin, octobre: MILLIDGE, 1975a. — *Femelle.* Juin: MILLIDGE, 1975a.

#### *Oedothorax retusus* (Westring, 1851)

*Erigone retusa*; *Gongylidium fuscum*.

[Selon DENIS, 1933b, SIMON, 1884b a inversé les espèces *Gongylidium fuscum* et *G. retusum*, d'où cette synonymie étonnante]. **Répartition.** Ain: HEIDT & *al.*, 1998. Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. r.*); SIMON, 1884b (*G. f.*). Ariège: DENIS, 1953b, 1961b, 1967d. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. r.*); SIMON, 1884b (*G. f.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; DENIS, 1947c; GUIBÉ, 1946. Cher: DENIS, 1943b, 1947c. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: SIMON, 1884b (*G. f.*). Dordogne: DENIS, 1947c. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; SIMON, 1909a. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a; MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Isère: SIMON, 1884b (*G. f.*). Loiret: COCQUEMPOT & *al.*, 1984; LEDOUX & *al.*, 2002. Lot: SIMON, 1884b (*G. f.*). Lot-et-Garonne: DENIS, 1947c. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Manche: CANARD, 1990a; DENIS, 1947c; GUIBÉ, 1946; PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle:

LEBORGNE & *al.*, 1998. Nièvre: DENIS, 1947c. Nord: DENIS, 1947c, 1955b; EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1884b (*G. f.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1947c, 1952c. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; DENIS, 1947c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. r.*); SIMON, 1884b (*G. f.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*G. f.*); SIMON, 1884b (*G. f.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989. Somme, Var: SIMON, 1884b (*G. f.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: SIMON, 1884b (*G. f.*). — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2270 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de l'eau: SIMON, 1884b. Bord de rivière: DENIS, 1938a, 1947c; LEDOUX & *al.*, 2002. Bord de rivière, graviers: HEIDT & *al.*, 1998. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1952c. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Dune, sous des pierres: DENIS, 1962b. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt, bord d'étang; forêt, bord de ruisseau: DENIS, 1950a. Grève: GUIBÉ, 1946. Jardin; lisière de forêt: LE PERU, 2004. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Marécage: DENIS, 1947c, 1952a; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; LANCELEVÉE, 1884. Prairie: ASSELIN & *al.*, 1989; CORNIC, 1977; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Sable humide, sous les salicornes: DENIS, 1963c, 1964b. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. **Période.** — *Mâle.* Mars: LESSERT, 1910. Avril: DENIS, 1947c; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: BONTE, 2000. Juin: DENIS, 1947c; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: DENIS, 1947c. Août: DENIS, 1952c. Septembre: DENIS, 1947c, 1953b; EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1947c. Mars: DENIS, 1947c, 1952a; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1947c, 1962b; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1967d. Juin: DENIS, 1938a, 1943b, 1947c, 1950a; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1952c; LE PERU, 2004. Septembre: DENIS, 1947c, 1953b; EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: DENIS, 1963c, 1964b; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle avec cocon.* Septembre: DENIS, 1953b.

#### *Oreonetides glacialis* (L. Koch, 1872)

**Répartition.** Savoie (Haute-): SIMON, 1929. — Allemagne, Suisse. Europe. **Altitude.** 2000 m (SIMON, 1929).

#### *Oreonetides quadridentatus* (Wunderlich, 1972)

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. — Allemagne. Autriche. **Altitude.** 2100 m (BOSMANS & *al.*, 1986).



*Oreonetides vaginatus* (Thorell, 1872)

*O. vaginata*; *Porrhomma adipatum*; *Saaristoa v.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a (*P. a.*). Orne: ASSELIN, 1990 (*S. v.*). Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1929 (*O. v.*). Savoie: BERLAND, 1937 (*O. v.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1929 (*O. v.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** De 1930 m (LEDOUX & al., 1996b) jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Prairie: LEDOUX & al., 1996b. Prairies alpêtres, sous les pierres: SIMON, 1884a. Sous une pierre: SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937. Août: LEDOUX & al., 1996b.

*Oryphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Ostearius melanopygius* (O. P.-Cambridge, 1879)

*Ostarius m.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DENIS, 1957b. Ariège: DENIS, 1963d, 1967d. Calvados: ASSELIN & al., 1989 (*O. m.*); CANARD, 1990a (*O. m.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a (*O. m.*). Finistère: DENIS, 1963d; MANACH, 1995 (*O. m.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a (*O. m.*). Loire-Atlantique: DENIS, 1963d. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: CANARD, 1990a (*O. m.*); DENIS, 1963d. Morbihan: CANARD, 1990a (*O. m.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1999a. "Seine": DENIS & al., 1946; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: DENIS, 1963d. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Vendée: DENIS, 1959c, 1962b, 1962d, 1963c, 1963d, 1965c; DENIS & al., 1946. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Carrière, sur un talus couvert de plantes sèches: DENIS & al., 1946. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Dune: LEDOUX & al., 1999a. Dune, sous des pierres: DENIS, 1963c; DENIS & al., 1946. Maison: BRAUD & al., 2005. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Plage, sous des galets: DENIS, 1962d. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c; DENIS & al., 1946. Serre: DENIS, 1957b. Vieilles bouses: DENIS, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS & al., 1946. Mars: DENIS, 1963c. Avril: DENIS & al., 1946. Juin: DENIS & al., 1946; LEDOUX & al., 1999a. Septembre: DENIS, 1957b, 1959c. Octobre: DENIS, 1962b, 1963d. Décembre: DENIS, 1963d, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS & al., 1946. Mars: DENIS, 1963c. Avril: DENIS & al., 1946. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS & al., 1946; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: DENIS, 1959c, 1963c, 1963d. Août: DENIS, 1963d. Septembre: DENIS, 1957b, 1959c, 1962d. Octobre: DENIS, 1962b, 1963c, 1963d. Novembre: DENIS, 1957b; DENIS & al., 1946. — *Femelle avec cocon.* Mars: DENIS, 1963c. Juin: DENIS & al., 1946.

*Ouedia* (voir *Trichopterna*)

*Palliduphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Panamomops mengei* Simon, 1926

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. — Citée de France, sans localité précise, par SIMON, 1926. Allemagne, Suisse. Paléarctique.

*Panamomops mutilus* (Denis, 1962)

**Répartition.** Gard, Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Espagne. **Habitat.** Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Janvier, octobre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Janvier: LEDOUX, 2000.

*Panamomops sulcifrons* (Wider, 1834)

*Erigone bicuspis*; *P. bicuspis*.

**Répartition.** Aube, Cantal: SIMON, 1884b (*P. b.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2003. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. b.*); SIMON, 1884b (*P. b.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. b.*); SIMON, 1884b (*P. b.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DENIS, 1946c; SIMON, 1884b (*P. b.*). — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1980 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Berges humides: SIMON, 1884b. Bord de l'eau, herbes et détritiques: SIMON, 1926. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Détritiques d'inondation: DENIS, 1946c. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Friche: VEILLON, 1997. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2002, 2003. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1946c. Avril: VEILLON, 1997. — *Femelle.* Février: DENIS, 1946c. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: LEDOUX & al., 1996a, 2003.

*Parapelecopsis* (voir *Pelecopsis*)

*Pelecopsis bucephala* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone b.*; *Exechophysis bucephalus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926 (*Exechophysis b.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957 (*Exechophysis b.*), 1965 (*Exechophysis b.*); BIGOT & al., 1973 (*Exechophysis b.*), 1983 (*Exechophysis b.*); DENIS, 1950c (*Exechophysis b.*), 1967c (*Exechophysis b.*). Corse: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*Erigone b.*); SIMON, 1884b (*Exechophysis b.*), 1926 (*Exechophysis b.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994 (*Exechophysis b.*); EMERIT & al., 1994 (*Exechophysis b.*). Gers: SIMON, 1884b (*Exechophysis b.*), 1926 (*Exechophysis b.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a (*Exechophysis b.*); SIMON, 1926 (*Exechophysis b.*). Var: BIGOT & al., 1987a (*Exechophysis b.*), 1987b (*Exechophysis b.*); SIMON, 1884b (*Exechophysis b.*), 1926 (*Exechophysis b.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Anciens marais salants; bord d'étang saumâtre; bord de canal: DENIS, 1950c. Dune: DENIS, 1950c; LEDOUX & al., 1999a. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: SIMON, 1884b, 1926. Marécage salé: BIGOT, 1965. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Sur le sable à coquilles: DENIS, 1950c. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1965. Végétation sèche halo-



phile: DENIS, 1950c. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1950c. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX & al., 1999a. Octobre: EMERIT & al., 1994. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX & al., 1999a.

***Pelecopsis capitata*** (Simon, 1884)

*Lophocarenum capitatum.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. c.*), 1926 (*L. c.*). — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois de mélèzes, mousses: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1884b.

***Pelecopsis denisi*** Brignoli, 1983

*P. montana.*

**Taxonomie.** L'espèce *Pelecopsis denisi* a d'abord été décrite d'Andorre par DENIS, 1937f sous *Lophocarenum* sp., puis nommée *P. montana* n. nom. par DENIS, 1960a. Ce nom étant préoccupé, l'espèce est renommée *P. denisi* par BRIGNOLI, 1983. [Mâle inconnu]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a (*P. m.*). — Connue seulement d'Andorre et de France. **Habitat.** Mousses: DENIS, 1960a.

***Pelecopsis elongata*** (Wider, 1834)

*Lophocarenum elongatum*; *Lophocarenum insanum.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. i.*), 1926 (*L. i.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1926 (*L. i.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*L. e.*). Doubs: SIMON, 1926 (*L. e.*). Drôme: SIMON, 1926 (*L. i.*). Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*L. e.*). Jura, Landes, Loire: SIMON, 1926 (*L. e.*). Lozère: SIMON, 1926 (*L. i.*). Oise: SIMON, 1926 (*L. e.*). Vaucluse: SIMON, 1926 (*L. i.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Bois de mélèzes, mousses: SIMON, 1884b. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de ruisseau: SIMON, 1926. Forêt: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Novembre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Mars, juin: DENIS, 1938a. Novembre: SIMON, 1926.

***Pelecopsis inedita*** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Brachycentrum ineditum*; *Erigone i.*; *Lophocarenum ineditum.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. i.*), 1926 (*L. i.*). Ariège, Aude: SIMON, 1926 (*L. i.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*B. i.*); SIMON, 1884b (*L. i.*), 1926 (*L. i.*). Corse: SIMON, 1884b (*L. i.*), 1926 (*L. i.*). Hérault: EMERIT & al., 1985 (*L. i.*); SIMON, 1884b (*L. i.*), 1926 (*L. i.*). Maine-et-Loire, Pyrénées-Orientales: SIMON, 1926 (*L. i.*). "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. i.*). Var: DENIS, 1934a (*L. i.*), 1935b (*L. i.*), 1935d (*L. i.*), 1937b (*L. i.*); SIMON, 1884b (*L. i.*), 1898c (*L. i.*), 1926 (*L. i.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1962d. — Espagne, Italie, Méditerranée. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962d. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Dune, sous la végétation: DENIS, 1950c. Forêt de pins, herbes sèches et litière: DENIS, 1962b. Herbes humides: DENIS, 1934a. Marécage: DENIS, 1950c. Plage: SIMON, 1926. Sol sec, sous les pierres: DENIS, 1935d. **Période.** — *Mâle.* Mai:

DENIS, 1934a, 1950c. Octobre: DENIS, 1935b, 1935d. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b, 1962d. Mai: DENIS, 1934a, 1937b, 1950c. Août: SIMON, 1926. Octobre: DENIS, 1935d.

***Pelecopsis mediocris*** (Kulczynski, 1899)

*Erigone straminea*; *Lophocarenum mediocre*; *Lophocarenum stramineum*; *Parapelecopsis m.*

**Taxonomie.** La situation de l'espèce *Pelecopsis mediocris* (Kulczynski, 1899) est confuse. L'espèce citée par SIMON, 1884b sous le nom *Lophocarenum stramineum* (non Menge) se rapporte à *Lophocarenum (= Pelecopsis) mediocre* (Kulczynski) selon SIMON, 1926, et à *P. nemoralioides* (O. P.-Cambridge, 1884) selon WUNDERLICH, 1985. Ce dernier indique une synonymie probable de *Brachycentrum (= Pelecopsis) mediocre* Kulczynski, 1899 avec *P. nemoralioides* (O. P.-Cambridge, 1884). Selon PLATNICK, 2004, les citations de *P. mediocris* par SIMON, 1926 sont erronées et se rapportent à *P. nemoralioides* dans le cas des femelles. Toutefois, le nom *mediocris*, le plus souvent utilisé, est maintenu ici. Les citations faites sous les noms *L. stramineum* et *L. mediocre* se retrouvent donc sous *P. mediocris*. [Remarque: *Lophocarenum straminea* (Menge, 1868) est considéré comme *nomen dubium* par DENIS, 1964e]. Le transfert de *P. mediocris*, *P. nemoralioides* et *P. nemoralis* dans le nouveau genre *Parapelecopsis* par WUNDERLICH, 1991 n'est pas suivi ici. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926 (*L. m.*). Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*); SIMON, 1884b (*L. s.*), 1926 (*L. m.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1926 (*L. m.*). Calvados: GUIBÉ, 1943 (*L. m.*), 1946 (*L. m.*). Finistère: CANARD, 1990a. Gironde: SIMON, 1884b (*L. s.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990a. Morbihan: CANARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1884b (*L. s.*). Var: BECKER, 1880 (*E. s.*); SIMON, 1884b (*L. s.*), 1926 (*L. m.*). Vaucluse: SIMON, 1926 (*L. m.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Espagne (*P. m.*). Madère (*P. m.*). **Habitat.** Coquilles vides d'*Helix*: GUIBÉ, 1943. Dune: DENIS, 1962b. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b, 1963c. Herbes sèches: DENIS, 1963c. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c. Octobre: DENIS, 1962b, 1963c. Novembre: DENIS, 1962b. Décembre: DENIS, 1964b; GUIBÉ, 1943. — *Femelle.* Octobre: DENIS, 1962b, 1963c. Décembre: DENIS, 1962b, 1964b; GUIBÉ, 1943.

***Pelecopsis mingei*** (Simon, 1884)

*Erigone parumpunctata*; *Lophocarenum m.*; *Lophocarenum parumpunctatum*; *Trichopterna m.*

**Répartition.** Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. m.*); SIMON, 1884b (*L. m.*), 1926 (*L. m.*). Var: SIMON, 1881c (*E. p.*), 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*T. m.*). — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Holarctique. **Habitat.** Marais, détritus: LANCELEVÉE, 1884. Marécage: SIMON, 1926. Marécages, détritus: SIMON, 1884b. Prairie; ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai, novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Avril, mai, juin, novembre: LEDOUX, 2000.

*Pelecopsis mutica* Denis, 1957*P. muticus*.

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (*P. m.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1961b. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1590 m (DENIS, 1961b) jusqu'à 2340 m (DENIS, 1957a). **Période.** — *Mâle.* Juillet, décembre: DENIS, 1961b. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1957a, 1961b. Décembre: DENIS, 1961b.

*Pelecopsis nemoralioides* (O. P.-Cambridge, 1884)*Parapelecopsis n.*; *P. locketi*.

**Taxonomie.** La synonymie *P. locketi* Cooke, 1967 = *P. nemoralioides* est établie par WUNDERLICH, 1985. **Répartition.** Vendée: DENIS, 1966a (*P. l.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne (*P. n.*). Europe (*P. n.*).

*Pelecopsis nemoralis* (Blackwall, 1841)

*Brachycentrum pyrenaicum*; *Erigone n.*; *Lophocarenum nemorale*; *Lophocarenum pyrenaicum*; *Parapelecopsis n.*; *P. pyrenaica*; *P. pyreneae*.

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a, 1960a (*P. pyrenaica*), 1961b (*P. pyrenaica*); SIMON, 1918 (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. n.*); SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*L. n.*). Calvados, Charente: SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*L. n.*). Finistère: MANACH, 1995; SIMON, 1926 (*L. n.*). Gers: SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*L. n.*). Gironde: DENIS, 1952a; SIMON, 1926 (*L. n.*). Landes: SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*L. n.*). Loire: SIMON, 1926 (*L. n.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*P. n.*); SIMON, 1926 (*L. n.*). Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*L. n.*). Pas-de-Calais: SIMON, 1926 (*L. n.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (*B. p.*), 1951c (*B. p.*); SIMON, 1918 (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1985a (*P. pyrenaica*); DENIS, 1933b (*L. n.*); LEDOUX & al., 1996a, 1999a (*P. pyrenaica*), 2003; SIMON, 1918 (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Rhône: SIMON, 1926 (*L. n.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (*L. n.*), 1926 (*L. n.*). Var: SIMON, 1884b (*L. n.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*P. n.*). Europe, Russie (*P. n.*). **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois, mousses: SIMON, 1884b. Bord de lac: DENIS, 1950b. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1964b. Dune, oyats: DENIS, 1965c. Dune, oyats et *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Dune, sous les tamaris: DENIS, 1965c. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962d. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt, mousses et lichens sur les troncs des arbres: SIMON, 1926. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Litière de pins: DENIS, 1964b. Marécage: DENIS, 1952a. Mousses: DENIS, 1960a. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Plage, oyats: DENIS, 1963c. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Touffes sèches de *Saxifraga*: SIMON, 1918. Touffes sèches de saxifrages: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1953b, 1965c.

Mars: DENIS, 1952a. Juin: LEDOUX & al., 1999a. Août: SIMON, 1926. Septembre: DENIS, 1951c. Octobre: DENIS, 1962b, 1962d, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1953b; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1952a, 1964b. Avril: DENIS, 1962b, 1962d, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1933b, 1964b; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a, 1961b. Août: SIMON, 1926. Septembre: DENIS, 1951c. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1962b, 1965c; LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1964b.

*Pelecopsis parallela* (Wider, 1834)

*Brachycentrum parallelum*; *Erigone p.*; *Lophocarenum parallelum*; *P. parallelus*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (*L. p.*). Calvados: GUIBÉ, 1943 (*L. p.*), 1946 (*L. p.*). Cantal, Corse: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*L. p.*); SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Gers, Gironde: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loir-et-Cher: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1926 (*L. p.*); VEILLON, 1997. Manche, Morbihan: CANARD, 1990a. Nièvre: DENIS, 1943b (*L. p.*). Nord: DENIS, 1955a (*P. p.*). Oise: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*B. p.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (*L. p.*). Rhône: SIMON, 1926 (*L. p.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; DENIS, 1945a (*L. p.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. p.*); SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984 (*L. p.*), 1989; DOIGNON, 1976 (*L. p.*). Somme: SIMON, 1884b (*L. p.*), 1926 (*L. p.*). Vendée: DENIS, 1941 (*L. p.*), 1947b (*L. p.*), 1962d, 1963c. — Alsace: SIMON, 1926 (*L. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Berges humides: SIMON, 1884b. Berges humides, mousses: SIMON, 1926. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, chênes; bois, herbes et litière: DENIS, 1943b. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de mare, herbes humides: DENIS, 1962d. Bord de rivière: SIMON, 1926. Bord de rivière, sous des pierres: DENIS, 1967d. Bord de ruisseau: DENIS, 1941. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coquilles d'*Helix*: GUIBÉ, 1946. Coquilles vides d'*Helix*; détritit: GUIBÉ, 1943. Dune: DENIS, 1947b. Dune, oyats et *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Étang desséché: DENIS, 1945a. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de chênes: LE PERU, 2004. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Garrigue à *Quercus coccifera*:

BIGOT & *al.*, 1973. Herbes sèches: DENIS, 1963c. Litière; marécage: GUIBÉ, 1943. Mousses: SIMON, 1884b. Oyats secs; plage, oyats: DENIS, 1963c. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Prairie alpestre près des neiges: SIMON, 1884b, 1926. Sable sous *Tamarix anglica*: DENIS, 1962d. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962d. Juin: DENIS, 1941, 1943b, 1945a, 1947b; SIMON, 1926. Juillet, septembre, octobre: DENIS, 1963c. Décembre: GUIBÉ, 1943. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Avril: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1943b, 1947b; EMERIT & *al.*, 1997. Juillet, août: DENIS, 1962d. Septembre: GUIBÉ, 1943. Octobre: DENIS, 1963c. Décembre: GUIBÉ, 1943.

*Pelecopsis partita* Denis, 1953

*P. partitus.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1953b (*P. p.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (*P. p.*). — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2320 m (DENIS, 1954a) jusqu'à 2400 m (DENIS, 1953b). **Habitat.** Sous les pierres en bordure de névé: DENIS, 1954a. **Période.** — *Femelle*. Mai: DENIS, 1953b. Juillet: DENIS, 1954a.

*Pelecopsis radicolica* (L. Koch, 1872)

*Brachycentrum thoracatum*; *Erigone thoracata*; *Lophocarenum r.*; *Lophocarenum thoracatum*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*L. r.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. t.*); SIMON, 1884b (*L. t.*), 1926 (*L. r.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Orne: CANARD, 1990a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*L. t.*), 1910 (*B. t.*); SIMON, 1926 (*L. r.*). "Seine": SIMON, 1884b (*L. t.*), 1926 (*L. r.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. t.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois; clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de pins: DENIS, 1964b, 1965c. Forêt de pins, herbes sèches et litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Herbes coupées sèches; litière très sèche sous des fagots de chênes-verts: DENIS, 1963c. Mousses: SIMON, 1884b. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1964b; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b, 1963c; LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1962b, 1964b. Juillet: DENIS, 1963c. Août: DENIS, 1962b, 1963c. Septembre: DENIS, 1964b. Octobre: DENIS, 1962b.

*Pelecopsis susannae* (Simon, 1914)

*Brachycentrum clypeatum*; *Lophocarenum s.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*B. c.*). Rhône: SIMON, 1915a (*L. s.*), 1926 (*L. s.*). — Espagne. **Habitat.** Dune, sous la végétation; marais saumâtre; sables à coquilles, salicornes: DENIS, 1950c. **Période.** — *Femelle*. Mai: DENIS, 1950c.

*Peponocranium ludicrum* (O. P.-Cambridge, 1861)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Charente-Maritime: SIMON, 1926. Côtes-d'Armor: CANARD,

1990a. Dordogne: SIMON, 1926. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1940a. Gironde: MAGNÉ, 1969; SIMON, 1884b. Ile-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990a. Landes, Loire-Atlantique: SIMON, 1926. Manche: BERLAND, 1924. Morbihan: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Seine-et-Marne: SIMON, 1926. Vendée: DENIS, 1941. Vienne (Haute-): SIMON, 1926. — Toute la région maritime de l'ouest et du nord: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Europe, Russie. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Ajoncs, bruyères, genévriers: SIMON, 1926. Bord de mer, *Ulex*: SIMON, 1884b. Bruyères: DENIS, 1948b. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Grotte: MAGNÉ, 1969. Herbes humides: DENIS, 1941. Lande humide: LANCELEVÉE, 1884. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande, fougères: DENIS, 1940a. Marais salant: SIMON, 1926. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: BERLAND, 1924. **Période.** — *Mâle*. Février: MAGNÉ, 1969. Mars: SIMON, 1926. Mai: BONTE, 2000. — *Femelle*. Février: MAGNÉ, 1969. Mai: BONTE, 2000. Juin: DENIS, 1941, 1948b; EMERIT & *al.*, 1999. Juillet: DENIS, 1940a. Août: SIMON, 1926.

*Piniphantes* (voir *Lepthyphantes*)

*Pityohyphantes palilis* (L. Koch, 1870)

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Jura: SIMON, 1929. — Europe centrale et de l'Est. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929.

*Pityohyphantes phrygianus* (C. L. Koch, 1836)

*Linyphia phrygiana*.

**Répartition.** Calvados: LUCAS, 1870d (*L. p.*). Jura: SIMON, 1929. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1961b. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. — Alpes, Jura, Auvergne, Cévennes, Pyrénées: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (BOSMANS & *al.*, 1986). **Habitat.** Conifères: SIMON, 1884a. Épicéas: DENIS, 1948b. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt de conifères: SIMON, 1929. Lande: LUCAS, 1870d. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1948b. Juillet: DENIS, 1961b. Août: LUCAS, 1870d.

*Plaesianillus cyclops* (Simon, 1881)

*Erigone c.*; *Ploesianillus c.*; *Tapinocyba c.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1881c (*E. c.*), 1884b (*T. c.*), 1926 (*P. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. c.*); SIMON, 1881c (*E. c.*), 1884b (*T. c.*), 1926 (*P. c.*). — Connue seulement de France.

*Pocadicnemis jacksoni* MILLIDGE, 1976

*Hypselistes j.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a; MILLIDGE, 1975b. — Espagne, Grande-Bretagne, Chine. **Altitude.** De 800 m jusqu'à 1700 m (LEDOUX & *al.*,

1996a). **Habitat.** Forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, litière: MILLIDGE, 1975b. Pelouse à *Brachypodium*; sous les genêts: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Février, avril, juillet: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Février, avril: LEDOUX & al., 1996a. Mai: LEDOUX & al., 1996a; MILLIDGE, 1975b. Juin, juillet: LEDOUX & al., 1996a.

*Pocadicnemis juncea* Locket & MILLIDGE, 1953

*P. neglecta.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: MILLIDGE, 1975b. Finistère: MANACH, 1995. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994. Nord, Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*P. n.*); MILLIDGE, 1975b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Champ: LEDOUX & al., 1996a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Litière: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: EMERIT & al., 1999. Prairie: LEDOUX & al., 1996a, 2002. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841)

*Erigone p.*; *Lophocarenum medusa* [err.].

**Répartition.** Aisne, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1884b. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1899, 1909a. Finistère: CANARD, 1990a; DENIS, 1939a; MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1955a. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d, 1955a; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): DENIS, 1950a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904, 1910. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b. Somme: SIMON, 1884b. Var: DENIS, 1934a, 1937b [*Lophocarenum medusa*, err. selon DENIS, 1966b]. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS,

1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b, 1965c. Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1959d; SIMON, 1884b. Bois d'épicéas, herbes: DENIS, 1948b. Bois, hautes herbes: SIMON, 1926. Bois, herbes très humides: DENIS, 1948b. Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de rivière, herbes humides: DENIS, 1939a. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b, 1965c. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Forêt: DENIS, 1955a; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1964b. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, bord de mer: DOIGNON, 1976. Forêt, litière de chênes: DENIS, 1963c. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Herbes humides: DENIS, 1934a. Herbes sèches: DENIS, 1950c. Herbes sèches ou humides: DENIS, 1933b. Jardin; lisière de forêt, mousses: LE PERU, 2004. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & al., 1970. Marais salant: DENIS, 1950c, 1962b. Marais saumâtre, herbes humides: DENIS, 1950c. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003; SIMON, 1884b, 1926. Mousses: DENIS, 1933b. Mousses très humides: DENIS, 1960a. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 1996c, 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: LEDOUX & al., 1996c. Prairie très humide: DENIS, 1948b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Tourbière: DENIS, 1948b, 1950a; LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1952a. Avril: CLARK & al., 1970; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Mai: DENIS, 1950c, 1965c; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1948b, 1964b; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1960a; LEDOUX & al., 1996c. Octobre, novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1952a. Avril: CLARK & al., 1970; LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1934a, 1937b, 1950c, 1965c; LE PERU, 2004. Juin: CLARK & al., 1970; DENIS, 1938a, 1948b, 1950a, 1964b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2002; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1939a, 1959d, 1960a, 1961b, 1962b; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: DENIS, 1963c; LEDOUX & al., 1996c. Octobre, novembre: LE PERU, 2004.

*Pociloneta variegata* (Blackwall, 1841)

*Bathyphantes variegatus*; *P. globosa*.

**Taxonomie.** L'espèce *Pociloneta variegata* (Blackwall, 1841) est désignée sous le nom *P. globosa* (Wider, 1834) par plusieurs auteurs. À ce propos, BONNET, 1958 note: «Jusqu'en 1907, les auteurs s'étaient entendus sur le nom de *variegatus* B., 1841 pour désigner cette espèce; mais à cette date, Strand détermine que la *Linyphia globosa* de Wider, 1834 est synonyme de *variegatus*, et comme elle a priorité, donne le nom

de *globosa* à cette espèce. Il a été suivi par de nombreux auteurs jusqu'en 1929, où Simon déclare que cette *globosa* de Wider est identique à *Linyphia pusilla* et n'a rien de commun avec *variegata*; et les auteurs de revenir à la première appellation. Cela montre, une fois de plus, combien, à notre époque, il est absurde de changer le nom d'une espèce commune sous la foi d'une synonymie qui peut très bien être controversée quelque temps plus tard». **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: SIMON, 1884a (*B. v.*), 1929. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1929. Ardennes: LENICE, 1992 (*P. g.*). Ariège: SIMON, 1929. Calvados: ASSELIN & al., 1989 (*P. g.*); GUIBÉ, 1943, 1946. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990 (*P. g.*). Dordogne: SIMON, 1929. Eure: EMERIT & al., 2003 (*P. g.*); LANCELEVÉE, 1884 (*B. v.*). Finistère: ASSELIN, 1990 (*P. g.*); DENIS, 1940a; MANACH, 1995 (*P. g.*); SIMON, 1929. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*P. g.*). Jura: SIMON, 1929. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b (*P. g.*). Lozère: SIMON, 1929. Morbihan: ASSELIN, 1990 (*P. g.*); SIMON, 1884a (*B. v.*), 1929. Nord: DENIS, 1934c. Oise, Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1929. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (*P. g.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*B. v.*), 1910 (*P. g.*); SIMON, 1929. "Seine": SIMON, 1929. Seine-et-Marne: SIMON, 1884a (*B. v.*), 1929. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2090 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères; forêt, buissons bas, bruyères et *Ulex*: SIMON, 1929. Fougères: DENIS, 1940a. Friche: PASQUET & al., 1992. Jardin: LENICE, 1992. **Période.** — *Mâle.* Juin: LESSERT, 1904, 1910. Juillet: SIMON, 1929. — *Femelle.* Mai: GUIBÉ, 1943. Juillet: DENIS, 1940a, 1954a. Septembre: EMERIT & al., 2003; GUIBÉ, 1943.

***Porrhomma campbelli*** F. O. P.-Cambridge, 1894

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 900 m (BOSMANS & al., 1986).

***Porrhomma convexum*** (Westring, 1851)

*P. diabolicum*; *P. pallidum* [err.]; *P. proserpina*; *P. scopiferum*.

**Répartition.** Ain: BOURNE, 1977. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*P. p.*). Ardennes: HUBERT, 1969 (*P. p.*). Ariège: DENIS, 1953b (*P. p.*), 1959a (*P. p.*), 1960a (*P. p.*), 1967d; FAGE, 1931 (*P. p.*); HUBERT, 1969 (*P. p.*); JEANNEL, 1926 (*P. p.*); SIMON, 1884a (*P. p.*), 1910 (*P. p.*), 1911 (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Aveyron: HUBERT, 1969 (*P. p.*). Côte-d'Or, Doubs: FAGE, 1931 (*P. p.*). Eure: EMERIT & al., 2003. Gard: SIMON, 1926 (*P. p.*). Gers: DENIS, 1959b (*P. p.*); JEANNEL, 1926 (*P. d.*); SIMON, 1884a (*P. d.*), 1926 (*P. p.*). Gironde: DRESKO & al., 1968 (*P. p.*); MAGNÉ, 1967 (*P. p.*), 1969 (*P. p.*). Jura: FAGE, 1931 (*P. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Meurthe-et-Moselle: HUBERT, 1969 (*P. p.*); REMY, 1927 (*P. p.*), 1932b (*P. p.*); SIMON, 1926 (*P. p.*). Nord: DENIS, 1943d (*P. p.*), 1955b (*P. p.*); EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a (*P. p.*); DRESKO & al., 1968 (*P. p.*); FAGE, 1931 (*P. p.*); JEANNEL, 1926 (*P. p.*); SIMON, 1907b (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Pyrénées-

Atlantiques: FAGE, 1931 (*P. p.*); HUBERT, 1969 (*P. p.*); JEANNEL, 1926 (*P. p.*); SIMON, 1913 (*P. p.*), 1926 (*P. p.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*P. p.*), 1959a (*P. p.*), 1967d; JEANNEL, 1926 (*P. s.*); SIMON, 1884a (*P. s.*), 1926 (*P. p.*). Savoie: HEIDT & al., 1998; MÜLLER, 1985. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b [*P. pallidum*, err. selon LEDOUX & al., 1996c], 1996c. Somme: DENIS, 1946b (*P. p.*). Vendée: CLARK & al., 1970. Vienne: DENIS, 1958b (*P. p.*). Vosges: HUBERT, 1969 (*P. p.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2340 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bois sombres, mousses épaisses: SIMON, 1926. Bord de névé: DENIS, 1960a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Friche: VEILLON, 1997. Galerie souterraine: SIMON, 1926. Grotte: BOURNE, 1977; DENIS, 1953b, 1958b, 1959a, 1959b, 1967d; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1931; HUBERT, 1969; JEANNEL, 1926; MAGNÉ, 1967, 1969; REMY, 1927, 1932b; SIMON, 1884a, 1884a, 1884a, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1926. Marais, sous des roseaux couchés: DENIS, 1943d. Marécage: EMERIT & al., 2003. Mine: DENIS, 1959a. Mousses: DENIS, 1933b. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre: DENIS, 1953a; MÜLLER, 1985. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969. Février: EMERIT & al., 1999; HUBERT, 1969. Avril: CLARK & al., 1970; DRESKO & al., 1968. Mai: DENIS, 1959b; EMERIT & al., 2003. Juillet: DRESKO & al., 1968; MAGNÉ, 1969. Août: DENIS, 1960a; DRESKO & al., 1968; LEDOUX & al., 1996b, 1996c; MAGNÉ, 1969. Septembre: DENIS, 1946b; EMERIT & al., 2003. Octobre: DENIS, 1943d; HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969. Novembre: DENIS, 1959a; HUBERT, 1969. Décembre: DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969. — *Femelle.* Janvier, février: DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969. Mars: DENIS, 1958b. Avril: CLARK & al., 1970; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969. Mai: DENIS, 1959b; EMERIT & al., 2003. Juin: HUBERT, 1969. Juillet: DENIS, 1953b; DRESKO & al., 1968; MAGNÉ, 1969. Août: DENIS, 1953a, 1959a, 1960a; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969. Septembre: DENIS, 1967d; MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1943d; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969. Novembre: DENIS, 1959a, 1967d; HUBERT, 1969. Décembre: HUBERT, 1969; MAGNÉ, 1969.

***Porrhomma corsicum*** Simon, 1910

*Centromerus corsicus*.

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: REMY, 1950 (*C. c.*); SIMON, 1910, 1926. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Grotte: REMY, 1950; SIMON, 1910, 1926.

***Porrhomma egeria*** Simon, 1884

*P. jacksoni*.

**Taxonomie.** L'espèce *Porrhomma jacksoni* Simon, 1926, citée du Tarn-et Garonne, est maintenue comme synonyme de *P. egeria*, bien que THALER, 1968 la place dans les "species inquirendae", et que PLATNICK, 2004 la considère *nomen dubium*. **Répartition.** Aisne: SIMON, 1884a, 1926. Allier: SIMON, 1926.

Ariège: DENIS, 1959a, 1960a, 1967d; SIMON, 1926. Aude: DENIS, 1967d. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Côte-d'Or: DRESKO, 1956; DRESKO & al., 1968. Gard: SIMON, 1926. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Gironde: MAGNÉ, 1969. Hérault: LOPEZ & al., 1979. Marne: SIMON, 1926. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a; FAGE, 1931; SIMON, 1926. Rhin (Haut-): FAGE, 1931. Sarthe: SIMON, 1926. Savoie (Haute-): BOURNE, 1978. Tarn: DENIS, 1958b. Tarn-et-Garonne: FAGE, 1931 (*P. j.*); SIMON, 1926 (*P. j.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1400 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Détritux: GUIBÉ, 1943. Forêt: DENIS, 1960a. Forêt sablonneuse, sous des gros blocs de grès: SIMON, 1884a. Forêt, sous des grosses pierres: SIMON, 1926. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; BOURNE, 1978; DENIS, 1958b, 1959a, 1967d; DRESKO, 1956, 1959a; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1931; LOPEZ & al., 1979; MAGNÉ, 1969; SIMON, 1926. Sous des grosses souches de hêtres: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Janvier: BOURNE, 1978. Mars: DENIS, 1967d. Avril: DRESKO, 1959a. Septembre: DENIS, 1958b; DRESKO & al., 1968. Octobre: SIMON, 1884a. — *Femelle.* Janvier: BOURNE, 1978; GUIBÉ, 1943. Mars: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959a. Mai: DENIS, 1967d. Août: DENIS, 1959a, 1960a; MAGNÉ, 1969. Septembre: DENIS, 1958b, 1967d. Octobre: SIMON, 1884a. Novembre: DENIS, 1960a; DRESKO, 1959a.

*Porrhomma microphthalmum* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Opistoxys acuta*; *P. decens*; *P. errans* [err.]; *P. microphthalmum*.

**Taxonomie.** La synonymie *P. acutum* (Simon, 1884) = *P. microphthalmum* est établie par THALER, 1975. [SIMON, 1926 note: « Je rapportais autrefois cette espèce au *Nerienne errans* Blackwall (= *Porrhomma e.*) mais à tort »]. **Répartition.** Ain: SIMON, 1884a [*P. errans*, err. selon SIMON, 1926]; VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1884a (*O. a.*), 1926 (*O. a.*); THALER, 1975. Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a [*P. errans*, err. selon SIMON, 1926]. Ardèche: FAGE, 1931. Aube: SIMON, 1884a [*P. errans*, err. selon SIMON, 1926]. Calvados: SIMON, 1884a (*P. d.*). Doubs: EMERIT & al., 1997; FAGE, 1931. Eure: LANCELEVÉE, 1884 [*P. errans*, err. selon BONNET, 1958]. Loir-et-Cher: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées (Hautes-): DRESKO & al., 1975 (*P. m.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1884a [*P. errans*, err. selon SIMON, 1926]. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; SIMON, 1884a [*P. errans*, err. selon SIMON, 1926]. Somme: SIMON, 1884a (*P. d.*). Tarn: DRESKO & al., 1968. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1968a. — Presque toute la France: SIMON, 1926 (*O. a.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. En plein air: LEDOUX, 2000. Forêt: LEDOUX & al., 1999b. Grotte: DRESKO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; SIMON, 1926. Maison: DENIS, 1968a. Marécage: SIMON, 1884a; VILLEPOUX, 1990b. Mousses épaisses: SIMON, 1926. Prairie: LEDOUX & al., 1999b; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Ripisilve:

LEDOUX, 2000. Souterrain: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Avril: DRESKO & al., 1968. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1968a; EMERIT & al., 1997. Août: LEDOUX & al., 1999b. Octobre: DRESKO & al., 1975.

*Porrhomma myops* Simon, 1884

**Répartition.** Ain: BOURNE, 1977. Aude: JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1926. Savoie (Haute-): BOURNE, 1977. — Allemagne, Belgique, Europe. **Habitat.** Grotte: BOURNE, 1977; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1926.

*Porrhomma obtitum* (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Loiret: LEDOUX & al., 2002. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Islande. **Habitat.** Bord de rivière, carex: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000.

*Porrhomma pygmaeum* (Blackwall, 1834)

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1884a. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1884a. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884a. Corse: SIMON, 1884a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: MANACH, 1995. Gers: SIMON, 1884a. Gironde: DENIS, 1952a; SIMON, 1884a. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Marne: SIMON, 1884a. Nord: DENIS, 1955b; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a. Orne: ASSELIN, 1990. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1884a. Vendée: DENIS, 1941, 1968a. Yonne: SIMON, 1884a. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de l'eau: SIMON, 1884a. Bord de l'eau, mousses et herbes: SIMON, 1926. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de ruisseau: DENIS, 1941. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Forêt, bord d'étang; forêt, herbes sèches: DENIS, 1950a. Maison: DENIS, 1968a. Marécage: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Mousses humides: SIMON, 1884a. Nids de taupes: DENIS, 1967d. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Terrier de taupe: SIMON, 1926. Tourbière: EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1952a. Février: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a, 1968a. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1950a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1952a. Février: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a, 1952a, 1967d. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1941, 1950a; EMERIT & al., 1999. Septembre: EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003.

***Porrhomma rosenhaueri*** (L. Koch, 1872)*P. subterranea*; *P. subterraneum*.

**Taxonomie.** La synonymie *P. subterraneum* Simon, 1884 = *P. rosenhaueri* est établie par HEIMER & al., 1991. **Répartition.** Ain, Aisne: SIMON, 1926 (*P. subterranea*). Alpes (Hautes-): SIMON, 1884a (*P. subterraneum*), 1926 (*P. subterranea*). Alpes-de-Haute-Provence: JEANNEL, 1926 (*P. subterraneum*); PEYERIMHOFF, 1906 (*P. subterraneum*). Ardèche: BALAZUC & al., 1952 (*P. subterraneum*). Ariège: JEANNEL, 1926; SIMON, 1910. Doubs: FAGE, 1931 (*P. subterraneum*). Marne (Haute-): DENIS, 1958b (*P. subterraneum*). Meurthe-et-Moselle: REMY, 1927 (*P. subterranea*), 1932b (*P. subterranea*); SIMON, 1926 (*P. subterranea*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Habitat.** Galerie souterraine: SIMON, 1926. Grotte: BALAZUC & al., 1952; DENIS, 1958b; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; PEYERIMHOFF, 1906; REMY, 1927, 1932b; SIMON, 1910, 1926. Sous des blocs de rochers: SIMON, 1926. Sous des grosses pierres: SIMON, 1884a. **Période.** — *Femelle.* Mai: REMY, 1927, 1932b. Octobre: DENIS, 1958b.

*Prinerigone* (voir *Erigone*)***Saaristoa abnormis*** (Blackwall, 1841)*Oreonetides a.*; *Tmeticus a.*

**Répartition.** Ain: DRESCO & al., 1975 (*O. a.*); SIMON, 1884a (*T. a.*). Aisne: SIMON, 1884a (*T. a.*), 1887b (*T. a.*). Ardennes: DRESCO & al., 1968 (*O. a.*). Ariège: DENIS, 1959a (*O. a.*), 1960a (*O. a.*), 1961b (*O. a.*), 1967d (*O. a.*); DRESCO, 1962 (*O. a.*); DRESCO & al., 1968 (*O. a.*); JEANNEL, 1926 (*O. a.*); SIMON, 1884a (*T. a.*), 1911 (*O. a.*). Aube: SIMON, 1884a (*T. a.*). Aude: DENIS, 1967d (*O. a.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*O. a.*); SIMON, 1884a (*T. a.*). Cantal: SIMON, 1884a (*T. a.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1884a (*T. a.*). Finistère: ASSELIN, 1990; DENIS, 1938a (*O. a.*); MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1960a (*O. a.*), 1967d (*O. a.*); DRESCO, 1947a (*O. a.*); DRESCO & al., 1968 (*O. a.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979 (*O. a.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984 (*O. a.*). Lot: FAGE, 1931 (*O. a.*). Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963c (*O. a.*); DRESCO, 1959a (*O. a.*). Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a (*O. a.*), 1963c (*O. a.*); DRESCO, 1962 (*O. a.*). Morbihan: ASSELIN, 1990. Nord: EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a (*T. a.*). Orne: ASSELIN, 1990; SIMON, 1884a (*T. a.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*O. a.*); DENIS, 1951c (*O. a.*), 1959a (*O. a.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1953b (*O. a.*), 1957a (*O. a.*), 1959d (*O. a.*); DRESCO & al., 1968 (*O. a.*); FAGE, 1931 (*O. a.*); SIMON, 1884a (*T. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987 (*O. a.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (*O. a.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (*O. a.*); CHRISTOPHE & al., 1977 (*O. a.*); COCQUEMPOT & al., 1991 (*O. a.*); SIMON, 1884a (*T. a.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984 (*O. a.*), 1989 (*O. a.*); DOIGNON, 1976 (*T. a.*); SIMON, 1884a (*T. a.*), 1898b (*T. a.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*T. a.*). Vendée: DENIS, 1964b (*O. a.*). — Presque toute la France: SIMON, 1929 (*O. a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987).

**Habitat.** Bois: DENIS, 1959d. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière: DRESCO & al., 1968. Carrière souterraine: DRESCO, 1959a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Forêt: DENIS, 1938a, 1967d; ROSELLE, 1891. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et hêtres humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1951c. Forêt, entrée de grotte; forêt, litière; forêt, litière et mousses: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976; SIMON, 1929. Friche: PASQUET & al., 1992. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DENIS, 1967d; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968, 1975; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1911, 1929. Grotte, à l'entrée: DENIS, 1959a. Lande sèche: CANARD, 1979. Litière: DENIS, 1967d. Marécage: DENIS, 1938a. Mine: DENIS, 1959a; DRESCO, 1962. Mousses: DENIS, 1967d. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mars: DRESCO, 1959a. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1959a, 1964b. Juillet: DRESCO & al., 1968. Décembre: DENIS, 1961b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1960a; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968. Février: DENIS, 1953b. Juin: DENIS, 1938a, 1959a, 1967d; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1957a, 1959d, 1967d; DRESCO & al., 1975. Septembre: DENIS, 1951c, 1967d. Octobre: DENIS, 1967d; DRESCO & al., 1968. Décembre: DENIS, 1961b, 1967d; DRESCO, 1962.

***Saaristoa firma*** (O. P.-Cambridge, 1905)*Oreonetides firmus*.

**Répartition.** Jura, Savoie (Haute-): SIMON, 1929 (*O. f.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Forêt, mousses: SIMON, 1929.

***Saloca dicerus*** (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926. Ariège: DENIS, 1960a, 1967d. Nord: DENIS, 1960a, 1961a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1960a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois, litière: DENIS, 1960a. Forêt: DENIS, 1961a, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1960a. — *Femelle.* Mars, mai: DENIS, 1960a. Septembre, novembre: DENIS, 1967d.

***Satilatlas britteni*** (Jackson, 1913)*Maso serratipes*.

**Répartition.** Seine, Somme: SIMON, 1918 (*M. s.*), 1926 (*M. s.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Habitat.** Marécage; tourbière: SIMON, 1926.

*Sauron* (voir *Metopobactrus*)***Savignia frontata*** Blackwall, 1833*Savignya f.*

**Répartition.** Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1942 (*S. f.*), 1943, 1946 (*S. f.*). Eure: EMERIT & al., 2003 (*S. f.*). Finistère: MANACH, 1995. Loire-Atlanti-



que: SIMON, 1926 (*S. f.*). Nord: DENIS, 1943a (*S. f.*), 1943d (*S. f.*), 1955a (*S. f.*). Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Seine-Maritime: CORNIC, 1977 (*S. f.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois calcicole de hêtres; coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Marais, détritiques: GUIBÉ, 1943. Marais, sous des roseaux couchés: DENIS, 1943d. Marécage: DENIS, 1943a; EMERIT & *al.*, 2003; GUIBÉ, 1942; SIMON, 1926. Prairie: CORNIC, 1977. Tourbière: GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle.* Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mars: GUIBÉ, 1942. Juin: SIMON, 1926. Octobre: DENIS, 1943d; GUIBÉ, 1943. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003; GUIBÉ, 1943. — *Femelle.* Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mars: GUIBÉ, 1942. Mai: DENIS, 1943a; EMERIT & *al.*, 2003. Septembre: EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: DENIS, 1943d; GUIBÉ, 1943. Novembre: DENIS, 1943d; EMERIT & *al.*, 2003; GUIBÉ, 1943.

### *Savignia fronticornis* (Simon, 1884)

#### *Delorhipis f.*

**Taxonomie.** Le nom *Savignia fronticornis* (Simon, 1884) est adopté ici, la synonymie du genre *Delorhipis* avec le genre *Savignia* étant établie par WUNDERLICH, 1994c. **Répartition.** Hérault: EMERIT, 2002 (*D. f.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1884b (*D. f.*), 1926 (*D. f.*). — Espagne. Méditerranée. **Habitat.** Buissons de buis: SIMON, 1884b. Garrigue, pelouse à *Brachypodium*: EMERIT, 2002. **Période.** — *Mâle.* Octobre: EMERIT, 2002.

### *Savignia superstes* Thaler, 1984

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): THALER, 1984. — Connue seulement de France. **Altitude.** 3290 m (THALER, 1984). **Habitat.** Éboulis: THALER, 1984. **Période.** — *Mâle.* Septembre: THALER, 1984. — *Femelle.* Septembre: THALER, 1984.

### *Sciastes carli* (Lessert, 1909)

#### *Halorates reprobis* [err.].

**Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b [*Halorates reprobis*, err. selon LEDOUX & *al.*, 1996c], 1996c. — Italie, Suisse, Autriche. **Altitude.** De 2340 m (LEDOUX & *al.*, 1996c) jusqu'à 2380 m (LEDOUX & *al.*, 1996b). **Période.** — *Femelle.* Août: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c.

### *Scotargus pilosus* Simon, 1913

#### *Gongyliidiellum bihamatum*; *Macrargus strandi*.

**Taxonomie.** La situation des espèces *Scotargus pilosus* Simon, 1913 et *Collinsia inerrans* (O. P.-Cambridge, 1885) est un peu confuse. SIMON, 1926 a confondu les deux espèces sous le nom *S. inerrans*. Cependant, DENIS, 1965e, examinant la collection Simon, indique la répartition suivante pour *S. pilosus*: Alpes-Maritimes, Mont Pommier; Ardèche, Mézillac; Haute-Savoie, les Contamines; cela correspond à la répartition donnée par SIMON, 1926 pour *S. inerrans*, à l'exception d'une localité de Haute-Savoie (St Gervais), récolte d'un spécimen mâle déjà citée par SIMON, 1915b sous le nom *Gongyliidiellum bihamatum* (= *Scotargus pilosus*). **Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b (*M. s.*), 1996c; SIMON, 1915b (*G. b.*). — Allemagne,

Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois de conifères, mousses: SIMON, 1915b. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Août: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c.

### *Scotinotylus alpinus* (L. Koch, 1869)

#### *S. alpigena*; *Scotynotylus alpigena*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*S. a.*), 1926 (*Scotynotylus a.*). — Italie, Suisse (*S. a.*). Paléarctique (*S. a.*).

### *Scotinotylus antennatus* (O. P.-Cambridge, 1875)

#### *Scotynotylus a.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b, 1926 (*S. a.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*S. a.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 2000 m (SIMON, 1884b, 1926). **Habitat.** Près des glaciers et des névés, sous les pierres: SIMON, 1884b. Sous les pierres près des glaciers: SIMON, 1926.

### *Scotinotylus provincialis* Denis, 1949

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Var: DENIS, 1949c. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1949c.

### *Silometopus ambiguus* (O. P.-Cambridge, 1905)

**Répartition.** Calvados: DENIS, 1963f. Finistère: MANACH, 1995. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Manche: PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: CANARD, 1990a. Vendée: DENIS, 1964b. — Grande-Bretagne. Europe. **Habitat.** Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Marécage: DENIS, 1963f. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. **Période.** — *Femelle.* Juin: DENIS, 1964b.

### *Silometopus curtus* (Simon, 1881)

*Cnephalocotes c.*; *Erigone curta*; *S. nitidithorax* [err.].

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c [*S. nitidithorax*, err. selon DENIS, 1963f], 1963f; SIMON, 1881c (*E. c.*), 1884b (*C. c.*), 1926. Manche: CANARD, 1990a. — Allemagne, Belgique, Espagne. Europe. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre; dune; marais salant; marais saumâtre; sables à coquilles, sous les salicornes: DENIS, 1950c. *Salicornietum*: DENIS, 1963f. **Période.** — *Mâle.* Novembre: DENIS, 1963f. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Novembre: DENIS, 1963f.

### *Silometopus elegans* (O. P.-Cambridge, 1872)

#### *Erigone e.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Finistère: CANARD, 1990a. Gironde: DENIS, 1951b, 1952a. Lozère: SIMON, 1926. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. e.*). [Les citations de l'Isère et de la Seine par SIMON 1884b, sous *Cnephalocotes e.*, sont erronées selon SIMON, 1926, et se rapportent à *C. interjectus* (= *S. reussi*)]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse.



Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2310 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Friche: PASQUET & al., 1992. Herbes très humides: DENIS, 1948b. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 1996a; PASQUET & al., 1992. Tourbière: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Femelle.* Mars: DENIS, 1952a. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1948b; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: DENIS, 1951b.

*Silometopus nitidithorax* (Simon, 1914)

*Cnephlocotes n.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Ardèche: SIMON, 1915b (*C. n.*), 1926. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. [La citation des Bouches-du-Rhône par DENIS, 1950c est erronée selon DENIS, 1963f, et se rapporte à *S. curtus*]. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a. Novembre: SIMON, 1915b.

*Silometopus reussi* (Thorell, 1871)

*Cnephlocotes elegans* [err.]; *S. laesus*.

**Répartition.** Calvados: DENIS, 1943e; GUIBÉ, 1946. Finistère: MANACH, 1995. Isère: SIMON, 1884b [*Cnephlocotes elegans*, err. selon SIMON, 1926], 1926. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire: SIMON, 1926. Morbihan: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*S. l.*). "Seine": SIMON, 1884b [*Cnephlocotes elegans*, err. selon SIMON, 1926], 1926. Vienne (Haute-): SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1948b). **Habitat.** Fumier de couches: SIMON, 1884b. Marais, dans des détritiques: DENIS, 1943e. Sous des lichens: SIMON, 1884b. Sous une pierre: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1948b. Décembre: DENIS, 1943e. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1948b. Décembre: DENIS, 1943e.

*Silometopus tenuispinus* Denis, 1949

*S. tenuispina.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b (*S. t.*). — Espagne. **Altitude.** 2000 m (DENIS, 1961b). **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1961b.

*Sintula corniger* (Blackwall, 1856)

*Micryphantes c.*; *S. cornigera.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884b, 1926. Charente: SIMON, 1926. Cher: DENIS, 1943b (*S. c.*). Corrèze: LE PERU, 2004 (*S. c.*). Doubs: SIMON, 1926. Eure: EMERIT & al., 2003 (*S. c.*). Finistère: ASSELIN, 1990; MANACH, 1995. Gard, Garonne (Haute-): DENIS, 1967b. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990; CANARD, 1979 (*S. c.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002 (*S. c.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ASSELIN, 1990. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Orientales:

BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Rhône: SIMON, 1926. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*M. c.*), 1910 (*M. c.*); SIMON, 1926. "Seine": SIMON, 1926. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b, 1926. [La citation de Vendée par DENIS, 1947b est erronée selon DENIS, 1967b, et se rapporte à *S. retroversus*]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord d'étang; bord de rivière: SIMON, 1926. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de pins, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Herbes et litière: DENIS, 1943b. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marais salant: SIMON, 1926. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: SIMON, 1884b. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Ripisylve: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Janvier: LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1967b; LE PERU, 2004. Mars: LE PERU, 2004. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Décembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Février: DENIS, 1967b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Mars: LE PERU, 2004. Avril: LEDOUX & al., 1996a, 2002. Mai: LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1943b; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: LE PERU, 2004.

*Sintula diceros* Simon, 1926

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1943c; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1926. — Connue seulement de France. **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: SIMON, 1926. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1943c. Décembre: DENIS, 1933b.

*Sintula retroversus* (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone retroversa*; *Microneta retroversa*; *S. cornigera* [err.].

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DENIS, 1967b; SIMON, 1884b (*M. r.*), 1926. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c, 1967b; SIMON, 1926. Corse: SIMON, 1884b (*M. r.*), 1926. Gard: LEDOUX, 2000. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Oise: SIMON, 1884b (*M. r.*), 1926. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995. "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. r.*); SIMON, 1884b (*M. r.*), 1926. Seine-et-Marne, Var, Vaucluse: SIMON, 1884b (*M. r.*), 1926. Vendée: DENIS, 1946b, 1947b [*S. cornigera*, err. selon DENIS, 1967b], 1962b, 1962d, 1963c, 1964b. — Italie. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1964b. Bord de canal: DENIS, 1950c. Bord de cultures, herbes: DENIS, 1933b. Cultures, détritiques secs: SIMON, 1926. Dune: DENIS, 1962b, 1964b. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, herbes fraîches: DENIS, 1962d. Forêt, sous des pierres: DENIS, 1947b. Lieux cultivés, détritiques secs: SIMON, 1884b. *Populetum albae*, litière; *Populetum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Prairie, au sol: LEDOUX & al., 1999b. Sous une pierre; vigne abandonnée, *Helichrysum*: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.*

Mars : DENIS, 1967b. Octobre : DENIS, 1962b. Novembre : LEDOUX, 2000 ; LEDOUX & al., 1999b. Décembre : DENIS, 1962b. — *Femelle*. Mars : DENIS, 1933b, 1964b, 1967b. Avril : DENIS, 1946b, 1962d, 1964b. Mai : DENIS, 1950c. Octobre : DENIS, 1962b, 1963c. Novembre : LEDOUX, 2000 ; LEDOUX & al., 1999b. Décembre : DENIS, 1962b.

*Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758)

*Linyphia lineata*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1965. Calvados : GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corrèze : LE PÉRU, 2004. Corse : SIMON, 1884a (*L. l.*). Côtes-d'Armor : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*L. l.*) ; SIMON, 1909a (*L. l.*). Finistère : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1939a ; MANACH, 1995. Gard : LEDOUX, 2000. Ille-et-Vilaine : ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924 (*L. l.*) ; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan, Orne : ASSELIN, 1990. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Bas-) : DENIS, 1950a. "Seine" : PLANET, 1905 (*L. l.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*L. l.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*L. l.*). Somme : ROSELLE, 1887 (*L. l.*). Var : DENIS, 1934a. Vaucluse : LEDOUX, 2000. Vendée : CLARK & al., 1970. — Toute la France : SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de chênes : EMERIT & al., 1997. Clôture : BRAUD & al., 2005. Détrit : SIMON, 1884a. Dune : LEDOUX & al., 1999a. Formation à bruyères et genévriers : LEDOUX & al., 1995. Forêt : LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-verts : LEDOUX & al., 2003. Forêt, clairière : DOIGNON, 1976. Friche : VEILLON, 1997. Jardin : LE PÉRU, 2004. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Littoral, dans la végétation sèche : CLARK & al., 1970. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Marécage : BELIN, 2001 ; LANCELEVÉE, 1884 ; ROSELLE, 1887 ; SIMON, 1929. Mous-ses : SIMON, 1884a. Pelouse : BERLAND, 1924. *Popule-tum albae*, pelouse : LEDOUX, 2000. Prairie : LEDOUX & al., 1996a, 2002. Prairie en friche, mousses : LE PÉRU, 2004. Prairie humide : SIMON, 1929. Ripisilve : LEDOUX, 2000 ; LEDOUX & al., 2002. *Salicornietum* : BIGOT, 1965. Sous une pierre : EMERIT & al., 1997 ; SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle*. Janvier : LE PÉRU, 2004. Février : DENIS, 1933b ; LE PÉRU, 2004. Avril : VEILLON, 1997. Juillet : LEDOUX & al., 2003. Octobre : LEDOUX, 2000 ; LEDOUX & al., 2002. Novembre : LE PÉRU, 2004. Décembre : DENIS, 1933b ; LE PÉRU, 2004. — *Femelle*. Février : DENIS, 1933b ; LE PÉRU, 2004. Avril : CLARK & al., 1970 ; LEDOUX & al., 1996a ; VEILLON, 1997. Mai : LEDOUX & al., 1996a. Juin : EMERIT & al., 1997 ; VEILLON, 1997. Juillet : DENIS, 1938a. Octobre : LEDOUX & al., 2002. Novembre : LEDOUX, 2000. Décembre : DENIS, 1933b ; LE PÉRU, 2004.

*Styloctetor romanus* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Ceratinopsis romana* ; *Erigone inuncans* ; *S. inuncans* ; *S. inuncus* ; *Styloctetor r.*

**Répartition.** Ardèche : SIMON, 1926. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c ; KABOUCHÉ & al., 1997 ; SIMON,

1884b (*S. inuncans*), 1926. Corse : CANARD, 1989 (*C. r.*) ; SIMON, 1884b (*S. inuncans*), 1926. Finistère : DENIS, 1939a, 1939a (*S. r.*) ; SIMON, 1926. Gironde, Hérault : SIMON, 1884b (*S. inuncans*), 1926. Landes, Loire-Atlantique : SIMON, 1926. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 (*S. r.*). Manche : CANARD, 1990a (*C. r.*). Marne : SIMON, 1926. Morbihan : CANARD, 1990a (*C. r.*) ; SIMON, 1884b (*S. inuncans*), 1926. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b, 1955c. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a (*C. r.*) ; DENIS, 1933b (*S. r.*) ; LEDOUX & al., 1999a (*C. r.*) ; SIMON, 1926. Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910. Rhin (Haut-) : MULLER & al., 1895 (*S. inuncus*). Seine, Seine-et-Marne : SIMON, 1884b (*S. inuncans*), 1926. Var : BECKER, 1880 (*E. i.*) ; DENIS, 1933a (*S. r.*), 1934a (*S. r.*), 1935a ; SIMON, 1884b (*S. inuncans*), 1926. Vendée : DENIS, 1947b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c (*S. r.*). — Alsace : SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse (*C. r.*). Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2500 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Arrière-dune : LEDOUX & al., 1999a. Arrière-dune, sous des pierres : DENIS, 1964b. Bois : DENIS, 1957a. Bruyères : DENIS, 1933b. Clôture : BRAUD & al., 2005. Cultures : LESSERT, 1910 ; SIMON, 1884b, 1926. Dune : LEDOUX & al., 1999a. Forêt de pins, clairière, herbes : DENIS, 1965c. Friche sèche : SIMON, 1884b, 1926. Herbes rares sous *Tamarix anglica* : DENIS, 1962d. Marais salant : SIMON, 1926. Mousses : DENIS, 1947b. Pelouse : CANARD, 1989. Plage, oyats : DENIS, 1963c. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coc-cifera* et *Cistus albidus* : KABOUCHÉ & al., 1997. Prairie : LEDOUX & al., 1999a. Sable, herbes : DENIS, 1950c. Sous une pierre : DENIS, 1939a, 1950b, 1955c. Terrains sablonneux : LESSERT, 1910 ; SIMON, 1884b, 1926. **Période.** — *Mâle*. Février : CANARD, 1989. Avril : DENIS, 1933b. Mai : DENIS, 1934a. Juin : SIMON, 1926. Juillet : DENIS, 1939a, 1950b. Août : DENIS, 1957a. Octobre : DENIS, 1963c ; KABOUCHÉ & al., 1997. Novembre : LESSERT, 1910. — *Femelle*. Février : CANARD, 1989. Mars : DENIS, 1964b. Avril : DENIS, 1933b. Mai : DENIS, 1934a, 1950c, 1965c. Juin : DENIS, 1947b ; LEDOUX & al., 1999a. Juillet : DENIS, 1939a, 1939a, 1950b, 1955c. Septembre : DENIS, 1962d. Octobre : DENIS, 1963c ; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle avec cocon*. Mai : DENIS, 1934a.

*Syedra gracilis* (Menge, 1869)

*S. ophthalmica*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1929. Isère : DENIS, 1934d ; SIMON, 1884b (*S. o.*), 1929. Jura : SIMON, 1929. Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Pyrénées (Hautes-) : SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1967d ; SIMON, 1884b (*S. o.*), 1929. "Seine" : SIMON, 1929. Vendée : DENIS, 1962b. Vienne (Haute-) : SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois, mousses et détrit : SIMON, 1929. Bord de rivière : SIMON, 1884b. Bord de torrent : SIMON, 1929. Forêt de pins, herbes et litière : DENIS, 1962b. Friche : VEILLON, 1997. Tourbière : SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Octobre, novembre : DENIS, 1962b. — *Femelle*. Octobre : DENIS, 1962b. Novembre : DENIS, 1934d, 1962b, 1967d.

*Syedra nigrotibialis* Simon, 1884

**Répartition.** Corse: MÜLLER, 1986; SIMON, 1884b, 1929. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Forêt de *Pinus laricio*, mousses et herbes: SIMON, 1929. Forêt humide, litière: MÜLLER, 1986. Mousses: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Juin: MÜLLER, 1986. — *Femelle.* Juin: SIMON, 1884b, 1929.

*Tallusia experta* (O. P.-Cambridge, 1871)

*Centromerus expertus*; *Tmeticus expertus*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Aisne: DENIS, 1939b (*C. e.*); SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Aube: SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*C. e.*); SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Cantal: SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: MANACH, 1995 (*C. e.*). Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990 (*C. e.*). Jura: SIMON, 1929 (*C. e.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Marne (Haute-): SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Nord: DENIS, 1934c (*C. e.*), 1943d (*C. e.*); EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Orne: SIMON, 1929 (*C. e.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Bas-): LESERT, 1910 (*C. e.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (*T. e.*). "Seine": SIMON, 1884a (*T. e.*), 1929 (*C. e.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*T. e.*); SIMON, 1929 (*C. e.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929. Friche: VEILLON, 1997. Herbes humides; marais, détritus: DENIS, 1943d. Marécage: DENIS, 1934c, 1939b; EMERIT & al., 1999, 2003; ROSELLE, 1891. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mars: EMERIT & al., 1999. Octobre: DENIS, 1943d; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1929. Novembre: DENIS, 1943d; EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1934c. — *Femelle.* Janvier, mars: DENIS, 1934c. Avril: DENIS, 1939b. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999. Septembre: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 1999. Octobre: EMERIT & al., 1999. Novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1934c.

*Tapinocyba affinis* Lessert, 1907

*Colobocyba a.*

[SIMON, 1926 note sous le genre *Colocyba* (= *Tapinocyba*): «Je ne trouve rien pour distinguer la femelle de *C. affinis* de celle de *C. pallens*»]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926 (*C. a.*). Aude: MILLIDGE, 1979. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; MILLIDGE, 1979. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1926 (*C. a.*). — Allemagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** De 1000 m (MILLIDGE, 1979) jusqu'à 2100 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois de conifères, mousses: SIMON, 1926. Bord de lac; forêt de conifères; forêt de conifères, litière; litière; marécage; prairie humide: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Avril, mai, septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Tapinocyba anceps* Denis, 1948

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1948c. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle.* Décembre: DENIS, 1948c.

*Tapinocyba bisissa* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Colobocyba bisissa*; *Plaesiocraerus bisissus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Nord: SIMON, 1884b (*P. b.*), 1926 (*C. b.*). — Allemagne, Belgique, Paléarctique.

*Tapinocyba corsica* (Simon, 1884)

*Colobocyba c.*; *Plaesiocraerus corsicus*.

**Répartition.** Corse: MILLIDGE, 1975a; SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*C. c.*); TIBERGHEN & al., 1993b. — Italie. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (MILLIDGE, 1975a). **Habitat.** Bois mixte, litière: MILLIDGE, 1975a. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de hêtres, litière: MILLIDGE, 1975a. **Période.** — *Mâle.* Juin: MILLIDGE, 1975a. — *Femelle.* Juin: MILLIDGE, 1975a.

*Tapinocyba discedens* Denis, 1948

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Calvados: DENIS, 1948c. — Connue seulement de France. **Habitat.** Détritus: DENIS, 1948c. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1948c.

*Tapinocyba insecta* (L. Koch, 1869)

*Colobocyba i.*; *Erigone i.*; *Gongylidiellum vivum* [err.]; *Plaesiocraerus insectus*; *Troxochrus insectus*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1926 (*C. i.*). Aisne: SIMON, 1884b (*P. i.*), 1926 (*C. i.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. i.*); SIMON, 1884b (*P. i.*), 1926 (*C. i.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*C. i.*). Eure, Jura: SIMON, 1926 (*C. i.*). Nord: DENIS, 1934c [*Gongylidiellum vivum*, err. selon DENIS, 1937d], 1943a (*C. i.*), 1943d (*C. i.*), 1955a; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b (*P. i.*), 1926 (*C. i.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (*T. i.*); EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926 (*C. i.*). Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895 (*P. i.*). Savoie (Haute-), "Seine": SIMON, 1926 (*C. i.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*P. i.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois, mousses et détritus; bord d'étang: SIMON, 1926. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: DOIGNON, 1976; SIMON, 1926. Marécage: DENIS, 1943a; EMERIT & al., 1999. Mousses et détritus: SIMON, 1884b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1943a; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926. Août: SIMON, 1926. Octobre: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1943a. Mai: DENIS, 1943d. Juin: EMERIT & al., 1999. Août: DENIS, 1934c; SIMON, 1926. Octobre: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926.

*Tapinocyba ligurica* Thaler, 1976

**Répartition.** Vaucluse: MILLIDGE, 1979. — Italie. **Altitude.** 1500 m (MILLIDGE, 1979). **Habitat.** Litière de hêtres: MILLIDGE, 1979. **Période.** — *Mâle.* Mai: MILLIDGE, 1979. — *Femelle.* Mai: MILLIDGE, 1979.

*Tapinocyba mitis* (O. P.-Cambridge, 1882)

**Répartition.** Finistère: CANARD, 1990a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990a. Morbihan: CANARD, 1990a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. — Espagne, Grande-Bretagne. **Habitat.** Forêt d'épicéas, litière: LEDOUX & al., 1996c. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. **Période.** — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1996c.

***Tapinocyba pallens* (O. P.-Cambridge, 1872)***Colobocyba p.*; *Erigone p.*; *T. exilis*.

[SIMON, 1926 note sous le genre *Colocyba* (= *Tapinocyba*): « Je ne trouve rien pour distinguer la femelle de *C. affinis* de celle de *C. pallens* »]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884b, 1926 (*C. p.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b, 1926 (*C. p.*). Ariège: DENIS, 1961b. Aveyron: SIMON, 1884b. Calvados: GUIBÉ, 1943 (*C. p.*). Cantal: SIMON, 1884b, 1926 (*C. p.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Drôme: SIMON, 1926 (*C. p.*). Eure: SIMON, 1899, 1909a, 1926 (*C. p.*). Isère: SIMON, 1884b, 1926 (*C. p.*). Jura, Loire, Lozère: SIMON, 1926 (*C. p.*). Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*T. e.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1926 (*C. p.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1960a, 1961b. Sarthe: SIMON, 1926 (*C. p.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c; SIMON, 1926 (*C. p.*). Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884b, 1926 (*C. p.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe jusqu'à l'Arménie. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois de conifères, mousses: SIMON, 1884b. Bois de hêtres, litière: DENIS, 1948b. Détritrus: GUIBÉ, 1943. Forêt: SIMON, 1926. Forêt d'épicéas, litière: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1926. Litière: GUIBÉ, 1943. Marécage: SIMON, 1926. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Mars: GUIBÉ, 1943. Mai: LE PERU, 2004. Septembre, octobre: SIMON, 1926. Novembre: GUIBÉ, 1943. — *Femelle.* Mai: LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1948b, 1961b. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996c. Octobre: DENIS, 1960a; SIMON, 1926. Décembre: DENIS, 1961b.

***Tapinocyba praecox* (O. P.-Cambridge, 1873)***Erigone p.*

**Répartition.** Ain, Aisne, Ardennes: SIMON, 1884b, 1926. Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. p.*); SIMON, 1884b, 1926. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: SIMON, 1926. Gironde: SIMON, 1884b, 1926. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990a. Loire: SIMON, 1926. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: CANARD, 1990a. Oise: SIMON, 1884b, 1926. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhône: SIMON, 1926. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & *al.*, 1977; SIMON, 1884b, 1926. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b, 1926. Vendée: DENIS, 1947b, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Détritrus: GUIBÉ, 1943. Dune: DENIS, 1962b. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & *al.*, 1977. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1947b, 1963c, 1964b. Forêt de pins, talus sablonneux: DENIS, 1962d. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976; SIMON, 1926. Haie, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mousses: SIMON, 1884b. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2002. SOUS des genêts: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle.* Février:

LEDOUX & *al.*, 1996a. Avril: DENIS, 1963c, 1964b. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre: DENIS, 1962b; SIMON, 1926. Novembre: GUIBÉ, 1943; LEDOUX & *al.*, 1996a. Décembre: DENIS, 1964b, 1967d. — *Femelle.* Février: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962d, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: DENIS, 1965c; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1947b, 1948b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: DENIS, 1962b; GUIBÉ, 1943; LEDOUX & *al.*, 1996a.

***Tapinocyba ventosa* MILLIDGE, 1979**

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; MILLIDGE, 1979. Vaucluse: MILLIDGE, 1979. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1200 m (MILLIDGE, 1979) jusqu'à 1600 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Forêt, litière: MILLIDGE, 1979. **Période.** — *Mâle.* Mai, septembre: MILLIDGE, 1979. — *Femelle.* Mai: MILLIDGE, 1979.

***Tapinocyboides pygmaeus* (Menge, 1869)**

**Répartition.** Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; DUFFEY & *al.*, 2004. Pyrénées-Orientales, Vienne (Haute-): DUFFEY & *al.*, 2004. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (DUFFEY & *al.*, 2004). **Habitat.** Champs non pâturés: DUFFEY & *al.*, 2004. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Pierres et herbes: DUFFEY & *al.*, 2004. **Période.** — *Mâle.* Avril: DUFFEY & *al.*, 2004. — *Femelle.* Mars, avril, septembre: DUFFEY & *al.*, 2004.

***Tapinopa disjugata* Simon, 1884**

**Répartition.** Corse: SIMON, 1884a, 1929. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. — Paléarctique. **Période.** — *Femelle.* Décembre: DENIS, 1933b.

***Tapinopa longidens* (Wider, 1834)**

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1884a, 1929. Côtes-d'Armor: ASSELIN, 1990. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Finistère: MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: ASSELIN, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Manche: LUCAS, 1878b. Morbihan: ASSELIN, 1990. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & *al.*, 1977. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; DOIGNON, 1976. Var: BIGOT & *al.*, 1987a. Vendée: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1770 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Arrière-dune, mousses sèches: DENIS, 1964b. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, mousses et sous les pierres: SIMON, 1929. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989. Dune: DENIS, 1963c. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & *al.*, 1977. Forêt de chênes: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de pins maritimes, détritrus: CLARK & *al.*,

1970. Forêt de pins, herbes et litière : DENIS, 1962b. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Jardin, détritiques humides : DENIS, 1965c. Marécage : DENIS, 1962b. Prairie : LEDOUX & al., 1999a. Prairie rase : LEDOUX & al., 1996a. Ripisilve : LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre : LUCAS, 1878b. **Période.** — *Mâle*. Juin, août, novembre : DENIS, 1962b. — *Femelle*. Janvier : DENIS, 1933b, 1962b. Avril : LEDOUX & al., 1996a. Juin : DENIS, 1962b. Août : DENIS, 1962b, 1964b ; LUCAS, 1878b. Septembre : CLARK & al., 1970 ; EMERIT & al., 1997 ; LEDOUX & al., 1996a. Octobre : DENIS, 1962b ; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre : DENIS, 1962b, 1965c ; LEDOUX & al., 1996a. Décembre : DENIS, 1964b.

**Taranucus setosus** (O. P.-Cambridge, 1863)

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Aube : SIMON, 1884a, 1929. Calvados : SIMON, 1929. Côtes-d'Armor : ASSELIN, 1990. Finistère : ASSELIN, 1990 ; DENIS, 1938a ; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine : ASSELIN, 1990. Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Morbihan : ASSELIN, 1990. Nord : EMERIT & al., 1999. Orne : ASSELIN, 1990. Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1884a, 1929. Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992. "Seine" : SIMON, 1929. Somme : DENIS, 1946b. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Forêt : SIMON, 1929. Friche : PASQUET & al., 1992 ; VEILLON, 1997. Lande : VEILLON, 1997. Marais, à la base des roseaux et dans les *Sphagnum* : SIMON, 1929. Marécage : DENIS, 1938a, 1946b ; VILLEPOUX, 1990b. Marécages, à la base des roseaux : SIMON, 1884a. Tourbière : EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Avril : VEILLON, 1997. Septembre : DENIS, 1946b. Octobre : EMERIT & al., 1999. — *Femelle*. Juin : DENIS, 1938a.

*Tenuiphantes* (voir *Lepthyphantes*)

**Theonina cornix** (Simon, 1881)

*Bathyphantes mastodon* ; *Theonoe* c.

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1929. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1884a (*B. m.*), 1929. Ardèche : SIMON, 1929. Aube : SIMON, 1884a (*B. m.*), 1929. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1949c ; SIMON, 1929. Charente : SIMON, 1929. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*B. m.*) ; SIMON, 1884a (*B. m.*), 1929. Gard : SIMON, 1929. Gironde : SIMON, 1881a (*T. c.*), 1929. Isère : SIMON, 1884a (*B. m.*), 1929. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; DENIS, 1933b ; LEDOUX & al., 1996a, 2003 ; SIMON, 1884a (*B. m.*), 1929. "Seine" : SIMON, 1884a (*B. m.*), 1929. Seine-et-Marne : SIMON, 1881a (*T. c.*), 1929. Var : SIMON, 1884a (*B. m.*), 1898c (*B. m.*), 1929. Vendée : DENIS, 1941, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1280 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de chênes, litière : EMERIT & al., 1997. Bois de conifères, sous les pierres ou dans les détritiques secs : SIMON, 1884a. Bois de hêtres, chênes et charmes : EMERIT & al., 1997. Bruyères, genévriers : SIMON, 1929. Champ : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de bouleaux et de hêtres : BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères, détritiques secs et sous les pierres : SIMON, 1929. Forêt de pins, litière : DENIS, 1964b. Forêt de pins, mousses épaisses : DENIS, 1965c.

Forêt, bruyères et genévriers : SIMON, 1881a. Garrigue : DENIS, 1949c. Herbes sèches : DENIS, 1933b. Lande à genêts, sous les pierres : LEDOUX & al., 1996a. Mousses : DENIS, 1933b. Pelouse à *Brachypodium* : LEDOUX & al., 1996a. Prairie : LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Janvier, février : SIMON, 1929. Avril : LEDOUX & al., 1996a. Mai : DENIS, 1933b, 1965c. Juin : DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 1997. Novembre : LEDOUX & al., 2003. — *Femelle*. Janvier, février : SIMON, 1929. Mai : DENIS, 1965c ; LEDOUX & al., 1996a. Juin : DENIS, 1933b, 1941, 1949c ; EMERIT & al., 1997 ; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1964b. Septembre : EMERIT & al., 1997.

**Thyreosthenius biovatus** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone biovata* ; *Peponocranium biovatum*.

**Répartition.** Calvados : GUIBÉ, 1946. Gard : SIMON, 1926. Morbihan : CANARD, 1990a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; SIMON, 1926. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. b.*) ; SIMON, 1884b (*P. b.*), 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Forêt : SIMON, 1926. Forêt, dans des fourmilères de *Formica rufa* : LANCELEVÉE, 1884. Fourmilères de *Formica rufa* : SIMON, 1884b. Terrain vague : BOSMANS & al., 1985a.

**Thyreosthenius parasiticus** (Westring, 1851)

*Plaesiocraerus becki* ; *T. becki* ; *Troxochrus sulcatus*.

**Taxonomie.** La synonymie *Thyreosthenius sulcatus* (Simon, 1926, de *Troxochrus*) = *T. parasiticus* est établie par MILLIDGE, 1977b. **Répartition.** Ain, Aube, Calvados : SIMON, 1884b (*P. b.*), 1926 (*T. b.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Finistère : DENIS, 1938a (*T. b.*). Ille-et-Vilaine : CANARD, 1990a. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. "Seine" : DRESKO, 1957a (*T. b.*) ; SIMON, 1884b (*P. b.*), 1926 (*T. b.*), 1926 (*T. s.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Habitat.** Bois, mousses et détritiques ; cave ; détritiques de potager : SIMON, 1926. Galerie souterraine : DRESKO, 1957a. Jardin : SIMON, 1926. Maison : LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Novembre : LE PERU, 2004. — *Femelle*. Mars : DRESKO, 1957a. Juin : DENIS, 1938a.

**Tiso aestivus** (L. Koch, 1872)

*T. morosus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1884b (*T. m.*), 1926 (*T. m.*). Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1953a. — Alpes du Dauphiné : SIMON, 1926 (*T. m.*). Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Holarctique. **Altitude.** 2780 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Sous une pierre : DENIS, 1953a. **Période.** — *Mâle*. Août : DENIS, 1953a. — *Femelle*. Août : DENIS, 1953a.

**Tiso vagans** (Blackwall, 1834)

**Répartition.** Aisne : SIMON, 1884b. Alpes (Hautes-) : MÜLLER, 1985 ; SIMON, 1884b. Aube : SIMON, 1884b. Calvados : ASSELIN & al., 1989 ; GUIBÉ, 1946 ; SIMON, 1884b. Cantal, Corse : SIMON, 1884b. Eure : EMERIT & al., 2003 ; LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1884b, 1909a. Finistère : CANARD, 1990a ; MANACH, 1995. Gironde : SIMON, 1884b. Ille-et-Vilaine : CANARD,

1990a. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Manche: PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: DENIS, 1955a. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003; SOYER, 1965. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; SIMON, 1884b. Somme: SIMON, 1884b. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987). **Habitat.** Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Dune: DENIS, 1962b. Forêt de chênes pubescents et d'érables: SOYER, 1965. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins, herbes sèches et litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière très sèche: DENIS, 1964b. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Herbes sèches: DENIS, 1948b. Litière: SIMON, 1926. Litière très sèche sous des fagots de chênes-verts: DENIS, 1963c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Marais, détritus: SIMON, 1926. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003. Mousse: SIMON, 1926. Mousse humides: SIMON, 1884b. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Prairie: BOSMANS & *al.*, 1985a; CORNIC, 1977; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & *al.*, 1987. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Sous des genêts: DENIS, 1948b. Sous les pierres en haute montagne: SIMON, 1926. Sous une pierre: DENIS, 1948b; MÜLLER, 1985; SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1965c; LEDOUX & *al.*, 1996a. Avril: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: DENIS, 1948b, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Novembre: DENIS, 1965c. — *Femelle.* Février: LEDOUX & *al.*, 1996a. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Juin: DENIS, 1948b, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: DENIS, 1948b, 1960a, 1963c; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: DENIS, 1964b. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a; MÜLLER, 1985. Novembre: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX & *al.*, 1996a.

*Tmeticus affinis* (Blackwall, 1855)

*Centromerus a.*

**Répartition.** Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*C. a.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Paléarctique. **Période.** — *Mâle.* Janvier: LESSERT, 1910.

*Trachelocamptus derisor* (Simon, 1918)

*Acartauchenius d.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1918, 1926. — Connue seulement de France.

*Trachelocamptus indicator* Simon, 1884

*Thaumatocnus i.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1884b (*T. i.*), 1926 (*T. i.*). — Algérie, Tunisie. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre: SIMON, 1926. Bord des eaux saumâtres: SIMON, 1884b.

*Trachelocamptus nasutus* (O. P.-Cambridge, 1879)

*Acartauchenius n.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b, 1926. Ardèche: DRESKO & *al.*, 1975. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1884b, 1926. — Portugal. **Habitat.** Carrière: DRESKO & *al.*, 1975. Pentes arides, sous les pierres: SIMON, 1884b. Sous les pierres des pentes arides: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Mars: DRESKO & *al.*, 1975. Mai: SIMON, 1926. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1926.

*Trematocephalus cristatus* (Wider, 1834)

*Gongylidium cristatum.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1926. Aube: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926. Corrèze: LE PERU, 2004. Dordogne: SIMON, 1926. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997; Gironde: SIMON, 1884b (*G. c.*), 1926. Jura: SIMON, 1926. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Nord: DENIS, 1943a, 1955b. Oise: SIMON, 1926. Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; SIMON, 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne; bois de chênes; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois marécageux: SIMON, 1926. Bois, clairière, sur les buissons de chênes et d'aulnes: SIMON, 1884b. Bord d'étang, roseaux: DENIS, 1943a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Forêt, aulnes: SIMON, 1926. Jardin; lisière de forêt humide; prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1943a. Juin: EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004. Septembre: EMERIT & *al.*, 1997.

*Trematocephalus obscurus* Denis, 1950

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. — Connue seulement de France. **Habitat.** Marais saumâtre, joncs et herbes humides: DENIS, 1950c. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c.

*Trichoncoïdes pilosus* Denis, 1950

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c, 1966c. — Connue seulement de France. **Habitat.** *Salicornietum*: DENIS, 1966c. Sur *Juniperus phoenicea*: DENIS, 1950c, 1966c. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Novembre: DENIS, 1966c.

*Trichoncoïdes piscator* (Simon, 1884)

*Gongylidium p.*; *Rhaebothorax p.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884b (*G. p.*), 1926 (*R. p.*). Corse: SIMON, 1926 (*R. p.*). — Espagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Bord d'étang: SIMON, 1926.

*Trichoncus affinis* Kulczynski, 1894

**Taxonomie.** Le genre *Trichoncus* a donné lieu à de fréquentes erreurs de détermination. DENIS, 1965a fait le point sur le genre *Trichoncus*; les conclusions de ce travail sont utilisées pour les nombreuses corrections des citations des espèces *T. affinis*, *T. hackmani*, *T. saxicola*, *T. varipes* et *T. vasconicus*. La répartition de ces espèces est toutefois à prendre avec réserve, malgré ces corrections. **Répartition.** Dordogne: DENIS, 1965a. Pas-de-Calais: DENIS, 1953d, 1956, 1958a, 1961a, 1965a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Var: DENIS, 1965a. [La citation de Vendée par DENIS, 1962b est erronée selon DENIS, 1963c, et se rapporte à *T. vasconicus*]. — Alpes: SIMON, 1926. Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arbustes: DENIS, 1956. Forêt: DENIS, 1953d, 1958a, 1961a. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1953d, 1956, 1958a, 1965a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1953d, 1956, 1958a, 1965a.

*Trichoncus auritus* (L. Koch, 1869)*T. kulczynskii*.

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*T. k.*). — Allemagne, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** 1280 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Février, septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Février, avril, juin, septembre, novembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Trichoncus gibbulus* Denis, 1944

[*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1944c. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bois de chênes, litière: EMERIT & al., 1997. Herbes sèches; litière: DENIS, 1944c. **Période.** — *Femelle*. Janvier, mai: DENIS, 1944c. Juin: EMERIT & al., 1997.

*Trichoncus hackmani* MILLIDGE, 1955*T. saxicola* [err.]. *T. vasconicus* h.

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres espèces du genre *Trichoncus*. Voir la note sous *T. affinis*. **Répartition.** Cher: DENIS, 1943b [*T. saxicola*, err. selon DENIS, 1965a]. Pyrénées-Orientales, DENIS, 1965a (*T. v. h.*). [Les citations des Pyrénées-Orientales par DENIS, 1961b et de Vendée par DENIS, 1962d, sont erronées selon DENIS, 1965a, et se rapportent à *T. varipes*]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Europe centrale et du Nord. **Habitat.** Bruyères; litière de chênes: DENIS, 1943b. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1943b.

*Trichoncus helveticus* Denis, 1965

**Répartition.** Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Italie, Suisse. **Habitat.** Ripisilve, sous des pierres: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Janvier: LEDOUX, 2000.

*Trichoncus hirtus* Denis, 1965

[*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Corse: CANARD, 1989; DENIS, 1965a; TIBERGHEN & al., 1993b. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Plateau calcaire:

CANARD, 1989. **Période.** — *Femelle*. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1965a.

*Trichoncus pusillus* (Miller, 1958)*Heterotrichoncus* p.

**Répartition.** Vendée: CANARD, 1990a. — Autriche, République Tchèque, Slovaquie (*H. p.*).

*Trichoncus saxicola* (O. P.-Cambridge, 1861)*Tigellinus* s.

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres espèces du genre *Trichoncus*. Voir la note sous *T. affinis*. [DENIS, 1965a corrige de nombreuses citations faites sous le nom de *T. saxicola*, et qui se rapportent à *T. hackmani* ou à *T. varipes*. Après avoir signalé la présence de *T. saxicola* dans les îles Britanniques, il indique: «Aucune capture authentique de cette espèce, qui paraît d'ailleurs peu commune, n'a été faite sur le continent européen». Toutefois, lorsque cet auteur exprime quelque doute sur l'espèce à laquelle attribuer les citations, celles-ci sont laissées sous *T. saxicola*. Les citations sont donc à prendre avec beaucoup de réserves]. **Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*T. s.*); SIMON, 1884b (*T. s.*), 1926. Gard: SIMON, 1926. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Landes: SIMON, 1926. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1926. Oise, Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1884b (*T. s.*), 1926. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*T. s.*), 1910; SIMON, 1926. Seine-et-Marne, Vaucluse: SIMON, 1884b (*T. s.*), 1926. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1926. Forêt, lichens des troncs de hêtres: SIMON, 1926. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Jardin: LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979. Lieux très secs, sablonneux et découverts: SIMON, 1884b. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. **Période.** — *Mâle*. Mai: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Avril: LE PERU, 2004. Mai: LESSERT, 1910. Août: SIMON, 1926.

*Trichoncus scrofa* Simon, 1884*Trichonchus* s.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b, 1926. Alpes-Maritimes: DENIS, 1965a; SIMON, 1926. Ardèche: DENIS, 1965a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (*T. s.*); DENIS, 1949c, 1965a; SIMON, 1884b, 1926. Cantal: SIMON, 1884b, 1926. Charente, Drôme: SIMON, 1926. Gironde: SIMON, 1884b, 1926. Hérault, Landes: SIMON, 1926. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1884b, 1926. Tarn-et-Garonne: SIMON, 1884b, 1926. Var: DENIS, 1934a, 1939b; SIMON, 1884b, 1898c, 1926. Vaucluse: SIMON, 1884b, 1926. — Espagne, Majorque. **Habitat.** Bruyères: DENIS, 1949c. Forêt: SIMON, 1926. Garrigue à *Quercus coccoifera*: BIGOT & al., 1973. Grotte, dans la partie éclairée: DENIS, 1965a. Herbes sèches: DENIS, 1934a. Pelouse: DENIS, 1949c. Sous une pierre: DENIS, 1965a. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1949c, 1965a. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1939b, 1949c, 1965a. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1949c. Décembre: DENIS, 1933b.

*Trichoncus similipes* Denis, 1965

**Répartition.** Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. — Espagne. Portugal. **Habitat.** Prairie: LEDOUX & al., 1999b. **Période.** — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1999b.

*Trichoncus sordidus* Simon, 1884

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1884b, 1926. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Var: SIMON, 1884b, 1926. — Allemagne, Espagne, Italie. Europe. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Femelle.* Juin: SIMON, 1926.

*Trichoncus trifidus* Denis, 1965

[LEDOUX & al., 1996a indique: «Détermination douteuse; nous connaissons deux femelles comparables provenant du Gard et du Vaucluse». **Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. — Espagne. Portugal. **Habitat.** Forêt de feuillus, litière: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 1996a.

*Trichoncus varipes* Denis, 1965

*T. hackmani* [err.]; *T. saxicola* [err.].

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres espèces du genre *Trichoncus*. Voir la note sous *T. affinis*. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1965a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a [*T. saxicola*, err. selon DENIS, 1965a]. Gard: DENIS, 1965a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b [*T. saxicola*, err. selon DENIS, 1965a], 1965a. Maine-et-Loire: DENIS, 1965a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b [*T. saxicola*, err. selon DENIS, 1965a]. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c [*T. saxicola*, err. selon DENIS, 1965a]. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1961b [*T. hackmani*, err. selon DENIS, 1965a]. Vendée: DENIS, 1947b [*T. saxicola*, err. selon DENIS, 1965a], 1962d [*T. hackmani*, err. selon DENIS, 1965a], 1963c. [DENIS, 1965a indique: «Il y aurait lieu d'ajouter quelques-unes des localités citées par Simon pour son *T. saxicola*, mais qu'il n'est pas possible de répartir entre *T. varipes* et *T. vasconicus hackmani*»]. — Espagne. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2160 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Carrière, sous des pierres: DENIS, 1965a. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt, talus sablonneux, dans les herbes: DENIS, 1947b. Sous une pierre: DENIS, 1955c. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965a. Juin: DENIS, 1938a, 1947b, 1948b. Juillet: DENIS, 1955c, 1961b, 1965a. Août: DENIS, 1953b, 1965a.

*Trichoncus vasconicus* Denis, 1944

*T. affinis* [err.].

**Taxonomie.** Cette espèce a pu être confondue avec d'autres espèces du genre *Trichoncus*. Voir la note sous *T. affinis*. **Répartition.** Dordogne: DENIS, 1944c. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1965a; LEDOUX & al., 2003. Seine-et-Marne: DENIS, 1965a. Vendée: DENIS, 1962b [*T. affinis*, err. selon DENIS, 1963c], 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965a. — Espa-

gne. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: DENIS, 1963c. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, herbes sèches et litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière sur un talus sablonneux: DENIS, 1962d. Forêt de pins, litière très sèche: DENIS, 1962b. Forêt, litière et mousses humides; forêt, litière très sèche: DENIS, 1964b. Litière de chênes et de châtaigniers: DENIS, 1944c. Litière sèche: DENIS, 1965a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b, 1963c. Juin: DENIS, 1965a. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1965a. Juin: DENIS, 1944c, 1964b. Juillet: DENIS, 1963c, 1965a. Août: DENIS, 1962d, 1963c, 1964b; LEDOUX & al., 2003. Septembre: DENIS, 1964b. Octobre: DENIS, 1962b, 1963c, 1965a.

*Trichopterna cito* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Erigone blackwallii*; *Lophocarenum blackwalli*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1926. Alpes (Hautes-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. b.*); SIMON, 1884b (*L. b.*), 1926. Gironde: DENIS, 1952a; SIMON, 1884b (*L. b.*), 1926. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1926. Oise: SIMON, 1926. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1926. "Seine": SIMON, 1884b (*L. b.*), 1926. Seine-et-Marne: SIMON, 1898b (*L. b.*), 1926. Vendée: DENIS, 1946b, 1947b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1947b, 1964b. Forêt de pins, herbes sèches: DENIS, 1962d. Forêt, litière et mousses: DENIS, 1947b. Forêt, sur sol sablonneux: DENIS, 1946b. Lieux secs au pied des plantes: SIMON, 1926. Marécage: DENIS, 1952a. Mousses et lichens: SIMON, 1926. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1947b. Août: DENIS, 1946b. Septembre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1952a, 1963c. Mars: DENIS, 1964b. Juin: DENIS, 1947b; EMERIT & al., 1999. Septembre: DENIS, 1963c. Décembre: DENIS, 1964b.

*Trichopterna cucurbitina* (Simon, 1881)

*Erigone c.*; *Lophocarenum cucurbitinum*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1926. Bouches-du-Rhône: MILLIDGE, 1979; SIMON, 1881c (*E. c.*), 1884b (*L. c.*), 1926. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1926. Var: SIMON, 1881c (*E. c.*), 1884b (*L. c.*), 1926. — Espagne. **Habitat.** Bord de route, dans un tas d'herbes coupées: MILLIDGE, 1979. **Période.** — *Mâle.* Octobre: MILLIDGE, 1979. Novembre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Octobre: MILLIDGE, 1979. Novembre: SIMON, 1926.

*Trichopterna rufithorax* (Simon, 1881)

*Erigone r.*; *Lophocarenum r.*; *Ouedia r.*; *Pelecopterna r.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1881c (*E. r.*), 1884b (*L. r.*), 1926; WUNDERLICH, 1994c (*P. r.*). Var: SIMON, 1881c (*E. r.*), 1884b (*L. r.*), 1926. — Italie. Algérie (*O. r.*). **Habitat.** Lieux sablonneux: WUNDERLICH, 1994c.



*Trichopterna thorelli* (Westring, 1861)*Baryphyma t.*; *Entelecara t.*

**Répartition.** Finistère: CANARD, 1990a (*B. t.*); DENIS, 1938a (*E. t.*). Morbihan: CANARD, 1990a (*B. t.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. "Seine": SIMON, 1884b (*E. t.*), 1926 (*E. t.*). Vendée: DENIS, 1962d. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bord de l'eau: SIMON, 1884b. Bord de mare: SIMON, 1926. Bord de mer, vase sous les salicornes: DENIS, 1962d. Lande: DENIS, 1938a. Mousses humides: SIMON, 1884b. Prairie: PASQUET & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962d. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962d. Juin: DENIS, 1938a.

*Troglohyphantes balazuci* Dresco, 1953

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: DRESKO, 1953. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DRESKO, 1953.

*Troglohyphantes caecus* Fage, 1919*T. caecus.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DRESKO, 1953 (*T. c.*), 1962 (*T. c.*); DRESKO & al., 1968 (*T. c.*); JEANNEL, 1926 (*T. c.*); SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: JEANNEL, 1926 (*T. c.*); SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DRESKO, 1953, 1962; DRESKO & al., 1968; JEANNEL, 1926; SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DRESKO, 1953. — *Femelle.* Juillet: DRESKO, 1953. Novembre: DRESKO, 1962.

*Troglohyphantes cerberus* (Simon, 1884)*Taranucnus c.*

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1953b, 1959a; DRESKO, 1953, 1962; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a (*T. c.*), 1907b (*T. c.*), 1929. — Espagne. **Altitude.** 550 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1953b, 1959a; DRESKO, 1953, 1962; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1907b, 1929. Mine de plomb: DENIS, 1959a. **Période.** — *Mâle.* Août: DRESKO, 1953. Septembre: DRESKO, 1962. Novembre: DENIS, 1953b. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1959a. Août, novembre: DRESKO, 1953.

*Troglohyphantes furcifer* (Simon, 1884)

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. — Espagne. **Altitude.** 300 m (BOSMANS & al., 1985a).

*Troglohyphantes henroti* Dresco, 1956

**Répartition.** Drôme: DRESKO, 1953; DRESKO & al., 1975. Isère: DRESKO, 1953. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DRESKO, 1953; DRESKO & al., 1975. **Période.** — *Mâle.* Juillet, septembre: DRESKO, 1953. — *Femelle.* Mai, juillet: DRESKO, 1953. Août: DRESKO & al., 1975. Septembre: DRESKO, 1953.

*Troglohyphantes lucifuga* (Simon, 1884)*Taranucnus l.*; *T. lucifuga.*

**Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*T. l.*), 1996c (*T. l.*); SIMON, 1929. Seine-et-Marne: DOI-

GNON, 1976 (*Taranucnus l.*). — Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1929. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 1996b.

*Troglohyphantes marqueti* (Simon, 1884)*Taranucnus m.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1959a; DRESKO, 1953, 1962; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a (*T. m.*), 1911 (*T. m.*), 1929. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d; DRESKO, 1947a, 1953, 1962; FAGE, 1931; SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b; DRESKO, 1953, 1962; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1929. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; FAGE, 1919; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a (*T. m.*), 1910 (*T. m.*), 1911 (*T. m.*), 1913 (*T. m.*), 1929. — Espagne. **Altitude.** De 550 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 1860 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois, mousses; bord de lac, roseaux: SIMON, 1929. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1953, 1962; DRESKO & al., 1968; FAGE, 1919, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1910, 1911, 1913, 1929. **Période.** — *Mâle.* Avril, mai: DRESKO, 1953. Juillet: DRESKO, 1953, 1962. Août: DRESKO, 1953. Octobre: DENIS, 1967d; DRESKO & al., 1968. — *Femelle.* Février: DRESKO, 1962. Avril: DRESKO, 1953; DRESKO & al., 1968. Mai: DRESKO, 1953. Juillet: DRESKO, 1953, 1962. Août: DENIS, 1959a; DRESKO, 1953, 1962. Octobre: DRESKO & al., 1968. Décembre: DRESKO, 1962.

*Troglohyphantes orpheus* (Simon, 1884)*Taranucnus o.*

**Répartition.** Ariège: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1910 (*T. o.*), 1911 (*T. o.*), 1929. Aude: FAGE, 1919, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a (*T. o.*), 1929. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1907b (*T. o.*). Pyrénées-Orientales: JEANNEL, 1926; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1913 (*T. o.*), 1929. — Bulgarie. **Altitude.** 1250 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Grotte: FAGE, 1919, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1884a, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1929. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Troglohyphantes phragmitis* (Simon, 1884)*Taranucnus p.*

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1884a (*T. p.*), 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Bord d'étang: SIMON, 1929. Étang, roseaux: SIMON, 1884a. Marécage: SIMON, 1929.

*Troglohyphantes pumilio* Denis, 1959

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959a. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DENIS, 1959a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1959a.

*Troglohyphantes pyrenaicus* Simon, 1907

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1913. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b, 1959a; FAGE, 1931;

JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1910, 1911, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DENIS, 1953b, 1959a; FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1929. **Période.** — *Femelle.* Septembre: DENIS, 1953b.

*Troglohyphantes rupicapra* Brignoli, 1971

**Taxonomie.** L'espèce *Troglohyphantes rupicapra* Brignoli, 1971 est citée des Alpes-Maritimes, sur un spécimen femelle, par BRIGNOLI, 1979 sous le terme «*Troglohyphantes prope rupicapra* Brignoli, 1971» avec cette observation: «malheureusement ni le mâle de cette forme (sur laquelle j'ai déjà publié en 1971 quelques remarques) ni celui de *T. rupicapra* ne sont encore connus; d'après les femelles ces deux (?) formes sont très proches de *T. vignai* Brignoli, 1971». **Répartition.** Alpes-Maritimes: BRIGNOLI, 1979a. — Italie. **Habitat.** Grotte: BRIGNOLI, 1979a. **Période.** — *Femelle.* Août: BRIGNOLI, 1979a.

*Troglohyphantes simoni* Fage, 1919

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: JEANNEL, 1926; SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: JEANNEL, 1926; SIMON, 1929.

*Troglohyphantes solitarius* Fage, 1919

**Répartition.** Lot: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1929. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: FAGE, 1931; JEANNEL, 1926; SIMON, 1929.

*Troxochrus cirrifrons* (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Nord: DENIS, 1955a. — Europe.

*Troxochrus scabriculus* (Westring, 1851)

*Erigone scabricula.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Aisne: SIMON, 1884b. Ariège: DENIS, 1967d. Calvados: GUIBÉ, 1946. Gard: LEDOUX, 2000. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: SIMON, 1884b. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1955a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a. "Seine": PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. s.*); SIMON, 1884b. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: SIMON, 1884b. Somme: ROSELLE, 1891. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b. — Presque toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1400 m (DENIS, 1959d). **Habitat.** Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, sous des pierres: DENIS, 1967d. Champ: ROSELLE, 1891. Détritiques humides: SIMON, 1884b, 1926. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, bord d'étang: DENIS, 1950a. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. *Populetum albae*, litière: LEDOUX, 2000. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 2002. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1967d. Juillet: LEDOUX, 2000. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Avril:

LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1950a; LEDOUX, 2000. Juillet: DENIS, 1959d; LEDOUX, 2000. Août: DENIS, 1962b. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000.

*Turinyphia clairi* (Simon, 1884)

*Linyphia c.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): HELSDINGEN, 1995. Alpes-Maritimes: MAURER & al., 1988; SIMON, 1884a (*L. c.*), 1929 (*L. c.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1929 (*L. c.*). — Espagne, Italie. Europe du Sud. **Altitude.** De 1800 m (HELSDINGEN, 1995) jusqu'à 2400 m (MAURER & al., 1988). **Habitat.** Forêt de mélèzes, taillis: HELSDINGEN, 1995. Parmi des gros blocs de pierres: MAURER & al., 1988. Sapins: SIMON, 1884a. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1884a. Juillet: HELSDINGEN, 1995. Août: MAURER & al., 1988. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1884a. Juillet: HELSDINGEN, 1995. Août: MAURER & al., 1988.

*Typhochrestus alticola* Denis, 1953

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. — Connue seulement de France. **Altitude.** 2790 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Formation à chênes-verts; forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Sous une pierre: DENIS, 1953a. **Période.** — *Mâle.* Août: DENIS, 1953a.

*Typhochrestus bogarti* Bosmans, 1990

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. — Maroc. **Habitat.** Prairie: LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Mâle.* Octobre: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle.* Octobre: LEDOUX & al., 1999a.

*Typhochrestus digitatus* (O. P.-Cambridge, 1872)

*T. dorsuosus*; *Typhocraestus d.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b, 1884b (*T. d.*), 1926, 1926 (*T. d.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1884b, 1926, 1926 (*T. d.*). Finistère: MANACH, 1995 (*Typhocraestus d.*). Gironde: SIMON, 1884b (*T. d.*), 1926 (*T. d.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a (*Typhocraestus d.*). Loir-et-Cher: SIMON, 1884b, 1926. Morbihan: CANARD, 1990a (*Typhocraestus d.*); SIMON, 1884b, 1926. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1926. Var: SIMON, 1884b, 1926. Vaucluse: SIMON, 1926 (*T. d.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1964c, 1965c. [La citation du Var par DENIS, 1935a, sous le nom *T. dorsuosus*, est erronée selon DENIS, 1964c, et se rapporte à *T. simoni*]. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Bord de torrent, mousses: SIMON, 1926. Dune: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1964c. Dune, sous les tamaris: DENIS, 1965c. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964c. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Plage, oyats: DENIS, 1963c, 1964c. Touffes sèches de *Saxifraga*: SIMON, 1926. **Période.** — *Mâle.* Octobre: DENIS, 1962b, 1963c, 1964c. Novembre:

SIMON, 1926. Décembre: DENIS, 1962b, 1964c. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b, 1964b, 1964c. Octobre: DENIS, 1962b, 1963c, 1964c. Décembre: DENIS, 1962b, 1964c.

*Typhochrestus dubius* Denis, 1949

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Vendée: DENIS, 1949e. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle*. Avril: DENIS, 1949e.

*Typhochrestus simoni* Lessert, 1907

*T. dorsuosus* [err.].

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 2003. Rhône: DENIS, 1964c. Var: DENIS, 1935a [*T. dorsuosus*, err. selon DENIS, 1964c]. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-verts; prairie: LEDOUX & al., 2003. Sous une pierre: DENIS, 1935a. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DENIS, 1935a. Novembre: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle*. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

*Walckenaeria acuminata* Blackwall, 1833

**Répartition.** Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Ardenes: SIMON, 1884b. Ariège: DENIS, 1960a, 1967d; SIMON, 1884b. Aube: SIMON, 1884b. Aude: DENIS, 1967d. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1884b. Cantal, Charente: SIMON, 1884b. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1899, 1909a. Finistère: MANACH, 1995. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1967d. Gironde: SIMON, 1884b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a; SIMON, 1884b. Isère: SIMON, 1884b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1949a, 1955a; EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b. Orne: CANARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1960a; SIMON, 1884b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1884b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; SIMON, 1884b. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1884b. Somme: SIMON, 1884b. — Toute la France: SIMON, 1926. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1967d. Bois, mousses: SIMON, 1884b, 1926. Bord de torrent, mousses: DENIS, 1950b. Détritus d'inondation: SIMON, 1884b. Forêt: DENIS, 1955a; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Forêt, litière; forêt, litière et mousses: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; VEILLON, 1997. Herbes humides: DENIS, 1933b. Jardin: LE PERU, 2004. Litière: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b. Mousses: DENIS, 1933b. Mélézes, au sol: LEDOUX & al.,

1996c. Pelouse: BERLAND, 1924. Prairie: LEDOUX & al., 1996b. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Verger: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Février: EMERIT & al., 1999. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: DENIS, 1949a, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Octobre, décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1960a. Février: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1967d. Juin: DENIS, 1933b, 1967d. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a, 1967d; LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: DENIS, 1953b; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: EMERIT & al., 1999. Décembre: DENIS, 1967d; LE PERU, 2004.

*Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois de chênes, litière: EMERIT & al., 1997. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. **Période.** — *Mâle*. Septembre: EMERIT & al., 1997.

*Walckenaeria angustifrons* (Simon, 1884)

*Wideria a.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Gironde: SIMON, 1884b (*W. a.*), 1926 (*W. a.*). — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926.

*Walckenaeria antica* (Wider, 1834)

*Erigone a.*; *W. antiqua*; *Wideria a.*; *Wideria antiqua*.

**Répartition.** Ain, Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Ariège: DENIS, 1967d (*Wideria a.*). Aube: SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*Wideria a.*). Charente: SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909a (*Wideria antiqua*). Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Isère, Lot-et-Garonne: SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1955a (*Wideria a.*). Oise: SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a (*Wideria a.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b (*Wideria a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*W. antiqua*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a (*Wideria a.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; LUCAS, 1876 (*E. a.*); SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*Wideria a.*); SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*Wideria a.*); SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*Wideria a.*). Var: SIMON, 1884b (*Wideria a.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1926 (*Wideria a.*). Vendée: DENIS, 1964b (*Wideria a.*). — Toute la France: SIMON, 1926 (*Wideria a.*). Allemagne, Bel-

gique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2780 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Bois: LUCAS, 1876. Bois, mousses: SIMON, 1884b, 1926. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Éboullis: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Herbes sèches: DENIS, 1964b. Jardin: LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Mousses: DENIS, 1967d. Prairie: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous les pierres dans la haute montagne: SIMON, 1926. Tourbière: DENIS, 1950a. **Période.** — *Mâle.* Février: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Avril: DENIS, 1964b. Août: DENIS, 1953a; LEDOUX & al., 1996b. Octobre: LUCAS, 1876. — *Femelle.* Janvier: LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1953b, 1967d; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1953b. Avril: DENIS, 1964b; LE PERU, 2004. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1950a, 1964b. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1953a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX, 2000; LUCAS, 1876. Novembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000.

***Walckenaeria atrotibialis*** (O. P.-Cambridge, 1878)

*Erigone glaphyra*; *W. melanocephala*; *Wideria a.*; *Wideria melanocephala*; *Wideria melanocephalus*.

**Répartition.** Aisne, Aube: SIMON, 1881c (*E. g.*), 1884b (*Wideria melanocephalus*), 1926 (*Wideria melanocephala*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*W. a.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a (*W. melanocephala*). Eure: SIMON, 1926 (*Wideria melanocephala*). Finistère: CANARD, 1990a (*W. melanocephala*); DENIS, 1938a (*Wideria melanocephala*). Jura, Lozère: SIMON, 1926 (*Wideria melanocephala*). Maine-et-Loire: SIMON, 1926 (*Wideria melanocephala*); VEILLON, 1997. Marne: SIMON, 1926 (*Wideria melanocephala*). Morbihan: CANARD, 1990a (*W. melanocephala*). Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (*W. melanocephala*). Nord: DENIS, 1955a (*W. a.*); EMERIT & al., 1999 (*W. melanocephala*). Oise: SIMON, 1881c (*E. g.*), 1884b (*Wideria melanocephalus*), 1887a (*Wideria melanocephala*), 1926 (*Wideria melanocephala*). Orne: CANARD, 1990a (*W. melanocephala*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1926 (*Wideria melanocephala*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998 (*W. melanocephala*); PASQUET & al., 1992 (*W. melanocephala*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie: MÜLLER, 1985 (*W. melanocephala*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991 (*W. melanocephala*); SIMON, 1926 (*Wideria melanocephala*). Seine-et-Marne: SIMON, 1884b (*Wideria melanocephalus*), 1926 (*Wideria melanocephala*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (MÜLLER, 1985). **Habitat.** Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Dune: DENIS, 1950c. Forêt: SIMON, 1926. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Lande: DENIS, 1938a. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Marécage: DENIS, 1938a; SIMON, 1926. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998.

Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1938a. Juillet, août: SIMON, 1926. Septembre: MÜLLER, 1985. Octobre: SIMON, 1926.

***Walckenaeria capito*** (Westring, 1861)

*Erigone c.*; *Wideria c.*

**Taxonomie.** La synonymie *W. vidua* Wunderlich, 1970 = *W. capito* est établie par MILLIDGE, 1983. **Répartition.** Aude: SIMON, 1926 (*W. c.*). Isère: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. c.*), 1875b (*E. c.*); SIMON, 1884b, 1926 (*W. c.*). Oise: SIMON, 1884b, 1926 (*W. c.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*W. c.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c (*W. c.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": DENIS, 1946b (*W. c.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. c.*). Vendée: DENIS, 1963c (*W. c.*), 1964b (*W. c.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2450 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1952c. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Novembre: DENIS, 1946b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1964b. Juin: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1950b. Août: DENIS, 1952c, 1963c; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. Novembre: DENIS, 1946b.

***Walckenaeria corniculans*** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone c.*; *Prosopotheca c.*

**Répartition.** Ain, Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*P. c.*); SIMON, 1926 (*P. c.*). Ariège: DENIS, 1967d (*P. c.*). Aveyron: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1949c (*P. c.*). Cantal: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Côte-d'Or: HUBERT, 1964a (*P. c.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1926 (*P. c.*). Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Gard: SIMON, 1926 (*P. c.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (*P. c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Isère: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Jura, Loire: SIMON, 1926 (*P. c.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Oise: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*P. c.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (*P. c.*), 1955c (*P. c.*), 1960a (*P. c.*), 1967d (*P. c.*); SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1953b (*P. c.*); FAGE, 1931 (*P. c.*); SIMON, 1926 (*P. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b (*P. c.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a; SIMON, 1926 (*P. c.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. c.*); SIMON, 1926 (*P. c.*). "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (*P. c.*); CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1926 (*P. c.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Somme: ROSELLE, 1891 (*P. c.*). Var: SIMON, 1884b (*P. c.*), 1926 (*P. c.*). Vaucluse: SIMON, 1926 (*P. c.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 3140 m

(DENIS, 1967d). **Habitat.** Bois de chênes, litière; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois de sapins et de hêtres, mousses: SIMON, 1884b. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMPOUT & al., 1989, 1991. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: SIMON, 1926. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1987. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, détritus secs: SIMON, 1926. Forêt, litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, mousses: ROSELLE, 1891. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Grotte: FAGE, 1931; HUBERT, 1964a. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Mousses: DENIS, 1933b. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: LEDOUX & al., 1996c. Prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Prairies alpestres, sous les pierres: SIMON, 1884b. Sous une pierre: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1948b; SIMON, 1926. Taillis de chênes-verts: DENIS, 1949c. Touffe de myrtilles: DENIS, 1950b. Végétation de *Buxus*, *Rubus* et fougères: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1933b. Mai: HUBERT, 1964a. Juin: DENIS, 1954a. Juillet: DENIS, 1955c. Septembre: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: SIMON, 1926. Novembre: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1926. Décembre: DENIS, 1933b, 1967d. — *Femelle*. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1933b, 1949c, 1953b. Avril, mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1948b; EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a. Août: DENIS, 1967d. Octobre: SIMON, 1926. Novembre: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1926. Décembre: DENIS, 1933b.

***Walckenaeria cucullata* (C. L. Koch, 1836)**

*Erigone c.*; *Wideria c.*

**Répartition.** Aisne, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Aube: SIMON, 1884b (*W. c.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*W. c.*). Charente: SIMON, 1884b (*W. c.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*W. c.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*W. c.*); SIMON, 1884b (*W. c.*), 1899 (*W. c.*), 1909a (*W. c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Isère: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. c.*); SIMON, 1884b (*W. c.*). Morbihan: CANARD, 1990a; DENIS, 1938a (*W. c.*). Nord: DENIS, 1961a (*W. c.*). Oise: SIMON, 1884b (*W. c.*). Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1961b (*W. c.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a. "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (*W. c.*); CHRISTOPHE & al., 1977; SIMON, 1884b (*W. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*W. c.*); SIMON, 1884b (*W. c.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOUT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*W. c.*); SIMON, 1884b (*W. c.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*W. c.*). Vendée: DENIS, 1962b (*W. c.*), 1964b (*W. c.*), 1965c (*W. c.*). — Toute la France: SIMON, 1926 (*W. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois de pins, mousses; bois à sol argileux, mousses: SIMON, 1884b. Champ

de céréales: COCQUEMPOUT & al., 1989. Dune, sous les tamaris: DENIS, 1965c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1961a; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1891. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, herbes: DENIS, 1961a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976; LE PERU, 2004. Litière; litière de pins: DENIS, 1964b. Mousses: LEDOUX & al., 1996a. Mousses humides très épaisses: DENIS, 1964b. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1964b. Avril: LE PERU, 2004. Novembre: DENIS, 1965c. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Février: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1961a; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1961b. Novembre: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1964b.

***Walckenaeria cuspidata* Blackwall, 1833**

*Cornicularia c.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b (*C. c.*), 1926 (*C. c.*). Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1926 (*C. c.*). Cantal: SIMON, 1884b (*C. c.*), 1926 (*C. c.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*C. c.*); SIMON, 1884b (*C. c.*), 1926 (*C. c.*). Finistère: CANARD, 1990a; MANACII, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Jura, Loire, Marne: SIMON, 1926 (*C. c.*). Nord: DENIS, 1955b (*C. c.*); EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1884b (*C. c.*), 1926 (*C. c.*). Orne: CANARD, 1990a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d (*C. c.*). Rhône, Savoie (Haute-), "Seine": SIMON, 1926 (*C. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*C. c.*); SIMON, 1884b (*C. c.*), 1926 (*C. c.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes et hêtres, litière: LE PERU, 2004. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1926. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, mousses: SIMON, 1884b. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: SIMON, 1926. Prairie en friche, mousses; prairie très humide: LE PERU, 2004. Ravin, mousses: SIMON, 1884b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Février: EMERIT & al., 1999. Avril, septembre: LE PERU, 2004. Octobre: LE PERU, 2004; SIMON, 1926. Novembre: LE PERU, 2004. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Février, avril, juillet: LE PERU, 2004. Octobre: SIMON, 1926. Novembre: LE PERU, 2004.

***Walckenaeria dalmasi* (Simon, 1914)**

*Wideria d.*

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; SIMON, 1915a (*W. d.*), 1926 (*W. d.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a; MILLIDGE, 1979. — Espagne. **Altitude.** De 1250 m jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères: LEDOUX & al.,

1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: LEDOUX & al., 1996a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. **Période.** — *Mâle*. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

***Walckenaeria dulciacensis*** (Denis, 1949)

*Cornicularia d.*

**Taxonomie.** La place de l'espèce *W. dulciacensis* (Denis, 1949) dans le genre *Walckenaeria* est incertaine. Décrite sur un seul spécimen femelle, WUNDERLICH, 1972 indique à son propos: «Männchen unbekannt. Genus?» et PLATNICK, 2004 note: «uncertain placement». [Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Nord: DENIS, 1949e (*C. d.*), 1955b (*C. d.*). [La citation de DENIS, 1955b n'est probablement qu'une répétition de la citation de DENIS, 1949e]. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle*. Mars: DENIS, 1949e.

***Walckenaeria dysderoides*** (Wider, 1834)

*W. fugax*; *Wideria fugax*.

**Répartition.** Aisne: DENIS, 1939b (*Wideria f.*). Aube: SIMON, 1884b (*Wideria f.*), 1926 (*Wideria f.*). Cher: DENIS, 1943b (*Wideria f.*). Jura: SIMON, 1926 (*Wideria f.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Orne: CANARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*W. f.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*W. f.*), 1987 (*W. f.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Rhône: SIMON, 1926 (*Wideria f.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*W. f.*), 1996c (*W. f.*); SIMON, 1926 (*Wideria f.*). “Seine”: SIMON, 1884b (*Wideria f.*), 1926 (*Wideria f.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*W. f.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1987). **Habitat.** Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt, mousses: SIMON, 1926. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Lande, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996c. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996b; PASQUET & al., 1992. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Talus, mousses: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1939b. Mai: LEDOUX, 2000. Juillet: SIMON, 1926. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1943b. Juillet: LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1926. Août: LEDOUX & al., 1996b. Octobre: SIMON, 1926.

***Walckenaeria erythrina*** (Simon, 1884)

*Erigone monoceros* [err.]; *Prosopotheca e.*

**Répartition.** Corse: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b [*Erigone monoceros*, err. selon SIMON, 1926]; SIMON, 1884b (*P. e.*), 1926 (*P. e.*). — Espagne. Algérie, Maroc, Tunisie. **Habitat.** Bois de hêtres et de châtaigniers, litière sèche: SIMON, 1884b. Litière sèche de châtaigniers et de hêtres: SIMON, 1926.

***Walckenaeria furcillata*** (Menge, 1869)

*Erigone habilis*; *Tigellinus furcillatus*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1887b (*T. f.*). Alpes-de-Haute-Provence: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. h.*).

Cher: DENIS, 1943b (*T. f.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*T. f.*); SIMON, 1884b (*T. f.*), 1926 (*T. f.*). Ille-et-Vilaine, Morbihan: CANARD, 1990a. Oise: SIMON, 1887a (*T. f.*), 1926 (*T. f.*). Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. “Seine”: CHRISTOPHE, 1974 (*T. f.*); SIMON, 1884b (*T. f.*), 1926 (*T. f.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*T. f.*); SIMON, 1884b (*T. f.*), 1926 (*T. f.*). Vendée: DENIS, 1947b (*T. f.*), 1964b (*T. f.*), 1965c (*T. f.*). Vienne (Haute-): SIMON, 1926 (*T. f.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois de chênes, mousses: DENIS, 1943b. Buissons de chênes et de hêtres, litière sèche: SIMON, 1884b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de pins, clairière, herbes: DENIS, 1965c. Forêt, buissons de chênes et de hêtres: SIMON, 1926. Forêt, litière: DENIS, 1947b. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1943b; SIMON, 1926. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1947b, 1964b; EMERIT & al., 1999.

***Walckenaeria incisa*** (O. P.-Cambridge, 1871)

*Erigone polita*; *Prosopotheca i.*; *W. lugens*; *Wideria polita*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b (*P. i.*), 1926 (*P. i.*). Aube: SIMON, 1881c (*E. p.*), 1884b (*W. l.*), 1884b (*W. p.*), 1926 (*W. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1946b (*P. i.*), 1955b (*P. i.*). “Seine”: SIMON, 1926 (*P. i.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois: SIMON, 1926. Forêt, mousses épaisses: SIMON, 1881c, 1884b. Marécage: SIMON, 1926. **Période.** — *Femelle*. Avril: SIMON, 1926. Novembre: DENIS, 1946b.

***Walckenaeria kochi*** (O. P.-Cambridge, 1872)

*Cornicularia k.*

**Répartition.** Jura: SIMON, 1926 (*C. k.*). Vendée: DENIS, 1964b (*C. k.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1964b.

***Walckenaeria languida*** (Simon, 1914)

*Wideria l.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SIMON, 1915a (*W. l.*), 1926 (*W. l.*). Vaucluse: MILLIDGE, 1979; SIMON, 1915a (*W. l.*), 1926 (*W. l.*). — Italie, Suisse. Europe du Sud, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (MILLIDGE, 1979). **Habitat.** Litière de pins: MILLIDGE, 1979. **Période.** — *Mâle*. Novembre: SIMON, 1926. — *Femelle*. Mai: MILLIDGE, 1979. Novembre: SIMON, 1926.

***Walckenaeria mitrata*** (Menge, 1868)

*Erigone m.*; *Wideria m.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1884b, 1926 (*W. m.*). Aube, Eure: SIMON, 1881c (*E. m.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Oise: SIMON, 1881c (*E. m.*), 1926 (*W. m.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1881c (*E. m.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique.

que. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1926. Mousses épaisses: SIMON, 1884b.

**Walckenaeria monoceros** (Wider, 1834)

*Erigone m.*; *Prosopotheca m.*

**Répartition.** Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1926 (*P. m.*). Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935 (*P. m.*); SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Ardèche: SIMON, 1926 (*P. m.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. m.*); SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1949c (*P. m.*); SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989. Drôme: SIMON, 1926 (*P. m.*). Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère, Gironde: SIMON, 1926 (*P. m.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Landes: SIMON, 1926 (*P. m.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Nièvre: DENIS, 1943b (*P. m.*). Oise: SIMON, 1926 (*P. m.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Sarthe: SIMON, 1926 (*P. m.*). “Seine”: DENIS, 1946b (*P. m.*); SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. m.*); SIMON, 1884b (*P. m.*), 1926 (*P. m.*). Var: DENIS, 1949c (*P. m.*). Vaucluse: SIMON, 1926 (*P. m.*). Vendée: CANARD, 1990a; DENIS, 1947b (*P. m.*), 1962b (*P. m.*), 1963c (*P. m.*), 1964b (*P. m.*), 1965c (*P. m.*). [La citation de Corse par PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b, sous le nom *Erigone monoceros*, est erronée selon SIMON, 1926, et se rapporte à *Prosopotheca* (= *Walckenaeria erythrina*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe au Kirgizstan. **Altitude.** Jusqu'à 2310 m (LEDoux & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois: DENIS, 1946b. Collines arides, sous les pierres: SIMON, 1884b. Dune: DENIS, 1964b, 1965c. Foin: DENIS, 1943b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, herbes sèches: DENIS, 1947b. Forêt, mousses et détritits: SIMON, 1926. Marécage: EMERIT & al., 2003. Oyats secs: DENIS, 1963c. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre: BERLAND, 1935; DENIS, 1947b, 1963c; LEDOUX & al., 1996a. Vigne abandonnée, *Helichrysum*: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1947b. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: BERLAND, 1935. Octobre: DENIS, 1963c. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1949c. Février: DENIS, 1965c. Mai: DENIS, 1946b, 1949c, 1965c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1943b, 1947b. Octobre: DENIS, 1963c. Décembre: DENIS, 1964b.

**Walckenaeria nodosa** O. P.-Cambridge, 1873

*W. jucundissima*; *Wideria n.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b (*W. j.*), 1926 (*W. n.*). Eure: EMERIT & al., 2003. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Seine-et-Marne: DENIS, 1946b (*W. n.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bord de mare: DENIS, 1946b. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Marais, détritits: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1946b. — *Femelle.* Novembre: EMERIT & al., 2003.

**Walckenaeria nudipalpis** (Westring, 1851)

*Trachynella n.*; *Trachynotus n.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Calvados: GUIBÉ, 1943 (*Trachynella n.*), 1946 (*Trachynotus n.*).

Corrèze: LE PERU, 2004. Dordogne: SIMON, 1926 (*Trachynotus n.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926 (*Trachynotus n.*). Finistère: CANARD, 1990a; MANACH, 1995. Gironde: DENIS, 1952a (*Trachynella n.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990a. Jura, Loire: SIMON, 1926 (*Trachynotus n.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1934c (*Trachynotus n.*), 1943d (*Trachynella n.*), 1955a (*Trachynella n.*); EMERIT & al., 1999. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. “Seine”: COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000; SIMON, 1926 (*Trachynotus n.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (LEDoux & al., 1996a). **Habitat.** Bord de rivière: SIMON, 1926. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Détritits: GUIBÉ, 1943. Forêt: DENIS, 1955a; SIMON, 1926. Forêt humide, litière et mousses: LE PERU, 2004. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Lande sèche: CANARD, 1979. Marécage: DENIS, 1934c, 1952a; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926; VILLEPOUX, 1990b. Pins et rhododendrons: LEDOUX & al., 1996a. Prairie humide: LANCELEVÉE, 1884. Sous des roseaux couchés: DENIS, 1943d. Tourbière: EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle.* Janvier: GUIBÉ, 1943. Septembre: DENIS, 1934c. Octobre: SIMON, 1926. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1952a; GUIBÉ, 1943. Février: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1943d; LE PERU, 2004; SIMON, 1926. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juillet, août: LE PERU, 2004. Octobre: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1926.

**Walckenaeria obtusa** Blackwall, 1836

*Trachynella o.*; *Trachynotus obtusus.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1884b, 1926 (*Trachynotus o.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*Trachynotus o.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926 (*Trachynotus o.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Jura: SIMON, 1926 (*Trachynotus o.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Meurthe-et-Moselle: SIMON, 1926 (*Trachynotus o.*). Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1943d (*Trachynella o.*), 1955a (*Trachynella o.*). Oise, “Seine”: SIMON, 1884b, 1926 (*Trachynotus o.*). Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926 (*Trachynotus o.*). Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1884b, 1926 (*Trachynotus o.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005. Bois humides; bois, berges de petites mares: SIMON, 1884b. Bord d'étang: SIMON, 1926. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt humide, mousses: SIMON, 1926. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Marais, détritits: DENIS, 1943d. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1884b, 1926. Mousses et litière sèches: SIMON, 1884b. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Octobre: DENIS, 1943d. — *Femelle.* Avril, juin: VEILLON, 1997. Novembre: LE PERU, 2004.

**Walckenaeria pyrenaea** (Denis, 1952)

*Wideria p.*

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c (*W. p.*). —

Connue seulement de France. **Altitude.** 2120 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang, sous des pierres noyées du rivage: DENIS, 1952c. **Période.** — *Femelle.* Août: DENIS, 1952c.

***Walckenaeria stylifrons*** (O. P.-Cambridge, 1875)

*Erigone s.*; *Wideria obscuripalpis*; *Wideria s.*; *Wideria thinophila*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône: DENIS, 1964c (*W. s.*); SIMON, 1884b (*W. s.*), 1926 (*W. s.*). Corse: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875a (*E. s.*); SIMON, 1884b (*W. s.*), 1926 (*W. s.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. Var: DENIS, 1948d (*W. o.*); SIMON, 1884b (*W. s.*), 1926 (*W. s.*). Vaucluse: SIMON, 1926 (*W. s.*). Vendée: DENIS, 1962b (*W. s.*), 1963c (*W. s.*), 1963c (*W. t.*), 1964b (*W. s.*), 1964c (*W. s.*), 1965c (*W. s.*); DUFFEY, 1964 (*W. s.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 970 m (DENIS, 1964c). **Habitat.** Dune: DENIS, 1965c. Dune, oyats: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt de pins sur dune: DUFFEY, 1964. Forêt de pins, clairière, litière de chênes-verts: DENIS, 1963c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b, 1964b, 1964c. Friches sèches, sous les pierres et les touffes: SIMON, 1884b, 1926. Herbes sèches: DENIS, 1948d. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. *Salicornietum*; sous une pierre: DENIS, 1964c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1963c. Mars: DENIS, 1964c. Octobre: DENIS, 1962b, 1964c. — *Femelle.* Février: DENIS, 1964c, 1965c. Mars: DENIS, 1964b, 1964c. Avril: DENIS, 1964b. Mai: DENIS, 1948d. Juillet: DENIS, 1964b. Septembre: DENIS, 1963c. Décembre: DENIS, 1964b.

***Walckenaeria unicornis*** O. P.-Cambridge, 1861

*Cornicularia u.*; *Erigone u.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1884b (*C. u.*). Aube: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. u.*); SIMON, 1884b (*C. u.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*C. u.*); SIMON, 1884b (*C. u.*). Charente: SIMON, 1884b (*C. u.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990a. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*C. u.*); SIMON, 1884b (*C. u.*). Eure-et-Loire: SIMON, 1884b (*C. u.*). Finistère: MANACH, 1995. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Morbihan: CANARD, 1990a. Nord: DENIS, 1934c (*C. u.*), 1955b (*C. u.*); EMERIT & al., 1999. Orne: CANARD, 1990a. Pas-de-Calais: DENIS, 1956 (*C. u.*), 1961a (*C. u.*); EMERIT & al., 1999. Rhin (Bas-): DENIS, 1950a (*C. u.*); LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DENIS, 1950a (*C. u.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910; SIMON, 1884b (*C. u.*). "Seine": SIMON, 1884b (*C. u.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*C. u.*); SIMON, 1884b (*C. u.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*C. u.*). — Presque toute la France: SIMON, 1926 (*C. u.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Arbustes: DENIS, 1950a. Bois humides: SIMON, 1884b. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Éboulis: LEDOUX & al., 1996c. Forêt: DENIS, 1956, 1961a; ROSELLE, 1891. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Marais, détritit: SIMON, 1926. Marécage: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 1999; LANCELEVÉE, 1884. Mousse: SIMON, 1926. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Sous une pierre: LEDOUX

& al., 1996c. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1934c. Mai: LESSERT, 1910. Juin, septembre: EMERIT & al., 1999. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1934c. Février: EMERIT & al., 1999. Juin: DENIS, 1950a; EMERIT & al., 1999. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Septembre, octobre: EMERIT & al., 1999.

***Walckenaeria vigilax*** (Blackwall, 1853)

*Cornicularia v.*; *Erigone v.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1926 (*C. v.*). Alpes (Hautes-): SIMON, 1884b (*C. v.*), 1926 (*C. v.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: MANACH, 1995. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990a. Isère: SIMON, 1884b (*C. v.*), 1926 (*C. v.*). Jura: PICKARD-CAMBRIDGE, 1875b (*E. v.*). Loire: SIMON, 1926 (*C. v.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: CANARD, 1990a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Sarthe: SIMON, 1926 (*C. v.*). "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; SIMON, 1884b (*C. v.*), 1926 (*C. v.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*C. v.*); SIMON, 1884b (*C. v.*), 1926 (*C. v.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: SIMON, 1926. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Marécage: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1926. Prairie: SIMON, 1926. Prairie alpestre près des neiges: SIMON, 1884b. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Novembre: EMERIT & al., 2003.

TETRAGNATHIDAE

Le genre *Meta*, placé il y a peu de temps dans la famille Metidae, se retrouve à nouveau dans les Tetragnathidae, comme l'indique PLATNICK, 2004.

Les espèces *Meta mengei*, *M. merianae* et *M. segmentata* ont été transférées dans le genre *Metellina* par LEVI, 1980. Ce transfert n'est pas retenu ici, le genre *Metellina* étant considéré comme synonyme de *Meta* par certains auteurs (WUNDERLICH, 1987).

***Meta bournetii*** Simon, 1922

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DRESKO, 1957d. Ardèche: BALAZUC & al., 1952, 1954; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; SIMON, 1922, 1929. Ariège: DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1957d, 1962; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1929. Aude: DRESKO, 1962; SIMON, 1929. Aveyron: DRESKO, 1957d; DRESKO & al., 1968. Bouches-du-Rhône: LUCZACK & al., 1964. Charente: DRESKO, 1959a. Corse: DRESKO, 1957d. Dordogne: DRESKO, 1959a. Drôme: DRESKO, 1957d. Gard: DRESKO, 1957d, 1962; HUBERT, 1964a; SIMON, 1922, 1929. Garonne (Haute-): DRESKO, 1962; KERVILLE, 1935; SIMON, 1929. Gers: DENIS, 1959b; DRESKO, 1959a. Hérault: DRESKO, 1957d; LOPEZ, 1974; LOPEZ & al., 1977, 1978b, 1979, 1981, 1985; SIMON, 1922, 1929. Lot: SIMON, 1922. Lot-et-Garonne: DRESKO, 1959a, 1962. Maine-et-Loire: HUBERT, 1964a. Pyrénées (Hautes-): DRESKO, 1957d; KERVILLE, 1935. Pyrénées-



Atlantiques: DENIS, 1959a; DRESKO, 1947b, 1957d, 1962; DRESKO & al., 1968. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; DRESKO, 1957d; DRESKO & al., 1968. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1968. Saône-et-Loire: DRESKO, 1957b, 1957d. "Seine": DRESKO, 1947b; DRESKO & al., 1968. Tarn, Tarn-et-Garonne: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Var: DRESKO, 1962. Vienne: DENIS, 1958b; DRESKO, 1947b. [Selon DENIS, 1932b la citation des Pyrénées-Orientales par SIMON, 1929 est en fait *M. menardi*; DENIS, 1933b note: «*M. bourneti* E. S. citée par SIMON, 1929 de la grotte de Pouade est à rayer de la faune de cette grotte»]. — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. De l'Europe à la Géorgie, Afrique du Nord. **Habitat.** Carrière: BEAUCOURNU & al., 1963b. Carrière souterraine: DRESKO, 1947b, 1959a. Carrière, galerie souterraine: BEAUCOURNU & al., 1963b. Cave: DRESKO & al., 1968. Grotte: BALAZUC & al., 1952, 1954; BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DENIS, 1958b, 1959a, 1959b, 1967d; DRESKO, 1947b, 1957b, 1957d, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; KERVILLE, 1935; LOPEZ, 1974; LOPEZ & al., 1977, 1978b, 1979, 1981, 1985; LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1922, 1929. Mine: LOPEZ & al., 1977. Mine de cuivre: LOPEZ & al., 1981. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DRESKO, 1957b, 1957d. Juillet: DRESKO, 1957d, 1962. Août: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1959a; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a. Février: DENIS, 1958b. Mars: DRESKO & al., 1968. Avril: DRESKO, 1957d, 1959a; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Mai: DRESKO, 1962. Juin: DRESKO & al., 1968. Juillet: DRESKO, 1959a, 1962; HUBERT, 1964a. Août: DRESKO, 1957d; DRESKO & al., 1968. Octobre: DRESKO, 1957d, 1962. Novembre: DRESKO, 1959a. Décembre: DRESKO, 1957d, 1959a; DRESKO & al., 1968.

#### *Meta menardi* (Latreille, 1804)

*M. bourneti* [err.].

**Répartition.** Ain: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Alpes (Hautes-): DRESKO, 1962; SIMON, 1913. Alpes-Maritimes: BRIGNOLI, 1979a; HUBERT, 1964a; SIMON, 1907b, 1911. Alpes-de-Haute-Provence: DRESKO & al., 1975; PEYERIMHOFF, 1906. Ardèche: DRESKO & al., 1975; SIMON, 1929. Ariège: DENIS, 1953b, 1959a, 1967d; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; LUCANTE, 1880b; SIMON, 1874a, 1910, 1911. Aude: DENIS, 1967d. Aveyron: DRESKO & al., 1968. Charente: DRESKO, 1959a. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1910. Côte-d'Or: DRESKO, 1956, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990a; THOMAS, 1988. Doubs: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Drôme: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; SIMON, 1913. Finistère: ROLLARD, 1990a. Gard: SIMON, 1911, 1929. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1910. Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: DRESKO & al., 1968; MAGNÉ, 1967, 1969. Hérault: LOPEZ & al., 1978b, 1979, 1981; SIMON, 1911, 1929. Isère: DRESKO & al., 1975. Jura: DENIS, 1958b; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Loire-Atlantique: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a. Lot: VIRÉ, 1902. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; DRESKO & al., 1975. Marne (Haute-): DENIS, 1958b.

Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975. Meurthe-et-Moselle: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a; REMY, 1927, 1932b. Morbihan: DRESKO & al., 1975; ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953b; DRESKO & al., 1975. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b, 1959a; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; LUCANTE, 1880b; SIMON, 1907b, 1911. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1932b, 1933b, 1951a; DRESKO & al., 1968; SIMON, 1911, 1929 [*M. bourneti*, err. selon DENIS, 1932b]. Rhône: DRESKO & al., 1975. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1975. Savoie: BOURNE, 1974. Savoie (Haute-): DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; LESSERT, 1904, 1910. Saône (Haute-), Saône-et-Loire: DRESKO, 1959c; HUBERT, 1964a. "Seine": BERLAND, 1933. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: BERLAND, 1928; DOIGNON, 1976; DRESKO, 1943. Tarn: DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; LUCANTE, 1880b. Var: DRESKO & al., 1968. Vienne, Vosges: DENIS, 1958b. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. De l'Europe à la Corée. **Habitat.** Carrière: DRESKO & al., 1975; SIMON, 1929. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1959c; LANCELEVÉE, 1884. Cave: BERLAND, 1933; SIMON, 1929. Caves humides: SIMON, 1874a. Galerie souterraine: DRESKO & al., 1975. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963b, 1963c; BERLAND, 1928; BOURNE, 1974; BRIGNOLI, 1979a; DENIS, 1932b, 1933b, 1951a, 1953b, 1958b, 1959a, 1967d; DOIGNON, 1976; DRESKO, 1943, 1956, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; LANCELEVÉE, 1884; LESSERT, 1904, 1910; LOPEZ & al., 1978b, 1979, 1981; MAGNÉ, 1967, 1969; PEYERIMHOFF, 1906; REMY, 1927, 1932b; SIMON, 1874a, 1907b, 1910, 1911, 1913, 1929; VIRÉ, 1902. Jardin, dans un gros tas de bois humide: LE PERU, 2004. Maison: BRAUD & al., 2005. Mine: DENIS, 1967d; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968. Mine de fer: LOPEZ & al., 1981. Souterrain: THOMAS, 1988. Terriers de blaireaux et de renards: SIMON, 1929. Terriers de renard: LANCELEVÉE, 1884. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1962; HUBERT, 1964a. Février: DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; LESSERT, 1904. Mars: BERLAND, 1928; DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Avril: BERLAND, 1928; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Mai: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1975; LESSERT, 1904. Juin: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Juillet: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Août: BRIGNOLI, 1979a; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975. Septembre: DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Octobre: DENIS, 1959a; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Novembre: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Décembre: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Février: DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Mars: BERLAND, 1928; DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; REMY, 1927, 1932b. Avril: BERLAND, 1928; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al.,

1968, 1975; HUBERT, 1964a. Mai: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a; LESSERT, 1904. Juin: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Juillet: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975. Août: BRIGNOLI, 1979a; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Septembre: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Octobre: DENIS, 1958b; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Novembre: DENIS, 1953b; DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Décembre: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a.

#### *Meta mengei* (Blackwall, 1869)

*M. segmentata mengei*; *Metellina m.*

**Répartition.** Ain: DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*M. s. m.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1959c. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*M. s. m.*); ROLLARD, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1938a (*M. s. m.*); ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; DRESKO & al., 1975. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*M. s. m.*); ROLLARD, 1990a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*M. s. m.*); LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*M. m.*); VEILLON, 1997. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a. Morbihan: DENIS, 1938a (*M. s. m.*); ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000 (*M. m.*); EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (*M. s. m.*), 1960a; HUBERT, 1964a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1932b (*M. s. m.*), 1933b (*M. s. m.*); LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Saône-et-Loire: DRESKO & al., 1975. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Vaucluse: HUBERT, 1964a. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse (*M. m.*). De l'Europe à la Géorgie (*M. m.*). **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: DENIS, 1957a, 1960a, 1967e. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1938a. Bord de ruisseau: VEILLON, 1997. Bétulaie: EMERIT & al., 2003. Cavité artificielle: DRESKO & al., 1975. Clôture: BRAUD & al., 2005. Détrit: DENIS, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: ASSELIN & al., 1989; DENIS, 1938a. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes et hêtres, mousses: LE PERU, 2004. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt humide: LE PERU, 2004. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DENIS, 1932b; DRESKO, 1959a, 1959c; HUBERT, 1964a. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Lande: DENIS, 1938a; LE PERU, 2004. Maison: DENIS, 1962b. Noisetiers: LEDOUX & al., 1996a.

Prairie: DENIS, 1959d; LEDOUX & al., 1996c. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie en friche: prairie très humide: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: SIMON, 1929; VEILLON, 1997. Sur de la fougère-aigle: VEILLON, 1997. Talus: DENIS, 1959d. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1965c. Mars: DRESKO, 1959a; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b; HUBERT, 1964a; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1938a, 1962b, 1965c; DRESKO, 1959c; EMERIT & al., 2003; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; DRESKO & al., 1975; EMERIT & al., 1997, 1999. Juillet: DENIS, 1938a, 1960a; DRESKO & al., 1975; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1957a. Septembre: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DRESKO & al., 1975; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Février: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 1999. Mars: HUBERT, 1964a. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1962b, 1965c, 1967e; EMERIT & al., 2003; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b, 1954a, 1959d, 1960a; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1957a. Septembre: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003.

#### *Meta merianae* (Scopoli, 1763)

*Metellina m.*

**Répartition.** Ain: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; BRIGNOLI, 1979a; HUBERT, 1964a. Ardèche: BALAZUC & al., 1952, 1954; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; VIRÉ, 1896. Ariège: DENIS, 1959a; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; LUCANTE, 1880b. Aveyron: HUBERT, 1964a. Bouches-du-Rhône: LUCZACK & al., 1964. Calvados: GUIBÉ, 1946; KERVILLE, 1898. Charente: HUBERT, 1964a. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989. Côte-d'Or: DRESKO, 1956, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; DRESKO & al., 1975; ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; EMERIT & al., 1997. Drôme: DRESKO & al., 1975; JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Eure: SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; ROLLARD, 1990a. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a, 1967d; DRESKO, 1947a, 1962; DRESKO & al., 1968; LUCANTE, 1880b. Gers: DENIS, 1959b; LUCANTE, 1880b. Gironde: DRESKO & al., 1968; LUCANTE, 1880b; MAGNÉ, 1969. Hérault: LOPEZ, 1975; LOPEZ & al., 1977, 1979, 1985. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Isère: DRESKO & al., 1975. Jura: DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a; ROLLARD, 1990a. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; BRAUD & al., 2005 (*M. m.*); DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a; DRESKO

& *al.*, 1968. Meurthe-et-Moselle: DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975. Morbihan: BEAUCOURNU & *al.*, 1963c; DENIS, 1938a; DRESKO, 1959a, 1962; ROLLARD, 1990a. Nièvre: DRESKO, 1959c. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c, 1960a; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; KERVILLE, 1935; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1957a, 1959d; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1932b, 1933b, 1967d; JEANNEL, 1926; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1911, 1913. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Rhône: DRESKO & *al.*, 1975. Sarthe: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1975. Savoie (Haute-): DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975. Saône (Haute-): HUBERT, 1964a. Saône-et-Loire: DRESKO, 1959c; DRESKO & *al.*, 1975. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & *al.*, 1977; DRESKO, 1947c. Seine-Maritime: DRESKO & *al.*, 1968; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; DRESKO, 1943. Tarn: DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a; LUCANTE, 1880b. Tarn-et-Garonne: DRESKO & *al.*, 1968; HUBERT, 1964a; LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a, 1934a, 1935b; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1940b, 1941, 1964b, 1965c. Vosges: DRESKO & *al.*, 1968. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse (*M. m.*). De l'Europe à la Géorgie (*M. m.*). **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de canal: DENIS, 1955c. Bord de rivière, mousses: EMERIT & *al.*, 1997. Bord de ruisseau: CANARD, 1989. Bord de torrent, près d'un pont: DENIS, 1959d. Bunker: SCHALLER, 2000. Bâtiment: DENIS, 1964b, 1965c. Carrière: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b; DRESKO & *al.*, 1975. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1959c. Carrière, galerie souterraine: BEAUCOURNU & *al.*, 1963b. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Caves humides: SIMON, 1874a. Cavité artificielle: DRESKO & *al.*, 1975. Falaise humide: DENIS, 1941. Falaises maritimes, fissures: KERVILLE, 1898. Fontaine: DENIS, 1940a. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & *al.*, 1977. Forêt humide et sombre: LE PERU, 2004. Forêt, entrée de grotte; forêt, litière et mousses: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Galerie souterraine: DRESKO, 1962. Gorge humide, mousses: BOSMANS & *al.*, 1985a. Grotte: BALAZUC & *al.*, 1952, 1954; BEAUCOURNU & *al.*, 1963a, 1963b, 1963c; BRIGNOLI, 1979a; DENIS, 1932b, 1933b, 1941, 1959a, 1959b, 1967d; DRESKO, 1943, 1947a, 1956, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; KERVILLE, 1935; LANCELEVÉE, 1884; LOPEZ, 1975; LOPEZ & *al.*, 1977, 1979, 1985; LUCZACK & *al.*, 1964; MAGNÉ, 1969; SIMON, 1911, 1913; VIRÉ, 1896. Grotte, à l'entrée: SIMON, 1929. Lieu humide: DENIS, 1934a. Lieux sombres et humides: LOPEZ, 1975. Litière et mousses: EMERIT & *al.*, 1997. Littoral, grotte dans la falaise: DENIS, 1940a, 1940b. Marécage: LEDOUX & *al.*, 1996a. Mine: BEAUCOURNU & *al.*, 1963c; DENIS, 1959a; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1968. Parois de rochers très humides: SIMON, 1874a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & *al.*,

1996a. Ripisilve: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Rivière souterraine: DRESKO & *al.*, 1968. Rochers humides, anfractuosités: DENIS, 1954a. Rochers suintants, anfractuosités: DENIS, 1957a. Rochers très humides: SIMON, 1929. Sous la voûte des fontaines: SIMON, 1874a. Sous les voûtes humides: SIMON, 1929. Sous un vieux journal en plein air: DENIS, 1965c. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1967d; DRESKO, 1959a; DRESKO & *al.*, 1975. Février: DRESKO, 1959c; HUBERT, 1964a. Mars: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975. Avril: DRESKO, 1947c, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Mai: DENIS, 1934a, 1965c; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; DRESKO & *al.*, 1975; EMERIT & *al.*, 1997; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Juillet: DENIS, 1940a; DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1874a. Août: DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968; MAGNÉ, 1969. Septembre: DRESKO, 1959c; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Octobre: DRESKO, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975. Novembre: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Décembre: DRESKO, 1959c; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; HUBERT, 1964a. — *Femelle.* Janvier: BRIGNOLI, 1979a; DRESKO, 1959a; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Février, mars: DRESKO, 1959a, 1959c; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Avril: DRESKO, 1947c, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Mai: DENIS, 1934a, 1959b; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975. Juin: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; DENIS, 1938a, 1941, 1959a, 1964b; DRESKO, 1959c; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1940a, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Août: CANARD, 1989; DENIS, 1967d; DRESKO, 1943, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; MAGNÉ, 1969. Septembre: CANARD, 1989; DRESKO, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1975; HUBERT, 1964a. Octobre: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975. Novembre: DRESKO, 1959a, 1959c; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Décembre: DRESKO, 1959a, 1959c, 1962; DRESKO & *al.*, 1968, 1975; HUBERT, 1964a.

#### *Meta segmentata* (Clerck, 1757)

*Metellina s.*; *Zilla s.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: BALAZUC & *al.*, 1952; HUBERT, 1964a. Ariège: DENIS, 1960a; HUBERT, 1964a. Bouches-du-Rhône: KABOUICHE & *al.*, 1997. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d. Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989. Côte-d'Or: DRESKO, 1956. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: LUCAS, 1868 (*Z. s.*); ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Gers: LUCANTE, 1880b. Hérault: FAGE, 1931. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005 (*M. s.*); VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b. Marne: LUCAS, 1878a.

Mayenne, Morbihan: ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1979a. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1963e. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; MULLER & al., 1895. Saône (Haute-): BECKER, 1879a. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Var: BECKER, 1880; BIGOT, 1993; DENIS, 1933a, 1935b; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c, 1966a. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse (*M. s.*). Paléarctique (Canada, introduit) (*M. s.*). **Altitude.** Jusqu'à 2030 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnes: LEDOUX & al., 1996c. Bois: BRAUD & al., 2005; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: DENIS, 1952c; VEILLON, 1997. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus*: KABOUCHÉ & al., 1997. Bord de torrent, entre les blocs de rochers: DENIS, 1950b. Buissons: SIMON, 1929. Bâtiment: DENIS, 1966a. Bétulaie, herbes: EMERIT & al., 2003. Champ cultivé: LUCAS, 1868. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: ASSELIN & al., 1989; DENIS, 1960a; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1887. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de conifères; forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992. Grotte: BALAZUC & al., 1952; DRESCO, 1956; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a. Haie: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1929. Jardin: GOULLIART, 1979a; LENICE, 1992; LUCAS, 1878a; ROSELLE, 1887. Lande: LUCAS, 1870d; VEILLON, 1997. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maison: DENIS, 1963c. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Noisetiers: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Près de l'eau: SIMON, 1874a. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1963c, 1963e. Août: LEDOUX, 1993; LUCAS, 1870d, 1878a, 1878b. Septembre: DENIS, 1962b, 1963c; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Octobre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 1999. Avril: HUBERT, 1964a. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Août: CANARD, 1989; DENIS, 1952c, 1953a, 1962b, 1966a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1868, 1870d, 1878a, 1878b; VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1953b, 1963c; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; LUCAS, 1875; VEILLON, 1997. Octobre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1999; KABOUCHÉ & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Novembre: DENIS, 1962b,

1965c; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1964b; HUBERT, 1964a.

*Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1942, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: CANARD, 1989. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990a; SALMON, 1959. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1940a; ROLLARD, 1990a. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990a. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990a. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOUT & al., 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bord d'étang: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de ruisseau: DENIS, 1940a. Bord de torrent: DENIS, 1955c. Bord des eaux, détritiques: LANCELEVÉE, 1884. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOUT & al., 1989. Détritiques humides: SIMON, 1909b. Estuaire, au niveau du *Puccinellietum* et de l'*Agropyretum*: SALMON, 1959. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais saumâtre: DENIS, 1954b. Marais, détritiques: SIMON, 1881a. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1952a; EMERIT & al., 2003; GUIBÉ, 1942; HENRY, 1981; ROSELLE, 1887; SIMON, 1929; VILLEPOUX, 1990b. Peupliers: NOËL & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1881a, 1929. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Roseaux: NOËL & al., 2005. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1952a. Février: DENIS, 1952a; VEILLON, 1997. Mars: DENIS, 1938a; GUIBÉ, 1942. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1962b; LEDOUX, 2000. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1952a. Février: VEILLON, 1997. Mars: GUIBÉ, 1942. Avril: LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1962b; LEDOUX, 2000;

LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a; LEDOUX, 2000. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1962b; EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: EMERIT & al., 2003.

*Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1942, 1946; LUCAS, 1870d. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1929. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; SALMON, 1959. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1898; LUCAS, 1878b; PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990a. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1937a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: DRESKO, 1950. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1875; SIMON, 1881a. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997; LUCAS, 1878a. Bord de mare: DENIS, 1941. Bord de rivière: DENIS, 1953b. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, herbes humides: DENIS, 1939a. Bord de route, herbes: ROSELLE, 1888b. Bord des eaux, détritus: LANCELEVÉE, 1884. Carrière: DRESKO, 1950. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Cultures: SIMON, 1929. Détritus humides: SIMON, 1909b. Dune: DENIS, 1965c. Dune, sous les *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Estuaire, au niveau du *Puccinellietum* et de l'*Agropyretum*: SALMON, 1959. Feuilles de chênes: LUCAS, 1870d. Forêt: ROSELLE, 1888b. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1934a, 1963c. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lieux humides: LUCAS, 1878b. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Litière de pins: DENIS, 1964b, 1965c. Littoral, marais salé: PÉTILLON

& al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1952a; EMERIT & al., 2003; GUIBÉ, 1942. Peupliers: NOËL & al., 2005. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Prairie: ASSELIN & al., 1989; LEDOUX & al., 1999a, 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1881a. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & al., 2005; LEDOUX & al., 1996a. Prairie sèche: EMERIT & al., 1999. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Roseaux: NOËL & al., 2005. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1952a. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1942; LE PERU, 2004. Avril: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1934a; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1954a; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a; LEDOUX, 2000. Août: DENIS, 1963c; LUCAS, 1878b. Septembre: DENIS, 1935a, 1953b, 1963c; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c, 1967d. Mars: DENIS, 1963c, 1964b; EMERIT & al., 1999; GUIBÉ, 1942; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Avril: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: DENIS, 1941, 1954a, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1964b; LEDOUX, 2000. Août: LUCAS, 1870d, 1878a, 1878b. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre: LEDOUX, 2000.

*Pachygnatha listeri* Sundevall, 1829

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1960a. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Morbihan, Orne: ROLLARD, 1990a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1891. Vendée: DENIS, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois humides, allées herbues: SIMON, 1881a. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord des eaux, détritus: LANCELEVÉE, 1884. Forêt: ROSELLE, 1891. Marécage: SIMON, 1929; VILLEPOUX, 1990b. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: SIMON, 1929. Prairie très humide, mousses: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Septembre: EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Avril: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1964b. Août: LE PERU, 2004. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: LE PERU, 2004.

*Tetragnatha dearmata* Thorell, 1873

*T. punctipes.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929 (*T. p.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lozère:

SIMON, 1929 (*T. p.*). — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bord de rivière, carex: LEDOUX & *al.*, 2002. Jardin; prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1929. Juillet, septembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Juin: SIMON, 1929.

***Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)**

[SIMON, 1929 note: « Presque tous les auteurs ont confondus *T. extensa* L. avec les espèces voisines, surtout avec *T. montana* E. S. »]. **Répartition.** Ain: BRUDON, 1894; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; REHFELDT, 1992. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999; SIMON, 1874d. Corse: SIMON, 1929; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; DRESKO, 1974b; ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-), Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: DENIS, 1951b; LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a; PIONNEAU, 1911; ROLLARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; NOËL & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; KERVILLE, 1900; LUCAS, 1878b; PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Nord: GOULLIART, 1979a. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b, 1951c; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; LESSERT, 1910; MULLER & *al.*, 1895; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910; MULLER & *al.*, 1895. Saône (Haute-): BECKER, 1879a. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; LUCAS, 1875. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880; BIGOT & *al.*, 1987a; DENIS, 1937a; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1963c, 1964b. Vienne: DUREPAIRE & *al.*, 1994. Yonne: LUCAS, 1872. [Selon DRESKO, 1974b la citation du Finistère par DENIS, 1938a faite sur des juvéniles n'est pas à retenir]. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique, Madère. **Altitude.** Jusqu'à 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: BRAUD & *al.*, 2005; DENIS, 1938a; LUCAS, 1875. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1952c; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Bord de canal: REHFELDT, 1992. Bord de lac: DENIS, 1951c. Bord de lac, rhododendrons: DENIS, 1950b. Bord de rivière: DENIS, 1938a; LEDOUX & *al.*, 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & *al.*, 1999a. Bord de ruisseau: DENIS, 1959d; LUCAS, 1872, 1878b. Bord de ruisseau, herbes: DENIS, 1950b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Dune: KERVILLE, 1900. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Dune,

oyats: DENIS, 1964b. Estuaire, terrain salé: DENIS, 1951b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1887. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Fossé: BERLAND, 1924. Fossé en bord de route: VEILLON, 1997. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Juncs: DENIS, 1961b. Lande: DENIS, 1938a. Lande humide: DUREPAIRE & *al.*, 1994. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Lieux humides: KOVOOR & *al.*, 2000. Lieux humides, bord de l'eau: LUCAS, 1882a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Peupliers: NOËL & *al.*, 2005. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002; NOËL & *al.*, 2005; PASQUET & *al.*, 1992; ROSELLE, 1887; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & *al.*, 1996a. Près de l'eau: SIMON, 1909b. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX, 2000. Mai: DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1960a, 1961b; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a. — *Femelle.* Avril: LEDOUX, 2000. Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a; DRESKO, 1974b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1950b, 1959d, 1960a, 1961b; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1952c, 1964b; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1878b, 1882a; VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1951b, 1951c; LUCAS, 1875; VEILLON, 1997.

***Tetragnatha isidis* (Simon, 1880)**

*Eucta gallica*; *Eucta i.*

**Répartition.** Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1929 (*E. i.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*E. g.*); SIMON, 1929 (*E. i.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*E. g.*). — Espagne. De l'Europe à Sumatra. **Habitat.** Marécage: LANCELEVÉE, 1884; MURPHY, 1994; ROSELLE, 1891; SIMON, 1929.

***Tetragnatha montana* Simon, 1874**

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; DENIS, 1954b. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1929; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; DRESKO, 1974b; ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: DENIS, 1963e. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & *al.*, 1999. Orne: ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1955c; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d;

LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: DENIS, 1935b; KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 980 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois: BRAUD & *al.*, 2005; DENIS, 1941, 1967e. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois marécageux: SIMON, 1929. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord d'étang, haie de ronces: VEILLON, 1997. Bord de rivière: LEDOUX & *al.*, 2002. Bord de rivière, fourrés de saules et *Populetum albae*: LEDOUX & *al.*, 1999a. Bord de torrent: CANARD, 1989. Bétulaie, herbes: EMERIT & *al.*, 2003. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Forêt: DENIS, 1938a, 1963c. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de pins: DENIS, 1964b, 1965c. Forêt, bord d'étang: VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Haie de ronces: VEILLON, 1997. Hautes herbes et buissons: SIMON, 1929. Jardin: LE PERU, 2004. Lieux humides: KOVOOR & *al.*, 2000. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1959d; EMERIT & *al.*, 2003; HENRY, 1981; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Prairie humide: BOSMANS & *al.*, 1985a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. *Salicornietum*; *therobrachypodion*: BIGOT, 1965. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1964b; DRESKO, 1974b; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1955c, 1959d, 1964b; LEDOUX, 2000. Août: DRESKO, 1974b; LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965c, 1967e; EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1964b; DRESKO, 1974b; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1955c, 1959d, 1963e, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; MÜLLER, 1985. Août: CANARD, 1989; DENIS, 1964b, 1967d; DRESKO, 1974b; LE PERU, 2004. Septembre: CANARD, 1989.

*Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. Charente: SIMON, 1929. Corrèze: JUBERTHIE, 1954; LE PERU, 2004. Dordogne: JUBERTHIE, 1954; SIMON, 1929. Jura: SIMON, 1929. Loire-Atlantique: JUBERTHIE, 1954; SIMON, 1929. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. "Seine": SIMON, 1929. — Alpes du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bord d'étang: SIMON, 1929; VEILLON, 1997. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Forêt: SIMON, 1929. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: SIMON, 1929; VILLEPOUX, 1990b. Prairie; ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Rose-lière: SCHALLER, 2000. **Période.** — *Mâle.* Juin: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1929. Juillet, août: SIMON, 1929. Septembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Juin: LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1929. Août: SIMON, 1929. Septembre: VEILLON, 1997.

*Tetragnatha nitens* (Sav. & Aud., 1825)

*T. ejuncida.*

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874a, 1874a (*T. e.*), 1929. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1929. Var: DENIS, 1935b. — Espagne, Italie. Cosmotropical. **Habitat.** Bord de torrent: CANARD, 1989. Marécage: SIMON, 1874a, 1929. **Période.** — *Femelle.* Septembre: CANARD, 1989.

*Tetragnatha obtusa* C. L. Koch, 1837

*T. chrysochlora.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1874a (*T. c.*). Corse: ROEWER, 1926; SIMON, 1874a (*T. c.*), 1929. Gironde: LUCANTE, 1880b (*T. c.*); SIMON, 1874a (*T. c.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*T. c.*). Loiret-Cher: HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a, 1960a; LUCANTE, 1880b (*T. c.*). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*T. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1999a. Rhin (Bas-): LES-SERT, 1910. Rhin (Haut-): LEPREUR, 1880 (*T. c.*); MULLER & *al.*, 1895; REIBER, 1880 (*T. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. c.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*T. c.*). Var: BECKER, 1880 (*T. c.*); BIGOT, 1993; BIGOT & *al.*, 1979; DENIS, 1933a, 1934a; KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2310 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Blocs de rochers: DENIS, 1953a. Bois de pins: SIMON, 1874a. Bord d'étang: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & *al.*, 1999a. Collines sèches, hautes herbes et buissons: SIMON, 1929. Dune: DENIS, 1965c; LEDOUX & *al.*, 1999a. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c. Jardin, rosiers: LANCELEVÉE, 1884. Lieux humides: KOVOOR & *al.*, 2000. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Marais, buissons: SIMON, 1929. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b, 1934a. Mai: DENIS, 1934a. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1967d. Septembre: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Mars: ROEWER, 1926. Avril: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1960a, 1963c. Août: DENIS, 1953a, 1967d. Septembre: VEILLON, 1997.

*Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870

[SIMON, 1929 note: «Nous confondions autrefois cette espèce avec *T. extensa* L.»]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1929. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Orne: SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1999a. Var: KOVOOR & *al.*, 2000. — Alpes; Pyrénées: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse.



Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bord d'étang: SIMON, 1929; VEILLON, 1997. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de torrent: CANARD, 1989. Conifères: SIMON, 1929. Lieux humides: KOVOOR & al., 2000. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie très humide: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1997. Août: SIMON, 1929. Septembre: VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mai: EMERIT & al., 2003; VEILLON, 1997. Juin: LEDOUX & al., 2002. Août: SIMON, 1929. Septembre: VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & al., 1999a.

***Tetragnatha striata*** L. Koch, 1862

*Eugnatha s.*

**Répartition.** Gers: SIMON, 1881a (*E. s.*), 1929. Loire-Atlantique: SIMON, 1929. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. "Seine": DRESKO, 1974b (*E. s.*); SIMON, 1929. Somme: SIMON, 1881a (*E. s.*), 1929. Var: SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. De l'Europe au Kazakhstan. **Habitat.** Marais salant: SIMON, 1929. Tourbière: SIMON, 1881a, 1929.

ARANEIDAE

Le genre *Araneus* a été divisé au cours du siècle dernier en plusieurs genres: *Araniella*, *Gibbaranea*, *Larinioides*. Ceux-ci, maintenant utilisés par plusieurs auteurs, sont adoptés ici.

Le genre *Atea* C. L. Koch, 1837 est mis en synonymie de *Araneus* Clerck, 1757 par LEVI, 1991. Cette synonymie est adoptée ici. Ce genre comprenait trois espèces en France: *A. sturmi*, *A. triguttata* et *A. v-notata*.

Deux espèces citées par erreur par SIMON, 1874a sont à exclure: *Nuctenea silvicultrix* C. Koch, 1835, citée de Corse sous le nom *Epeira s.*, mais SIMON, 1929 indique: «*A. silvicultrix* C. Koch est étranger à notre faune et jusqu'ici propre à la Bavière. Le jeune mâle de Corse que je lui rapportais est sans doute un *A. corticalis* immature», et *Zygiella keyserlingi* (Ausserer, 1871), citée des Alpes et des Pyrénées-Orientales sous le nom *Zilla k.*, mais SIMON, 1929 indique: «Par suite d'une erreur de détermination nous avons introduit dans la faune française le *Zilla keyserlingi* qui lui est étranger».

Quant à *Araneus nordmanni* (Thorell), elle est citée de Belgique par SIMON, 1874a (*Epeira n.*), mais n'a pas été trouvée en France.

***Aculepeira armida*** (Sav. & Aud., 1825)

*Araneus a.*; *Araneus armidus*; *Epeira a.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1874a (*E. a.*). Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957 (*A. a.*), 1965 (*A. a.*). Corse: BERLAND, 1922 (*A. a.*); CANARD, 1989; SIMON, 1874a (*E. a.*), 1929 (*A. a.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994 (*A. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*A. armidus*); SIMON, 1929 (*A. a.*). Var: BIGOT & al., 1987a (*A. a.*), 1988 (*A. a.*); DENIS, 1935b (*A. a.*); KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993 (*A. a.*); SIMON, 1898c (*A.*

*a.*). — Provence: SIMON, 1929 (*A. a.*). Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Lieux chauds et marécageux: SIMON, 1874a. Plateau calcaire: CANARD, 1989. Prairie sèche et caillouteuse: DELFOSSE, 2000b. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Juin: CHANSIGAUD & al., 1994. — *Femelle.* Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DELFOSSE, 2000b. Juillet: CANARD, 1989.

***Aculepeira carbonaria*** (L. Koch, 1869)

*Araneus carbonarius*; *Epeira c.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1874a (*E. c.*). Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. c.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c (*A. c.*); SIMON, 1874a (*E. c.*), 1929 (*A. c.*). — Alpes: SIMON, 1929 (*A. c.*). Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** De 2000 m (SIMON, 1874a, 1929) jusqu'à 2660 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Éboulis: DENIS, 1952c. Entre les grosses pierres: SIMON, 1874a. Rochers et éboulis: SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle.* Août: DENIS, 1952c; SIMON, 1874a. — *Femelle avec cocon.* Septembre: SIMON, 1874a.

***Aculepeira ceropegia*** (Walckenaer, 1802)

*Araneus c.*; *Araneus ceropegius*; *Epeira c.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardèche: LUCAS, 1870b (*E. c.*). Ariège: DENIS, 1953b (*A. ceropegius*), 1960a (*A. ceropegius*), 1961b (*A. ceropegius*). Aube: SIMON, 1874a (*E. c.*). Aude: DENIS, 1961b (*A. ceropegius*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*A. c.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (*A. ceropegius*). Hérault: EMERIT & al., 1990. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b (*A. ceropegius*); LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*A. ceropegius*); DENIS, 1950b (*A. c.*), 1953a (*A. ceropegius*), 1955c (*A. c.*), 1960a (*A. ceropegius*), 1963e (*A. ceropegius*); LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a (*A. ceropegius*); DENIS, 1957a (*A. ceropegius*), 1959d (*A. ceropegius*); LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*A. ceropegius*); DENIS, 1933b (*A. c.*), 1952c (*A. c.*), 1961b (*A. ceropegius*); LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*A. ceropegius*); PASQUET & al., 1992 (*A. ceropegius*). Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895 (*E. c.*). Savoie: BERLAND, 1937 (*A. c.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904 (*A. ceropegius*), 1910 (*A. ceropegius*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*E. c.*). "Seine": SIMON, 1874a (*E. c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*A. ceropegius*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996c. Bois: DENIS, 1957a, 1959d. Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord d'étang, prairie: BOSMANS & al., 1985a. Bord de lac tourbeux: DENIS, 1955c. Buissons: SIMON, 1929. Éboulis: DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996b. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: MÜLLER, 1985. Friche: PASQUET & al., 1992. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Genêts: DENIS, 1948b.



Herbes humides : DENIS, 1933b. Jardin : LE PERU, 2004. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lieux chauds et découverts : SIMON, 1874a. Prairie : LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 2003 ; PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre : BOSMANS & al., 1985a. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Prairie rase ; prairie tourbeuse : LEDOUX & al., 1996a. Rhododendrons : DENIS, 1950b, 1954a ; LEDOUX & al., 1996b. Tourbière : DENIS, 1950b ; LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle*. Juin : LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1955c, 1960a, 1961b ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996c, 2003 ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août : PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. — *Femelle*. Juin : DENIS, 1933b, 1948b ; LE PERU, 2004. Juillet : BERLAND, 1937 ; CORNIC, 1978 ; DENIS, 1950b, 1952c, 1953b, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b, 1963e ; LEDOUX & al., 1996a, 1996c ; MÜLLER, 1985 ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août : DENIS, 1952c, 1953a, 1957a ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1996a, 1996b, 1996c, 2003 ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre : LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon*. Septembre : SIMON, 1874a.

#### *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)

*Aranea r.* ; *Araneus r.* ; *Epeira cratera* ; *Epeira r.* ; *Epeira solers*.

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Ariège : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1973 (*Araneus r.*) ; KABOUCHE & al., 1997. Calvados : ASSELIN & al., 1989 ; GUIBÉ, 1946 (*Araneus r.*). Charente-Maritime : JOURDE & al., 1999. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : CANARD, 1989. Côtes-d'Armor : ROLLARD, 1990a. Dordogne : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : EMERIT & al., 2003 ; LANCELEVÉE, 1884 (*E. r.*). Garonne (Haute-), Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Hérault : EMERIT & al., 1990. Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990a. Landes : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 (*Araneus r.*) ; LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Morbihan : ROLLARD, 1990a. Nord : DENIS, 1952b (*Araneus r.*). Orne : ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme : LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1951c (*Araneus r.*) ; LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a (*Araneus r.*) ; DENIS, 1933b (*Araneus r.*) ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003 ; TAMBS-LYCHE, 1957 (*Aranea r.*). Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910 (*Araneus r.*) ; PASQUET & al., 1992 (*Araneus r.*). Rhin (Haut-) : MULLER & al., 1895 (*E. s.*). Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904 (*Araneus r.*), 1910 (*Araneus r.*). "Seine" : LUCAS, 1875 (*E. r.*) ; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994 ; LANCELEVÉE, 1884 (*E. r.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*Araneus r.*). Somme : ROSELLE, 1888b (*E. r.*). Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*E. r.*). Var : BECKER, 1882 (*E. r.*) ; BIGOT & al., 1987a (*Araneus r.*) ; DENIS, 1933a (*Araneus r.*), 1934a (*Araneus r.*), 1935b (*Araneus r.*), 1937a (*Araneus r.*) ; SIMON, 1898c (*Araneus r.*). Vaucluse : CHANSIGAUD, 1992 (*Araneus r.*) ; CORNIC, 1978 (*Araneus r.*) ; FABRE, 1905 (*E. c.*). Vendée : CLARK & al., 1970 (*Araneus r.*) ; DENIS, 1962b (*Araneus r.*), 1963c (*Araneus r.*), 1964b (*Araneus r.*). Yonne : LUCAS, 1872 (*E. s.*). — Toute la France : SIMON, 1929 (*Araneus r.*). Allemagne, Belgique, Espagne,

Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1951c). **Habitat.** Bois : LUCAS, 1875. Bord de rivière, *Populetum albae* : LEDOUX & al., 1999a. Bord de ruisseau ; carrière de calcaire : VEILLON, 1997. Clôture : BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Forêt : DENIS, 1952b, 1963c. Forêt de chênes-lièges, arbustes : BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins : DENIS, 1951c, 1962b, 1964b. Forêt de pins clairsemée : KABOUCHE & al., 1997. Forêt, buissons : DOIGNON, 1976. Friche : PASQUET & al., 1992 ; VEILLON, 1997. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Jardin : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994 ; CLARK & al., 1970. Lande : VEILLON, 1997. Lieux découverts, buissons bas : SIMON, 1929. Lieux secs : SIMON, 1874a. Lisière de forêt : LE PERU, 2004. Maquis : CANARD, 1989. Marécage : EMERIT & al., 2003 ; VILLEPOUX, 1990b. Prairie : LEDOUX & al., 1999a, 2003. Prairie calcaire : EMERIT & al., 1999. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Sur un arbousier : CHANSIGAUD, 1992. **Période.** — *Mâle*. Avril : DENIS, 1933b, 1964b. Mai : DENIS, 1933b. Juin : DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 1999 ; SIMON, 1874a. — *Femelle*. Avril : DENIS, 1962b ; LEDOUX & al., 1996a ; VEILLON, 1997. Mai : DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 2003 ; LE PERU, 2004 ; LESSERT, 1910 ; TAMBS-LYCHE, 1957 ; VEILLON, 1997. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1933b ; LE PERU, 2004 ; LESSERT, 1910 ; SIMON, 1874a ; VEILLON, 1997. Juillet : CORNIC, 1978. Août : CANARD, 1989. Septembre : LUCAS, 1875.

#### *Araneus alsine* (Walckenaer, 1802)

*Epeira a.*

**Répartition.** Aube : SIMON, 1874a (*E. a.*), 1929. Calvados : GUIBÉ, 1943, 1946. Charente-Maritime : JOURDE & al., 1999. Corrèze : LE PERU, 2004. Dordogne, Eure : SIMON, 1929. Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990a. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Orne : ROLLARD, 1990a ; SIMON, 1929. "Seine" : SIMON, 1874a (*E. a.*), 1929. Seine-et-Marne : SIMON, 1929. Somme : ROSELLE, 1888a (*E. a.*) ; SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois : SIMON, 1874a. Bois marécageux : SIMON, 1929. Forêt : ROSELLE, 1888a. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Prairie humide : SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Juin : SIMON, 1929. Juillet : SIMON, 1874a. Septembre : GUIBÉ, 1943. — *Femelle*. Avril : SIMON, 1929. Juillet : SIMON, 1874a. Août : LE PERU, 2004. Septembre : SIMON, 1929.

#### *Araneus angulatus* Clerck, 1757

*Epeira angulata* ; *Epeira spinivulva*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1874a (*E. s.*). Ardèche, Aube : SIMON, 1874a (*E. a.*). Calvados : GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime : JOURDE & al., 1999 ; SIMON, 1874a (*E. a.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor, Finistère : ROLLARD, 1990a. Gard : BIGOT, 1983. Garonne (Haute-), Gironde : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979 ; MARC, 1990b ; ROLLARD, 1990a. Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 ; LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Marne (Haute-) : SIMON, 1929. Morbihan : ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-) : LUCANTE, 1880b (*E. a.*) ; SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; SIMON, 1874a (*E. a.*).

1874a (*E. s.*). Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. a.*); REIBER, 1880 (*E. a.*). "Seine": SIMON, 1874a (*E. a.*). Somme: ROSELLE, 1888a (*E. a.*). Var: BIGOT & *al.*, 1987a, 1988; DENIS, 1934a, 1935a, 1935b; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1929. Vaucluse: FABRE, 1905 (*E. a.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*E. a.*). — Presque toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois; clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Forêt: ROSELLE, 1888a. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & *al.*, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, clairière: SIMON, 1929. Haie: BRAUD & *al.*, 2005; SIMON, 1874a. Jardin: LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Plage: BIGOT, 1983. **Période.** — *Mâle.* Juin: SIMON, 1874a. Juillet: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin: LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Juillet: SIMON, 1874a. Août: VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004.

*Araneus circe* (Sav. & Aud., 1825)

*Epeira c.*; *Epeira regia*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. c.*). Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Lozère: SIMON, 1929. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1874a (*E. r.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Var: SIMON, 1898c. — Alpes méridionales du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1929. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Murs: SIMON, 1874a. Parois de rochers: SIMON, 1874a, 1929. **Période.** — *Femelle.* Juin: SIMON, 1929.

*Araneus diadematus* Clerck, 1757

*Epeira diademata*; *Epeira soror*.

**Répartition.** Ain: PRUDON, 1894 (*E. d.*); VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. d.*). Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: LUCAS, 1870b (*E. d.*); RAPHAËL & *al.*, 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*E. d.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874a (*E. s.*), 1929. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; GROS, 2004; LUCAS, 1871a (*E. d.*); ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*E. d.*); SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; LUCAS, 1868 (*E. d.*); ROLLARD, 1990a. Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; EMERIT & *al.*, 1994; RAHOLA, 2005. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Hérault: LOPEZ, 1976. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; LUCAS, 1882a (*E. d.*); ROLLARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Lot-et-Garonne: DALINGWATER, 1991; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b (*E. d.*); PÉTILLON & *al.*, 2004. Marne: LUCAS, 1878a (*E. d.*). Meurthe-et-Moselle: PASQUET, 1984. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & *al.*, 1999; GOULLIART, 1979a. Oise: DENIS, 1931a. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*,

1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b, 1967d; GROS, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. d.*); REIBER, 1880 (*E. d.*); SCHALLER, 2000. Rhône: LE BERRE & *al.*, 1981. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*E. d.*). Saône (Haute-): BECKER, 1879a (*E. d.*). "Seine": LUCAS, 1847d (*E. d.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*E. d.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887 (*E. d.*); SUEUR, 1992, 1993. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Var: BIGOT, 1993; BIGOT & *al.*, 1979, 1987a; DENIS, 1934a, 1935a, 1937a; KOVOOR & *al.*, 2000; PONEL & *al.*, 1993. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978; FABRE, 1905 (*E. d.*). Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1966a. Yonne: LUCAS, 1872 (*E. d.*). — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2500 m (SIMON, 1929). **Habitat.** Ancienne carrière: VEILLON, 1997. Arrière-dune: LEDOUX & *al.*, 1999a. Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996b. Bois: BRAUD & *al.*, 2005; DENIS, 1938a, 1941, 1960a; GOULLIART, 1979a; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1874a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & *al.*, 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, lisière: DENIS, 1959d. Bois, lisière, haie: LE BERRE & *al.*, 1981. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1953b. Bord de route: VEILLON, 1997. Bord de route, arbustes: CANARD, 1989; DENIS, 1953a. Bord de torrent: DENIS, 1953a. Bâtiment: DENIS, 1966a. Bétulaie, herbes: EMERIT & *al.*, 2003. Chênes: DENIS, 1967e. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Clôtures: LOPEZ, 1976. Coteau calcaire: VEILLON, 1997. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Éboulis: DENIS, 1950b; LEDOUX & *al.*, 1996b. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1960a, 1961b. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b; ROSELLE, 1887. Forêt, allée: VEILLON, 1997. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Gros blocs de rochers: DENIS, 1953a. Haie: BRAUD & *al.*, 2005; GOULLIART, 1979a; LOPEZ, 1976. Haies de thuyas: VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; GOULLIART, 1979a; LANCELEVÉE, 1884; LE PERU, 2004; LENICE, 1992; LUCAS, 1878a, 1882a; SIMON, 1874a. Jardin en milieu urbain: VEILLON, 1997. Jardins des villes: SIMON, 1929. Lande: LUCAS, 1868. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de bois: LOPEZ, 1976. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & *al.*, 1994. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maison: DENIS, 1963c. Maquis: CANARD, 1989. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c, 2002. Prairie en friche:

LE PERU, 2004; PASQUET, 1984. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996b. Rhododendrons: DENIS, 1957a; LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX & al., 2002. Sous une écorce de pin: DENIS, 1953a. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Sur un arbousier: CHANSIGAUD, 1992. Sur un genévrier: DENIS, 1957a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Talus: LOPEZ, 1976. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Ville, cour: LANCELEVÉE, 1884. **Période.** — *Mâle.* Juin: CORNIC, 1978. Juillet: CORNIC, 1978; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: CORNIC, 1978; DENIS, 1953a, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 1996b, 1996c; LUCAS, 1868, 1878a, 1878b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1950b, 1954a, 1959d, 1960a. Août: CORNIC, 1978; DENIS, 1953a; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996b; LUCAS, 1868, 1870d, 1878a, 1878b, 1882a; VEILLON, 1997. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1953b, 1963c, 1967e; EMERIT & al., 1997, 1999, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; VEILLON, 1997. Octobre: DENIS, 1963c; EMERIT & al., 1994, 1999; LEDOUX & al., 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

### *Araneus grossus* (C. L. Koch, 1845)

#### *Epeira grossa.*

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*E. g.*), 1929. Côte-d'Or: SIMON, 1929. Var: DENIS, 1935b; SIMON, 1874a (*E. g.*), 1929. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1929. — Allemagne, Espagne, Italie. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Lieux secs, buissons bas: SIMON, 1929. Pentes arides: SIMON, 1874a.

### *Araneus marmoreus* Clerck, 1757

#### *Epeira marmorea; Epeira scalaris.*

**Répartition.** Ain: PRUDON, 1894 (*E. s.*); VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Aude: DELFOSSE, 2000b. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes, Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Meurthe-et-Moselle: PASQUET, 1984. Nord: GOULLIART, 1979a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. m.*); MULLER & al., 1895 (*E. m.*); REIBER, 1880 (*E. m.*); SCHALLER, 2000. "Seine": LUCAS, 1853 (*E. s.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*E. m.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887 (*E. m.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. m.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1980 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1960a; SCHALLER, 2000. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997.

Bois, lisière: GOULLIART, 1979a; SIMON, 1929. Bois, lisière ou clairière, sur les jeunes pins ou les hêtres: SIMON, 1874a. Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de mare: LUCAS, 1853. Forêt: ROSELLE, 1887. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Jardin; lisière de forêt: LE PERU, 2004. Marécage: SIMON, 1929; VILLEPOUX, 1990b. Prairie en friche: LE PERU, 2004; PASQUET, 1984. Prairie sèche et caillouteuse: DELFOSSE, 2000b. **Période.** — *Mâle.* Août: LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1960a. Août: DENIS, 1952c; LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Octobre: LE PERU, 2004.

### *Araneus pallidus* Olivier, 1789

#### *Epeira pallida.*

**Répartition.** Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1929. Hérault: LOPEZ, 1976; SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; SIMON, 1929. Var: DENIS, 1933a, 1934a, 1935b; SIMON, 1929. Vaucluse: FABRE, 1905 (*E. p.*); SIMON, 1874a (*E. p.*), 1929. — Espagne, Italie. Algérie, Portugal. **Habitat.** Garrigue: LOPEZ, 1976. Jardins, arbres; rochers: SIMON, 1874a. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Septembre: DENIS, 1967d. Novembre: SIMON, 1874a.

### *Araneus quadratus* Clerck, 1757

#### *Epeira quadrata.*

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991; VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Aube: SIMON, 1874a (*E. q.*). Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*E. q.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909b. Finistère: ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a; LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Isère: SIMON, 1874a (*E. q.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: ROLLARD, 1990a. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Nord: GOULLIART, 1979a. Orne: GUIBÉ, 1946; ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a, 1955c, 1960a; LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a; LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c, 1961b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. q.*); MULLER & al., 1895 (*E. q.*); REIBER, 1880 (*E. q.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; MULLER & al., 1895 (*E. q.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*E. q.*). "Seine": PLANET, 1905 (*E. q.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*E. q.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b (*E. q.*); SUEUR, 1993. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. q.*). Vendée: DUFFEY, 1964. Yonne: LUCAS, 1872 (*E. q.*). — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2280 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: CHANSIGAUD, 1991; VEILLON, 1997. Bruyères: DENIS, 1957a. Coteau calcaire à genévriers:

EMERIT & *al.*, 1999. Côtes très sèches: SIMON, 1874a. Dune: DUFFEY, 1964; ROSELLE, 1888b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Jardin: LE PERU, 2004. Joncs: DENIS, 1961b. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Plantation de pins: SIMON, 1874a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996b; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: SIMON, 1874a, 1929. Près de l'eau: SIMON, 1874a. Rhododendrons: DENIS, 1957a; LEDOUX & *al.*, 1996b. Tourbière: DENIS, 1952c. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1960a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898; SIMON, 1874a. Septembre: EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1954a, 1957a, 1960a, 1961b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996b; LUCAS, 1870d; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898; SIMON, 1874a. Septembre: DENIS, 1953b; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a; SUEUR, 1993; VEILLON, 1997. Octobre: CHANSIGAUD, 1991; SUEUR, 1993; VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon*. Octobre: SIMON, 1874a.

#### *Araneus sturmi* (Hahn, 1831)

*Atea s.*; *Epeira s.*

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992 (*A. s.*). Ariège: DENIS, 1960a. Corrèze: LE PERU, 2004 (*A. s.*). Corse: SIMON, 1874a (*E. s.*), 1929. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997 (*A. s.*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003 (*A. s.*). Finistère: ROLLARD, 1990a (*A. s.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b (*A. s.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005 (*A. s.*). Morbihan: ROLLARD, 1990a (*A. s.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986 (*A. s.*); DENIS, 1953a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987 (*A. s.*); DENIS, 1961b; LEDOUX & *al.*, 1995 (*A. s.*), 1996a (*A. s.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. s.*); MULLER & *al.*, 1895 (*E. s.*); REIBER, 1880 (*E. s.*). "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Var: BECKER, 1880 (*E. s.*); DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b, 1936; KOVOOR & *al.*, 2000 (*A. s.*); SIMON, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*A. s.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*A. s.*). Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1953b. Bétulaie, branches: EMERIT & *al.*, 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Chênes-verts: DENIS, 1964b. Conifères: SIMON, 1929. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1961b, 1963c. Forêt de chênes: BOSMANS & *al.*, 1987. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins et de sapins: SIMON, 1874a. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003. Rhododendrons: DENIS, 1953a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1934a, 1936, 1962b; EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1934a, 1962b, 1965c; EMERIT & *al.*, 2003. Juin:

DENIS, 1964b; LEDOUX, 2000. Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1953a. Septembre: DENIS, 1962b.

#### *Araneus triguttatus* Fabricius, 1775

*Atea triguttata*; *Atea t.*; *Epeira triguttata*.

**Répartition.** Ariège: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c (*E. t.*). Corrèze: LE PERU, 2004 (*A. triguttata*). Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*E. t.*). Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979; ROLLARD, 1990a (*A. triguttata*). Landes: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002 (*A. triguttata*). Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005 (*A. triguttata*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004 (*A. triguttata*). Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1943c. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": LUCAS, 1875 (*E. t.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*E. t.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b (*E. t.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. t.*). Var: DENIS, 1936; KOVOOR & *al.*, 2000 (*A. triguttata*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*A. t.*). Paléarctique. **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Bois, clairière et lisière: SIMON, 1929. Bois, lisière ou clairière: SIMON, 1874a. Bruyères: LUCAS, 1874c. Forêt: DENIS, 1963c; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Jardin: LE PERU, 2004; SIMON, 1874a, 1929. Lande sèche: CANARD, 1979. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: DENIS, 1933b, 1936, 1943c; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Juin: LESSERT, 1904, 1910. Juillet: LE PERU, 2004. Septembre: LUCAS, 1875.

#### *Araneus v-notatus* (Thorell, 1875)

*A. sturmi v-notata*.

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*A. s. v.*). — Midi de la France: SIMON, 1929 (*A. s. v.*). Algérie. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1943c.

#### *Araniella alpica* (L. Koch, 1869)

*Araneus alpicus*; *Epeira a.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. a.*). Corse: SIMON, 1874a (*E. a.*), 1929 (*A. a.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1953b (*A. a.*); LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Jura: SIMON, 1929 (*A. a.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1960a (*A. a.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (*A. a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. a.*); REIBER, 1880 (*E. a.*). Vosges: SIMON, 1929 (*A. a.*). — Vosges, Auvergne, Cévennes, Alpes, Pyrénées: SIMON, 1929 (*A. a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** De 800 m (SIMON, 1929) jusqu'à 1800 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1874a. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*,

1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Sur un genévrier: DENIS, 1960a. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1957a, 1960a; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Septembre: DENIS, 1953b.

*Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757)

*Aranea c.*; *Araneus cucurbitinus*; *Epeira c.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. c.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1967d (*Araneus c.*); LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (*Araneus c.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*Araneus c.*). Charente-Maritime: SIMON, 1874d (*E. c.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1929 (*Araneus c.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*Araneus c.*); ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*E. c.*); SIMON, 1899 (*Araneus c.*), 1909b (*Araneus c.*). Finistère: DENIS, 1938a (*Araneus c.*); ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b (*Araneus c.*); LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Hérault: LOPEZ, 1975 (*Araneus c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979 (*Araneus c.*), 1980 (*Araneus c.*); DENIS, 1938a (*Araneus c.*); ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e (*Araneus c.*); PIONNEAU, 1911 (*Araneus c.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: DENIS, 1938a (*Araneus c.*); ROLLARD, 1990a. Nord: GOULLIART, 1979a (*Araneus c.*). Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b (*Araneus c.*), 1960a (*Araneus c.*); LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b (*Araneus c.*); LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*Araneus c.*), 1987; DENIS, 1933b (*Araneus c.*), 1952c (*Araneus c.*), 1961b (*Araneus c.*); LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957 (*Aranea c.*). Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. c.*); REIBER, 1880 (*E. c.*); SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Saône (Haute-): BECKER, 1879a (*E. c.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991 (*Araneus c.*); LUCAS, 1875 (*E. c.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*E. c.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*Araneus c.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*E. c.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Var: BIGOT, 1993 (*Araneus c.*); BIGOT & al., 1987a (*Araneus c.*), 1987b (*Araneus c.*), 1988 (*Araneus c.*); DENIS, 1933a (*Araneus c.*), 1934a (*Araneus c.*), 1935b (*Araneus c.*), 1936 (*Araneus c.*), 1937a (*Araneus c.*); KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993 (*Araneus c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*Araneus c.*). Vendée: DENIS, 1941 (*Araneus c.*), 1962b (*Araneus c.*), 1963c (*Araneus c.*), 1964b (*Araneus c.*), 1965c (*Araneus c.*); ROLLARD, 1990a. Yonne: LUCAS, 1872 (*E. c.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*Araneus c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2020 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941, 1960a, 1967e; LUCAS, 1875; SIMON, 1874a. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord de lac, sur un

pin: DENIS, 1952c. Bord de rivière: DENIS, 1953b; LEDOUX & al., 2002. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: ASSELIN & al., 1989; DENIS, 1938a, 1963c; GOULLIART, 1979a; ROSELLE, 1887. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Forêt, pins: DENIS, 1961b. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lande: DENIS, 1938a; VEILLON, 1997. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Massif de lavataires: VEILLON, 1997. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pins: DENIS, 1950b. Prairie: LEDOUX & al., 1996c; ROSELLE, 1887. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Sur un mur: DENIS, 1965c. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Végétation dense: LOPEZ, 1975. **Période.** — *Mâle.* Avril: CORNIC, 1978. Mai: BONTE, 2000; CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1965c, 1967e; SIMON, 1874a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a, 1941; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1874a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: DENIS, 1953b; EMERIT & al., 1999. — *Femelle.* Avril: CORNIC, 1978; VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1967e; SIMON, 1874a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a, 1941; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2002; SIMON, 1874a; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; CORNIC, 1978; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 2003. Septembre: LUCAS, 1875.

*Araniella displicata* (Hentz, 1847)

**Répartition.** "Seine": ROLLARD, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Holarctique.

*Araniella inconspicua* (Simon, 1874)

*Araneus inconspicuus*; *Epeira i.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Ariège, Corse, Eure, Gironde: SIMON, 1929 (*A. i.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1929 (*A. i.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: SIMON, 1880a (*E. i.*), 1929 (*A. i.*). Var: SIMON, 1929 (*A. i.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1929. Haie: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c.

*Araniella opisthographa* (Kulczynski, 1905)*Araneus opisthographus*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (A. o.); LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (A. o.); LEDOUX & al., 1996a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Marécage: BELIN, 2001. Ripisilve, chênes: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Mai: BONTE, 2000; LEDOUX, 2000. Juillet: MÜLLER, 1985. — *Femelle*. Mai: BONTE, 2000. Juin: LEDOUX & al., 1996a.

*Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)*A. brunnichii*; *A. fasciata*; *Argyope b.*; *Epeira fasciata*; *Metargiope b.*; *Nephila fasciata*.

**Répartition.** Ain: PRUDON, 1894 (E. f.); VILLEPOUX, 1990b. Aisne: COUTANCEAU & al., 1992. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1953b (M. b.), 1960a (M. b.); LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Aube: SIMON, 1874a. Bouches-du-Rhône: REHFELDT, 1992. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (N. f.); SIMON, 1929. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1874a. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1929. Côte-d'Or: REMY, 1946. Côtes-d'Armor: RAZET, 1953; ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Doubs: REMY, 1946. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1929. Finistère: ROLLARD, 1990a. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*); MARPLES, 1935. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Hérault: DENIS, 1963e (M. b.); LOPEZ, 1976. Ille-et-Vilaine: RAZET, 1953; ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: ROLLARD, 1990a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990a. Marne (Haute-): FELTGEN, 1906 (A. b.). Meurthe-et-Moselle: FELTGEN, 1906 (A. b.); LEBORGNE & al., 2005; REMY, 1946. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Moselle: REMY, 1946. Oise: DENIS, 1931a; DUQUEF, 1993. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999; ORHANT, 1997. Puy-de-Dôme: GOULLIART, 1979a. Pyrénées (Haut-): LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992; REMY, 1946. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880 (*Argyope b.*); SCHALLER, 2000. Rhône: SIMON, 1874a. Saône (Haute-): REMY, 1932a, 1946. "Seine": PLANET, 1905 (A. f.); SIMON, 1874a, 1929. Seine-Maritime: COULON, 1934 (A. f.); DUPONT, 1934 (A. f.); EDOUARD, 1917 (A. f.); LANCELEVÉE, 1884;

MAIL, 1916 (A. f.); SIMON, 1929. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1874a. Somme: COMMECY, 1992; COUTANCEAU & al., 1992; DRON, 1993; DUQUEF, 1993; SUEUR, 1992. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Argyope b.*). Var: BIGOT & al., 1979; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b; GOULLIART, 1979a; GROS, 1983b (M. b.); KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978; FABRE, 1905 (E. f.); LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970 (M. b.); DENIS, 1964b (M. b.), 1968a (M. b.); ROLLARD, 1990a. Vienne: DUREPAIRE & al., 1994. Vosges: FELTGEN, 1906 (A. b.). — Ouest, sud de la Loire, Midi de la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne carrière: COUTANCEAU & al., 1992. Ancienne carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1999a. Bois: COUTANCEAU & al., 1992. Bois, clairière: LUCAS, 1870d. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de canal: REHFELDT, 1992. Bord de chemin: FELTGEN, 1906. Bord de cours d'eau: CORNIC, 1978. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route: VEILLON, 1997. Bord de route, herbes et fougères: BOSMANS & al., 1985a. Broussailles: FELTGEN, 1906. Bétulaie, herbes: EMERIT & al., 2003. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ aride et sablonneux: FELTGEN, 1906. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire: SUEUR, 1992. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Coteaux arides: LANCELEVÉE, 1884. Cultures céréalières, lisière: VEILLON, 1997. Dune: DUQUEF, 1993. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de pins: CANARD, 1989. Forêt, allée: VEILLON, 1997. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Friches calcaires: COUTANCEAU & al., 1992. Jardin: DENIS, 1968a; FELTGEN, 1906. Jardin en friche: SUEUR, 1992. Lande: ORHANT, 1997. Lande humide: DUREPAIRE & al., 1994. Lande sèche: DUPONT, 1934. Lieu cultivé, bord de chemin: COMMECY, 1992. Lieux humides: KOVOOR & al., 2000. Lisière de marais: COUTANCEAU & al., 1992. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; MARPLES, 1935; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: SCHALLER, 2000. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: FELTGEN, 1906; LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994; LEDOUX, 2000. *Tamarix*: DENIS, 1935a. Terrain calcicole en friche: DRON, 1993. Verger: FELTGEN, 1906. **Période.** — *Mâle*. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b; MÜLLER, 1985. Août: LEDOUX, 1993. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. Juin: REHFELDT, 1992. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b; GROS, 1983b; VEILLON, 1997. Août: COULON, 1934; DENIS, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1870d; REMY, 1946; VEILLON, 1997. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1968a; EMERIT & al., 1999, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; ORHANT, 1997; VEILLON, 1997. Octobre: CANARD, 1989; EMERIT & al., 1994; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon*. Septembre: DENIS, 1935a; LEBORGNE & al., 2005. Octobre: LEBORGNE & al., 2005.

*Argiope lobata* (Pallas, 1772)*Epeira sericea*.

**Répartition.** Aude: DELFOSSE, 2000b. Corse: GERHARDT, 1928; O'NEIL, 1979; SIMON, 1874a, 1929. Hérault: LOPEZ, 1976. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d; GOULLIART, 1979a. Var: DENIS, 1933a, 1934a, 1935b. Vaucluse: FABRE, 1905 (*E. s.*). — Midi de la France: SIMON, 1929. Espagne, Italie. Ancien Monde. **Habitat.** Lieux chauds: SIMON, 1874a. Plantation de pins: O'NEIL, 1979. **Période.** — *Mâle*. Juin: DELFOSSE, 2000b. Septembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a, 1967d. Juin: DELFOSSE, 2000b.

*Cercidia prominens* (Westring, 1851)*Araneus p.*

**Répartition.** Ain, Aube: SIMON, 1874a. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; KABOUCHE & al., 1997. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*A. p.*); SIMON, 1874a. Charente-Maritime: SIMON, 1874a. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Oise: SIMON, 1874a. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1910. "Seine": LUCAS, 1875; SIMON, 1874a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*A. p.*); SIMON, 1874a, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: LUCAS, 1875. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bruyères: SIMON, 1874a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Détritius humides: DENIS, 1965c. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Forêt de pins maritimes, détritius: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, herbes et litière humides: DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Jardin: LE PERU, 2004. Lagune: DENIS, 1954b. Lieux marécageux: SIMON, 1874a. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marécage: ROSELLE, 1887; SIMON, 1929. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 1999a, 2002, 2003. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Salicornes: DENIS, 1962b. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX, 2000. Mai: LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Août: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1964b. Avril: LESSERT, 1910. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996c.

Septembre: CLARK & al., 1970; EMERIT & al., 1997; LUCAS, 1875. Octobre: DENIS, 1963c; KABOUCHE & al., 1997; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

*Cyclosa algérica* Simon, 1885

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; SIMON, 1929. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992. Vendée: DENIS, 1947b, 1963c, 1965c. — Espagne. Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Forêt: DENIS, 1947b. Forêt de pins: DENIS, 1963c, 1965c. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Haie: BRAUD & al., 2005. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. Juin: SIMON, 1929. Juillet: DENIS, 1963c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: DENIS, 1933b, 1947b; SIMON, 1929. Juillet, septembre: DENIS, 1963c.

*Cyclosa conica* (Pallas, 1772)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ariège: DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b; LUCANTE, 1880b. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: LOPEZ, 1975. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1934c; GOULLIART, 1979a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1953a; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1943c; LEDOUX & al., 1996a; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904. "Seine": LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880; BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1935b, 1936; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1898c, 1929. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a; LUCAS, 1875; SIMON, 1874a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière: DENIS, 1953b. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Clôture: BRAUD & al., 2005.



Forêt : DENIS, 1960a ; LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et lièges : BOSMANS & al., 1985a. Forêt d'épicéas : LEDOUX & al., 1996b. Forêt de chênes-lièges : BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes : BIGOT & al., 1987a. Forêt de feuillus : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins : DENIS, 1962b ; MÜLLER, 1985. Forêt, clairière : DOIGNON, 1976. Friche : LEBORGNE & al., 1998 ; SIMON, 1874a. Garrigue : LOPEZ, 1975. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Gorge humide, mousses : BOSMANS & al., 1985a. Haie : BRAUD & al., 2005. Lisière de forêt : LE PERU, 2004 ; ROSELLE, 1887. Littoral, taillis de chênes-verts : BIGOT, 1993. Marécage : LANCELEVÉE, 1884. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Mélèzes : LEDOUX & al., 1996b. Rhododendrons : DENIS, 1953a. Sous-bois : LEDOUX & al., 1996a. Sous-bois, dans un buisson de houx ; sur un coteau boisé : VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Avril : DENIS, 1962b. Mai : DENIS, 1936 ; LESSERT, 1904. Juin : DENIS, 1938a ; LESSERT, 1904. — *Femelle*. Mars : VEILLON, 1997. Avril : DENIS, 1962b. Mai : DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 2003 ; LESSERT, 1904. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 1997 ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a ; LESSERT, 1904. Juillet : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1960a ; LE PERU, 2004 ; MÜLLER, 1985. Septembre : LUCAS, 1875.

#### *Cyclosa insulana* (Costa, 1834)

*C. trituberculata*.

**Répartition.** Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1874a (*C. t.*), 1929 ; TIBERGHEN & al., 1993b. — Espagne, Italie. Méditerranée à Philippines, Australie. **Habitat.** Arbustes dans les endroits chauds : SIMON, 1929. Bruyères : CANARD, 1989. Lieux chauds : SIMON, 1874a. Plateau calcaire ; ruisseau à sec, juncs : CANARD, 1989. **Période.** — *Femelle*. Juillet, septembre : CANARD, 1989.

#### *Cyclosa oculata* (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Ain : SIMON, 1929 ; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes : SIMON, 1929. Aube : SIMON, 1874a, 1929. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c. Corse : SIMON, 1874a, 1929. Côtes-d'Armor : ROLLARD, 1990a. Eure : EMERIT & al., 2003 ; SIMON, 1929. Gironde : SIMON, 1929. Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990a. Indre-et-Loire, Jura, Landes : SIMON, 1929. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b ; SIMON, 1929. Loire-Atlantique : MURPHY, 1994. Orne : SIMON, 1874a, 1929. Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1929. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b. Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910 ; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : MULLER & al., 1895. "Seine" : SIMON, 1874a, 1929. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1929. Seine-et-Marne : SIMON, 1929. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord d'étang ; bord de mare : SIMON, 1929. Forêt : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1929. Friche : PASQUET & al., 1992. Jardin : SIMON, 1874a, 1929. Lagune : DENIS, 1950c. Marécage : EMERIT & al., 2003 ; MURPHY, 1994 ; VILLEPOUX, 1990b. Prairie : LEDOUX & al., 1999b ; PASQUET & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Juillet : SIMON, 1874a. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1950c ; LEDOUX & al., 1999b.

#### *Cyclosa sierrae* Simon, 1870

**Répartition.** Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1874a, 1929 ; TIBERGHEN & al., 1993b. — Espagne, Italie. De l'Europe à la Géorgie. **Habitat.** Arbustes ; bruyères et genévriers ; buissons : CANARD, 1989. Forêt : SIMON, 1874a. **Période.** — *Femelle*. Juillet : CANARD, 1989.

#### *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870)

*C. ixodoides* ; *C. tuberculifera* ; *C. tuberculiferum* ; *Peltosoma i.* ; *Peltosoma tuberculiferum*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BERLAND, 1926 (*C. tuberculiferum*) ; RODMAN, 1919 (*C. tuberculifera*) ; SIMON, 1929 (*C. i.*). Bouches-du-Rhône : SIMON, 1929 (*C. i.*). Corse : SIMON, 1874a (*P. i.*), 1874a (*P. t.*), 1929 (*C. i.*). Var : BECKER, 1880 (*P. t.*) ; BERLAND, 1926 (*C. tuberculiferum*) ; EMERIT, 1977 (*C. i.*) ; SIMON, 1929 (*C. i.*). — Espagne, Italie. Méditerranée à Géorgie, Madagascar. **Habitat.** Buissons et haies : SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle*. Juillet : EMERIT, 1977. — *Femelle*. Juillet : SIMON, 1929.

#### *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775)

*C. opuntiae*.

**Répartition.** Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1874a (*C. o.*), 1929 ; TIBERGHEN & al., 1993b. [SIMON, 1929 note : «*C. citricola* m'avait été envoyé une fois de Monaco, mais comme l'espèce n'y a jamais été revue depuis il est probable qu'il s'agissait d'une introduction accidentelle qui ne s'est pas maintenue »]. — Espagne, Italie. Ancien Monde, Haïti, Colombie. **Habitat.** Cactus ou aloès : SIMON, 1874a. Figuiers de barbarie : CANARD, 1989. Opuntias, agaves : SIMON, 1929. **Période.** — *Femelle*. Septembre : CANARD, 1989.

#### *Gibbaranea bituberculata* (Walckenaer, 1802)

*Araneus bituberculatus* ; *Araneus dromedarius* ; *Epeira dromedaria*.

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes : BECKER, 1882 (*E. d.*). Ardèche : LUCAS, 1870b (*E. d.*) ; RAPHAËL & al., 1992. Ariège : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1965 (*A. b.*) ; BIGOT & al., 1973 (*A. b.*), 1973 (*A. d.*) ; DENIS, 1954b (*A. b.*). Calvados : GUIBÉ, 1946 (*A. b.*). Dordogne : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*E. d.*) ; SIMON, 1899 (*A. d.*), 1909b (*A. d.*). Gard : CHANSIGAUD & al., 1994 (*A. b.*). Garonne (Haute-), Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Hérault : EMERIT & al., 1990. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979 (*A. b.*) ; ROLLARD, 1990a. Landes : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 (*A. b.*). Loire-Atlantique : DENIS, 1967e (*A. b.*) ; ROLLARD, 1990a. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Morbihan : ROLLARD, 1990a. Nord : GOULLIART, 1979a (*A. d.*). Orne : ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a (*A. b.*) ; DENIS, 1933b (*A. b.*). Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910 (*A. d.*). Rhin (Haut-) : SCHALLER, 2000. Sarthe : ROLLARD, 1990a. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904 (*A. d.*), 1910 (*A. d.*). "Seine" : COCQUEMPOT & al., 1991 (*A. b.*) ; ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*A. d.*). Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Var : BEC-



KER, 1880 (*E. d.*); BIGOT & *al.*, 1987a (*A. b.*); DENIS, 1935b (*A. b.*), 1937a (*A. b.*); KOVOOR & *al.*, 2000; PONEL & *al.*, 1993 (*A. b.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b (*A. b.*), 1963c (*A. b.*), 1965c (*A. b.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. b.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1967e; GOULLIART, 1979a. Bord d'étang: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Buissons: GOULLIART, 1979a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Dune: DENIS, 1962b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Garrigue calcaire: EMERIT & *al.*, 1990. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & *al.*, 1973, 1973. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Lande: VEILLON, 1997. Lande sèche: CANARD, 1979. Lieux découverts, arbustes: SIMON, 1929. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse calcaire: BOSMANS & *al.*, 1985a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Sous-bois: VEILLON, 1997. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: LESSERT, 1904, 1910. Juin: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1933b, 1962b; LESSERT, 1904, 1910.

### *Gibbaranea gibbosa* (Walckenaer, 1802)

*Araneus gibbosus*; *Epeira g.*

**Répartition.** Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1874a (*E. g.*), 1929 (*A. g.*). Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990a. Eure: SIMON, 1899 (*A. g.*), 1909b (*A. g.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*E. g.*). Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*A. g.*); MARC, 1990b; ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*E. g.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*A. g.*). Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911 (*A. g.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a (*A. g.*); DENIS, 1933b (*A. g.*); LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*E. g.*); REIBER, 1880 (*E. g.*). "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991 (*A. g.*); LUCAS, 1875 (*E. g.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*E. g.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*E. g.*). Var: DENIS, 1936 (*A. g.*); KOVOOR & *al.*, 2000. Vendée: DENIS, 1962b (*A. g.*), 1963c (*A. g.*), 1964b (*A. g.*). — Presque toute la France: SIMON, 1929 (*A. g.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bois: BRAUD & *al.*, 2005; LUCAS, 1875; SIMON, 1874a. Bois de conifères: SIMON, 1929. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Dune, oyats secs: DENIS, 1964b. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1963c; ROSELLE, 1888b. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: DENIS, 1938a. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Pins: VEILLON,

1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b, 1936. Juin: LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Juillet: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1933b, 1936, 1938a. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1874a. Juillet: VEILLON, 1997. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon.* Juillet: SIMON, 1874a.

### *Gibbaranea omoeda* (Thorell, 1870)

*Araneus omoedus.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Corse: SIMON, 1929 (*A. o.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Orientales, Vosges: SIMON, 1929 (*A. o.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (BOSMANS & *al.*, 1986). **Habitat.** Forêt de conifères: SIMON, 1929.

### *Gibbaranea ullrichi* (Hahn, 1835)

*Araneus u.*; *Epeira u.*

**Répartition.** Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. u.*). Isère, "Seine": SIMON, 1874a (*E. u.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. u.*). Allemagne, Espagne, Suisse. Europe, Russie, Asie Centrale.

### *Hyposinga albovittata* (Westring, 1851)

*Araneus albovittatus*; *Hyposinga a.*; *Singa a.*; *Singa albovittatus.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1874a (*S. a.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1874a (*S. a.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997 (*H. a.*). Hérault: EMERIT & *al.*, 1990 (*H. a.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b (*H. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c (*S. a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1996a (*S. a.*). Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*A. a.*), 1910 (*S. albovittatus*). "Seine": SIMON, 1874a (*S. a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*S. a.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1898b. Var: BECKER, 1880 (*S. a.*); DENIS, 1934a (*A. a.*), 1937a (*A. a.*). Vendée: DENIS, 1964b (*S. a.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Afrique du Nord, Russie, Ukraine. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Garrigue calcaire: EMERIT & *al.*, 1990. Genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Jardin: LE PERU, 2004. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Prés sablonneux: SIMON, 1874a. Rochers: DENIS, 1955c. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1874a. Juillet: SIMON, 1874a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin: LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1955c.

### *Hyposinga heri* (Hahn, 1831)

*Araneus h.*; *Hyposinga h.*; *Singa h.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*S. h.*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003 (*H. h.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*S. h.*). Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*S. h.*); ROLLARD, 1990a. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Oise: SIMON,

1887a (*S. h.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*S. h.*); PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895 (*S. h.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*S. h.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1874a (*S. h.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*S. h.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Presque toute la France: SIMON, 1929 (*A. h.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Ancienne carrière d'argile: VEILLON, 1997. Bord de l'eau: SIMON, 1929. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; MURPHY, 1994; VILLEPOUX, 1990b. Près de l'eau: SIMON, 1874a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai: EMERIT & *al.*, 2003. — *Femelle.* Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: VEILLON, 1997. Novembre: LEDOUX, 2000.

### *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831)

*Araneus pygmaeus*; *Hyposinga p.*; *H. pygmaeus*; *Singa p.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: LUCANTE, 1880b (*S. p.*). Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*S. p.*). Eure: EMERIT & *al.*, 2003 (*Hyposinga p.*). Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*S. p.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes, Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*S. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Oise: SIMON, 1887a (*S. p.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999 (*Hyposinga p.*). Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*S. p.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*A. p.*); PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895 (*S. p.*). "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*S. p.*); SIMON, 1898b (*H. p.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*S. p.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Prairie humide: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: EMERIT & *al.*, 1999.

### *Hypsosinga sanguinea* (C. L. Koch, 1844)

*Araneus sanguineus*; *Hyposinga s.*; *Singa s.*; *Singa sanguineus*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*S. s.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*A. s.*); SIMON, 1874a (*S. s.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997 (*H. s.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*S. s.*). Gironde: LUCANTE, 1880b (*S. s.*); SIMON, 1874a (*S. s.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*S. s.*); SIMON, 1874a (*S. s.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b (*H. s.*). Lot: LUCANTE, 1880b (*S. s.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: ROLLARD, 1990a. Oise: SIMON, 1887a (*S.*

*s.*). Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999 (*H. s.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*S. sanguineus*); PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895 (*S. s.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*A. s.*), 1910 (*S. sanguineus*). "Seine": ROLLARD, 2000 (*H. s.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*S. s.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*S. s.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. s.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Jardin: LE PERU, 2004. Littoral, marais salé: PÉTHLON & *al.*, 2004. Marécage: ROSELLE, 1888b; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Prairie calcaire: EMERIT & *al.*, 1999. Près marécageux: SIMON, 1874a. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Femelle.* Juin: EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997.

### *Larinia lineata* (Lucas, 1846)

*Araneus lineatus*.

**Répartition.** Ardèche: SIMON, 1929 (*A. l.*). Corse: SIMON, 1874a, 1929 (*A. l.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1999a. — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Berges: SIMON, 1929. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & *al.*, 1999a. Sur une berge humide: SIMON, 1874a. Talus sableux: SIMON, 1929. **Période.** — *Mâle.* Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a. — *Femelle.* Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a.

### *Larinioides cornutus* (Clerck, 1757)

*Araneus c.*; *Epeira cornuta*.

**Taxonomie.** La synonymie de *Larinioides cornutus*, *L. folium* et *L. suspicax* est assez complexe. SIMON, 1929 reconnaît deux espèces: *Araneus cornutus* Clerck et *A. suspicax* O. P.-Cambridge, et indique la synonymie: *A. folium* Schrank = *A. cornutus*, avec les répartitions «Toute la France» pour *A. cornutus* et «Midi de la France» pour *A. suspicax*. THALER, 1974 sépare les deux espèces *A. folium* Schrank (= *A. suspicax*) et *A. cornutus*. Il indique: «In the western palaeartic region there seem to exist two species: *A. cornutus* Clerck, distributed more in the North (Iceland to Kamtschatka), and *A. folium* Schrank (= *A. suspicax* (O. P.-Camb.)) occurring in the Mediterranean region, SE, E-Central-Europe and Russia». GRASSHOFF, 1983, transférant les espèces du groupe *cornutus* dans le genre *Larinioides*, sépare aussi les deux espèces *L. folium* (= *Epeira suspicax*) et *L. cornutus*. LEVY, 1998a, considérant la confusion existant au sujet du nom *folium* Schrank, indique: «Definite distinction between *cornutus* and its closely resembling species was rendered by O. P.-Cambridge (1876) who deliberately avoided the old inextricable confusing names and selected a new one, *suspicax*», et il ajoute: «The two names, *cornutus* and *suspicax*, are those that are recognized in France rather than the old controversial names *folium* and *foliata*, which should be considered *nomina dubia*». Devant cette situation confuse, les données sont ici placées sous les noms utilisés dans les travaux originaux, c'est-à-dire *L. cornutus* et *L. folium*, avec la synonymie *L. suspicax* = *L. folium* pour la citation de SIMON, 1929. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: LUCANTE, 1880b (*E. c.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*A. c.*); DENIS, 1954b (*A. c.*); PETIT & *al.*, 1945 (*A. c.*). Calvados: ASSE-

LIN & al., 1989 (A. c.); GUIBÉ, 1946 (A. c.); KERVILLE, 1898 (A. c.). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (A. c.); ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (E. c.). Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (E. c.). Finistère: DENIS, 1938a (A. c.), 1939a (A. c.); ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (E. c.). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (E. c.). Loir-et-Cher: HENRY, 1981 (A. c.); HILLYARD, 1975 (A. c.); LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (E. c.). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924 (A. c.); LUCAS, 1878b (E. c.); PÉTILLON & al., 2004. Marne: LUCAS, 1878a (E. c.). Morbihan: ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1979a (A. c.). Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (A. c.), 1955c (A. c.); LUCANTE, 1880b (E. c.). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (E. c.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (A. c.); DENIS, 1933b (A. c.), 1952c (A. c.); LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (A. c.). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (E. c.); SCHALLER, 2000. "Seine": LUCAS, 1875 (E. c.); SIMON, 1874a (E. c.). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (E. c.). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (A. c.). Somme: ROSELLE, 1887 (E. c.). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (E. c.). Var: BECKER, 1880 (E. c.); BIGOT, 1993 (A. c.); DENIS, 1937a (A. c.). Vendée: DENIS, 1962b (A. c.), 1963c (A. c.), 1965c (A. c.); ROLLARD, 1990a. Vienne: DUREPAIRE & al., 1994. — Toute la France: SIMON, 1929 (A. c.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Bois: LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bord d'étang: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1938a, 1952c; PETIT & al., 1945; VEILLON, 1997. Bord de mer, ancien parc à huîtres: KERVILLE, 1898. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de ruisseau: LUCAS, 1878a, 1878b; VEILLON, 1997. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Fossé: BERLAND, 1924; GOULLIART, 1979a. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005; ROSELLE, 1887. Lac tourbeux: DENIS, 1950b. Lande humide: DUREPAIRE & al., 1994. Lieux humides: DENIS, 1962b. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 1999, 2003; HENRY, 1981; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie humides, au bord des cours d'eau ou des marais: SIMON, 1874a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Pré humide, bord de l'eau: SIMON, 1929. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Sous-bois, zone humide: VEILLON, 1997. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1965. Tourbière: DENIS, 1952c; EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. **Période.** — **Mâle.** Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1962b, 1965c; EMERIT & al., 2003; VEILLON, 1997. Juin: LEDOUX & al., 2002. Juillet: CANARD, 1989. Août: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003; VEILLON, 1997. — **Femelle.** Février: EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT &

al., 2003; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1933b, 1938a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1950b, 1952c, 1955c; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1878a, 1878b; VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1999, 2003; LUCAS, 1875; VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & al., 2002. — **Femelle avec cocon.** Juillet: DENIS, 1939a, 1952c. Août: DENIS, 1952c.

#### *Larinioides folium* (Schrank, 1803)

*Araneus f.*; *Araneus suspicax*; *L. suspicax*.

**Taxonomie.** Voir la note sous *L. cornutus*. **Répartition.** Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: REHFELDT, 1992. Corse: GRASSHOFF, 1983. Gard: EMERIT & al., 1994. Hérault: LOPEZ, 1976 (A. f.). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-), Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (A. f.). Var: KOVOOR & al., 2000. — Extrême Midi de la France: SIMON, 1929 (A. s.). Allemagne, Espagne, Italie (L. s.). De la Méditerranée à l'Asie Centrale (L. s.). **Habitat.** Bord de canal: REHFELDT, 1992. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Friche sèche: LOPEZ, 1976. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins; murs et tamaris: EMERIT & al., 1994. Prairie sèche et caillouteuse: DELFOSSE, 2000b. *Salicornietum*: EMERIT & al., 1994. **Période.** — **Mâle.** Avril: GRASSHOFF, 1983; LESSERT, 1910. Octobre: EMERIT & al., 1994. — **Femelle.** Avril: GRASSHOFF, 1983. Octobre: EMERIT & al., 1994. — **Femelle avec cocon.** Juin: DELFOSSE, 2000b.

#### *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757)

*Araneus ocellatus*; *Araneus p.*; *Epeira patagiata*; *L. ocellatus*.

**Taxonomie.** L'espèce *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757) est citée sous le nom *ocellatus* (Clerck, 1757) par de nombreux auteurs. Il ne semble pas exister d'arguments en faveur de l'un ou l'autre nom. **Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1961b (A. o.); LUCANTE, 1880b (E. p.). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b (A. o.). Calvados: GUIBÉ, 1946 (A. o.). Dordogne: LUCANTE, 1880b (E. p.). Eure: EMERIT & al., 2003. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (A. o.); LUCANTE, 1880b (E. p.). Gers, Gironde, Landes: LUCANTE, 1880b (E. p.). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (A. p.). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (E. p.). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990a (L. o.). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (A. o.), 1955c (A. o.), 1960a (A. o.); LUCANTE, 1880b (E. p.). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (A. o.); LUCANTE, 1880b (E. p.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (A. p.); DENIS, 1933b (A. o.), 1952c (A. o.), 1967d (A. o.). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (A. p.). Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895 (E. p.). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (L. o.), 1996c (L. o.). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (E. p.). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (A. p.). Somme: ROSELLE, 1887 (E. p.). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (E. p.). Var: DENIS, 1933a (A. o.). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (L. o.). Yonne: LUCAS, 1872 (E. p.). — Toute la France: SIMON, 1929 (A. o.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à

2190 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Bois: BRAUD & al., 2005. Bois, clairière: SIMON, 1929. Bord d'étang: DENIS, 1952c, 1954b. Bord d'étang, sur un rosier; bord de l'eau, sur un chêne: VEILLON, 1997. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Clôture: BRAUD & al., 2005. Conifères: HILLYARD, 1975. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: LENICE, 1992. Marécage: EMERIT & al., 2003. Rhododendrons: DENIS, 1957a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Rochers humides, anfractuosités: DENIS, 1954a. Verger: HILLYARD, 1975. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1933b, 1952c, 1955c. Août: DENIS, 1952c. Septembre: DENIS, 1950b; EMERIT & al., 2003. Octobre: LEDOUX & al., 2002. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1967d; LEDOUX, 2000. Juin: VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1933b, 1952c, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1952c. Septembre: DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & al., 2002.

*Larinioides sclopetarius* (Clerck, 1757)

*Araneus s.*; *Araneus sericatus*; *Epeira hygrophila*; *Epeira sclopetaria*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. s.*). Ardèche: LUCAS, 1870b (*E. s.*). Ariège: LUCANTE, 1880b (*E. s.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b (*A. sericatus*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*A. sericatus*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Dordogne, Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. s.*). Hérault: LOPEZ, 1975 (*A. sericatus*). Landes, Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. s.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*A. sericatus*), 1955c (*A. sericatus*); LUCANTE, 1880b (*E. s.*). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*E. s.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*A. sericatus*), 1952c (*A. sericatus*); LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. "Seine": SIMON, 1874a (*E. s.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*E. s.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*A. s.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*E. s.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. s.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. sericatus*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2220 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Arches des ponts et des écluses: SIMON, 1874a (*E. h.*). Bord d'étang: DENIS, 1952c; VEILLON, 1997. Bord de l'eau: SIMON, 1929. Bord de lac, rhododendrons: DENIS, 1950b. Bord de ruisseau, dans la végétation dense: LOPEZ, 1975. Bord de torrent: DENIS, 1955c. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Jardin: VEILLON, 1997. Rhododendrons: DENIS, 1952c. Rivière, sur un pont: LEDOUX & al., 1996a. Sous les écorces: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1950b. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1955c. Août: DENIS, 1952c. Septembre: VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1952c.

*Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)

*Araneus acalyphus*; *Epeira a.*; *Meta a.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*E. a.*), 1882 (*E. a.*). Alpes-de-

Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1874a (*E. a.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; KABOUCHE & al., 1997. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; O'NEIL, 1979. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*M. a.*); ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909b. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Garonne (Haute-), Gers: LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Gironde: DENIS, 1951b, 1952a; LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Hérault: EMERIT & al., 1997. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979; DENIS, 1940a; ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1953a; LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b, 1957a, 1959d; LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880 (*E. a.*); MULLER & al., 1895 (*E. a.*); REIBER, 1880 (*E. a.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1875 (*E. a.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*E. a.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976 (*A. a.*). Somme: ROSELLE, 1888a (*E. a.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Var: BECKER, 1880 (*E. a.*); BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1933a, 1934a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2310 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1999a. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: DENIS, 1938a, 1957a, 1959d, 1967e; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de ruisseau: VEILLON, 1997. Bord de ruisseau, pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Carrière de pierres à chaux: BOSMANS & al., 1985a. Carrière, herbes sèches: VEILLON, 1997. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés:

DENIS, 1951b. Formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt : DENIS, 1963c. Forêt de chênes : MÜLLER, 1985. Forêt de chênes-lièges : BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes : BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts : CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins : DENIS, 1962b, 1964b; MÜLLER, 1985. Forêt de pins clairsemée : KABOUCHE & al., 1997. Forêt de pins sur dune : DUFFEY, 1964. Forêt de résineux, allée : VEILLON, 1997. Forêt, buissons : DOIGNON, 1976. Friche : PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts : CHANSIGAUD & al., 1994. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Haie : BRAUD & al., 2005. Jardin : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lande : DENIS, 1941; VEILLON, 1997. Lande sèche : CANARD, 1979. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lande à *Ulex* : LUCAS, 1871a. Lieux secs et découverts : SIMON, 1874a. Lieux secs et découverts, buissons : SIMON, 1929. Littoral, dans la végétation sèche : CLARK & al., 1970. Littoral, taillis de chênes-verts : BIGOT, 1993. Marécage : BELIN, 2001; VILLEPOUX, 1990b. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Pelouse calcaire : BOSMANS & al., 1985a. Pelouse sèche : BRAUD & al., 2005. Pelouse à *Brachypodium* : LEDOUX & al., 1996a. Prairie : LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002, 2003; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Ripisilve : LEDOUX & al., 2002. Sous-bois : LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Sur *Cistus monspelliensis* : CANARD, 1989. Sur un buisson : CHANSIGAUD, 1992. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Tamaris et roseaux : KOVOOR & al., 2000. Tourbière : EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Avril : CLARK & al., 1970; VEILLON, 1997. Mai : DENIS, 1933b, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000; SIMON, 1874a. Juin : DENIS, 1933b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a. Août : DENIS, 1953a. Septembre : VEILLON, 1997. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1933b, 1965c, 1967e. Juin : CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1938a, 1941; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997. Juillet : CORNIC, 1978; DENIS, 1959d, 1964b; MÜLLER, 1985. Août : CANARD, 1989; DENIS, 1957a. Septembre : DENIS, 1964b; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Juin : DENIS, 1933b.

*Nemoscolus lauræ* (Simon, 1868)

*Cyclosa l.*; *Nemoscolus l.*; *Singa l.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1929 (*N. l.*). Ardèche : LUCAS, 1870b (*S. l.*); SIMON, 1874a (*C. l.*), 1929 (*N. l.*). Aude : SIMON, 1929 (*N. l.*). Hérault : LOPEZ, 1975 (*N. l.*); SIMON, 1929 (*N. l.*). Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b (*N. l.*); LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1929 (*N. l.*). Var : KABOUCHE & al., 1997 (*N. l.*). Vaucluse : SIMON, 1874a (*C. l.*), 1929 (*N. l.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Altitude.** 480 m (KABOUCHE & al., 1997). **Habitat.** Forêt de chênes-verts : LEDOUX & al., 2003. Forêt à *Quercus* sur plateau calcaire : KABOUCHE & al., 1997. Garrigue calcaire : LOPEZ, 1975. **Période.** — *Mâle*. Mai : DENIS, 1933b. Juin : SIMON, 1874a. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1933b. Juin : SIMON, 1874a. Juillet, août : LEDOUX & al., 2003. — *Femelle avec cocon*. Juillet : SIMON, 1874a.

*Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802)

*Aranea adiantus*; *Araneus a.*; *Araneus adiantum*; *Araneus adiantus*; *Araneus byzanthina*; *Epeira a.*; *N. adiantum*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : MÜLLER, 1985 (*N. a.*). Ariège : DENIS, 1960a (*Araneus adiantum*), 1961b (*Araneus adiantum*); LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Aube : SIMON, 1874a (*E. a.*). Aude : DELFOSSE, 2000b. Calvados : GUIBÉ, 1946 (*Araneus a.*). Charente-Maritime : BELIN, 2001 (*N. a.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : O'NEIL, 1979 (*Aranea adiantus*); SIMON, 1874a (*E. a.*), 1929 (*Araneus a.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a (*Araneus a.*); ROLLARD, 1990a. Dordogne : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Eure : EMERIT & al., 2003 (*N. a.*). Finistère : DENIS, 1938a (*Araneus a.*), 1940a (*Araneus a.*); ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-) : KERVILLE, 1932 (*Araneus adiantus*); LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Hérault : LOPEZ, 1976 (*Araneus adiantum*). Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990a. Jura : LESSERT, 1910 (*Araneus adiantus*). Landes : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b (*N. a.*). Loire-Atlantique : LUCAS, 1882a (*E. a.*); ROLLARD, 1990a. Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997 (*N. a.*). Manche : KERVILLE, 1900 (*Araneus a.*); PÉTILLON & al., 2004. Morbihan, Orne : ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999 (*N. a.*). Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b (*Araneus a.*); LEDOUX, 1993 (*N. a.*); LEDOUX & al., 1996a (*N. a.*). Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992 (*Araneus adiantus*). Rhin (Haut-) : BLICK, 2000; SCHALLER, 2000 (*N. a.*). "Seine" : COCQUEMOT & al., 1991 (*Araneus adiantus*); ROLLARD, 2000 (*N. a.*); SIMON, 1874a (*E. a.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*E. a.*). Seine-et-Marne : SIMON, 1898b (*Araneus a.*). Somme : ROSELLE, 1891 (*E. a.*). Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*E. a.*). Var : DENIS, 1934a (*Araneus a.*), 1937a (*Araneus a.*); GROS, 1983b (*Araneus adiantum*); KOVOOR & al., 2000; LEDOUX, 1973b (*A. b.*). Vaucluse : LEDOUX, 1973b (*A. b.*). Vendée : DENIS, 1941 (*Araneus a.*); ROLLARD, 1990a. — Centre et Midi de la France : SIMON, 1929 (*Araneus a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1720 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois : DENIS, 1941. Bord d'étang, arbustes : VEILLON, 1997. Bord de route, touffes d'*Atriplex halimus* : LUCAS, 1882a. Bord de ruisseau : DENIS, 1941; LOPEZ, 1976. Carrière de calcaire : VEILLON, 1997. Champ de céréales : COCQUEMOT & al., 1991. Clôture : BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Dune : KERVILLE, 1900. Forêt de chênes : MÜLLER, 1985. Friche : VEILLON, 1997. Garrigue : LOPEZ, 1976. Haie : BRAUD & al., 2005. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Marécage : BELIN, 2001; DENIS, 1938a; EMERIT & al., 2003. Pelouse : SCHALLER, 2000. Prairie : PASQUET & al., 1992. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Talus, bord de champ cultivé : ROSELLE, 1891. Tamaris et roseaux : KOVOOR & al., 2000. **Période.** — *Mâle*. Mai : DENIS, 1934a. Juin : DENIS, 1941. Juillet : DENIS, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985. Septembre : LE PERU, 2004. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1934a. Juin : DELFOSSE, 2000b; DENIS, 1941. Juillet : DENIS,

1938a, 1960a; GROS, 1983b; MÜLLER, 1985; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX, 1993; LUCAS, 1882a; VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1874a.

*Neoscona subfusca* (C. L. Koch, 1837)

*Araneus dalmaticus*; *Epeira dalmatica*; *N. dalmatica*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*E. d.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*E. d.*). Corse: CANARD, 1989 (*N. d.*); SIMON, 1874a (*E. d.*), 1929 (*A. d.*). Gard: EMERIT & al., 1994 (*N. d.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Hérault: LOPEZ, 1976 (*A. d.*). Lot: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1874a (*E. d.*). Tarn: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Var: BECKER, 1880 (*E. d.*); DENIS, 1935b (*A. d.*); GROS, 1983b (*A. d.*); SIMON, 1874a (*E. d.*). — Midi de la France: SIMON, 1929 (*A. d.*). Espagne, Italie, Suisse. Ancien Monde. **Habitat.** Arbustes: CANARD, 1989. Bois: SIMON, 1874a. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Haie: SIMON, 1874a, 1929. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. **Période.** — *Femelle*. Juillet: GROS, 1983b.

*Nuctenea corticalis* (Simon, 1874)

*Araneus c.*; *Araneus corticaloides*; *Epeira c.*

**Taxonomie.** Cette espèce est placée dans le genre *Nuctenea* par CANARD, 2005. Elle a été décrite sous le nom *Epeira corticalis* par SIMON, 1874. Ce nom étant préoccupé par *Aranea corticalis* Walckenaer, 1802 selon ROWER, 1942, l'espèce est renommée *Araneus corticaloides*. Mais ce changement de nom n'est pas justifié, l'espèce décrite par Walckenaer ayant été transférée dans le genre *Clubiona* en 1805. **Répartition.** Corse: SIMON, 1874a (*E. c.*), 1929 (*A. c.*); TIBERGHEN & al., 1993a. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Buisson sec: SIMON, 1929. Maquis: TIBERGHEN & al., 1993a. Sur un buisson sec: SIMON, 1874a.

*Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757)

*Araneus umbraticus*; *Epeira thomisoides*; *Epeira u.*; *Epeira umbraticola*.

**Répartition.** Aisne: GROS, 2004. Ariège: DENIS, 1961b (*A. u.*); LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*A. u.*); LUCAS, 1874c (*Epeira u.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: JUBERTHIE, 1954 (*A. u.*); LE PERU, 2004. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909b (*A. u.*). Finistère: ROLLARD, 1990a. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*). Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*A. u.*); MARC, 1990b; ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*); SIMON, 1874a (*E. t.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b (*Epeira u.*). Mayenne: ROLLARD, 1990a. Morbihan: DENIS, 1938a (*A. u.*); ROLLARD, 1990a. Nord: GOULLIART, 1979a (*A. u.*). Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*A. u.*); LEDOUX

& al., 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; MULLER & al., 1895 (*Epeira u.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*Epeira u.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*Epeira u.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*A. u.*); SIMON, 1898b (*A. u.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*Epeira u.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Epeira u.*). Var: BIGOT & al., 1987a (*A. u.*), 1988 (*A. u.*); DENIS, 1933a (*A. u.*), 1936 (*A. u.*), 1937a (*A. u.*); GROS, 1983b (*A. u.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970 (*A. u.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*Epeira umbraticola*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. u.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: BRAUD & al., 2005; LUCAS, 1875. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bâtiment: VEILLON, 1997. Clôture: BRAUD & al., 2005. Clôtures: LUCAS, 1878b. Coteau calcaire à genévriers, sous écorce: EMERIT & al., 1999. Fissures de poteaux: DENIS, 1933b. Fissures des vieux murs: LUCAS, 1878b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Genêts: LEDOUX & al., 1996a. Haies sèches: SIMON, 1874a. Jardin: GOULLIART, 1979a; LE PERU, 2004; ROSELLE, 1887. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Littoral, sous l'écorce soulevée d'un tronç de chêne: SIMON, 1874a. Maison: BRAUD & al., 2005. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003. Palissades: SIMON, 1874a. Pelouse: SCHALLER, 2000. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, troncs d'arbres: LEDOUX, 2000. Sous les écorces: DENIS, 1933b; LUCAS, 1878b. Sous les écorces des arbres: LUCAS, 1874c. Sur un poteau: VEILLON, 1997. Troncs d'arbres: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Juin: VEILLON, 1997. Août: LUCAS, 1878b; VEILLON, 1997. Septembre: CLARK & al., 1970; LE PERU, 2004. — *Femelle*. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2003. Mai: DENIS, 1936, 1938a; SIMON, 1874a. Juin: LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1961b; GROS, 1983b. Août: LUCAS, 1878b; VEILLON, 1997. Septembre: LE PERU, 2004; LUCAS, 1875. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1874a.

*Singa aussereri* Thorell, 1873

*Araneus rufulus*; *Hypsosinga a.*; *S. rufula*.

[THALER & al., 2003 considère cette espèce "species inquirenda" sans présenter d'arguments]. **Répartition.** Aube, Corse: SIMON, 1874a (*S. r.*). Oise: SIMON, 1880a (*S. r.*), 1887a (*S. r.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*A. r.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1880a (*S. r.*). — Presque toute la France: SIMON, 1929 (*A. r.*). Italie (*H. a.*). Europe. **Habitat.** Bord de la mer, sur un ciste; lieux secs: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1933b; SIMON, 1874a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1933b; SIMON, 1874a.

*Singa hamata* (Clerck, 1757)

*Araneus hamatus*; *S. hamatus*.

**Répartition.** Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a. Gers: LUCANTE, 1880b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loi-

ret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a. Nord: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*S. h.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*S. h.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910 (*S. h.*); MULLER & al., 1895; SCHALLER, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: DENIS, 1937a; SIMON, 1929 (*A. h.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1929 (*A. h.*). — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. h.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois: LUCAS, 1878a. Bord d'étang: LEDOUX, 2000; SIMON, 1929. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Champ: ROSELLE, 1888b. Forêt: DOIGNON, 1976. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Forêt, endroits humides: LANCELEVÉE, 1884. Friche: PASQUET & al., 1992. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Marais salant: SIMON, 1929. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888b. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Près de l'eau: SIMON, 1874a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Rivière asséchée, herbes: VEILLON, 1997. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: SIMON, 1929. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1967e; LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Août: LUCAS, 1878a. Septembre: DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: SIMON, 1929. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1874a.

*Singa lucina* (Sav. & Aud., 1825)

*Araneus l.*

**Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1929 (*A. l.*). — Espagne. De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat.** Bord d'étang: SIMON, 1929.

*Singa neta* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Araneus decorus.*

**Répartition.** Aude: SIMON, 1929 (*A. d.*). — Espagne. Méditerranée. **Habitat.** Marais salant: SIMON, 1929.

*Singa nitidula* C. L. Koch, 1844

*Araneus nitidulus*; *S. nitidulus.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: LUCANTE, 1880b. Cher: DENIS, 1943b. Dordogne, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*S. n.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*A. n.*), 1910 (*S. n.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Toute la France: SIMON, 1929 (*A. n.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Près de l'eau: SIMON, 1874a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 2000. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1874a.

*Singa semiatra* L. Koch, 1867

*Araneus semiater.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1929 (*A. s.*). — Italie. Méditerranée, Ukraine. **Habitat.** Roseaux: SIMON, 1929.

*Siwa dufouri* (Simon, 1874)

*Araneus d.*; *Larinia d.*

**Taxonomie.** L'espèce *Araneus dufouri* (Simon, 1874) a été transférée dans le genre *Siwa* par LEVY, 1986. **Répartition.** Alpes-Maritimes, Ardèche, Corse: SIMON, 1929 (*A. d.*). Vaucluse: SIMON, 1874a (*L. d.*), 1929 (*A. d.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Sous une pierre: SIMON, 1874a. **Période.** — *Femelle.* Novembre: SIMON, 1874a.

*Zilla diodia* (Walckenaer, 1802)

*Araneus d.*; *Araneus diodius*; *Epeira d.*

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991; VILLEPOUX, 1990b. Aisne: GROS, 2004. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. d.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b (*E. d.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; O'NEIL, 1979. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*E. d.*); SIMON, 1899 (*A. d.*), 1909b (*A. d.*). Finistère: ROLLARD, 1990a. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990a. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b; LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*A. diodius*). "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*A. diodius*). Somme: ROSELLE, 1888a (*E. d.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*E. d.*). Var: BECKER, 1880 (*E. d.*); BIGOT, 1993; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b, 1936, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*A. d.*). Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c, 1966a; DUFFEY, 1964. — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De la Méditerranée à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arbustes: CANARD, 1989. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: BRAUD & al., 2005; CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1938a, 1941, 1960a; SIMON, 1874a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: CHANSIGAUD,



1991. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Buissons: CANARD, 1989; SIMON, 1929. Bâtiment: DENIS, 1966a. Bétulaie: EMERIT & al., 2003. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1941, 1962b; DUFFEY, 1964. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Forêt de pins sur dune: DUFFEY, 1964. Forêt de pins, herbes: CANARD, 1989. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994; RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: BRAUD & al., 2005; ROSELLE, 1888a. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lande: VEILLON, 1997. Lieux frais, herbes: LUCAS, 1877b. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis: CANARD, 1989. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; VILLEPOUX, 1990b. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1934a, 1936, 1965c; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1964b, 1965c; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1874a. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a, 1965c; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1965c; EMERIT & al., 1997; GROS, 2004; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1954a, 1963c, 1966a; LE PERU, 2004. Août: DENIS, 1963c. Septembre: DENIS, 1963c; LUCAS, 1877b.

*Zygiella atrica* (C. L. Koch, 1845)

*Xylla a.*; *Zilla a.*

**Répartition.** Ariège: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*Z. a.*). Corse: CANARD, 1989. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*Z. a.*); ROLLARD, 1990a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Eure: EMERIT & al., 2003. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: ROLLARD, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*Z. a.*); REIBER, 1880 (*Z. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*Z. a.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*Z. a.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*X. a.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*Z. a.*). — Toute la France: SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie (USA, Canada, introduit). **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Arbres sempervirens: SIMON, 1874a. Blocs de rochers, interstices: DENIS, 1954a. Conifères: SIMON, 1929. Coteau calcaire

à genévriers: EMERIT & al., 1999. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Lande: LUCAS, 1870d. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Maison: BRAUD & al., 2005. Maquis: CANARD, 1989. Marécage: EMERIT & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Juin: VEILLON, 1997. Septembre: CANARD, 1989; EMERIT & al., 1999, 2003; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1954a. Août: LUCAS, 1870d. Septembre: CANARD, 1989; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a.

*Zygiella kochi* (Thorell, 1870)

*Leviellus k.*; *Xylla k.*; *Zilla k.*

[Nommée *Leviellus kochi* dans CANARD, 2005].

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*Z. k.*); SIMON, 1874a (*Z. k.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*Z. k.*). Corse: SIMON, 1874a (*Z. k.*), 1929. Landes: LUCANTE, 1880b (*X. k.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. Seine-et-Marne: SIMON, 1880a (*Z. k.*). Var: DENIS, 1935b. — Midi de la France: SIMON, 1929. Espagne, Italie. Europe du Sud, Afrique du Nord, Asie Centrale. **Habitat.** Arbres: SIMON, 1929. Sur l'écorce des vieux chênes: SIMON, 1880a. **Période.** — *Femelle*. Juillet: LEDOUX & al., 2003.

*Zygiella montana* (C. L. Koch, 1834)

*Parazygiella m.*; *Xylla m.*; *Zilla alpina*; *Zilla m.*

[Nommée *Parazygiella montana* dans CANARD, 2005]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1874a (*Z. m.*). Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*Z. m.*). Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: LUCAS, 1870d (*Z. m.*). Finistère: LUCAS, 1868 (*Z. m.*). Isère: SIMON, 1874a (*Z. m.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a; LUCANTE, 1880b (*X. m.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1961b, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*Z. a.*). — Cévennes, Alpes, Pyrénées: SIMON, 1929. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (DENIS, 1967d). **Habitat.** Bâtiment: DENIS, 1955c. Conifères: SIMON, 1929. Éboulis: LEDOUX & al., 1996a. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de mélèzes: LEDOUX & al., 1996c. Gros blocs de rochers: DENIS, 1953a. Lande: LUCAS, 1870d. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Maison: SIMON, 1874a. Marécage: LEDOUX & al., 1996a. Murs extérieurs de bâtiment: DENIS, 1950b. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Rochers: SIMON, 1874a. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1950b, 1957a. Sous des écorces de pins: DENIS, 1960a, 1961b. Sous une pierre: LUCAS, 1868. Sur le tronc des vieux arbres: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Juillet: LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1874a. Août: DENIS, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1874a. — *Femelle*. Juin: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1950b, 1955c, 1957a, 1960a; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1874a. Août: DENIS, 1953a, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1868, 1870d; SIMON, 1874a. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1957a.

*Zygiella stroemi* (Thorell, 1870)

*Stroemiellus s.*; *Zilla s.*

[Nommée *Stroemiellus stroemi* dans CANARD, 2005]. **Répartition.** Aube: SIMON, 1874a (*Z. s.*), 1929.



Eure, Lozère : SIMON, 1929. "Seine" : SIMON, 1874a (Z. s.), 1929. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (Z. s.). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Herbes sèches : LANCELEVÉE, 1884. Vieux murs : SIMON, 1874a, 1929. **Période.** — *Femelle.* Août : SIMON, 1929.

*Zygiella thorelli* (Ausserer, 1871)

*Leviellus t.*

[Nommée *Leviellus thorelli* dans CANARD, 2005].

**Répartition.** Landes, Seine-et-Marne : SIMON, 1929. — Allemagne, Italie, Suisse, Europe. **Habitat.** Forêt, troncs de vieux chênes : SIMON, 1929.

*Zygiella x-notata* (Clerck, 1757)

*Araneus x-notatus*; *Xylla notata*; *Zilla x.*; *Z. decem-notata*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : MÜLLER, 1985. Ariège : LUCANTE, 1880b (X. n.). Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c (Z. x.). Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corrèze : JUBERTHIE, 1954. Corse : CANARD, 1989; SIMON, 1929. Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (Z. x.); ROLLARD, 1990a. Dordogne : LUCANTE, 1880b (X. n.). Eure : SIMON, 1909b (Z. x.). Finistère : DENIS, 1938a, 1939a, 1939a (Z. d.), 1940a; ROLLARD, 1990a. Gard : EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-) : JUBERTHIE, 1954; LUCANTE, 1880b (X. n.). Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b (X. n.). Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990a. Landes : LUCANTE, 1880b (X. n.). Loire-Atlantique : LUCAS, 1882a (Z. x.). Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (X. n.). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924 (Z. x.); KERVILLE, 1900 (A. x.); LUCAS, 1878b (Z. x.). Marne : LUCAS, 1878a (Z. x.). Meurthe-et-Moselle : KREMER, 1989. Morbihan : ROLLARD, 1990a. Nord : GOULLIART, 1979a. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986; LUCANTE, 1880b (X. n.). Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (X. n.). Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 1999a, 2003. Rhin (Haut-) : SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-) : MULLER & al., 1895 (Z. x.). "Seine" : LUCAS, 1875 (Z. x.). Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (Z. x.). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (Z. x.). Somme : ROSELLE, 1887 (Z. x.). Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (X. n.). Var : BECKER, 1880 (Z. x.); BIGOT, 1993; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993. Vendée : DENIS, 1940b (Z. d.), 1941, 1962b, 1965c, 1966a; ROLLARD, 1990a. Yonne : LUCAS, 1872 (Z. x.). — Toute la France : SIMON, 1929. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique, Néotropical. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Aulnaie : LEDOUX & al., 1999a. Bois : DENIS, 1941; LUCAS, 1875. Bord de mer : KERVILLE, 1900. Bruyères : CANARD, 1989. Bâtiment : BERLAND, 1924; DENIS, 1966a; GOULLIART, 1979a; LANCELEVÉE, 1884; LUCAS, 1872, 1878b, 1882a; SIMON, 1874a, 1929. Bâtiment, sous le rebord du toit : ROSELLE, 1887. Bâtiments, fenêtres : DENIS, 1933b. Clôture : BRAUD & al., 2005. Dune : DENIS, 1941, 1962b. Falaise : DENIS, 1934a; SIMON, 1929. Falaises, rochers, fissures : DENIS, 1940a. Fissure d'un poteau de ciment : DENIS, 1965c. Forêt, buissons, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Grotte : DENIS, 1941. Haie :

BRAUD & al., 2005; KOVOOR & al., 2000; LUCAS, 1874c. Haie de thuyas : VEILLON, 1997. Jardin : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; GOULLIART, 1979a; LUCAS, 1878a. Jardin en milieu urbain : VEILLON, 1997. Lande à *Ulex* : LUCAS, 1871a. Lierres : DENIS, 1935a. Littoral, falaise : DENIS, 1940b. Littoral, taillis de chênes-verts : BIGOT, 1993. Maison : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a; SIMON, 1874a. Maquis : CANARD, 1989. Marécage : BELIN, 2001; LANCELEVÉE, 1884. Murs : SIMON, 1909b. Murs et tamaris : EMERIT & al., 1994. Prairie : LEDOUX & al., 2003. Rochers : CANARD, 1989; DENIS, 1934a; SIMON, 1929. Rochers, anfractuosités : DENIS, 1933b; LUCAS, 1878b, 1882a. Sous les écorces : DENIS, 1933b. Sur un mur : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. **Période.** — *Mâle.* Août : DENIS, 1966a; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre : LUCAS, 1875; SIMON, 1874a. — *Femelle.* Mai : DENIS, 1934a, 1967d. Juin : DENIS, 1941. Juillet : DENIS, 1938a, 1939a, 1940a. Août : DENIS, 1966a; LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre : CANARD, 1989; LUCAS, 1875; MÜLLER, 1985; SIMON, 1874a. Octobre : DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle avec cocon.* Avril, octobre : SIMON, 1874a. Décembre : DENIS, 1933b.

LYCOSIDAE

Trois *Lycosa* décrites des Alpes-Maritimes par A. Rizzo sont exclues de la liste. Il s'agit de *L. grisea*, *L. monscalvana* et *L. palustris*. À propos de ces espèces DENIS, 1938b indique «*Lycosa monscalvana* et *Lycosa grisea* sont deux espèces qui ne sont pas identifiables, même si elles sont effectivement des Lycosides» et «*Argyroneta palustris* est vraisemblablement une *Lycosa* ou une *Pardosa* fréquentant les lieux humides qu'il n'est pas possible de préciser».

*Acantholycosa pyrenaea* (Simon, 1876)

*A. rupicola* [err.]; *Pardosa p.*; *Pardosa rupicola* [err.].

**Taxonomie.** Les espèces du genre *Acantholycosa* (*A. pyrenaea* et *A. rupicola*) ont été confondues par Simon et Denis. L'article de BUCAR & al., 1993 fait le point sur ce genre en remettant en cause les données de Simon et Denis; les conclusions de ce travail ont été retenues pour la correction des données concernant ces deux espèces. **Répartition.** Pyrénées-Orientales : BUCAR & al., 1993; DENIS, 1952c [*A. rupicola*, err.]; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1876a (*P. p.*), 1937 [*P. rupicola*, err.]. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2000 m (LEDOUX & al., 1996a) jusqu'à 2640 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Éboulis : DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996a. Rochers : SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Juillet : BUCAR & al., 1993; DENIS, 1952c. Août : LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juillet : LEDOUX & al., 1996a. Septembre : BUCAR & al., 1993.

*Acantholycosa rupicola* (Dufour, 1821)

*A. pyrenaea* [err.]; *A. spinosa* [err.]; *Pardosa r.*

[Cette espèce a été confondue avec *A. pyrenaea* et *A. spinosa*; les corrections sont faites selon BUCAR & al., 1993]. **Répartition.** Ariège : DENIS, 1960a. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a [*A. pyrenaea*, err.], 1954a; SIMON, 1937 (*P. r.*). Pyrénées (Hautes-) : BUCAR & al., 1993; DENIS, 1950b [*A. spinosa*, err.],

1950b, 1953a [*A. pyrenaica*, err.], 1955c [*A. pyrenaica*, err.], 1960a [*A. pyrenaica*, err.], 1960a; SIMON, 1937 (*P. r.*). Pyrénées-Atlantiques: BUCAR & al., 1993; DENIS, 1957a [*A. pyrenaica*, err.], 1959d [*A. pyrenaica*, err.], 1960a [*A. pyrenaica*, err.]. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Espagne, Suisse. **Altitude.** De 1550 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 3300 m (BUCAR & al., 1993). **Habitat.** Éboulis: DENIS, 1953a, 1957a, 1959d; LEDOUX & al., 1996c. Forêt de pins: DENIS, 1950b. Pelouse: DENIS, 1957a. Rochers: SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1954a. Juillet: BUCAR & al., 1993; DENIS, 1950b, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1960a. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle.* Juillet: BUCAR & al., 1993; DENIS, 1954a, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a, 1960a. Août: DENIS, 1953a; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: BUCAR & al., 1993. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a. — *Femelle avec ses jeunes.* Août: DENIS, 1953a.

#### *Allocosa oculata* (Simon, 1876)

*Lycosa o.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1876a (*L. o.*), 1876e (*L. o.*), 1937 (*L. o.*). — Ouest Méditerranée. [Algérie, Maroc, Tunisie: GUY, 1966]. **Habitat.** Plateaux arides et pierreux: SIMON, 1876a.

#### *Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817)

*Lycosa a.*

**Taxonomie.** *Alopecosa accentuata* (Latreille) et *A. barbipes* (Sundevall) ont souvent été confondues et mises en synonymie, du début du siècle dernier jusqu'en 1987 (DAHLEM & al., 1987). Ainsi SIMON, 1937 met en synonymie les deux espèces sous le nom *Lycosa a.* Il est donc difficile de savoir à laquelle de ces espèces se rapportent réellement les données de la littérature de cette période. La répartition de ces espèces est à prendre avec réserve. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. a.*); LUCAS, 1877b (*L. a.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Finistère: DENIS, 1938a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*L. a.*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*L. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*L. a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. a.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. a.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** De 600 m (CORNIC, 1978) jusqu'à 2000 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à genêts; maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1877b, 1882a; SIMON, 1876a,

1937. Sur une route: DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle.* Février: LEDOUX & al., 1996a. Avril, mai: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a. Juin, juillet: CORNIC, 1978. Août: LUCAS, 1882a. Septembre: LUCAS, 1877b. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Avril: CORNIC, 1978; DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997. Mai: CORNIC, 1978. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1960a, 1961b. Août: LUCAS, 1882a. Septembre: LUCAS, 1877b. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1959d.

#### *Alopecosa aculeata* (Clerck, 1757)

*Tarentula a.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*T. a.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Var: DENIS, 1937a; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Allemagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Forêt: LEDOUX & al., 1996c. Pelouse très humide: DENIS, 1943c. **Période.** — *Mâle.* Janvier, avril, mai: DENIS, 1943c. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Avril, juin: DENIS, 1943c. Juillet: CORNIC, 1978.

#### *Alopecosa albofasciata* (Brullé, 1832)

*Lycosa a.*; *Tarentula a.*; *Tarentula numida*; *Trochosa a.*; *Xerolycosa a.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*L. a.*), 1882 (*L. a.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*L. a.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aveyron: SIMON, 1876a (*L. a.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*L. a.*); BIGOT & al., 1973 (*L. a.*), 1983 (*L. a.*); DENIS, 1954b; SOYER, 1953b (*Tarentula a.*). Charente-Maritime: SIMON, 1874d (*T. n.*), 1876a (*L. a.*). Corse: KRAUS, 1955 (*X. a.*); ROEWER, 1926 (*Tarentula a.*); SCHAREFF, 1894 (*Trochosa a.*); SIMON, 1876a (*L. a.*). Dordogne: LUCANTE, 1880b (*L. a.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*L. a.*). Hérault: SIMON, 1876a (*L. a.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*L. a.*); SIMON, 1876a (*L. a.*). Lot: LUCANTE, 1880b (*L. a.*). Morbihan: MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*Tarentula a.*), 1967d; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1876a (*L. a.*); TAMBS-LYCHE, 1957 (*Tarentula a.*). Var: BECKER, 1880 (*L. a.*), 1882 (*L. a.*); DENIS, 1937a; KABOUCHE & al., 1997. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a (*L. a.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1965c; ROLLARD, 1990c. — Midi de la France et littoral de l'ouest jusqu'à l'embouchure de la Loire: SIMON, 1937 (*L. a.*). Espagne, Italie, Suisse. De la Méditerranée à l'Asie centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1320 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Bord de rivière, pierres: LEDOUX, 2000. Dune: DENIS, 1962b, 1965c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt à *Quercus* sur plateau calcaire: KABOUCHE & al., 1997. Forêt, clairière; friche: SIMON, 1937. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994; RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Marécage salé: BIGOT, 1965. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse sèche: SOYER, 1953b. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. *Salicornie-*

*tum*: BIGOT, 1965. Sous une pierre: CHANSIGAUD, 1992. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période**. — *Mâle*. Mars: ROEWER, 1926. Avril: DENIS, 1943c, 1962b, 1967d. Mai: DENIS, 1962b, 1965c. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c. Juillet, septembre: CORNIC, 1978. Novembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Mars: ROEWER, 1926. Avril: DENIS, 1943c, 1962b, 1967d. Mai: DENIS, 1965c; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: DENIS, 1943c, 1967d. Septembre: CORNIC, 1978; DENIS, 1962b. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: DENIS, 1967d. [Note de CORNIC, 1978: « des mâles adultes ont été trouvés en juin et en septembre dans la station Tête Mathieu (1320m), ce qui laisse supposer qu'il y aurait deux générations par an dans ce biotope exposé au sud et très chaud, bien qu'en altitude »].

### *Alopecosa alpicola* (Simon, 1876)

*A. pastoralis*; *Lycosa a.*; *Lycosa pastoralis*; *Lycosa soriculata*; *Tarentula pastoralis*.

**Taxonomie**. La synonymie *Alopecosa pastoralis* (Simon, 1876) = *A. alpicola* est établie par LUGETTI & al., 1969. **Répartition**. Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a (*L. a.*), 1937 (*L. a.*). Alpes-Maritimes: CORNIC, 1978; LUGETTI & al., 1969; SIMON, 1876a (*L. s.*), 1937 (*L. a.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*L. a.*), 1876a (*L. p.*), 1937 (*L. a.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*L. p.*); SIMON, 1876a (*L. p.*), 1937 (*L. p.*); SOYER, 1953b (*T. p.*). Corse: KRAUS, 1955. Hérault: EMERIT & al., 1990 (*A. p.*). Isère: SIMON, 1876a (*L. a.*). Savoie: MÜLLER, 1985. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Var: SIMON, 1876a (*L. p.*), 1898c (*L. p.*), 1937 (*L. p.*). Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1876a (*L. a.*), 1937 (*L. a.*). — Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 2300 m (CORNIC, 1978). **Habitat**. Éboulis, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de conifères: SIMON, 1937. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Pelouse sèche: SOYER, 1953b. Prairie: SIMON, 1937. Prairies alpêtres: SIMON, 1876a. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1965. **Période**. — *Mâle*. Juin: CORNIC, 1978. Juillet: CORNIC, 1978; SIMON, 1937. Septembre: CORNIC, 1978. Octobre: SOYER, 1953b. — *Femelle*. Juin: CORNIC, 1978; LUGETTI & al., 1969. Juillet: CORNIC, 1978; SIMON, 1937. Août: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: KRAUS, 1955; LUGETTI & al., 1969; MÜLLER, 1985. Octobre: SOYER, 1953b.

### *Alopecosa barbipes* (Sundevall, 1833)

*Lycosa b.*; *Tarentula andrenivora barbipes*; *Tarentula b.*

**Taxonomie**. Cette espèce a été confondue avec *A. accentuata*. Voir la note sous *A. accentuata*. **Répartition**. Corse: KRAUS, 1955. Marne: LUCAS, 1878a (*T. b.*). Rhin (Haut-): MÜLLER & al., 1895 (*T. a. b.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*L. b.*). Vendée: DUFFEY, 1964 (*T. b.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne. Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1450 m (KRAUS, 1955). **Habitat**. Forêt de pins sur dune: DUFFEY, 1964. Lieu sec aride crayeux: LUCAS, 1878a. **Période**. — *Femelle*. Avril: KRAUS, 1955. Août: LUCAS, 1878a.

### *Alopecosa cuneata* (Clerck, 1757)

*Lycosa c.*; *Tarentula c.*

**Répartition**. Alpes (Hautes-), Aube: SIMON, 1876a (*L. c.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. c.*); LUCAS, 1877b (*L. c.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899 (*L. c.*), 1909b (*L. c.*). Finistère: ROLLARD, 1990c. Gers: LUCANTE, 1880b (*L. c.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1876a (*L. c.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*L. c.*); SIMON, 1876a (*L. c.*). Loire-Atlantique: ROLLARD, 1990c. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; LUCANTE, 1880b (*L. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c (*T. c.*), 1961b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*L. c.*), 1910 (*L. c.*). "Seine": SIMON, 1876a (*L. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. c.*); SIMON, 1876a (*L. c.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1876a (*L. c.*). Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1900 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat**. Arrière-dune: DENIS, 1962b. Bois: BRAUD & al., 2005. Forêt: DENIS, 1961b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Lieux sablonneux: LUCAS, 1877b. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1937. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. **Période**. — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b; VEILLON, 1997. Septembre: LUCAS, 1877b. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1943c. Avril: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1961b. Septembre: EMERIT & al., 1997; LUCAS, 1877b.

### *Alopecosa cursor* (Hahn, 1831)

*Lycosa c.*; *Tarentula c.*

**Répartition**. Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1876a (*L. c.*), 1937 (*L. c.*). Aveyron: SIMON, 1937 (*L. c.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1953b (*T. c.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*L. c.*), 1937 (*L. c.*). Gironde: LUCANTE, 1880b (*L. c.*); SIMON, 1937 (*L. c.*). Landes, Lot: SIMON, 1937 (*L. c.*). Lozère: DENIS, 1939b. Morbihan: MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a (*L. c.*), 1937 (*L. c.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1876a (*L. c.*), 1937 (*L. c.*). Var: SIMON, 1876a (*L. c.*), 1937 (*L. c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1937 (*L. c.*). Vendée: DENIS, 1947b (*T. c.*), 1964b; ROLLARD, 1990c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat**. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Pelouse rase sèche: SOYER, 1953b. Prairie: SIMON, 1937. Pré en bordure des dunes: DENIS, 1947b. **Période**. — *Mâle*. Avril: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai: CORNIC, 1978. Octobre: SOYER, 1953b. — *Femelle*. Février: DENIS, 1939b. Mars: SOYER, 1953b. Avril: CORNIC, 1978; LEDOUX & al.,

1996a. Mai : CORNIC, 1978. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1947b, 1964b. Juillet : CORNIC, 1978.

*Alopecosa fabrilis* (Clerck, 1757)

*Lycosa f.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1876a (*L. f.*). Charente-Maritime : JOURDE & al., 1999. Isère : SIMON, 1876a (*L. f.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1952c. Seine, Seine-et-Marne : SIMON, 1876a (*L. f.*). Vaucluse : CORNIC, 1978. — Presque toute la France : SIMON, 1937 (*L. f.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2430 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Friche : SIMON, 1876a, 1937. Pelouse calcaire : BOSMANS & al., 1985a. Prairie : SIMON, 1876a, 1937. Terrain vague ; terrains sablonneux : SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle.* Juin : CORNIC, 1978. Août : DENIS, 1952c. — *Femelle.* Juin : CORNIC, 1978. — *Femelle avec cocon.* Août : DENIS, 1952c.

*Alopecosa inquilina* (Clerck, 1757)

*Lycosa i.*

**Répartition.** Isère : SIMON, 1876a (*L. i.*). Loire, Lozère, Meuse, Vienne (Haute-) : SIMON, 1937 (*L. i.*). — Vosges, Auvergne, Alpes : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Prairie : SIMON, 1876a.

*Alopecosa laciniosa* (Simon, 1876)

*Lycosa l.* ; *Tarentula l.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude : SIMON, 1937 (*L. l.*). Hérault : SIMON, 1876a (*L. l.*), 1937 (*L. l.*). Pyrénées-Orientales : DENIS, 1943c (*T. l.*) ; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003 ; SIMON, 1876a (*L. l.*), 1937 (*L. l.*). Var : KABOUCHE & al., 1997. Vaucluse : CORNIC, 1978. — Espagne, Italie. **Altitude.** Jusqu'à 1050 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Formation à bruyères et genévriers ; formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 2003. Forêt à *Quercus* sur plateau calcaire : KABOUCHE & al., 1997. Friche : LEDOUX & al., 2003. Lieu inculte et aride : SIMON, 1876a, 1937. Pelouse à thym : LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle.* Janvier, février : DENIS, 1943c. Avril : DENIS, 1943c ; LEDOUX & al., 2003. Septembre : CORNIC, 1978 ; SIMON, 1876a. Novembre : LEDOUX & al., 2003. Décembre : DENIS, 1943c. — *Femelle.* Janvier : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1943c. Février, mars : CORNIC, 1978. Avril : CORNIC, 1978 ; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai, juin : DENIS, 1943c. Septembre : CORNIC, 1978 ; SIMON, 1876a. Octobre : CORNIC, 1978 ; KABOUCHE & al., 1997. Novembre : CORNIC, 1978 ; LEDOUX & al., 2003. Décembre : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1943c.

*Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757)

*Lycosa andrenivora* ; *Lycosa p.* ; *Lycosa renidens* ; *Tarentula andrenivora* ; *Tarentula p.*

**Taxonomie.** La synonymie *Arctosa renidens* (Simon, 1876) = *Alopecosa pulverulenta* est établie par LUGETTI & al., 1969. [Les citations de *Lycosa renidens* par SIMON, 1876a et 1937 ne concernent qu'un seul et même spécimen mâle]. **Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1876a (*L. p.*). Alpes-Maritimes : SIMON, 1876a (*L. r.*), 1937 (*L. r.*). Alpes-de-Haute-Provence : SIMON,

1876a (*L. p.*). Ariège : DENIS, 1961b. Calvados : ASSE-LIN & al., 1989 ; GUIBÉ, 1946 (*L. p.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1876a (*L. p.*). Côtes-d'Armor : LUCAS, 1871a (*L. a.*). Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*L. p.*) ; SIMON, 1899 (*L. p.*), 1909b (*L. p.*). Finistère : LUCAS, 1868 (*L. a.*). Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a, 1960a. Ile-et-Vilaine : ROLLARD, 1990c. Isère : SIMON, 1876a (*L. p.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924 (*L. p.*) ; LUCAS, 1878b (*L. p.*) ; PÉTILLON & al., 2004 ; ROLLARD, 1990c. Morbihan : ROLLARD, 1990c. Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Orne : ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme : VILLEPOUX, 1986, 1990a. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 ; DENIS, 1939b, 1950b (*T. p.*), 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; DENIS, 1943c (*T. p.*), 1967d ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1876a (*L. p.*). Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000 ; MULLER & al., 1895 (*T. p.*). Savoie (Haute-) : PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*T. a.*), 1898 (*T. p.*). "Seine" : ROLLARD, 2000 ; SIMON, 1876a (*L. p.*). Seine-Maritime : CORNIC, 1977 ; LANCELEVÉE, 1884 (*L. p.*). Seine-et-Marne : COCQUEMPOUT & al., 1984, 1989 ; SIMON, 1876a (*L. p.*). Somme : ROSELLE, 1888a (*L. p.*). Var : DENIS, 1937a. Vaucluse : CORNIC, 1978 ; SIMON, 1876a (*L. p.*). — Toute la France : SIMON, 1937 (*L. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2320 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois : DENIS, 1957a, 1959d. Bord de lac : DENIS, 1950b. Bord de lac tourbeux : DENIS, 1955c. Champ de céréales : COCQUEMPOUT & al., 1984, 1989. Forêt : SIMON, 1937. Forêt de bouleaux et de hêtres ; forêt de hêtres et pins : BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins : BOSMANS & al., 1987 ; ROSELLE, 1888a. Forêt mixte : BOSMANS & al., 1985a. Friche : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992 ; VEILLON, 1997. Jardin : DENIS, 1950b ; LE PERU, 2004. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex* : LUCAS, 1871a. Lieu aride et sablonneux : LUCAS, 1868. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Marécage : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1937. Pelouse : BERLAND, 1924. Prairie : ASSE-LIN & al., 1989 ; BOSMANS & al., 1985a ; CORNIC, 1977 ; LUCAS, 1878b ; PASQUET & al., 1992 ; SIMON, 1937. Prairie calcaire : EMERIT & al., 1999. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Prairie à rhododendron : BOSMANS & al., 1987. Pâturage : LEBORGNE & al., 1998. Tourbière : VILLEPOUX, 1986. Tourbière à sphaignes : VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Février : DENIS, 1967d. Avril : LE PERU, 2004 ; VEILLON, 1997. Mai : CORNIC, 1978 ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a. Juin : VEILLON, 1997. Juillet : DENIS, 1939b, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898, 1898. Août : LUCAS, 1878b ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898, 1898. — *Femelle.* Avril : VEILLON, 1997. Mai : CORNIC, 1978 ; LE PERU, 2004. Juin : CORNIC, 1978 ; EMERIT & al., 1999 ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a ; VEILLON, 1997. Juillet : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1950b, 1955c, 1959d, 1961b ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août : CORNIC, 1978 ; LUCAS, 1868, 1878b ; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre : CORNIC, 1978 ; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Juillet : DENIS, 1957a, 1961b. Août : DENIS, 1953a. Octobre : LE PERU, 2004.

***Alopecosa simoni*** (Thorell, 1872)*Lycosa s.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*L. s.*), 1937 (*L. s.*). [Note de SIMON, 1937: «Digne: seule localité française»]. — Espagne, Italie. Méditerranée. **Habitat.** Lieux arides ou plantés de chênes: SIMON, 1876a.

***Alopecosa striatipes*** (C. L. Koch, 1839)*A. striata*; *Lycosa striata*; *Lycosa s.*

**Taxonomie.** La synonymie *Alopecosa striata* (Kulczynski, 1831) = *A. striatipes* est établie par LUGETTI & al., 1969. **Répartition.** Aube: SIMON, 1876a (*L. s.*), 1937 (*L. striata*). Gironde: LUCANTE, 1880b (*L. s.*); SIMON, 1876a (*L. s.*), 1937 (*L. striata*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1937 (*L. striata*). Manche: LUCAS, 1878b (*L. s.*); SIMON, 1876a (*L. s.*), 1937 (*L. striata*). Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a (*L. s.*), 1937 (*L. striata*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995 (*A. s.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*L. striata*). Sarthe, Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1937 (*L. striata*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*A. s.*). Vendée: DENIS, 1962b (*A. s.*). — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie centrale. **Habitat.** Bord de rivière, *Populeum albae*: LEDOUX, 2000. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Friche au soleil: SIMON, 1937. Lieu sablonneux: LUCAS, 1878b. **Période.** — *Mâle*. Septembre: SIMON, 1937. — *Femelle*. Février: LEDOUX, 2000. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: SIMON, 1937. Octobre: DENIS, 1962b.

***Alopecosa sulzeri*** (Pavesi, 1873)*Lycosa s.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1937 (*L. s.*). — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique.

***Alopecosa trabalis*** (Clerck, 1757)*Lycosa t.*; *Tarentula t.*

**Répartition.** Ain, Aisne: SIMON, 1876a (*L. t.*). Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. t.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Finistère: DENIS, 1938a. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b (*L. t.*). Gers, Landes: LUCANTE, 1880b (*L. t.*); SIMON, 1876a (*L. t.*). Marne: LUCAS, 1878a (*T. t.*). Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Oise: SIMON, 1876a (*L. t.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c (*T. t.*), 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; LUGETTI & al., 1969; SIMON, 1876a (*L. t.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*L. t.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (*T. t.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*L. t.*), 1910 (*L. t.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*T. t.*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1876a (*L. t.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1876a (*L. t.*), 1898b (*L. t.*). Vosges: SIMON, 1876a (*L. t.*). — Presque toute la France: SIMON, 1937 (*L. t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Carrière de pierres à chaux: BOSMANS & al., 1985a. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt de bouleaux et de hêtres; forêt de chênes: BOSMANS & al., 1987. Forêt mixte: BOSMANS & al., 1985a.

Jardin: LE PERU, 2004. Lande: DENIS, 1938a. Lieu sec aride crayeux: LUCAS, 1878a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1967d. Avril: DENIS, 1943c. Mai: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1943c; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1961b. Août: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910. Août: LEDOUX, 1993; LUCAS, 1878a. Septembre: LE PERU, 2004; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

***Arctosa alpigena*** (Doleschall, 1852)*A. lamperti*; *Lycosa a.*; *Lycosa insignita*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*L. i.*). Rhin (Haut-): DAHL & al., 1927 (*A. l.*). — Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse. Holarctique. **Altitude.** 910 m (DAHL & al., 1927). **Habitat.** Mousses humides épaisses: DAHL & al., 1927. Prairie: SIMON, 1937 (*L. a.*). Prairies alpêtres: SIMON, 1876a. **Période.** — *Femelle*. Août: DAHL & al., 1927.

***Arctosa cinerea*** (Fabricius, 1777)*Lycosa c.*; *Trochosa c.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Ariège: DENIS, 1960a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*L. c.*); PETIT & al., 1945 (*L. c.*); SOYER, 1953b. Calvados: LUCAS, 1874c. Corse: BIGOT, 1977; KRAUS, 1955. Finistère: LUCAS, 1868. Gers, Landes: LUCANTE, 1880b (*L. c.*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*L. c.*); ROLLARD, 1990c. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: GOULLIART, 1979b (*L. c.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1967d. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895 (*T. c.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. c.*). Var: BECKER, 1880 (*L. c.*); BOUMEZZOUGH & al., 1983; SIMON, 1898c (*L. c.*). Vendée: DENIS, 1959c; GROS, 2004. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, Congo. **Habitat.** Bord d'étang: BIGOT, 1977; PETIT & al., 1945. Bord d'étang, sable: SOYER, 1953b. Bord de rivière: SIMON, 1876a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Chemins: LUCAS, 1874c. Dune: GOULLIART, 1979b; SIMON, 1876a. Forêt, sous une pierre au bord d'une mare: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Lieu aride et sablonneux: LUCAS, 1868. Lieu sablonneux: LUCAS, 1882a. Marécage salé: BIGOT, 1965. Plage: SIMON, 1876a. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Rivière asséchée, sur le sable: VEILLON, 1997. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle*. Août: LUCAS, 1882a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1943c, 1967d. Juin: DENIS, 1943c. Juillet: DENIS, 1960a. Août: LUCAS, 1868, 1882a. Septembre: VEILLON, 1997.

***Arctosa figurata*** (Simon, 1876)*Lycosa f.*

**Répartition.** Dordogne, Oise: SIMON, 1937 (*L. f.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1937 (*L. f.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1877c (*L. f.*). Vienne (Haute-): SIMON, 1876c (*L. f.*). — Allemagne, Belgi-

que, Espagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Forêt, sur sol sablonneux très sec, sous les mousses: SIMON, 1877c. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1877c. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1877c.

*Arctosa fulvolineata* (Lucas, 1846)

*Alopecosa f.*; *Leaena f.*; *Lycosa f.*; *Trochosa f.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b (*Leaena f.*); PETIT & al., 1945 (*Lycosa f.*); SOYER, 1953b (*Leaena f.*). Charente-Maritime, Corse: SIMON, 1937 (*Lycosa f.*). Finistère: ROLLARD, 1990c (*T. f.*). Gironde: DENIS, 1952a (*Leaena f.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c (*T. f.*). Loire-Atlantique: ROLLARD, 1990c (*T. f.*); SIMON, 1937 (*Lycosa f.*). Manche: PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c (*T. f.*). Morbihan: ROLLARD, 1990c (*T. f.*); SIMON, 1937 (*Lycosa f.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*Leaena f.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Somme: SIMON, 1937 (*Lycosa f.*). Var: DENIS, 1937b (*A. f.*). Vendée: DENIS, 1941 (*T. f.*). — Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Europe, Nord-Afrique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord d'étang: PETIT & al., 1945. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Friche: PASQUET & al., 1992. Littoral: SOYER, 1953b. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais salant: SIMON, 1937. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1952a. Octobre: DENIS, 1937b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1943c. Juin: DENIS, 1941. Octobre: DENIS, 1937b. — *Femelle avec ses jeunes.* Octobre: DENIS, 1937b.

*Arctosa lacustris* (Simon, 1876)

*Lycosa l.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*L. l.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1985. Corse: BIGOT, 1977; CANARD, 1989; SIMON, 1876a (*L. l.*), 1937 (*L. l.*). Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b (*L. l.*). Gironde: DENIS, 1952a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c. Var: DENIS, 1937a, 1937b; SIMON, 1898c (*L. l.*). Vaucluse: BIGOT & al., 1985; FAVET, 1984. — Midi de la France: SIMON, 1937 (*L. l.*). Espagne, Italie, Canaries, Méditerranée. **Habitat.** Bord de l'eau: SIMON, 1876a. Bord de mare: CANARD, 1989. Bord de rivière: BIGOT, 1977; BIGOT & al., 1985; FAVET, 1984. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Prairie humide: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1943c. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1937b. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1952a. Avril: DENIS, 1943c. Septembre: DENIS, 1937b. — *Femelle avec cocon.* Juillet: BIGOT & al., 1985.

*Arctosa leopardus* (Sundevall, 1833)

*Lycosa l.*; *Megarctosa l.*; *Pirata l.*; *Trochosa l.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1961b. Aube, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1876a (*L. l.*). Calvados: LUCAS, 1874c. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: JUBERTHIE, 1954 (*L. l.*). Corse: KRAUS, 1955 (*M. l.*); SIMON, 1876a (*L. l.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*L. l.*). Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Maine-et-Loire:

BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946 (*L. l.*); PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a (*L. l.*). Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise, Orne: SIMON, 1876a (*L. l.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b (*L. l.*); SIMON, 1876a (*L. l.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1961b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (*L. l.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910 (*L. l.*); MULLER & al., 1895 (*P. l.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910 (*L. l.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*T. l.*). "Seine": SIMON, 1876a (*L. l.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*L. l.*). Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1876a (*L. l.*). Var: BOUMEZZOUGH & al., 1983; DENIS, 1937a. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. l.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1650 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a. Bord des étangs et des mares, sous les pierres: SIMON, 1876a. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux; estuaire, schorre: BONTE, 2000. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Grève: GUIBÉ, 1946. Herbes humides: DENIS, 1961b. Lande: DENIS, 1938a. Lieux sablonneux: LUCAS, 1874c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; HENRY, 1981; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX, 2000; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1940a; JUBERTHIE, 1954. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Roseaux: NOËL & al., 2005. Tourbière: LEDOUX & al., 1996c; VEILLON, 1997; VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle.* Avril: LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1943c; LESSERT, 1910. Mai: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1943c; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1940a, 1959d, 1961b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1938a.

*Arctosa lutetiana* (Simon, 1876)

*Lycosa l.*; *Tricca l.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b (*T. l.*). Ariège: SIMON, 1937 (*L. l.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999; SIMON, 1937 (*L. l.*). Doubs: EMERIT & al., 1997 (*T. l.*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*L. l.*); SIMON, 1877c (*L. l.*). Oise: SIMON, 1937 (*L. l.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d (*T. l.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1876a (*L. l.*), 1877c (*L. l.*), 1937 (*L. l.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1877c (*L. l.*), 1937 (*L. l.*). — Allemagne, Belgique, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Forêt, sur sol sablonneux, sous les mousses: SIMON, 1877c. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Terrains sablonneux secs ou humides: SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1967d. Mai: SIMON, 1877c. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1877c. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: SIMON, 1877c.

**Arctosa perita** (Latreille, 1799)*Lycosa filicata*; *Lycosa p.*; *Trochosa p.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1953b. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. p.*); LUCAS, 1877b (*L. p.*). Cantal: SIMON, 1876a (*L. f.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: SIMON, 1899 (*L. p.*), 1909b (*L. p.*). Finistère: DENIS, 1938a. Gard: BIGOT, 1983; BIGOT & al., 1982b. Gironde: CAUSSANEL, 1970 (*L. p.*); DENIS, 1951b; SIMON, 1937 (*L. p.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b (*L. p.*); SIMON, 1937 (*L. p.*). Loire-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*L. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924 (*L. p.*); KERVILLE, 1900 (*L. p.*); LUCAS, 1878b (*T. p.*). Morbihan: ROLLARD, 1990c. Nord: GOULLIART, 1979b (*L. p.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*L. p.*); PASQUET & al., 1992. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. p.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. p.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*L. p.*). Var: SIMON, 1898c (*L. p.*). Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964; ROLLARD, 1990c. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970. Bord d'étang, sable: SOYER, 1953b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Dune: BIGOT, 1983; DENIS, 1962b, 1965c; GOULLIART, 1979b; KERVILLE, 1900; ROSELLE, 1888b; SIMON, 1937. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Dune littorale: BIGOT & al., 1982b. Dune, *Ammophiletum*: CAUSSANEL, 1970. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Estuaire, terrain salé: DENIS, 1951b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins sur dune: DUFFEY, 1964. Forêt, sous une pierre: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992. Jardin, sur sol sablonneux: LE PERU, 2004. Lande: VEILLON, 1997. Lande, sur sol sablonneux: LE PERU, 2004. Lieu aride: LUCAS, 1878b. Lieu inculte et découvert: LUCAS, 1882a. Lieux cultivés: LUCAS, 1877b. Marécage: BELIN, 2001. Plage: BERLAND, 1924; DENIS, 1963c; TAMBS-LYCHE, 1957. Sable: DENIS, 1964b. Terrains sablonneux: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1943c; LE PERU, 2004. Avril: VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1943c. Septembre: CLARK & al., 1970; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910; SIMON, 1876a. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Janvier: LE PERU, 2004. Février: DENIS, 1965c. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1943c; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1964b. Juillet: DENIS, 1943c. Août: LUCAS, 1878b, 1882a. Septembre: LE PERU, 2004; LESSERT, 1910; LUCAS, 1877b. — *Femelle avec cocon*. Mai: LE PERU, 2004.

**Arctosa personata** (L. Koch, 1872)*Lycosa p.*

**Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1876a (*L. p.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*L. p.*). Corse: SIMON, 1876a (*L. p.*). Var: SIMON, 1898c (*L. p.*). — Espagne, Italie, Suisse. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Garrigue à chê-

nes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Lieux humides et marécageux: SIMON, 1876a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992.

**Arctosa stigmosa** (Thorell, 1875)*Lycosa s.*; *Trochosa s.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1937c. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*L. s.*). Rhin (Haut-): LESSERT, 1910 (*L. s.*); MULLER & al., 1895 (*T. s.*). Var: GROS, 1983b. — Allemagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & al., 1999a. Septembre: LESSERT, 1910. — *Femelle*. Avril: LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1957a; GROS, 1983b.

**Arctosa variana** (C. L. Koch, 1847)*Lycosa v.*

**Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1985. Gard: BIGOT, 1983. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Var: BOUMEZZOUGH & al., 1983; GROS, 1983b (*L. v.*); SIMON, 1937 (*L. v.*). Vaucluse: BIGOT & al., 1982a, 1985; FAVET, 1984; LEDOUX, 2000. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Asie centrale. **Habitat.** Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a; FAVET, 1984; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de rivière, galets et sable: BIGOT & al., 1985. Bord de rivière, graviers; bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Marais salant: SIMON, 1937. Plage, troncs échoués: BIGOT, 1983. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Avril à juin: LEDOUX, 2000. — *Femelle*. Avril, mai: LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX & al., 2002. Juillet: GROS, 1983b. — *Femelle avec cocon*. Juin: BIGOT & al., 1985.

**Arctosa villica** (Lucas, 1846)*Leaena v.*; *Lycosa tomentosa*; *Lycosa v.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude: SIMON, 1937 (*Lycosa v.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1876a (*L. t.*), 1937 (*Lycosa v.*); SOYER, 1953b (*Leaena v.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*Lycosa v.*). Landes: SIMON, 1937 (*Lycosa v.*). Manche: GUIBÉ, 1946 (*Lycosa v.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*Leaena v.*); SIMON, 1876a (*L. t.*), 1937 (*Lycosa v.*). "Seine": SIMON, 1880a (*L. t.*), 1937 (*Lycosa v.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. t.*). Vaucluse: SIMON, 1937 (*Lycosa v.*). — Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Forêt, sous une pierre: DOIGNON, 1976. Grève: GUIBÉ, 1946. Lieux secs, sous les pierres et les détritiques: SIMON, 1937. Littoral, vases salées: GUIBÉ, 1946. Sables littoraux: SOYER, 1953b. Sablière: SIMON, 1880a.

**Aulonia albimana** (Walckenaer, 1805)*Lycosina a.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1876a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*L. a.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1876a, 1937. Côtes-d'Armor:



DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884 ; SIMON, 1899, 1909b. Finistère : DENIS, 1938a. Gers : LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979, 1980 ; ROLLARD, 1990c. Isère : SIMON, 1876a. Landes : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 ; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique : ROLLARD, 1990c. Loiret : COCQUEMPO & al., 1984 ; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Morbihan : MURPHY, 1994 ; ROLLARD, 1990c. Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Oise : SIMON, 1876a. Orne : ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1953b, 1959d. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987 ; DENIS, 1943c ; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998 ; LESSERT, 1910 ; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000 ; LESSERT, 1910 ; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910. "Seine" : COCQUEMPO & al., 1991 ; LUCAS, 1875 (L. a.) ; PLANET, 1905 ; ROLLARD, 2000 ; SIMON, 1876a. Seine-Maritime : CORNIC, 1977 ; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : COCQUEMPO & al., 1984, 1989 ; DOIGNON, 1976 ; SIMON, 1876a, 1898b. Vaucluse : CORNIC, 1978. Vendée : DENIS, 1962b, 1964b. Vosges : SIMON, 1876a. — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois : DENIS, 1959d ; LUCAS, 1875. Bois de chênes : EMERIT & al., 1997. Bois, clairière : LUCAS, 1870d. Bruyères : HILLYARD, 1975. Champ de céréales : COCQUEMPO & al., 1984, 1989, 1991. Clairières sablonneuses : PLANET, 1905. Clôture : BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Forêt : DENIS, 1938a. Forêt de bouleaux et de hêtres : BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins : DENIS, 1962b, 1964b. Forêt humide : LE PERU, 2004. Forêt mixte : BOSMANS & al., 1985a. Forêt, clairière : DOIGNON, 1976 ; SIMON, 1937. Friche : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992 ; SIMON, 1937 ; VEILLON, 1997. Haie : BRAUD & al., 2005. Jardin : LE PERU, 2004. Lande sèche : CANARD, 1979, 1980. Marécage : VILLEPOUX, 1990b. Mousses : DENIS, 1967d. Pelouse sèche : BRAUD & al., 2005. Prairie : CORNIC, 1977 ; LEDOUX & al., 2002 ; PASQUET & al., 1992. Prairie humide : BRAUD & al., 2005. Pâturage : LEBORGNE & al., 1998. **Période.** — *Mâle.* Mai : CORNIC, 1978 ; LESSERT, 1904. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1938a ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a ; LESSERT, 1904 ; VEILLON, 1997. Octobre : LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mai : EMERIT & al., 1997 ; LE PERU, 2004 ; LESSERT, 1904. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1938a, 1964b ; EMERIT & al., 1997 ; LEDOUX & al., 1996a, 2002 ; LESSERT, 1904 ; VEILLON, 1997. Juillet : CORNIC, 1978. Août : CORNIC, 1978 ; LE PERU, 2004 ; LUCAS, 1870d. Septembre : CORNIC, 1978 ; EMERIT & al., 1997 ; LE PERU, 2004 ; LUCAS, 1875. Décembre : DENIS, 1943c. — *Femelle avec cocon.* Juin : DENIS, 1938a, 1964b ; EMERIT & al., 1997. Juillet : DENIS, 1959d.

### *Hogna radiata* (Latreille, 1817)

*Lycosa r.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BECKER, 1881 (L. r.), 1882 (L. r.). Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Aude : DELFOSSE, 2000a, 2000b. Aveyron : SIMON, 1876a (L. r.). Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1965 (L. r.) ; SOYER, 1953b. Charente : SIMON, 1937 (L. r.). Charente-Mari-

time : JOURDE & al., 1999 (L. r.) ; SIMON, 1876b (L. r.). Corse : KRAUS, 1955 ; SIMON, 1876a (L. r.). Drôme : SIMON, 1876a (L. r.). Gard : CHANSIGAUD & al., 1994. Garonne (Haute-) : DENIS, 1953b. Gers : LUCANTE, 1880b (L. r.). Hérault : DENIS, 1963e ; EMERIT & al., 1990. Landes : LUCANTE, 1880b (L. r.). Loire-Atlantique : SIMON, 1937 (L. r.). Lot, Lozère : SIMON, 1876a (L. r.). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1943c, 1963e, 1967d ; GROS, 2004 (L. r.) ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003 ; SOYER, 1965 ; TAMBS-LYCHE, 1957. Seine-et-Marne, Sèvres (Deux-) : SIMON, 1937 (L. r.). Tarn : LUCANTE, 1880b (L. r.). Var : BECKER, 1880 (L. r.), 1882 (L. r.) ; DENIS, 1937b (L. r.) ; GROS, 1982 (L. r.), 1983a ; KOVOOR & al., 2000 ; SIMON, 1898c (L. r.). Vaucluse : CHANSIGAUD, 1992 ; CORNIC, 1978. Vendée : DENIS, 1962b, 1962d ; DUFFEY, 1964 ; MURPHY, 1994 (L. r.). — Midi de la France : SIMON, 1937 (L. r.). Espagne, Italie, Suisse (L. r.). De la Méditerranée à l'Asie centrale, Afrique centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (CORNIC, 1978 ; SOYER, 1953b). **Habitat.** Arrière-dune : LEDOUX & al., 1999a. Bois de chênes-lièges : SOYER, 1965 ; TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de plage, sous des pierres : DENIS, 1962d. Dune : MURPHY, 1994. Dune, sous des pierres : DENIS, 1962b, 1962d. Forêt de pins sur dune : DUFFEY, 1964. Friche : LEDOUX & al., 2003. Garrigue : SOYER, 1965. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts : CHANSIGAUD & al., 1994 ; RAPHAËL & al., 1992. Marais salant : SIMON, 1937. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Pelouse : SOYER, 1953b. Pelouses sèches, sous des pierres : JOURDE & al., 1999. Prairie : LEDOUX & al., 1999a. Prairie sèche et caillouteuse, sous des écorces ou des pierres : DELFOSSE, 2000b. Sablière : SIMON, 1937. Sur sol sec et caillouteux : DELFOSSE, 2000b. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Talus : CHANSIGAUD, 1992. *Therobrachypodion* : BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Juin : DELFOSSE, 2000b. Juillet : CORNIC, 1978. Août : CORNIC, 1978 ; GROS, 1983a ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juin : DENIS, 1967d. Juillet : CORNIC, 1978 ; GROS, 1982, 1983a, 2004. Août : CORNIC, 1978 ; GROS, 2004 ; LEDOUX & al., 2003. Septembre : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1953b, 1962b. Octobre : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1962b ; LEDOUX & al., 1999a. Novembre : DENIS, 1962b ; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Août : DENIS, 1962b, 1962d. Septembre : DENIS, 1937b, 1962d ; SIMON, 1876a. Octobre : SIMON, 1876a. — *Femelle avec ses jeunes.* Septembre : DENIS, 1937b ; SIMON, 1876a. Octobre : CHANSIGAUD, 1992 ; DENIS, 1962b, 1967d ; SIMON, 1876a.

### *Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohlert, 1865)

*Lycosa r.* ; *Pardosa r.*

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Aisne : DENIS, 1939b ; SIMON, 1880b (P. r.), 1937 (L. r.). Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990c ; SIMON, 1937 (L. r.). Jura : SIMON, 1937 (L. r.). Landes : DENIS, 1964a ; SIMON, 1937 (L. r.). Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique : MURPHY, 1994. Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Morbihan : ROLLARD, 1990c. Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Oise : SIMON, 1937 (L. r.). Orne : ROLLARD, 1990c. Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1937 (L. r.). Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992. "Seine" : ROLLARD, 2000 ; SIMON, 1937 (L. r.). Seine-et-Marne : SIMON, 1880a (L. r.), 1937



(*L. r.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord de rivière: VEILLON, 1997. Bord marécageux de canal: SIMON, 1880b. Forêt de pins, dans un pot de résine: DENIS, 1964a. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Lande: VEILLON, 1997. Marais, détritiques: SIMON, 1880a. Marécage: DENIS, 1939b; MURPHY, 1994; SIMON, 1937; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1939b; SIMON, 1937. Août: DENIS, 1964a. Octobre: SIMON, 1937. — *Femelle.* Mars: VEILLON, 1997. Avril: SIMON, 1937; VEILLON, 1997. Juin: VEILLON, 1997. Octobre: SIMON, 1937. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1937.

*Lycosa narbonensis* Walckenaer, 1806

*Tarentula n.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; DENIS, 1964d; SIMON, 1876a, 1937. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardèche: LUCAS, 1870b; SIMON, 1876a, 1937. Aude, Aveyron: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; BIGOT & al., 1983; SOYER, 1953b (*T. n.*). Gard: SIMON, 1876a. Lot-et-Garonne: DALINGWATER, 1991. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d. Var: BERLAND, 1929; DENIS, 1936; GOODMAN, 1928; GOULLIART, 1979b; SIMON, 1876a. Vaucluse: CORNIC, 1978; FABRE, 1905. — Midi de la France, dans la région méditerranéenne: ne paraît pas dépasser au nord le département de l'Ardèche, et à l'est les environs de Cannes: SIMON, 1937. Italie. Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (SIMON, 1876a). **Habitat.** Marécage salé: BIGOT, 1965. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Juin, juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1936. Juin, juillet: CORNIC, 1978. Septembre: DENIS, 1967d.

*Pardosa agrestis* (Westring, 1861)

*Lycosa a.*; *P. purbeckensis*.

**Répartition.** Aisne, Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: HOLLANDER & al., 1972. Calvados: ROLLARD, 1990c (*P. p.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: SIMON, 1937. Drôme: HOLLANDER & al., 1972; VLIJM, 1971. Loire, Loire-Atlantique: SIMON, 1937. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984. Maine-et-Loire: NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b (*L. a.*); PÉTILLON & al., 2004; SIMON, 1876a, 1937. Morbihan: ROLLARD, 1990c (*P. p.*); SIMON, 1876a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000 (*P. p.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1952c, 1967d. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992 (*P. p.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Seine, Somme: SIMON, 1876a. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vienne: VLIJM, 1971. Yonne: HOLLANDER & al., 1972; SIMON, 1937. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2380 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Bord de lac: DENIS, 1953a. Champ cultivé: HOLLANDER & al., 1972.

Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Fossé: HOLLANDER & al., 1972. Friche: VEILLON, 1997. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais salant: SIMON, 1937. Peupliers: NOËL & al., 2005. Prairie: NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1937. Pré tourbeux: SIMON, 1937. Roseaux: NOËL & al., 2005. Sentier sablonneux au soleil: LUCAS, 1878b. Tourbière: DENIS, 1952c. **Période.** — *Mâle.* Avril: VLIJM, 1971. Mai: BONTE, 2000; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle.* Avril: VLIJM, 1971. Mai: BONTE, 2000; VLIJM, 1971. Juin: SIMON, 1937; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a, 1960a. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: SIMON, 1937. Novembre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1959d. Août: DENIS, 1952c, 1953a.

*Pardosa agricola* (Thorell, 1856)

*Lycosa a.*; *Lycosa arenaria*; *P. arenicola*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1876a. Alpes (Hautes-): GAUTIER, 1980, 1981; SIMON, 1876a. Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1876a. Calvados: LUCAS, 1870d (*L. arenaria*); SIMON, 1876a. Cantal: SIMON, 1876a. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*L. arenaria*). Drôme: VLIJM, 1971. Eure-et-Loire: SIMON, 1876a. Garonne (Haute-): KERVILLE, 1932. Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: AMANIEU & al., 1963 (*P. a.*); VLIJM, 1971. Isère: SIMON, 1876a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1900 (*P. a.*); SIMON, 1937 (*P. a.*). Marne: LUCAS, 1878a (*L. arenaria*). Morbihan: ROLLARD, 1990c (*P. a.*); SIMON, 1876a. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. "Seine": LUCAS, 1875 (*L. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: SIMON, 1937 (*P. a.*). — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 2450 m (KERVILLE, 1932). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Bord de cours d'eau et de lac, sables, galets: VLIJM, 1971. Bord de mer, sous une pierre: KERVILLE, 1900. Bord de rivière: GAUTIER, 1980; LEDOUX & al., 2002. Dune: SIMON, 1937. Forêt, sous une pierre: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Grèves des rivières: SIMON, 1876a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lieu humide: GAUTIER, 1981. Lieu sec aride: LUCAS, 1878a. Lieu sec découvert et sablonneux: SIMON, 1937. Lieux sablonneux et secs: SIMON, 1876a. Littoral, galets: KERVILLE, 1900. Littoral, schorre: AMANIEU & al., 1963. Plage, galets: SIMON, 1937. Prairie: NOËL & al., 2005. Sable au soleil: LUCAS, 1870d. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002; VLIJM, 1971. Mai: SIMON, 1876a; VLIJM, 1971. Juin: VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. — *Femelle.* Avril: VLIJM, 1971. Mai: SIMON, 1876a; VLIJM, 1971. Juin: VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. Août: LUCAS, 1870d, 1878a. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon.* Mai: SIMON, 1876a. Juin: SIMON, 1876a; VLIJM, 1971. Juillet: SIMON, 1876a.

*Pardosa amentata* (Clerck, 1757)

*Lycosa a.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-): GAUTIER, 1980, 1981. Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935. Ardennes: LENICE, 1992.

Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BIGOT, 1983; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a, 1967d. Gironde: AMANIEU & al., 1963. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: ROLLARD, 1990c; TONGIORGI, 1966. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1979b. Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1955c, 1960a; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c, 1952c; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*L. a.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*L. a.*); SIMON, 1876a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1887. Var: DENIS, 1937a. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b. Vosges: SIMON, 1876a. Yonne: HOLLANDER & al., 1972; LUCAS, 1872 (*L. a.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1952c; HOLLANDER & al., 1972. Bord de l'eau: SIMON, 1876a. Bord de lac: DENIS, 1950b, 1951c. Bord de lac tourbeux: DENIS, 1955c. Bord de mare: DENIS, 1941. Bord de rivière: DENIS, 1938a; GAUTIER, 1980; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de ruisseau: DENIS, 1940a. Champ: GOULLIART, 1979b. Dune: DENIS, 1962b. Étang, dans une fleur de salicaria: VEILLON, 1997. Forêt: DENIS, 1960a, 1961b. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Jardin: LENICE, 1992. Lande: VEILLON, 1997. Lieu aride au soleil: LUCAS, 1872. Lieu humide: GAUTIER, 1981. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Littoral, schorre: AMANIEU & al., 1963. Littoral, vase salée: BIGOT, 1983. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Marécage: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999, 2003; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: CORNIC, 1977; DENIS, 1960a; LEDOUX & al., 1996a, 1996c, 2002; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1876a, 1937. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a; BRAUD & al., 2005; DENIS, 1940a. Pré tourbeux: LEDOUX & al., 1996b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: DENIS, 1950b, 1952c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle.* Mars: CORNIC, 1977. Avril: CORNIC, 1977; DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Mai: CORNIC, 1977; DENIS, 1938a, 1943c; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996c.

Août: DENIS, 1952c. — *Femelle.* Avril: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1938a, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: BERLAND, 1937; DENIS, 1950b, 1952c, 1955c, 1957a, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août: BERLAND, 1935; LEDOUX & al., 1996a, 1996b. Septembre: DENIS, 1951c; LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1875; VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon.* Avril: SIMON, 1876a. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; SIMON, 1876a. Juin: DENIS, 1938a, 1941; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1950b, 1954a, 1955c, 1959d, 1960a, 1961b. Août: BERLAND, 1935; DENIS, 1952c, 1953a, 1967d.

#### *Pardosa bifasciata* (C. L. Koch, 1834)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gironde: DENIS, 1952a. Isère: SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Oise: SIMON, 1876a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1876a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Var: SIMON, 1876a. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Carrière de pierres à chaux: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Lieu sec et découvert: SIMON, 1937. Marécage: DENIS, 1952a. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Prairies sablonneuses très chaudes: SIMON, 1876a. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Sur un mur: LENICE, 1992. **Période.** — *Mâle.* Mai: LESSERT, 1904; SIMON, 1937. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; EMERIT & al., 1997; LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1876a, 1937. — *Femelle.* Mai: LESSERT, 1904; SIMON, 1937. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; EMERIT & al., 1997; LESSERT, 1904; SIMON, 1876a, 1937. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Août: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle avec cocon.* Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. [Note de SIMON, 1937: «Mâles et femelles adultes en mai et juin, une seconde ponte (sans mâle) en septembre»].

#### *Pardosa blanda* (C. L. Koch, 1833)

*Lycosa b.*; *Lycosa cursoria*; *P. cursoria*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1876a (*P. c.*). Alpes (Hautes-): BIGOT & al., 1981; GAUTIER, 1980, 1981; SIMON, 1876a (*P. c.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*P. c.*). Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Cantal: SIMON, 1876a (*P. c.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Isère: SIMON, 1876a (*P. c.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1952c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1876a (*P. c.*). Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE,

1898 (*L. b.*), 1898 (*L. c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Alpes, Auvergne, Cévennes, Pyrénées: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** De 1300 m jusqu'à 3080 m (DENIS, 1960a). [sauf une récolte exceptionnelle à 300 m d'altitude (BOSMANS & al., 1985a). SIMON, 1937 note: «Je ne l'ai jamais observé au-dessous de 1000 m d'altitude»]. **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de lac: DENIS, 1950b. Bord de rivière: BIGOT & al., 1981; GAUTIER, 1980. Forêt: DENIS, 1960a. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lieu humide: GAUTIER, 1981. Pelouse avec cailloux; pelouse avec pierres: LEDOUX & al., 1996b. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairies alpestres: SIMON, 1876a. Sous une pierre: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière: DENIS, 1950b, 1952c. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: BERLAND, 1937; DENIS, 1950b, 1955c, 1957a, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898, 1898. Août: DENIS, 1957a, 1959d; LEDOUX & al., 1996b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898, 1898. — *Femelle.* Juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: BERLAND, 1937; CORNIC, 1978; DENIS, 1950b, 1952c, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898, 1898. Août: DENIS, 1957a, 1959d; LEDOUX & al., 1996a, 1996b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898, 1898. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1954a, 1955c, 1957a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1967d.

#### *Pardosa cribrata* Simon, 1876

**Répartition.** Aude: SIMON, 1876a, 1937. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; DENIS, 1950c; HOLLANDER & al., 1972; PETIT & al., 1945; SIMON, 1937; SOYER, 1953b; TONGIORGI, 1974. Corse: SIMON, 1937. Hérault: HOLLANDER & al., 1972; SIMON, 1876a, 1937. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1937; TAMBS-LYCHE, 1957. Var: DENIS, 1937b. — Espagne, Italie. Europe du sud, Algérie. **Habitat.** Bord d'étang: PETIT & al., 1945. Marais salant: DENIS, 1950c. Marécage salé: BIGOT, 1965. Plage, sous les plaques sèches de *Chetomorpha*: DENIS, 1950c. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965; HOLLANDER & al., 1972. Terrains salés littoraux: SOYER, 1953b. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Mai: TAMBS-LYCHE, 1957. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c; TAMBS-LYCHE, 1957. Octobre: DENIS, 1937b. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1950c.

#### *Pardosa femoralis* Simon, 1876

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a, 1937. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; SIMON, 1937. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a, 1937. Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault: HOLLANDER & al., 1972. Lot: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1937. Lozère: HOLLANDER & al., 1972. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1937. Vaucluse: SIMON, 1876a. Yonne: HOLLANDER & al., 1972. — Espagne, Italie. Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord d'étang; bord de rivière; fossé: HOLLANDER & al., 1972. Herbes humides: DENIS, 1948b. Prairie: SIMON, 1937. Tourbière: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1948b. Août: LEDOUX & al., 1996a.

#### *Pardosa ferruginea* (L. Koch, 1870)

*P. alveolata.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Isère: SIMON, 1876a (*P. a.*), 1937. — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt de conifères: SIMON, 1937.

#### *Pardosa frigida* Simon, 1876

**Taxonomie.** Dans l'ouvrage posthume de SIMON (1937) on trouve cette remarque: «Les exemplaires de cette espèce n'ont pu être trouvés dans la collection Simon». Pour TONGIORGI, 1966 la validité de cette espèce est douteuse. PLATNICK, 2004 la place dans la liste des *nomina dubia*. Cependant le dessin (SIMON, 1876) et les descriptions (SIMON, 1937) devraient permettre de reconnaître cette espèce si elle était retrouvée. *P. frigida* est donc maintenue dans la liste des espèces valides. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a, 1937. [localité: Faillefeu]. — Connue seulement de France.

#### *Pardosa giebeli* (Pavesi, 1873)

**Répartition.** Savoie: BERLAND, 1937. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a. — Alpes de la Savoie et du Dauphiné: SIMON, 1937. Allemagne, Suisse. Europe. **Altitude.** 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: BERLAND, 1937. — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937.

#### *Pardosa hortensis* (Thorell, 1872)

*Lycosa h.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): GAUTIER, 1980; SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardèche: HOLLANDER & al., 1972. Ariège: LUCANTE, 1880b. Aude, Aveyron: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1953b (*L. h.*). Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Drôme: HOLLANDER & al., 1972. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Gironde: LUCANTE, 1880b; VLIJM, 1971. Ile-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1876a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Lozère: HOLLANDER & al., 1972. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b (*L. h.*); ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; DENIS, 1937d. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1876a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; SCHALLER, 2000. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; LUCAS, 1876 (*L. h.*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1876a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884.

Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888a. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: SIMON, 1898c. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a; CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a. Vendée: DENIS, 1963c, 1965c. Yonne: HOLLANDER & al., 1972. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ancienne mine, sur le sable: VEILLON, 1997. Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: LUCAS, 1876. Bord d'étang: DENIS, 1938a; LEDOUX, 2000. Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a; GAUTIER, 1980; HOLLANDER & al., 1972. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Bord de ruisseau; carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Champ: SOYER, 1953b. Champ cultivé: CORNIC, 1978; HOLLANDER & al., 1972; LUCAS, 1878b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Clairière: SOYER, 1953b. Clôture: BRAUD & al., 2005. Cultures: SIMON, 1937. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Éboulis calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1943c; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes, clairière: LE PERU, 2004. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: CORNIC, 1978; LUCAS, 1877b; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004; SIMON, 1937; SOYER, 1953b. Lande: VEILLON, 1997. Marécage: ROSELLE, 1888a. Milieux urbains, terrains vagues et jardins: SIMON, 1876a. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: NOËL & al., 2005. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Sur un mur: DENIS, 1965c. Terrain vague: SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1943c; SIMON, 1876a. Avril: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; SOYER, 1953b; VEILLON, 1997. Mai: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; SOYER, 1953b. Juin: SOYER, 1953b; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1940a; SOYER, 1953b. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: LUCAS, 1877b. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1943c; SIMON, 1876a. Avril: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; SOYER, 1953b; VEILLON, 1997. Mai: CORNIC, 1978; LE PERU, 2004; SOYER, 1953b; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1997; LEDOUX, 2000; SOYER, 1953b; VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. Juillet: DENIS, 1940a; SOYER, 1953b; VEILLON, 1997. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: LUCAS, 1877b. Octobre: LUCAS, 1876. — *Femelle avec cocon.* Avril: DENIS, 1943c; SIMON, 1876a. Mai: DENIS, 1938a, 1943c, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1937d, 1938a, 1943c; EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1939a, 1963c.

***Pardosa luctinosa* Simon, 1876**

**Répartition.** Corse: SIMON, 1876a, 1937; VLIJM, 1971. Var: SIMON, 1937. — Espagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** *Salicornia*; zone salée littorale: VLIJM,

1971. **Période.** — *Mâle.* Mai: VLIJM, 1971. — *Femelle.* Mai: VLIJM, 1971.

***Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802)**

*Lycosa l.*

[Les citations antérieures à 2000 pourraient se rapporter à *P. saltans*]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne: GROS, 2004. Ardèche: HOLLANDER & al., 1972; VLIJM, 1971. Ariège: DENIS, 1961b; LUCANTE, 1880b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1876a; TONGIORGI, 1966; VLIJM, 1971. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a; LUCANTE, 1880b. Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: LUCANTE, 1880b; VLIJM, 1971. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: TONGIORGI, 1966. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: GOULLIART, 1979b. Oise: TONGIORGI, 1966. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904, 1910. "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1876 (*L. l.*); ROLLARD, 2000; TÖPFER-HOFMANN & al., 2000. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976; TONGIORGI, 1966. Somme: ROSELLE, 1888a. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: TONGIORGI, 1966. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970. Bois: DENIS, 1967e; LUCAS, 1876; SIMON, 1876a. Bois de chênes; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1938a; HOLLANDER & al., 1972. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Bord de ruisseau, litière: LEDOUX & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Éboulis calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Formation de chênes et châtaigniers: LEDOUX & al., 2003. Forêt: DENIS, 1938a, 1963c; GOULLIART, 1979b; LANCELEVÉE, 1884; LEDOUX & al., 1996c; ROSELLE, 1888a; VLIJM, 1971. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1987. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes et hêtres: LE PERU, 2004. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987; CANARD, 1989; DENIS, 1962b, 1964b, 1965c.

Forêt décidue: TÖPFER-HOFMANN & al., 2000. Forêt mixte: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, trônçs: DOIGNON, 1976. Fossé: HOLLANDER & al., 1972. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Lande: VEILLON, 1997. Lieu humide, litière: LEDOUX & al., 2003. Maison: DENIS, 1965c. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; CORNIC, 1977; LEDOUX & al., 2002. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle*. Mars: SIMON, 1876a. Avril: DENIS, 1963c; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003; SIMON, 1876a; TÖPFER-HOFMANN & al., 2000; VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. Mai: DENIS, 1943c, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a; VLIJM, 1971. Juin: DENIS, 1938a; LEDOUX, 2000. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b, 1963c; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. Mai: DENIS, 1943c, 1965c, 1967e; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a; VLIJM, 1971. Juin: DENIS, 1938a, 1943c, 1964b; EMERIT & al., 1997; GROS, 2004; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1954a, 1963c; LEDOUX & al., 1996a. Août: LE PERU, 2004. Septembre: CLARK & al., 1970; LE PERU, 2004. Octobre: LUCAS, 1876. — *Femelle avec cocon*. Avril: SIMON, 1876a. Mai: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a; VLIJM, 1971. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1959d, 1961b, 1963c. Septembre: DENIS, 1953b. Octobre: LE PERU, 2004. — *Femelle avec ses jeunes*. Juin: DENIS, 1964b.

*Pardosa mixta* (Kulczynski, 1887)

*P. monticola mixta*.

**Répartition.** Lozère: SIMON, 1937 (*P. m. m.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique.

*Pardosa monticola* (Clerck, 1757)

*Lycosa m.*; *Lycosa saccigera*.

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Aube, Aveyron: SIMON, 1876a. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*L. s.*), 1877b. Cantal: SIMON, 1876a. Corse: KRAUS, 1955; TONGIORGI, 1966. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*L. s.*); ROLLARD, 1990c; SALMON, 1959. Finistère: DENIS, 1939a, 1940a; ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): KERVILLE, 1932. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1876a. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a; SIMON, 1937. Lozère: SIMON, 1937. Maine-et-Loire: NOËL & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924; KERVILLE, 1898, 1900; LUCAS, 1878b (*L. m.*); ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a, 1937. Marne: LUCAS, 1878a (*L. m.*). Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: GOULLIART, 1979b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme: SIMON, 1876a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c, 1952c, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1876a, 1937; TONGIORGI, 1966. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LESSERT,

1904, 1910; SIMON, 1937. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1875 (*L. m.*); SIMON, 1876a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: SIMON, 1876a, 1937. Var: DENIS, 1937a. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1941. Yonne: HOLLANDER & al., 1972; LUCAS, 1872 (*L. m.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Bois: DENIS, 1960a; LUCAS, 1875. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1952c. Bord de ruisseau: DENIS, 1940a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Champ inculte: LUCAS, 1878b, 1882a. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Dune: GOULLIART, 1979b; KERVILLE, 1900; LUCAS, 1877b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, au niveau du *Puccinellietum* et de l'*Agropyretum*: SALMON, 1959. Forêt: DENIS, 1960a. Forêt de pins: DENIS, 1950b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Fougères: DENIS, 1940a. Jardin: SIMON, 1876a. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lande à *Ulex* et *Pteris*: LUCAS, 1870d. Lieu aride au soleil: LUCAS, 1872. Lisière de forêt, sous une pierre: LUCAS, 1878a. Marais salant: SIMON, 1937. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a, 2003; NOËL & al., 2005; SIMON, 1937. Prairie marécageuse: SIMON, 1937. Prairies alpêtres: SIMON, 1876a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre: CORNIC, 1978. Terrains vagues: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX & al., 1996a. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1938a, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1940a, 1950b, 1952c, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b. Septembre: LUCAS, 1877b. — *Femelle*. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1938a, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1950b, 1955c, 1957a, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Août: LUCAS, 1870d, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre: LUCAS, 1875, 1877b. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1943c. Juin: DENIS, 1941, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1950b, 1952c, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LEDOUX & al., 2003.

*Pardosa morosa* (L. Koch, 1870)

**Répartition.** Ain: SIMON, 1876a. Alpes (Hautes-): BIGOT & al., 1981; GAUTIER, 1981. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aveyron, Cantal: SIMON, 1876a. Drôme: HOLLANDER & al., 1972; VLIJM, 1971. Gers: LUCANTE, 1880b. Isère: SIMON, 1876a. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c; SIMON, 1876a. Var: BOUMEZZOUGH & al., 1983; SIMON, 1898c. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a; SIMON, 1876a. — Midi de la France, Alpes, Pyrénées, Cévennes: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie centrale. **Altitude.** 60 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bord de lac: SIMON, 1937. Bord de rivière: BIGOT & al., 1981, 1982a; HOLLANDER & al., 1972; SIMON, 1937; VLIJM, 1971. Bord de rivière,

galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Bord de torrent: SIMON, 1937. Bord des rivières et des torrents: SIMON, 1876a. Forêt: DENIS, 1943c. Lieu humide: GAUTIER, 1981. **Période.** — *Mâle.* Janvier, février: DENIS, 1943c. Avril: DENIS, 1943c; VLIJM, 1971. Octobre: DENIS, 1943c. — *Femelle.* Février: DENIS, 1943c. Avril: DENIS, 1943c; VLIJM, 1971. Octobre: DENIS, 1943c. — *Femelle avec cocon.* Avril: VLIJM, 1971.

*Pardosa nigra* (C. L. Koch, 1834)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Isère: SIMON, 1876a. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Alpes du Dauphiné, de la Provence: SIMON, 1937. Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** De 720 m (CORNIC, 1978) jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Pelouse avec cailloux; pelouse avec pierres; prairie: LEDOUX & al., 1996b. Prairies alpestres, sous les pierres: SIMON, 1876a. Rochers: SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Juillet: BERLAND, 1937. Août: LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937; CORNIC, 1978.

*Pardosa nigriceps* (Thorell, 1856)

*Lycosa n.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1876a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c (*L. n.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Eure-et-Loire: SIMON, 1876a. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; ROLLARD, 1990c. Gers: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Loire-Atlantique: ROLLARD, 1990c. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Lozère: HOLLANDER & al., 1972. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; LUCAS, 1878b (*L. n.*); PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Marne: SIMON, 1876a. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Orne: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004; VILLEPOUX, 1986, 1990a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. "Seine": SIMON, 1876a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1876a. Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1876a. Vendée: DENIS, 1941. Yonne: HOLLANDER & al., 1972. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois humides et ombragés: LUCAS, 1874c. Bord de ruisseau: DENIS, 1941. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1938a. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande: VEILLON, 1997. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lieu humide: LUCAS, 1878b. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: DENIS, 1938a; SIMON, 1937. Prairie: PASQUET & al., 1992.

Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie humide: SIMON, 1937. Prairie très humide en friche: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Avril: VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1943c; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1937. Juin: DENIS, 1938a, 1943c. Août: LUCAS, 1878b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1938a. Mai: SIMON, 1937. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1938a. Août: LUCAS, 1878b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941; EMERIT & al., 1999. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a.

*Pardosa occidentalis* Simon, 1881

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: TONGIORGI, 1974. Gard: LEDOUX, 1973. Hérault, Vaucluse: LEDOUX, 1973, 1973b. — Espagne. Portugal. **Habitat.** Bordure de champ; garrigue: LEDOUX, 1973. Terrain sec: LEDOUX, 1973b. Vigne: LEDOUX, 1973. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX, 1973. — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 1973. Juillet: TONGIORGI, 1974. — *Femelle avec cocon.* Juin: LEDOUX, 1973. — *Femelle avec ses jeunes.* Juillet, août: LEDOUX, 1973.

*Pardosa oreophila* Simon, 1937

**Taxonomie.** Les espèces *P. oreophila* et *P. saltuaria* ont été confondues par certains auteurs, et les descriptions données sont parfois inversées (voir TONGIORGI, 1966, WUNDERLICH, 1984 et HEIMER & al., 1991). Les données sont placées ici sous le nom utilisé dans les travaux, mais la répartition de ces espèces est à prendre avec réserve. Selon WUNDERLICH, 1984 et HEIMER & al., 1991, *P. saltuaria* ne se trouverait qu'en Europe centrale dans les Hautes et Basses Tatra. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. — Alpes françaises: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Europe centrale et du sud. **Altitude.** De 1700 m (LEDOUX & al., 1996a) jusqu'à 2470 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2003. Rhododendrons; rivière, pierres: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: LEDOUX & al., 1996a, 1996c. — *Femelle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon.* Juin: LEDOUX & al., 1996a.

*Pardosa paludicola* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b; VLIJM, 1971. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Drôme: HOLLANDER & al., 1972. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Gers: LUCANTE, 1880b. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": PLANET, 1905. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Yonne: HOLLANDER & al., 1972. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie,

Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (VILLEPOUX, 1986). **Habitat.** Forêt, bord de mare: PLANET, 1905. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Forêt, fossé: PLANET, 1905. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Lieu humide: VLIJM, 1971. Lieu sablonneux et humide: SIMON, 1876a, 1937. Marécage: BELIN, 2001; HOLLANDER & al., 1972; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle.* Avril: VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. — *Femelle.* Avril: VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. Juin: VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon.* Avril: VLIJM, 1971. Juillet: DENIS, 1959d.

***Pardosa palustris*** (Linnaeus, 1758)

*Lycosa p.*; *Lycosa tarsalis*; *P. herbigrada*; *P. tarsalis*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935 (*P. t.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*P. t.*); LUCAS, 1870d (*L. t.*), 1877b. Cantal: SIMON, 1876a. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CAZALET, 1935. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: ROLLARD, 1990c. Ille-et-Vilaine: CAZALET, 1935; ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1876a. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984. Maine-et-Loire: NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946 (*P. t.*); KERVILLE, 1898 (*P. h.*); ROLLARD, 1990c; SIMON, 1937 (*P. h.*). Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (*P. t.*). Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998 (*P. t.*); LESSERT, 1910 (*P. t.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MÜLLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*L. p.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1876a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Somme, Vosges: SIMON, 1876a. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (BERLAND, 1935). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux; estuaire, schorre: BONTE, 2000. Estuaire, talus du schorre: CAZALET, 1935. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Grève: GUIBÉ, 1946. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à *Ulex* et *Pteris*: LUCAS, 1870d. Lieux humides et marécageux: LUCAS, 1877b. Marécage: EMERIT & al., 2003. Prairie: ASSELIN & al., 1989; CORNIC, 1977; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1876a, 1937. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle.* Avril: CORNIC, 1977; SIMON, 1876a. Mai: BONTE, 2000; CORNIC, 1977; EMERIT & al., 2003. Juin: VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & al., 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. — *Femelle.* Avril: SIMON, 1876a. Mai: BONTE, 2000; LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. Juillet: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: BERLAND, 1935; LUCAS, 1870d; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: LUCAS, 1877b. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1876a.

***Pardosa prativaga*** (L. Koch, 1870)

*P. fervida*.

**Taxonomie.** La synonymie *Pardosa fervida* Simon, 1876 = *P. prativaga* est établie par TONGIORGI, 1966. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b; VLIJM, 1971. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardèche: VLIJM, 1971. Aube: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: HOLLANDER & al., 1972. Calvados: ASSELIN & al., 1989. Cantal: SIMON, 1876a. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1876a (*P. f.*), 1937 (*P. f.*); VLIJM, 1971. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Drôme: VLIJM, 1971. Eure: EMERIT & al., 2003. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Gironde: SIMON, 1937; VLIJM, 1971. Hérault: HOLLANDER & al., 1972. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979; DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1876a. Landes: SIMON, 1937. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: COCQUEMPOT & al., 1984; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise: SIMON, 1876a. Orne: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie: MÜLLER, 1985. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1876a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1876a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990. Somme: SIMON, 1876a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b; ROLLARD, 1990c. Yonne: HOLLANDER & al., 1972. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (MÜLLER, 1985). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1938a; HOLLANDER & al., 1972; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1990, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Lande sèche: CANARD, 1979. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: EMERIT & al., 2003; HENRY, 1981; HOLLANDER & al., 1972; SIMON, 1937; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: HOLLANDER & al., 1972. Peupliers: NOËL & al., 2005. Plage: DENIS, 1962b. Prairie: CORNIC, 1977; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Roseaux: NOËL & al., 2005. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997; VLIJM, 1971. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; VLIJM, 1971. Juin: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Février: VEILLON, 1997. Avril: LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1937; VLIJM, 1971. Mai: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; VLIJM, 1971. Juin: DENIS, 1938a, 1962b; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: MÜLLER, 1985. — *Femelle avec cocon.* Avril, mai: VLIJM, 1971. Juin: DENIS, 1938a; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle avec ses jeunes.* Mai: LEDOUX, 2000.



*Pardosa proxima* (C. L. Koch, 1847)

[Les citations antérieures à 1974 pourraient se rapporter à *P. vlijmi*]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b; VLIJM, 1971. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: Aude: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: HOLLANDER & al., 1972; PETIT & al., 1945. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1876a; VLIJM, 1971. Côtes-d'Armor: SIMON, 1876a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Drôme: HOLLANDER & al., 1972. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1940a; ROLLARD, 1990c. Gard: SIMON, 1876a. Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Hérault: HOLLANDER & al., 1972. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a; ROLLARD, 1990c. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Lozère: HOLLANDER & al., 1972, 1974. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Nord: GOULLIART, 1979b. Orne: SIMON, 1876a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1952c, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a; SIMON, 1876a. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": SIMON, 1876a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; SIMON, 1876a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: SIMON, 1876a. Var: BOUMEZZOUGH & al., 1983; DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a, 1985; LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1964b, 1965c; ROLLARD, 1990c. Yonne: HOLLANDER & al., 1972, 1974. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, Canaries, Açores. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire, bord d'étang: VEILLON, 1997. Bois: BRAUD & al., 2005. Bord d'étang: DENIS, 1952c; PETIT & al., 1945. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de mare: DENIS, 1941; LUCAS, 1882a. Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a, 1985; HOLLANDER & al., 1972; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Bord de torrent: DENIS, 1955c. Clôture: BRAUD & al., 2005. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Dune: DENIS, 1962b; GOULLIART, 1979b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux; estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: CANARD, 1989; DENIS, 1962b, 1965c. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Fossé: HOLLANDER & al., 1972. Friche: VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Jardin: DENIS, 1937b. Jardin en milieu urbain: VEILLON, 1997. Lieu humide en bordure de plage: KOVOOR & al., 2000. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & al., 1970. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais salant: SIMON, 1937. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; VILLEPOUX, 1990b. Pierraille: DENIS, 1964b. Prairie: CORNIC, 1977; NOËL & al., 2005; SIMON, 1937; VLIJM, 1971. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Pré

tourbeux: LEDOUX & al., 1996b. *Salicornietum*: HOLLANDER & al., 1972. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1943c. Mars: CORNIC, 1977; HOLLANDER & al., 1974; LEDOUX, 2000. Avril: CORNIC, 1977; DENIS, 1967d; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; CORNIC, 1977; DENIS, 1937b, 1965c; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1941, 1943c; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Mars: HOLLANDER & al., 1974; LEDOUX, 2000. Avril: CLARK & al., 1970; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002; VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1937b, 1967d; EMERIT & al., 2003. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: BERLAND, 1937; CANARD, 1989; DENIS, 1940a, 1964b; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996b; LUCAS, 1882a; VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1937b. Juin: DENIS, 1941. Juillet: DENIS, 1955c. Septembre: DENIS, 1964b.

*Pardosa pullata* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b; VLIJM, 1971. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1876a. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Doubs: EMERIT & al., 1997. Drôme: VLIJM, 1971. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; LUCANTE, 1880b. Gers: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; DENIS, 1937d; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004; VILLEPOUX, 1986, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c, 1952c, 1961b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1876a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1876a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884. Somme: SIMON, 1876a. Vendée: CLARK & al., 1970. Yonne: HOLLANDER & al., 1972. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie, Asie centrale. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1960a. Bord d'étang: DENIS, 1938a; HOLLANDER & al., 1972. Bord de l'eau: SIMON, 1876a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1938a, 1960a, 1961b. Forêt de feuillus: BOSMANS & al., 1985a. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: NOËL & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Lande: DENIS,



1940a. Lieu humide: LEDOUX & *al.*, 2003. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & *al.*, 1970. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Marécage: DENIS, 1938a; ÉMERIT & *al.*, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Peupliers: NOËL & *al.*, 2005. Prairie: ASSELIN & *al.*, 1989; BOSMANS & *al.*, 1985a; CORNIC, 1977; NOËL & *al.*, 2005; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie calcaire: ÉMERIT & *al.*, 1999. Prairie humide: ÉMERIT & *al.*, 1999; SIMON, 1876a. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Sous une pierre: ÉMERIT & *al.*, 1997. Tourbière: DENIS, 1952c; LEDOUX & *al.*, 1996a; VILLEPOUX, 1986. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Avril: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1943c; ÉMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a; VLIJM, 1971. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1943c; ÉMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1937d, 1938a, 1943c; ÉMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1940a, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1952c; LE PERU, 2004. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle.* Avril: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1943c; ÉMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a; VLIJM, 1971. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1943c; ÉMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: DENIS, 1938a, 1943c; ÉMERIT & *al.*, 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1954a, 1957a, 1960a. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2003. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1937d, 1938a, 1943c; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1954a, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1952c. Septembre: ÉMERIT & *al.*, 1997. — *Femelle avec ses jeunes.* Juillet: DENIS, 1960a.

### *Pardosa riparia* (C. L. Koch, 1833)

*Lycosa r.*; *P. kervillei*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1876a, 1937 (*P. k.*). Allier: SIMON, 1937 (*P. k.*). Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a, 1937 (*P. k.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*P. k.*). Finistère: LUCAS, 1868 (*L. r.*). Isère: SIMON, 1876a, 1937 (*P. k.*). Manche: KERVILLE, 1900; SIMON, 1937 (*P. k.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1937d. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*L. r.*). Var: DENIS, 1937a. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (PICKARD-CAMBRIDGE, 1898). **Habitat.** Dune: KERVILLE, 1900. Lande: LEDOUX & *al.*, 1996c. Marécage: LUCAS, 1868. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996c; SIMON, 1937. Prairies alpêtres: SIMON, 1876a. Rhododendrons: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1938a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LUCAS, 1868; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1937d. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LEDOUX & *al.*, 1996c; LUCAS, 1868; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996c.

### *Pardosa saltans* Töpfer-Hofmann, 2000

**Taxonomie.** Voir la note sous *P. vlijmi*. **Répartition.** Corse: TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. Rhin

(Haut-): BLICK, 2000. Seine-et-Marne: TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois: BRAUD & *al.*, 2005. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt mixte: TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. Haie; pelouse sèche; prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. **Période.** — *Mâle.* Avril: TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. Mai: BONTE, 2000; TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000; TÖPFER-HOFMANN & *al.*, 2000.

### *Pardosa saltuaria* (L. Koch, 1870)

**Taxonomie.** Les espèces *P. oreophila* et *P. saltuaria* ont été confondues par certains auteurs. Voir la note sous *P. oreophila*. Selon WUNDERLICH, 1984 et HEIMER & *al.*, 1991, *P. saltuaria* ne se trouverait qu'en Europe centrale dans les Hautes et Basses Tatra. Dans ce cas, toutes les citations de France sous le nom *P. saltuaria* se rapporteraient en fait à *P. oreophila*. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Cantal: SIMON, 1876a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a, 1960a. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1955c, 1960a, 1963e. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1957a, 1959d, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1952c, 1967d; SIMON, 1876a. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b. — Auvergne, Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence, Pyrénées orientales et centrales: SIMON, 1937. Espagne. De l'Europe centrale au Kazakhstan. **Altitude.** De 1600 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 2700 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bord d'étang: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1952c. Bord de lac: DENIS, 1950b. Éboulis: DENIS, 1957a. Forêt: BOSMANS & *al.*, 1985a. Prairie: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1996b. Prairie rudérale; prairie à rhododendron: BOSMANS & *al.*, 1987. Pré tourbeux: LEDOUX & *al.*, 1996b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1948b, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a. Août: DENIS, 1953a; LEDOUX & *al.*, 1996b. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1961b. Juillet: DENIS, 1954a, 1957a, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1953a, 1957a; LEDOUX & *al.*, 1996b. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1952c, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b, 1963e. Août: DENIS, 1953a, 1967d. Septembre: DENIS, 1951c.

### *Pardosa saturator* Simon, 1937

*P. wagleri saturator*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): BIGOT & *al.*, 1981; GAUTIER, 1980, 1981. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. [SIMON, 1937 note: «Nous ne connaissons cette forme que par un seul mâle sans localité précise»]. — Alpes: SIMON, 1937 (*P. w. s.*). Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe centrale. **Altitude.** 1750 m (LEDOUX & *al.*, 1996c). **Habitat.** Bord de rivière: BIGOT & *al.*, 1981; GAUTIER, 1980. Lieu humide: GAUTIER, 1981. Rivière, galets: LEDOUX & *al.*, 1996c. Torrent, galets: LEDOUX & *al.*, 1996b. **Période.** — *Mâle.* Août: LEDOUX & *al.*, 1996b. — *Femelle.* Août: LEDOUX & *al.*, 1996b.

### *Pardosa sordidata* (Thorell, 1875)

**Répartition.** Isère, Savoie (Haute-): ÉMERIT & *al.*, 2004c. — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 1100 m (ÉMERIT & *al.*, 2004c). **Habitat.** Forêt;

prairie: EMERIT & al., 2004c. **Période.** — *Mâle*. Mai: EMERIT & al., 2004c. — *Femelle*. Août: EMERIT & al., 2004c.

***Pardosa sphagnicola*** (Dahl, 1908)

**Répartition.** Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986. — Allemagne, Belgique, Europe, Russie. **Altitude.** 1200 m (VILLEPOUX, 1986). **Habitat.** Tourbière: VILLEPOUX, 1986.

***Pardosa tatarica*** (Thorell, 1875)

*P. strigillata*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1937 (*P. s.*). Corse: BIGOT, 1977 (*P. s.*); CANARD, 1989 (*P. s.*); KRAUS, 1955 (*P. s.*); SIMON, 1876a (*P. s.*), 1937 (*P. s.*); TONGIORGI, 1966 (*P. s.*); VLIJM, 1971 (*P. s.*). Hérault, Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1937 (*P. s.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*P. s.*), 1952c (*P. s.*); SIMON, 1937 (*P. s.*). Var: SIMON, 1937 (*P. s.*). — Espagne, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2120 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de rivière: BIGOT, 1977; CANARD, 1989. Bord de rivière, sable: SIMON, 1937. Bord de torrent: CANARD, 1989. Grèves des rivières; terrains sablonneux: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1943c; VLIJM, 1971. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Février, avril: DENIS, 1943c. Mai: DENIS, 1943c; VLIJM, 1971. Juin: DENIS, 1943c. Septembre: CANARD, 1989. Décembre: DENIS, 1943c. — *Femelle avec cocon*. Mai, juin: DENIS, 1943c. Juillet: DENIS, 1952c.

***Pardosa torrentum*** Simon, 1876

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Charente-Maritime: BIGOT, 1983. Lozère: SIMON, 1937. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. — Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence, Pyrénées: SIMON, 1937. Allemagne, Italie, Suisse, Europe, Géorgie. **Altitude.** De 1860 m (DENIS, 1955c) jusqu'à 3000 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de lac: DENIS, 1950b. Bord de torrent: SIMON, 1876a. Bord des rivières et des torrents: SIMON, 1937. Littoral, vase salée: BIGOT, 1983. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1950b, 1952c; LESSERT, 1910. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1950b, 1955c; LESSERT, 1910. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b.

***Pardosa vittata*** (Keyserling, 1863)

*P. palitans*.

**Taxonomie.** La synonymie *Pardosa palitans* Simon, 1876 = *P. vittata* est établie par TONGIORGI, 1966. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1937 (*P. p.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a, 1876a (*P. p.*), 1937, 1937 (*P. p.*). Aveyron: SIMON, 1876a (*P. p.*), 1937 (*P. p.*). Charente: SIMON, 1937 (*P. p.*). Corse: BIGOT, 1977; SIMON, 1876a (*P. p.*), 1937 (*P. p.*). Gers, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*P. p.*); SIMON, 1937 (*P. p.*). Maine-et-Loire: NOËL & al., 2005 (*P. p.*); SIMON, 1937 (*P. p.*). Morbihan: ROLLARD, 1990c (*P. p.*); SIMON, 1876a (*P. p.*), 1937 (*P. p.*). Var: SIMON, 1876a (*P. p.*), 1937 (*P. p.*). — Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à

la Géorgie. **Habitat.** Bord d'étang: BIGOT, 1977. Bord de rivière: SIMON, 1876a, 1937. Marais salant: SIMON, 1937. Peupliers: NOËL & al., 2005. Plage: SIMON, 1937.

***Pardosa vlijmi*** Den Hollander & Dijkstra, 1974

**Taxonomie.** Quelques auteurs ont décrit des espèces de *Pardosa* ne se distinguant que par le comportement de cour des mâles ("courtship display"). Deux de ces espèces ont été décrites de France: *Pardosa vlijmi* HOLLANDER & DIJKSTRA, 1974, morphologiquement indistinguable de *P. proxima* (C.L. Koch), et *Pardosa saltans* TOPFER-HOFMANN & al., 2000, morphologiquement semblable à *P. lugubris* (Walckenaer). La répartition de ces espèces est donc à prendre avec une certaine réserve. **Répartition.** Lozère, Yonne: HOLLANDER & al., 1974. — Connue seulement de France. **Période.** — *Mâle*. Mars: HOLLANDER & al., 1974. — *Femelle*. Mars: HOLLANDER & al., 1974.

***Pardosa wagleri*** (Hahn, 1822)

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Alpes (Hautes-): BIGOT & al., 1981; GAUTIER, 1980, 1981. Alpes-Maritimes: SIMON, 1876a. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Drôme: HOLLANDER & al., 1972; VLIJM, 1971. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. Savoie: SIMON, 1876a. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a, 1985; FAVET, 1984; LEDOUX, 2000. — Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence, Pyrénées centrales: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 450 m (DENIS, 1953a). [Note de SIMON, 1937: «Espèce commune de la région subalpine»]. **Habitat.** Bord de rivière: BIGOT & al., 1981, 1982a; DENIS, 1953a; FAVET, 1984; GAUTIER, 1980. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992; VLIJM, 1971. Bord de rivière, galets et sable: BIGOT & al., 1985. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998; LEDOUX, 2000. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Bord de torrent: SIMON, 1876a. Bord des torrents et des rivières sous les pierres les plus rapprochées de l'eau: SIMON, 1937. Lieu humide: GAUTIER, 1981. **Période.** — *Mâle*. Février, mars: BIGOT & al., 1985. Avril: VLIJM, 1971. — *Femelle*. Février, mars: BIGOT & al., 1985. Avril: VLIJM, 1971. Mai: LEDOUX, 2000. — *Femelle avec cocon*. Avril à juillet: BIGOT & al., 1985. Août: BIGOT & al., 1985; DENIS, 1953a. — *Femelle avec ses jeunes*. Mai: BIGOT & al., 1985.

***Pirata hygrophilus*** Thorell, 1872

*Lycosa hygrophila*; *P. hygrophila*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1967d. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*P. h.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: ROEWER, 1926. Côte-d'Or: DENIS, 1938a (*P. h.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: DENIS, 1938a (*P. h.*). Gers: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (*P. h.*); EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET &

*al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*P. h.*). Seine, Somme: SIMON, 1876a. Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. h.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord de rivière: LEDOUX & *al.*, 2002. Bord de rivière, bois de hêtres et chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord de ruisseau: DENIS, 1962b; VEILLON, 1997. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Détritus d'inondation: DENIS, 1967d. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt humide, bord de l'eau: SIMON, 1937. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Lisière de forêt, mousses: LE PERU, 2004. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Marécage: DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Prairie en friche; prairie marécageuse: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Ripisilve: LEDOUX & *al.*, 2002. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: LESSERT, 1910. Mai: DENIS, 1967d; EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1967d; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mars: ROEWER, 1926. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1937d; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1955c. Août: LE PERU, 2004. Septembre: EMERIT & *al.*, 2003. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 1999.

#### *Pirata knorri* (Scopoli, 1763)

*Lycosa furcifera*; *Lycosa k.*

**Taxonomie.** Cette espèce a été décrite sous le nom *Lycosa furcifera* par SIMON, 1937; mais le nom étant préoccupé, l'espèce est renommée *Piratula eugeni* par ROEWER, 1951; puis la synonymie *Piratula eugeni* = *Pirata knorri* est établie par BUCHAR, 1966. **Répartition.** Ain: SIMON, 1876a; VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes: SIMON, 1937 (*L. f.*). Cantal: SIMON, 1876a. Corrèze: JUBERTHIE, 1954 (*L. k.*). Corse: CANARD, 1989. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Isère: SIMON, 1876a. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*L. k.*), 1910. — Toute la France montagneuse: SIMON, 1937 (*L. k.*). Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bord de rivière, bois de hêtres et chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord de rivière, galets et le sable: JUBERTHIE, 1954. Bord de torrent: SIMON, 1876a, 1937. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Tourbière: SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle avec cocon.* Juin: EMERIT & *al.*, 1997. Août: CANARD, 1989.

#### *Pirata latitans* (Blackwall, 1841)

*Lycosa l.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ariège: DENIS, 1961b. Aube: SIMON, 1876a. Aude: DELFOSSE, 2000b. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. l.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SIMON,

1876a. Eure: EMERIT & *al.*, 2003. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; ROLLARD, 1990c. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Lot: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: NOËL & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & *al.*, 2004; ROLLARD, 1990c. Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: DENIS, 1952b; EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1876a. Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX & *al.*, 1995. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; SIMON, 1876a. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884. Somme: SIMON, 1876a. Var: SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1941, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. l.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 1400 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord de l'eau: SIMON, 1876a, 1937. Bord de mare: DENIS, 1941. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1941, 1962b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Estuaire de rivière: CANARD, 1989. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt de hêtres: LEDOUX & *al.*, 1995. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992; VEILLON, 1997. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1938a, 1952b; EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: CORNIC, 1977; NOËL & *al.*, 2005; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie humide: DENIS, 1940a. Prairie sèche et caillouteuse: DELFOSSE, 2000b. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999; VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1937d; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1937d, 1938a, 1941, 1943c; EMERIT & *al.*, 1999; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1940a. Août: LESSERT, 1910. — *Femelle.* Mai: EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1943c; EMERIT & *al.*, 1999. Juillet: DENIS, 1961b. Août: LESSERT, 1910. Septembre: EMERIT & *al.*, 2003. Décembre: DENIS, 1943c. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1943c. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1943c, 1952b. Juillet: DENIS, 1940a, 1959d, 1961b. Septembre: CANARD, 1989.

#### *Pirata piraticus* (Clerck, 1757)

*Lycosa piratica*; *P. piratica.*

[L'espèce *P. tenuitarsis* a parfois été considérée comme une sous-espèce de *P. piraticus* jusqu'en 1976. Jusqu'à cette date, les données concernant ces deux espèces ont pu être confondues]. **Répartition.** Ain: HEIDT & *al.*, 1998; VILLEPOUX, 1990b. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. p.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*P. p.*). Dordogne: LUCANTE, 1880b. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884. Finistère: DENIS, 1938a (*P. p.*), 1940a (*P. p.*). Garonne (Haute-): BONNET, 1925; LUCANTE, 1880b. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine:

DENIS, 1938a (*P. p.*); ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1900 (*L. p.*); PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1979b. Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (*P. p.*); EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1952c, 1961b (*P. p.*); LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (*P. p.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910 (*P. p.*); MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910 (*P. p.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*L. p.*). Somme: ROSELLE, 1888b. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941 (*P. p.*), 1962b, 1963c. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2150 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1967e. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1952c; GOULLIART, 1979b; SIMON, 1876a, 1937; VEILLON, 1997. Bord de canal: BONNET, 1925. Bord de lac tourbeux: DENIS, 1950b. Bord de mare: DENIS, 1941; SIMON, 1876a, 1937. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1876a, 1937. Bord de rivière, gravières: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Bord de ruisseau: DENIS, 1941. Boue humide, herbes: DENIS, 1963c. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Dune: KERVILLE, 1900; ROSELLE, 1888b. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Haie: NOËL & al., 2005. Herbes humides et joncs: DENIS, 1961b. Jardin: LENICE, 1992. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999, 2003; GOULLIART, 1979b; HENRY, 1981; LANCELEVÉE, 1884; LEDOUX, 2000; VILLEPOUX, 1990b. Peupliers: NOËL & al., 2005. Prairie: NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: DENIS, 1940a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Roseaux: NOËL & al., 2005. Tourbière: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; VILLEPOUX, 1986. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910; SIMON, 1876a. Mai: DENIS, 1938a, 1967e; EMERIT & al., 2003; SIMON, 1876a. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1943c, 1962b; EMERIT & al., 1999; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1940a; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Septembre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910; SIMON, 1876a. Mai: DENIS, 1943c, 1967e; EMERIT & al., 2003; SIMON, 1876a. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1950b, 1962b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996c; VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle avec cocon.* Mai: SIMON, 1876a. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1943c, 1961b. Août: DENIS, 1952c.

### *Pirata piscatorius* (Clerck, 1757)

*Lycosa piscatoria.*; *P. piscatoria.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1961b (*P. p.*). Aube: SIMON, 1876a. Corse: SIMON, 1937 (*L. p.*). Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990c. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*P. p.*); ROLLARD, 1990c. Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise: SIMON, 1876a. Orne: ROLLARD, 1990c. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910 (*P. p.*); MULLER & al., 1895. "Seine": SIMON, 1876a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1888a. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. p.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1938a. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888a; VILLEPOUX, 1990b. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1938a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1961b.

### *Pirata tenuitarsis* Simon, 1876

*Lycosa piratica tenuitarsis.*

[Cette espèce a parfois été considérée comme une sous-espèce de *P. piraticus* jusqu'en 1976. Jusqu'à cette date, les données concernant ces deux espèces ont pu être confondues]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Corse: CANARD, 1989; SCHARFF, 1894; SIMON, 1876a, 1937 (*L. p. t.*). Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990c. Eure: EMERIT & al., 2003. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: ROLLARD, 1990c. Nord: EMERIT & al., 1999. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie centrale. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord de rivière: CANARD, 1989; LEDOUX & al., 2002. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Friche: VEILLON, 1997. Marécage: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1876a, 1937; VILLEPOUX, 1990b. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000; EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: BONTE, 2000; EMERIT & al., 2003. Septembre: CANARD, 1989.

### *Pirata uliginosus* (Thorell, 1856)

**Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986, 1990a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (VILLEPOUX, 1986, 1990a). **Habitat.** Bois de hêtres: EMERIT & al., 1997. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Friche: PASQUET & al., 1992. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Femelle.* Juin: EMERIT & al., 1997.

***Trabea paradoxa* Simon, 1876***Trabea p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1937 (*T. p.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1937 (*T. p.*); SOYER, 1953b. Corse: CANARD, 1989; SCHARFF, 1894; SIMON, 1876a, 1937 (*T. p.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994 (*T. p.*); EMERIT & al., 1994 (*T. p.*); LEDOUX, 2000 (*T. p.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a (*T. p.*), 1999a (*T. p.*), 2003 (*T. p.*); SIMON, 1937 (*T. p.*). Var: SIMON, 1937 (*T. p.*). — Espagne, Italie. Europe du sud. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Bord de mer, joncs: CANARD, 1989. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Broussailles: CHANSIGAUD & al., 1994. Dune: LEDOUX & al., 1999a; SOYER, 1953b. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Friche: LEDOUX & al., 2003. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse dense: SOYER, 1953b. Pelouse à *Brachypodium ramosum*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Ruisseau à sec: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1943c. Octobre: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1943c. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle avec cocon*. Juin: LEDOUX & al., 1999a; SOYER, 1953b. Juillet: LEDOUX & al., 1996a; SOYER, 1953b. Août, septembre: SOYER, 1953b.

***Trochosa hispanica* Simon, 1870***Lycosa caliginosa*; *Lycosa manicata*; *T. manicata*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1937 (*L. m.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*L. c.*). Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & al., 1997 (*T. m.*). Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1937 (*L. m.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. — Midi de la France: SIMON, 1937 (*L. m.*). Espagne, Italie, Suisse. De la Méditerranée à l'Asie centrale. **Altitude.** Jusqu'à 720 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX, 2000. Juin, juillet: CORNIC, 1978. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Avril, mai: LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: CORNIC, 1978. Octobre: KABOUCHE & al., 1997.

***Trochosa robusta* (Simon, 1876)***Lycosa r.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1876a (*L. r.*). Aisne: GROS, 2004. Alpes (Hautes-), Aveyron: SIMON, 1876a (*L. r.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure-et-Loire: SIMON, 1876a (*L. r.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*L. r.*); SIMON, 1876a (*L. r.*). Isère: SIMON, 1876a (*L. r.*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*L. r.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne (Haute-): SIMON, 1876a (*L. r.*). Morbihan: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a (*L. r.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. "Seine": SIMON, 1876a (*L. r.*). Seine-Maritime: CORNIC, 1977. Yonne: DRESKO, 1950 (*L. r.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois: BRAUD &

al., 2005. Bois de chênes; bois de chênes et de charmes, litière: EMERIT & al., 1997. Carrière: DRESKO, 1950. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Marécage: BELIN, 2001. Prairie: CORNIC, 1977; PASQUET & al., 1992. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DRESKO, 1950. — *Femelle*. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999. Septembre: DRESKO, 1950.

***Trochosa ruricola* (De Geer, 1778)***Lycosa r.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Alpes (Hautes-): GAUTIER, 1980. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*L. r.*), 1882 (*L. r.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*L. r.*). Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 (*L. r.*); LUCAS, 1870d (*L. r.*). Corse: SIMON, 1876a (*L. r.*). Côtes-d'Armor: CAZALET, 1935 (*L. r.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*L. r.*). Finistère: ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): BONNET, 1925 (*L. r.*). Gers: GROS, 2004; LUCANTE, 1880b (*L. r.*). Gironde: DENIS, 1951b. Hérault: DENIS, 1963e. Ille-et-Vilaine: CAZALET, 1935 (*L. r.*); ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924 (*L. r.*); GUIBÉ, 1946 (*L. r.*); PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c, 1963e, 1967d. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Saône (Haute-): BECKER, 1879a (*L. r.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1875. Seine-Maritime: CORNIC, 1977; LANCELEVÉE, 1884 (*L. r.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*L. r.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*L. r.*). Var: BECKER, 1880 (*L. r.*); BOUMEZZOUGH & al., 1983; DENIS, 1937a (*L. r.*); KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: BIGOT & al., 1982a, 1985; CORNIC, 1978; FAVET, 1984; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. r.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique, Bermudes. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Bois: BRAUD & al., 2005; LUCAS, 1875. Bord de canal: BONNET, 1925. Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a; FAVET, 1984; GAUTIER, 1980; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, galets, graviers: BIGOT & al., 1985. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Dune, sous les tamaris: DENIS, 1965c. Estuaire: CAZALET, 1935. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Grève: GUIBÉ, 1946. Haie: NOËL & al., 2005. Lande à *Ulex* et *Pteris*: LUCAS, 1870d. Lieu humide en bordure de plage: KOVOOR & al., 2000. Lieux très humides: SIMON, 1876a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; LEDOUX, 2000; LUCAS, 1872. Montagne

pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse: BERLAND, 1924. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: CORNIC, 1977; LUCAS, 1878a; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prairie sèche: EMERIT & al., 1999. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Talus du schorre: CAZALET, 1935. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1937. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1965c. Mars: EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: CORNIC, 1978. Juin: DENIS, 1943c; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Juillet: GROS, 2004. Septembre, octobre: DENIS, 1967d. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1943c, 1964b; EMERIT & al., 1999. Avril: DENIS, 1962b, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1963e. Août: LUCAS, 1870d, 1878a. Septembre: DENIS, 1951b; LUCAS, 1875. Octobre: DENIS, 1963c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle avec cocon*. Mai: SIMON, 1876a. Juin: DENIS, 1943c. Juillet: DENIS, 1963e.

***Trochosa spinipalpis*** (F. O. P. Cambridge, 1895)

*Lycosa s.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Eure: EMERIT & al., 2003. Doubs: EMERIT & al., 1997; SIMON, 1937 (*L. s.*). Loire (Haute-): VILLEPOUX, 1986. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999. Orne: ROLLARD, 1990c. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986, 1990a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1937 (*L. s.*). Vaucluse: BIGOT & al., 1982a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (VILLEPOUX, 1986, 1990a). **Habitat.** Bois de hêtres: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière: BIGOT & al., 1982a. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Marécage: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1937; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: EMERIT & al., 1999; VILLEPOUX, 1986. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle*. Mars: EMERIT & al., 1999. Avril: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1937; VEILLON, 1997. Juillet: VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1937. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 2003.

***Trochosa terricola*** Thorell, 1856

*Alopecosa t.*; *Lycosa t.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Aisne: GROS, 2004. Alpes (Hautes-): GAUTIER, 1980. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*L. t.*). Ariège: DENIS, 1960a, 1967d. Aveyron: GROS, 1983a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1953b. Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. t.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*A. t.*); ROLLARD, 1990c. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure:

EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*L. t.*); SIMON, 1899 (*L. t.*), 1909b (*L. t.*). Finistère: DENIS, 1938a (*A. t.*); ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1960a, 1967d. Gers: LUCANTE, 1880b (*L. t.*). Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a (*A. t.*); ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1900 (*L. t.*). Mayenne, Morbihan: ROLLARD, 1990c. Nord: GOULLIART, 1979b (*L. t.*). Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1986. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1953a. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1953b, 1959d; LUCANTE, 1880b (*L. t.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Saône (Haute-): BECKER, 1879a (*L. t.*). "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. t.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; SIMON, 1898b (*L. t.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*L. t.*). Var: DENIS, 1936 (*L. t.*), 1937a (*A. t.*), 1937b (*A. t.*); SIMON, 1898c (*L. t.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b. Aulnaie: BOSMANS & al., 1985a. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1959d; GOULLIART, 1979b. Bois de chênes, litrière; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ: GOULLIART, 1979b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Cultures: SIMON, 1876a. Détritus humides: DENIS, 1965c. Dune: KERVILLE, 1900. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1938a, 1953b, 1961b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litrière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1965c. Forêt humide, mousses: SIMON, 1937. Forêt, mousses: ROSELLE, 1887. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Grotte: DENIS, 1967d. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: DENIS, 1938a; VEILLON, 1997. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lieu humide: SOYER, 1953b. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1938a, 1952a; EMERIT & al., 2003; LUCAS, 1872. Mousses: DENIS, 1967d. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: GOULLIART, 1979b; LEDOUX & al., 2002; NOËL & al., 2005; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Prés humides, sous les pierres et dans les détritus: SIMON, 1876a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: SOYER, 1953b. Tourbière: VILLEPOUX, 1986. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1952a. Mars: DENIS, 1964b, 1967d. Avril: DENIS, 1962b, 1964b; VEILLON, 1997. Mai: LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1960a. Septembre: DENIS, 1962b, 1963c; EMERIT & al., 1997; GROS, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: DENIS, 1962b;

EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: DENIS, 1965c. Décembre: DENIS, 1943c, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1943c. Février: DENIS, 1952a, 1967d; EMERIT & *al.*, 1999. Mars: DENIS, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b, 1964b, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1936, 1938a, 1943c; EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1938a, 1959d, 1960a, 1961b, 1963c. Septembre: DENIS, 1937b, 1962b, 1964b, 1967d; EMERIT & *al.*, 1997, 1999, 2003; GROS, 1983a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: DENIS, 1965c, 1967d. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon*. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1943c. Juillet: DENIS, 1959d. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle avec ses jeunes*. Juin: DENIS, 1938a.

**Vesubia jugorum** (Simon, 1881)

*Trabea j.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER & *al.*, 1988; SIMON, 1881b (*T. j.*), 1937. — Italie. **Altitude.** De 2000 m jusqu'à 2750 m (MAURER & *al.*, 1988). **Période.** — *Mâle*. Août: MAURER & *al.*, 1988. — *Femelle*. Août, octobre: MAURER & *al.*, 1988. — *Femelle avec cocon*. Août: MAURER & *al.*, 1988.

**Wadicosa fidelis** (O. P. Cambridge, 1872)

*Lycosa galerita*; *Pardosa venatrix*.

**Taxonomie.** La synonymie *Wadicosa venatrix* (Lucas, 1846) = *W. fidelis* est établie par WUNDERLICH, 1991. **Répartition.** Aude, Bouches-du-Rhône, Hérault: SIMON, 1937 (*P. v.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1876a (*L. g.*), 1937 (*P. v.*). Var: SIMON, 1937 (*P. v.*). — Espagne. Paléarctique. **Habitat.** Marais salant: SIMON, 1937.

**Xerolycosa miniata** (C. L. Koch, 1834)

*Lycosa m.*; *Tarentula m.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: LUCAS, 1877b (*L. m.*); SIMON, 1937 (*L. m.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: ROEWER, 1926 (*T. m.*). Dordogne: SIMON, 1937 (*L. m.*). Manche: ROLLARD, 1990c. Morbihan: SIMON, 1876a (*L. m.*), 1937 (*L. m.*). Oise: SIMON, 1937 (*L. m.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (*L. m.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910 (*L. m.*); SIMON, 1937 (*L. m.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*L. m.*); SIMON, 1937 (*L. m.*). "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1937 (*L. m.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1937 (*L. m.*). Somme: SIMON, 1876a (*L. m.*), 1937 (*L. m.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Jardin: LE PERU, 2004. Lieu aride et sablonneux: LUCAS, 1877b; SIMON, 1937. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1937d. Juin: LESSERT, 1910. — *Femelle*. Avril: ROEWER, 1926. Mai: DENIS, 1937d. Juin: LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1961b. Septembre: LUCAS, 1877b.

**Xerolycosa nemoralis** (Westring, 1861)

*Lycosa n.*; *Tarentula n.*

**Répartition.** Aisne: GROS, 2004. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b

(*L. n.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*L. n.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*L. n.*); ROLLARD, 1990c. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*L. n.*). Finistère: DENIS, 1938a (*L. n.*); ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a; LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Landes, Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: ROLLARD, 1990c. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1955c, 1960a; LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d; LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1943c; LEDOUX & *al.*, 1996a; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895 (*T. n.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1904 (*L. n.*), 1910 (*L. n.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*T. n.*). "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*L. n.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; DOIGNON, 1976 (*L. n.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*L. n.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Yonne: LUCAS, 1872 (*L. n.*). — Toute la France: SIMON, 1937 (*L. n.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2250 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1959d; SIMON, 1876a. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de lac: DENIS, 1950b. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX, 2000. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989. Éboulis: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt: DENIS, 1938a, 1960a; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1937. Forêt de châtaigniers: DENIS, 1943c. Forêt de pins: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1950b. Forêt mixte: LE PERU, 2004. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Jardin: LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Lieu aride au soleil: LUCAS, 1872. Prairie: SIMON, 1937. Sous une pierre: DENIS, 1943c. **Période.** — *Mâle*. Mai: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1938a; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1959d, 1960a, 1961b; LE PERU, 2004; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1943c; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1938a, 1943c; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b; LE PERU, 2004. Août: DENIS, 1953a, 1957a; LE PERU, 2004. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a. Août: DENIS, 1953a.

PISAURIDAE

Le nom *Dolomedes pratensis* Risso, 1826, présent dans le catalogue de CANARD & *al.*, 1997, est considéré *nomen dubium* par PLATNICK, 2004, après ROEWER, 1954 (« nicht zu deuten ! »), et exclu de la liste.

**Dolomedes fimbriatus** (Clerck, 1757)

*D. limbatus*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1876a; VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1880b (*D. l.*), 1937. Alpes-Maritimes: SIMON, 1937. Ardennes: LENICE, 1992. Aube:



SIMON, 1876a, 1937. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955; RENNER, 1987. Côtes-d'Armor, Finistère: ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): BONNET, 1925. Gers: LUCANTE, 1880b, 1880b (*D. l.*); SIMON, 1937. Gironde: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a, 1937. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Jura, Landes: SIMON, 1937. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: SIMON, 1876a; VEILLON, 1997. Moselle: LEBORGNE & al., 1998; SIMON, 1876a. Nord: GOULLIART, 1979b. Oise: SIMON, 1876a (*D. l.*), 1937. Orne: GUIBÉ, 1946; ROLLARD, 1990c; SIMON, 1876a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BONNET, 1925 (*D. l.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1937. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": DENIS, 1949d; SIMON, 1876a, 1937. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; DRESKO, 1948; SIMON, 1937. Var: SIMON, 1937. Vendée: DENIS, 1946b. Vosges: SIMON, 1876a. Yonne: SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois, au bord de la mer: DENIS, 1967e. Bord d'étang: DENIS, 1938a, 1949d. Bord de canal: BONNET, 1925; DENIS, 1946b. Bord de lac: BONNET, 1925; GOULLIART, 1979b. Bord de rivière: SIMON, 1937. Bord marécageux de canal: SIMON, 1880b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976; DRESKO, 1948. Forêt, fossé humide: SIMON, 1937. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Marécage: BELIN, 2001; HENRY, 1981; LANCELEVÉE, 1884; LENICE, 1992; SIMON, 1937; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie humide: SIMON, 1937. Prairie marécageuse; prairie très humide, près d'une rivière: LE PERU, 2004. Tourbière: SIMON, 1937; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: RENNER, 1987. Juin: VEILLON, 1997. — *Femelle.* Avril: LESSERT, 1910; RENNER, 1987. Mai: DENIS, 1938a, 1967e; LE PERU, 2004. Juin: DRESKO, 1948; VEILLON, 1997. Août: LE PERU, 2004. Septembre: RENNER, 1987. — *Femelle avec cocon.* Juin: DRESKO, 1948.

***Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757)**

*D. clercki.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*D. c.*); DENIS, 1937c, 1949d. Garonne (Haute-): RENNER, 1987. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Nord: DENIS, 1943a, 1949d. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895; RENNER, 1987. "Seine": SIMON, 1937 (*D. c.*). Seine-Maritime: SIMON, 1937. Somme: SIMON, 1937 (*D. c.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Bord de rivière: DENIS, 1949d. Grotte: DENIS, 1967d. Marécage: DENIS, 1943a; MURPHY, 1994; SIMON, 1937. Ripisilve: LEDOUX, 2000. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Tourbière: SIMON, 1937. **Période.** — *Femelle.* Août: DENIS, 1949d. — *Femelle avec ses jeunes.* Août: DENIS, 1943a.

***Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757)**

*Ocyale m.*

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*O.*

*m.*). Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b, 1967d; LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Aude: DELFOSSE, 2000a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; BIGOT & al., 1973; DENIS, 1954b; KABOUCHE & al., 1997; PETIT & al., 1945. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*O. m.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; ROEWER, 1926; SCHARFF, 1894 (*O. m.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c; SALMON, 1959. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884 (*O. m.*); SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; ROLLARD, 1990c. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b; LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Hérault: BONARIC, 1985, 1987; EMERIT & al., 1985, 1990; LOPEZ, 1974. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; ROLLARD, 1990c. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1952b; EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1979b. Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; DENIS, 1937d. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BRIGNOLI, 1978, 1984; DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LÉPRIEUR, 1880 (*O. m.*); REIBER, 1880 (*O. m.*); SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; MULLER & al., 1895 (*O. m.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1875 (*O. m.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*O. m.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887 (*O. m.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*O. m.*). Var: BECKER, 1880 (*O. m.*); BOULLARD, 1980; DENIS, 1937a, 1937b; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872 (*O. m.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Italie, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1963c; LEDOUX & al., 1999a. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1967e; GOULLIART, 1979b; LUCAS, 1875; SIMON, 1937. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord d'étang: CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1938a; LEDOUX, 2000; PETIT & al., 1945; VEILLON, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1938a, 1953b; LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus*: KABOUCHE & al., 1997. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bord de ruisseau: LOPEZ, 1974. Broussailles: CHANSIGAUD



& al., 1994. Champ de céréales: COCQUEMPOIT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Estuaire, au niveau du *Puccinellietum* et de l'*Agropyretum*: SALMON, 1959. Estuaire, joncs: CANARD, 1989. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1952b, 1963c; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: CANARD, 1989; DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Forêt de résineux, allée: VEILLON, 1997. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORNE & al., 1998; LOPEZ, 1974; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Garrigue: BOULLARD, 1980; LOPEZ, 1974. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Jardin en milieu urbain: VEILLON, 1997. Lande: DENIS, 1938a; VEILLON, 1997. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Lieux humides: LUCAS, 1872. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral, zone humide entre des dunes: DENIS, 1937d. Maison: DENIS, 1967e. Marais, roseaux secs: ROSELLE, 1887. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Marécage salé: BIGOT, 1965. Orties: GOULLIART, 1979b. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1996c, 1999a, 2002, 2003; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1937. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: EMERIT & al., 1999. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORNE & al., 1998. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. *Salicornietum*: BIGOT, 1965; EMERIT & al., 1994. Sous-bois: VEILLON, 1997. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Mars: ROEWER, 1926. Avril: BONARIC, 1985, 1987; VEILLON, 1997. Mai: BONARIC, 1985, 1987; BONTE, 2000; DENIS, 1937b, 1943c; LEDOUX, 2000. Juin: BONARIC, 1985, 1987; CORNIC, 1978; DENIS, 1938a, 1967d; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1960a. Août: LUCAS, 1870d. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle.* Avril: BONARIC, 1985; VEILLON, 1997. Mai: BONARIC, 1985, 1987; BONTE, 2000; DENIS, 1937b, 1938a; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: BONARIC, 1985, 1987; BRIGNOLI, 1978; CHANSIGAUD & al., 1994; CORNIC, 1978; DENIS, 1941, 1952b, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: BONARIC, 1985, 1987; DENIS, 1938a, 1960a. Août: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875; VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1937b. Juin: BONARIC, 1985, 1987; CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1938a, 1941, 1943c, 1952b, 1964b; EMERIT & al., 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a, 1940a, 1959d, 1960a, 1961b. Août: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c; SIMON, 1876a. — *Femelle avec ses jeunes.* Juin: CHANSIGAUD

& al., 1994; DENIS, 1941. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a, 1959d, 1961b.

*Pisaura quadrilineata* (Lucas, 1838)

*P. maderiana.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BRIGNOLI, 1984 (*P. m.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Canaries, Madère.

OXYOPIIDAE

*Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a, 1937. Gers: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & al., 1990. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1936, 1937a; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Carrière de calcaire; coteau calcaire: VEILLON, 1997. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Lieux sablonneux: SIMON, 1876a. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: PASQUET & al., 1992; SIMON, 1876a. Sur *Cistus monspeliensis*: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle.* Mai: CORNIC, 1978. Juin: CORNIC, 1978; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle.* Mai: CORNIC, 1978. Juin: CORNIC, 1978; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978.

*Oxyopes lineatus* Latreille, 1806

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973, 1983. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Gard: LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003. Seine-et-Marne: SIMON, 1876a. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880, 1882; BIGOT & al., 1987a; DENIS, 1937a, 1937b; GROS, 1983a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b; ROLLARD, 1990c. — Midi de la France: SIMON, 1937. Belgique, Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 900 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, herbes humides: DENIS, 1943c. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Maquis: KOVOOR & al., 2000. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1876a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Zone caillouteuse sèche à

végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1943c. Mai: DENIS, 1937b; LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Juillet: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a, 2003; MÜLLER, 1985. Août: CANARD, 1989; LEDOUX, 1993. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1943c. Mai: DENIS, 1937b. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Juillet: CORNIC, 1978; GROS, 1983a; LEDOUX & al., 1996a, 2003.

***Oxyopes nigripalpis* Kulczynski, 1891**

*O. lineatus* n.

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. — [SIMON, 1876a, considérant qu'il s'agit d'une variété d'*O. lineatus* indique: « elle se trouve souvent en compagnie du type; dans certaines localités elle est plus commune ». Sous le nom d'*Oxyopes lineatus nigripalpis*, SIMON, 1937 indique « même habitat que le type »] Belgique, Espagne, Italie. Méditerranée. **Altitude.** 800 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Maquis de cistes; pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a.

***Oxyopes ramosus* (Martini & Goeze, 1778)**

**Répartition.** Aube: SIMON, 1937. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1937. Jura: SIMON, 1937. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loiret, Oise, Pyrénées-Orientales, "Seine": SIMON, 1937. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1937. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b, 1937. Vienne (Haute-): SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bruyères: HILLYARD, 1975. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1937. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Octobre: SIMON, 1937.

ZORIDAE

***Zora armillata* Simon, 1878**

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a. Gard: LEDOUX, 2000. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Morbihan: MARC, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1932. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. "Seine": ROLLARD, 2000. [SIMON, 1878a indique: « Midi de la France »]. — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Europe, Russie. **Habitat.** Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Marécage: MURPHY, 1994. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 2000.

***Zora manicata* Simon, 1878**

[SIMON, 1932 a confondu sous ce nom les deux espèces *Z. manicata* et *Z. silvestris*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a, 1932. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1960a. Aveyron, Gironde,

Jura: SIMON, 1932. Lozère: DENIS, 1939b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1955c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe, Ukraine, Israël. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois secs: SIMON, 1878a. Forêt: SIMON, 1932. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 2003. Mai: DENIS, 1933b. Juin: DENIS, 1939b. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1950b, 1955c, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1950b; SIMON, 1878a.

***Zora nemoralis* (Blackwall, 1861)**

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1878a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers: LUCANTE, 1880a. Isère: SIMON, 1878a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LESSERT, 1904, 1910. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle.* Juin, septembre: EMERIT & al., 1997. Novembre: DENIS, 1967d.

***Zora parallela* Simon, 1878**

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a, 1932. Ardèche: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & al., 1997; SOYER, 1963. Charente: SIMON, 1932. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1874d, 1878a. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Dordogne: SIMON, 1932. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1932. Gironde: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Landes: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: SIMON, 1932. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Morbihan: MARC, 1990a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Seine-et-Marne, Var: SIMON, 1878a, 1932. Vendée: DENIS, 1941, 1965c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune, hautes herbes: DENIS, 1965c. Forêt: SIMON, 1932. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Lande de bruyères et d'ajoncs: SIMON, 1932. Lieux chauds et sablonneux: SIMON, 1878a. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a; SOYER, 1963. Plage: SIMON, 1932. Prairie: JOURDE & al., 1999. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1965c; SIMON, 1878a. Juillet: SIMON, 1932. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1933b. Avril: DENIS,

1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mai: DENIS, 1965c; SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1941. Juillet, septembre: SIMON, 1932.

*Zora pardalis* Simon, 1878

**Répartition.** Corse: SCHARFF, 1894; SIMON, 1878a, 1932. Gers, Gironde, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. — Espagne, Italie. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 850 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois de pins, litière sèche: SIMON, 1878a. Pelouse calcaire: BOSMANS & *al.*, 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b.

*Zora silvestris* Kulczynski, 1897

[SIMON, 1932 a confondu sous le nom *Z. manicata* les deux espèces *Z. manicata* et *Z. silvestris*]. **Répartition.** Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: MARC, 1990a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Ancienne vigne; bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Friche: VEILLON, 1997. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mai: LEDOUX & *al.*, 1999b. Juin, septembre: EMERIT & *al.*, 1997.

*Zora spinimana* (Sundevall, 1833)

*Z. maculata*; *Z. spinimanus*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946 (*Z. s.*); LUCAS, 1870d. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1878a, 1932 (*Z. s.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*Z. s.*); MARC, 1990a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a (*Z. s.*); MARC, 1990a. Gard: LEDOUX, 2000. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; MARC, 1990a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & *al.*, 2004. Morbihan: MARC, 1990a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: DENIS, 1952b (*Z. s.*); EMERIT & *al.*, 1999. Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b (*Z. s.*), 1959d (*Z. s.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1933b (*Z. s.*); LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; COCQUEMPOT & *al.*, 1991; LUCAS, 1875 (*Z. m.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1891. Var: DENIS, 1934a (*Z. s.*). Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1932 (*Z. s.*). Allemagne,

Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1875. Bois de chênes, litière; bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, mousses: SIMON, 1909b. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989, 1991. Chemins: LUCAS, 1870d. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de conifères; forêt de feuillus: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & *al.*, 1987. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c. Forêt de pins, herbes couchées: DENIS, 1965c. Forêt de pins, mousses humides très épaisses: DENIS, 1964b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt clairière: DOIGNON, 1976. Forêt, litière: DENIS, 1963c. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992; VEILLON, 1997. Friche buissonneuse: ASSELIN & *al.*, 1989. Jardin: LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Lisière de forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Litière très humide: DENIS, 1963c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Maison: LE PERU, 2004. Marécage: BELIN, 2001; ROSELLE, 1891; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse calcaire: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & *al.*, 1996a. Phragmitaie: LEDOUX & *al.*, 1999a. *Populetum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996c, 2002; PASQUET & *al.*, 1992. Prairie calcaire: EMERIT & *al.*, 1999. Prairie en friche; prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Rhododendrons, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Sablière: DENIS, 1952b. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. Taillis de chênes, litière: SOYER, 1963. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1933b. Février: DENIS, 1965c; EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004. Mars: DENIS, 1963c; EMERIT & *al.*, 1999. Avril: DENIS, 1964b; EMERIT & *al.*, 1999. Mai: DENIS, 1965c; EMERIT & *al.*, 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1964b, 1967d; EMERIT & *al.*, 1999; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: LEDOUX & *al.*, 1996c. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1999a. Novembre: LEDOUX & *al.*, 2003. Décembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b. Février: DENIS, 1953b; EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1996a. Mars: DENIS, 1963c. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: DENIS, 1965c; EMERIT & *al.*, 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1964b; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1959d, 1961b, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1870d. Septembre: DENIS, 1962b, 1963c; EMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c; LUCAS, 1875. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002. Novembre: LEDOUX, 2000. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1952b.

*Zoropsis media* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aude: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1955. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1878a, 1914. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Var: BIGOT & al., 1979; DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1878a. — Provence et Alpes méridionales, Cévennes méridionales: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt, entrée de grotte: BOSMANS & al., 1985a. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Marais, détritiques; sous une pierre: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle*. Février: DENIS, 1933b. Juillet: CORNIC, 1978.

*Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820)*Z. spinimanus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: RODMAN, 1919 (Z. s.). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955 (Z. s.). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; THIRION, 1998. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1914 (Z. s.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (Z. s.), 1933d (Z. s.); LEDOUX & al., 1996a (Z. s.). Var: DENIS, 1931a (Z. s.), 1933a (Z. s.), 1934a (Z. s.), 1937a (Z. s.), 1937b (Z. s.); KABOUCHÉ & al., 1997; KOVOOR & al., 2000. — Midi de la France: SIMON, 1914 (Z. s.). Espagne, Italie. Méditerranée (USA, introduit). **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bâtiment: JOURDE & al., 1999. Forêt de chênes, litière; forêt de pins: CANARD, 1989. Jardin: JOURDE & al., 1999; THIRION, 1998. Maison: LEDOUX & al., 1996a. Maquis, litière: CANARD, 1989. Marécage: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1934a. Sous des pierres ou des écorces: KOVOOR & al., 2000. Sous l'écorce d'un platane: DENIS, 1931a. Sous les écorces de chênes-lièges: SIMON, 1914. Sur un mur: KABOUCHÉ & al., 1997. **Terrain** vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1933b. Juin: LEDOUX & al., 1996a. Septembre: CANARD, 1989. Octobre: KABOUCHÉ & al., 1997. Novembre: THIRION, 1998. — *Femelle avec cocon*. Mars: DENIS, 1931a. Avril: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a.

## AGELENIDAE

L'espèce *Tegenaria tyrrhenica* Dalmas, 1922 est indiquée de France et d'Italie par PLATNICK, 2004. Selon DRESKO & al., 1976, cette espèce n'est présente qu'en Italie, et donc exclue de la liste.

*Agelena agelenoides* (Walckenaer, 1841)

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1875a. — Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Forêt de châtaigniers: SIMON, 1937.

*Agelena gracilens* C. L. Koch, 1841*A. similis*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1875a (A. s.). Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1875a (A. s.). Aube: SIMON, 1875a (A. s.). Calvados: LUCAS, 1877b (A. s.). Charente-Maritime, Côtes-d'Armor: SIMON, 1875a (A. s.). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Gers: LUCANTE, 1880a (A. s.). Isère: SIMON, 1875a (A. s.). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a (A. s.). Morbihan: ROLLARD, 1990c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a (A. s.). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": LUCAS, 1875 (A. s.); SIMON, 1875a (A. s.). Var: SIMON, 1898c (A. s.). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Yonne: LUCAS, 1872 (A. s.). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Friche: VEILLON, 1997. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande: VEILLON, 1997. Lisière de bois: LUCAS, 1878a. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Juillet: MÜLLER, 1985; SIMON, 1875a. Août: LEDOUX, 1993; SIMON, 1937. Septembre: LUCAS, 1875; SIMON, 1937. — *Femelle*. Août: LEDOUX, 1993; LUCAS, 1878a; SIMON, 1937. Septembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875, 1877b; SIMON, 1937; VEILLON, 1997. Octobre: VEILLON, 1997.

*Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Aude: DELFOSSE, 2000a. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870e. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; O'NEIL, 1979. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Gers: LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; ROLLARD, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880a. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1952b. Orne: ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; SCHALLER, 2000. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887. Var: BECKER, 1882. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois: DENIS, 1938a, 1960a. Bord d'étang: DENIS, 1938a; VEILLON, 1997. Buissons: CANARD, 1989; SIMON, 1937. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: DENIS, 1952b, 1961b. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC,

1990b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Haie: ROSELLE, 1887; SIMON, 1875a. Herbes humides: DENIS, 1940a. Jardin: LENICE, 1992. Lande: LUCAS, 1870e. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1938a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à thym: LEDOUX & al., 2003. Plateau calcaire: CANARD, 1989. Prairie: PASQUET & al., 1992; SIMON, 1875a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. Talus, herbes: SIMON, 1937. **Période.** — *Mâle*. Juillet: CANARD, 1989. Août: CANARD, 1989; LUCAS, 1878a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1962b. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1959d, 1960a, 1961b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1878a. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon*. Août: DENIS, 1964b.

***Histopona torpida*** (C. L. Koch, 1834)

*H. debilis*; *Tegenaria debilis*; *Tegenaria t.*

**Répartition.** Ain: DRESCO & al., 1975 (*T. t.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1875a (*T. d.*); THORELL, 1875 (*H. d.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Isère: SIMON, 1875a (*T. t.*). Jura: DRESCO, 1962 (*T. t.*). Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (*T. t.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c (*T. t.*). "Seine": CHRISTOPHE, 1973 (*T. t.*), 1974 (*T. t.*); SIMON, 1875a (*T. t.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*T. t.*). — Toute la France: SIMON, 1937 (*T. t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Habitat.** Bois: SIMON, 1875a. Bois de hêtres, chênes et charmes; éboulis: EMERIT & al., 1997. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973. Forêt, entre les racines et dans les mousses: SIMON, 1937. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Grotte: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975. Jardin; jardin, dans un tas de bois: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle*. Juin: LE PERU, 2004. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: EMERIT & al., 1997; SIMON, 1875a. Octobre: DRESCO & al., 1975. — *Femelle*. Avril: DRESCO, 1962. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: LE PERU, 2004. Septembre: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon*. Octobre: SIMON, 1875a.

***Lycosoides coarctata*** (Dufour, 1831)

*Textrix c.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*T. c.*); SIMON, 1875a (*T. c.*). Corse: KRAUS, 1955 (*T. c.*); SIMON, 1875a (*T. c.*), 1937 (*T. c.*). Hérault: EMERIT & al., 1985 (*T. c.*). Pyrénées-Orientales: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1943c (*T. c.*), 1967d (*T. c.*); SIMON, 1875a (*T. c.*). Var: BECKER, 1880 (*T. c.*), 1882 (*T. c.*); DENIS, 1937b (*T. c.*); KOVOOR & al., 2000. — Midi de la France: SIMON, 1937 (*T. c.*). Espagne, Italie, Méditerranée. **Altitude.** 300 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Prairie, sous des pierres: SIMON, 1875a. Troncs d'arbres: KOVOOR & al., 2000. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DENIS, 1937b. Octobre: DENIS, 1967d. — *Femelle*.

Mars: DENIS, 1967d. Avril: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1967d. Juin: DENIS, 1943c. Septembre: DENIS, 1937b; KRAUS, 1955. Décembre: DENIS, 1943c.

***Lycosoides flavomaculata*** Lucas, 1846

*Textrix f.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1875a (*T. f.*), 1937 (*T. f.*). — Italie. Méditerranée.

***Malthonica lusitanica*** Simon, 1898

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; BRIGNOLI, 1978; SIMON, 1937. — Espagne. Portugal. **Altitude.** Jusqu'à 600 m (SIMON, 1937). **Habitat.** Forêt, mousses: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Femelle*. Juin: BRIGNOLI, 1978.

***Tegenaria agrestis*** (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Ardennes: LENICE, 1992. Aveyron: GROS, 1983a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b. Finistère: DRESCO, 1971b; ROLLARD, 1990c. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a. Hérault: EMERIT & al., 1985. Landes: LUCANTE, 1880a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: GUIBÉ, 1946. Morbihan: DRESCO, 1971b; ROLLARD, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c, 1967d; DRESCO, 1957c; LEDOUX & al., 1995, 2003. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. "Seine": LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: SUEUR, 1992. Var: BIGOT & al., 1979, 1987a; DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale, USA, Canada. **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Au pied des arbres: LUCAS, 1877b. Bois: LUCAS, 1875. Bois et friches, sous les pierres ou dans les trous: SIMON, 1875a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Entre les racines des arbres: SIMON, 1875a. Forêt: DENIS, 1967d. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1875a. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Mur: LENICE, 1992. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Sous les écorces de cerisiers: LANCELEVÉE, 1884. Sous une pierre; talus: LUCAS, 1882a. Talus de route: SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1943c. Mai: DENIS, 1937b. Juillet: CORNIC, 1978; SIMON, 1875a. Août: DENIS, 1967d; LUCAS, 1882a. Septembre: DENIS, 1967d; LUCAS, 1875; MÜLLER, 1985. — *Femelle*. Janvier: DRESCO, 1971b. Avril: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 2003. Mai: DENIS, 1937b. Juin: DENIS, 1943c. Juillet: CORNIC, 1978. Août: GROS, 1983a; LUCAS, 1882a. Septembre: DENIS, 1937b; LUCAS, 1875, 1877b. Octobre: EMERIT & al., 1999. Novembre: DRESCO, 1971b. — *Femelle avec cocon*. Septembre, octobre: SIMON, 1875a.

*Tegebaria antrorum* Simon, 1916

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DRESCO, 1957c; FAGE, 1931; SIMON, 1916, 1937. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1500 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: FAGE, 1931; SIMON, 1916, 1937.

*Tegebaria armigera* Simon, 1873

**Répartition.** Corse: HEIMER & al., 1988; SIMON, 1875a, 1937. — Connue seulement de Corse et de Sardaigne. **Altitude.** De 800 m jusqu'à 980 m (HEIMER & al., 1988). **Habitat.** Bois, trous de rochers ou entre les racines des arbres: SIMON, 1875a. Forêt de conifères, sous des pierres: HEIMER & al., 1988. **Période.** — *Mâle.* Juillet: HEIMER & al., 1988. — *Femelle.* Juillet, septembre: HEIMER & al., 1988.

*Tegebaria atrica* C. L. Koch, 1843

*T. agrestis* [err.]; *T. larva*.

**Taxonomie.** Les *Tegebaria* du groupe *atrica* (*T. atrica*, *T. duellica*, *T. nervosa*, *T. saeva*), aux caractères insuffisamment différenciés, présentent des difficultés de détermination, et la confusion des espèces est très grande. Ainsi DENIS, 1959e note à propos de *T. atrica* et *T. saeva*: «La dénomination des deux espèces principales qui composent le petit groupe de *Tegebaria atrica* C. L. Koch pose un problème de nomenclature extrêmement complexe par suite du désaccord persistant entre les auteurs». LOCKET, 1975 indique: «There has been much confusion in Britain over the naming of species of *Tegebaria* of the *atrica-saeva* group». De nombreux travaux traitent de cette question (BARRIENTOS & al., 1988, BRIGNOLI, 1978, CRAWFORD & al., 1976, DENIS, 1959, MÉRRETT, 1980, OXFORD, 1987, OXFORD & al., 1991) mais sans que le problème soit vraiment éclairci. Devant cette situation, la solution choisie est de maintenir ici tels quels les noms utilisés dans les travaux originaux, sans appliquer aucune correction. Les répartitions indiquées pour les espèces du groupe *atrica* sont donc à prendre avec beaucoup de réserve. La synonymie *T. larva* Simon, 1875 = *T. atrica* est établie par BONNET, 1959.

**Répartition.** Ardèche: BALAZUC & al., 1952; DRESCO, 1957c. Ariège: DENIS, 1967d; DRESCO, 1957c; DRESCO & al., 1968. Bouches-du-Rhône: LUCZACK & al., 1964. Corse: SIMON, 1875a. Côte-d'Or: DRESCO, 1956, 1957c, 1959c, 1962; HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a. Doubs: SIMON, 1875a (*T. l.*), 1937. Gard: SIMON, 1937. Hérault: LOPEZ & al., 1979; SIMON, 1937. Jura: DRESCO & al., 1968. Manche: KEPVILLE, 1898; LUCAS, 1878b. Meurthe-et-Moselle: SIMON, 1875a (*T. l.*), 1937. Nord: GOULLIART, 1979b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a, 1955c. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1967d; DRESCO, 1957c; DRESCO & al., 1968; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 2003; SIMON, 1875a (*T. l.*), 1937. Savoie (Haute-): BRIGNOLI, 1978. Saône (Haute-): BECKER, 1879a. Saône-et-Loire: DRESCO, 1959c, 1962. «Seine»: SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887 [*T. agrestis*, err. selon ROSELLE, 1891], 1891. Tarn: DRESCO & al., 1968. Var: SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1940b, 1941,

1962b, 1962d, 1965c. Yonne: DRESCO, 1950, 1957c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, introduit en Amérique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 2250 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bâtiment: DENIS, 1955c. Carrière: DRESCO, 1950, 1957c. Carrière souterraine: DRESCO, 1959c, 1962. Éboulis calcaire: ROSELLE, 1887. Entre les grosses racines de châtaigniers: SIMON, 1898c. Forêt: DENIS, 1967d. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins, anfractuosités d'un talus sablonneux: DENIS, 1962b. Forêt de pins, clairière, sous des talus: DENIS, 1962d. Forêt, sous les grosses pierres et les souches: SIMON, 1937. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Grotte: BALAZUC & al., 1952; DENIS, 1941, 1943c, 1967d; DRESCO, 1956, 1957c, 1959c, 1962; DRESCO & al., 1968; HUBERT, 1964a; LOPEZ & al., 1979; LUCZACK & al., 1964. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, grotte dans la falaise: DENIS, 1940b. Maison: DENIS, 1953a. Mine: DENIS, 1967d. Murs, blocs de craie: ROSELLE, 1891. Sous de gros rochers: DENIS, 1953a. Sous une pierre: DENIS, 1943c. Trous des murs: SIMON, 1875a. Trous des talus: LANCELEVÉE, 1884. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1955c. Août: DENIS, 1953a, 1967d; DRESCO, 1957c; LUCAS, 1878b; ROSELLE, 1891; SIMON, 1875a. Septembre: DRESCO, 1950. Novembre: DRESCO, 1957c. — *Femelle.* Janvier: DRESCO, 1959c, 1962. Février: HUBERT, 1964a. Mars: DRESCO, 1957c; DRESCO & al., 1968. Avril: DENIS, 1962b, 1962d; LEDOUX & al., 2003. Mai: DRESCO, 1962. Juin: DENIS, 1941, 1943c; DRESCO, 1957c; DRESCO & al., 1968. Août: DENIS, 1967d; DRESCO, 1957c; LUCAS, 1878b; ROSELLE, 1891. Septembre: DRESCO, 1950. Octobre: DRESCO & al., 1968. Novembre: DENIS, 1965c; DRESCO, 1957c, 1962. Décembre: DENIS, 1943c; DRESCO, 1957c, 1959c, 1962; DRESCO & al., 1968.

*Tegebaria campestris* C. L. Koch, 1834

**Répartition.** Calvados: LUCAS, 1870e. Eure: SIMON, 1899. Gers: LUCANTE, 1880a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. — Allemagne, Espagne, Italie. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Bois, sous les pierres ou entre les racines des arbres: SIMON, 1875a. Forêt, sous les grosses pierres: LANCELEVÉE, 1884. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Sous une pierre: LUCAS, 1870e. **Période.** — *Mâle.* Septembre, octobre: SIMON, 1875a. — *Femelle.* Août: LUCAS, 1870e.

*Tegebaria dalmatica* Kulczynski, 1906

**Répartition.** Var: LEDOUX, 2004b. — De la France à Israël. **Habitat.** Bord de mer, sous des *Camphorosma* et des varechs: LEDOUX, 2004b. **Période.** — *Femelle.* Mars: LEDOUX, 2004b.

*Tegebaria domestica* (Clerck, 1757)

*T. civilis*; *T. derhami*; *T. domesticus*; *T. fontium*.

**Taxonomie.** La synonymie *Tegebaria derhami* Scopoli, 1763 = *T. domestica* est établie par BONNET, 1959. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: BRIGNOLI, 1978; SIMON, 1875a (*T. f.*). Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1961b; JEANNEL, 1926; SIMON, 1910. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1875c. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: CANARD, 1989; REMY, 1950; SIMON, 1910.

Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Finistère: LUCAS, 1868. Gard: BRIGNOLI, 1978. Gers: LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c (*T. derhami*). Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963c; BRAUD & al., 2005 (*T. domesticus*); DRESKO, 1959a. Meurthe-et-Moselle: REMY, 1927, 1932b. Nord: DENIS, 1930; GOULLIART, 1979b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1932b, 1943c (*T. derhami*), 1952c (*T. derhami*); DRESKO, 1957c. Savoie (Haute-): BRIGNOLI, 1978. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn: DRESKO, 1962 (*T. derhami*); LUCANTE, 1880a. Var: DENIS, 1937b (*T. derhami*). Vaucluse: FABRE, 1905. Vendée: DENIS, 1940b (*T. derhami*), 1941 (*T. derhami*), 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (*T. c.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Altitude.** Jusqu'à 2010 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Carrière: SIMON, 1875a. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963c; DENIS, 1932b; DRESKO, 1962; JEANNEL, 1926; LUCANTE, 1880a; REMY, 1927, 1932b, 1950; SIMON, 1875a, 1875c, 1910. Littoral, grotte dans la falaise: DENIS, 1940b. Maison: CANARD, 1989; DENIS, 1952c, 1961b, 1965c; DOIGNON, 1976; GUIBÉ, 1946; LANCELEVÉE, 1884; LENICE, 1992; LUCAS, 1868; SIMON, 1875a, 1909b. Mine de charbon: DENIS, 1930. Puits: ROSELLE, 1887. Sous la voûte des cavités très humides: SIMON, 1875a. Souterrains: LANCELEVÉE, 1884. **Période.** — *Mâle.* Juin: REMY, 1927, 1932b. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1965c; LUCAS, 1868. Octobre: DENIS, 1937b. — *Femelle.* Janvier, mars: DRESKO, 1959a. Juin: DENIS, 1941. Juillet: DENIS, 1952c, 1959d, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1965c; LUCAS, 1868. Septembre: BRIGNOLI, 1978. Décembre: DRESKO, 1962. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941; SIMON, 1875a.

#### *Tegenaria duellica* Simon, 1875

##### *T. gigantea.*

**Taxonomie.** Cette espèce a été confondue avec d'autres espèces du groupe *T. atrica*; voir la note sous *T. atrica*. La synonymie *T. gigantea* Chamberlin & Ivie, 1935 = *T. duellica* est établie par BRIGNOLI, 1978. **Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992 (*T. g.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004 (*T. g.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Somme: SUEUR, 1992 (*T. g.*). — Grande-Bretagne (*T. g.*). Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2470 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bâtiment: LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Cavités obscures; grotte: SIMON, 1875a. Marécage: BELIN, 2001. **Période.** — *Femelle.* Avril: LE PERU, 2004.

#### *Tegenaria femoralis* Simon, 1873

**Répartition.** Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1875a, 1937; WUNDERLICH, 1994a. — Connue seulement de Corse. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Bois de châtaigniers, sous une pierre: SIMON, 1875a, 1937. **Période.** — *Mâle.* Avril, septembre: KRAUS, 1955. — *Femelle.* Avril, septembre: KRAUS, 1955.

#### *Tegenaria ferruginea* (Panzer, 1804)

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Gers: LUCANTE, 1880a. Isère: SIMON, 1875a. Nord: GOULLIART, 1979b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1952c; DRESKO, 1957c. Savoie (Haute-): BRIGNOLI, 1978. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887; SUEUR, 1992. Vosges: OXFORD, 2000. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Açores. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bâtiment: ROSELLE, 1887; SIMON, 1909b. Cave: ROSELLE, 1887. Forêt, creux des arbres et trous des talus: SIMON, 1937. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Grenier: ROSELLE, 1887. Parois des rochers; sous les arches des ponts: SIMON, 1875a. Sous les rochers: DENIS, 1952c. Trous des murs: SIMON, 1875a. Trous des vieux murs: LANCELEVÉE, 1884. **Période.** — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1943c. Juin: BRIGNOLI, 1978. Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1952c.

#### *Tegenaria fuesslini* Pavesi, 1873

##### *T. capra*; *T. corsica*; *T. ericarum*; *T. pallidula.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1937 (*T. corsica*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*T. e.*); SIMON, 1937 (*T. corsica*). Ariège: LUCANTE, 1880a (*T. p.*); SIMON, 1875a (*T. p.*). Aude: BRIGNOLI, 1978. Bouches-du-Rhône, Corse: SIMON, 1937 (*T. corsica*). Gers: LUCANTE, 1880a (*T. e.*). Isère: SIMON, 1875a (*T. capra*), 1937 (*T. corsica*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1943c (*T. corsica*), 1960a (*T. p.*), 1967d (*T. p.*); DRESKO, 1957c (*T. p.*); LEDOUX, 1993 (*T. e.*); LEDOUX & al., 1995 (*T. e.*), 1996a (*T. e.*), 1999a, 2003; SIMON, 1875a (*T. e.*), 1937 (*T. corsica*); SOYER, 1965 (*T. corsica*). Var: DENIS, 1937b (*T. corsica*); KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*T. capra*), 1937 (*T. corsica*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*T. e.*); SIMON, 1937 (*T. corsica*). — Espagne, Italie, Suisse. Ukraine. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois de hêtres: SOYER, 1965. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie alpestre, sous les pierres: SIMON, 1875a. Sous écorces; sous une pierre: DENIS, 1943c. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1967d. Avril: DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: CORNIC, 1978. Octobre: SIMON, 1875a. — *Femelle.* Janvier, février: DENIS, 1943c. Mars: DENIS, 1960a. Avril: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Mai: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a,



1999a. Juillet: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 2003. Septembre: DENIS, 1937b. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

#### *Tegenaria inermis* Simon, 1870

**Répartition.** Ariège: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a, 1967d; DRESCO, 1962. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1950b; DRESCO & al., 1968, 1975; SIMON, 1937. Pyrénées-Atlantiques: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1953b, 1959a; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975; SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales: SOYER, 1965. — Espagne. **Altitude.** De 1290 m (DENIS, 1954a) jusqu'à 2350 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois de châtaigniers: SOYER, 1965. Carrière: DRESCO, 1962. Cavités souterraines: SIMON, 1937. Grotte: DENIS, 1959a, 1967d; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968, 1975. Mine: DRESCO, 1962. Rochers humides, fissures: DENIS, 1954a. Ruines, sous les grosses pierres: SIMON, 1937. Sous les gros blocs de pierres: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DENIS, 1959a, 1967d. Février, mars: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975. Avril: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968. Mai: DRESCO, 1962. Juin: BRIGNOLI, 1978. Juillet: DENIS, 1954a. Août, septembre: DRESCO, 1962. Octobre: DRESCO & al., 1968. Novembre: DENIS, 1953b. Décembre: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1967d; DRESCO, 1962. Mars: DRESCO, 1962. Avril: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968. Mai: DRESCO, 1962. Juin: BRIGNOLI, 1978. Juillet: DENIS, 1954a. Août: DRESCO, 1962. Octobre: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968. Novembre: DENIS, 1953b. Décembre: DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975.

#### *Tegenaria ligurica* Simon, 1916

**Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER & al., 1988; SIMON, 1916, 1937. — Italie. **Altitude.** 1200 m (MAURER & al., 1988). **Habitat.** Sous des blocs de pierres: MAURER & al., 1988. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: MAURER & al., 1988. — *Femelle.* Juillet, août: MAURER & al., 1988.

#### *Tegenaria montigena* Simon, 1937

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1937. — Espagne. Portugal. **Altitude.** 1350 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois, sous des très grosses pierres: DENIS, 1960a. Forêt: SIMON, 1937. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1960a.

#### *Tegenaria nemorosa* Simon, 1916

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1916, 1937. Corse: CANARD, 1989. Hérault: LEDOUX, 1967. Var: KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1916, 1937. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Italie. Bulgarie, Turquie. **Habitat.** Bois, talus: CANARD, 1989. Forêt de pins, sous les talus en corniche et entre les grosses racines: SIMON, 1937. Ripisilve, bord d'étang: LEDOUX, 2000. Sablière, détritus: LEDOUX, 1967. **Période.** — *Mâle.* Juin: LEDOUX, 1967, 2000; SIMON, 1937. — *Femelle.* Avril: SIMON, 1937. Juin: LEDOUX, 1967. Septembre: CANARD, 1989.

#### *Tegenaria nervosa* Simon, 1870

*T. deroueti.*

**Taxonomie.** Cette espèce a été confondue avec d'autres espèces du groupe *T. atrica*; voir la note sous *T. atrica*. La synonymie *T. deroueti* Dresco, 1957 = *T. nervosa* est établie par BRIGNOLI, 1978. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DRESCO, 1957c (*T. d.*); SIMON, 1875a. — Connue seulement de France. **Habitat.** Grotte: DRESCO, 1957c. **Période.** — *Mâle.* Août: DRESCO, 1957c.

#### *Tegenaria oribata* Simon, 1916

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c; DRESCO, 1957c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1916, 1937. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987) jusqu'à 1300 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1937. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de feuillus; forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, sous des pierres: DENIS, 1943c. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1943c. — *Femelle.* Février, avril: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

#### *Tegenaria pagana* C. L. Koch, 1841

*T. urbana.*

**Répartition.** Aude, Bouches-du-Rhône: DRESCO, 1962. Charente: DRESCO, 1959a. Corse: SIMON, 1875a, 1937. Gard: JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Maine-et-Loire: DRESCO & al., 1975. Morbihan: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a. Nord: DENIS, 1930 (*T. u.*). Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a. "Seine": SIMON, 1875a (*T. u.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*T. u.*). — Midi de la France: SIMON, 1937. Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale, des USA au Chili, Nouvelle-Zélande. **Habitat.** Carrière souterraine: DRESCO, 1959a; DRESCO & al., 1975. Caves humides: SIMON, 1875a. Grenier: ROSELLE, 1887. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a, 1962; JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Mine: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a. Mine de charbon: DENIS, 1930. Murs extérieurs des maisons; sous les grosses pierres; trous des rochers: SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle.* Janvier: DRESCO, 1959a. Mars: DRESCO, 1959a, 1962. Novembre: DRESCO, 1959a. — *Femelle.* Mars: DRESCO, 1959a, 1962. Juin: DRESCO & al., 1975. Juillet: DRESCO, 1962.

#### *Tegenaria parietina* (Fourcroy, 1785)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: DRESCO, 1962. Alpes-de-Haute-Provence: LUCZACK & al., 1964. Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: BALAZUC & al., 1952, 1954; DRESCO & al., 1968. Bouches-du-Rhône: LUCZACK & al., 1964. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: KRAUS, 1955; SCHARFF, 1894. Côtes-d'Armor: DRESCO, 1971b. Eure: SIMON, 1909b. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Hérault: LOPEZ & al., 1979. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963c; BRAUD & al., 2005; DRESCO, 1959a. Nord: GOULLIART, 1979b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Pyrénées-Orientales: BRIGNOLI, 1978.



Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887; SUEUR, 1992, 1993. Tarn: DRESCO & al., 1968. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: DRESCO, 1962. Vendée: DENIS, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, de l'Afrique du Nord à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1720 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bord de chemin: KOVOOR & al., 2000. Bâtiment: LANCELEVÉE, 1884; LENICE, 1992. Bâtiments [dans le centre et le nord de la France]: SIMON, 1875a. Carrière souterraine: DRESCO, 1959a. Cave: ROSELLE, 1887. Creux des rochers: SIMON, 1898c. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Grotte: BALAZUC & al., 1952, 1954; BEAUCOURNU & al., 1963c; CHANSIGAUD & al., 1994; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1968; LOPEZ & al., 1979; LUCZACK & al., 1964. Maison: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1965c; DRESCO, 1971b; GOULLIART, 1979b; GUIBÉ, 1946; KOVOOR & al., 2000; ROSELLE, 1887; SIMON, 1909b. Rochers, creux: SIMON, 1937. Talus: SIMON, 1898c. Trous de rochers et creux d'arbres [dans le midi de la France]: SIMON, 1875a. Vieux murs: SIMON, 1937. [Selon SIMON, 1937, cette espèce habite exclusivement l'intérieur des maisons dans le Centre et le Nord]. **Période.** — *Mâle.* Août: DENIS, 1965c; DRESCO, 1962, 1971b. Septembre: DENIS, 1965c. — *Femelle.* Avril: DRESCO & al., 1968; KRAUS, 1955. Mai: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1937b; DRESCO, 1962. Août: DENIS, 1953a. Décembre: DRESCO, 1959a. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1937b.

#### *Tegenaria picta* Simon, 1870

*T. minuta*; *T. perita*; *T. pusilla*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Ariège: BRIGNOLI, 1978. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*T. pusilla*); SIMON, 1899 (*T. pusilla*), 1909b (*T. pusilla*). Finistère: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Gironde: LUCANTE, 1880a (*T. pusilla*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; PÉTILLON & al., 2004; ROLLARD, 1990c. Morbihan: MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990c. Nord: GOULLIART, 1979b (*T. pusilla*). Orne: ROLLARD, 1990c. Puy-de-Dôme: SIMON, 1875a (*T. pusilla*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1957a; LUCANTE, 1880a (*T. pusilla*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c; DRESCO, 1957c; LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1875a, 1875a (*T. perita*). "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; SIMON, 1875a (*T. pusilla*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*T. pusilla*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*T. pusilla*); SIMON, 1898b (*T. pusilla*). Somme: ROSELLE, 1888a (*T. pusilla*), 1891 (*T. pusilla*). Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a; SIMON, 1937. Bois, sous des pierres: GOULLIART, 1979b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Dune: CLARK & al., 1970. Éboulis calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Formation à chênes-verts: LEDOUX &

al., 1995. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973. Forêt de chênes et hêtres, litière ou sous des pierres: LE PERU, 2004. Forêt de pins, mousses: DENIS, 1964b. Forêt de pins, mousses épaisses: DENIS, 1965c. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt humide, litière: LE PERU, 2004. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Forêt, sous les pierres, dans les mousses: BOSMANS & al., 1985a. Friche: VEILLON, 1997. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: DENIS, 1938a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Sur un mur: DENIS, 1965c. Talus: ROSELLE, 1891. Talus, bord de chemin: ROSELLE, 1888a. **Période.** — *Mâle.* Février, mars: DENIS, 1943c. Avril: LE PERU, 2004; SIMON, 1937. Mai: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1965c; LE PERU, 2004; SIMON, 1937. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1943c. Mai: DENIS, 1965c; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b, 1957a. Septembre: CLARK & al., 1970. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1938a.

#### *Tegenaria saeva* Blackwall, 1844

**Taxonomie.** Cette espèce a été confondue avec d'autres espèces du groupe *T. atrica*; voir la note sous *T. atrica*. **Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corse: SIMON, 1937. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; DRESCO, 1971b. Drôme: JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a; DRESCO, 1971b; ROLLARD, 1990c. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Loire-Atlantique: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963c; BRAUD & al., 2005; DRESCO, 1962; DRESCO & al., 1975; HUBERT, 1964a; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESCO, 1959a, 1962; HUBERT, 1964a. Morbihan: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a; ROLLARD, 1990c. Nord: GOULLIART, 1979b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c; DRESCO, 1957c. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESCO, 1959a, 1962. "Seine": DRESCO, 1957c; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: DRESCO, 1957c. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. [SIMON, 1937 note «Remplacée dans la région pyrénéenne et dans l'Est comme dans l'Europe centrale par la forme *atrica*»]. — Toute la France: SIMON, 1937. Belgique, Grande-Bretagne. Europe, Canada. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a. Bord de torrent: DENIS, 1955c. Bâtiment: DENIS, 1939a, 1962b. Carrière: BEAUCOURNU & al., 1963b; DRESCO, 1957c; DRESCO & al., 1975. Carrière souterraine: DRESCO, 1959a, 1962; HUBERT, 1964a. Cave: HUBERT, 1964a. Décombres: SIMON, 1937. Forêt de pins, creux d'un talus: DENIS, 1964b. Galerie souterraine: DRESCO, 1957c. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963b, 1963c; DRESCO, 1957c, 1959a, 1962; HUBERT, 1964a; JEANNEL, 1926; SIMON, 1913. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Jardin en milieu urbain: VEILLON, 1997. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; BRAUD & al., 2005; DRESCO, 1971b; GUIBÉ, 1946. Mine: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESCO, 1959a. Sur un mur: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Trous des murs: SIMON, 1937. Vieux papiers: DENIS, 1965c. **Période.** — *Mâle.* Mai:

DENIS, 1965c; DRESKO, 1971b. Août: DENIS, 1964b; DRESKO, 1957c; VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1962b, 1964b. Octobre: DRESKO, 1957c. Novembre: DENIS, 1965c. — *Femelle*. Janvier: DRESKO, 1957c, 1959a; HUBERT, 1964a. Février: DENIS, 1943c, 1965c; DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Mars: DENIS, 1963c; DRESKO, 1957c, 1959a, 1971b; HUBERT, 1964a. Avril: DRESKO, 1959a, 1971b. Mai: DENIS, 1965c; DRESKO, 1957c. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; DRESKO, 1957c. Juillet: DENIS, 1955c; DRESKO, 1962. Août: DENIS, 1964b. Septembre: DENIS, 1962b. Octobre: DRESKO, 1957c, 1962, 1971b. Novembre: DENIS, 1965c; DRESKO, 1957c. Décembre: DENIS, 1964b; DRESKO, 1957c, 1971b. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1955c, 1963c.

*Tegenaria silvestris* L. Koch, 1872

**Répartition.** Ain: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; BRIGNOLI, 1978. Ariège: DRESKO, 1962. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: HUBERT, 1964a. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990c. Doubs: DRESKO & al., 1975. Eure: SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a; DRESKO, 1971b; ROLLARD, 1990c. Garonne (Haute-): DRESKO, 1962. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; ROLLARD, 1990c. Jura: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Mayenne: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a. Meurthe-et-Moselle: DRESKO & al., 1968. Morbihan, Orne: ROLLARD, 1990c. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DRESKO & al., 1968. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c; DRESKO, 1957c. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; DRESKO & al., 1968; SCHALLER, 2000. Sarthe: DRESKO & al., 1968. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; DRESKO, 1962. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; DRESKO, 1943, 1962; SIMON, 1875a. Tarn: DRESKO & al., 1968. Yonne: DRESKO, 1950. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BRIGNOLI, 1978). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a; SIMON, 1875a. Bois, sous les pierres ou entre les racines des arbres: SIMON, 1937. Bâtiment: LEDOUX & al., 1996c. Carrière: BEAUCOURNU & al., 1963b; DRESKO, 1950; DRESKO & al., 1968. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1962; HUBERT, 1964a. Cave: HUBERT, 1964a. Cavité artificielle: DRESKO & al., 1975. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, lièzière: CHRISTOPHE, 1973. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt humide, mousses et lièzière: LE PERU, 2004. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963a, 1963c; DRESKO, 1943, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001. Mine: DRESKO & al., 1968. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DRESKO & al., 1968, 1975; HUBERT, 1964a. Février, mars: HUBERT, 1964a. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX &

*al.*, 1996c. Octobre: DRESKO & al., 1968. Décembre: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968. — *Femelle*. Janvier: DRESKO, 1959a, 1971b; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Février: DENIS, 1943c; DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Mars: DRESKO, 1959a, 1962; HUBERT, 1964a. Avril: DRESKO, 1959a. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DRESKO & al., 1968. Août: BRIGNOLI, 1978; DRESKO, 1962. Septembre: DRESKO, 1950; DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Octobre: LE PERU, 2004. Novembre: DRESKO & al., 1968. Décembre: DRESKO & al., 1975.

*Tegenaria soriculata* Simon, 1873

*T. cyrnea*.

**Répartition.** Corse: BRIGNOLI, 1974 (*T. c.*); KRAUS, 1955; SIMON, 1875a, 1937. — Connue seulement de Corse et de Sardaigne. **Altitude.** De 1000 m jusqu'à 1500 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Forêt de hêtres, sous les grosses pierres humides: SIMON, 1937. Forêt de hêtres, sous les pierres: SIMON, 1875a. **Période.** — *Femelle*. Septembre: KRAUS, 1955.

*Tegenaria tridentina* L. Koch, 1872

**Répartition.** Savoie: SIMON, 1937. Savoie (Haute-): DRESKO & al., 1975. — Allemagne, Italie, Suisse, Europe. **Habitat.** Grotte: DRESKO & al., 1975. **Période.** — *Femelle*. Avril: DRESKO & al., 1975.

*Textrix caudata* L. Koch, 1872

*T. albosignata*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1875a (*T. a.*), 1937, 1937 (*T. a.*). Hérault: SIMON, 1875a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1875a. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1937b; GROS, 1983a; SIMON, 1898c. — Midi de la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Méditerranée. **Habitat.** Amas d'aiguilles de pins sèches: DENIS, 1937b. Forêt: SIMON, 1937. Forêt de pins: SIMON, 1875a. Maquis: DENIS, 1937b. Murs; parois des rochers: SIMON, 1875a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1937b. Juillet: CANARD, 1989; SIMON, 1875a. — *Femelle*. Février: DENIS, 1937b. Mai: DENIS, 1937b, 1943c. Juillet: GROS, 1983a. Août: DENIS, 1967d. Septembre: DENIS, 1937b. Novembre: LEDOUX & al., 1996a, 2003.

*Textrix denticulata* (Olivier, 1789)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Ariège: DENIS, 1961b. Eure: SIMON, 1899, 1909b. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1875a. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c, 1952c, 1961b, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a; SOYER, 1965. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904; MULLER & al., 1895. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Var: BECKER, 1882; DENIS, 1937a. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Toute la

France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de hêtres: SOYER, 1965. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1967d. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1995. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: DENIS, 1950b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Gros arbres, entre les racines: SIMON, 1937. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Murs: SIMON, 1875a. Murs, trous: SIMON, 1937. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1952c; SIMON, 1875a, 1937. Tourbière: VEILLON, 1997. Trous des vieux arbres: SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1943c; SIMON, 1875a. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1943c. Juin: SIMON, 1875a; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1943c, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1967d; LEDOUX, 1993. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Juillet: SIMON, 1875a.

*Textrix pinicola* Simon, 1875

**Répartition.** Corse: SIMON, 1875a, 1937. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1937. — Espagne, Italie. Portugal. **Habitat.** Forêt de hêtres, entre les racines des arbres: SIMON, 1875a.

CYBAEIDAE

L'espèce *Cybaeus tetricus* (C. L. Koch, 1839) est exclue de la liste. Suivant l'opinion de SIMON, 1937, qui note que *C. tetricus* est absente de France, BONNET, 1956 indique que la citation de *C. tetricus* de l'Eure par SIMON, 1899 est erronée et se rapporte à *C. angustiarum*. Cependant MAURER, 1992 exprime une opinion contraire; voir la note sous *C. angustiarum*.

*Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Aisne, Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: LOPEZ & al., 1973. Calvados: GUIBÉ, 1946; ROLLARD, 1990c. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990c. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire: SIMON, 1875a. Manche: KERVILLE, 1894, 1900; ROLLARD, 1990c. Moselle: SIMON, 1875a. Nord: GOULLIART, 1979b; SCHODDUYN, 1925. Orne: LETACQ, 1913. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948a, 1948b. Rhin (Bas-), Rhin (Haut-): LESSERT, 1910. Sarthe: ROLLARD, 1990c; SIMON, 1875a. "Seine": SIMON, 1875a; VALLÉE, 1875. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: ROYER, 1928. Somme: ROSELLE, 1887. — Presque toute la France sauf la région méditerranéenne: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Eaux limpides, dormantes ou légèrement courantes: SIMON, 1937. Étang: DENIS, 1948a, 1948b; KERVILLE, 1894; ROSELLE, 1887; SIMON, 1875a. Jardin, dans un bassin: VALLÉE, 1875. Mare: KERVILLE, 1900. Marécage: BELIN, 2001; GOULLIART, 1979b; LANCELEVÉE, 1884; LETACQ, 1913; SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1948a, 1948b.

*Cybaeus angustiarum* L. Koch, 1868

*C. tetricus* [err.].

**Taxonomie.** Selon MAURER, 1992 cette espèce a été confondue avec *C. raymondi* et *C. tetricus*: les citations de SIMON, 1937 se rapporteraient à *C. tetricus*, les citations de BOSMANS & al., 1985a et 1986 se rapporteraient à *C. raymondi*. Cet auteur ne dit rien au sujet des autres citations, mais il ajoute que *C. angustiarum* ne se trouve pas en France. Toutefois, comme les collections en question ne semblent pas avoir été examinées, les citations sont laissées sous le nom utilisé dans les travaux originaux. **Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899 [*C. tetricus*, err. selon SIMON, 1937]. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Isère: DRESKO & al., 1975. Jura: SIMON, 1937. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1959a; DRESKO & al., 1968. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1957a; DRESKO & al., 1975. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Vosges: SIMON, 1937. — Alpes, Auvergne, Cévennes, Pyrénées: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** De 900 m (BOSMANS & al., 1985a, 1986) jusqu'à 1900 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois: BRIGNOLI, 1978. Forêt: LEDOUX & al., 1996c. Forêt d'arbres sempervirens, fentes des troncs d'arbres abattus: SIMON, 1875a. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de conifères, sous les pierres et les souches: SIMON, 1937. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DRESKO & al., 1968, 1975. Grotte, à l'entrée: DENIS, 1959a. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996c. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Végétation de *Buxus*, *Rubus* et fougères: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Juin: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1959a; EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1954a, 1957a; SIMON, 1875a. Août: DRESKO & al., 1975; SIMON, 1875a. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1959a. Juillet: DRESKO & al., 1968. Août: DRESKO & al., 1975; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: DRESKO & al., 1975.

*Cybaeus raymondi* (Simon, 1916)

*Cicurina* r.

[Selon MAURER, 1992 cette espèce a été confondue avec *C. angustiarum*. Voir la note sous *C. angustiarum*.] **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): MAURER, 1992. Pyrénées-Atlantiques: MAURER, 1992; SIMON, 1916 (*C. r.*), 1937 (*C. r.*). — Connue seulement de France. **Période.** — *Mâle.* Juin: MAURER, 1992. — *Femelle.* Septembre: MAURER, 1992.

*Cybaeus vignai* Brignoli, 1977

**Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER & al., 1988. — Italie. **Altitude.** De 900 m jusqu'à 1200 m (MAURER & al., 1988). **Habitat.** Bois d'*Ostrya* et *Castanea*; forêt de pins: MAURER & al., 1988. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: MAURER & al., 1988. — *Femelle.* Août: MAURER & al., 1988.

HAHNIIDAE

*Antistea elegans* (Blackwall, 1841)

*Hahnia e.*; *Hahnia propinqua*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a (*H. p.*). Alpes-

Maritimes: SIMON, 1937. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a (*H. p.*). Ariège: DENIS, 1960a, 1961b, 1967d; SIMON, 1937. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1875a (*H. e.*), 1937. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990c. Gers: LUCANTE, 1880a (*H. e.*). Gironde: DENIS, 1952a; LUCANTE, 1880a (*H. e.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Isère: SIMON, 1875a (*H. p.*). Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche, Morbihan: ROLLARD, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1931c; EMERIT & al., 1999. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; DRESKO, 1962. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c, 1961b. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MÜLLER & al., 1895 (*H. e.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": SIMON, 1875a (*H. e.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*H. e.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*H. e.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*H. e.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b. Vosges: SIMON, 1937. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord de l'eau: SIMON, 1875a. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de ruisseau, herbes humides: DENIS, 1961b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Forêt, litière: LEDOUX, 2000. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Grotte: DRESKO, 1962. Herbes humides: DENIS, 1962b. Lande: VEILLON, 1997. Marécage: DENIS, 1931c, 1952a; EMERIT & al., 1999; HENRY, 1981; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1891; SIMON, 1937; VILLEPOUX, 1990b. Mousses: DENIS, 1967d. Prairie: LEDOUX & al., 1996c. Prairie humide: SIMON, 1875a, 1937. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Talus, herbes très humides: DENIS, 1959d. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1961b. Septembre: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DENIS, 1931c. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1943c, 1952a. Avril: DENIS, 1943c; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1943c, 1967d. Juin: DENIS, 1943c, 1962b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000. Juillet: DENIS, 1959d. Septembre: DENIS, 1962b; DRESKO, 1962; LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DENIS, 1931c, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Août: SIMON, 1875a.

#### *Cryphaeca silvicola* (C. L. Koch, 1834)

*Cryphaeca silvicola*; *C. silvicola*.

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997 (*C. s.*). Isère: SIMON, 1875a (*C. s.*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1955c, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a. Savoie: MÜLLER, 1985. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*Cryphaeca s.*), 1996c (*C. s.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: BECKER, 1882 (*C. s.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (MÜLLER, 1985). **Habitat.** Aulnes: LEDOUX & al., 1996c. Bois: SIMON, 1937. Bois de hêtres: EMERIT & al., 1997. Bois, mousses et litière:

SIMON, 1875a. Bord de lac: DENIS, 1960a. Éboulis: LEDOUX & al., 1996b. Forêt: LEDOUX & al., 1996c. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de sapins: DENIS, 1955c. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, sous écorce d'arbre mort: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Mousses et sur les écorces: SIMON, 1937. Prairie: LEDOUX & al., 1996a. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Tronc de pin abattu, lichens: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1950b. Août: LEDOUX & al., 1996b; SIMON, 1875a. Septembre: DENIS, 1951c, 1960a; SIMON, 1875a. Novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Avril: LE PERU, 2004. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1950b. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c; SIMON, 1875a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; MÜLLER, 1985; SIMON, 1875a. Octobre: LE PERU, 2004. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

#### *Dirksia pyrenaica* (Simon, 1898)

*Cryphaeca p.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1898a (*C. p.*), 1937 (*C. p.*). — Espagne. **Altitude.** 800 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1937. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a.

#### *Hahnia candida* Simon, 1875

*H. muscicola.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aube: SIMON, 1875a (*H. m.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*H. m.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899 (*H. m.*), 1909b (*H. m.*). Finistère: DENIS, 1938a (*H. m.*). Gard: LEDOUX, 2000. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1982b; ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Maine-et-Loire: SIMON, 1937. Morbihan: DENIS, 1938a (*H. m.*); ROLLARD, 1990c. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Seine-et-Marne: SIMON, 1937. Var: DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1946b, 1947b, 1962d, 1964b, 1965c. — Midi de la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Afrique du Nord, Israël. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: KOVOOR & al., 2000. Bois, mousses: SIMON, 1909b. Bord d'étang; bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de rivière, bois de chênes, mousses et litière sèche: SIMON, 1875a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Détritrus: SIMON, 1937. Dune: DENIS, 1965c. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962d. Forêt de pins, litière et mousses: DENIS, 1946b. Forêt de pins, mousses humides très épaisses: DENIS, 1964b. Forêt de pins, mousses épaisses: DENIS, 1965c. Forêt, litière et mousses: DENIS, 1947b. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Lande: CANARD, 1982b. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lieux secs: SIMON, 1937. Litière: LEDOUX & al., 1996a. Plantation de pins, mousses: SIMON, 1875a. *Populetum albae*, litière; *Populetum albae*, pelouse: LEDOUX, 2000. Sous une

Pierre : DENIS, 1947b; EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Août : DENIS, 1946b; LEDOUX & al., 2003. Octobre : SIMON, 1875a. — *Femelle.* Février : DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Mars : DENIS, 1964b. Mai : DENIS, 1943c, 1965c; SIMON, 1875a. Juin : DENIS, 1938a, 1947b; EMERIT & al., 1997. Septembre : DENIS, 1937b; EMERIT & al., 1997. Octobre : DENIS, 1962d; SIMON, 1875a. Novembre : LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2003. Décembre : DENIS, 1943c.

***Hahnia difficilis*** HARM, 1966

**Répartition.** Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Allemagne, Suisse. Autriche, République Tchèque. **Altitude.** 1900 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Rhododendrons : LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Femelle.* Août : LEDOUX & al., 1996b.

***Hahnia helveola*** Simon, 1875

**Répartition.** Ain : SIMON, 1875a. Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Ariège : DENIS, 1967d. Aube : SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1954b. Calvados : ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Eure : LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Hérault : EMERIT & al., 1990. Ille-et-Vilaine : MARC, 1990b; ROLLARD, 1990c. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Orne : ROLLARD, 1990c; SIMON, 1875a. Puy-de-Dôme : LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1959a. “Seine” : CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Vendée : DENIS, 1963c, 1964b. — Presque toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bois humides, mousses : SIMON, 1937. Bois, litière sèche : SIMON, 1875a. Bois, mousses : SIMON, 1909b. Forêt de châtaigniers : CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière : CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et hêtres, litière : LE PERU, 2004. Forêt de pins, mousses humides très épaisses : DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs : MARC, 1990b. Forêt, litière de chênes : DENIS, 1963c. Forêt, mousses : DOIGNON, 1976. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Grotte, à l'entrée : DENIS, 1959a. Litière : LANCELEVÉE, 1884. Mousses : SIMON, 1899. Mousses humides : DENIS, 1967d. **Période.** — *Mâle.* Avril : LE PERU, 2004. Juin : DENIS, 1967d. Septembre : DENIS, 1963c. Décembre : DENIS, 1964b. — *Femelle.* Mars : DENIS, 1967d. Avril : LE PERU, 2004. Juin : DENIS, 1959a.

***Hahnia montana*** (Blackwall, 1841)

**Répartition.** Ariège : DENIS, 1961b. Calvados : ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor : ROLLARD, 1990c. Doubs : EMERIT & al., 1997. Finistère : ROLLARD, 1990c. Ille-et-Vilaine : MARC, 1990b; ROLLARD, 1990c. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Orne : ROLLARD, 1990c. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996c. “Seine” : CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977. Vendée : DENIS, 1962b. — Presque toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1870 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois

de conifères, mousses : SIMON, 1937. Bois de hêtres, éboulis, litière et dans les souches : EMERIT & al., 1997. Bois, litière : BRAUD & al., 2005. Forêt : DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers : CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière : CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de pins, herbes sèches et litière : DENIS, 1962b. Forêt de pins, troncs : MARC, 1990b. Herbes humides : DENIS, 1943c. Litière et pierres : LEDOUX & al., 1996a. Mélèzes : LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août : LEDOUX & al., 1996c. Septembre : LEDOUX & al., 1996a. Octobre : DENIS, 1962b. Décembre : DENIS, 1943c. — *Femelle.* Avril : DENIS, 1962b. Mai : DENIS, 1943c. Juin : EMERIT & al., 1997. Juillet : DENIS, 1961b. Septembre : LEDOUX & al., 1996a. Octobre : DENIS, 1962b.

***Hahnia nava*** (Blackwall, 1841)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1965; BIGOT & al., 1973. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : SIMON, 1909b. Finistère : ROLLARD, 1990c. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979, 1980; ROLLARD, 1990c. Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Morbihan, Orne : ROLLARD, 1990c. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Seine-et-Marne : SIMON, 1898b. [La citation de Corse par SIMON, 1875a est erronée selon SIMON, 1932, et se rapporte à *H. ononidum*]. — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois, mousses : SIMON, 1909b. Friche : VEILLON, 1997. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Lande sèche : CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Marécage salé : BIGOT, 1965. Mousses et détritiques : SIMON, 1937. Prairie : PASQUET & al., 1992. *Salicornietum* : BIGOT, 1965. Sous une pierre : EMERIT & al., 1997. *Therobrachypodion* : BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Avril : LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Mai, juin : LEDOUX & al., 1996a. Septembre : EMERIT & al., 1997. Novembre : LEDOUX & al., 1996a.

***Hahnia ononidum*** Simon, 1875

*H. mengei*; *H. nava* [err.].

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1875a. Calvados : GUIBÉ, 1946. Corse : SIMON, 1875a [*H. nava*, err. selon SIMON, 1932]. Doubs : EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a (*H. m.*). Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1955c (*H. m.*). Pyrénées-Orientales : DENIS, 1960a; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. USA, Canada, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 3050 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bois de chênes : EMERIT & al., 1997. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Mousses et détritiques : SIMON, 1937. Pentas sèches, sous les touffes d'*Ononis* : SIMON, 1875a. Prairie : LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle.* Juin : EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet : DENIS, 1954a. Septembre : LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a. — *Femelle.* Avril : LEDOUX & al., 2003. Mai : LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1954a, 1955c. Septembre : SIMON, 1875a. Octobre : DENIS, 1960a.

*Hahnia petrobia* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1937. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1875a, 1937. Ardèche : RAPHAËL & al., 1992 ; SIMON, 1875a, 1937. Ariège : SIMON, 1937. Aube : SIMON, 1875a, 1937. Aude, Aveyron : SIMON, 1937. Gard : LEDOUX, 2000. Gironde, Puy-de-Dôme, Pyrénées (Hautes-) : SIMON, 1937. Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880a ; SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales : BRIGNOLI, 1978 ; DENIS, 1943c, 1967d ; LEDOUX & al., 1996a, 2003 ; SIMON, 1937. Seine-et-Marne : DRESKO, 1952a ; SIMON, 1937. Var : SIMON, 1898c. Vaucluse : SIMON, 1937. Vendée : DENIS, 1963c. Yonne : DRESKO, 1950. — Allemagne, Espagne, Italie. Europe. **Habitat.** Carrière : DRESKO, 1950. Carrière, sous des pierres : DENIS, 1963c. Forêt de chênes-verts ; forêt de conifères : LEDOUX & al., 2003. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Lieux découverts et secs, sous les pierres et dans les détritux végétaux : SIMON, 1937. Lieux très secs, sous les pierres ou dans les détritux : SIMON, 1875a. Mousses : DENIS, 1943c. Pelouse à *Brachypodium* : LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à thym : LEDOUX & al., 2003. *Populetum albae*, pelouse : LEDOUX, 2000. Sous une pierre : DENIS, 1943c. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Juillet : DENIS, 1963c ; LEDOUX & al., 1996a. Août : LEDOUX & al., 2003. Septembre : DENIS, 1967d. — *Femelle*. Janvier, mars : DENIS, 1943c. Avril : DENIS, 1943c ; LEDOUX & al., 2003. Août : LEDOUX & al., 2003. Septembre : DRESKO, 1950. Novembre : LEDOUX, 2000. Décembre : DENIS, 1943c.

*Hahnia picta* Kulczynski, 1897

**Répartition.** Sarthe, Seine-et-Marne : SIMON, 1937. — Europe. **Habitat.** Bois secs ou sablonneux, mousses : SIMON, 1937.

*Hahnia pusilla* C. L. Koch, 1841

*H. bressica* [err.].

[*H. bressica* est un synonyme de *H. helveola*].

**Répartition.** Ain : SIMON, 1875a [*H. bressica*, err. selon SIMON, 1932], 1937 ; VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1875a, 1937. Calvados : GUIBÉ, 1943, 1946. Doubs : EMERIT & al., 1997. Jura : SIMON, 1937. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Marne, Oise : SIMON, 1937. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Rhône, Sarthe : SIMON, 1937. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910 ; SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Forêt, mousses : SIMON, 1875a, 1937. Litière et mousses : EMERIT & al., 1997. Marécage : VILLEPOUX, 1990b. Mousses : GUIBÉ, 1943. Pelouse sèche : BRAUD & al., 2005. Prairie humide : SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle*. Janvier, mars : LESSERT, 1904, 1910. Mai : SIMON, 1937. Juin : LESSERT, 1910. Octobre : SIMON, 1875a, 1937. — *Femelle*. Janvier, mars : LESSERT, 1904, 1910. Mai : SIMON, 1937. Juin : LESSERT, 1910. Septembre : EMERIT & al., 1997. Octobre : SIMON, 1875a, 1937. Novembre : GUIBÉ, 1943.

*Iberina mazarredoi* Simon, 1881

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1959a ; FAGE, 1931 ; JEANNEL, 1926 ; SIMON, 1907b, 1937.

— Espagne. **Habitat.** Grotte : DENIS, 1959a ; FAGE, 1931 ; JEANNEL, 1926 ; SIMON, 1907b, 1937. **Période.** — *Mâle*. Mars, septembre : DENIS, 1959a. — *Femelle*. Mars : DENIS, 1959a.

*Tuberta maerens* (O. P.-Cambridge, 1863)

*T. insignipalpis*.

**Répartition.** Gironde : SIMON, 1937. Landes : DENIS, 1964a. Lot-et-Garonne : SIMON, 1884b (*T. i.*), 1937. Var : SIMON, 1898c (*T. i.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie. Europe. **Habitat.** Buissons : SIMON, 1937. Forêt de pins, dans un pot de résine : DENIS, 1964a. **Période.** — *Femelle*. Août : DENIS, 1964a.

## DICTYNIDAE

Plusieurs espèces du genre *Dictyna* ont été transférées par LEHTINEN, 1967 dans les genres *Archaeodictyna* (*D. ammophila*, *D. consecuta*), *Brigittea* (*D. civica*, *D. kosiorowiczii*, *D. latens*, *D. vicina*), *Marilynia* (*D. bicolor*). WUNDERLICH, 1975 transférait *D. brevidens* dans le genre *Embylma*. Mais ces modifications ont été peu suivies par les auteurs. WUNDERLICH, 1987 établissait par ailleurs la synonymie *Brigittea* = *Dictyna*. Toutes ces espèces sont maintenues ici dans le genre *Dictyna*. Le genre *Nigma* (avec les espèces *N. flavescens*, *N. hortensis*, *N. puella* et *N. viridissima*), utilisé par plusieurs auteurs, est adopté ici. Trois espèces (*Tetrilus arietinus*, *T. lucifuga* et *Tuberta macrophthalma*) ont été transférées dans le genre *Mastigusa* par WUNDERLICH, 1986, transferts suivis dans ce catalogue.

*Altella lucida* (Simon, 1874)

*Lethia l.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1874a (*L. l.*), 1914. Aube, Bouches-du-Rhône : SIMON, 1914. Ille-et-Vilaine, Manche, Morbihan : ROLLARD, 1990b. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; SIMON, 1914. Var : SIMON, 1914. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Europe. **Habitat.** Friches sèches et chaudes : SIMON, 1914. Lieu très sec, sous une touffe d'*Ononis* : SIMON, 1874a. **Période.** — *Femelle*. Avril, mai : DENIS, 1933b. Septembre : SIMON, 1874a.

*Archaeodictyna* (voir *Dictyna*)

*Argenna patula* (Simon, 1874)

*Dictyna p.* ; *Protadia p.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c (*P. p.*) ; SOYER, 1955 (*P. p.*). Gard : CHANSIGAUD & al., 1994 ; LEDOUX, 2000. Gironde : DENIS, 1951b (*P. p.*), 1952a (*P. p.*). Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique : ROLLARD, 1990b. Manche : PÉTILLON & al., 2004 ; ROLLARD, 1990b. Morbihan : SIMON, 1914 (*P. p.*). "Seine" : SIMON, 1874a (*D. p.*). Seine-Maritime : SIMON, 1874a (*D. p.*), 1914 (*P. p.*). Somme : SIMON, 1914 (*P. p.*). Vaucluse : LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Paléarctique. **Habitat.** Bord d'étang : CHANSIGAUD & al., 1994. Bord d'étang saumâtre : DENIS, 1950c. Bord de mer, rochers : SOYER, 1955. Dune : DENIS, 1950c. Estuaire, sous des joncs : DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés : DENIS, 1951b. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. *Populetum*

*albae*: LEDOUX, 2000. Prairie humide; sous une pierre: SIMON, 1874a. **Période**. — *Mâle*. Mai: DENIS, 1950c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1950c; LEDOUX, 2000. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000. Septembre: DENIS, 1951b.

*Argenna subnigra* (O. P.-Cambridge, 1861)

**Répartition**. Gers: SIMON, 1914. Ille-et-Vilaine, Morbihan: ROLLARD, 1990b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-et-Marne: SIMON, 1914. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Habitat**. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Sous une pierre: SIMON, 1914.

*Brigittea* (voir *Dictyna*)

*Chorizomma subterraneum* Simon, 1872

*C. subterranea*.

**Répartition**. Ariège: DENIS, 1959a, 1960a, 1967d; DRESKO & al., 1968; JEANNEL, 1926; LUCANTE, 1880a (*C. s.*); SIMON, 1875a (*C. s.*), 1910, 1911, 1913. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (*C. s.*), 1959a, 1960a, 1967d; DRESKO, 1947a, 1962 (*C. s.*); DRESKO & al., 1968; KERVILLE, 1932 (*C. s.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*C. s.*). Lot-et-Garonne: DRESKO & al., 1968; LUCANTE, 1880a (*C. s.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1959a, 1960a; DRESKO, 1962 (*C. s.*); DRESKO & al., 1975; JEANNEL, 1926; KERVILLE, 1935; SIMON, 1913. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a (*C. s.*); BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1959a, 1959d, 1960a; DRESKO, 1962 (*C. s.*); DRESKO & al., 1968; JEANNEL, 1926; LUCANTE, 1880a (*C. s.*); SIMON, 1910. — Pyrénées, de l'océan à la Méditerranée: SIMON, 1937. Espagne. **Altitude**. Jusqu'à 1800 m (DENIS, 1960a). **Habitat**. Bois: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1959d, 1960a. Bois, mousses humides: SIMON, 1937. Détritrus: LUCANTE, 1880a. Forêt: DENIS, 1960a, 1967d. Forêt, litière; forêt, litière et mousses: BOSMANS & al., 1985a. Grotte: DENIS, 1959a, 1967d; DRESKO, 1947a, 1962; DRESKO & al., 1968, 1975; JEANNEL, 1926; KERVILLE, 1935; LUCANTE, 1880a; SIMON, 1875a, 1910, 1911, 1913, 1937. Mousses: DENIS, 1967d; LUCANTE, 1880a. Mousses humides: DENIS, 1967d. Prairie: BOSMANS & al., 1985a. Sous les grosses pierres: SIMON, 1937. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période**. — *Mâle*. Janvier, juin: DENIS, 1967d. Août: DENIS, 1960a. Septembre: DENIS, 1959a, 1967d. Octobre: DRESKO & al., 1968. Novembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Février: DENIS, 1967d; DRESKO, 1962. Mars: DENIS, 1959a, 1967d. Avril: DENIS, 1960a. Mai: DENIS, 1967d. Juin: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1959a, 1967d. Juillet: DENIS, 1959d, 1960a. Septembre: DENIS, 1967d; DRESKO, 1962. Octobre: DENIS, 1967d; DRESKO & al., 1968. Décembre: DRESKO, 1962; DRESKO & al., 1975.

*Cicurina cicur* (Fabricius, 1793)

*C. cicurea*; *C. cinerea*; *C. pellucida*.

**Répartition**. Ain, Aube: SIMON, 1875a (*C. cinerea*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*C. cicurea*); SIMON, 1875a (*C. cinerea*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côte-d'Or: DRESKO, 1956, 1959c. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990c. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*C. cinerea*); SIMON, 1899, 1909b. Finistère, Ille-et-Vilaine:

ROLLARD, 1990c. Isère: DENIS, 1934d (*C. cicurea*); SIMON, 1875a (*C. p.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a (*C. cicurea*). Meurthe-et-Moselle: DRESKO & al., 1968. Morbihan: ROLLARD, 1990c. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a, 1962. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; DRESKO, 1947c (*C. cicurea*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a (*C. cinerea*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*C. cinerea*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*C. cinerea*). Somme: ROSELLE, 1891 (*C. cinerea*). — Toute la France: SIMON, 1937 (*C. cicurea*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude**. Jusqu'à 2350 m (DENIS, 1955c). **Habitat**. Bois de hêtres: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bois, sous les pierres et les souches: SIMON, 1937. Bois, sous les pierres ou sous les troncs: SIMON, 1909b. Carrière: BEAUCOURNU & al., 1963b; HUBERT, 1964a. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a, 1962; DRESKO & al., 1975. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Cave: DRESKO, 1959a. Éboulis: EMERIT & al., 1997. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et hêtres, sous écorces ou sous des pierres: LE PERU, 2004. Forêt humide, sous les pierres ou dans les mousses: SIMON, 1875a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1956, 1959c; DRESKO & al., 1968. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: ROSELLE, 1891. Sous l'écorce d'un vieux hêtre abattu: SIMON, 1875a. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Sous une souche d'arbre mort: HILLYARD, 1975. **Période**. — *Mâle*. Octobre: DRESKO, 1962. — *Femelle*. Février: DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Mars: DRESKO, 1959a. Avril: DRESKO, 1947c; LE PERU, 2004. Juin: DRESKO, 1959a; LE PERU, 2004. Août: DRESKO, 1959c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. Octobre: DRESKO, 1962. Novembre: DENIS, 1934d; DRESKO & al., 1968. — *Femelle avec cocon*. Septembre: SIMON, 1875a.

*Desidiopsis racovitzai* (Fage, 1909)

*Mizaga r.*

**Répartition**. Alpes-Maritimes: SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales: FAGE, 1909; SIMON, 1937. Var: DENIS, 1937b. — Italie (*M. r.*). Méditerranée (*M. r.*). **Habitat**. Littoral, algues calcaires formant le trottoir méditerranéen: DENIS, 1937b. Littoral, trottoirs d'algues calcaires au ras de l'eau le long des rochers: FAGE, 1909. [FAGE, 1909 donne la description détaillée de l'habitat de cette espèce: «Il existe en Méditerranée une formation littorale bien spéciale à laquelle De Quatrefages donna le nom de trottoirs et qui consiste en une bordure d'algues calcaires courant au ras de l'eau le long des rochers. Ces bourrelets, constamment battus par les vagues et souvent complètement immergés, sont formés en majeure partie par des *Lithothamnion* et des *Lithophyllum* percés de galeries nombreuses qui servent d'abri à quantité de petits animaux des plus intéressants». SIMON, 1937 indique: «Araignée marine;



habite dans les formations spéciales de la Méditerranée, qu'on appelle trottoirs, bande saillante formée par une agglomération d'algues calcaires, complètement immergée par mauvais temps et mouillée seulement dans le beau temps par l'embrun de petites vagues»].

*Devade hirsutissima* (Simon, 1880)

*D. indistincta*; *Diotima h.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SIMON, 1880b (*D. h.*), 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; TAMBS-LYCHE, 1957. Var: DENIS, 1937a; SIMON, 1880b (*D. h.*), 1914. — Méditerranée (*D. i.*). **Habitat.** Plage: SIMON, 1880b, 1914; TAMBS-LYCHE, 1957. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DENIS, 1933b. Octobre: SIMON, 1880b. — *Femelle*. Septembre: DENIS, 1933b. Octobre: SIMON, 1880b.

*Dictyna ammophila* Menge, 1871

*Archaeodictyna a.*; *D. boiorum*.

**Répartition.** Gironde: SIMON, 1881b (*D. b.*), 1914 (*D. b.*). Landes: SIMON, 1914, 1914 (*D. b.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. Seine-et-Marne: SIMON, 1914. Vendée: MURPHY, 1994. — Allemagne, Italie (*A. a.*). De l'Europe à l'Asie Centrale (*A. a.*). **Habitat.** Dune: MURPHY, 1994. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Plage, sous les touffes d'*Helichrysum*; rochers, mousses: SIMON, 1914. Sable, sous les touffes d'*Helichrysum stoechas*: SIMON, 1881b. Troncs d'arbres, mousses: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1914. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1914.

*Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)

*Theridion benigna*.

**Répartition.** Ain: PRUDON, 1894 (*T. b.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: ROLLARD, 1990b. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909a. Finistère: ROLLARD, 1990b. Gironde: DENIS, 1951b. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Nord: DENIS, 1952b; GOULLIART, 1973. Orne: ROLLARD, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: DENIS, 1937a. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2150 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Bois, feuilles des arbustes: GOULLIART, 1973. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord d'étang, rhododendrons: DENIS, 1952c. Bruyères: SIMON, 1909a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Estuaire, terrain salé: DENIS, 1951b. Forêt: DENIS, 1952b, 1961b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992; SIMON, 1914. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: LANCELEVÉE, 1884. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT

& al., 2003. Pelouse: SCHALLER, 2000. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1914. Prairie en friche: prairie très humide: LE PERU, 2004. Sur un pin mort abattu: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Juin: LEDOUX & al., 2002. — *Femelle*. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; SIMON, 1874a. Juin: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: EMERIT & al., 1999; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1933b. Juillet, août: DENIS, 1952c.

*Dictyna bicolor* Simon, 1870

*Marilynia b.*

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998 (*M. b.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1914. Aude: SIMON, 1881b. Charente-Maritime: SIMON, 1874a, 1874d, 1914. Cher: DENIS, 1943b. Corse: SIMON, 1874a, 1914. Gironde: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1881b. Hérault: SIMON, 1881b. Nièvre: DENIS, 1943b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1999a. Var: SIMON, 1881b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1959c, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Midi de la France jusqu'en Ardèche et dans l'Ouest à l'île de Ré: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie (*M. b.*). De l'Europe à l'Asie Centrale, Afrique du Nord (*M. b.*). **Altitude.** 60 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bord de mer, petits arbustes: LUCANTE, 1880a. Bord de plage, sous des pierres: DENIS, 1962d. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, grève de sable grossier, sous les galets: DENIS, 1943b. Dune: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1881b. Dune, sous les oyats: DENIS, 1963c. Friches arides, sous les pierres; grèves: SIMON, 1914. Oyats: DENIS, 1964b. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. *Populetum albae*, sous des pierres: LEDOUX, 2000. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Sable, sous les oyats: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1943b, 1965c; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1943b, 1965c. Juillet: DENIS, 1959c, 1963c. Octobre: LEDOUX & al., 1999a.

*Dictyna brevidens* Kulczynski, 1897

*Brigittea b.*; *Emblyna b.*

**Répartition.** Landes: SIMON, 1914. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Seine-et-Marne: SIMON, 1914. — Allemagne, Italie, Suisse (*B. b.*; *E. b.*). Paléarctique (*E. b.*). **Habitat.** Aulnes; bord de rivière: SIMON, 1914. Marécage: MURPHY, 1994.

*Dictyna civica* (Lucas, 1849)

*Brigittea c.*; *Theridion civicum*.

**Répartition.** Corrèze: LE PERU, 2004. Gard: EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-): BONNET, 1931. Nord: GOULLIART, 1973. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. "Seine": LUCAS, 1849a (*T. c.*), 1875; SIMON, 1874a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: SUEUR, 1993. Var: DENIS, 1935b. Vendée: DENIS, 1966a. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgi-



que, Espagne, Italie, Suisse (*B. c.*). Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord. **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Maison: DOIGNON, 1976. Mur des bâtiments: LUCAS, 1849a. Murs: SIMON, 1874a, 1914. Murs et tamaris: EMERIT & *al.*, 1994. Sur le mur extérieur d'une maison: LE PERU, 2004. Sur un mur: DENIS, 1966a. Vieux murs et cavités des pierres: GOULLIART, 1973. Ville, sur un monument: BONNET, 1931. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1935b. Juillet: LE PERU, 2004. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle*. Mai: LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1966a; LE PERU, 2004. Septembre: LUCAS, 1875. Octobre: EMERIT & *al.*, 1994.

*Dictyna consecuta* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Archaedictyna c.*; *D. sedilloti*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875b (*D. s.*), 1914 (*D. s.*). Aude: SIMON, 1914 (*D. s.*). — Allemagne, Espagne, Italie (*A. c.*). Paléarctique (*A. c.*). **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1875b.

*Dictyna kosiorowiczi* Simon, 1873

*Brigittea k.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SIMON, 1914. Corse: SIMON, 1874a, 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a (*B. k.*); LEDOUX & *al.*, 1999a; SIMON, 1914. — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & *al.*, 1999a. Bruyères: SIMON, 1874a, 1914. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & *al.*, 1999a. — *Femelle*. Juin: LEDOUX & *al.*, 1999a.

*Dictyna latens* (Fabricius, 1775)

*Brigittea l.*; *D. globiceps*; *D. scabra*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*D. s.*). Ardennes: LENICE, 1992. Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1973; SOYER, 1955. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990b. Eure: SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a. Gers: LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; ROLLARD, 1990b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan, Orne: ROLLARD, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a (*B. l.*); LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003; SIMON, 1874a (*D. g.*); TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1888a, 1891. Var: BIGOT & *al.*, 1988; DENIS, 1935b. Vaucluse: SIMON, 1874a (*D. s.*). Vendée: DENIS, 1941, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*B. l.*). De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Bruyères: SIMON, 1898b, 1914. Buissons des lieux secs: SIMON, 1909a. Buissons secs: SIMON, 1914. Champ: LEDOUX & *al.*, 1996a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Dune: DENIS, 1962b. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & *al.*, 1988. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEDOUX & *al.*, 2003. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & *al.*, 1973. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: ROSELLE, 1891. Lieux secs et découverts: SIMON, 1874a. Maré-

age: DENIS, 1938a. Pelouse calcaire: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pins: DENIS, 1953a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002. Sous une pierre: LUCAS, 1874c. Sur un mur: LENICE, 1992. **Période.** — *Mâle*. Mai: LEDOUX & *al.*, 1996a; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2002; SIMON, 1874a. Juillet: DENIS, 1938a, 1940a; LEDOUX & *al.*, 2003. — *Femelle*. Mai: MULLER & *al.*, 1895. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2002; SIMON, 1874a. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Août: DENIS, 1953a. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999.

*Dictyna major* Menge, 1869

**Répartition.** Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990b. Pas-de-Calais: JACKSON, 1930. — [SIMON, 1914, indique à propos de cette espèce «elle est à rechercher dans les dunes du Nord de la France»]. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Holarctique.

*Dictyna pusilla* Thorell, 1856

**Répartition.** Aisne, Ardèche: SIMON, 1914. Orne: ROLLARD, 1990b. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. Var: SIMON, 1881b, 1914. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Prairie: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Juillet: SIMON, 1914. — *Femelle*. Mai: LEDOUX, 2000. Juillet: SIMON, 1914.

*Dictyna uncinata* Thorell, 1856

**Répartition.** Ain: HEIDT & *al.*, 1998; VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; SIMON, 1909a. Gers: LUCANTE, 1880a. Gironde: DENIS, 1952a. Landes: LUCANTE, 1880a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Marne: LUCAS, 1878a. Nord: GOULLIART, 1973. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Saône (Haute-): BECKER, 1879a. "Seine": LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000; SIMON, 1874a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOD & *al.*, 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: DENIS, 1935b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1550 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Au sommet d'ombellifères ou de graminées séchées: GOULLIART, 1973. Bois: LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & *al.*, 1999. Bord de rivière, graviers: HEIDT & *al.*, 1998. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & *al.*, 1999a. Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a. Bruyères: DENIS, 1957a. Bétulaie, branches: EMERIT & *al.*, 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOD & *al.*, 1989. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Forêt: ROSELLE, 1888b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Haies sèches: SIMON, 1874a. Jardin: ROSELLE, 1888b. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marécage: DENIS, 1952a; EMERIT & *al.*, 1999, 2003; SIMON, 1914; VILLEPOUX, 1990b. Murailles: LUCAS, 1877b.

Palissades: SIMON, 1874a. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, chênes: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: LUCAS, 1872. Sur le vieux murs: SIMON, 1874a. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Verger: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle*. Janvier, mars: DENIS, 1952a. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1957a; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: LUCAS, 1878a. Septembre: LUCAS, 1875, 1877b. Octobre: EMERIT & al., 1999.

#### *Dictyna vicina* Simon, 1873

*Brigittea* v.

**Répartition.** Corse: SIMON, 1874a, 1914. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Midi de la France: SIMON, 1914. Italie (B. v.). De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat.** Haie: SIMON, 1874a. Ripisilve, chênes: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Mai: LEDOUX, 2000.

#### *Lathys humilis* (Blackwall, 1855)

*L. meridionalis*; *Lethia* h.; *Lethia meridionalis*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*Lethia m.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c (*L. h.*). Corse: SIMON, 1874a (*L. h.*), 1874a (*Lethia m.*), 1914. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a. Gers: LUCANTE, 1880a (*L. h.*), 1880a (*Lethia m.*). Gironde: LUCANTE, 1880a (*L. h.*); SIMON, 1914. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; MARC, 1990b; ROLLARD, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: LUCAS, 1878a (*L. h.*). Morbihan: ROLLARD, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; LUCAS, 1875 (*L. h.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976. Var: BECKER, 1880 (*L. h.*), 1880 (*Lethia m.*); DENIS, 1934a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c, 1898c (*L. m.*). Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord de mer, buissons épineux: SIMON, 1874a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Buissons épineux ou résineux: SIMON, 1914. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1964b, 1965c. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et

châtaigniers; forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, chênes-verts, ajoncs et genêts; forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Forêt, chênes: DENIS, 1963c. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Genêts et ajoncs: SIMON, 1909a. Jardin: LUCAS, 1878a. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lieux chauds et arides, sous les pierres: SIMON, 1874a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Plage: SIMON, 1874a. Prairie: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous l'écorce d'un chêne: LUCAS, 1874c. Sous une pierre: DENIS, 1934a. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2002, 2003. Mai: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 2003; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2002, 2003. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a, 1964b, 1965c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1910. Août: LUCAS, 1878a. Septembre: EMERIT & al., 1997, 1999; LUCAS, 1875. Octobre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1999. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1934a.

#### *Lathys jubata* (Denis, 1947)

*Analtella* j.

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Vendée: DENIS, 1947b (A. j.). — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt, talus sablonneux, dans les herbes: DENIS, 1947b. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1947b.

#### *Lathys lutulenta* Simon, 1914

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Var: SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

#### *Lathys narbonensis* (Simon, 1876)

*Analtella brevitarsis*; *Lethia* n.

**Répartition.** Aude: SIMON, 1876c (*L. n.*), 1914. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1914; SOYER, 1955. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1947b (A. b.); SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Marais salant: SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Septembre: SIMON, 1876c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1947b. Décembre: DENIS, 1933b.

#### *Lathys sexpustulata* (Simon, 1878)

*L. alticola* [err.]; *L. sexpustula*; *Lethia* s.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SIMON, 1914. Gironde, Landes: SIMON, 1914. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b [*L. alticola*, err. selon LEDOUX, communication personnelle]. Morbihan: ROLLARD, 1990b (*L. sexpustula*); SIMON, 1914. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a (*Lethia s.*); SIMON, 1878d (*Lethia s.*), 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a [*L. alticola*, err. selon LEDOUX, communication personnelle], 1996a, 2003 [*L. alticola*, err. selon LEDOUX, communication personnelle]. Seine-et-Marne: SIMON, 1914. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Vienne (Haute-): SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Altitude.** Jusqu'à

880 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ajoncs, bruyères et buis : SIMON, 1914. Arrière-dune : DENIS, 1964b. Champ : LEDOUX & al., 1996a. Dune : DENIS, 1965c. Dune à coquilles : DENIS, 1950c. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins : DENIS, 1964b. Forêt de pins, herbes sèches : DENIS, 1962b. Forêt, au sol : LEDOUX & al., 1999b. Plage, oyats : DENIS, 1964b. **Période.** — *Mâle.* Avril : DENIS, 1962b ; SIMON, 1878d. Mai : DENIS, 1933b. — *Femelle.* Février : LEDOUX & al., 1996a. Avril : DENIS, 1964b. Mai : DENIS, 1950c, 1965c ; LEDOUX & al., 1999b. Juin : DENIS, 1964b ; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1962b ; LEDOUX & al., 1996a. Août : DENIS, 1964b ; LEDOUX & al., 2003.

*Lathys simplex* (Simon, 1884)

*Scotolathys heterophthalma* [err.] ; *Scotolathys s.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : DALMAS, 1916 (S. s.) ; SIMON, 1914 [S. h., err. selon DALMAS, 1916]. — Algérie. **Habitat.** Litière de pins : DALMAS, 1916. **Période.** — *Femelle.* Avril, novembre : DALMAS, 1916.

*Lathys stigmatisata* (Menge, 1869)

*L. puta* [err.] ; *Lethia puta* [err.].

**Taxonomie.** L'espèce *Lathys stigmatisata* (Menge, 1869) a souvent été citée sous le nom *L. puta* (O. P. Cambridge, 1863). Selon MERRETT, 1998, il s'agit d'identifications erronées, *L. puta* étant un synonyme d'*Argenna subnigra* (O. P. Cambridge, 1861). [Les citations de SIMON, 1874a sous le nom *Lethia puta*, et de SIMON, 1914 sous le nom *L. puta*, sont des erreurs d'identification selon MERRETT, 1998]. **Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Aube : SIMON, 1874a [*Lethia puta*, err.]. Côtes-d'Armor : ROLLARD, 1990b. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Morbihan : MURPHY, 1994 ; ROLLARD, 1990b. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1995, 1996a. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910. "Seine" : SIMON, 1874a [*Lethia puta*, err.]. Vaucluse : LEDOUX, 2000. Vendée : DENIS, 1941, 1962b, 1964b, 1965c ; ROLLARD, 1990b. — Presque toute la France : SIMON, 1914 (*L. p.* [err.]). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 250 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres : DENIS, 1962b. Dune : DENIS, 1965c. Forêt de pins : DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière : DENIS, 1962b. Friches arides, sous les pierres : SIMON, 1914. Lieux arides, sous les pierres : SIMON, 1874a. Pelouse à plantain caréné : LEDOUX & al., 1995. Ripisilve, sous des pierres : LEDOUX, 2000. Sous une pierre : DENIS, 1941. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Avril : LEDOUX & al., 1996a ; LESSERT, 1904, 1910. Mai : LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Avril : DENIS, 1962b ; LESSERT, 1904, 1910. Mai : DENIS, 1965c ; LEDOUX & al., 1996a ; LESSERT, 1904, 1910. Juin : DENIS, 1941, 1962b, 1965c. Juillet : DENIS, 1964b. Décembre : LESSERT, 1904, 1910.

*Marilynia* (voir *Dictyna*)

*Mastigusa arietina* (Thorell, 1871)

*Cicurina impudica* ; *Tetrilus arietinus* ; *Tetrilus macrophthalmus* [err.].

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1875a (C. i.), 1937 (T. a.). Alpes-de-Haute-Provence, Drôme :

SIMON, 1937 (T. a.). Garonne (Haute-) : DENIS, 1967d (T. a.). Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1951c (T. a.). Pyrénées-Orientales : SIMON, 1937 [*T. macrophthalmus*, err. selon WUNDERLICH, 1986], 1937 (T. a.). Seine-et-Marne : SIMON, 1880a (C. i.), 1937 (T. a.). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1951c). **Habitat.** Forêt de pins, sous des pierres : DENIS, 1951c. Forêt, sous des pierres très enfoncées : SIMON, 1937. Près des glaciers, sous les pierres : SIMON, 1875a. Sous une pierre : SIMON, 1880a. **Période.** — *Mâle.* Mai : SIMON, 1937. Décembre : DENIS, 1967d. — *Femelle.* Septembre : DENIS, 1951c.

*Mastigusa lucifuga* (Simon, 1898)

*Tetrilus l.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales : SIMON, 1898a (T. l.), 1937 (T. l.). — Connue seulement de France.

*Mastigusa macrophthalma* (Kulczynski, 1897)

**Taxonomie.** WUNDERLICH, 1986 indique à propos de cette espèce : «Angaben über Funde aus Frankreich und wohl auch aus Polen beziehen sich wahrscheinlich auf *M. arietina* (Thorell, 1871)». **Répartition.** Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. — Belgique, Grande-Bretagne, Hongrie, Balkans, Russie. **Habitat.** Maison : BRAUD & al., 2005.

*Nigma flavescens* (Walckenaer, 1830)

*Dictyna f.* ; *Heterodictyna f.*

[SIMON, 1914 indique : «Jusque dans ces dernières années, nous confondions *D. flavescens* avec une espèce plus méridionale, *D. hortensis* E. Sim.».] **Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & al., 1992 (D. f.). Calvados : ASSELIN & al., 1989 (D. f.). Eure : LANCELEVÉE, 1884 (D. f.). Gers : LUCANTE, 1880a (D. f.). Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 (H. f.) ; LEDOUX & al., 1999b. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904 (D. f.), 1910 (D. f.). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (D. f.). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (D. f.). Somme : ROSELLE, 1891 (D. f.). Var : DENIS, 1935b (D. f.). — Toute la France, sauf peut-être dans le Midi : SIMON, 1914 (D. f.). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 60 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bord de rivière, galets : RAPHAËL & al., 1992. Forêt : ROSELLE, 1891. Forêt de hêtres, lisière : HILLYARD, 1975. Forêt, buissons : DOIGNON, 1976. Lieux frais : SIMON, 1874a. Ripisilve : LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Avril : LEDOUX & al., 2002. Mai : LESSERT, 1910. — *Femelle.* Mai : LESSERT, 1910.

*Nigma hortensis* (Simon, 1870)

*Dictyna h.*

[SIMON, 1914 indique : «Jusque dans ces dernières années, nous confondions *D. flavescens* avec une espèce plus méridionale, *D. hortensis* E. Sim.».] **Répartition.** Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b (D. h.). Vendée : DENIS, 1962b (D. h.). — Midi de la France : SIMON, 1914 (D. h.). Espagne. Algérie. **Habitat.** Forêt de pins : DENIS, 1962b. **Période.** — *Mâle.* Juillet : DENIS, 1933b. — *Femelle.* Juillet : DENIS, 1962b.

*Nigma puella* (Simon, 1870)*Dictyna p.*; *Heterodictyna p.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*D. p.*), 1882 (*D. p.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*D. p.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*D. p.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (*D. p.*); SOYER, 1955 (*D. p.*). Calvados: LUCAS, 1874c (*D. p.*); SIMON, 1874a (*D. p.*). Corse: SIMON, 1874a (*D. p.*), 1914 (*D. p.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*D. p.*); ROLLARD, 1990b (*H. p.*). Dordogne: LUCANTE, 1880a (*D. p.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Finistère: DENIS, 1938a (*D. p.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*D. p.*). Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990b (*H. p.*). Landes: LUCANTE, 1880a (*D. p.*); SIMON, 1874a (*D. p.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e (*D. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994; ROLLARD, 1990b (*H. p.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*D. p.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*D. p.*); SIMON, 1874a (*D. p.*). Var: BECKER, 1880 (*D. p.*); BIGOT & al., 1987a (*D. p.*), 1987b (*D. p.*), 1988 (*D. p.*); DENIS, 1933a (*D. p.*), 1934a (*D. p.*), 1935b (*D. p.*); SIMON, 1898c (*D. p.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941 (*D. p.*), 1962b (*D. p.*), 1964b (*D. p.*), 1965c (*D. p.*). — Toute la France: SIMON, 1914 (*D. p.*). Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Açores, Madère, Canaries. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1938a, 1941. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DENIS, 1962b. Feuilles de chênes: DENIS, 1938a. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Friche: VEILLON, 1997. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1934a. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Opuntias: SIMON, 1874a. Prairie: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: LUCAS, 1874c. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX, 2000. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1965c; LEDOUX, 2000; SIMON, 1874a. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b; SIMON, 1874a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. — *Femelle.* Avril: LEDOUX, 2000. Mai: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b. Août: DENIS, 1962b, 1967e. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1934a.

*Nigma viridissima* (Walckenaer, 1802)*Dictyna v.*; *N. walckenaeri*.

**Taxonomie.** Le nom *viridissima* a été utilisé pendant plus d'un siècle sans problème, et son changement en *D. walckenaeri* par ROEWER, 1951 n'est pas justifié. **Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946 (*D. v.*); LUCAS, 1874c (*D. v.*). Eure: SIMON, 1909a (*D. v.*). Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911 (*D. v.*). Nord: GOULLIART, 1973 (*D. v.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999 (*N. w.*). Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914 (*D. v.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*D. v.*); LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1914 (*D. v.*); TAMBS-LYCHE, 1957 (*D. v.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*D. v.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*D. v.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*D. v.*). Var: DENIS, 1935a (*D. v.*), 1935b (*D. v.*). Yonne: LUCAS,

1872 (*D. v.*). — Toute la France: SIMON, 1914 (*D. v.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*N. w.*). Paléarctique (*N. w.*). **Habitat.** Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: LUCAS, 1875. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Jardin: ROSELLE, 1891. Jardin, sur la face supérieure des feuilles: GOULLIART, 1973. Marécage: EMERIT & al., 1999. Mur des maisons, sur le lierre: LUCAS, 1874c. Vieux lierres: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1935b. Septembre: EMERIT & al., 1999; LUCAS, 1875. Octobre: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1874a. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Septembre: LUCAS, 1875. Octobre: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1874a. Décembre: DENIS, 1933b.

## AMAUROBIIDAE

Le genre *Coelotes* a été récemment divisé en de nombreux genres (BRIGNOLI, 1982b, WANG, 2002), dont: *Eurocoelotes* (*C. inermis*), *Paracoelotes* (*C. pyrenaicus*, *C. segestriformis*). Ces modifications ont été peu suivies pour le moment. Ces espèces sont maintenues ici dans le genre *Coelotes*.

*Amaurobius erberi* (Keyserling, 1863)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a. Ardèche: BALAZUC & al., 1952; RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; BIGOT & al., 1973; KABOUICHE & al., 1997; LUCZACK & al., 1964; PETIT & al., 1945; SOYER, 1955. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1876b. Corse: SIMON, 1874a. Côte-d'Or: DRESKO, 1956. Finistère: DRESKO, 1975. Gard: LEDOUX, 2000. Gers: LUCANTE, 1880a. Gironde: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1874a. Hérault: DRESKO & al., 1968; EMERIT & al., 1985, 1990. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990b. Landes: LUCANTE, 1880a. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a. Maine-et-Loire: BEAUCOURNU & al., 1963c; BRAUD & al., 2005; DRESKO, 1959a. Manche: KERVILLE, 1898, 1900; LUCAS, 1878b. Morbihan: DRESKO, 1975; MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1933d, 1967d; HUBERT, 1964b; LEDOUX & al., 1995, 2003; SIMON, 1874a; SOYER, 1965; TAMBS-LYCHE, 1957. Var: BECKER, 1880, 1882; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b; GROS, 1983a; KOVOOR & al., 2000; PONEI, 1984; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; LEDOUX, 2000; SIMON, 1874a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Tout le Centre et le Midi de la France et sur le littoral océanique jusqu'en Normandie: SIMON, 1914. Espagne, Italie, Suisse. Europe, Canaries. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1963c. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord d'étang: PETIT & al., 1945. Bord de mer, sous une pierre: KERVILLE, 1900. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Carrière souterraine: DRESKO, 1959a. Détritrus: SIMON, 1914. Dune, sous les oyats: DENIS, 1963c. Décombres: SIMON, 1874a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al.,

1987a. Forêt de pins maritimes, détritrus : CLARK & al., 1970. Friche : LEDOUX & al., 2003. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Grotte : BALAZUC & al., 1952; BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1956; DRESKO & al., 1968; LUCZACK & al., 1964. Maison en ruine, sous des pierres : DENIS, 1962b. Marécage : BELIN, 2001. Mur : LUCAS, 1878b. Plage : PONÉL, 1984. Plage, sous des galets : DENIS, 1963c. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus* : KABOUCHÉ & al., 1997. *Populetum albae*, litière ou sous des pierres : LEDOUX, 2000. *Salicornietum* : BIGOT, 1965. Sous des écorces de bois à terre : KOVOOR & al., 2000. Sous une pierre : KERVILLE, 1898; KOVOOR & al., 2000; LUCAS, 1882a; SIMON, 1874a, 1914. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992; SOYER, 1965. Talus : CHANSIGAUD, 1992. Terrain vague : BOSMANS & al., 1985a. Vieux murs : SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Janvier : DENIS, 1963c. Mars : DENIS, 1967d. Août : LUCAS, 1882a. Octobre : DENIS, 1963c, 1967d. Novembre : DENIS, 1962b; DRESKO, 1975. — *Femelle*. Janvier : DENIS, 1963c; DRESKO, 1959a; LEDOUX, 2000. Mars : DENIS, 1964b, 1967d. Avril : DRESKO, 1975; HUBERT, 1964b. Mai : DENIS, 1967d; DRESKO & al., 1968; TAMBS-LYCHE, 1957. Juillet : GROS, 1983a. Août : GROS, 1983a; LUCAS, 1878b, 1882a. Septembre : CLARK & al., 1970; HUBERT, 1964b. Octobre : DENIS, 1963c; KABOUCHÉ & al., 1997; LEDOUX, 2000. Novembre : DENIS, 1962b, 1967d; DRESKO, 1975; LEDOUX & al., 2003. — *Femelle avec cocon*. Mai : DENIS, 1934a.

#### *Amaurobius fenestralis* (Ström, 1768)

*A. atrox*; *Ciniflo f.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : HUBERT, 1964b; SIMON, 1913. Calvados : ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*A. a.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Eure : SIMON, 1909a. Finistère : DENIS, 1938a; LUCAS, 1868 (*A. a.*). Garonne (Haute-) : FAGE, 1931. Gers : LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine : ROLLARD, 1990b. Jura : HUBERT, 1964a; LESSERT, 1910 (*C. f.*). Marne : LUCAS, 1878a. Meurthe-et-Moselle : DRESKO & al., 1968. Morbihan : ROLLARD, 1990b. Puy-de-Dôme : LE PERU, 2004. Rhin (Haut-) : SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1910 (*C. f.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976. Tarn : LUCANTE, 1880a. Yonne : LUCAS, 1872 (*A. a.*). — Presque toute la France : SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Bois : DENIS, 1938a; SIMON, 1874a. Bâtiment : LEDOUX & al., 1996c. Champs, sous des pierres : LUCAS, 1870d. Éboulis : LEDOUX & al., 1996b. Forêt d'épicéas : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Forêt de sapins, sous les pierres : SIMON, 1874a. Forêt humide, sous écorces ou dans les mousses : LE PERU, 2004. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Grotte : DRESKO & al., 1968; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a; SIMON, 1913. Jardin : SIMON, 1874a. Marais, sous des grosses pierres : LANCELEVÉE, 1884. Murailles : LUCAS, 1878a. Murs : LUCAS, 1872. Mélèzes : LEDOUX & al., 1996c. Rochers, anfractuosités : SIMON, 1874a. Sous les écorces : SIMON, 1914. Sous une pierre : LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1868; SIMON, 1874a, 1914. Trous

d'arbres : SIMON, 1874a. Vieux murs : SIMON, 1874a, 1909a. **Période.** — *Mâle*. Mars : LESSERT, 1904, 1910. Août : LEDOUX & al., 1996b. Septembre : LEDOUX & al., 1996c. Décembre : LE PERU, 2004. — *Femelle*. Avril : LE PERU, 2004. Mai : DRESKO & al., 1968. Juin : DENIS, 1938a. Juillet : HUBERT, 1964a. Août : HUBERT, 1964b; LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LUCAS, 1868, 1870d, 1878a. Septembre : LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon*. Juillet : SIMON, 1874a.

#### *Amaurobius ferox* (Walckenaer, 1830)

*A. corsicus.*

**Répartition.** Ain : DRESKO & al., 1975. Ardèche : BALAZUC & al., 1952; HUBERT, 1964b. Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b. Charente : DRESKO, 1959a. Charente-Maritime : JOURDE & al., 1999. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1874a (*A. c.*), 1914. Côte-d'Or : DRESKO, 1956, 1959c. Côtes-d'Armor : CAZALET, 1935; DENIS, 1938a; DRESKO, 1975. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909a. Finistère : DENIS, 1939a, 1940a; DRESKO, 1975; ROLLARD, 1990b. Gard : SIMON, 1913. Ille-et-Vilaine : CAZALET, 1935; ROLLARD, 1990b. Jura : DRESKO, 1959c; DRESKO & al., 1968. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique : BEAUCOURNU & al., 1963b, 1963c; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964b. Maine-et-Loire : BEAUCOURNU & al., 1963c; BRAUD & al., 2005; DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a; VEILLON, 1997. Manche : LUCAS, 1878b; PÉTILLON & al., 2004. Mayenne, Meurthe-et-Moselle : HUBERT, 1964a. Morbihan : DENIS, 1938a; DRESKO, 1975; ROLLARD, 1990b. Nord : GOULLIART, 1979a. Oise : HUBERT, 1964b. Orne : ROLLARD, 1990b. Pyrénées-Atlantiques : FAGE, 1931. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b, 1967d. Sarthe : BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a. Saône-et-Loire : DRESKO, 1959c; HUBERT, 1964a. "Seine" : DRESKO, 1947c; ROLLARD, 2000; SIMON, 1874a. Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : BERLAND, 1928; DRESKO, 1943. Somme : ROSELLE, 1887. Tarn-et-Garonne : FAGE, 1931. Vendée : CLARK & al., 1970; DENIS, 1940b, 1941, 1963c. Yonne : HUBERT, 1964b. — Toute la France : SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bois : DENIS, 1941. Bois de chênes, vieux mur : EMERIT & al., 1997. Bord d'étang, sous des pierres : DENIS, 1938a. Carrière souterraine : DRESKO, 1959a; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a, 1964b. Carrière, dans une fissure de la paroi : DENIS, 1963c. Carrière, sous un tas de pierres calcaires : DRESKO, 1947c. Cave : BEAUCOURNU & al., 1963b; DRESKO, 1959a, 1959c, 1975; HUBERT, 1964a; SIMON, 1874a, 1914. Décombres : SIMON, 1909a, 1914. Forêt : DENIS, 1938a. Forêt de pins maritimes, détritrus : CLARK & al., 1970. Friche : VEILLON, 1997. Galerie souterraine : DRESKO, 1959c. Grotte : BALAZUC & al., 1952; BEAUCOURNU & al., 1963c; BERLAND, 1928; DRESKO, 1943, 1956, 1959a, 1959c; DRESKO & al., 1975; FAGE, 1931; HUBERT, 1964a, 1964b; SIMON, 1874a, 1913. Jardin : ROSELLE, 1887. Jardin, sous un tas de bois : LE PERU, 2004. Littoral, falaise : CAZALET, 1935. Littoral, grotte dans la falaise : DENIS, 1940b. Littoral, marais salé : PÉTILLON & al., 2004. Maison : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; DRESKO, 1975. Maison, cave : LE PERU, 2004. Maisons, endroits obscurs; marécage :

LANCELEVÉE, 1884. Murs: GOULLIART, 1979a. Plage, sous des pierres: DRESKO, 1975. Sous écorces: GOULLIART, 1979a; LUCAS, 1877b. Sous l'écorce d'un arbre abattu: SIMON, 1874a. Sous les écorces: LANCELEVÉE, 1884. Sous une pierre: DENIS, 1940a; LANCELEVÉE, 1884; LUCAS, 1878b. Trous des murs: SIMON, 1914. Vieux murs: SIMON, 1909a. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DRESKO, 1959a, 1975; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Février: LE PERU, 2004. Mars: DRESKO, 1959a, 1959c; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Avril: DRESKO, 1947c; DRESKO & al., 1968. Mai: DRESKO, 1975; DRESKO & al., 1975. Juin: VEILLON, 1997. Août: DRESKO, 1975; LUCAS, 1878b. Septembre: LUCAS, 1877b. Novembre: DRESKO, 1959a, 1975; DRESKO & al., 1975; LE PERU, 2004. — *Femelle*. Janvier: DRESKO, 1959a, 1975. Février: DRESKO, 1975; HUBERT, 1964a. Mars: DRESKO, 1959a, 1975. Avril: DRESKO, 1947c, 1959a; LE PERU, 2004. Mai: DRESKO, 1959c, 1975; HUBERT, 1964b; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1941; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1874a. Juillet: DENIS, 1938a, 1963c; DRESKO, 1975; LE PERU, 2004. Août: DRESKO, 1975; HUBERT, 1964b; LUCAS, 1878b. Septembre: CLARK & al., 1970; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Octobre: DRESKO, 1975; HUBERT, 1964b. Novembre: DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964b. Décembre: BERLAND, 1928; DRESKO, 1959c. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941.

*Amaurobius jugorum* L. Koch, 1868

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe du Sud et de l'Est.

*Amaurobius latebrosus* Simon, 1874

**Répartition.** Corse: HUBERT, 1964b; SIMON, 1874a, 1914. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Forêt sombre, sous une pierre: SIMON, 1874a.

*Amaurobius occidentalis* Simon, 1892

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914. — Espagne. Portugal. **Habitat.** Sous les pierres dans les montagnes: SIMON, 1914.

*Amaurobius scopolii* Thorell, 1871

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1874a, 1914. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881, 1882; SIMON, 1874a, 1914. Alpes-de-Haute-Provence: LUCZACK & al., 1964; SIMON, 1874a, 1914. Bouches-du-Rhône: LUCZACK & al., 1964; SOYER, 1955. Var: DENIS, 1933a; SIMON, 1898c, 1914. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1914. — Espagne, Italie. Europe du Sud. **Altitude.** Jusqu'à 1440 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois de hêtres, sous les pierres: SIMON, 1874a. Forêt, sous les pierres: SIMON, 1914. Grotte: LUCZACK & al., 1964. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. **Période.** — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1874a, 1914.

*Amaurobius similis* (Blackwall, 1861)

*Ciniflo s.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1959a; HUBERT, 1964b. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d. Charente: HUBERT, 1964a. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-

d'Armor: DRESKO, 1975. Eure: SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a; LUCAS, 1868; ROLLARD, 1990b. Gers: LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine: DRESKO, 1975; MARC, 1990b; ROLLARD, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: ROLLARD, 1990b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; DRESKO & al., 1975; HUBERT, 1964a. Manche: BERLAND, 1924. Mayenne: DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964b; ROLLARD, 1990b. Morbihan: ROLLARD, 1990b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Sarthe: BEAUCOURNU & al., 1963c; DRESKO, 1959a, 1962. "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (C. s.); CHRISTOPHE & al., 1977; DRESKO, 1947c; ROLLARD, 2000; SIMON, 1874a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Vendée: ROLLARD, 1990b. Yonne: DRESKO, 1950; HUBERT, 1964b; LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Carrière: DRESKO, 1950; HUBERT, 1964a. Carrière souterraine: DRESKO, 1962. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Cave: HUBERT, 1964a. Champs, sous des pierres: LUCAS, 1870d. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et châtaigniers: LEDOUX & al., 2003. Forêt de chênes et hêtres, sous écorce d'arbre mort: LE PERU, 2004. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, mousses épaisses: DENIS, 1938a. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Grotte: BEAUCOURNU & al., 1963c; DENIS, 1959a; DRESKO, 1959a; HUBERT, 1964a, 1964b. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; DRESKO, 1975; LE PERU, 2004; ROSELLE, 1887. Murs: LUCAS, 1872. Prairie, sous des pierres: LEDOUX & al., 2003. Rochers, anfractuosités: SIMON, 1914. Sous les écorces: SIMON, 1874a, 1914. Sous un amas de briques: BERLAND, 1924. Sous une pierre: LANCELEVÉE, 1884; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1868; SIMON, 1914. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Sur un mur: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Trous des murs: SIMON, 1874a. Vieux murs: SIMON, 1909a. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1933b; HUBERT, 1964a; LE PERU, 2004. Mars: HUBERT, 1964a. Juillet: DRESKO, 1975; LEDOUX & al., 1996a. Août: DRESKO, 1975; HUBERT, 1964b; LEDOUX, 1993. Septembre: DENIS, 1967d; DRESKO, 1950; HUBERT, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Novembre: DRESKO & al., 1975. Décembre: DRESKO, 1962; HUBERT, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1959a. Mars: LE PERU, 2004. Avril: DRESKO, 1947c; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DRESKO, 1975; HUBERT, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DRESKO, 1975; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1868, 1870d. Septembre: DENIS, 1967d; DRESKO, 1950; HUBERT, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Novembre: LEDOUX & al., 1996a, 2003. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1938a.

***Callobius claustrarius*** (Hahn, 1831)*Amaurobius c.*; *Ciniflo c.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1874a (A. c.). Corse: ROEWER, 1926 (A. c.). Doubs: SIMON, 1874a (A. c.). Jura: LESSERT, 1910 (C. c.); SIMON, 1874a (A. c.), 1914 (A. c.). Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (A. c.); REIBER, 1880 (A. c.); SIMON, 1914 (A. c.). Savoie (Haute-): HUBERT, 1964b (A. c.); LEDOUX & al., 1996c. [SIMON, 1914 indique que la citation de cette espèce des environs de Paris par SIMON, 1874a est une erreur]. — Alsace: Jura et Alpes françaises: SIMON, 1914 (A. c.). Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 1320 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Femelle.* Mars: ROEWER, 1926. Août: HUBERT, 1964b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

***Coelotes atropos*** (Walckenaer, 1830)*Amaurobius a.*

**Taxonomie.** Les espèces *Coelotes atropos* et *C. terrestris* ont parfois été confondues. SIMON, 1937 note: «Walckenaer confondait les deux espèces *C. atropos* et *C. terrestris* comme je le faisais moi-même, jusque dans ces derniers temps». CHRYSANTHUS, 1965 cite cette note et indique à propos de ces deux espèces: «For this reason all references until 1937 must be considered with some reserve». **Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: SIMON, 1937. Aude: DELFOSSE, 2000a. Aveyron: SIMON, 1937. Calvados: LUCAS, 1870d (A. a.). Cantal: SIMON, 1937. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Doubs: SIMON, 1937. Finistère: DENIS, 1938a. Gard: SIMON, 1937. Gers: LUCANTE, 1880a. Isère: SIMON, 1875a, 1937. Jura, Loire, Lozère: SIMON, 1937. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Orne: GUIBÉ, 1946. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": SIMON, 1875a, 1937. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1888a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Champs, sous des pierres: LUCAS, 1870d. Forêt: ROSELLE, 1888a. Forêt, sous les pierres: SIMON, 1875a. Forêt, sous les pierres et les souches: SIMON, 1937. Mur: LENICE, 1992. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Mars: SIMON, 1937. Avril: SIMON, 1875a, 1937. Juin, juillet: SIMON, 1937. Août: LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1870d. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. Octobre, novembre: SIMON, 1937. — *Femelle.* Mars: SIMON, 1937. Avril: SIMON, 1875a, 1937. Juin: DENIS, 1938a; SIMON, 1937. Juillet: LEDOUX & al., 1996c; SIMON, 1937. Août: LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1870d. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. Octobre, novembre: SIMON, 1937. — *Femelle avec cocon.* Mai: SIMON, 1875a. Juin: DENIS, 1938a. — *Femelle avec ses jeunes.* Septembre: SIMON, 1875a.

***Coelotes inermis*** (L. Koch, 1855)*Eurocoelotes i.*

**Répartition.** Ain: DRESKO & al., 1975; SIMON, 1875a, 1937. Aisne: GROS, 2004; SIMON, 1887b, 1937. Aube: SIMON, 1875a, 1937. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Drôme, Eure: SIMON, 1937. Isère: SIMON, 1875a, 1937. Jura: SIMON, 1937. Loire, Marne, Nièvre, Pas-de-Calais, Rhône, "Seine": SIMON, 1937. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884.

Seine-et-Marne, Yonne: SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Europe (*E. i.*). **Habitat.** Bois de hêtres, chênes et charmes, éboulis: EMERIT & al., 1997. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1937. Forêt humide, sous écorce d'arbre mort: LE PERU, 2004. Forêt, sous les pierres: SIMON, 1875a. Grotte: DRESKO & al., 1975. Jardin, sous un tas de bois: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Septembre: EMERIT & al., 1997; SIMON, 1937. Octobre: DRESKO & al., 1975; LE PERU, 2004; SIMON, 1937. — *Femelle.* Juin: EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004. Août: SIMON, 1937. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: SIMON, 1937.

***Coelotes osellai*** de Blauwe, 1973

**Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER, 1981; MAURER & al., 1988. — Italie. **Altitude.** De 1200 m (MAURER, 1981) jusqu'à 2400 m (MAURER, 1981; MAURER & al., 1988). **Habitat.** Éboulis; forêt, éboulis de pierres calcaires: MAURER & al., 1988. **Période.** — *Mâle.* Juillet: MAURER, 1981. — *Femelle.* Juillet, août: MAURER, 1981; MAURER & al., 1988. Septembre, octobre: MAURER, 1981.

***Coelotes pabulator*** Simon, 1875*C. pastor* [err.]; *C. solitarius* [err.].

[SIMON, 1937 remet en cause certaines citations de SIMON, 1875a. Il indique: «La distribution dans nos Alpes françaises des deux espèces alpines *C. pabulator* et *pastor*, n'est pas conforme à celle que j'en avais donnée à l'origine ... *C. pabulator* est plus méridionale que *C. pastor*». La citation de l'Isère par SIMON, 1875a est erronée selon SIMON, 1937, et se rapporte à *C. pastor*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a, 1937. Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935; MAURER, 1981; MAURER & al., 1988; SIMON, 1937. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a [*C. pastor*, err. selon SIMON, 1937], 1937. Drôme: SIMON, 1937. Vaucluse: CORNIC, 1978 [*C. pastor* et *C. solitarius*, err. selon MAURER, 1981]; MAURER, 1981. — Italie, Suisse. **Altitude.** De 900 m jusqu'à 2550 m (MAURER & al., 1988). **Habitat.** Éboulis; forêt de *Castanea* et *Ostrya*; forêt de pins: MAURER & al., 1988. Prairie alpestre, sous les pierres: SIMON, 1875a, 1937. Sous une pierre: BERLAND, 1935. **Période.** — *Mâle.* Juillet: CORNIC, 1978; MAURER & al., 1988. Septembre: MAURER, 1981. — *Femelle.* Juillet: CORNIC, 1978; MAURER, 1981; MAURER & al., 1988. Août: BERLAND, 1935; MAURER & al., 1988. Septembre, octobre: MAURER, 1981.

***Coelotes pastor*** Simon, 1875*C. pabulator* [err.].

[Voir explication à *C. pabulator*. La citation des Alpes-de-Haute-Provence par SIMON, 1875a est erronée selon SIMON, 1937, celle du Vaucluse par CORNIC, 1978 est erronée selon MAURER, 1981; ces citations se rapportent à *C. pabulator*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a, 1937. Isère: SIMON, 1875a [*C. pabulator*, err. selon SIMON, 1937], 1937. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): SIMON, 1937. Vaucluse: MAURER, 1981. — Italie, Suisse. **Altitude.** De 1800 m (SIMON, 1875a) jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Prairie alpestre, sous les pierres: SIMON, 1875a, 1937. **Période.** — *Mâle.* Août: SIMON, 1875a. — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937; MAURER, 1981.

*Coelotes poweri* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes-Maritimes: MAURER & al., 1988; SIMON, 1875a, 1937. — Italie. **Altitude.** De 1700 m jusqu'à 2070 m (MAURER & al., 1988). **Habitat.** Forêt de conifères: SIMON, 1937. Forêt de mélèzes, sous des blocs de pierres: MAURER & al., 1988. **Période.** — *Mâle*. Juillet: MAURER & al., 1988; SIMON, 1937. Août: SIMON, 1937. — *Femelle*. Juillet: MAURER & al., 1988; SIMON, 1937. Août: SIMON, 1937.

*Coelotes pyrenaes* (Simon, 1870)*Paracoelotes p.*

**Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a; SIMON, 1875a, 1937; SOYER, 1965. — Espagne (*P. p.*). **Altitude.** De 800 m (SIMON, 1937) jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois de hêtres: SOYER, 1965. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de hêtres, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres, sous les pierres et les souches: SIMON, 1937. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Talus, terrier profond: DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1954a. Août: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1954a; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1967d. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b. — *Femelle avec ses jeunes*. Juillet: DENIS, 1959d.

*Coelotes segestriformis* (Dufour, 1820)

*C. atramentarius*; *C. leveillei*; *C. obesus*; *C. roscidus*; *Paracoelotes s.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a, 1961b, 1967d; LUCANTE, 1880a (*C. a.*); SIMON, 1875a (*C. a.*), 1937. Côtes-d'Armor: SIMON, 1876d (*C. l.*), 1937. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; DRESKO, 1947a; KERVILLE, 1927, 1932; SIMON, 1937. Pyrénées (Hautes-): BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1939b, 1950b, 1955c, 1960a, 1963e; LUCANTE, 1880a (*C. a.*), 1880a (*C. r.*); SIMON, 1937. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a; BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1957a, 1959d; SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1961b; SIMON, 1875a (*C. o.*), 1937. [SIMON, 1875a cite cette espèce des "Pyrénées" sous le nom *C. roscidus*, d'après une récolte de L. Koch]. — Espagne (*P. s.*). Europe, Russie (*P. s.*). **Altitude.** Jusqu'à 3000 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bois: BRIGNOLI, 1978. Bois, sous des pierres: DENIS, 1959d. Forêt: DENIS, 1960a. Forêt de hêtres et de conifères, sous les pierres et les souches: SIMON, 1937. Prairie alpestre; rochers: BOSMANS & al., 1985a. Sous une pierre: DENIS, 1950b; KERVILLE, 1927. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1957a. Août: DENIS, 1960a. — *Femelle*. Juin: BRIGNOLI, 1978; DENIS, 1967d. Juillet: DENIS, 1939b, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1959d, 1960a, 1961b, 1963e. Août: DENIS, 1950b. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1957a, 1959d, 1960a. — *Femelle avec ses jeunes*. Juillet: DENIS, 1950b, 1957a, 1960a.

*Coelotes solitarius* L. Koch, 1868

[SIMON, 1937 indique qu'il confondait autrefois *C. solitarius* et *C. terrestris*. MAURER, 1981 note: «*C. soli-*

*tarius* L. K. ist für die Westalpen nicht nachgewiesen; alle unter diesem Namen publizierten Funde erwiesen sich als etwas anderes». La citation du Vaucluse par CORNIC, 1978 est erronée selon MAURER, 1981 et se rapporte à *C. pabulator*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1937. Allemagne, Italie. Europe. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1875a, 1937.

*Coelotes terrestris* (Wider, 1834)*Amaurobius t.*

**Taxonomie.** Cette espèce a été confondue avec *C. atropos*; voir la note sous *C. atropos*. **Répartition.** Ain, Aisne: SIMON, 1937. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1937. Cher: DENIS, 1943b. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Doubs: EMERIT & al., 1997. Drôme: SIMON, 1937. Eure: SIMON, 1899, 1909b, 1937. Finistère: DENIS, 1938a; ROLLARD, 1990c. Gers: SIMON, 1937. Ille-et-Vilaine: ROLLARD, 1990c. Isère, Jura, Loir-et-Cher: SIMON, 1937. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Mayenne, Morbihan: ROLLARD, 1990c. Oise: SIMON, 1937. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a; SIMON, 1937. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1937. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Sarthe: SIMON, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1910 (*A. t.*); SIMON, 1937. "Seine": CHRISTOPHE, 1973, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; ROLLARD, 2000; SIMON, 1937. Seine-Maritime: SIMON, 1937. Seine-et-Marne: SIMON, 1898b, 1937. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a. Bois de hêtres: DENIS, 1948b. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois, sous des pierres: DENIS, 1943b. Forêt: LEDOUX & al., 1996c. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE, 1973; CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et hêtres, litière: LE PERU, 2004. Forêt froide, sous les pierres et les souches: SIMON, 1937. Forêt humide, sous écorce d'arbre mort ou sous des pierres: LE PERU, 2004. Forêt, sous des troncs abattus: SIMON, 1898b. Jardin, sous un tas de bois ou sous des pierres: LE PERU, 2004. Lande: LEDOUX & al., 1996c. Mousses: SIMON, 1909b. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Sous des écorces de pins abattus: DENIS, 1960a. Sous une pierre: DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle*. Juillet: CORNIC, 1978; SIMON, 1937. Août: LE PERU, 2004. Septembre, octobre: LE PERU, 2004; SIMON, 1937. Novembre: SIMON, 1937. — *Femelle*. Janvier: LE PERU, 2004. Avril, mai: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1948b; EMERIT & al., 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1948b, 1960a; LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1938a, 1943b. Juillet: DENIS, 1948b.

## TITANOECIDAE

Les espèces *Titanoeca albomaculata* et *T. sequerai* ont été transférées dans le genre *Nurscia* par LEHTINEN, 1967; ces modifications n'étant pas suivies par les



auteurs ultérieurs, ces espèces sont maintenues ici dans le genre *Titanoeca*.

*Titanoeca albomaculata* (Lucas, 1846)

*Nurscia a.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1874a. Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1973; DENIS, 1954b; SOYER, 1955. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874a, 1914. Gard: EMERIT & al., 1994. Hérault: EMERIT & al., 1985. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. Var: BECKER, 1880; BIGOT, 1993; DENIS, 1934a, 1935b; GROS, 1983a; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Midi de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie (*N. a.*). De l'Europe à l'Asie Centrale (*N. a.*). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Jardin: DENIS, 1934a. Lieu humide: KOVOOR & al., 2000. Lieux arides, sous les pierres: SIMON, 1874a. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Plage: DENIS, 1954b. Plateau calcaire: CANARD, 1989. *Populetum albae*, sous des pierres: LEDOUX, 2000. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Prairie sèche et caillouteuse: DELFOSSE, 2000b. Ripisilve: EMERIT & al., 1994. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle*. Juin: SIMON, 1874a. Juillet: CANARD, 1989; SIMON, 1874a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. Juin: SIMON, 1874a. Juillet: CANARD, 1989; GROS, 1983a; SIMON, 1874a.

*Titanoeca flavicoma* L. Koch, 1872

**Répartition.** Corse: SIMON, 1874a, 1914. — Italie. Paléarctique. **Habitat.** Lit d'un torrent desséché, sous les pierres: SIMON, 1874a.

*Titanoeca hispanica* Wunderlich, 1994

**Répartition.** Ardèche, Charente-Maritime: WUNDERLICH, 1994d. — Espagne.

*Titanoeca monticola* (Simon, 1870)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a, 1914. Charente-Maritime: SIMON, 1874a, 1874d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1874a, 1914. — Espagne, Italie. Portugal. **Habitat.** Lieux secs et arides: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle*. Juillet: SIMON, 1874a. — *Femelle*. Juillet, novembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Titanoeca nivalis* Simon, 1874

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Isère: SIMON, 1874a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a; HUBERT, 1966. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. — Alpes et Pyrénées: SIMON, 1914. Espagne, Suisse. Holarctique. **Altitude.** De 2000 m (SIMON, 1874a, 1914) jusqu'à 2960 m (DENIS, 1953a). [SIMON, 1914 indique: « dans la zone alpine et la zone des neiges de 2000 à 2500 m (Cani-gou) »]. **Habitat.** Sous une pierre: SIMON, 1874a, 1914. **Période.** — *Mâle*. Juillet: SIMON, 1874a. Août: DENIS, 1952c. — *Femelle*. Juillet: SIMON, 1874a. Août: DENIS, 1952c, 1953a. Septembre: HUBERT, 1966.

*Titanoeca praefica* (Simon, 1870)

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1874a, 1914. — Espagne. Algérie, Russie.

*Titanoeca quadriguttata* (Hahn, 1833)

*T. obscura.*

**Taxonomie.** L'espèce *Titanoeca quadriguttata* (Hahn, 1833), parfois citée sous le nom *T. obscura* (SIMON, 1914, HEIMER & al., 1991), présente une synonymie un peu confuse. Elle a été décrite sous le nom *Aranea obscura* par WALCKENAER (1802), mais le nom étant préoccupé, PLATNICK, 2004 retient le nom *Theridion 4-guttata* Hahn, 1833 pour cette espèce. Le nom *obscura* a été utilisé par Keyserling (1878) pour désigner une espèce d'Amérique du Sud (*T. obscura* = *Goeldia o.*); cette espèce n'a rien à voir avec l'*Aranea obscura* de Walckenaer. **Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992 (*T. o.*). Ariège: DENIS, 1961b (*T. o.*). Aube: SIMON, 1874a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1955 (*T. o.*). Côte-d'Or: SIMON, 1874a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*T. o.*); HUBERT, 1966 (*T. o.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*T. o.*); DENIS, 1933b (*T. o.*); LEDOUX & al., 1996a (*T. o.*), 2003 (*T. o.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1874a. Vendée: DENIS, 1941 (*T. o.*). — Presque toute la France: rare dans le Nord, commun dans le plateau central: SIMON, 1914 (*T. o.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse (*T. o.*). Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). [SIMON, 1914 indique: « dans les Alpes et les Pyrénées jusque vers 2000 m »]. **Habitat.** Carrière: LENICE, 1992. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Friches arides, sous les pierres: SIMON, 1874a. Sous une pierre: DENIS, 1950b; EMERIT & al., 1997; LUCAS, 1882a. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1874a. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1874a. Juin: DENIS, 1933b, 1941; EMERIT & al., 1997; HUBERT, 1966; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b. Août: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1882a. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle avec cocon*. Mai, juin: SIMON, 1874a.

*Titanoeca schineri* L. Koch, 1872

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a, 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. — Paléarctique. **Habitat.** Tas de pierres; trous des vieux murs: SIMON, 1874a. **Période.** — *Femelle*. Février, avril: DENIS, 1933b.

*Titanoeca sequerai* Simon, 1892

*Nurscia s.*; *T. sequerai*.

**Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1914 (*T. s.*). — Espagne (*N. s.*). Portugal (*N. s.*). **Altitude.** 60 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle*. Juin: SIMON, 1914. — *Femelle*. Juin: SIMON, 1914.

*Titanoeca tristis* L. Koch, 1872

**Répartition.** Ardèche, Charente-Maritime: SIMON, 1914. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; HUBERT, 1966.

Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962d, 1963c, 1964b; MURPHY, 1994. — Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970. Arrière-dune, mousses très sèches: DENIS, 1964b. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1962d. Dune: DENIS, 1941, 1964b; MURPHY, 1994. Dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Sable, oyats: DENIS, 1964b. Sous une pierre: DENIS, 1941. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1941, 1964b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962d. Juin: DENIS, 1941, 1964b. Juillet: DENIS, 1963c; HUBERT, 1966. Août: DENIS, 1964b. Septembre: CLARK & al., 1970. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1963c.

#### ANYPHAENIDAE

##### *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991; VILLEPOUX, 1990b. Ardennes: LENICE, 1992. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a; MARC, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a; MARC, 1990a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: MARC, 1990a. Nord: DENIS, 1952b. Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; GROS, 1983a; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: DENIS, 1936. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois: CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1938a, 1967e; LUCAS, 1875. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord d'étang, ronces ou chênes: VEILLON, 1997. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Buissons et arbres: SIMON, 1932. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Chênes: LUCAS, 1878a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: CLARK & al., 1970; DENIS, 1952b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1964b, 1965c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, chênes: DENIS, 1963c. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Haie; haie, litière: BRAUD & al., 2005.

Jardin: LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de forêt humide; maison: LE PERU, 2004. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, litière: LEDOUX, 2000. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002, 2003. Mai: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a. Juin: SIMON, 1878a. Août: LUCAS, 1870d. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1933b; KRAUS, 1955; LEDOUX & al., 2002, 2003. Mai: DENIS, 1933b, 1936, 1965c, 1967e; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1952b, 1964b; EMERIT & al., 1997; GROS, 1983a; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002; LESSERT, 1910; SIMON, 1878a. Veillon, 1997. Août: LUCAS, 1870d, 1878a. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1953b; LUCAS, 1875.

##### *Anyphaena alboirrorata* Simon, 1878

*A. conspersa* [mâle].

**Taxonomie.** SIMON, 1878a décrit *A. conspersa* et la cite des Alpes-Maritimes et du Var. Les femelles sont des *A. sabina* et les mâles sont des *A. alboirrorata*, selon ROEWER, 1954. Il n'est donc pas possible de répartir ces citations entre les deux espèces. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1878a, 1932; SOYER, 1963. Hérault: EMERIT & al., 1985. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1932. Var: SIMON, 1878a, 1932. — Espagne, Italie, Portugal. **Altitude.** Jusqu'à 600 m (DENIS, 1933b). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Cupule de gland; feuille sèche roulée: DENIS, 1933b. Forêt de chênes-verts; forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Garrigue: SOYER, 1963. **Période.** — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

##### *Anyphaena numida* Simon, 1897

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1932. — Espagne, Algérie, Portugal. **Altitude.** 1000 m (DENIS, 1933b). **Habitat.** Sous une pierre: DENIS, 1933b. **Période.** — *Femelle.* Janvier, février: DENIS, 1933b.

##### *Anyphaena sabina* L. Koch, 1866

*A. conspersa* [femelle].

**Taxonomie.** Voir la note sous *A. alboirrorata*. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1878a, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1878a. Var: BECKER, 1880; BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1933a, 1934a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie, Europe du Sud, Russie, Géorgie, Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Forêt de chênes et châtaigniers: LEDOUX & al., 2003. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Garrigue: SOYER, 1963. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis, frondaisons: KOVOOR & al., 2000. Sous une pierre: CORNIC, 1978. Taillis de

chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Avril, mai: DENIS, 1933b, 1934a. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1933b; KRAUS, 1955; LEDOUX & al., 2003. Mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juin, juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1934a.

## LIOCRANIDAE

*Agraecina lineata* (Simon, 1878)*Agroeca l.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1932. Corse: ROEWER, 1926 (*A. l.*); SIMON, 1878a (*A. l.*), 1932. Loire-Atlantique, Morbihan: SIMON, 1932. — Belgique, Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Bord d'étang; marais salant: SIMON, 1932. **Période.** — *Mâle*. Juin: SIMON, 1932. — *Femelle*. Mars: ROEWER, 1926.

*Agraecina striata* (Kulczynski, 1881)

*Agroeca gracilior*; *Agroeca s.*; *Agroecina s.*; *Lio-cranoeca s.*

**Taxonomie.** L'espèce *Agraecina striata* (Kulczynski, 1881) a été transférée dans le nouveau genre *Lio-cranoeca* par WUNDERLICH, 1999. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône, Gard: LEDOUX, 2000. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: MARC, 1990a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*L. s.*). Savoie: HEIDT & al., 1998. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*A. g.*), 1910 (*Agroeca s.*); SIMON, 1932. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989 (*Agroecina s.*). Vaucluse: LEDOUX, 1972, 1973b, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse (*L. s.*). Europe, Russie (*L. s.*). **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910; SIMON, 1932). **Habitat.** Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de fleuve, sous-bois: LEDOUX, 1973b. Bord de l'eau, sous des pierres: SIMON, 1932. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Bord de rivière, sous-bois, sous les débris végétaux: LEDOUX, 1972. Bord de ruisseau: VEILLON, 1997. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Ripisilve, litière: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX, 2000. Mai: VEILLON, 1997. Juin: LEDOUX, 1972. — *Femelle*. Avril, mai: LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX, 1972, 2000; LESSERT, 1910. Juillet: LEDOUX, 2000.

*Agroeca annulipes* Simon, 1878

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a, 1932. — Espagne. Algérie, Maroc.

*Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)

*Agelena b.*; *A. haglundii*; *Philoica linotina*.

**Répartition.** Aude: SIMON, 1878a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*P. l.*), 1870e (*A. b.*). Cantal: SIMON, 1878a. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: JUBERTHIE, 1954; LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899 (*A. h.*), 1909b, 1932. Gers: LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b. Morbihan: MARC, 1990a. Nord: GOULLIART, 1980. Orne: MARC, 1990a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin

(Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1873a; SIMON, 1878a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1888a. — Presque toute la France froide tempérée et montagnaise: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; GOULLIART, 1980. Bois, mousses et sous les pierres: SIMON, 1878a, 1878a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Champ en friche: LUCAS, 1878b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888a. Forêt de chênes, sous des pierres: LE PERU, 2004. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, mousses: SIMON, 1932. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Jardin, sous un tas de bois: LE PERU, 2004. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. **Période.** — *Mâle*. Avril, juin: VEILLON, 1997. Août: LUCAS, 1870d, 1878b. Novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Février: LE PERU, 2004. Août: LUCAS, 1870d, 1878b. Novembre: LE PERU, 2004.

*Agroeca cuprea* Menge, 1873

*A. chrysea*; *A. pullata*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aude: SIMON, 1878a (*A. c.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a (*A. c.*); SIMON, 1878a (*A. c.*). Isère: DENIS, 1934d (*A. p.*); SIMON, 1878a (*A. c.*). Morbihan: MARC, 1990a. Oise, Puy-de-Dôme: SIMON, 1878a (*A. c.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*A. p.*); LEDOUX & al., 1996a, 2003 (*A. p.*). "Seine": SIMON, 1878a (*A. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*A. c.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989 (*A. p.*); SIMON, 1878a (*A. c.*). Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*A. c.*); SIMON, 1878a (*A. c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*A. p.*). Vendée: DENIS, 1964b, 1965c (*A. p.*). — Toute la France: SIMON, 1932 (*A. p.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 720 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Bois de pins, mousses: SIMON, 1878a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Coteaux calcaires, sous les pierres: SIMON, 1932. Dune; forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, clairière, dans les herbes couchées: DENIS, 1965c. Friche: LEDOUX & al., 2003. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mousses: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1932. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1933b. Février: DENIS, 1965c. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Février: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1933b, 1964b. Mai: DENIS, 1933b, 1965c. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: CORNIC, 1978. Septembre: LEDOUX & al., 1996a. Novembre: DENIS, 1934d; LEDOUX & al., 1996a, 2003.

*Agroeca inopina* O. P.-Cambridge, 1886

[Selon SIMON, 1932, les citations de *A. proxima* par SIMON, 1878a pourraient en partie se rapporter à *A. inopina*. Ainsi les citations de *A. proxima* des départements de l'Aveyron, du Gers et du Lot-et-Garonne ne sont pas reprises par SIMON, 1932 et pourraient

concerner *A. inopina*]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a. Aveyron: SIMON, 1932. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corse: SIMON, 1932. Côtes-d'Armor: MARC, 1990a. Drôme, Gers: SIMON, 1932. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Loiret: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot-et-Garonne: SIMON, 1932. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1943c; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. — Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Europe, Algérie. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Coquilles vides d'*Helix*: GUIBÉ, 1943. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1965c. Dune, oyats et mousses: DENIS, 1964b. Forêt: SIMON, 1932. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Friche: VEILLON, 1997. Litière; mousses humides: DENIS, 1943c. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: CORNIC, 1978; DENIS, 1963c. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Septembre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b. Février: DENIS, 1965c; EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1933b. Avril: DENIS, 1943c. Juin: CORNIC, 1978. Septembre: EMERIT & al., 1999. Octobre: DENIS, 1963c; LEDOUX & al., 2002. Novembre: DENIS, 1965c. Décembre: DENIS, 1964b; GUIBÉ, 1943.

*Agroeca lusatica* (L. Koch, 1875)

**Répartition.** Aude, Cantal: SIMON, 1932. Manche: MARC, 1990a; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: MARC, 1990a. "Seine": SIMON, 1932. Var: DENIS, 1933c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. De l'Europe au Kazakhstan. **Habitat.** Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. **Période.** — *Femelle*. Juin: SIMON, 1932.

*Agroeca proxima* (O. P.-Cambridge, 1871)

[Selon SIMON, 1932, les citations de *A. proxima* par SIMON, 1878a pourraient en partie se rapporter à *A. inopina*. Ainsi les citations des départements de l'Aveyron, du Gers et du Lot-et-Garonne ne sont pas reprises par SIMON, 1932 et pourraient concerner *A. inopina*]. **Répartition.** Aube: SIMON, 1878a, 1932. Aveyron: SIMON, 1878a. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1878a, 1932. Côtes-d'Armor: MARC, 1990a; SIMON, 1932. Dordogne, Drôme, Eure: SIMON, 1932. Finistère: MARC, 1990a; SIMON, 1932. Gers: SIMON, 1878a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; MARC, 1990a. Jura, Landes: SIMON, 1932. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: SIMON, 1878a, 1932. Morbihan: MARC, 1990a; SIMON, 1878a, 1932. Orne: MARC, 1990a. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": SIMON, 1878a, 1932. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a, 1932. Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989; SIMON, 1898b, 1932. Somme: SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espa-

gne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989. Forêt, mousses: SIMON, 1932. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle*. Septembre: SIMON, 1932. — *Femelle*. Août: LEDOUX & al., 1996b.

*Apostenus fuscus* Westring, 1851

**Répartition.** Ain: SIMON, 1932. Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1932. Aube: SIMON, 1878a, 1932. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Drôme: SIMON, 1932. Eure: SIMON, 1899, 1909b, 1932. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Isère: SIMON, 1878a, 1932. Jura: SIMON, 1932. Marne, Pas-de-Calais: SIMON, 1932. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1932. "Seine": SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois, mousses et sous les pierres: SIMON, 1878a. Éboulis calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt, mousses: SIMON, 1932. Litière et mousses: EMERIT & al., 1997. Sous une pierre: LESSERT, 1904. **Période.** — *Femelle*. Mars: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1957a; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: EMERIT & al., 1997.

*Apostenus humilis* Simon, 1932

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1932. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt, détritiques et à la base des plantes: SIMON, 1932. **Période.** — *Femelle*. Mars, mai, décembre: DENIS, 1933b.

*Cybaeodes madidus* Simon, 1914

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Détritiques: SIMON, 1914.

*Cybaeodes testaceus* Simon, 1878

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1878a, 1914. — Connue seulement de Corse. **Habitat.** Forêt de *Pinus laricio*, mousses: SIMON, 1914.

*Liocranoeca* (voir *Agraeacina*)

*Liocranum apertum* Denis, 1960

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1330 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Paroi rocheuse suintante, mousses épaisses: DENIS, 1960a. **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1960a.

*Liocranum concolor* Simon, 1878

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1878a, 1932. — Connue seulement de Corse. **Altitude.** De 1200 m jusqu'à 1500 m (KRAUS, 1955). **Période.** — *Femelle*. Septembre: KRAUS, 1955.

*Liocranum ruplicola* (Walckenaer, 1830)

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1878a, 1932; TIBERGHEN & al., 1993a. Eure: SIMON, 1878a. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880a. Gironde: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Jura: SIMON, 1932. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: MARC, 1990a. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1878a. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a; SIMON, 1878a. Savoie (Haute-): DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. "Seine": SIMON, 1878a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a. Somme: ROSELLE, 1888a. Var: SIMON, 1898c. Vosges: SIMON, 1932. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (CANARD, 1989). **Habitat.** Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt, sous les écorces des chênes, des châtaigniers et des hêtres: SIMON, 1932. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Grotte: DRESKO & al., 1968; HUBERT, 1964a. Haie: LENICE, 1992. Lieu humide: TIBERGHEN & al., 1993a. Sous les écorces: DENIS, 1933b. Sous les écorces de châtaigniers: SIMON, 1898c. Sous les écorces des vieux arbres: SIMON, 1878a. Sous une pierre: DENIS, 1933b; SIMON, 1878a. Taillis de chênes, sous les écorces ou les pierres: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1933b. Avril: DENIS, 1933b; DRESKO & al., 1968. Mai: SIMON, 1878a. — *Femelle*. Février: DENIS, 1933b. Avril: KRAUS, 1955. Mai: DENIS, 1933b; SIMON, 1878a. — *Femelle avec cocoon*. Juillet: SIMON, 1878a.

*Liocranum rutilans* (Thorell, 1875)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1878a, 1932. Jura, Lozère: SIMON, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a, 1898b, 1932. Var: SIMON, 1898c. — Allemagne, Italie, Suisse. De l'Europe à la Géorgie. **Habitat.** Bord de rivière, sur le sable sec, sous les galets ou entre les racines des saules: SIMON, 1878a. Forêt: SIMON, 1932. Forêt, sous les écorces des vieux arbres: SIMON, 1878a. Sous les écorces de châtaigniers: SIMON, 1898c. **Période.** — *Mâle*. Août: SIMON, 1932. — *Femelle*. Juillet: MÜLLER, 1985.

*Liocranum segmentatum* Simon, 1878

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a, 1932. — Italie.

*Mesiotelus mauritanicus* Simon, 1909

**Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d; GERHARDT, 1930; LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1932. — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie. Méditerranée. **Habitat.** Bois pourri de micocoulier: DENIS, 1967d. Forêt de pins et de chênes-lièges, sous des pierres: GERHARDT, 1930. Prairie: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1933b, 1967d. Mai: DENIS, 1933b. Novembre: LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mars, mai, décembre: DENIS, 1933b.

*Mesiotelus tenuissimus* (L. Koch, 1866)

*Liocranum spinulosum*; *Liocranum tenuissimum*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*L. t.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: SIMON, 1878a (*L. t.*), 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d; SIMON, 1878a (*L. t.*). Var: DENIS, 1935b; SIMON, 1878a (*L. s.*), 1878a (*L. t.*), 1898c. Vaucluse: SIMON, 1878a (*L. t.*). — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie. Europe, Afrique du Nord, Turkménistan. **Habitat.** Bâtiments, murs; lieux chauds et secs, sous les pierres: SOYER, 1963. Pentas arides, sous les pierres: SIMON, 1878a, 1932. **Période.** — *Mâle*. Février, septembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Février, mars: DENIS, 1967d. Mai, décembre: DENIS, 1933b.

*Scotina celans* (Blackwall, 1841)

*Agroeca c.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1878a (*A. c.*). Alpes (Hautes-): MÜLLER, 1985. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1967d. Aube, Aveyron: SIMON, 1878a (*A. c.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1932. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a. Gard: EMERIT & al., 1994. Gironde: LUCANTE, 1880a (*A. c.*); SIMON, 1878a (*A. c.*). Hérault: SIMON, 1878a (*A. c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; MARC, 1990a, 1990b. Isère: SIMON, 1878a (*A. c.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*A. c.*); SIMON, 1878a (*A. c.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: MARC, 1990a. Oise: SIMON, 1878a (*A. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1878a (*A. c.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a (*A. c.*), 1898b. Var: FAGE, 1931; SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Algérie, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bois, mousses: SIMON, 1878a, 1932. Dune: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1999a. Éboulis calcaire, sous des pierres: LE PERU, 2004. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-verts; forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Garrigue, litière: SOYER, 1963. Grotte: FAGE, 1931. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Litière: LEDOUX & al., 1996a. Litière et mousses: EMERIT & al., 1997. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Mousses: LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1909b. Mousses humides: MÜLLER, 1985. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Ripisilve: EMERIT & al., 1994. Taillis de chênes, litière: SOYER, 1963. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOS-

MANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: LEDOUX & al., 1996a. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: DENIS, 1962b. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mars: DENIS, 1963c, 1967d; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a; LEDOUX & al., 1999a. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1997; MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1962b. Novembre: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1933b, 1964b.

*Scotina gracilipes* (Blackwall, 1859)

*Agroeca g.*

[SIMON, 1932 indique: «Je ne distingue pas sûrement la femelle de celle de *S. paillardii*»]. **Répartition.** Aube: SIMON, 1878a (A. g.). Eure: SIMON, 1909b. Gironde: LUCANTE, 1880a (A. g.); SIMON, 1878a (A. g.). Morbihan: MARC, 1990a. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (A. g.). Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (A. g.); SIMON, 1878a (A. g.). [SIMON, 1932 indique: «France, sans localité précise un individu mêlé à nos *S. paillardii*»]. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois de conifères, mousses: SIMON, 1878a. Mousses: SIMON, 1909b.

*Scotina palliardii* (L. Koch, 1881)

*S. paillardii*.

**Répartition.** Aude: SIMON, 1932 (*S. p.*). Côtes-d'Armor: MARC, 1990a (*S. p.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Finistère: MARC, 1990a (*S. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979 (*S. p.*), 1980 (*S. p.*), 1982b (*S. p.*); MARC, 1990a (*S. p.*). Meuse: GRIMM, 1986. Morbihan: MARC, 1990a (*S. p.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*S. p.*); LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932 (*S. p.*). Seine, Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne: SIMON, 1932 (*S. p.*). — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois de conifères, mousses: SIMON, 1932. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980, 1982b. Lande à genêts; pelouse à *Brachypodium*; sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Avril: LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a.

CLUBIONIDAE

*Cheiracanthium angulitarse* Simon, 1878

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a, 1932. — Espagne, Italie. Europe.

*Cheiracanthium elegans* Thorell, 1875

*C. letochae*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a (C. l.), 1932. Charente: SIMON, 1932. Cher: DENIS, 1943b. Dordogne: LEDOUX & al., 1996a. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (C. l.); SIMON, 1878a (C. l.), 1932. Isère: SIMON, 1878a (C. l.), 1932. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (C. l.); SIMON, 1932. Morbihan: MARC, 1990a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al.,

1996a. Rhône: SIMON, 1932. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (C. l.), 1932. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1947b, 1963c, 1964b. Vosges: SIMON, 1878a (C. l.), 1932. — Espagne, Italie. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Bois: DENIS, 1943b. Forêt: DENIS, 1947b; SIMON, 1932. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c. Sous les écorces: SIMON, 1878a. Sous une pierre: LUCAS, 1882a. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1943b, 1947b; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1878a, 1932. Juillet: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1943b; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1963c. Août: DENIS, 1963c; LUCAS, 1882a; SIMON, 1932. Septembre: CLARK & al., 1970. Décembre: SIMON, 1878a. — *Femelle avec ses jeunes*. Août: DENIS, 1963c.

*Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)

*C. erroneum*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Cantal: SIMON, 1878a (C. e.). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Finistère: DENIS, 1939a, 1940a. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880a (C. e.). Gers: LUCANTE, 1880a (C. e.); SIMON, 1878a (C. e.). Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1878a (C. e.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": PLANET, 1905; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a (C. e.). Somme, Vaucluse: SIMON, 1878a (C. e.). — Toute la France: SIMON, 1932. Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Formation à *Cistus albidus*: SOYER, 1963. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Graminées: PLANET, 1905. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse: SCHALLER, 2000. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse sèche: SOYER, 1963. Prairie: SIMON, 1878a, 1932. Ronces: DENIS, 1939a. Sur une graminée: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle*. Avril: LESSERT, 1910. Mai: SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1933b; SIMON, 1878a, 1878a. — *Femelle*. Avril: LESSERT, 1910. Mai: SIMON, 1878a. Juin: SIMON, 1878a, 1878a. Juillet: DENIS, 1940a. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1939a; SIMON, 1878a.

*Cheiracanthium fulvotestaceum* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a, 1932. Ardèche: SIMON, 1932. Corse: ROEWER, 1926. Var: GROS, 1983a. — Italie. **Période.** — *Mâle*. Mars: ROEWER, 1926. Juin: SIMON, 1932. — *Femelle*. Juillet: GROS, 1983a.

*Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881; SIMON, 1878a. Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Hérault: EMERIT & al., 1985; SIMON, 1878a. Landes: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Loire-Atlantique: SIMON, 1932. Lot-et-Garonne: LUCANTE,

1880a; SIMON, 1878a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1932. Morbihan: MARC, 1990a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; SIMON, 1878a. Rhône: SIMON, 1932. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie. Holarctique, Argentine. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970. Bois: DENIS, 1941. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Buissons et haies: SIMON, 1932. Feuilles de houx: DENIS, 1941. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962d. Forêt, chênes-verts: DENIS, 1964b. Garrigue: SOYER, 1963. Haie: BRAUD & al., 2005. Haies sèches: SIMON, 1878a. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; DENIS, 1962b, 1962d, 1963c. Marais salant: SIMON, 1932. Marécage: BELIN, 2001. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1934a. Sous les écorces et les pierres: DENIS, 1933b. Sous une pierre: DENIS, 1941. Sur un mur: DENIS, 1965c. Taillis de chênes: SOYER, 1963. Terrains cultivés: KOVOOR & al., 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1934a, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1941; SIMON, 1878a, 1932. Juillet: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Janvier, février: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a; LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b; SIMON, 1878a, 1932. Août: DENIS, 1962d. Septembre: CLARK & al., 1970. Novembre: DENIS, 1962b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941. Août: DENIS, 1964b.

#### *Cheiracanthium montanum* L. Koch, 1877

##### *C. pennyi* [err.].

[Cette espèce est citée par LESSERT, 1910 avec un point d'interrogation. SIMON, 1932 indique: «jusqu'ici étrangère à la France»]. **Répartition.** Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 [*C. pennyi*, err. selon LESSERT, 1910], 1910. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bruyères: LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle.* Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Juin: LESSERT, 1904, 1910.

#### *Cheiracanthium pelagicum* (C. L. Koch, 1837)

##### *C. abbreviatum.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881; SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1878a, 1932. Gironde: LUCANTE, 1880a (*C. a.*); SIMON, 1878a (*C. a.*), 1932. Landes: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1878a. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a, 1898c. Vaucluse: SIMON, 1878a. — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Buissons et hautes herbes: SIMON, 1932. Dune, sous une touffe d'*Helichrysum stechas*: SIMON, 1878a. Pelouses sèches à *Brachypodium*: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Avril: SIMON, 1878a. Mai: DENIS, 1934a. Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle avec*

*cocon.* Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle avec ses jeunes.* Mai: DENIS, 1934a.

#### *Cheiracanthium pennatum* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Morbihan: MARC, 1990a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Espagne, Italie. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b, 1934a. — *Femelle.* Juillet: CORNIC, 1978.

#### *Cheiracanthium pennyi* O. P.-Cambridge, 1873

[SIMON, 1932 note: «*C. pennyi* Cambr. que je ne séparais pas autrefois de *C. erraticum*, n'en est peut-être qu'une forme locale»]. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Finistère: DENIS, 1940a. Ille-et-Vilaine, Morbihan, Orne, Vendée: MARC, 1990a. [La citation de Haute-Savoie par LESSERT, 1904 est erronée selon LESSERT, 1910, et se rapporte à *C. montanum*]. — Toute la France: SIMON, 1932. Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Paléarctique. [SIMON, 1932 indique: «Beaucoup plus rare que *C. erraticum*»]. **Habitat.** Feuilles de roseaux roulées: DENIS, 1940a. Pelouse sèche; taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1938a, 1940a.

#### *Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789)

##### *C. nutrix.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: LUCAS, 1874c (*C. n.*). Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1932. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Garonne (Haute-): JUBERTHIE, 1954. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MARC, 1990a. Orne: GUIBÉ, 1946. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; SCHALLER, 2000. "Seine": LUCAS, 1873b (*C. n.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1240 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire, panicauts: VEILLON, 1997. Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois, clairière: SIMON, 1878a, 1932. Bord de route, graminées: LUCAS, 1873b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: SIMON, 1878a, 1932. Haie: SIMON, 1878a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Panicauts: VEILLON, 1997. Pelouse: SCHALLER, 2000. **Période.** — *Mâle.* Juin: SIMON, 1878a. Juillet: DENIS, 1964b. Août: DENIS, 1964b; VEILLON, 1997. Septembre: CLARK & al., 1970. — *Femelle.* Juin: SIMON, 1878a. Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1964b, 1967d; VEILLON, 1997. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b. — *Femelle avec cocon.* Août: SIMON, 1878a, 1932. Septembre: DENIS, 1962b, 1964b; SIMON, 1878a, 1932.

*Cheiracanthium salsicola* Simon, 1932

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1932. — Connue seulement de France. **Habitat.** Plage, Salsolacées: SIMON, 1932.

*Cheiracanthium seidlitzi* L. Koch, 1864*C. seidlitzi*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Ardèche: SIMON, 1932 (C. s.). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963 (C. s.). Corse: SIMON, 1878a (C. s.), 1932 (C. s.). Gard: LEDOUX & al., 1996a (C. s.). Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (C. s.). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (C. s.). Seine-et-Marne: SIMON, 1932 (C. s.). Var: BIGOT & al., 1987a (C. s.), 1987b (C. s.), 1988 (C. s.); DENIS, 1937a (C. s.); KOVOOR & al., 2000 (C. s.); SIMON, 1878a (C. s.), 1932 (C. s.). — Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat.** Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Pelouses hautes à *Brachypodium*: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1937d.

*Cheiracanthium striolatum* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: SIMON, 1878a. Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995. Var: DENIS, 1933a; SIMON, 1878a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962d, 1965c. — France méridionale et occidentale jusqu'en Bretagne: SIMON, 1932. Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Arrière-dune, oyats: CLARK & al., 1970. Associations à *Cistus albidus* et *Erica multiflora*: SOYER, 1963. Dune: DENIS, 1965c. Dune, oyats: CLARK & al., 1970. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt, sur un pin: DENIS, 1962d. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Plantes basses: SIMON, 1878a. Sous une pierre: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Février: DENIS, 1933b. Avril: DENIS, 1933b, 1962d. Juin: DENIS, 1933b, 1965c. Septembre: CLARK & al., 1970. — *Femelle avec cocon*. Avril: SIMON, 1878a. Mai: DENIS, 1933b.

*Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833)*C. candidum*; *C. lapidicolens*.

**Répartition.** Aube, Aude: SIMON, 1878a (C. l.). Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal, Eure-et-Loire: SIMON, 1878a (C. l.). Gironde: CAUSSANEL, 1970. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Indre-et-Loire: SIMON, 1878a (C. l.). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (C. l.); PIONNEAU, 1911 (C. l.). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (C. l.); SIMON, 1878a (C. l.). Morbihan: MARC, 1990a; SIMON, 1878a (C. l.). Oise: SIMON, 1878a (C. l.). Orne: MARC, 1990a. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880a (C. l.); SIMON, 1878a (C. l.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; SIMON, 1878a (C. c.). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (C. l.). Rhin (Haut-): LESSERT, 1910 (C. l.); MULLER & al., 1895 (C. l.). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (C. l.). "Seine": SIMON, 1878a (C. l.). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (C. l.); SIMON, 1878a (C.

l.). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (C. l.). Somme: SIMON, 1878a (C. l.). Vaucluse: SIMON, 1878a (C. c.). Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1932. Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Plage, bois échoués: CAUSSANEL, 1970. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Sous une pierre: LUCAS, 1882a; SIMON, 1878a, 1932. **Période.** — *Mâle*. Juin: LESSERT, 1910. — *Femelle*. Août: LUCAS, 1882a. Novembre: DENIS, 1962b. — *Femelle avec cocon*. Mai: SIMON, 1878a.

*Clubiona brevipes* Blackwall, 1841*C. fuscula*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (C. f.), 1874c. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lozère: DENIS, 1939b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1943c; LEDOUX & al., 1999a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; GROS, 1983a; LUCAS, 1875. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1891. Var: BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1935b; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1965c; MARC, 1990a. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a, 1941; LUCAS, 1875. Bord de rivière, *Populeum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Buissons: SIMON, 1932. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: CLARK & al., 1970; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1963c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Haie: BRAUD & al., 2005; ROSELLE, 1891. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Marécage: EMERIT & al., 2003. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, chênes: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1965c, 1967e; EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a, 1939b, 1941; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1878a. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Février: DENIS, 1933b. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Mai: LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1941; EMERIT & al., 1997, 1999; GROS, 1983a; LEDOUX, 2000. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1963c. Août: DENIS,



1963c; LUCAS, 1870d. Septembre: CLARK & al., 1970; LUCAS, 1875. Octobre: LEDOUX & al., 2002.

***Clubiona caeruleascens* L. Koch, 1867**

**Répartition.** Ain, Aube, Cantal: SIMON, 1878a. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a. Garonne (Haute-), Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Isère, Oise, Orne: SIMON, 1878a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Seine, Seine-et-Marne, Somme, Var, Vienne (Haute-): SIMON, 1878a. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois: SIMON, 1878a. Forêt de chênes, de hêtres et de charmes: SIMON, 1932. Marécage: BELIN, 2001. Prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Août: LE PERU, 2004. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1878a.

***Clubiona comta* C. L. Koch, 1839**

*C. compta.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (C. c.). Ariège: DENIS, 1960a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (C. c.); SOYER, 1963 (C. c.). Calvados: GUIBÉ, 1946 (C. c.). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955 (C. c.). Doubs: DRESKO, 1962 (C. c.); EMERIT & al., 1997 (C. c.). Eure: EMERIT & al., 2003 (C. c.); LANCELEVÉE, 1884 (C. c.); SIMON, 1899, 1909b (C. c.). Finistère: DENIS, 1938a (C. c.). Hérault: EMERIT & al., 1985 (C. c.). Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a (C. c.). Jura: DRESKO, 1962 (C. c.). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (C. c.); LEDOUX & al., 1999b (C. c.). Loire-Atlantique: DENIS, 1967e (C. c.); PIONNEAU, 1911 (C. c.). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: DENIS, 1938a (C. c.); MARC, 1990a (C. c.). Nord: EMERIT & al., 1999 (C. c.). Orne: MARC, 1990a (C. c.). Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (C. c.); EMERIT & al., 1999 (C. c.). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (C. c.). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b (C. c.). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (C. c.); DENIS, 1933b (C. c.); LEDOUX & al., 1995 (C. c.), 1996a (C. c.), 1999a (C. c.), 2003 (C. c.). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c (C. c.); LESSERT, 1904 (C. c.), 1910 (C. c.). "Seine": CHRISTOPHE, 1974 (C. c.); CHRISTOPHE & al., 1977 (C. c.); COCQUEMOT & al., 1991 (C. c.); ROLLARD, 2000 (C. c.). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (C. c.). Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989 (C. c.); DOIGNON, 1976 (C. c.). Var: SIMON, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000 (C. c.). Vendée: DENIS, 1941 (C. c.), 1962b, 1963c, 1964b (C. c.), 1965c (C. c.); DUFFEY, 1964 (C. c.). — Toute la France: SIMON, 1932 (C. c.). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de rivière, *Populeum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Buis et houx: DENIS, 1933b. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Détrit: SIMON, 1878a, 1932. Détrit

humides: DENIS, 1965c. Dune: DENIS, 1965c; DUFFEY, 1964. Dune, *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Fagots: SIMON, 1878a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1964b; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c, 1965c. Forêt de pins, litière très sèche: DENIS, 1963c. Forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Forêt, mousses, clairière: DOIGNON, 1976. Garrigue: SOYER, 1963. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Grotte: DRESKO, 1962. Haie: BRAUD & al., 2005. Litière: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Maison: DENIS, 1965c. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Mousses: SIMON, 1878a, 1932. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996c. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Ripisilve; ripisilve, litière: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: DENIS, 1933b. Sous-bois, sur un noisetier: VEILLON, 1997. Taillis de chênes: SOYER, 1963. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1953b. Avril: DENIS, 1962b; DRESKO, 1962; KRAUS, 1955; LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1878a. Mai: DENIS, 1933b, 1965c; DRESKO, 1962; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1962b; EMERIT & al., 1997. — *Femelle.* Février: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2003; LESSERT, 1904, 1910. Mai: DENIS, 1933b, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1962b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a; LESSERT, 1904. Juillet: DENIS, 1963c; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1963c; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1997, 2003. Novembre: DENIS, 1962b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1964b.

***Clubiona corticalis* (Walckenaer, 1802)**

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Eure: SIMON, 1909b. Gers: LUCANTE, 1880a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Landes: LUCANTE, 1880a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: MARC, 1990a. Nord: DENIS, 1950d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1943c. Rhin (Haut-): LÉPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. "Seine": LUCAS, 1875. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1891. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b; MARC, 1990a. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Maison: DENIS, 1950d; ROSELLE, 1891. Sous des écorces de cerisiers: LANCELEVÉE, 1884. Sous les écorces: SIMON, 1878a. Sous les écorces d'oliviers: DENIS, 1933b. Sous les écorces de saules et de peupliers: LUCAS, 1878a. Sous les écorces des vieux arbres: SIMON, 1932. Sous une pierre: CORNIC, 1978. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1878a. Juin: CORNIC, 1978. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1878a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. Juillet: CORNIC, 1978. Août:

LUCAS, 1878a. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1878a.

*Clubiona diniensis* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a, 1932. Aude: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1932. — Espagne, Italie, Portugal. **Habitat.** Garrigue; taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1933b.

*Clubiona diversa* O. P.-Cambridge, 1862

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Aube: SIMON, 1878a, 1878a, 1932. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Cantal: SIMON, 1878a, 1932. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Côtes-d'Armor: MARC, 1990a. Drôme, Eure: SIMON, 1932. Finistère: MARC, 1990a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; MARC, 1990a, 1990b. Isère: SIMON, 1878a. Jura: SIMON, 1932. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Lozère: SIMON, 1932. Morbihan, Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b; VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1951c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhône: SIMON, 1932. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": SIMON, 1878a, 1932. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a. Var: SIMON, 1898c. Vienne (Haute-): SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2380 m (DENIS, 1951c). **Habitat.** Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères, mousses: SIMON, 1932. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Friche: PASQUET & al., 1992. Friches, sous les pierres et dans les détritiques secs: SIMON, 1878a. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Litière de hêtres: DENIS, 1948b. Marécage: BELIN, 2001. Mousses: GUIBÉ, 1943. Prairie: LEDOUX & al., 1996c; PASQUET & al., 1992. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996b. Sous une pierre: DENIS, 1951c. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle*. Février: EMERIT & al., 1999. Mars: SIMON, 1878a, 1932. Avril: SIMON, 1878a. Mai: SIMON, 1878a, 1932. Juillet: DENIS, 1948b. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1878a. Octobre: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1878a, 1932. Novembre: GUIBÉ, 1943. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999. Mars: GUIBÉ, 1943; SIMON, 1878a. Avril, mai: SIMON, 1878a. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1951c; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; SIMON, 1878a. Octobre: EMERIT & al., 1999; SIMON, 1878a, 1932.

*Clubiona frutetorum* L. Koch, 1867

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a, 1932. Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Lozère: SIMON, 1932. Nord: DENIS, 1943a. Oise: SIMON, 1932. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1932. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; SIMON, 1932. Rhône, Seine-

et-Marne: SIMON, 1932. Var: DENIS, 1933a, 1933c. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Bord de rivière: LEDOUX & al., 1999a. Forêt: SIMON, 1932. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1933c. Mai: DENIS, 1937d; SIMON, 1878a. Juin: SIMON, 1878a, 1932. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1937d; LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a. Juin: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1878a, 1932. Août: LESSERT, 1910.

*Clubiona genevensis* L. Koch, 1866

*C. decora*; *C. stigmatica*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932. Ardèche: SIMON, 1932. Aube: SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; SOYER, 1963. Côtes-d'Armor: MARC, 1990a. Drôme: SIMON, 1932. Finistère: DENIS, 1940a. Gers: LUCANTE, 1880a (*C. s.*); SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932. Landes: BRISTOWE, 1928 (*C. d.*). Loire-Atlantique: SIMON, 1932. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: MARC, 1990a; MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhône: SIMON, 1932. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*C. d.*), 1910 (*C. d.*); SIMON, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Var: BIGOT, 1983; BIGOT & al., 1987a, 1987b; KOVOOR & al., 2000; PONEL, 1983; PONEL & al., 1993. Vaucluse: SIMON, 1932. Vendée: DENIS, 1941, 1962d, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bord de rivière: SIMON, 1932. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DUFFEY, 1964; PONEL, 1983. Dune, oyats: DENIS, 1964b, 1965c. Dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Dune, sous les tamaris: DENIS, 1965c. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Friches chaudes et sèches, sous les pierres et des détritiques végétaux: SIMON, 1878a. Herbes rares sous *Tamarix anglica*: DENIS, 1962d. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Lande à genêts, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996a. Littoral, zone halophile à salicorne: SOYER, 1963. Marais salant: SIMON, 1932. Marécage salé: BIGOT, 1965. Plage, oyats: DENIS, 1964b. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre: DENIS, 1940a; LESSERT, 1904. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1964b. Avril: BRISTOWE, 1928. Septembre: DENIS, 1962d. Octobre: SIMON, 1932. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Avril: LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1910. Mai: DENIS, 1965c; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1941, 1964b; LESSERT, 1910. Août: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: SIMON, 1932. Novembre: LEDOUX & al., 2003. Décembre: LESSERT, 1910. — *Femelle avec cocon*. Avril à juin: LESSERT, 1904. Juillet: DENIS, 1940a.

*Clubiona germanica* Thorell, 1871

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1878a, 1932. Garonne (Haute-): DENIS, 1939b. Landes: SIMON, 1932. Nord: DENIS, 1934c; EMERIT & al., 1999. Oise, Orne: SIMON, 1878a, 1932. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910;

MULLER & *al.*, 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. "Seine": SIMON, 1878a, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Somme: SIMON, 1878a, 1932. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Dune; forêt: SIMON, 1878a, 1932. Genêts: DENIS, 1933b. Lande, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Marécage: SIMON, 1932. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1878a. Juillet: SIMON, 1932. Août: DENIS, 1934c; SIMON, 1878a, 1932. Septembre: DENIS, 1939b. — *Femelle.* Février: EMERIT & *al.*, 1999. Mai: SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996c. Août: DENIS, 1934c; SIMON, 1878a. — *Femelle avec cocon.* Mai: SIMON, 1878a.

#### *Clubiona hilaris* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Corse: KRAUS, 1955. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; SIMON, 1932. — Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 1900 m (LEDOUX & *al.*, 1996b). **Habitat.** Aulnes, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Éboulis: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêts alpêtres: SIMON, 1932. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Août: LEDOUX & *al.*, 1996b. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996c. — *Femelle.* Avril: KRAUS, 1955. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996c.

#### *Clubiona juvenis* Simon, 1878

**Répartition.** Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Morbihan: MARC, 1990a. Nord: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1999a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1999a. "Seine": SIMON, 1878a, 1932. Somme: ROSELLE, 1891; SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Marécage: HENRY, 1981; ROSELLE, 1891; SIMON, 1932. Phragmitaie: LEDOUX & *al.*, 1999a. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1999a; SIMON, 1878a. **Période.** — *Femelle.* Octobre: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX & *al.*, 1999a.

#### *Clubiona kulczynskii* Lessert, 1905

**Taxonomie.** Le nom *Clubiona abdita* est utilisé dans le catalogue de CANARD & *al.*, 1997. La synonymie *Clubiona abdita* L. Koch, 1876 = *C. kulczynski* Lessert, 1905 est établie par THALER, 1981. PLATNICK, 2004 fait ce commentaire: « younger name can be conserved under ICZN Art. 79B ». **Répartition.** Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c; SIMON, 1932. — Allemagne, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Mélèzes: LEDOUX & *al.*, 1996c. **Période.** — *Mâle.* Août: LEDOUX & *al.*, 1996c.

#### *Clubiona leucaspis* Simon, 1932

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Var: BIGOT, 1993; BIGOT & *al.*, 1987a; DENIS, 1933a; KOVOOR & *al.*, 2000. Vendée: DENIS, 1962d. — Allemagne, Espagne, Italie. Algérie. **Habitat.** Bord de plage, sur un olivier: KOVOOR & *al.*, 2000. Buissons bas: SIMON, 1932. Dune: MURPHY, 1994. Forêt de chê-

nes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962d. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Garrigue: SOYER, 1963. Lieux secs, herbes, mousses, détritiques: SIMON, 1932. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Sous les écorces: SIMON, 1932. Taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle.* Mars: SIMON, 1932. Avril: DENIS, 1962d. Mai: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b.

#### *Clubiona lutescens* Westring, 1851

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Aube: SIMON, 1878a. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1878a. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a. Finistère: DENIS, 1938a. Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Marne: SIMON, 1878a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: EMERIT & *al.*, 1999. Oise: SIMON, 1878a, 1887a. Orne: SIMON, 1878a. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a. Somme: SIMON, 1878a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Presque toute la France sauf la région méditerranéenne: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord de rivière: LEDOUX & *al.*, 2002. Bétulaie, au sol: EMERIT & *al.*, 2003. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Friche buissonneuse: ASSELIN & *al.*, 1989. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marécage: EMERIT & *al.*, 2003; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. Tourbière: EMERIT & *al.*, 1999. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & *al.*, 2002; LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & *al.*, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1878a. Juillet: LEDOUX, 2000. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002. — *Femelle.* Février: EMERIT & *al.*, 1999. Avril: LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & *al.*, 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002; SIMON, 1878a. Juillet: LEDOUX, 2000. Septembre: EMERIT & *al.*, 1999, 2003. Octobre: EMERIT & *al.*, 1999. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1938a.

#### *Clubiona marmorata* L. Koch, 1866

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Seine-et-Marne, Vienne: SIMON, 1878a, 1932. — Allemagne, Italie. Europe. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1932.

#### *Clubiona neglecta* O. P.-Cambridge, 1862

[Selon SIMON, 1932, cette espèce a été partiellement confondue avec *C. similis*, sous le nom *C. neglecta*, par SIMON, 1878a]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Ariège: DENIS, 1961b. Aube, Aude: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c. Cantal: SIMON, 1878a. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1878a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Ille-et-

Vilaine: MARC, 1990a. Isère: SIMON, 1878a. Landes: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Loire-Atlantique: SIMON, 1932. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; LUCAS, 1878b; SIMON, 1878a. Morbihan: MARC, 1990a. Oise, Orne: SIMON, 1878a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: SIMON, 1878a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1878a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a. Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a. Somme: ROSELLE, 1891. Var: SIMON, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1850 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: DENIS, 1938a; LEDOUX, 2000. Bord de canal: DENIS, 1964b. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b. Bord de torrent, sous des pierres: SIMON, 1878a. Buis et genêts: DENIS, 1933b. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins, clairière, dans les hautes herbes: DENIS, 1965c. Forêt de pins, clairière, dans les herbes couchées: DENIS, 1964b. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Haie; lieux humides: SIMON, 1878a. Littoral, zone halophile à salicorne: SOYER, 1963. Pelouse: BERLAND, 1924. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Prairie: LEDOUX & al., 2002, 2003. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre: DENIS, 1933b; LUCAS, 1878b. Sur un genévrier: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Avril: LESSERT, 1910. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1933b, 1964b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; SIMON, 1932; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b. — *Femelle.* Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Août: LUCAS, 1878b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b. Août: SIMON, 1878a.

*Clubiona pallidula* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Nord: GOULLIART, 1980. Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": CHRISTOPHE, 1974. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Habitat.** Arrière-

dune: DENIS, 1964b. Bois: GOULLIART, 1980; SIMON, 1878a, 1932. Bord de ruisseau: VEILLON, 1997. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Haie: GOULLIART, 1980. Jardin: GOULLIART, 1980; SIMON, 1878a, 1932. Marécage: BELIN, 2001. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous des écorces de cerisiers: LANCELEVÉE, 1884. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999.

*Clubiona phragmitis* C. L. Koch, 1843

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: ROEWER, 1926; SIMON, 1878a, 1932. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884. Finistère: MARC, 1990a. Garonne (Haute-): MARPLES, 1935. Gers: LUCANTE, 1880a. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; MARC, 1990a. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: MARC, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1980. Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1910. "Seine": LUCAS, 1876. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b. Vienne: DUREPAIRE & al., 1994. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1876. Bord d'étang: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Bord de l'eau, roseaux secs: LANCELEVÉE, 1884. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, roseaux: GOULLIART, 1980. Dune: SOYER, 1963. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Fossé, roseaux: DENIS, 1962b. Friche: LEBORGNE & al., 1998. Lande humide: DUREPAIRE & al., 1994. Lieux humides: SIMON, 1878a, 1932. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999, 2003; HENRY, 1981; MARPLES, 1935; SIMON, 1878a, 1932; VILLEPOUX, 1990b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février: EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a. Avril: LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: EMERIT & al., 1999. Novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1952a. Février: EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1938a. Avril: LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910; ROEWER, 1926. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1999, 2003. Octobre: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002; LUCAS, 1876.

*Clubiona pseudoneglecta* Wunderlich, 1994

**Répartition.** Lot-et-Garonne: MERRETT, 2001. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. De

l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** 150 m (MERRETT, 2001). **Habitat.** Forêt de chênes: MERRETT, 2001. **Période.** — *Femelle.* Août: MERRETT, 2001.

*Clubiona reclusa* O. P.-Cambridge, 1863

*C. grisea.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1878a. Ariège: DENIS, 1961b. Aube: SIMON, 1878a, 1878a (*C. g.*). Aude: SIMON, 1878a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1878a (*C. g.*). Cantal: SIMON, 1878a. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; MARC, 1990a. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; MARC, 1990a. Gers: SIMON, 1878a. Gironde: LUCANTE, 1880a (*C. g.*); SIMON, 1878a (*C. g.*). Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Isère: SIMON, 1878a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Marne (Haute-): SIMON, 1878a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1952b. Oise: SIMON, 1878a. Orne: MARC, 1990a; SIMON, 1878a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004; VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1878a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1910. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a, 1878a (*C. g.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884, 1884 (*C. g.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a. Somme: ROSELLE, 1887; SIMON, 1878a, 1878a (*C. g.*). Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1870 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1957a, 1960a; SIMON, 1932. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de l'eau: SIMON, 1878a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Forêt: DENIS, 1952b, 1961b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, bord de mare: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Joncs: DENIS, 1962b. Marécage: DENIS, 1938a; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a; VILLEPOUX, 1990b. Mélèzes: LEDOUX & al., 1996b. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2002; PASQUET & al., 1992; ROSELLE, 1887. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: SIMON, 1878a, 1932. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Rhododendrons, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1940a; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2002; LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1952b; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre: DENIS, 1962b. — *Femelle avec cocon.* Mai: SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1952b; SIMON, 1878a. Juillet: DENIS, 1940a, 1960a, 1961b; SIMON, 1878a. Août: DENIS, 1957a.

*Clubiona rosserae* Locket, 1953

**Répartition.** Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. — Grande-Bretagne. Paléarctique. **Habitat.** Marécage: MURPHY, 1994.

*Clubiona saxatilis* L. Koch, 1866

*C. caeruleascens saxatilis.*

[Considérée comme une variété de *C. caeruleascens* par SIMON, 1932 qui lui donne comme caractère: «Céphalothorax sans ligne marginale» et qui ajoute: «La ligne noire marginale manque normalement aux spécimens du Jura et des Alpes françaises qui répondent le mieux à la forme *saxatilis* L. Koch, mais certains en offrent des traces et ce caractère seul n'aurait pas une valeur subsppécifique»]. **Répartition.** Jura et Alpes: SIMON, 1932 (*C. c. s.*). Europe. [Citée d'Autriche: BLICK & al., 2002]. **Habitat.** Buissons de conifères: SIMON, 1932.

*Clubiona similis* L. Koch, 1867

[Selon SIMON, 1932, cette espèce a été partiellement confondue avec *C. neglecta* par SIMON, 1878a]. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Aude: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c. Côtes-d'Armor, Finistère: DENIS, 1938a. Lozère: SIMON, 1932. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946. Pas-de-Calais: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932. Rhône: SIMON, 1932. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Somme: SIMON, 1932. Var: DENIS, 1935b. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2270 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Dune: SIMON, 1932. Friche: VEILLON, 1997. Grève: GUIBÉ, 1946. Haie: BRAUD & al., 2005. Marais saumâtre: DENIS, 1950c. Plage: SIMON, 1932. Prairie: LEDOUX & al., 1996a. Sous une écorce de platane: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1950c; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. Août: DENIS, 1952c. — *Femelle.* Mai: VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1933b, 1938a; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. Août: DENIS, 1952c. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Août: DENIS, 1952c.

*Clubiona stagnatilis* Kulczynski, 1897

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Côtes-d'Armor: MARC, 1990a; SALMON, 1959. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère: MARC, 1990a. Gironde: DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Isère: SIMON, 1932. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Morbihan: MARC, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord, Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1932. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (VILLEPOUX, 1990a). **Habitat.** Bois humides: SIMON, 1932. Estuaire, au niveau du *Puccinellietum* et

de l'*Agropyretum*: SALMON, 1959. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Marécage: DENIS, 1952a; EMERIT & al., 1999, 2003; SIMON, 1932; VILLEPOUX, 1990b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période**. — *Mâle*. Janvier, février: DENIS, 1952a. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999. Septembre, novembre: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1952a. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1999; VEILLON, 1997. Septembre, novembre: EMERIT & al., 2003.

*Clubiona subsultans* Thorell, 1875

*C. erratica*.

**Répartition**. Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Aube: SIMON, 1878a (*C. e.*). Cantal: SIMON, 1878a (*C. e.*), 1932. Corrèze: SIMON, 1932. Gers: LUCANTE, 1880a (*C. e.*); SIMON, 1878a (*C. e.*). Jura: SIMON, 1932. Landes: LUCANTE, 1880a (*C. e.*); SIMON, 1878a (*C. e.*). Loire, Lozère: SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat**. Bois de conifères: SIMON, 1878a. Forêt de conifères: SIMON, 1932. **Période**. — *Mâle*. Août: SIMON, 1878a. Septembre, octobre: SIMON, 1932. — *Femelle*. Août: SIMON, 1878a. Octobre: SIMON, 1932.

*Clubiona subtilis* L. Koch, 1867

**Répartition**. Ain: SIMON, 1878a; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1932. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Gironde: DENIS, 1951b, 1952a; LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise: SIMON, 1878a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1878a. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a, 1898b. Somme: SIMON, 1878a. Vendée: CLARK & al., 1970. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). **Habitat**. Bord de rivière, sable: SIMON, 1932. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & al., 1970. Marais, détritus: SIMON, 1932. Marécage: EMERIT & al., 1999; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Sous une pierre: DENIS, 1950b. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période**. — *Mâle*. Février: EMERIT & al., 1999. Mars: DENIS, 1952a. Avril: CLARK & al., 1970; LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1878a. Mai: LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1999. Août: LE PERU, 2004. Septembre: DENIS, 1951b. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999. Avril: CLARK & al., 1970; LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1878a. Mai: LE PERU, 2004. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 2002. Septembre: DENIS, 1951b; EMERIT & al., 1999. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b.

*Clubiona terrestris* Westring, 1851

**Répartition**. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1878a. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Côtes-d'Armor: MARC, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a; MARC, 1990a. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Isère: SIMON, 1878a. Landes: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: JUBERTHIE, 1954. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: GUIBÉ, 1946; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: MARC, 1990a; SIMON, 1878a. Oise, Orne: SIMON, 1878a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004; SIMON, 1878a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a; SIMON, 1878a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977; COCQUEMPOT & al., 1991; DRESKO, 1947c; LUCAS, 1876; ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a, 1898b. Somme: SIMON, 1878a. Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1964b. Yonne: DRESKO, 1950. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe. **Altitude**. Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat**. Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: DENIS, 1938a, 1941; LUCAS, 1876. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière: DRESKO, 1950. Carrière, sous un tas de pierres calcaires: DRESKO, 1947c. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de feuillus, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, chênes-verts; forêt de pins, litière; forêt de pins, mousses très humides: DENIS, 1964b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche buissonneuse: ASSELIN & al., 1989. Haie; haie, litière: BRAUD & al., 2005. Herbes sèches: DENIS, 1962b. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Litière sèche: SIMON, 1932. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Maison: LE PERU, 2004. Marécage: BELIN, 2001. Phragmitaie: LEDOUX & al., 1999a. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a; BRAUD & al., 2005. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, litière; ripisilve, pelouse: LEDOUX, 2000. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période**. — *Mâle*. Janvier: LEDOUX, 2000. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1964b; EMERIT & al., 1997;

LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: CLARK & al., 1970; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1967d; LEDOUX, 2000. Avril: DENIS, 1964b; DRESKO, 1947c; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1964b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002. Juillet: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: DENIS, 1962b; DRESKO, 1950; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 2002; LUCAS, 1876. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1941.

***Clubiona trivialis*** C. L. Koch, 1843

**Répartition.** Ardèche: SIMON, 1932. Finistère, Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Jura, Lozère: SIMON, 1932. Morbihan, Orne: MARC, 1990a. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOD & al., 1989; SIMON, 1878a, 1932. Vienne (Haute-), Vosges: SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (VILLEPOUX, 1990a). **Habitat.** Bruyères: SIMON, 1878a. Champ de céréales: COCQUEMPOD & al., 1989. Forêt, herbes, mousses: SIMON, 1932. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1878a. Août: SIMON, 1932. Septembre: SIMON, 1878a, 1932. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1878a. Septembre: SIMON, 1878a, 1932.

***Clubiona vegeta*** Simon, 1918

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Charente-Maritime: SIMON, 1874d. Corse: SIMON, 1932. Gard: EMERIT & al., 1994. Gironde: DENIS, 1952a. Loire-Atlantique: MARC, 1990a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b. "Seine": SIMON, 1932. Var: DENIS, 1934a. Vendée: DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964. — Tout le centre et le sud de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie, Suisse. Europe, Asie Centrale, Afrique du Nord, Canaries. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962d. Dune: DENIS, 1962b, 1965c; DUFFEY, 1964. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Dune, oyats: DENIS, 1963c. Estuaire, sous des joncs: DENIS, 1952a. Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1963. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Sable, sous les tamaris: DENIS, 1963c. Sous une pierre: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c. Mars: DENIS, 1952a. Mai: DENIS, 1933b. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1962b. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962d. Mai: DENIS, 1933b, 1934a. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1933b. Juin: DENIS, 1964b.

CORINNIDAE

***Ceto laticeps*** (Canestrini, 1868)

*C. unicolor*; *Cetonana l.*

**Taxonomie.** Le genre *Ceto* est appelé *Cetonana* par certains auteurs. Il est utile de reproduire le commentaire fait par BONNET, 1956 à ce sujet: «*Cetonana* a

été créé par Strand pour remplacer *Ceto* Simon, 1874, préoccupé par un Échinoderme... Puisque Simon s'est servi par inadvertance de ce terme en 1874 pour désigner une Araignée et que nul ne s'est douté de cette homonymie, il était inutile, sinon absurde dans ce cas, de venir changer ce nom en 1929, par une application trop stricte de l'article 34». **Répartition.** Corse: SIMON, 1874a (*C. u.*), 1878a (*C. u.*), 1932. Dordogne, Eure: SIMON, 1932. Gers: LUCANTE, 1880a (*C. u.*); SIMON, 1878a (*C. u.*), 1932. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a, 1990b. Isère: DENIS, 1934d. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*C. l.*). Oise: SIMON, 1932. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d (*C. l.*). "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a (*C. u.*), 1932. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*C. u.*); SIMON, 1878a (*C. u.*), 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse (*C. l.*). Europe (*C. l.*). **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Écorces de châtaigniers et de chênes: SIMON, 1932. Forêt: LEDOUX & al., 1999b. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, sous les écorces de vieux chênes: SIMON, 1878a. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Sous les écorces des chênes-lièges: SIMON, 1874a. Sous une écorce de saule: DENIS, 1934d. **Période.** — *Mâle*. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Mai: LEDOUX & al., 1999b. Juillet: CORNIC, 1978. Novembre: DENIS, 1934d.

***Phrurolithus corsicus*** (Simon, 1878)

*Micariosoma corsicum*.

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*M. c.*), 1932. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. — Espagne. De la Corse à la Roumanie. **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995.

***Phrurolithus festivus*** (C. L. Koch, 1835)

*Micariosoma festivum*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; VILLEPOUX, 1990b. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; MARC, 1990a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; GRIMM, 1986; LANCELEVÉE, 1884 (*M. f.*); SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a; MARC, 1990a. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924; KERVILLE, 1900 (*M. f.*); LUCAS, 1878b. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: MARC, 1990a. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1952b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie: HEIDT & al., 1998. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*M. f.*); SIMON, 1898b (*M. f.*). Var: BECKER, 1880 (*M. f.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; MARC, 1990a. Vosges: GRIMM, 1986. Yonne: LUCAS, 1872. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT &



*al.*, 1997. Aulnaie : LEDOUX & *al.*, 1999a. Bois : DENIS, 1959d. Bois calcicole de hêtres : EMERIT & *al.*, 1999. Bois de chênes, litière : EMERIT & *al.*, 1997. Bois, litière : BRAUD & *al.*, 2005. Bord d'étang : DENIS, 1938a. Bord de mer, sous une pierre : KERVILLE, 1900. Bord de rivière, graviers : HEIDT & *al.*, 1998. Bord de rivière, *Populetum albae* : LEDOUX & *al.*, 1999a. Bétulaie, au sol : EMERIT & *al.*, 2003. Cour caillouteuse : BERLAND, 1924. Détritrus : SIMON, 1878a. Dune : DENIS, 1962b. Éboulis : GRIMM, 1986. Forêt : DENIS, 1952b. Forêt de chênes : BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de pins : DENIS, 1964b. Forêt de pins, herbes et litière : DENIS, 1962b. Forêt, litière : DENIS, 1963c. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Friche : LEBORNE & *al.*, 1998 ; PASQUET & *al.*, 1992 ; SIMON, 1878a. Haie, litière : BRAUD & *al.*, 2005. Jardin : GRIMM, 1986 ; LE PERU, 2004 ; LUCAS, 1878a. Lieux cultivés ; lieux humides ; lieux secs : SIMON, 1878a. Marécage : DENIS, 1938a ; VILLEPOUX, 1990b. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Pâturage : LEBORNE & *al.*, 1998. Ripisilve, forêt claire et pelouse : LEDOUX, 2000. Sous une pierre : DENIS, 1950b ; LUCAS, 1872, 1874c, 1878b ; SIMON, 1878a. Sur la boue sèche, herbes : DENIS, 1965c. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & *al.*, 1992. Terrain vague : BOSMANS & *al.*, 1985a. **Période.** — *Mâle*. Avril : KRAUS, 1955 ; LEDOUX, 2000. Mai : DENIS, 1933b, 1965c ; EMERIT & *al.*, 2003 ; GRIMM, 1986 ; LESSERT, 1910. Juin : DENIS, 1933b, 1952b, 1962b ; EMERIT & *al.*, 1997 ; LEDOUX & *al.*, 1999a ; LESSERT, 1910 ; SIMON, 1878a. Juillet : DENIS, 1938a. Août : LUCAS, 1878a, 1878b. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1933b ; EMERIT & *al.*, 2003 ; GRIMM, 1986 ; LE PERU, 2004 ; LESSERT, 1910. Juin : DENIS, 1933b, 1938a, 1962b, 1964b ; EMERIT & *al.*, 1997, 1999 ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & *al.*, 1999a ; LESSERT, 1910 ; SIMON, 1878a. Juillet : DENIS, 1939a, 1950b, 1959d, 1960a. Août : LUCAS, 1878a, 1878b. Septembre : EMERIT & *al.*, 1997.

### *Phrurolithus flavitarsis* (Lucas, 1846)

*Liophrurillus f.* ; *Micariosoma flavitarse*.

**Taxonomie.** L'espèce *Phrurolithus flavitarsis* (Lucas, 1846) a été transférée dans le nouveau genre monospécifique *Liophrurillus* par WUNDERLICH, 1991. **Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & *al.*, 1992. Aude : BONARIC, 1974. Bouches-du-Rhône : BIGOT & *al.*, 1973, 1983 ; DENIS, 1954b ; KABOUCHE & *al.*, 1997 ; SOYER, 1963. Corse : CANARD, 1989 ; KRAUS, 1955 ; SCHARFF, 1894 (*M. f.*) ; SIMON, 1878a (*M. f.*), 1932. Gard : EMERIT & *al.*, 1994. Hérault : BONARIC, 1974 ; EMERIT & *al.*, 1985, 1990. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b, 1960a ; TAMBS-LYCHE, 1957. Var : BECKER, 1882 (*M. f.*) ; BIGOT & *al.*, 1979 ; DENIS, 1933a, 1935b, 1937a ; KOVOOR & *al.*, 2000 ; PONEL & *al.*, 1993 ; SIMON, 1898c (*M. f.*). Vaucluse : CHANSIGAUD, 1992 ; LEDOUX, 2000. — Midi de la France : SIMON, 1932. Italie. Europe, Madère, Afrique du Nord (*L. f.*). **Altitude.** Jusqu'à 460 m (KABOUCHE & *al.*, 1997). **Habitat.** Bois de chênes-lièges : TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & *al.*, 1985. Forêt de pins : CANARD, 1989. Garrigue calcaire : EMERIT & *al.*, 1990. Garrigue sèche : BONARIC, 1974. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & *al.*, 1973. Garrigue, litière : SOYER, 1963. Lieux assez humides, sous des pierres : KOVOOR & *al.*, 2000. Lieux secs et arides, sous les pierres : SIMON,

1878a. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins : EMERIT & *al.*, 1994. Marais saumâtre : DENIS, 1954b. Pelouse, sous des pierres : SOYER, 1963. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus* : KABOUCHE & *al.*, 1997. Ripisilve ; ripisilve, sous des pierres et litière : LEDOUX, 2000. Sous une pierre : CHANSIGAUD, 1992. Taillis de chênes, litière : SOYER, 1963. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & *al.*, 1992. Zone caillouteuse sèche à végétation rase : BIGOT & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle*. Mars : BONARIC, 1974. Mai : DENIS, 1933b ; TAMBS-LYCHE, 1957. — *Femelle*. Mars : BONARIC, 1974. Mai : DENIS, 1933b. Juillet, novembre : BONARIC, 1974.

### *Phrurolithus minimus* C. L. Koch, 1839

*Micariosoma minimum*.

**Répartition.** Ain : HEIDT & *al.*, 1998. Ariège : DENIS, 1961b, 1967d. Calvados : ASSELIN & *al.*, 1989. Corrèze : LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & *al.*, 1997. Eure : SIMON, 1899 (*M. m.*), 1909b. Gironde : DENIS, 1952a. Ille-et-Vilaine : MARC, 1990a. Loir-et-Cher : LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret : LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & *al.*, 2005 ; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne : MARC, 1990a. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1960a. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b, 1961b ; LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*M. m.*). Seine-et-Marne : COCQUEMOT & *al.*, 1989 ; DOIGNON, 1976 (*M. m.*). Somme : SUEUR, 1993. Vendée : DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b. — Toute la France : SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois : DENIS, 1938a, 1959d. Bois de chênes : EMERIT & *al.*, 1997. Bois, lisière : DENIS, 1959d. Bois, mousses : SIMON, 1909b. Bois, mousses et litière sèche : SIMON, 1878a. Bord de rivière, graviers : HEIDT & *al.*, 1998. Champ de céréales : COCQUEMOT & *al.*, 1989. Dune : DENIS, 1941. Dune, sous des pierres : DENIS, 1963c. Forêt : DENIS, 1961b. Forêt de pins, litière : DENIS, 1962b. Forêt, clairière humide, à proximité de fourmières : DENIS, 1961b. Forêt, litière et mousses humides ; forêt, litière très sèche : DENIS, 1964b. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Forêt, sous un tronc d'arbre : DENIS, 1964b. Friche : VEILLON, 1997. Jardin : LE PERU, 2004. Marécage : DENIS, 1952a ; SIMON, 1878a. Prairie : SIMON, 1878a. Près d'une fourmière de *Messor barbarus* : DENIS, 1941. Ripisilve : LEDOUX & *al.*, 2002. Sous une pierre : EMERIT & *al.*, 1997. Sous une pierre recouvrant une fourmière : DENIS, 1960a. **Période.** — *Mâle*. Avril : LEDOUX & *al.*, 2002. Mai : LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin : DENIS, 1938a ; EMERIT & *al.*, 1997. Juillet : DENIS, 1959d. — *Femelle*. Avril : DENIS, 1962b. Juin : DENIS, 1941, 1964b ; EMERIT & *al.*, 1997 ; LE PERU, 2004. Juillet : DENIS, 1959d, 1960a, 1961b, 1963c ; LE PERU, 2004. Octobre : DENIS, 1967d.

### *Phrurolithus nigrinus* (Simon, 1878)

*Micariosoma nigrinum*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BECKER, 1882 (*M. n.*). Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a (*M. n.*). Ariège : DENIS, 1961b. Aube : SIMON, 1878a (*M. n.*).



Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Charente-Maritime, Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1878a (*M. n.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Morbihan: SIMON, 1878a (*M. n.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*M. n.*). Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1898c (*M. n.*). Vaucluse: SIMON, 1878a (*M. n.*). — Presque toute la France: SIMON, 1932. Espagne, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2070 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Bord de ruisseau; bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marais salant: MURPHY, 1994. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: LEDOUX & al., 1999a, 2003. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1961b. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juin: EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Juillet: DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 1996a. ^

*Trachelas minor* O. P.-Cambridge, 1872

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a, 1932. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1932. Corse: SIMON, 1878a, 1932. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Gironde: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a. Var: DENIS, 1935a; SIMON, 1878a, 1932. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Azerbaïdjan, Afrique de l'Ouest. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Broussailles: CHANSIGAUD & al., 1994. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. Ripisilve, pelouse: LEDOUX, 2000. Rivières, grèves sablonneuses: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1933b. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994. Juillet: LEDOUX, 2000. Octobre: DENIS, 1935a; LEDOUX & al., 1999a.

*Trachelas rayi* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Aube: SIMON, 1878a, 1932. Aude: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; SIMON, 1878a, 1932; SOYER, 1963. Drôme, Gard: SIMON, 1932. Hérault: EMERIT & al., 1990; SIMON, 1878a, 1932. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1999a. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a, 1932. Var: DENIS, 1935a; SIMON, 1932. Vaucluse: SIMON, 1878a, 1932. — Espagne, Italie. **Habitat.** Arrière-dune; dune: LEDOUX & al., 1999a. Friches chaudes: SIMON, 1878a. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Pelouse: SOYER, 1963. Pentes cultivées en vignes: SIMON, 1878a. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Septembre, octobre: SIMON, 1878a. — *Femelle.* Septembre: SIMON, 1878a. Octobre: DENIS, 1935a; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1878a.

ZODARIIDAE

Les espèces du genre *Zodarium* présentent des difficultés de détermination, en particulier dans le groupe *italicum* incluant *Z. italicum*, *Z. gallicum*, *Z. ludibundum*, *Z. nigriceps*, *Z. remotum*, *Z. soror*. Les espèces *Z. gallicum* et *Z. italicum* ont souvent été confondues. Ainsi SIMON, 1914 note: « Je ne trouve aucun caractère constant pour séparer les mâles des *Z. italicum* et *gallicum* », et BOSMANS, 1997 remarque: « Recent figures of *Z. gallicum* in Heimer & Nentwig (1991), Pesarini (1993) and Roberts (1995) all concern *Z. italicum* ».

BOSMANS, 1997, critiquant sévèrement les travaux de DENIS (1933c, 1935c, 1937f), fait une mise au point complète sur les *Zodarium* d'Europe centrale et de l'ouest. Les conclusions présentées dans cet important travail ont été suivies pour les corrections apportées à la répartition des espèces mal identifiées par plusieurs auteurs.

L'espèce *Z. germanicum* ne semble pas présente en France. BOSMANS, 1997 indique: « Simon's (1873) citations of juvenile specimens from the Alpes Maritimes are probably incorrect, as he did not repeat this locality in 1914 ». Elle est exclue de la liste.

*Selamia reticulata* (Simon, 1870)

*Storena r.*

**Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1914 (*S. r.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*S. r.*), 1967d (*S. r.*); SIMON, 1874a, 1914 (*S. r.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Sous une pierre: SIMON, 1874a, 1914. **Période.** — *Mâle.* Janvier, mai: DENIS, 1933b. Septembre: DENIS, 1967d. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Janvier, mai, décembre: DENIS, 1933b.

*Zodarium couseransense* Bosmans, 1997

**Répartition.** Ariège: BOSMANS, 1997. — Connue seulement de France. **Période.** — *Mâle.* Juin: BOSMANS, 1997.

*Zodarium elegans* (Simon, 1873)

*Enyo e.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1874a (*E. e.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*E. e.*), 1914. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1977; BOSMANS, 1997; DENIS, 1950c, 1954b; SOYER, 1953a. Corse: BOSMANS, 1997; DENIS, 1937e; GERHARDT, 1928; KRAUS, 1955; SIMON, 1874a (*E. e.*), 1914. Gard, Hérault: BOSMANS, 1997. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 1995. Var: BOSMANS, 1997; DENIS, 1934a, 1937e; SIMON, 1898c. Vaucluse: BOSMANS, 1997; SIMON, 1914. — Région méditerranéenne jusque dans les Basses-Alpes: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Europe du Sud, Afrique du Nord. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1954b. Bord de plage: BIGOT & al., 1977. Dune: DENIS, 1950c. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Fourmillières du genre *Atta* [sic]: SIMON, 1874a. Marais saumâtre: DENIS, 1954b. Marécage salé: BIGOT, 1965. Pelouse: SOYER, 1953a. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. *Therobrachypodion*: BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle.* Mai: BOSMANS, 1997; DENIS, 1950c. Juin, août, septembre: BOSMANS, 1997. — *Femelle.* Avril: BOS-

MANS, 1997; DENIS, 1933b, 1967d. Mai, septembre, novembre: BOSMANS, 1997.

*Zodarion emarginatum* (Simon, 1873)

*Enyo emarginata*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Corse: BOSMANS, 1997; CANARD, 1989; SIMON, 1874a (*E. e.*), 1914. — Grèce. **Habitat.** Détritrus d'inondation: SIMON, 1874a. Plage, sous les plantes: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Septembre: CANARD, 1989.

*Zodarion fulvonigrum* (Simon, 1874)

*Enyo fulvonigra*; *Enyo nigrofuscus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*E. n.*); SIMON, 1874a (*E. f.*), 1914. — Espagne.

*Zodarion fuscum* (Simon, 1870)

*Enyo fusca*.

**Répartition.** Gironde: SIMON, 1914. Landes: BOSMANS, 1994; SIMON, 1914. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a (*E. f.*); SIMON, 1878d (*E. f.*), 1914. — Espagne, Grande-Bretagne. **Habitat.** Bruyères: BOSMANS, 1994. **Période.** — *Mâle*. Avril: SIMON, 1914. Juillet: BOSMANS, 1994. — *Femelle*. Avril: SIMON, 1914.

*Zodarion gallicum* (Simon, 1873)

*Enyo gallica*; *Z. simoni* [err.]; *Z. soror* [err.].

[Cette espèce a été confondue avec *Z. italicum*. Les citations par DENIS, 1939a, 1941, 1943a, LUCAS, 1878b, SIMON, 1874a, 1914 se rapportent à *Z. italicum*, selon BOSMANS, 1997]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: BOSMANS, 1997. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: LUCAS, 1874c (*E. g.*). Charente-Maritime: BOSMANS, 1997. Corse: BOSMANS, 1997; DENIS, 1935c [*Z. simoni*, identification erronée selon BOSMANS, 1997], 1935c [*Z. soror*, identification erronée selon BOSMANS, 1997], 1937e; SIMON, 1914. Garonne (Haute-): BOSMANS, 1997. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a (*E. g.*). Hérault: EMERIT & al., 1985. Landes: LUCANTE, 1880a (*E. g.*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*E. g.*). Manche: GUIBÉ, 1946. Nord: DENIS, 1939b, 1943a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1937e, 1943c. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": DENIS, 1937e; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Var: KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1962b; DUFFEY, 1964; YSNEL, 1990a. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Italie. Balkans. **Altitude.** Jusqu'à 890 m (BOSMANS, 1997). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Dune: DUFFEY, 1964. Forêt de chênes-lièges, litière: BOSMANS, 1997. Forêt, fourmière: DOIGNON, 1976. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Lieux sablonneux, sous des pierres: LUCAS, 1882a. Maquis: BOSMANS, 1997. Marais saumâtre: DENIS, 1954b. Près des fourmières: SIMON, 1914. Sous une pierre: LESSERT, 1904; LUCAS, 1874c. **Période.** — *Mâle*. Mai: BOSMANS, 1997; DENIS, 1943a; LESSERT, 1904, 1910. Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Mai: BOSMANS, 1997; LESSERT, 1904, 1910. Juin: LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1962b. Août: LUCAS, 1882a. Septembre, octobre: DENIS, 1962b.

*Zodarion gracilitibiale* Denis, 1933

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Var: DENIS, 1933c. — Connue seulement de France. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1933c.

*Zodarion italicum* (Canestrini, 1868)

*Enyo gallica* [err.]; *Enyo italica*; *Z. gallicum* [err.]. [Cette espèce a été confondue avec *Z. gallicum*. BOSMANS, 1997 indique: «Recent figures of *Z. gallicum* in Heimer & Nentwig (1991), Pesarini (1993) and ROBERTS (1995) all concern *Z. italicum* »]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1874a (*E. i.*), 1914. Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1874a (*E. i.*), 1914. Ardèche, Ariège: BOSMANS, 1997. Bouches-du-Rhône: BOSMANS, 1997; SIMON, 1914. Calvados: SIMON, 1874a [*Enyo gallica*, err.]. Charente-Maritime: SIMON, 1876b [*Enyo gallica*, err. selon BOSMANS, 1997]. Corrèze: BOSMANS, 1997; LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1874a (*E. i.*), 1914. Dordogne: BOSMANS, 1997. Finistère: DENIS, 1939a [*Z. gallicum*, err. selon BOSMANS, 1997]. Gard, Hérault: BOSMANS, 1997. Isère: SIMON, 1874a [*Enyo gallica*, err.]. Landes: BOSMANS, 1997; SIMON, 1874a [*Enyo gallica*, err.]. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Lozère: DENIS, 1939b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b [*Enyo gallica*, err. selon BOSMANS, 1997]; PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: MURPHY, 1994; YSNEL, 1990a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Puy-de-Dôme, Savoie (Haute-): BOSMANS, 1997. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1874a [*Enyo gallica*, err.]. Var: DENIS, 1937b [*Z. gallicum*, err. selon BOSMANS, 1997]. Vaucluse: BOSMANS, 1997; CHANSIGAUD, 1992; LEDOUX, 2000; SIMON, 1874a (*E. i.*), 1914. Vendée: DENIS, 1941 [*Z. gallicum*, err. selon BOSMANS, 1997], 1946b, 1947b, 1959c, 1963c, 1964b; DUFFEY, 1964. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1941. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune: DUFFEY, 1964. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1947b. Forêt claire, pelouse: LEDOUX, 2000. Forêt de pins: DENIS, 1963c. Forêt, litière: LEDOUX, 2000. Friche: VEILLON, 1997. Haie: SIMON, 1874a. Jardin, sur un mur: LE PERU, 2004. Lieux sablonneux et secs: SIMON, 1874a. Litière de pins; mousses: DENIS, 1946b. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Plage, sur le sable: DENIS, 1964b. Près d'une fourmière de *Messor barbarus*: DENIS, 1941. Près des fourmières: SIMON, 1874a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sable, herbes sèches: DENIS, 1963c. Sous une pierre: LUCAS, 1878b. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. **Période.** — *Mâle*. Février: BOSMANS, 1997. Avril: BOSMANS, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Mai: BONTE, 2000; BOSMANS, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: BOSMANS, 1997; DENIS, 1939b, 1941, 1959c; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Juillet: BOSMANS, 1997; DENIS, 1939a. Août: DENIS, 1946b; LUCAS, 1878b. Septembre: BOSMANS, 1997. Octobre: BOSMANS, 1997; DENIS, 1963c. Novembre: BOSMANS, 1997. — *Femelle*. Mars, avril: BOSMANS, 1997. Mai: BONTE, 2000; BOSMANS, 1997; LE PERU, 2004. Juin: BOSMANS, 1997; DENIS, 1939b, 1941, 1947b, 1964b; LEDOUX, 2000. Juillet: BOSMANS, 1997; DENIS, 1939a,

1939b. Août: DENIS, 1946b; LUCAS, 1878b. Septembre: DENIS, 1946b; MÜLLER, 1985. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: BOSMANS, 1997; LEDOUX, 2000.

*Zodarion ludibundum* Simon, 1914

**Taxonomie.** La synonymie *Z. simoni* Denis, 1935 = *Z. ludibundum* est établie par BOSMANS, 1997. **Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1914. [La citation de Corse sous le nom *Z. simoni* par DENIS, 1935c est erronée selon BOSMANS, 1997, et se rapporte à *Z. gallicum*]. — Italie. Algérie.

*Zodarion marginiceps* Simon, 1914

*Z. monticola.*

**Taxonomie.** La synonymie *Z. monticola* Denis, 1950 = *Z. marginiceps* est établie par BOSMANS, 1994. **Répartition.** Hérault: EMERIT & al., 1990. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*Z. m.*), 1955c (*Z. m.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1937e, 1943c; SIMON, 1914. [La citation des Pyrénées-Orientales par DENIS, 1933b est erronée selon DENIS, 1943c, et se rapporte à *Z. berlandi* (= *Z. pseudoelegans*)]. — Espagne. **Altitude.** De 1710 m (DENIS, 1955c) jusqu'à 1900 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1950b, 1955c.

*Zodarion nigriceps* (Simon, 1873)

*Enyo n.*

**Répartition.** Corse: BOSMANS, 1997; DENIS, 1937e; SIMON, 1874a (*E. n.*), 1914. — Connue seulement de Corse et de Sardaigne. **Altitude.** 20 m (BOSMANS, 1997). **Habitat.** Près des fourmillières: SIMON, 1874a. **Période.** — *Mâle.* Mai: BOSMANS, 1997.

*Zodarion pseudoelegans* Denis, 1933

*Z. berlandi*; *Z. marginiceps* [err.].

**Taxonomie.** La synonymie *Z. berlandi* DENIS, 1933 = *Z. pseudoelegans* est établie par BOSMANS, 1994. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b [*Z. marginiceps*, err. selon DENIS, 1943c], 1935c (*Z. b.*), 1943c (*Z. b.*); SOYER, 1965 (*Z. b.*). — Espagne. Ibiza. **Habitat.** Bois de chênes-lièges; garrigue: SOYER, 1965. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1933b.

*Zodarion pusio* Simon, 1914

[SIMON, 1914 note sous *Z. pusio*: «Je ne suis pas absolument certain que le mâle et la femelle décrits ci-dessus appartiennent bien à la même espèce»]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Corse: DENIS, 1937e. Hérault: BOSMANS, 1997. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1914. Var: KOVOOR & al., 2000. — Italie. Balkans, Tunisie. **Altitude.** 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Dune: BOSMANS, 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: BOSMANS, 1997. — *Femelle.* Avril: BOSMANS, 1997.

*Zodarion remotum* Denis, 1935

**Répartition.** Corse: DENIS, 1935c, 1937e. — Italie.

*Zodarion rubidum* Simon, 1914

**Répartition.** Ardennes: BOSMANS, 1994. Ardèche: BOSMANS, 1997; RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1961b. Charente-Maritime: BOSMANS, 1994. Gard, Hérault: SIMON, 1914. Loire-Atlantique: BOSMANS, 1994. Morbihan: YSNEL, 1990a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS, 1994, 1997; BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1937e; LEDOUX & al., 1995, 1996a; SIMON, 1914. Savoie: BOSMANS, 1994. Vendée: DENIS, 1941, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, USA (introduit). **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune, litière: DENIS, 1964b. Bois de pins: BOSMANS, 1994. Dune: BOSMANS, 1994; DENIS, 1941, 1965c. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de bouleaux et de hêtres; forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de hêtres et pins: BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de sapins et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse à *Brachypodium ramosum*: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: BOSMANS, 1994. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: BOSMANS, 1997; LEDOUX & al., 1996a. Mai: BOSMANS, 1994. Juin: BOSMANS, 1994; DENIS, 1933b, 1964b, 1965c. Juillet: BOSMANS, 1994. — *Femelle.* Avril: BOSMANS, 1997; LEDOUX & al., 1996a. Mai: BOSMANS, 1994, 1997; LEDOUX & al., 1996a. Juin: BOSMANS, 1997; DENIS, 1933b, 1941, 1964b. Juillet: BOSMANS, 1994, 1997; DENIS, 1961b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a.

*Zodarion ruffoi* Caporiacco, 1951

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BOSMANS, 1997. — Italie.

*Zodarion soror* (Simon, 1873)

*Enyo s.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1874a (*E. s.*), 1914. [La citation de Corse par DENIS, 1935c est erronée selon BOSMANS, 1997, et se rapporte à *Z. gallicum*]. — Espagne. **Habitat.** Détritiques secs: SIMON, 1874a.

*Zodarion timidum* (Simon, 1874)

*Enyo timida.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874a (*E. t.*), 1914. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1914. Gard: BOSMANS, 1994, 1997. Var: DENIS, 1937e; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1914. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 540 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bord de rivière, sur une grève sablonneuse: SIMON, 1874a. Garrigue: BOSMANS, 1994. **Période.** — *Mâle.* Juin: BOSMANS, 1997. Août: BOSMANS, 1994. — *Femelle.* Juin: CORNIC, 1978. Août: BOSMANS, 1994.

GNAPHOSIDAE

Plusieurs espèces du genre *Zelotes* ont été transférées dans d'autres genres par PLATNICK & al., 1984: *Trachyzelotes* (*Z. barbatus*, *Z. fuscipes*, *Z. holosericus*,

*Z. lyonneti*, *Z. mutabilis*, *Z. pedestris*), *Urozelotes* (*Z. rusticus*). Ces transferts n'ont pas été retenus dans les ouvrages de détermination ultérieurs (HEIMER & al., 1991; ROBERTS, 1995); ces espèces sont maintenues ici dans le genre *Zelotes*. Il en est de même des espèces du groupe *pusillus* (*Zelotes lutetianus*, *Z. praefficus*, *Z. pumilus*, *Z. pusillus*, *Z. villicus*), placées par quelques auteurs dans le genre *Drassylus*.

***Aphantaulax cincta*** (L. Koch, 1866)

*A. cinctus*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (A. c.); BIGOT & al., 1973 (A. c.); SOYER, 1966. Charente, Charente-Maritime: SIMON, 1914. Corse: GRIMM, 1985. Hérault: EMERIT & al., 1985. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. Var: BIGOT, 1993 (A. c.); BIGOT & al., 1987a (A. c.), 1987b (A. c.), 1988 (A. c.); DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993 (A. c.); SIMON, 1878a (A. c.). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Midi de la France jusque dans les Charentes: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Europe, Afrique du Nord, Israël. **Altitude.** Jusqu'à 600 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Garrigue: SOYER, 1966. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1966. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle*. Juin: CORNIC, 1978.

***Aphantaulax trifasciata*** (O. P.-Cambridge, 1872)

*A. seminiger*; *A. seminigra*; *A. trimaculatus*.

**Taxonomie.** La synonymie *A. seminigra* (Simon, 1878) = *A. trifasciata* est établie par LEVY, 2002. **Répartition.** Ardèche: LEVY, 2002. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b (*A. seminigra*); SOYER, 1966 (*A. seminigra*). Cantal: SIMON, 1878a (*A. t.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001 (*A. seminigra*); SIMON, 1878a (*A. t.*). Corse: CANARD, 1989 (*A. seminigra*); SIMON, 1878a (*A. seminiger*), 1914 (*A. seminigra*). Gers: LUCANTE, 1880a (*A. t.*). Gironde: LUCANTE, 1880a (*A. t.*); SIMON, 1878a (*A. t.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b (*A. seminigra*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*A. t.*); SIMON, 1878a (*A. t.*). Morbihan: SIMON, 1878a (*A. t.*), 1914 (*A. seminigra*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*A. seminigra*); LEDOUX & al., 2003 (*A. seminigra*). Var: BECKER, 1880 (*A. seminiger*); DENIS, 1934a (*A. seminigra*), 1935a (*A. seminigra*), 1937a (*A. seminigra*); KOVOOR & al., 2000 (*A. seminigra*). Vendée: DENIS, 1941 (*A. seminigra*), 1962b (*A. seminigra*), 1963c (*A. seminigra*); DUFFEY, 1964 (*A. seminigra*); MURPHY, 1994 (*A. seminigra*). — Midi de la France et la région maritime de l'ouest jusqu'au Morbihan: SIMON, 1914 (*A. seminigra*). Espagne, Italie (*A. seminigra*). Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Bois: DENIS, 1941. Dune: DENIS, 1962b; DUFFEY, 1964; MURPHY, 1994. Dune, oyats: DENIS, 1963c. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Friche: CANARD, 1989. Lagune: DENIS, 1954b.

Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1966. Marécage: BELIN, 2001. Plage, sous les plantes: CANARD, 1989. Sable, oyats: DENIS, 1964b. *Ulex europaeus*: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1964b, 1965c. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1941, 1962b, 1964b. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1964b. Août, septembre: DENIS, 1962b.

***Berlandina cinerea*** (Menge, 1872)

*Pterotricha c.*; *Pythonissa silacea*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*P. s.*), 1914 (*P. c.*). Aveyron, Gironde, Seine-et-Marne: SIMON, 1914 (*P. c.*). — Allemagne, Espagne, Suisse. De l'Europe au Kazakhstan.

***Berlandina nubivaga*** (Simon, 1878)

*Callilepis n.*; *Pterotricha n.*; *Pythonissa n.*

[*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*Pythonissa n.*), 1914 (*Pterotricha n.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1898b (*C. n.*). — Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Forêt, zones sablonneuses, sous les lichens: SIMON, 1898b.

***Berlandina plumalis*** (O. P.-Cambridge, 1872)

*Pterotricha p.*; *Pythonissa p.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*Pythonissa p.*), 1914 (*Pterotricha p.*). — Espagne, Italie. De l'Afrique de l'Ouest à la Chine.

***Callilepis concolor*** Simon, 1914

*C. nocturna concolor*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1914 (*C. n. c.*). Gard: DENIS, 1962a. Lozère: DENIS, 1939b (*C. n. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*C. n. c.*); LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1914 (*C. n. c.*). — Espagne. Europe du Sud. **Altitude.** 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Pelouse sèche, parsemée de chênes-verts et de *Viburnum tinus*: DENIS, 1962a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1962a. Août: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1933b, 1939b; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 2003.

***Callilepis nocturna*** (Linnaeus, 1758)

*Pythonissa n.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a (*P. n.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Corse: SIMON, 1878a (*P. n.*), 1914. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gers: LUCANTE, 1880a (*P. n.*). Gironde, Indre-et-Loire, Isère: SIMON, 1878a (*P. n.*). Oise: SIMON, 1887a (*P. n.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1955c. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1878a (*P. n.*); SOYER, 1965. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904, 1910; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. "Seine": PLATNICK, 1975. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*P. n.*). Vaucluse: COR-

NIC, 1978. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2470 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois de chênes-lièges: SOYER, 1965. Bois de pins, litière sèche et sous les pierres: SIMON, 1878a. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1950b, 1955c. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Garrigue: SOYER, 1965. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1959d; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. — *Femelle.* Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1950b, 1952c, 1955c, 1959d; LEDOUX & al., 1996c.

*Callilepis schuszeri* (Herman, 1879)

**Répartition.** Hérault: LEDOUX, 1973b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1987; MACHADO, 1949. — Allemagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 750 m (BOSMANS & al., 1987). **Habitat.** Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1987.

*Cryptodrassus hungaricus* (Balogh, 1935)

**Répartition.** Gard: LEDOUX & al., 2004b. — Suisse. Europe. **Habitat.** Garrigue sur sable, sous les pierres: LEDOUX & al., 2004b. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX & al., 2004b. — *Femelle.* Mai, juin: LEDOUX & al., 2004b.

*Drassodes albicans* (Simon, 1878)

*Drassus a.*

[*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*D. a.*), 1914. Gers: LUCANTE, 1880a (*D. a.*); SIMON, 1878a (*D. a.*), 1914. — Espagne, Italie, Méditerranée.

*Drassodes cervinus* Simon, 1914

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; SIMON, 1914. — Espagne. **Altitude.** De 750 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 1200 m (SIMON, 1914). **Habitat.** Forêt de hêtres et sapins: SIMON, 1914. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Août: SIMON, 1914. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b. Août: SIMON, 1914.

*Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834)

*D. andorranus*; *D. lapidosus cupreus*; *Drassus c.*

**Taxonomie.** La synonymie *D. andorranus* Denis, 1938 = *D. cupreus* est établie par LEDOUX & al., 1996a. [Cette espèce a été considérée comme une sous-espèce de *D. lapidosus* jusqu'en 1974. Jusqu'à cette date, les données concernant ces deux espèces ont pu être confondues]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Côtes-d'Armor, Finistère: CANARD, 1990b. Gard: SIMON, 1914 (*D. l. c.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne:

CANARD, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1952c (*D. a.*); LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*D. c.*). — France centrale, Cévennes: SIMON, 1914 (*D. l. c.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2170 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c; VEILLON, 1997. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Friche: VEILLON, 1997. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière à sphagnes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & al., 1996a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 2003; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Drassodes difficilis* (Simon, 1878)

*Drassus d.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*D. d.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Alpes du Dauphiné et de la Provence: SIMON, 1914. Espagne, Italie. **Altitude.** 1400 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Sous une pierre: CORNIC, 1978. **Période.** — *Femelle.* Juin: CORNIC, 1978.

*Drassodes fritillifer* Simon, 1914

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

*Drassodes fugax* (Simon, 1878)

*Drassus f.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Gard: SIMON, 1914. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c, 1953a, 1954a, 1955c, 1960a; SIMON, 1914. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1960a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1878a (*D. f.*), 1914. — Alpes: SIMON, 1914. Espagne, Italie, Paléarctique. **Altitude.** De 1300 m (DENIS, 1967d) jusqu'à 3160 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois; bord d'étang: DENIS, 1952c. Bord de lac: DENIS, 1955c. Éboulis: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de conifères: SIMON, 1914. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b, 1951c. Tourbière, sous les pierres: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1952c, 1954a, 1955c, 1957a. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LEDOUX, 1993. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1954a, 1967d. Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1952c, 1953a, 1957a; LEDOUX, 1993. Septembre: DENIS, 1951c, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a. Août: DENIS, 1952c, 1953a.

*Drassodes heeri* (Pavesi, 1873)*Drassus hispanus* [err.].

[Les citations de SIMON, 1878a sont faites sous *Drassus hispanus*, identifications erronées selon GRIMM, 1985. SIMON, 1914 note à propos des citations de 1878: «Je confondais alors cette espèce avec *D. hispanus* (L.K.)»]. **Répartition.** Ain: SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.]. Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.], 1914. Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.], 1914. Aveyron, Cantal: SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.]. Isère: SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.], 1914. Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.]. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904; SIMON, 1914. Var: SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err.]. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** De 1600 m jusqu'à 2800 m (SIMON, 1914). **Habitat.** Éboulis: LEDOUX & al., 1996b. Forêt, sous les pierres ou les écorces: SIMON, 1878a. Prairie: LEDOUX & al., 1996b. Rhododendrons, au sol: LEDOUX & al., 1996c. Sous une pierre: BERLAND, 1935; LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904. Torrent, galets: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Mâle.* Août: BERLAND, 1935; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Janvier, février: LESSERT, 1904. Juillet: BERLAND, 1937; CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996c. Août: BERLAND, 1935; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c.

*Drassodes hispanus* (L. Koch, 1866)*D. validior.*

[SIMON, 1914 note: «L'indication de Fontainebleau (Seine-et-Marne) donnée dans les Arachnides de France se rapporte à *D. hypocrita* (E. Sim.)»]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Cantal, Gard, Isère, Puy-de-Dôme: SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*D. v.*); SIMON, 1914, 1914 (*D. v.*). Rhône: SIMON, 1914. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. [Les citations de SIMON, 1878a sous *Drassus hispanus* sont erronées selon GRIMM, 1985, et se rapportent à *D. heeri*]. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (SIMON, 1914). **Habitat.** Bois: SIMON, 1914. Éboulis: LEDOUX & al., 1996a. Sous les très grosses pierres des éboulis: SIMON, 1914. **Période.** — *Femelle.* Janvier, février: LESSERT, 1910. Août: LEDOUX & al., 1996a.

*Drassodes hypocrita* (Simon, 1878)*Drassus hispanus* [err.]; *Drassus h.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1914. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*D. h.*), 1882 (*D. h.*); RODMAN, 1919; SIMON, 1914. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985; SIMON, 1878a (*D. h.*), 1914. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1914. Aude: SIMON, 1878a (*D. h.*), 1914. Bouches-du-Rhône: GRIMM, 1985; KABOUCHE & al., 1997; SIMON, 1878a (*D. h.*), 1914; SOYER, 1966. Gard: SIMON, 1914. Hérault: EMERIT & al., 1985, 1990; SIMON, 1878a (*D. h.*), 1914. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1914. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a [*Drassus hispanus*, err. selon SIMON,

1914], 1898b, 1914. Var: BECKER, 1880 (*D. h.*), 1882 (*D. h.*); DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; GRIMM, 1985; KABOUCHE & al., 1997; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a (*D. h.*), 1898c, 1914. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1914. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1000 m (SOYER, 1966). **Habitat.** Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Collines arides ou légèrement boisées, sous les pierres: SIMON, 1878a. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Forêt sèche, sous les pierres: SIMON, 1914. Forêt à *Quercus* sur plateau calcaire: KABOUCHE & al., 1997. Forêt, sous des pierres: GRIMM, 1985. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse sèche: SOYER, 1966. *Posidonia* secs: DENIS, 1935a. Sous une pierre: DENIS, 1934a; MÜLLER, 1985; SIMON, 1898c. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Septembre: DENIS, 1935a; GRIMM, 1985. Octobre: KABOUCHE & al., 1997. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: MÜLLER, 1985. Septembre: CORNIC, 1978; DENIS, 1935a; GRIMM, 1985. Octobre: KABOUCHE & al., 1997. Décembre: GRIMM, 1985. — *Femelle avec cocon.* Avril: SIMON, 1914. Mai: DENIS, 1934a; SIMON, 1914. Juillet: SIMON, 1878a. Août: SIMON, 1898c.

*Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)*Drassus lapidicola*; *Drassus lapidicolens*; *Drassus l.*

[L'espèce *D. cupreus* a été considérée comme une sous-espèce de *D. lapidosus* jusqu'en 1974. Jusqu'à cette date, les données concernant ces deux espèces ont pu être confondues]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*D. l.*), 1882 (*D. l.*); SIMON, 1878a (*D. l.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1961b. Aube: SIMON, 1878a (*D. l.*). Aude: DELFOSSE, 2000b. Aveyron: GROS, 1982. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1983; SOYER, 1966. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b (*D. lapidicolens*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999; SIMON, 1874d (*D. lapidicolens*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955; ROEWER, 1926 (*D. lapidicola*); SIMON, 1878a (*D. l.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*D. lapidicolens*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*D. l.*); SIMON, 1899, 1909a. Finistère: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a. Gard: LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; KERVILLE, 1932. Gers: LUCANTE, 1880a (*D. l.*). Gironde: CAUSANIEL, 1970. Hérault: EMERIT & al., 1985, 1990. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Landes: LUCANTE, 1880a (*D. l.*); SIMON, 1878a (*D. l.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: CANARD, 1990b; LUCAS, 1882a (*D. lapidicolens*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*D. l.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924; KERVILLE, 1898; LUCAS, 1878b (*D. lapidicolens*). Marne: LUCAS, 1878a (*D. lapidicolens*). Morbihan: CANARD, 1990b. Nord: GOULLIART, 1979b. Orne: CANARD, 1990b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1939b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1952c, 1961b, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a; SIMON, 1878a (*D. l.*); TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PAS-

QUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; SCHALLER, 2000. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1910; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*D. lapidicolens*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*D. l.*). Seine-et-Marne: BERLAND, 1928; COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a (*D. l.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*D. l.*). Var: BECKER, 1880 (*D. l.*); DENIS, 1934a, 1935a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CANARD, 1990b; CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1999a. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1938a; SCHALLER, 2000; SIMON, 1878a. Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bord de ruisseau, sous des pierres; broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Collines arides: SIMON, 1878a. Dune: DENIS, 1965c; SOYER, 1966. Dune, *Ammophiletum*: CAUSSANEL, 1970. Dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Éboulis: LEDOUX & al., 1996b. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt, clairière, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Grotte: BERLAND, 1928. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Maison: DENIS, 1964b; LE PERU, 2004. Marécage: SIMON, 1878a. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Pelouses sèches à *Brachypodium*: SOYER, 1966. Prairie: PASQUET & al., 1992; SIMON, 1878a. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale; prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Ripisylve: LEDOUX, 2000. *Salicornietum*: BIGOT, 1957. Sous un amas de briques: BERLAND, 1924. Sous une pierre: DENIS, 1934a, 1940a; EMERIT & al., 1997; GOULIART, 1979b; KERVILLE, 1898; LUCAS, 1877b, 1878b, 1882a. Sur sol marécageux: DELFOSSE, 2000b. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Touffe d'oyats: DENIS, 1963c. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1933b, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1965c, 1967d; SIMON, 1878a; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: BERLAND, 1937; DENIS, 1952c, 1961b, 1963c. Août: LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a. Septembre: LUCAS, 1877b. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1933b, 1962b. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1965c, 1967d; LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1962b, 1965c; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: BERLAND, 1937; DENIS, 1939a, 1939b, 1940a, 1952c, 1961b, 1963c, 1964b; LEDOUX & al., 1996a; PICKARD-

CAMBRIDGE, 1898. Août: CORNIC, 1978; DENIS, 1962b; GROS, 1982; LUCAS, 1878a, 1878b, 1882a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1935a, 1967d; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LUCAS, 1877b. — *Femelle avec cocon*. Juin: DELFOSSE, 2000b; DENIS, 1938a, 1941, 1962b. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1959d, 1961b, 1963c. Août: DENIS, 1964b. — *Femelle avec ses jeunes*. Juillet: DENIS, 1963c. Août: LEDOUX & al., 1996b.

#### *Drassodes luteomicans* (Simon, 1878)

*Drassus l.*; *Drassus portator*.

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*D. l.*), 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; SIMON, 1878a (*D. p.*), 1914. Var: SIMON, 1914. — Espagne, Italie. Europe du Sud. **Période.** — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1933b.

#### *Drassodes lutescens* (C. L. Koch, 1839)

*Drassus l.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1878a (*D. l.*), 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Corse: SIMON, 1878a (*D. l.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*D. l.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1878a (*D. l.*), 1914. Vaucluse: SIMON, 1914. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 500 m (SOYER, 1966). **Habitat.** Collines sèches et pierreuses: SIMON, 1914. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1966.

#### *Drassodes placidulus* Simon, 1914

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Gard: SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1914.

#### *Drassodes pubescens* (Thorell, 1856)

*Drassus p.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*D. p.*). Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1961b. Aube: SIMON, 1878a (*D. p.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1878a (*D. p.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1878a (*D. p.*). Eure: SIMON, 1909a. Finistère: DENIS, 1940a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Isère: SIMON, 1878a (*D. p.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: CANARD, 1990b. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Orne: CANARD, 1990b; SIMON, 1878a (*D. p.*). Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": SIMON, 1878a (*D. p.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; SIMON, 1878a (*D. p.*). Vendée: DENIS, 1941, 1962b. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois, mousses: SIMON, 1878a, 1909a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al.,

1999. Crevasses des grands rochers ; forêt de bouleaux et de hêtres : BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes : BOSMANS & al., 1987. Friche : LEBORGNE & al., 1998 ; PASQUET & al., 1992 ; VEILLON, 1997. Hautes herbes : LEDOUX & al., 1996a. Jardin : LE PERU, 2004 ; LENICE, 1992. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Marécage : BELIN, 2001 ; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse calcaire : BOSMANS & al., 1985a. Pelouse sèche : BRAUD & al., 2005. Prairie : PASQUET & al., 1992. Prairies alpestres, sous les pierres : SIMON, 1878a. Pâturage : LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1950b. Terrain vague : BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Juin : DENIS, 1933b, 1941, 1962b ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1878a ; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Juin : DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 1999 ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1878a. Juillet : DENIS, 1961b ; LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a. Août : LEDOUX & al., 1996a. Septembre : LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1940a, 1950b, 1961b.

#### *Drassodes rhodanicus* Simon, 1914

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Ardèche, Gard : SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

#### *Drassodes rubidus* (Simon, 1878)

*Drassus r.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 2003 ; SIMON, 1878a (*D. r.*), 1914. — Espagne, Italie. **Période.** — *Femelle*. Août : LEDOUX & al., 2003.

#### *Drassodes villosus* (Thorell, 1856)

*Drassus lapidosus inermis* ; *Drassus v.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a (*D. l. i.*). Charente-Maritime : SIMON, 1876b (*D. v.*). Gard : SIMON, 1914. Isère : SIMON, 1878a (*D. v.*). Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a. [Il existe une incertitude sur l'identité de l'espèce citée de Charente-Maritime par SIMON, 1876b sous le nom "*Drassus villosus* Westr."]. — Alpes du Dauphiné et de la Provence, Pyrénées, Cévennes : SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Chalets, fentes des charpentes : SIMON, 1878a. Forêt : SIMON, 1914. Prairies alpestres, sous les pierres : SIMON, 1878a.

#### *Drassodes vinosus* (Simon, 1878)

*Drassus v.* ; *Parasyrisca vinosa*.

**Taxonomie.** L'espèce *Drassodes vinosus* (Simon, 1878) a été transférée dans le genre *Parasyrisca* par OVTSHARENKO & al., 1995. Ce genre, créé par SCHENKEL, 1963 dans la famille des Clubionidae, a été transféré dans les Miturgidae par LEHTINEN, 1967, puis dans les Gnaphosidae par OVTSHARENKO & al., 1988. **Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1878a (*D. v.*), 1914. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1952c ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1878a (*D. v.*), 1914. — Espagne, Suisse (*P. v.*). Europe (*P. v.*). **Altitude.** De 2000 m (SIMON, 1878a) jusqu'à 2430 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang : DENIS, 1952c. Prairies alpestres, sous les pierres : SIMON, 1878a. Sous une pierre : SIMON, 1914. **Période.** — *Femelle*. Juillet : DENIS, 1952c ; LEDOUX & al., 1996a. Août : DENIS, 1952c. — *Femelle avec*

*cocon*. Juillet : DENIS, 1952c ; SIMON, 1878a. Août : DENIS, 1952c.

*Drassylus* (voir *Zelotes*)

#### *Echemus angustifrons* (Westring, 1861)

*E. ambiguus*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a (*E. a.*), 1914 (*E. a.*). Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Hérault : SIMON, 1914 (*E. a.*). Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 2003 (*E. a.*). — Allemagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Forêt de chênes-verts : LEDOUX & al., 2003. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992.

#### *Gnaphosa alacris* Simon, 1878

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SOYER, 1966. Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1878a, 1914. Hérault : EMERIT & al., 1985, 1990. Pyrénées-Orientales : SIMON, 1878a, 1914. Var : DENIS, 1935a ; GROS, 1982 ; KOVOOR & al., 2000 ; SIMON, 1898c. — Provence : SIMON, 1914. Espagne, Italie. Balkans. Maroc. **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & al., 1985. Collines sèches : SIMON, 1914. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Lieux secs, sous les pierres : SIMON, 1878a. Pelouses très éclairées : SOYER, 1966. Plateau calcaire, sous les pierres : CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Juillet : CANARD, 1989. — *Femelle*. Juillet : CANARD, 1989 ; GROS, 1982. Septembre : DENIS, 1935a.

#### *Gnaphosa alpica* Simon, 1878

*G. molesta*.

[L'espèce décrite et citée de Haute-Savoie par PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 sous le nom *G. molesta* est différente de *G. molesta* Herman, qui est un synonyme de *G. opaca*]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a. Savoie (Haute-) : PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*G. m.*). — Alpes de la Savoie et du Dauphiné : SIMON, 1914. Suisse. Europe. **Période.** — *Femelle*. Juillet, août : PICKARD-CAMBRIDGE, 1898.

#### *Gnaphosa atramentaria* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a, 1914. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1939b, 1950b, 1953a, 1954a, 1955c ; SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 2200 m (DENIS, 1939b) jusqu'à 3190 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Prairies alpestres, sous les pierres : SIMON, 1878a. Sous une pierre : DENIS, 1950b. **Période.** — *Femelle*. Juillet : DENIS, 1939b, 1950b, 1954a, 1955c. Août : DENIS, 1953a. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1950b, 1954a, 1955c. Août : DENIS, 1953a.

#### *Gnaphosa badia* (L. Koch, 1866)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Isère : SIMON, 1878a. Savoie : BERLAND, 1937. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Alpes de la Savoie et du Dauphiné : SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** De 1930 m (LEDOUX & al., 1996b) jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Forêt, au sol : LEDOUX & al., 1996c. Prairie : LEDOUX & al., 1996b. Prairies alpestres, sous



les pierres: SIMON, 1878a. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937; LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX & al., 1996b. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon.* Août: SIMON, 1878a.

***Gnaphosa bicolor* (Hahn, 1831)**

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aude: SIMON, 1878a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Italie, Suisse. De l'Europe à la Géorgie. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Sous une pierre: LESSERT, 1904. Terrains calcaires, sous les pierres: SIMON, 1878a. **Période.** — *Femelle.* Juin: EMERIT & al., 1997; LESSERT, 1904, 1910.

***Gnaphosa cantabrica* Simon, 1914**

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. — Espagne. **Période.** — *Femelle.* Août: LEDOUX & al., 2003.

***Gnaphosa corticola* Simon, 1914**

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Ardèche: SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Sous l'écorce d'un vieux châtaignier: SIMON, 1914.

***Gnaphosa dolosa* Herman, 1879**

*G. spadicea.*

**Taxonomie.** La synonymie *G. spadicea* Simon, 1914 = *G. dolosa* est établie par OVTSHARENKO & al., 1992. **Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*G. s.*); SIMON, 1914 (*G. s.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1964 (*G. s.*), 1966 (*G. s.*). Gers: GROS, 2004. — Paléarctique. **Altitude.** 250 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Pelouse à galets: SOYER, 1966. Plage, galets: SOYER, 1964. Plages de galets du bord de mer et des torrents: SOYER, 1966. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mai: SOYER, 1964. Juillet: GROS, 2004. — *Femelle.* Mai: SOYER, 1964.

***Gnaphosa inconspicua* Simon, 1878**

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1878a. — Pyrénées orientales et centrales: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne. Paléarctique.

***Gnaphosa lapponum* (L. Koch, 1866)**

*G. iberica.*

**Taxonomie.** La synonymie *G. iberica* Simon, 1878 = *G. lapponum* est établie par EMERIT & al., 2004a. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d (*G. i.*); EMERIT & al., 2004a; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1878a (*G. i.*), 1914 (*G. i.*). — Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** De 2170 m jusqu'à 2700 m (EMERIT & al., 2004a). **Habitat.** Forêt de conifères, sous les pierres: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie, sous des pierres: EMERIT

& al., 2004a; SIMON, 1914. Sous une pierre: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle.* Juillet: EMERIT & al., 2004a; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juin: EMERIT & al., 2004a; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: EMERIT & al., 2004a. Août: DENIS, 1967d. Septembre: EMERIT & al., 2004a. Décembre: DENIS, 1967d.

***Gnaphosa leporina* (L. Koch, 1866)**

*G. anglica*; *G. helvetica.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*G. a.*), 1878a (*G. h.*). Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935. Ariège: DENIS, 1961b. Aube, Cantal: SIMON, 1878a (*G. a.*). Morbihan: DRESKO, 1974a; SIMON, 1878a (*G. a.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1952c, 1967d; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1878a (*G. a.*). Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Bois: SCHALLER, 2000. Éboulis: LEDOUX & al., 1996b. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Sous une pierre: BERLAND, 1935; LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Août: BERLAND, 1935; LEDOUX & al., 1996b. Novembre: DRESKO, 1974a. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1952c.

***Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802)**

*Pythonissa l.*

**Répartition.** Ardèche: LUCAS, 1870b (*P. l.*); RAPHAËL & al., 1992. Aube, Aude, Aveyron: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965. Corrèze, Côte-d'Or: SIMON, 1878a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878a, 1909a. Eure-et-Loire: SIMON, 1878a. Gers: LUCANTE, 1880a. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: DRESKO, 1974a. Indre-et-Loire: SIMON, 1878a. Marne: LUCAS, 1878a (*P. l.*). Moselle: IORIO, 2003a; SIMON, 1878a. Oise: SIMON, 1878a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1961b; SIMON, 1878a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1878a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Var: GROS, 1982; SIMON, 1878a. Vendée: SIMON, 1878a. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Coteau calcaire, sous des pierres: IORIO, 2003a. Forêt, mousses: DOIGNON, 1976. Friche: SIMON, 1878a. Marécage salé: BIGOT, 1965. Sous une grosse pierre: LUCAS, 1878a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrains calcaires: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle.* Février: IORIO, 2003a. Mai, juin: LESSERT, 1904, 1910. Août: LUCAS, 1878a. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle.* Février: IORIO, 2003a. Mai, juin: LESSERT, 1904, 1910. Août: GROS, 1982. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1961b.

***Gnaphosa luctifica* Simon, 1879**

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Var: DENIS, 1934a; SIMON, 1879, 1914. — Connue seulement de France.

**Habitat.** Plage: DENIS, 1934a. **Période.** — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. Octobre: SIMON, 1879.

*Gnaphosa lugubris* (C. L. Koch, 1839)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Finistère: DENIS, 1940a. Isère: SIMON, 1878a. Morbihan: CANARD, 1990b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c. Savoie: BERLAND, 1937. “Seine”: ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne: SIMON, 1878a, 1914. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Alpes, Auvergne, Cévennes, Pyrénées: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l’Europe à l’Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu’à 2910 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d’étang: DENIS, 1952c. Sous les pierres, les mousses et les écorces: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1878a. Juin, juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1878a. Juillet: BERLAND, 1937. Août: DENIS, 1952c. Octobre: CORNIC, 1978. — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1878a. Juillet: DENIS, 1940a, 1952c. Août: DENIS, 1952c.

*Gnaphosa montana* (L. Koch, 1866)

**Répartition.** Doubs: EMERIT & al., 1997. Savoie (Haute-): SIMON, 1914. — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Femelle avec cocon*. Juin: EMERIT & al., 1997.

*Gnaphosa muscorum* (L. Koch, 1866)

*G. tetrica* [err.].

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a. Isère: SIMON, 1878a [*G. tetrica*, err. selon SIMON, 1914]. Savoie: BERLAND, 1937. — Alpes du Dauphiné et de la Savoie: SIMON, 1914. Allemagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** De 2500 m (SIMON, 1914) jusqu’à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Forêt de pins; mousses et litière: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1878a. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1878a. Juillet: BERLAND, 1937. — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1878a.

*Gnaphosa nigerrima* L. Koch, 1877

**Répartition.** Cantal, Loire (Haute-), Puy-de-Dôme, Savoie (Haute-): VILLEPOUX & al., 2004. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 1120 m (VILLEPOUX & al., 2004). **Habitat.** Marécage; tourbière alcaline froide; tourbière à sphagnum: VILLEPOUX & al., 2004. **Période.** — *Mâle*. Mai, août: VILLEPOUX & al., 2004. — *Femelle*. Mai à juillet: VILLEPOUX & al., 2004.

*Gnaphosa occidentalis* Simon, 1878

*G. lugubris occidentalis*; *Pythonissa o.*

**Répartition.** Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*P. o.*), 1878a, 1914 (*G. l. o.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Morbihan: MURPHY, 1994; SIMON, 1878a, 1914 (*G. l. o.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. — Région maritime de l’Ouest, dans les Charentes et le Morbihan: SIMON, 1914 (*G. l. o.*). Espagne, Grande-Bretagne. Ouest-Europe. **Altitude.** Jusqu’à 2400 m (BOSMANS & al., 1985a).

*Gnaphosa oceanica* Simon, 1878

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Morbihan: SIMON, 1878a, 1914. — Balkans.

*Gnaphosa opaca* Herman, 1879

**Répartition.** Aveyron, Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2004. — Allemagne, Belgique. De l’Europe à l’Asie Centrale. **Habitat.** Pelouse pierreuse xérophile; rocailles, sous une pierre: BRAUD & al., 2004. **Période.** — *Mâle*. Juin: BRAUD & al., 2004. — *Femelle*. Septembre: BRAUD & al., 2004.

*Gnaphosa petrobia* L. Koch, 1872

**Répartition.** [Aucune localité précise]. — Alpes de la Savoie et du Dauphiné: SIMON, 1914. Allemagne, Italie, Suisse. Europe.

*Gnaphosa rhenana* Müller & Schenkel, 1895

**Répartition.** Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. — Allemagne, Italie, Suisse. Roumanie. **Habitat.** Bord de rivière, sous des pierres: MULLER & al., 1895. **Période.** — *Mâle*. Avril: MULLER & al., 1895. — *Femelle*. Juin, juillet: MULLER & al., 1895.

*Gnaphosa secreta* Simon, 1878

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1878a, 1914. — Connue seulement de France.

*Gnaphosa tetrica* Simon, 1878

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1878a, 1914. [La citation de l’Isère par SIMON, 1878a est erronée selon SIMON, 1914, et se rapporte à *G. muscorum*]. — Balkans.

*Gnaphosa tigrina* Simon, 1878

**Répartition.** Isère: SIMON, 1914. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SIMON, 1914; TAMBS-LYCHE, 1957. — Espagne, Italie, Suisse. De la Méditerranée à la Russie. **Altitude.** De 2300 m (DENIS, 1959d) jusqu’à 2900 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Prairie: SIMON, 1914. Sous une pierre: DENIS, 1955c. **Période.** — *Mâle*. Mai: TAMBS-LYCHE, 1957. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1955c. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1959d.

*Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861)

*Drassodes c.*; *Drassus cognatus* [femelle].

[Selon SIMON, 1914, la synonymie *Drassus cognatus* = *H. cognatus* n’est valable que pour les femelles; pour les mâles la synonymie est *D. cognatus* = *Scotophaeus westringi*]. **Répartition.** Aube: SIMON, 1878a (*D. c.* [femelle]). Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*D. c.* [femelle]), 1914 (*D. c.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt, sous les écorces: SIMON, 1878a.

*Haplodrassus concertor* (Simon, 1878)

*Drassodes c.*; *Drassus c.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Puy-de-Dôme: SIMON, 1914

(*Drassodes c.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1878a (*Drassus c.*). — Espagne, Italie. **Altitude.** De 1370 m (DENIS, 1957a) jusqu'à 3030 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de conifères, clairière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale: BOSMANS & al., 1987. Prairie sèche: BOSMANS & al., 1985a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Prairies alpestres, sous les pierres: SIMON, 1914. Sous une pierre: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1950b. Tourbière, sous les pierres: DENIS, 1950b. **Période.** — *Femelle.* Juin: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1957a, 1960a, 1961b. Août: DENIS, 1953a. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b, 1955c. Août: DENIS, 1953a.

#### *Haplodrassus dalmatensis* (L. Koch, 1866)

*Drassodes d.*; *Drassodes minusculus*; *Drassus d.*; *Drassus minusculus*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a (*Drassus m.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983 (*Drassodes d.*); SOYER, 1966 (*Drassodes d.*). Charente-Maritime: SIMON, 1874d (*Drassus d.*), 1878a (*Drassus m.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1878a (*Drassus m.*), 1914 (*Drassodes d.*). Finistère: DENIS, 1939a. Landes: LUCANTE, 1880a (*Drassus m.*); SIMON, 1878a (*Drassus m.*). Loire-Atlantique: CANARD, 1990b; LUCAS, 1882a (*Drassus m.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; NOËL & al., 2005. Manche, Morbihan: CANARD, 1990b. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Drassodes d.*); SIMON, 1878a (*Drassus m.*). "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991. Seine-et-Marne, Somme: SIMON, 1878a (*Drassus m.*). Var: DENIS, 1934a (*Drassodes d.*); SIMON, 1878a (*Drassus m.*), 1898c (*Drassodes m.*). — Midi de la France et l'ouest jusqu'en Normandie: SIMON, 1914 (*Drassodes d.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Haie: NOËL & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Littoral, *Crithmo-stacion*; pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1966. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre: LUCAS, 1882a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1933b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1934a. Mai: BONTE, 2000; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1939a. Août: LUCAS, 1882a.

#### *Haplodrassus invalidus* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Drassodes i.*; *Drassus i.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*Drassus i.*), 1914 (*Drassodes i.*); TIBERGHIEU & al., 1993b. — Espagne, Israël.

#### *Haplodrassus kulczynskii* Lohmander, 1942

*Drassodes microps* [err.]; *H. microps* [err.].

[Les citations de *Drassodes microps* par LESSERT et SIMON, et de *H. microps* par DENIS, sont des erreurs d'identification selon PLATNICK, 2004. *Drassodes microps* et *H. microps* sont en fait des synonymes de *H. umbratilis*]. **Répartition.** Jura: SIMON, 1914 [*D. m.*, err.]. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1951a [*H. m.*, err.]. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 [*D. m.*, err.], 1910 [*D. m.*, err.]; SIMON, 1914 [*D. m.*, err.]. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Grotte: DENIS, 1951a. Sous une pierre: LESSERT, 1904; SIMON, 1914. **Période.** — *Femelle.* Avril: LESSERT, 1904, 1910.

#### *Haplodrassus macellinus* (Thorell, 1871)

*Drassodes m.*; *Drassus hebes*; *Drassus m.*; *Drassus occidentalis*; *Drassus typhon*; *Drassus vicarius*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*Drassus m.*), 1882 (*Drassus m.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1874 (*D. h.*); SIMON, 1878a (*Drassus m.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*Drassus m.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1878a (*Drassus m.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966 (*Drassodes m.*). Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1878a (*D. v.*), 1914 (*Drassodes m.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b (*Drassodes m.*), 1967d; LEDOUX & al., 1995, 2003; SIMON, 1878a (*Drassus m.*), 1878a (*D. t.*). Var: BECKER, 1880 (*Drassus m.*), 1882 (*Drassus m.*); DENIS, 1933a (*Drassodes m.*), 1934a (*Drassodes m.*); SIMON, 1878a (*Drassus m.*), 1898c (*Drassodes m.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*Drassodes m.*); SIMON, 1878a (*Drassus m.*). — Midi de la France: SIMON, 1914 (*Drassodes m.*). Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a. Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1966. Maquis, sous des pierres: CANARD, 1989. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1966. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Rochers: CANARD, 1989. Sous une pierre: DENIS, 1934a; SIMON, 1878a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1967d. Novembre: LEDOUX & al., 2003. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1967d.

#### *Haplodrassus severus* (C. L. Koch, 1839)

*Drassodes s.*; *Drassus s.*; *Drassus similis*.

**Répartition.** Aude: SIMON, 1878a (*Drassus s.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*Drassodes s.*); PETIT & al., 1945 (*Drassodes s.*); SIMON, 1878a (*Drassus s.*); SOYER, 1966 (*Drassodes s.*). Corse: SIMON, 1878a (*Drassus s.*), 1914 (*Drassodes s.*). Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*Drassus similis*). Hérault: EMERIT & al., 1990 (*Drassodes s.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Drassodes s.*); SIMON, 1878a (*Drassus s.*); TAMBS-LYPHE, 1957 (*Drassodes s.*). Var: DENIS, 1933a (*Drassodes s.*). — Midi de la France: SIMON, 1914 (*Drassodes s.*). Espagne, Italie. Méditerranée. **Habitat.** Bord d'étang: PETIT & al., 1945. Collines sèches et

pierreuses : SIMON, 1914. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Lande à *Ulex* : LUCAS, 1871a. Pelouses ensoleillées : SOYER, 1966. *Salicornietum*; *Therobrachypodium* : BIGOT, 1965. **Période**. — *Mâle*. Février, mai, décembre : DENIS, 1933b. — *Femelle*. Février : DENIS, 1933b. Mai : TAMBS-LYCHE, 1957.

**Haplodrassus signifer** (C. L. Koch, 1839)

*Drassodes s.*; *Drassodes troglodytes*; *Drassus troglodytes*.

**Répartition**. Alpes-Maritimes : BECKER, 1882 (*Drassus t.*). Ariège : DENIS, 1961b. Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1983 (*D. s.*). Calvados : GUIBÉ, 1946 (*D. s.*). Cantal : SIMON, 1878a (*Drassus t.*). Charente-Maritime : SIMON, 1874d (*Drassus t.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : KRAUS, 1955. Côtes-d'Armor : CANARD, 1990b; DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : SIMON, 1909a (*Drassodes t.*). Finistère : DENIS, 1938a. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a; KERVILLE, 1927 (*D. s.*), 1932 (*D. s.*). Ille-et-Vilaine : CANARD, 1979, 1980, 1990b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924 (*D. s.*); CANARD, 1990b. Morbihan : CANARD, 1990b. Puy-de-Dôme : VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a; BUCHLI, 1965; DENIS, 1933b (*D. s.*), 1952c, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910 (*Drassodes t.*); PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000; LESSERT, 1910 (*Drassodes t.*); MULLER & al., 1895 (*Drassus t.*). Savoie : BERLAND, 1937 (*D. s.*). Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*Drassus t.*). "Seine" : SIMON, 1878a (*Drassus t.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*Drassus t.*). Seine-et-Marne : COCQUEMPOT & al., 1989; DOIGNON, 1976 (*Drassodes t.*). Vaucluse : LEDOUX, 2000. Vendée : DENIS, 1962b. — Toute la France : SIMON, 1914 (*D. s.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude**. Jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937; SIMON, 1878a). **Habitat**. Bois : DENIS, 1952c. Bord de ruisseau, sous des pierres : BOSMANS & al., 1985a. Champ de céréales : COCQUEMPOT & al., 1989. Formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins, lisière : DENIS, 1962b. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Friche : LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie : BRAUD & al., 2005. Jardin : LE PERU, 2004. Lande sèche : CANARD, 1979, 1980. Marécage : LEDOUX & al., 1996a. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Mousses : SIMON, 1878a. Prairie : PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre : BOSMANS & al., 1985a. Ripisilve : LEDOUX, 2000. Sous un amas de briques : BERLAND, 1924. Sous une pierre : EMERIT & al., 1997; KERVILLE, 1927; SIMON, 1878a. Talus de chemin creux, vieux mur de pierres sèches : BUCHLI, 1965. Tourbière à sphaignes : VILLEPOUX, 1990a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase : BIGOT & al., 1983. **Période**. — *Mâle*. Avril : DENIS, 1933b. Mai : LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1878a. Juin : DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. Juillet : DENIS, 1961b. — *Femelle*. Avril : DENIS, 1933b, 1962b. Mai : DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1878a. Juin : DENIS, 1933b, 1938a; EMERIT & al., 1997; VEILLON, 1997. Juillet : BERLAND, 1937; DENIS, 1938a, 1952c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août : LEDOUX & al., 1996b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Décembre :

DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1961b.

**Haplodrassus silvestris** (Blackwall, 1833)

*Drassodes s.*; *Drassodes sylvestris*; *Drassus infuscatus*.

**Répartition**. Ain : SIMON, 1878a (*D. i.*). Bouches-du-Rhône : SOYER, 1966 (*Drassodes sylvestris*). Calvados : GUIBÉ, 1946 (*Drassodes s.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : SIMON, 1899 (*Drassodes s.*), 1909a (*Drassodes s.*). Gers : LUCANTE, 1880a (*D. i.*); SIMON, 1878a (*D. i.*). Ille-et-Vilaine : CANARD, 1990b. Isère : SIMON, 1878a (*D. i.*). Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 (*Drassodes s.*); LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Morbihan : DENIS, 1938a. Orne : CANARD, 1990b. Puy-de-Dôme : LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 2003. "Seine" : CHRISTOPHE, 1974 (*Drassodes s.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*Drassodes s.*); SIMON, 1878a (*D. i.*). Var : KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a (*D. i.*). — Presque tout le nord et le centre de la France : SIMON, 1914 (*Drassodes s.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude**. Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat**. Bois humides, litière et mousses : SIMON, 1878a. Bois humides, mousses : SIMON, 1899. Bois, mousses : SIMON, 1909a. Forêt : DENIS, 1938a. Forêt de châtaigniers : CHRISTOPHE, 1974. Forêt de chênes et hêtres : LE PERU, 2004. Forêt de chênes-verts : LEDOUX & al., 2003. Forêt, mousses : DOIGNON, 1976. Haie, litière : BRAUD & al., 2005. Prairie humide : BOSMANS & al., 1985a. **Période**. — *Mâle*. Juin : DENIS, 1938a; LE PERU, 2004; SIMON, 1878a. — *Femelle*. Avril : LEDOUX & al., 2003. Juin : DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1997; SIMON, 1878a.

**Haplodrassus umbratilis** (L. Koch, 1866)

*Drassodes u.*

**Répartition**. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c. Landes : SIMON, 1914 (*D. u.*). Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1952c, 1961b. Seine, Seine-et-Marne, Vaucluse : SIMON, 1914 (*D. u.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude**. Jusqu'à 2120 m (DENIS, 1952c). **Habitat**. Bord d'étang : DENIS, 1952c. Forêt : DENIS, 1961b. Friche : VEILLON, 1997. Plage, sous les plaques sèches de *Chetomorpha* : DENIS, 1950c. **Période**. — *Mâle*. Mai : DENIS, 1950c. Juin : VEILLON, 1997. Août : DENIS, 1952c. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1961b.

**Leptodrassus albidus** Simon, 1914

**Répartition**. Alpes-Maritimes : DALMAS, 1919; SIMON, 1914. Loire-Atlantique : DALMAS, 1919; MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales : DALMAS, 1919; SIMON, 1914. — Espagne. De l'Espagne à la Crète. **Habitat**. Marais salant : MURPHY, 1994.

**Leptodrassus femineus** (Simon, 1873)

**Répartition**. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1966. Corse : SIMON, 1878a, 1914. Var : KOVOOR & al., 2000. — Espagne, Italie. Du Portugal à la Crète. **Habitat**. Littoral, *Crithmo-stacion*; pelouse à *Brachypodium* : SOYER, 1966.

**Leptodrassus simoni** Dalmas, 1919*L. tenerimus.***Répartition.** Alpes-Maritimes: DALMAS, 1919. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914 (*L. t.*). — Espagne. Liban, Portugal.**Micaria aenea** Thorell, 1871*M. vandeli* [femelle].**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*M. v.* [femelle]), 1955c (*M. v.* [femelle]). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987, 2000. — Allemagne, Espagne, Suisse. Holarctique. **Altitude.** De 1860 m (DENIS, 1955c) jusqu'à 2200 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987, 2000). **Habitat.** Broussailles de rhododendron: BOSMANS & al., 1985a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: BOSMANS & al., 2000; DENIS, 1950b. — *Femelle.* Juillet: BOSMANS & al., 2000; DENIS, 1950b, 1955c.**Micaria albovittata** (Lucas, 1846)*M. romana*; *M. scintillans*; *M. spinulosa*.**Taxonomie.** Les synonymies *M. scintillans* (O. P.-Cambridge, 1871) et *M. romana* L. Koch, 1866 = *M. albovittata* sont établies par WUNDERLICH, 1979. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*M. spinulosa*), 1932 (*M. scintillans*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*M. r.*), 1932 (*M. scintillans*). Ardèche: SIMON, 1932 (*M. scintillans*). Aube, Charente-Maritime: SIMON, 1878a (*M. scintillans*), 1932 (*M. scintillans*). Corse: BOSMANS & al., 2000; SIMON, 1878a (*M. scintillans*), 1932 (*M. scintillans*). Côte-d'Armor: DENIS, 1938a (*M. scintillans*). Eure: SIMON, 1932 (*M. scintillans*). Finistère: BOSMANS & al., 2000; DENIS, 1939a (*M. scintillans*), 1940a (*M. scintillans*). Gard: SIMON, 1932 (*M. scintillans*). Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a (*M. scintillans*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*M. scintillans*); SIMON, 1932 (*M. scintillans*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*M. r.*); VEILLON, 1997 (*M. r.*). Morbihan: MARC, 1990a (*M. scintillans*); MURPHY, 1994 (*M. r.*); SIMON, 1878a (*M. scintillans*), 1932 (*M. scintillans*). Oise: SIMON, 1878a (*M. scintillans*), 1932 (*M. scintillans*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000 (*M. r.*). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a (*M. r.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*M. scintillans*); SIMON, 1932 (*M. scintillans*). Seine-et-Marne: SIMON, 1932 (*M. scintillans*). Vendée: DENIS, 1941 (*M. scintillans*), 1946b (*M. scintillans*), 1947b (*M. scintillans*), 1963c (*M. scintillans*). — Paléarctique. **Habitat.** Bord d'étang; carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire: VEILLON, 1997. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt de pins, litière: DENIS, 1946b. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lieux sablonneux, sous des pierres: LUCAS, 1882a. Littoral, végétation halophile: BOSMANS & al., 2000. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Sable, oyats: DENIS, 1963c. Sous une pierre: DENIS, 1940a, 1947b. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000; BOSMANS & al., 2000. Juin: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. Août: LUCAS, 1882a. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000. Juin: DENIS, 1941, 1947b; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. Août: BOSMANS & al.,2000; DENIS, 1946b. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1947b. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a.**Micaria alpina** L. Koch, 1872*M. breviuscula.***Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*M. b.*). Alpes-Maritimes: BERLAND, 1935. Lozère: SIMON, 1932. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1932. Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** 2300 m (BERLAND, 1935). **Habitat.** Sous une pierre: BERLAND, 1935. **Période.** — *Mâle.* Juin: SIMON, 1932. — *Femelle.* Août: BERLAND, 1935.**Micaria coarctata** (Lucas, 1846)*M. albimana*; *M. smaragdula*.**Taxonomie.** La synonymie *M. albimana* O. P.-Cambridge, 1872 = *M. coarctata* est établie par BOSMANS & al., 2000. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BOSMANS & al., 2000; SIMON, 1932 (*M. s.*). Alpes-de-Haute-Provence, Corse: SIMON, 1878a (*M. s.*), 1932 (*M. s.*). Loire-Atlantique: MURPHY, 1994 (*M. a.*). Pyrénées-Orientales, Vaucluse: SIMON, 1932 (*M. s.*). — Espagne, Suisse. De la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat.** Dune: MURPHY, 1994.**Micaria cyrnea** Brignoli, 1983*M. canestrini* [err.].**Répartition.** Corse: WUNDERLICH, 1979 [*M. canestrini*, err. selon PLATNICK, 2004]. — Italie.**Micaria dives** (Lucas, 1846)*Chrysothrix splendidissima*; *M. armata*; *Micariolepis d.*; *Micariolepis splendidissima*.**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*C. s.*), 1882 (*M. s.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1874 (*M. a.*); SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932 (*M. d.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932 (*M. d.*). Aude: SIMON, 1932 (*M. d.*). Corse: SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932 (*M. d.*). Gard: EMERIT & al., 1994 (*M. d.*); SIMON, 1932 (*M. d.*). Oise: SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932 (*M. d.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*M. d.*); SIMON, 1932 (*M. d.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932 (*M. d.*). Var: BECKER, 1882 (*M. s.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1874 (*M. a.*); SIMON, 1878a (*C. s.*), 1932 (*M. d.*). Vendée: DENIS, 1962b (*M. d.*), 1962d (*M. d.*), 1963c (*M. d.*), 1964b (*M. d.*), 1965c (*M. d.*); DUFFEY, 1964 (*M. d.*); MURPHY, 1994. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b. Dune: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964; MURPHY, 1994. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Dune, herbes sèches: DENIS, 1962d. Dune, sous des pierres: DENIS, 1962d, 1963c. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962d, 1963c. Lieux sablonneux et chauds: SIMON, 1932. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b, 1962d. Mai: DENIS, 1965c. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1962d, 1963c. Octobre: EMERIT & al., 1994.**Micaria formicaria** (Sundevall, 1831)**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a, 1932. Alpes-Maritimes, Ardèche: SIMON, 1932. Ariège:

DENIS, 1960a. Cantal : SIMON, 1878a, 1932. Corrèze : LE PERU, 2004. Dordogne, Finistère : SIMON, 1932. Ille-et-Vilaine : MARC, 1990a. Landes : BOSMANS & al., 2000. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Manche : SIMON, 1932. Morbihan : MARC, 1990a. Nord : DENIS, 1946b. Orne : MARC, 1990a. Pyrénées (Hautes-) : SIMON, 1932. Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1959d ; SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 2000 ; DENIS, 1933b, 1961b ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1932. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910. "Seine" : SIMON, 1932. Seine-et-Marne : SIMON, 1878a, 1932. Vaucluse : BOSMANS & al., 2000. Vendée : DENIS, 1941, 1964b ; MARC, 1990a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois, litière : BRAUD & al., 2005. Dune : DENIS, 1941. Forêt : DENIS, 1961b, 1964b. Haie : BRAUD & al., 2005. Jardin, sur sol sablonneux : LE PERU, 2004. Marécage : DENIS, 1941. Plage : SIMON, 1932. Sous du foin coupé : DENIS, 1933b. Sur une route : DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle.* Mai : LESSERT, 1910. Juin : DENIS, 1941 ; LE PERU, 2004 ; SIMON, 1932. Juillet : BOSMANS & al., 2000 ; DENIS, 1959d, 1960a ; LEDOUX & al., 1996a. Août : BOSMANS & al., 2000. — *Femelle.* Juin : DENIS, 1941 ; SIMON, 1932. Juillet : DENIS, 1960a. Août : SIMON, 1932. Septembre : DENIS, 1946b ; SIMON, 1932.

*Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1878a, 1932. Alpes-Maritimes : SIMON, 1932. Ariège : DENIS, 1960a. Aube : SIMON, 1878a, 1932. Calvados : GUIBÉ, 1946. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : SIMON, 1899, 1909b. Landes : SIMON, 1932. Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880a ; SIMON, 1878a, 1932. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b, 1953a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987, 2000 ; DENIS, 1933b, 1961b ; LEDOUX & al., 1996a ; SIMON, 1932. Savoie (Haute-) : BOSMANS & al., 2000 ; LESSERT, 1910 ; SIMON, 1932. "Seine" : SIMON, 1878a, 1932. Seine-Maritime : SIMON, 1932. Seine-et-Marne : SIMON, 1878a, 1932. Vendée : DENIS, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale, Afrique du Nord. **Altitude.** Jusqu'à 1860 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne : EMERIT & al., 1997. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Forêt : DENIS, 1961b. Forêt de bouleaux et de hêtres : BOSMANS & al., 1985a. Forêt de hêtres et pins : BOSMANS & al., 1987. Forêt de pins : BOSMANS & al., 1987 ; DENIS, 1962d. Forêt de pins, clairière : DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière : DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière très sèche : DENIS, 1963c. Forêt de pins, sous des pierres : DENIS, 1950b. Forêt de sapins et de hêtres : BOSMANS & al., 1985a. Fougères sèches : DENIS, 1933b. Friche : SIMON, 1909b. Sur un mur : DENIS, 1962d. **Période.** — *Mâle.* Février : EMERIT & al., 1999. Avril : DENIS, 1962d. Mai : DENIS, 1965c ; LESSERT, 1910. Juin : BOSMANS & al., 2000. Juillet : BOSMANS & al., 2000 ; DENIS, 1964b. Septembre : DENIS, 1962d. — *Femelle.* Mars : DENIS, 1964b. Mai : DENIS, 1962d. Juin : DENIS, 1933b ; EMERIT & al., 1997. Juillet : BOSMANS & al., 2000 ; DENIS, 1950b, 1960a, 1961b, 1963c ; LEDOUX & al., 1996a. Août : DENIS, 1953a, 1964b.

*Micaria funerea* Simon, 1878

*M. movens.*

**Répartition.** Corse : BOSMANS & al., 2000 ; KRAUS, 1955 (*M. m.*) ; SIMON, 1878a, 1878a (*M. m.*), 1932 ; WUNDERLICH, 1979. — Espagne, Italie, Russie. **Altitude.** De 1100 m jusqu'à 1450 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Prairie : BOSMANS & al., 2000. **Période.** — *Mâle.* Avril : KRAUS, 1955. Mai : BOSMANS & al., 2000. Septembre : KRAUS, 1955. — *Femelle.* Avril : KRAUS, 1955. Mai : BOSMANS & al., 2000.

*Micaria guttigera* Simon, 1878

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1878a, 1932. Alpes-Maritimes : SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a, 1932. Aude, Lozère : SIMON, 1932. Puy-de-Dôme : DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1960a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a, 1987, 2000 ; DENIS, 1933b ; LEDOUX & al., 1995 ; SIMON, 1932. Var : SIMON, 1932. — Espagne, Portugal. **Altitude.** De 1250 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987, 2000) jusqu'à 1410 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Forêt de bouleaux et de hêtres : BOSMANS & al., 1985a, 1987. Pelouse à plantain caréné : LEDOUX & al., 1995. Sous une pierre : DENIS, 1948b. **Période.** — *Mâle.* Juin : DENIS, 1933b. Juillet : BOSMANS & al., 2000 ; DENIS, 1933b. — *Femelle.* Juin : DENIS, 1933b, 1948b. Juillet : BOSMANS & al., 2000 ; DENIS, 1933b, 1960a. — *Femelle avec cocon.* Juin : DENIS, 1933b.

*Micaria guttulata* (C. L. Koch, 1839)

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1878a, 1932. Bouches-du-Rhône : SIMON, 1932 ; SOYER, 1963. Oise : SIMON, 1878a, 1932. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b, 1953a. Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1952c ; LEDOUX & al., 1996a, 2003 ; SIMON, 1932. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904, 1910. Seine, Seine-et-Marne : SIMON, 1878a, 1932. Var, Vaucluse : SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2430 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang : DENIS, 1952c. Forêt de conifères, sous les pierres : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins, sous des pierres : DENIS, 1950b. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Pelouse sèche : SOYER, 1963. Prairie : LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle.* Juin : LESSERT, 1904, 1910. Juillet : DENIS, 1952c. Septembre : LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juin : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet : DENIS, 1950b. Août : DENIS, 1953a.

*Micaria pallipes* (Lucas, 1846)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : BOSMANS & al., 2000. — Espagne. Des Canaries à l'Asie Centrale. **Habitat.** Marais salant : BOSMANS & al., 2000. **Période.** — *Femelle.* Avril : BOSMANS & al., 2000.

*Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831)

*M. nitens* ; *M. vandeli* [mâle].

**Répartition.** Ariège : DENIS, 1961b. Calvados : GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : CANARD, 1989 ; KRAUS, 1955 ; SIMON, 1878a, 1932. Côtes-d'Armor : LUCAS, 1871a, 1871a (*M. n.*). Finistère : MARC, 1990a. Gironde : DENIS, 1951b. Ille-et-Vilaine : MARC, 1990a.

Isère: SIMON, 1878a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: MARC, 1990a. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Orne: MARC, 1990a. Pas-de-Calais: EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1950b (*M. v.* [mâle]). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1952c; LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; BOSMANS & *al.*, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1910; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888a; SUEUR, 1992, 1993. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1952c; LEDOUX, 2000. Bord de lac: DENIS, 1950b. Champ, sous des chardons secs: ROSELLE, 1888a. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt de pins: CANARD, 1989. Forêt de pins maritimes: CLARK & *al.*, 1970. Forêt de pins, clairière: DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière très sèche: DENIS, 1964b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992; VEILLON, 1997. Haie, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LUCAS, 1878a. Jardin, sur sol sablonneux: LE PERU, 2004. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a, 1871a. Marécage: BELIN, 2001; LANCELEVÉE, 1884. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2002; PASQUET & *al.*, 1992. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Rhododendrons: LEDOUX & *al.*, 1996b. Sous une pierre: DENIS, 1950b. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle.* Février: LEDOUX & *al.*, 1996a. Avril: LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002; SUEUR, 1992. Mai: BOSMANS & *al.*, 2000; LE PERU, 2004. Juin: VEILLON, 1997. Juillet: BOSMANS & *al.*, 2000; DENIS, 1950b. Août: DENIS, 1952c; LEDOUX & *al.*, 1996b. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1951b; EMERIT & *al.*, 1999. Octobre: CANARD, 1989. — *Femelle.* Avril: KRAUS, 1955. Mai: BOSMANS & *al.*, 2000; DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX & *al.*, 1996a; LESSERT, 1910. Juillet: BOSMANS & *al.*, 2000; DENIS, 1950b, 1950b, 1961b; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LUCAS, 1878a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898.

*Micaria rossica* Thorell, 1875

*M. scenica.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1878a (*M. s.*), 1932 (*M. s.*). Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*M. s.*); SIMON, 1932 (*M. s.*). Alpes-de-Haute-Provence, Isère: SIMON, 1878a (*M. s.*), 1932 (*M. s.*). — Suisse. Holarctique.

*Micaria silesiaca* L. Koch, 1875

**Répartition.** Côtes-d'Armor: MARC, 1990a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique.

*Micaria sociabilis* Kulczynski, 1897

*M. aurata.*

**Taxonomie.** La synonymie de *Micaria sociabilis* Kulczynski, 1897 est assez complexe. *M. aurata* Canestrini, 1869 est citée par SIMON, 1878 et SIMON, 1932. Ce nom étant préoccupé, ROEWER, 1951 la renomme *M. canestrinii* et BRIGNOLI, 1983 établit la synonymie *M. canestrinii* Roewer, 1951 = *M. sociabilis* Kulczynski, 1897. **Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*M. a.*), 1932 (*M. a.*). Var: WUNDERLICH, 1979. [La citation de Corse sous *M. canestrinii* par WUNDERLICH, 1979 est erronée selon Platnick, 2004, et se rapporte à *M. cyrnea*]. — Italie. Europe du Sud. **Période.** — *Femelle.* Juillet: WUNDERLICH, 1979.

*Micaria subopaca* Westring, 1861

*M. albostriata.*

**Répartition.** Doubs: EMERIT & *al.*, 1997 (*M. a.*). Isère, Jura: SIMON, 1932 (*M. a.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*M. a.*). Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895 (*M. a.*). — Alsace: SIMON, 1932 (*M. a.*). Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne; bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. **Période.** — *Femelle.* Octobre: LESSERT, 1910.

*Micaria triguttata* Simon, 1884

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 2003. — Espagne. Algérie. **Habitat.** Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 2003. **Période.** — *Femelle.* Novembre: LEDOUX & *al.*, 2003.

*Minosia spinosissima* (Simon, 1878)

*Pterotricha s.*; *Pythonissa s.*

**Répartition.** [Aucune localité précise]. — Provence: SIMON, 1878a (*Pythonissa s.*), 1914 (*Pterotricha s.*). Espagne. Israël.

*Nomisia aussereri* (L. Koch, 1872)

*Callilepis a.*; *Pterotricha a.*; *Pythonissa a.*

**Répartition.** Aveyron: SIMON, 1878a (*Pythonissa a.*). Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & *al.*, 1997; SOYER, 1953a, 1966. Cantal: SIMON, 1878a (*Pythonissa a.*). Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955. Hérault, Puy-de-Dôme: SIMON, 1878a (*Pythonissa a.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1961c, 1967d; SIMON, 1878a (*Pythonissa a.*). "Seine": ROLLARD, 2000. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*Pythonissa a.*); SIMON, 1878a (*Pythonissa a.*). Var: DENIS, 1933a; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1898c (*C. a.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1959c, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b. — France centrale et méridionale, ne dépasse pas la Loire au nord: SIMON, 1914 (*Pterotricha a.*). Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Bord de plage, sous des pierres; forêt de pins: DENIS, 1962d. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & *al.*, 1997. Friche, sous une pierre: CANARD, 1989. Friches et plateaux arides, sous les pierres: SIMON, 1878a. Maquis, sous des pierres: CANARD, 1989. Pelouse sèche: SOYER, 1953a. Pelouses très éclairées: SOYER, 1966. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Sable, sous des pierres: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Août: SIMON, 1878a. Septembre:

CORNIC, 1978; DENIS, 1967d; SIMON, 1878a. Octobre: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Août: DENIS, 1962d; SIMON, 1878a. Septembre: CANARD, 1989; CORNIC, 1978; DENIS, 1959c, 1962d; SIMON, 1878a. Octobre: CORNIC, 1978; KABOUCHE & al., 1997. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon*. Août: DENIS, 1962b, 1962d. Octobre: DENIS, 1963c.

*Nomisia celerrima* (Simon, 1914)

*N. henryi*; *Pterotricha* c.

**Taxonomie.** La synonymie *N. henryi* Denis, 1934 = *N. celerrima* est établie par LEDOUX, 2004a. **Répartition.** Ardèche: LEDOUX, 2004a; RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1914 (*P. c.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1953a (*N. h.*), 1966 (*N. h.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 1963 (*N. h.*), 2004a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1995; SOYER, 1965 (*N. h.*). Var: DENIS, 1934a (*N. h.*); KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2004a. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 600 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois de chênes-lièges: SOYER, 1965. Garrigue: LEDOUX, 2004a; SOYER, 1966. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994; RAPHAËL & al., 1992. Littoral, zone halophile: SOYER, 1966. Pelouse sèche: SOYER, 1953a, 1966. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. Juin: LEDOUX, 1963, 2004a. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. Juin: LEDOUX, 1963, 2004a. Juillet: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2004a.

*Nomisia exornata* (C. L. Koch, 1839)

*Callilepis* e.; *Pterotricha* e.; *Pythonissa* e.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*Pythonissa* e.), 1882 (*Pythonissa* e.). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; SOYER, 1953a, 1966. Corse: KRAUS, 1955; SCHARFF, 1894 (*Pythonissa* e.); SIMON, 1878a (*Pythonissa* e.), 1914 (*Pterotricha* e.). Gers: LUCANTE, 1880a (*Pythonissa* e.). Gironde: SIMON, 1914 (*Pterotricha* e.). Hérault: EMERIT & al., 1990 (*Pterotricha* e.). Landes: LUCANTE, 1880a (*Pythonissa* e.). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*Pythonissa* e.). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*Pythonissa* e.). Morbihan: SIMON, 1914 (*Pterotricha* e.). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; GRIMM, 1985; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a; TAMBS-LYCHE, 1957 (*Pterotricha* e.). Var: BECKER, 1880 (*Pythonissa* e.), 1882 (*Pythonissa* e.); DENIS, 1933a, 1934a, 1937a; GROS, 1983b (*Pterotricha* e.); KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*C. e.*). Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c; MURPHY, 1994. — Midi de la France et littoral occidental jusqu'au Morbihan: SIMON, 1914 (*Pterotricha* e.). Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Dune: DENIS, 1941; LEDOUX & al., 1999a; MURPHY, 1994. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Friche sèche: DENIS, 1934a. Garrigue: SOYER, 1966. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Herbes humides: DENIS, 1934a. Lieu sablonneux: LUCAS, 1882a. Lieux secs et arides: SIMON, 1914. Lieux secs et arides, sous les pierres: SIMON, 1878a. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse: SOYER, 1966. Pelouse sèche: SOYER, 1953a. *Posidonia*: DENIS, 1934a. Sous une pierre: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle*. Mai:

DENIS, 1933b, 1934a. Juin: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1934a. Juin: LEDOUX & al., 1999a. Juillet: DENIS, 1963c; GROS, 1983b. Août: LUCAS, 1882a.

*Nomisia fagei* Dalmas, 1921

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: DALMAS, 1921. — Espagne. Portugal.

*Nomisia recepta* (Pavesi, 1880)

**Répartition.** [Citée par DALMAS, 1921 de la « France méridionale », avec cette note à propos du matériel de collection étudié: « Ces trois femelles étaient mélangées avec les *N. exornata* C.K., dans un tube étiqueté "France sud", mais parmi lesquels pouvaient se trouver des individus pris en Corse »]. — Malte, Tunisie.

*Parasyrisca* (voir *Drassodes*)

*Phaeocedus braccatus* (L. Koch, 1866)

*Drassus* b.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*D. b.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aube, Aveyron: SIMON, 1878a (*D. b.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Corrèze: LE PERU, 2004. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Orne: CANARD, 1990b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1878a (*D. b.*), 1914. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a (*D. b.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*D. b.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*D. b.*). Var: DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a (*D. b.*). Vendée: DENIS, 1941, 1962b. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2500 m (SIMON, 1914). **Habitat.** Bois, lisière: DENIS, 1959d. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Jardin, sur sol sablonneux: LE PERU, 2004. Lieux chauds, sous les pierres: SIMON, 1878a. Lisière de forêt humide, mousses; maison: LE PERU, 2004. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse: SOYER, 1966. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1941, 1962b; LE PERU, 2004; SIMON, 1878a. — *Femelle*. Janvier, février, avril: DENIS, 1933b. Juin: DENIS, 1941, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1959d; LEDOUX & al., 1996a.

*Poecilochroa albomaculata* (Lucas, 1846)

*P. picta*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*P. p.*). Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1878a (*P. p.*). Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & al., 1997; SOYER, 1966. Corse: SIMON, 1878a (*P. p.*), 1914. Hérault: SIMON, 1878a (*P. p.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 2003. Seine-et-Marne: SIMON, 1914. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. p.*); SIMON, 1878a (*P. p.*). Var: KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a (*P. p.*), 1898c (*P. p.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1878a (*P. p.*). — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Europe.



**Altitude.** 460 m (KABOUCHE & *al.*, 1997). **Habitat.** Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Littoral, falaise: SOYER, 1966. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & *al.*, 1995. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus cocifera* et *Cistus albidus*: KABOUCHE & *al.*, 1997. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1933b.

***Poecilochroa conspicua* (L. Koch, 1866)**

*Kishidaia c.*

**Répartition.** Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aude: SIMON, 1878a. Gers: LUCANTE, 1880a. Hérault, Isère: SIMON, 1878a. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a. Oise, “Seine”: SIMON, 1878a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1878a. Var: KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1878a. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l’Europe à l’Asie Centrale (*K. c.*). **Habitat.** Buissons; fagots: SIMON, 1878a. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1878a.

***Poecilochroa furcata* Simon, 1914**

[Femelle inconnue]. **Répartition.** [SIMON, 1914 note à propos de *P. furcata* et *P. perversa*: « Ces deux espèces se trouvaient mêlés dans ma collection aux *P. auspex* de Provence »]. — Provence: SIMON, 1914. Espagne.

***Poecilochroa patricia* (Simon, 1878)**

*Drassus patricius*.

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*D. p.*), 1914. Var: GROS, 1982. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle*. Juillet: GROS, 1982.

***Poecilochroa perversa* Simon, 1914**

[Femelle inconnue]. **Répartition.** [SIMON, 1914 note à propos de *P. furcata* et *P. perversa*: « Ces deux espèces se trouvaient mêlés dans ma collection aux *P. auspex* de Provence »]. — Provence: SIMON, 1914. Connue seulement de France.

***Poecilochroa senilis* (O. P.-Cambridge, 1872)**

*Drassus auspex*; *Drassus dimidiatus*; *P. dimidiata*.

**Taxonomie.** La synonymie *P. dimidiata* (Simon, 1878) = *P. senilis* est établie par LEVY, 1999. **Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*D. d.*), 1914 (*P. d.*). Pyrénées-Orientales: SIMON, 1878a (*D. a.*), 1914 (*P. d.*). — Espagne. De la Corse au Turkménistan.

***Poecilochroa tescorum* Simon, 1914**

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Landes: SIMON, 1914. Vendée: DENIS, 1947b. — Connue seulement de France. **Habitat.** Dune: DENIS, 1947b. Forêt: SIMON, 1914.

***Poecilochroa variana* (C. L. Koch, 1839)**

**Répartition.** Ain: SIMON, 1878a; VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; SOYER, 1966. Gers: LUCANTE, 1880a; SIMON, 1878a.

Hérault: EMERIT & *al.*, 1985. Indre-et-Loire: SIMON, 1878a. Morbihan: CANARD, 1990b; SIMON, 1878a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1878a. Somme: SUEUR, 1993. Var: DENIS, 1937a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l’Europe à l’Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu’à 1900 m (DENIS, 1950b; LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & *al.*, 1985. Dune: DENIS, 1941, 1962b. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Lieux secs exposés au soleil: SIMON, 1878a. Littoral: SOYER, 1966. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Pelouse à *Brachypodium ramosum*: LEDOUX & *al.*, 1996a. Ripisilve, tas de graviers: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1878a. — *Femelle*. Mai: SIMON, 1878a. Juillet: DENIS, 1933b, 1950b, 1960a. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1941, 1962b.

***Scotophaeus aculeatus* Simon, 1914**

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

***Scotophaeus blackwalli* (Thorell, 1871)**

*Drassus b.*; *Drassus isabellinus*; *Drassus politus*; *Herpyllus b.*

**Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992 (*H. b.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; SIMON, 1878a (*D. p.*), 1914. Corse: SIMON, 1878a (*D. i.*), 1914. Côtes-d’Armor: DRESCO & *al.*, 1974 (*H. b.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*D. p.*); SIMON, 1914. Hérault: EMERIT & *al.*, 1985. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Orne: SIMON, 1878a (*D. b.*), 1878a (*D. p.*), 1914. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1967d (*H. b.*). “Seine”: SIMON, 1878a (*D. b.*). Somme: ROSELLE, 1888a (*D. b.*). Var: DENIS, 1934a; KOVOOR & *al.*, 2000. Vendée: DENIS, 1963c (*H. b.*). — France septentrionale et centrale: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & *al.*, 1985. Jardin: LENICE, 1992. Maison: DENIS, 1963c; DRESCO & *al.*, 1974. Marécage: BELIN, 2001. Sous les écorces: SIMON, 1878a. Sous une écorce: DENIS, 1934a. Trous des vieux murs: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1963c. Septembre: DRESCO & *al.*, 1974. Novembre: DENIS, 1967d. *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a. Juillet: DENIS, 1963c. Août: DRESCO & *al.*, 1974.

***Scotophaeus brolemanni* Simon, 1914**

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

***Scotophaeus musculus* (Simon, 1878)**

*Drassus m.*

**Répartition.** Gironde: LUCANTE, 1880a (*D. m.*); SIMON, 1914. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*D. m.*); SIMON, 1878a (*D. m.*), 1914. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914. — Espagne. Madère. **Habitat.** Écorces de chênes-verts: SIMON, 1914.

*Scotophaeus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758)

**Répartition.** Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. [SIMON, 1914 note: «Trouvé une seule fois en France, peut-être accidentellement»]. — Lorraine: SIMON, 1914. Allemagne, Italie, Suisse. Europe, Russie.

*Scotophaeus retusus* (Simon, 1878)

*Drassus r.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Calvados: SIMON, 1878a (*D. r.*), 1914. — Espagne, Italie.

*Scotophaeus scutulatus* (L. Koch, 1866)

*Drassus fulvus*; *Drassus s.*; *Herpyllus s.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1878a (*D. s.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Calvados: LUCAS, 1870d (*D. s.*). Côte-d'Or: SIMON, 1878a (*D. s.*). Côtes-d'Armor: DRESKO & al., 1974 (*H. s.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*D. s.*); SIMON, 1878a (*D. s.*). Hérault: EMERIT & al., 1985. Isère: SIMON, 1878a (*D. s.*). Landes: LUCANTE, 1880a (*D. s.*); SIMON, 1878a (*D. s.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: LUCAS, 1878b (*D. s.*); SIMON, 1878a (*D. s.*). "Seine": SIMON, 1878a (*D. s.*). Seine-et-Marne: DRESKO, 1952a; SIMON, 1878a (*D. s.*). Vienne: SIMON, 1878a (*D. s.*). Yonne: DRESKO, 1950. [THORELL, 1875 cite l'espèce des Pyrénées sous le nom *D. fulvus*]. — Presque toute la France, sauf dans le Midi: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale, Algérie. **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bâtiment: DRESKO & al., 1974. Carrière: DRESKO, 1950. Champs, sous des pierres: LUCAS, 1870d. Maison: BRAUD & al., 2005; SIMON, 1878a. Mur: LUCAS, 1878b. Sous les écorces des arbres abattus: SIMON, 1878a. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1966. Trous des vieux murs: SIMON, 1878a. **Période.** — *Femelle.* Août: DRESKO & al., 1974; LUCAS, 1870d, 1878b. Septembre: DRESKO, 1950.

*Scotophaeus validus* (Lucas, 1846)

*Drassus viator*; *Herpyllus v.*; *S. viator*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aude: SIMON, 1878a (*D. v.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1878a (*D. v.*); SOYER, 1966. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1878a (*D. v.*), 1914. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*D. v.*); SIMON, 1878a (*D. v.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a (*H. v.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Var: DENIS, 1933a, 1934a; SIMON, 1878a (*D. v.*), 1898c (*S. v.*). Vaucluse: SIMON, 1878a (*D. v.*). — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Europe du Sud, Maroc, Algérie. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1966. Marais, détrit: SIMON, 1914. Sous des écorces d'olivier; sous des écorces de chênes-lièges: DENIS, 1933b. Sous les écorces: SIMON, 1914. Sous une pierre: DENIS, 1934a; SIMON, 1914. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Janvier, mars: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a. Juillet: DENIS, 1960a. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle avec ses jeunes.* Mai: DENIS, 1934a.

*Scotophaeus westringi* Simon, 1914

*Drassus cognatus* [mâle].

[Selon SIMON, 1914, la synonymie *Drassus cognatus* = *Haplodrassus cognatus* n'est valable que pour les

femelles; pour les mâles la synonymie est *D. cognatus* = *S. westringi*]. **Répartition.** Seine-et-Marne: SIMON, 1914. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt: SIMON, 1914.

*Setaphis carmeli* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Prothesima latipes*; *Zelotes c.*

**Répartition.** Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1878a (*P. l.*). Corse: PLATNICK & al., 1996; SIMON, 1878a (*P. l.*), 1914 (*Z. c.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*P. l.*); SIMON, 1878a (*P. l.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Z. c.*). Var: SIMON, 1878a (*P. l.*). — Midi de la France: SIMON, 1914 (*Z. c.*). Espagne. Méditerranée. **Altitude.** 500 m (PLATNICK & al., 1996). **Habitat.** Pente caillouteuse: PLATNICK & al., 1996. **Période.** — *Mâle.* Mai: PLATNICK & al., 1996. Juin: DENIS, 1933b; PLATNICK & al., 1996.

*Setaphis parvula* (Lucas, 1846)

*Prothesima suavis*; *S. suavis*.

**Taxonomie.** La synonymie *S. suavis* (Simon, 1878) = *S. parvula* est établie par PLATNICK & al., 1996. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. s.*), 1914 (*S. s.*). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*S. s.*). Ariège: PLATNICK & al., 1996. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1914 (*S. s.*). Corse: PLATNICK & al., 1996. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995 (*S. s.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (PLATNICK & al., 1996). **Habitat.** Bois: SIMON, 1914. Champ caillouteux: PLATNICK & al., 1996. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Maquis, bord de route: PLATNICK & al., 1996. Montagnes arides, sous les pierres: SIMON, 1878a. Pente caillouteuse: PLATNICK & al., 1996. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mai: PLATNICK & al., 1996. — *Femelle.* Mai: PLATNICK & al., 1996.

*Sosticus loricatus* (L. Koch, 1866)

*Drassus navaricus*; *Scotophaeus l.*

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a (*D. n.*); SIMON, 1878e (*D. n.*), 1914 (*S. l.*). — Allemagne. Holarctique.

*Trachyzelotes* (voir *Zelotes*)

*Urozelotes* (voir *Zelotes*)

*Zelotes aeneus* (Simon, 1878)

*Prothesima aenea*.

**Taxonomie.** Les deux espèces *Zelotes aeneus* (Simon, 1878) et *Z. longipes* (L. Koch, 1866), traitées séparément ici, ont parfois été confondues. SIMON, 1914 les met en synonymie sous le nom *Z. longipes*. Leur répartition est donc à prendre avec réserve. **Répartition.** Alpes-Maritimes, Aube, Aveyron: SIMON, 1878a (*P. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne, Puy-de-Dôme: SIMON, 1878a (*P. a.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; LUCANTE, 1880a (*P. a.*); SENGLET, 2004. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003; SENGLET, 2004; SIMON, 1878a (*P. a.*). Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. a.*); SIMON, 1878a (*P. a.*). Vaucluse: SIMON, 1878a (*P. a.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Forêt de chênes-verts: LEDOUX

& al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1957a. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1957a. Novembre: LEDOUX & al., 2003.

*Zelotes apricorum* (L. Koch, 1876)

*Melanophora* a.; *Prosthesima* a.; *Z. louronensis*.

**Taxonomie.** La synonymie *Z. louronensis* Denis, 1960 = *Z. apricorum* est établie par SENGLLET, 2004. [SIMON, 1878a confond les deux espèces *Z. apricorum* et *Z. subterraneus* sous le nom *Prosthesima subterranea*]. **Répartition.** Aude: DENIS, 1961b (*Z. l.*); SENGLLET, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1909a (*M. a.*). Finistère: DENIS, 1939a. Gard: SIMON, 1914. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Orne: CANARD, 1990b. Puy-de-Dôme: JÉZÉQUEL, 1961. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a (*Z. l.*); SENGLLET, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SENGLLET, 2004. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904 (*P. a.*), 1910 (*P. a.*). “Seine”: JÉZÉQUEL, 1961. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989; JÉZÉQUEL, 1961. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b. Vosges: GRIMM, 1985. [DENIS, 1939a indique que les citations de DENIS, 1938a sous *Z. subterraneus* sont en fait deux espèces, *Z. subterraneus* et *Z. apricorum*, qu’il ne peut plus localiser]. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l’Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu’à 2300 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Bois de chênes, vieux mur: EMERIT & al., 1997. Bruyères: HILLYARD, 1975. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Clôture: BRAUD & al., 2005. Éboulis: LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères, clairière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1964b. Forêt de pins maritimes, détritus: CLARK & al., 1970. Friche: PASQUET & al., 1992. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 2003. Prairie alpestre; prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Sous une pierre: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle*. Avril: JÉZÉQUEL, 1961. Juin: CORNIC, 1978; JÉZÉQUEL, 1961; LESSERT, 1910; SENGLLET, 2004. Juillet: DENIS, 1939a; SENGLLET, 2004. Août: DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996c. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a, 2003; LESSERT, 1910; SENGLLET, 2004. Juillet: DENIS, 1939a, 1960a; LEDOUX & al., 1996c; SENGLLET, 2004. Août: JÉZÉQUEL, 1961; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: CLARK & al., 1970; LEDOUX & al., 1996c. Novembre: GRIMM, 1985. — *Femelle avec cocon*. Juin: EMERIT & al., 1997. Juillet: DENIS, 1961b.

*Zelotes atrocaeruleus* (Simon, 1878)

*Prosthesima atrocaerulea*; *Prosthesima pilipes*; *Z. atrocaeruleus*.

**Répartition.** Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: CANARD, 1990b; MURPHY, 1994; SIMON, 1878a (*P. a.*), 1914. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*P. p.*), 1910 (*P. a.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON,

1914. Var: DENIS, 1936. Vaucluse: CORNIC, 1978 (*Z. a.*). Vendée: CANARD, 1990b. [SIMON, 1914 note: «Il n’est pas absolument certain que les deux sexes que je rapporte à *Z. atrocaeruleus* appartiennent bien à la même espèce»]. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu’à 720 m (CORNIC, 1978). **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1936; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Juin: CORNIC, 1978.

*Zelotes barbatus* (L. Koch, 1866)

*Prosthesima barbata*; *Trachyzelotes b.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*P. b.*), 1882 (*P. b.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Corse: ROEWER, 1926 (*P. b.*); SCHARFF, 1894 (*P. b.*); SIMON, 1878a (*P. b.*), 1914. — Région méditerranéenne: SIMON, 1914. Espagne, Italie (*T. b.*). De la Méditerranée à l’Asie Centrale, USA (*T. b.*). **Habitat.** Littoral. *Crihmo-staticion*: SOYER, 1966. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. **Période.** — *Femelle*. Avril: ROEWER, 1926.

*Zelotes callidus* (Simon, 1878)

*Prosthesima callida*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Corse: SIMON, 1878a (*P. c.*), 1914. Var: GROS, 1982; LEDOUX, 1972. — Italie. **Habitat.** Lieux très chauds, sous les pierres: SIMON, 1878a. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1966. **Période.** — *Femelle*. Août: GROS, 1982; LEDOUX, 1972.

*Zelotes caucasius* (L. Koch, 1866)

*Prosthesima tarsalis*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. t.*), 1914. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1914. Gard: DENIS, 1962a; JÉZÉQUEL, 1961. — Espagne, Italie. De l’Europe à l’Asie Centrale. **Habitat.** Pelouse sèche, parsemée de chênes-verts et de *Viburnum tinus*: DENIS, 1962a. **Période.** — *Mâle*. Novembre: SIMON, 1914. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1962a; JÉZÉQUEL, 1961.

*Zelotes civicus* (Simon, 1878)

*Prosthesima civica*; *Prosthesima fortuita*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Alpes-Maritimes: GRIMM, 1985. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. f.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*P. f.*), 1878a (*P. f.*), 1914. Dordogne: LUCANTE, 1880a (*P. c.*). Finistère: DENIS, 1939a. Gironde: LUCANTE, 1880a (*P. f.*); SIMON, 1914. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Landes: SIMON, 1914. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: JÉZÉQUEL, 1961; LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: CANARD, 1990b; MURPHY, 1994; SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880a (*P. c.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. “Seine”: SIMON, 1878a (*P. c.*), 1878a (*P. f.*), 1914. Seine-et-Marne: JÉZÉQUEL, 1961. Var: DENIS, 1933a. Vendée: DENIS, 1963c. — Midi et ouest de la France, Alpes, Cévennes, Pyrénées: SIMON, 1914. Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu’à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Prairie humide: BRAUD & al., 2005. Sous une pierre:

DENIS, 1963c. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Mai: JÉZÉQUEL, 1961; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: GRIMM, 1985. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1933b; JÉZÉQUEL, 1961; LEDOUX & al., 2002. Juillet: DENIS, 1939a, 1963c; GRIMM, 1985; LEDOUX & al., 1996a.

*Zelotes clivicola* (L. Koch, 1870)

*Melanophora c.*; *Prothesima c.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. c.*). Gard: SIMON, 1914. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. c.*); SIMON, 1878a (*P. c.*). Morbihan: MURPHY, 1994. Var: SIMON, 1898c (*M. c.*). Vendée: DENIS, 1962d, 1964b. — Alpes de la Savoie et du Dauphiné: SIMON, 1914. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt de pins: DENIS, 1962d. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Avril, juillet: DENIS, 1962d.

*Zelotes cyanescens* Simon, 1914

*Z. donnezanus*; *Z. silvicola*.

**Taxonomie.** Les synonymies *Z. donnezanus* Denis, 1961 = *Z. cyanescens* et *Z. silvicola* Denis, 1962 = *Z. cyanescens* sont établies par SENGLLET, 2004. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b (*Z. d.*); SENGLLET, 2004. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1914. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*Z. s.*); DENIS, 1961b (*Z. s.*), 1962e (*Z. s.*); LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1914. Savoie (Haute-): SIMON, 1914. — Espagne, Italie. **Altitude.** De 1600 m (BOSMANS & al., 1985a) jusqu'à 2400 m (SIMON, 1914). **Habitat.** Forêt: DENIS, 1961b, 1962e. **Période.** — *Femelle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1961b, 1961b, 1962e; SENGLLET, 2004.

*Zelotes dentatidens* Simon, 1914

*Z. medianus* [femelle, err.].

**Répartition.** Ardèche: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966, 1967. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. Var: DENIS, 1935a [*Z. medianus* (femelle), err. selon SOYER, 1967]; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1914; SOYER, 1967. Vaucluse: CORNIC, 1978. [Les deux citations des Bouches-du-Rhône de SOYER, 1966 et 1967, se réfèrent à la même récolte]. — Espagne, Italie. **Altitude.** Jusqu'à 700 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Garrigue: SOYER, 1966. Littoral, *Crithmo-station*; maquis: SOYER, 1967. **Période.** — *Mâle*. Juin: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1935a.

*Zelotes devotus* Grimm, 1982

**Répartition.** Alpes-Maritimes: GRIMM, 1982. — Italie, Suisse. Europe.

*Zelotes egregius* Simon, 1914

*Z. reconditus*.

**Taxonomie.** La synonymie *Z. reconditus* Simon, 1914 = *Z. egregius* est établie par SENGLLET, 2004. Le statut de *Z. egregius* est confus. Selon GRIMM, 1985, le mâle décrit par SIMON, 1914, est en fait *Z. aeneus*. Pour SENGLLET, 2004, la femelle décrite par SIMON, 1914 sous *Z. egregius* est un spécimen malformé de *Z. latreillei*,

mais le mâle est bien *Z. egregius*. Devant le désaccord des auteurs, les citations sont laissées sous leurs noms originaux. La répartition de cette espèce est donc à prendre avec réserve. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914 (*Z. r.*). Garonne (Haute-): KERVILLE, 1932 (*Z. r.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1951c (*Z. r.*); JÉZÉQUEL, 1961 (*Z. r.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1987 (*Z. r.*); DENIS, 1933b (*Z. r.*), 1952c (*Z. r.*); LEDOUX & al., 1999a (*Z. r.*); SENGLLET, 2004; SIMON, 1914 (*Z. e* et *Z. r.*). Var: SIMON, 1914 (*Z. r.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Espagne, Italie (*Z. r.*). **Altitude.** De 930 m (CORNIC, 1978) jusqu'à 2350 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Prairie à rhododendron: BOSMANS & al., 1987. Sous une pierre: DENIS, 1951c. **Période.** — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1933b. Juillet: JÉZÉQUEL, 1961. Septembre: CORNIC, 1978; DENIS, 1951c. Octobre: LEDOUX & al., 1999a. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1952c.

*Zelotes electus* (C. L. Koch, 1839)

*Melanophora electa*; *Prothesima electa*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Charente-Maritime: SIMON, 1878a (*P. e.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*P. e.*); SIMON, 1878a (*P. e.*). Loire-Atlantique: CANARD, 1990b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. e.*); SIMON, 1878a (*P. e.*). Manche, Morbihan, Orne: CANARD, 1990b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 2003. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*M. e.*); SIMON, 1878a (*P. e.*), 1898b (*M. e.*). Somme: SIMON, 1878a (*P. e.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1959c, 1965c; DUFFEY, 1964. — Presque toute la France, Alpes, Pyrénées: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 700 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois de pins, sous les pierres, mousses et litière: SIMON, 1878a. Dune: CLARK & al., 1970; DUFFEY, 1964. Dune, sous des détritiques: DENIS, 1965c. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Lande à genêts: LEDOUX & al., 2003. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Terrains sablonneux et secs: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle*. Mai: SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Avril: LEDOUX & al., 2003. Mai: SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1959c, 1965c. Juillet: CORNIC, 1978. Septembre: CLARK & al., 1970. Octobre: LEDOUX & al., 2002. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1933b.

*Zelotes erebeus* (Thorell, 1871)

*Melanophora erebea*; *Prothesima erebea*; *Z. fuscomicans* [mâle].

**Taxonomie.** Cette espèce a été partiellement confondue avec *Z. fuscomicans* (= *Z. villicus*) par SIMON, 1914. Voir la note sous *Z. villicus*. **Répartition.** Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*P. e.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan, Orne: CANARD, 1990b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1878a (*P. e.*), 1914. Seine-Maritime: SIMON, 1914. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*M. e.*); DRESKO, 1952a; JÉZÉQUEL, 1961 (*Z. f.* [mâle]); SIMON, 1878a (*P. e.*), 1898b (*M. e.*), 1914. Vendée: DENIS, 1946b, 1962b, 1962b (*Z. f.* [mâle]), 1962d, 1962d (*Z. f.* [mâle]), 1963c, 1964b, 1964b (*Z. f.* [mâle]). Yonne: DRESKO, 1950. — Allemagne, Belgi-

que, Italie, Suisse. De l'Europe à la Géorgie. **Habitat.** Carrière: DRESKO, 1950. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1962b, 1962d, 1962d. Forêt, clairière sablonneuse, sous des pierres: DENIS, 1946b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Lieux sablonneux très chauds: SIMON, 1914. Litière de pins: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1962b, 1962d, 1964b. Août: JÉZÉQUEL, 1961. — *Femelle.* Août: DENIS, 1962d, 1963c, 1964b. Septembre: DENIS, 1946b; DRESKO, 1950. Octobre: DENIS, 1962b.

*Zelotes exiguus* (Müller & Schenkel, 1895)

*Prosthesima exigua.*

**Répartition.** Rhin (Haut-): LESSERT, 1910 (*P. e.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*P. e.*), 1910 (*P. e.*); SIMON, 1914. Vendée: DENIS, 1962b, 1962d. — Alsace: SIMON, 1914. Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Lieux exposés au soleil, sous les pierres: LESSERT, 1910. Vase salée, sous une pierre: DENIS, 1962b, 1962d. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b, 1962d; LESSERT, 1904, 1910. Mai: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Juin: LESSERT, 1904, 1910.

*Zelotes femellus* (L. Koch, 1866)

*Prosthesima femella.*

**Répartition.** Corse: KRAUS, 1955; SENGLET, 2004; SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914. — Italie. Europe du Sud. **Période.** — *Femelle.* Juin: SENGLET, 2004.

*Zelotes fulvaster* (Simon, 1878)

*Prosthesima fulvastra.*

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914. — Connue seulement de Corse.

*Zelotes fulvopilosus* (Simon, 1878)

*Melanophora fulvopilosa*; *Prosthesima fulvopilosa.*

[SIMON, 1914 note: «Nous ne sommes pas absolument certains que le mâle et la femelle que nous attribuons au *Z. fulvopilosus* soient réellement de même espèce, car leurs affinités semblent un peu différentes: tandis que la femelle est très voisine de *Z. longipes*, le mâle ressemble bien plus à *Z. clivicola*»]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. f.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Isère: SIMON, 1878a (*P. f.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1914. Var: SIMON, 1898c (*M. f.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Alpes du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1914. Espagne. Baléares. **Altitude.** Jusqu'à 720 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1966. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1933b. Juillet: CORNIC, 1978.

*Zelotes fuscipes* (L. Koch, 1866)

*Prosthesima f.*; *Prosthesima rubicundula*; *Trachyzelotes f.*; *Z. rubicundulus*; *Z. rubicundus.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957 (*Z. rubicundulus*), 1965 (*Z. rubicundus*); SIMON, 1878a (*P. r.*); SOYER, 1966 (*Z. rubicundulus*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*P. r.*), 1878a (*P. r.*), 1914 (*Z. rubicundulus*). Corse: CANARD, 1989 (*Z. rubicundulus*); SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914. Dordogne: PLATNICK & al., 1984 (*T. f.*). Finistère: DENIS, 1939a (*Z. rubicundulus*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Z. rubicundulus*);

PLATNICK & al., 1984 (*T. f.*). Var: SIMON, 1878a (*P. r.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*Z. rubicundulus*). — Région méditerranéenne et littoral de l'océan jusqu'à l'île de Ré: SIMON, 1914 (*Z. rubicundulus*). Espagne, Italie (*T. f.*). Méditerranée, Chine (*T. f.*). **Altitude.** Jusqu'à 540 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1966. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre: CANARD, 1989. Terrains salés: SOYER, 1966. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Février: CANARD, 1989. Mai: DENIS, 1933b. Juin: CORNIC, 1978. Juillet: DENIS, 1939a. — *Femelle.* Février: CANARD, 1989. Mars: PLATNICK & al., 1984. Avril: DENIS, 1933b. Juillet: PLATNICK & al., 1984.

*Zelotes fusciorufus* (Simon, 1878)

*Prosthesima fusciorufa.*

**Répartition.** Corse: SENGLET, 2004; SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914. — Italie. **Habitat.** Marais, sous les pierres et dans les détrit: SIMON, 1878a. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: SENGLET, 2004. — *Femelle.* Juin: SENGLET, 2004.

*Zelotes fuscotestaceus* (Simon, 1878)

*Prosthesima fuscotestacea.*

**Répartition.** Morbihan: SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1941. — Algérie. Maroc. **Altitude.** Jusqu'à 720 m (CORNIC, 1978). **Période.** — *Femelle.* Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1941.

*Zelotes gallicus* Simon, 1914

*Z. pseudoclivicola.*

**Taxonomie.** La synonymie *Z. pseudoclivicola* Grimm, 1982 = *Z. gallicus* est établie par SENGLET, 2004. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1914. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aude: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gers, Gironde, Isère: SIMON, 1914. Lozère: DENIS, 1939b. Morbihan: MURPHY, 1994 (*Z. p.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1953a, 1954a, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; SENGLET, 2004; SIMON, 1914. Savoie (Haute-): SIMON, 1914. Var: DENIS, 1934a. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1914. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964. — Espagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 2810 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1964b, 1965c. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Dune: CLARK & al., 1970; DUFFEY, 1964. Éboulis: DENIS, 1953a. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1963c; SIMON, 1914. Forêt de bouleaux et de hêtres: forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962d, 1964b, 1965c. Forêt de pins maritimes, détrit: CLARK & al., 1970. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Maison: DENIS, 1964b. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Sous des pierres recouvertes de neige: DENIS, 1933b. Taillis de chênes-verts, litière: SOYER, 1966. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Janvier, février: DENIS,

1933b. Mars: DENIS, 1964b. Mai: SIMON, 1914. Juin: DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1954a, 1959d, 1960a, 1964b. Août: DENIS, 1953a, 1963c, 1964b. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1962b; SIMON, 1914. — *Femelle*. Janvier, février: DENIS, 1933b. Avril: DENIS, 1962d; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai: DENIS, 1934a, 1965c. Juin: DENIS, 1962d, 1964b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Juillet: DENIS, 1933b, 1954a, 1959d, 1963c, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1953a, 1962d, 1963c, 1964b; LEDOUX & al., 2003. Septembre: CLARK & al., 1970. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1914. — *Femelle avec cocon*. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1939b, 1964b. Juillet: DENIS, 1939b, 1954a, 1959d, 1963c, 1964b. Août: DENIS, 1964b.

*Zelotes hirtus* (Thorell, 1875)

*Prothesima hirta*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1878a (*P. h.*). [SIMON, 1878a cite cette espèce de Nice, d'après Thorell (1875); cette citation n'est pas reprise par SIMON, 1914]. — Italie.

*Zelotes holosericeus* (Simon, 1878)

*Prothesima holosericea*; *Trachyzelotes h.*

**Répartition.** Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; KERVILLE, 1927, 1932. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1878a (*P. h.*), 1914. — Espagne (*T. h.*). Ouest-Méditerranée (*T. h.*). **Altitude.** De 1880 m jusqu'à 1980 m (DENIS, 1954a; KERVILLE, 1932). **Habitat.** Sous une pierre: KERVILLE, 1927.

*Zelotes laetus* (O. P.-Cambridge, 1872)

*Prothesima antiopa*; *Z. antiopa*.

**Taxonomie.** La synonymie *Z. antiopes* (Simon, 1878) = *Z. laetus* est établie par LEVY, 1998b. **Répartition.** Ardèche: SIMON, 1914 (*Z. a.*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. a.*); SIMON, 1878a (*P. a.*), 1914 (*Z. a.*). — Méditerranée, USA, Mexico, Pérou, Hawaï.

*Zelotes latreillei* (Simon, 1878)

*Melanophora atra*; *Prothesima l.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1878a (*P. l.*); VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Aube: SIMON, 1878a (*P. l.*). Aude: SENGLET, 2004. Calvados, Cantal: SIMON, 1878a (*P. l.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: JUBERTHIE, 1954; LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990b; DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*M. a.*). Finistère: CANARD, 1990b. Gers: LUCANTE, 1880a (*P. l.*). Ile-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990b. Isère: SIMON, 1878a (*P. l.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: CANARD, 1990b. Oise: SIMON, 1878a (*P. l.*). Orne: CANARD, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; DENIS, 1950b, 1951c; LUCANTE, 1880a (*P. l.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d; LUCANTE, 1880a (*P. l.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; SENGLET, 2004; SIMON, 1878a (*P. l.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*P. l.*), 1910 (*P.*

*l.*); PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*P. l.*). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*P. l.*). Vendée: DENIS, 1941, 1946b. Yonne: LUCAS, 1872 (*M. a.*). — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Azerbaïdjan. **Altitude.** Jusqu'à 2350 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: DENIS, 1959d. Bois humides: SIMON, 1878a. Bois, lieux humides: LUCAS, 1872. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1941. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b, 1951c. Forêt, clairière, sous des pierres: DENIS, 1946b. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Jardin: LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; SIMON, 1878a; VILLEPOUX, 1990b. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a. **Période.** — *Mâle*. Avril: LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Mai: LESSERT, 1910; SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1933b; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999. Avril: VEILLON, 1997. Mai: LE PERU, 2004; SIMON, 1878a. Juin: DENIS, 1933b, 1941; SENGLET, 2004; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1950b, 1957a, 1959d; LE PERU, 2004; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898; SENGLET, 2004. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898; VEILLON, 1997. Septembre: DENIS, 1951c. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1950b.

*Zelotes longestylus* Simon, 1914

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1914. — Connue seulement de France.

*Zelotes longipes* (L. Koch, 1866)

*Prothesima l.*; *Prothesima serotina*; *Z. serotinus*.

**Taxonomie.** Cette espèce a été confondue avec *Z. aeneus*; voir la note sous *Z. aeneus*. La synonymie *Z. serotinus* (L. Koch, 1866) = *Z. longipes* est établie par TULGREN, 1946. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b (*Z. s.*). Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1878a (*P. l.*), 1878a (*P. s.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*P. l.*); SIMON, 1878a (*P. l.*). Gironde: DENIS, 1951b (*Z. s.*); LUCANTE, 1880a (*P. s.*). Manche: SIMON, 1878a (*P. l.*). Morbihan: CANARD, 1990b, 1990b (*Z. s.*); SIMON, 1878a (*P. s.*). Moselle: LEBORGNE & al., 1998 (*Z. s.*). Oise: JÉZÉQUEL, 1961 (*Z. s.*); SIMON, 1878a (*P. s.*). Orne: CANARD, 1990b (*Z. s.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*Z. s.*), 1953a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*Z. s.*), 1967d; SIMON, 1878a (*P. l.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*P. l.*). Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895 (*P. l.*). "Seine": SIMON, 1878a (*P. l.*), 1878a (*P. s.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*P. l.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CLARK & al., 1970 (*Z. s.*); DENIS, 1962b (*Z. s.*), 1963c (*Z. s.*), 1964b (*Z. s.*), 1965c (*Z. s.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2790 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Arrière-dune, oyats: CLARK & al., 1970. Bois de pins: SIMON, 1878a. Dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. Dune, oyats: DENIS, 1963c. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c. Forêt de pins maritimes, détritit: CLARK & al., 1970. Friche; lieux cultivés, détritit; lieux sablonneux et

secs: SIMON, 1878a. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Sable, sous des pierres: DENIS, 1963c. Sous une pierre: DENIS, 1950b. Vigne abandonnée: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle*. Juin: CORNIC, 1978; SIMON, 1878a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1963c; LESSERT, 1910; MULLER & *al.*, 1895. Août: DENIS, 1953a, 1962b; LESSERT, 1910; MULLER & *al.*, 1895. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1967d. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1933b, 1962b, 1963c. Mai: DENIS, 1965c; JÉZÉQUEL, 1961. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1965c; SIMON, 1878a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1963c. Août: CORNIC, 1978; DENIS, 1953a. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; CORNIC, 1978; DENIS, 1951b, 1963c, 1967d. Octobre: DENIS, 1963c. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b. Août: DENIS, 1953a.

#### *Zelotes lutetianus* (L. Koch, 1866)

*Drassyllus l.*; *Prosthesima lutetiana*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & *al.*, 1998 (*D. l.*); VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: JUBERTHIE, 1954. Gers: LUCANTE, 1880a (*P. l.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994 (*D. l.*). Loiret: COCQUEMPOT & *al.*, 1984. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. l.*); SIMON, 1878a (*P. l.*). Maine-et-Loire: NOËL & *al.*, 2005 (*D. l.*); VEILLON, 1997 (*D. l.*). Morbihan: CANARD, 1990b. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Orne: CANARD, 1990b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*D. l.*). "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; SIMON, 1878a (*P. l.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1984, 1989, 1990. Somme: SIMON, 1878a (*P. l.*). Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. l.*); SIMON, 1878a (*P. l.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*D. l.*). De l'Europe au Kazakhstan (*D. l.*). **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord de rivière, gravières: HEIDT & *al.*, 1998. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1984, 1989, 1990, 1991. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; VEILLON, 1997. Haie: NOËL & *al.*, 2005. Marécage: HENRY, 1981; MURPHY, 1994; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. **Période.** — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1961b.

#### *Zelotes lyonnети* (Sav. & Aud., 1825)

*Trachyzelotes l.*

**Répartition.** Var: SOYER, 1967. — Italie. De la Méditerranée à l'Asie Centrale, USA, Brésil, Pérou (*T. l.*). **Habitat.** Littoral: SOYER, 1967.

#### *Zelotes manius* (Simon, 1878)

*Melanophora mania*; *Prosthesima mania*.

**Répartition.** Aude, Hérault: SIMON, 1878a (*P. m.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1999a; SENGLET, 2004. Var: SIMON, 1878a (*P. m.*), 1898c (*M. m.*). — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne, Italie. Europe du Sud. **Habitat.** Marais salant; plage, détritus maritimes: SIMON, 1878a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1999a. **Période.** — *Mâle*. Septembre: SIMON, 1878a. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a. — *Femelle*. Septembre: SIMON, 1878a.

#### *Zelotes medianus* Denis, 1935

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Corse: TIBERGHIE & *al.*, 1993b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a. Var: DENIS, 1935a; SOYER, 1967. [La citation (femelle) du Var par DENIS, 1935a, est erronée selon SOYER, 1967, et se rapporte à *Z. dentatidens*] — Connue seulement de France. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Garrigue: SOYER, 1967. Garrigue, litière; pelouse sèche: SOYER, 1966. Sous une pierre: DENIS, 1935a. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1967. Taillis de chênes-verts, litière: SOYER, 1966. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1935a.

#### *Zelotes murcidus* Simon, 1914

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Vaucluse: CORNIC, 1978. — Midi de la France (sans localité précise): SIMON, 1914. Connue seulement de France. **Altitude.** 720 m (CORNIC, 1978). **Période.** — *Femelle*. Septembre: CORNIC, 1978.

#### *Zelotes mutabilis* (Simon, 1878)

*Prosthesima m.*; *Trachyzelotes m.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*P. m.*), 1914. — Espagne, Italie (*T. m.*). Méditerranée (*T. m.*).

#### *Zelotes nilicola* (O. P.-Cambridge, 1874)

*Prosthesima tantula*; *Z. tantulus*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: CORNIC & *al.*, 2004. Corse: SIMON, 1878a (*P. t.*), 1914 (*Z. t.*); TIBERGHIE & *al.*, 1993a (*Z. t.*), 1993b (*Z. t.*). Pyrénées-Orientales, Vaucluse: CORNIC & *al.*, 2004. — Espagne, Italie. Méditerranée, Canaries, USA. **Habitat.** Dune; jardin, sous des chênes-blancs: CORNIC & *al.*, 2004. **Période.** — *Mâle*. Mai à juillet: CORNIC & *al.*, 2004. — *Femelle*. Mai à juillet: CORNIC & *al.*, 2004.

#### *Zelotes oblongus* (C. L. Koch, 1833)

*Prosthesima oblonga*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. o.*). Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1914. Allemagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & *al.*, 1992). **Habitat.** Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992.

#### *Zelotes paroculus* Simon, 1914

**Répartition.** [Aucune localité précise. Note de SIMON, 1914: «Un seul mâle mêlé à nos *Z. pumilus*»]. — Connue seulement de France.

#### *Zelotes pedestris* (C. L. Koch, 1837)

*Melanophora p.*; *Prosthesima p.*; *Trachyzelotes p.*

**Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. Bouches-du-Rhône: PLATNICK & *al.*, 1984 (*T. p.*). Calvados: LUCAS, 1870d (*M. p.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001 (*T. p.*); JOURDE & *al.*, 1999 (*T. p.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*M. p.*). Dordogne: PLATNICK & *al.*, 1984 (*T. p.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*P. p.*); PLATNICK & *al.*, 1984 (*T. p.*); SIMON, 1899 (*M. p.*), 1909a (*M. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: CANARD, 1990b. Maine-

et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*T. p.*); VEILLON, 1997 (*T. p.*). Manche: CANARD, 1990b; LUCAS, 1878b (*P. p.*); PÉTILLON & al., 2004 (*T. p.*). Marne: LUCAS, 1878a (*P. p.*). Morbihan: CANARD, 1990b. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*T. p.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*P. p.*). "Seine": LUCAS, 1876 (*P. p.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. p.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*P. p.*). Vendée: DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*T. p.*). De l'Europe à l'Azerbaïdjan (*T. p.*). **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Bois: BRAUD & al., 2005; LUCAS, 1876. Bord de ruisseau: VEILLON, 1997. Chemin sablonneux: LUCAS, 1878b. Chemins: LUCAS, 1870d. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1941. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins, mousses sèches: DENIS, 1964b. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Jardin: LE PERU, 2004; PLATNICK & al., 1984. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001. Mousses: SIMON, 1909a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Plage, sous des pierres: DENIS, 1959c. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Terrain sec: LUCAS, 1878a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1965c; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910; PLATNICK & al., 1984; TAMBS-LYCHE, 1957; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1964b; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965c; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1964b; EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; PLATNICK & al., 1984; VEILLON, 1997. Juillet: PLATNICK & al., 1984. Août: LUCAS, 1870d, 1878a, 1878b. Septembre: DENIS, 1962b. Octobre: LE PERU, 2004; LUCAS, 1876.

*Zelotes petrensis* (C. L. Koch, 1839)

*Melanophora p.*; *Prosthesima p.*

**Répartition.** Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1878a (*P. p.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1878a (*P. p.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1909a (*M. p.*). Eure-et-Loire: SIMON, 1878a (*P. p.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1967d; KERVILLE, 1932. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880a (*P. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b; DENIS, 1938a. Isère: SIMON, 1878a (*P. p.*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*P. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1900 (*M. p.*). Morbihan: CANARD, 1990b; DENIS, 1938a. Oise: SIMON, 1878a (*P. p.*). Orne: CANARD, 1990b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1951c; LUCANTE, 1880a (*P. p.*); SIMON, 1878a (*P. p.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1878a (*P. p.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910 (*P. p.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910 (*P. p.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. p.*); SIMON, 1878a (*P. p.*). Seine-et-Marne: JÉZÉQUEL, 1961; SIMON, 1878a (*P. p.*). Vendée: DENIS, 1964b. — Toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique,

Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1951c). **Habitat.** Bois: BRAUD & al., 2005. Bois secs, sous les pierres et les détritiques: SIMON, 1878a. Bois, lisière: DENIS, 1959d. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Dune: KERVILLE, 1900. Forêt: DENIS, 1938a; LANCELEVÉE, 1884. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: DENIS, 1938a. Lieu sablonneux: LUCAS, 1882a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Sous une pierre: DENIS, 1951c, 1964b; EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Mars: LE PERU, 2004. Juin: VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1964b. — *Femelle.* Avril: LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1938a; JÉZÉQUEL, 1961; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1997; JÉZÉQUEL, 1961; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1959d; JÉZÉQUEL, 1961. Août: JÉZÉQUEL, 1961; LUCAS, 1882a. Septembre: DENIS, 1951c; EMERIT & al., 1997.

*Zelotes praeficus* (L. Koch, 1866)

*Drassyllus p.*; *Prosthesima latitans*; *Prosthesima praefica*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1878a (*P. l.*). Ariège: DENIS, 1961b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1878a (*P. l.*), 1914. Doubs: EMERIT & al., 1997. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*D. p.*). Morbihan: CANARD, 1990b; SIMON, 1878a (*P. l.*). Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: DENIS, 1943a. Oise: SIMON, 1878a (*P. l.*), 1887a (*P. l.*). Orne: SIMON, 1878a (*P. l.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c; LUCANTE, 1880a (*P. l.*); SIMON, 1878a (*P. l.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 2003; SIMON, 1878a (*P. l.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*D. p.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*P. p.*), 1910 (*P. p.*). "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a (*P. l.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*P. l.*). Var: DENIS, 1937a. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1964b. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*D. p.*). De l'Europe à l'Asie Centrale (*D. p.*). **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de chênes pubescent, litière: SOYER, 1966. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1955c. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, herbes et litière très sèches: DENIS, 1964b. Friche: PASQUET & al., 1992. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1943a. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. — *Femelle.* Février: DENIS, 1933b, 1967d. Avril: DENIS, 1933b. Mai: LESSERT, 1904, 1910. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1955c, 1961b; LE PERU, 2004. Août: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 2003. Septembre: CORNIC, 1978.



*Zelotes pumilus* (C. L. Koch, 1839)*Drassyllus p.*; *Prosthesima vernalis*.

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998 (*D. p.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. v.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*D. p.*). Seine-et-Marne: JÉZÉQUEL, 1961. — Alpes du Dauphiné et Cévennes: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Italie, Suisse (*D. p.*). De l'Europe à l'Asie Centrale (*D. p.*). **Habitat.** Bord de rivière, gravières: HEIDT & al., 1998. **Période.** — *Femelle*. Juillet: JÉZÉQUEL, 1961.

*Zelotes pusillus* (C. L. Koch, 1833)*Drassyllus p.*; *Prosthesima nigrita*; *Prosthesima pusilla*.

**Répartition.** Ain, Calvados: SIMON, 1878a (*P. p.*). Côtes-d'Armor: CANARD, 1990b. Finistère: DENIS, 1940a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*D. p.*); VEILLON, 1997 (*D. p.*). Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: CANARD, 1990b. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise: JÉZÉQUEL, 1961; SIMON, 1878a (*P. p.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1914. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*D. p.*). Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*P. n.*). "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; ROLLARD, 2000; SIMON, 1878a (*P. p.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*P. p.*); SIMON, 1878a (*P. p.*). Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1984, 1989. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Presque toute la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*D. p.*). Paléarctique (*D. p.*). **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (BOSMANS & al., 1986). **Habitat.** Bois humides, sous les pierres et les souches: SIMON, 1878a. Bord d'étang; carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1984, 1989, 1991. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 1999a; PASQUET & al., 1992. Prairie humide: DENIS, 1940a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. **Période.** — *Mâle*. Juin: CORNIC, 1978; JÉZÉQUEL, 1961; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1940a, 1959d; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: CORNIC, 1978; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898.

*Zelotes pyrenaicus* Di Franco & Blick, 2003*Z. reconditus mediocris*.

**Taxonomie.** L'espèce *Zelotes pyrenaicus* Di Franco & Blick, 2003 a une synonymie un peu complexe. Citée sous le nom *Z. reconditus mediocris* n. sbsp. par SIMON, 1914, cette sous-espèce est élevée au rang d'espèce *Z. mediocris* par DI FRANCO, 2002, mais ce nom étant préoccupé, l'espèce est renommée *Z. pyrenaicus* par DI FRANCO & al., 2003. **Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*Z. r. m.*); SIMON, 1914 (*Z. r. m.*). — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1860 m jusqu'à 2350 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1950b. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1950b. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b.

*Zelotes reimoseri* Roewer, 1951*Z. piceus*; *Z. simoni*.

[*Femelle inconnue*]. **Répartition.** Vaucluse: CORNIC, 1978 (*Z. s.*). — Midi de la France: SIMON, 1914 (*Z. p.*). Connue seulement de France. **Altitude.** 830 m (CORNIC, 1978). **Période.** — *Mâle*. Juin: CORNIC, 1978.

*Zelotes rusciniensis* Simon, 1914*Z. circumspectus* [err.]; *Z. lugens*; *Z. massiliensis*.

**Taxonomie.** Les synonymies *Z. lugens* Denis, 1941 = *Z. rusciniensis* et *Z. massiliensis* Soyer, 1967 = *Z. rusciniensis* sont établies par SENGLLET, 2004. **Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966 (*Z. m.*), 1967 (*Z. m.*). Corse: SENGLLET, 2004. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1914; SOYER, 1967 (*Z. m.*). Var: DENIS, 1935a [*Z. circumspectus*, err. selon DENIS, 1941], 1935a; SOYER, 1967 (*Z. m.*). — Espagne. **Altitude.** De 0 m jusqu'à 700 m (SOYER, 1966, 1967). **Période.** — *Femelle*. Septembre: DENIS, 1935a, 1935a.

*Zelotes rusticus* (L. Koch, 1872)*Prosthesima larifuga*; *Prosthesima rustica*; *Urozelotes r.*; *Z. razoumowskyi*.

**Répartition.** Corse: SIMON, 1878a (*P. l.*), 1914 (*Z. r.*). Pyrénées-Orientales. "Seine": SIMON, 1878a (*P. r.*). — Presque toute la France: SIMON, 1914 (*Z. r.*). Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*U. r.*). Cosmopolite (*U. r.*).

*Zelotes sardus* (Canestrini, 1873)*Prosthesima sarda*.

**Répartition.** Calvados: SIMON, 1878a (*P. s.*), 1914. Corse: CANARD, 1989; SENGLLET, 2004; SIMON, 1878a (*P. s.*), 1914. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880a (*P. s.*); SIMON, 1878a (*P. s.*), 1914. — Italie. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (SENGLET, 2004). **Habitat.** Bois: CANARD, 1989. **Période.** — *Femelle*. Mai: SENGLLET, 2004. Septembre: CANARD, 1989.

*Zelotes segrex* (Simon, 1878)*Prosthesima s.*; *Z. declinans*; *Z. labilis*.

**Taxonomie.** Les synonymies *Z. declinans* (Kulczynski, 1897) = *Z. segrex* et *Z. labilis* Simon, 1914 = *Z. segrex* sont établies par SENGLLET, 2004. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a (*P. s.*), 1914. Ardèche: SIMON, 1914. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966 (*Z. d.*), 1967 (*Z. d.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995; SENGLLET, 2004; SIMON, 1914 (*Z. l.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*Z. l.*). — Connue seulement de France. **Altitude.** Jusqu'à 540 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: SIMON, 1914. Pelouse sèche: SOYER, 1966, 1967. **Période.** — *Femelle*. Juin: SOYER, 1967. Septembre: CORNIC, 1978.

*Zelotes subterraneus* (C. L. Koch, 1833)*Melanophora subterranea*; *Prosthesima subterranea*.

[SIMON, 1878a confond les deux espèces *Z. apricum* et *Z. subterraneus* sous le nom *Prosthesima subterranea*]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*P. s.*). Ariège: DENIS, 1961b. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*M. s.*). Charente-Maritime:

BELIN, 2001. Corrèze: JUBERTHIE, 1954. Côtes-d'Armor: CANARD, 1990b; DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1909a (*M. s.*). Finistère: DENIS, 1938a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; KERVILLE, 1932. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Manche: KERVILLE, 1900 (*M. s.*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1939b, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": JÉZÉQUEL, 1961. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*M. s.*); SIMON, 1898b (*M. s.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*P. s.*). Var: SIMON, 1898c (*M. s.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b. Yonne: LUCAS, 1872 (*M. s.*). [DENIS, 1939a indique que les citations de DENIS, 1938a sous *Z. subterraneus* concernent en fait deux espèces, *Z. subterraneus* et *Z. apricorum*, qu'il ne peut plus localiser]. — Tout le centre et le nord de la France: SIMON, 1914. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 3030 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a, 1952c. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, lieux humides: LUCAS, 1872. Bord de mer, sous une pierre: KERVILLE, 1900. Chemins: LUCAS, 1870d. Forêt de chênes: LE PERU, 2004. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Marécage: BELIN, 2001. Sous une pierre: DENIS, 1950b; EMERIT & al., 1997. Torrent, galets: LEDOUX & al., 1996b. **Période.** — *Mâle.* Juin: CORNIC, 1978. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1950b. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle.* Mai: JÉZÉQUEL, 1961; LE PERU, 2004. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a, 1954a; EMERIT & al., 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1939b, 1950b, 1952c, 1955c, 1959d, 1960a. Août: LEDOUX & al., 1996b; LUCAS, 1870d. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1950b, 1961b, 1962b.

*Zelotes talpinus* (L. Koch, 1872)

*Prosthesima talpina*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Isère: SIMON, 1878a (*P. t.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1914. Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995.

*Zelotes tenuis* (L. Koch, 1866)

*Prosthesima circumspecta*; *Z. circumspectus*; *Z. pallidus*.

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1966 (*Z. c.*). Corse: SIMON, 1878a (*P. c.*), 1914 (*Z. c.*). Gers: LUCANTE, 1880a (*P. c.*); SIMON, 1878a (*P. c.*), 1914 (*Z. c.*). Hérault: LEDOUX, 1967 (*Z. c.*). Loire-Atlantique: MURPHY, 1994 (*Z. p.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & al., 1985a (*Z. c.*). Var: DENIS, 1933c (*Z. c.*), 1934a (*Z. c.*); GROS, 1983b (*Z. c.*). Vendée: CANARD, 1990b (*Z. c.*). — Espagne, Suisse, Méditerranée, USA. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Champ en friche: SOYER, 1966. Littoral, bord d'étang: LEDOUX, 1967. Marais salant: MURPHY, 1994. Prairie: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1934a. Juin: LEDOUX, 1967. — *Femelle.* Juillet: GROS, 1983b. Août: LEDOUX, 1967.

*Zelotes thorelli* Simon, 1914

*Prosthesima vespertina* [err.].

[Les citations de SIMON, 1878a ont été faites sous le nom *Prosthesima vespertina*, identifications erronées selon SIMON, 1914]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1878a [*P. vespertina*, err.]. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973, 1983; KABOUCHE & al., 1997; SOYER, 1966. Hérault: SIMON, 1878a [*P. vespertina*, err.]. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; JUBERTHIE, 1954; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1878a [*P. vespertina*, err.]; SOYER, 1965; TAMBS-LYCHE, 1957. Var: DENIS, 1933a, 1934a, 1935a; GROS, 1982; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1878a [*P. vespertina*, err.]. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. — Midi de la France: SIMON, 1914. Espagne. Europe du Sud. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de chênes-lièges: SOYER, 1965. Bord de ruisseau, pierres: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Garrigue: SOYER, 1966. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Maquis de cistes; pelouse à *Brachypodium ramosum*: LEDOUX & al., 1996a. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus*: KABOUCHE & al., 1997. Ripisilve, sous des pierres: LEDOUX, 2000. Rochers, anfractuosités: DENIS, 1933b. Sous une pierre: DENIS, 1934a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Janvier: LEDOUX, 2000. Février: DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1996a. Avril, juillet: DENIS, 1933b. Octobre: DENIS, 1935a; KABOUCHE & al., 1997. Novembre: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle.* Février: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1933b, 1934a; TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: DENIS, 1935a; GROS, 1982. Octobre: DENIS, 1935a. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1934a. — *Femelle avec ses jeunes.* Mai: DENIS, 1934a.

*Zelotes vespertinus* (Thorell, 1875)

*Melanophora vespertina*.

[Mâle inconnu. SIMON, 1914 note: «Je donnais autrefois une attribution erronée au *Prosthesima vespertina* Thorell». Ces citations sont en fait *Z. thorelli*]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1914. Var: SIMON, 1898c (*M. v.*). — Italie. Balkans, Bulgarie.

*Zelotes villicus* (Thorell, 1875)

*Drassyllus v.*; *Prosthesima accepta*; *Prosthesima fuscomicans*; *Prosthesima villica*; *Z. fuscomicans* [sexe non précisé]; *Z. fuscomicans* [femelle].

**Taxonomie.** Selon GRIMM, 1985 la femelle de *Z. fuscomicans* décrite par SIMON, 1914 est synonyme de *Z. villicus*, alors que le mâle est synonyme de *Z. erebeus*. D'autres auteurs, se basant sur les descriptions de SIMON, 1914, ont fait cette confusion. Les citations sous *Z. fuscomicans* sont placées sous l'espèce correcte lorsque le sexe des spécimens est précisé, sinon elles sont placées sous *Z. villicus* et ces données sont donc à prendre avec réserve. **Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Gironde: SIMON, 1914. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990b. Landes: SIMON, 1914. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*D. v.*); NOËL & al., 2005 (*D. v.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*P. a.*), 1910 (*P.*

v.). Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1878a (*P. f.*), 1914 (*Z. f.*). Var: SIMON, 1914 (*Z. f.*). Vendée: DENIS, 1964b (*Z. f.* [femelle]). — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse (*D. v.*). Europe (*D. v.*). **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & *al.*, 1992). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1914. Forêt de pins, mousses sèches: DENIS, 1964b. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Lieu découvert et très chaud, sous une pierre: SIMON, 1878a. Prairie: NOËL & *al.*, 2005. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. Sous une pierre: LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle.* Mai: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1964b; SIMON, 1878a, 1914.

## SPARASSIDAE

*Micrommata ligurinum* (C. L. Koch, 1845)*M. ligurina.*

**Répartition.** Aude: SIMON, 1875a (*M. l.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*M. l.*); DENIS, 1954b; KABOUCHE & *al.*, 1997; SOYER, 1963 (*M. l.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: KRAUS, 1955 (*M. l.*); SIMON, 1874b (*M. l.*), 1875a (*M. l.*). Gard: EMERIT & *al.*, 1994. Gers: LUCANTE, 1880b (*M. l.*); SIMON, 1875a (*M. l.*). Hérault: EMERIT & *al.*, 1990; SIMON, 1875a (*M. l.*). Indre-et-Loire: SIMON, 1932. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Lot: LUCANTE, 1880b (*M. l.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; SIMON, 1932. Morbihan: MARC, 1990a; MURPHY, 1994 (*M. l.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a. Var: BIGOT & *al.*, 1987a (*M. l.*), 1987b; DENIS, 1933a, 1935b; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie (*M. l.*). De la Méditerranée à l'Asie Centrale (*M. l.*). **Altitude.** Jusqu'à 930 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois: DENIS, 1967e. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & *al.*, 1999a. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & *al.*, 1987b. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & *al.*, 1997. Garrigue calcaire: EMERIT & *al.*, 1990. Maison: DENIS, 1967e. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Prairie: LEDOUX & *al.*, 1999a, 1999b. *Salicornietum*: BIGOT, 1965; EMERIT & *al.*, 1994. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1967d, 1967e. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1967e. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a.

*Micrommata virescens* (Clerck, 1757)

*M. fulva*; *M. ornata*; *M. rosea*; *M. roseum*; *Sparassus v.*

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Ariège: DENIS, 1960a (*M. roseum*), 1961b (*M. roseum*); LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963 (*M. roseum*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*M. rosea*); LUCAS, 1870d (*S. v.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1932 (*M. roseum*). Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b. Gers: LUCANTE, 1880b, 1880b (*M. o.*). Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990a (*M. roseum*). Landes: LUCANTE,

1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*M. roseum*). Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a. Marne (Haute-): SIMON, 1875a (*M. o.*). Morbihan: MARC, 1990a (*M. roseum*). Nord: GOULLIART, 1980. Oise: SIMON, 1874b (*M. o.*), 1875a (*M. o.*). Orne: MARC, 1990a (*M. roseum*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*M. roseum*), 1955c (*M. roseum*), 1960a (*M. roseum*); LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d (*M. roseum*); LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987; DENIS, 1933b (*M. roseum*), 1961b (*M. roseum*), 1961c (*M. roseum*), 1967d (*M. roseum*); LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; MULLER & *al.*, 1895. "Seine": SIMON, 1874b (*M. o.*), 1875a (*M. o.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884, 1884 (*M. o.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976, 1976 (*M. o.*); SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1888b, 1888b (*M. o.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978 (*M. roseum*); LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b (*M. roseum*), 1963c (*M. roseum*), 1964b (*M. roseum*), 1965c (*M. roseum*); DUFFEY, 1964 (*M. roseum*). — Toute la France sauf la région méditerranéenne: SIMON, 1932 (*M. roseum*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1960 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1965c. Aulnes: LEDOUX & *al.*, 1996c. Bois: DENIS, 1960a; GOULLIART, 1980; SIMON, 1875a, 1875a. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, clairière: LUCAS, 1870d. Bois, litière: BRAUD & *al.*, 2005. Bord d'étang: CHANSIGAUD, 1991. Bord de torrent, sur un noisetier: DENIS, 1955c. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Champ: LEDOUX & *al.*, 1996a. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Dune: DENIS, 1962b; DUFFEY, 1964. Dune, oyats: DENIS, 1963c. Forêt: DENIS, 1964b; LANCELEVÉE, 1884, 1884; ROSELLE, 1888b. Forêt d'épicéas, au sol: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de chênes, clairière: LE PERU, 2004. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt, allée: VEILLON, 1997. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976, 1976; LEDOUX, 2000. Friche: VEILLON, 1997. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Lieu ombragé et humide, grandes herbes: LUCAS, 1878a. Maison: BRAUD & *al.*, 2005. Marécage: BELIN, 2001; LANCELEVÉE, 1884. Pelouse: SCHALLER, 2000. Pelouse à *Brachypodium*, sous les pierres: LEDOUX & *al.*, 1996a. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; SIMON, 1875a; VEILLON, 1997. Prairie en friche: DENIS, 1963c; LE PERU, 2004. Prairie très humide: LE PERU, 2004. Rhododendrons: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Sous une pierre: CORNIC, 1978. Taillis de chênes, litière: SOYER, 1963. Tourbière: LEDOUX & *al.*, 1996c; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1950b. Août: LUCAS, 1870d, 1882a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965c, 1967d; VEILLON, 1997. Juin: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1959d; LE PERU, 2004. Août: LUCAS, 1870d, 1878a, 1882a. — *Femelle avec cocon.* Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1955c, 1960a, 1961b.

*Olios argelasius* (Walckenaer, 1806)

*O. spongitaris*; *Sparassus a.*; *Sparassus spongitaris*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (S. s.); SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1874b (S. s.), 1875a (S. s.). Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aude: SIMON, 1875a (S. s.). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (O. s.); SOYER, 1963. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1874b (S. s.), 1875a (S. s.), 1932. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Garonne (Haute-): SIMON, 1875a (S. s.). Gers: LUCANTE, 1880b (S. s.); SIMON, 1875a (S. s.). Gironde: LUCANTE, 1880b (S. s.); SIMON, 1874b (S. s.), 1875a (S. s.). Hérault: DENIS, 1963e; EMERIT & al., 1985; SIMON, 1874b (S. s.), 1875a (S. s.). Landes: LUCANTE, 1880b (S. s.); SIMON, 1875a (S. s.). Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (S. s.). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1933d (O. s.); LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; SIMON, 1874b (S. a.), 1875a (S. a.), 1875a (S. s.). Var: BECKER, 1880 (S. s.); BIGOT, 1993 (O. s.); BIGOT & al., 1979 (O. s.), 1987a (O. s.), 1988 (O. s.); DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993 (O. s.); SIMON, 1898c (S. s.). Vaucluse: SIMON, 1875a (S. s.). [SIMON, 1932 indique que les citations de Gironde sont probablement erronées, et que celle des Landes n'a pas été confirmée. Il note: «Nous n'avons observé l'espèce que dans la région strictement méditerranéenne». — Midi de la France: SIMON, 1932. Espagne, Italie. Méditerranée. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois de chênes-verts: KOVOOR & al., 2000. Bord de rivière, fourrés de saules et *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Buissons: CANARD, 1989. Cupules de glands: DENIS, 1934a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Garrigue: SOYER, 1963. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Lieux arides et pierreux: SIMON, 1875a. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994. Sous les écorces; sous une pierre: DENIS, 1934a. Taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a. Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle.* Janvier: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a. Juillet: DENIS, 1963e. — *Femelle avec cocon.* Mai: DENIS, 1934a.

## PHILODROMIDAE

*Paratibellus oblongiusculus* (Lucas, 1846)

*Tibellus o.*

**Répartition.** Ardèche: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: SIMON, 1875a (T. o.), 1932. Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Pelouse: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle.* Juillet: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon.* Août: LEDOUX, 1993.

*Philodromus albidus* Kulczynski, 1911

*P. rufus* [err.].

**Taxonomie.** Selon SEGERS, 1989, l'espèce *Philodromus albidus* Kulczynski, 1911 a parfois été confondue avec *P. rufus* Walckenaer, 1826. Cet auteur attribue à *P. albidus* la citation de DONDALE, 1972 faite sous le nom *P. "near" rufus*, et selon lui, les descriptions du palpe mâle de *P. rufus* par LOCKET & al., 1951 et ROBERTS, 1985 sont en fait celui de *P. albidus*. La répartition de *P. rufus* doit donc être prise avec réserve. SEGERS, 1989 indique: «A re-examination of all specimens of *P. rufus* (s. lat.) in several Belgian collections has revealed that *P. albidus* is much more common than *P. rufus*, though both species are rare». **Répartition.** Jura: DONDALE, 1972 [*P. rufus* ("near"), (= *P. albidus*, selon SEGERS, 1989)]. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. "Seine": DONDALE, 1972 [*P. rufus* ("near"), (= *P. albidus*, selon SEGERS, 1989)]. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Europe de l'Ouest. **Habitat.** Bois, pins: DONDALE, 1972. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Femelle.* Juin: LEDOUX & al., 2002. Août: LEDOUX & al., 2003.

*Philodromus albopictus* Simon, 1875

[Mâle inconnu. Cette espèce n'est pas reprise par SIMON, 1932. Cela incite à douter de sa validité, bien qu'elle soit aussi citée d'Espagne]. **Répartition.** Ariège: LUCANTE, 1880b. Charente-Maritime: SIMON, 1876b. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875b. — Espagne.

*Philodromus aureolus* (Clerck, 1757)

*P. politus.*

[SIMON, 1932 regroupe sous ce nom *P. aureolus* et *P. cespitum*. Ces deux espèces ont pu être confondues par les autres auteurs. Leur répartition est à considérer avec réserve]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Ardennes: LENICE, 1992. Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870e. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1875a, 1875a (*P. p.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: SIMON, 1932. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Orne: YSNEL, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1961b, 1963e; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; MULLER & al., 1895. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; GROS, 1983a; LUCAS, 1875. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884.

Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880, 1882; DENIS, 1934a, 1935a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1400 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois: DENIS, 1941; LUCAS, 1875. Bois de chênes: LUCAS, 1878a. Buissons et herbes: SIMON, 1932. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de chênes: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Garrigue: SOYER, 1963. Haie de thuyas: VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Lande: DENIS, 1938a. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 1999. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: PASQUET & al., 1992; ROSELLE, 1887. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sur une route: DENIS, 1959d. Taillis de chênes: SOYER, 1963. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: CORNIC, 1978. Mai: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1934a, 1965c. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1938a, 1964b; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1959d. Août: LUCAS, 1870e. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1967e. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1941, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1961b, 1963e; GROS, 1983a; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 1996a, 1996b, 2003; LUCAS, 1870e, 1878a. Septembre: EMERIT & al., 1999; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a.

***Philodromus buchari*** Kubcova, 2004

**Répartition.** Vaucluse: MUSTER & al., 2004a. — [Europe centrale: KUBCOVA, 2004]. **Période.** — *Mâle.* Mai: MUSTER & al., 2004a.

***Philodromus buxi*** Simon, 1884

*P. armoricus.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche: SIMON, 1932. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*P. a.*). Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. "Seine": ROLLARD, 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 960 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bord de rivière: DENIS, 1938a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1960a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1967e; LEDOUX, 2000.

***Philodromus cespitum*** (Walckenaer, 1802)

[SIMON, 1932 regroupe *P. cespitum* sous le nom de *P. aureolus*. Ces deux espèces ont pu être confondues par les autres auteurs. Leur répartition est à considérer avec réserve]. **Répartition.** Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990c. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; YSNEL, 1990c. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique: YSNEL, 1990c. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990c. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Var: KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de mélèzes: LEDOUX & al., 1996c. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 1999. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2002. Prairie avec buissons: LEDOUX & al., 1999a. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, chênes: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002. Juillet: LEDOUX & al., 1996c. Août: LEDOUX, 1993. Septembre: VEILLON, 1997.

***Philodromus collinus*** C. L. Koch, 1835

[SIMON, 1932 regroupe *P. praedatus* sous le nom *P. collinus*. Ces deux espèces ont pu être confondues par les autres auteurs. Leur répartition est à considérer avec réserve]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1961b. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: YSNEL, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Var: BIGOT & al., 1987a, 1988; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (BOSMANS & al., 1986; LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois de conifères: SIMON, 1932. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de chênes-lièges: BIGOT

& al., 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX & al., 1996c. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Sur buis et sur pins: CORNIC, 1978. **Période.** — *Mâle*. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle*. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1961b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996b, 2003. Septembre: EMERIT & al., 1999. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1961b.

***Philodromus corticinus*** (C. L. Koch, 1837)

*P. laricium*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a (*P. l.*), 1932. Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Corse: KRAUS, 1955. Jura, Lozère: SIMON, 1932. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Habitat.** Rochers blancs recouverts de lichens: SIMON, 1932. Troncs d'arbres: SIMON, 1875a, 1932. **Période.** — *Femelle avec cocon*. Juillet: SIMON, 1875a.

***Philodromus dispar*** Walckenaer, 1826

*P. limbatus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; MARC, 1990b; YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne: LUCAS, 1878a. Morbihan, Orne: YSNEL, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b; SUEUR, 1993. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: DENIS, 1935b, 1936; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (*P. l.*). — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale (USA, Canada: introduit). **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois: DENIS, 1938a, 1967e; LUCAS, 1875; SIMON, 1875a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Buissons et herbes: SIMON, 1932. Bétulaie, au

sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes: BOSMANS & al., 1985a, 1987; LEDOUX & al., 1996a. Forêt de chênes-verts; forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1963c, 1965c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, chênes et pins: DENIS, 1964b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Forêt, litière: DENIS, 1964b. Friche: PASQUET & al., 1992. Garrigue: SOYER, 1963. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande: DENIS, 1938a. Maison, sur une fenêtre: ROSELLE, 1888b. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 1999. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse calcaire; prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. Sur une feuille de yucca: DENIS, 1964b. Taillis de chênes: SOYER, 1963. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Mars: SIMON, 1875a. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1933b, 1936, 1938a, 1965c; SUEUR, 1993. Juin: DENIS, 1933b, 1965c; EMERIT & al., 1997. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1933b, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1933b, 1964b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a, 1964b; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1963c; LUCAS, 1878a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1964b.

***Philodromus emarginatus*** (Schränk, 1803)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aude: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: SIMON, 1874d, 1875a. Corse: SIMON, 1875a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & al., 1985. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Puy-de-Dôme: SIMON, 1875a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1955c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1875a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. "Seine": LUCAS, 1875; SIMON, 1875a. Seine-et-Marne: SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1935b; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1875a. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: LUCAS, 1875. Bois de conifères: SIMON, 1932. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: ROSELLE, 1888b. Garrigue: SOYER, 1963. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: EMERIT & al., 2003. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Oliveraie, sur un châtaignier: KOVOOR & al., 2000. Pins et sapins: SIMON, 1875a. Prairie: LANCELEVÉE, 1884; LEDOUX & al., 2003. Sous-bois: LEDOUX & al., 1996a. **Période.**

— *Mâle*. Avril, mai : DENIS, 1933b. Juillet : DENIS, 1961b. — *Femelle*. Juin : DENIS, 1933b. Juillet : DENIS, 1950b, 1955c, 1961b ; LEDOUX & al., 1996a. Septembre : LUCAS, 1875.

*Philodromus fallax* Sundevall, 1833

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SOYER, 1963. Calvados : SIMON, 1875a. Charente-Maritime : BELIN, 2001 ; SIMON, 1874d, 1875a. Gironde : CAUSSANEL, 1970 ; LUCANTE, 1880b. Landes : LUCANTE, 1880b. Manche : LUCAS, 1878b. Nord : GOULLIART, 1980. Pas-de-Calais : BONTE, 2000 ; SIMON, 1875a. Seine-Maritime : SIMON, 1875a. Somme : SIMON, 1875a ; SUEUR, 1993. Vaucluse : SIMON, 1932. Vendée : YSNEL, 1990c. — Région maritime du nord et de l'ouest : SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie. Paléarctique. **Habitat.** Bord de rivière, sable : SIMON, 1932. Dune : GOULLIART, 1980 ; SIMON, 1875a, 1932 ; SOYER, 1963. Estuaire, schorre : BONTE, 2000. Lieu aride et sablonneux : LUCAS, 1878b. Marécage : BELIN, 2001. Plage : SIMON, 1932. Plage, bois échoués : CAUSSANEL, 1970. Plage, sur le sable : SIMON, 1875a. **Période.** — *Femelle*. Août : LUCAS, 1878b.

*Philodromus fuscolimbatus* Lucas, 1846

*P. aureolus fuscolimbatus* ; *P. constellatus*.

[Considérée par SIMON, 1932 à la fois comme une sous-espèce de *P. aureolus* et comme une espèce à part entière. Selon SEGERS, 1992, Simon a confondu *P. fuscolimbatus* avec d'autres espèces]. **Répartition.** Alpes-Maritimes : SEGERS, 1992. Ardèche : MUSTER & al., 2004a. Calvados : GUIBÉ, 1943 (*P. a. f.*), 1946. Corse : SIMON, 1875a (*P. c.*). Manche : SIMON, 1932 (*P. a. f.*). Meurthe-et-Moselle : SIMON, 1875a (*P. c.*). Pyrénées-Orientales : SEGERS, 1992. Seine-et-Marne : SIMON, 1875a (*P. c.*). Var : SEGERS, 1992. — Midi de la France et dans l'ouest dans la zone maritime jusque dans la Manche : SIMON, 1932. Espagne. Portugal, Du Maroc à la Crète, Azerbaïdjan. **Habitat.** Graminées élevées : SIMON, 1932. Talus, herbes : GUIBÉ, 1943. **Période.** — *Mâle*. Juin : MUSTER & al., 2004a ; SEGERS, 1992. Juillet : SEGERS, 1992. — *Femelle*. Juin : SEGERS, 1992. Juillet : GUIBÉ, 1943 ; SEGERS, 1992.

*Philodromus fuscomarginatus* (De Geer, 1778)

*P. auronitens*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1875a, 1875a (*P. a.*). Alpes-de-Haute-Provence, Corse : SIMON, 1875a (*P. a.*). Isère : SIMON, 1875a, 1875a (*P. a.*). Seine-et-Marne : SIMON, 1875a (*P. a.*). — Alpes du Dauphiné : SIMON, 1932. Allemagne, Espagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bois de conifères ; grande forêt, troncs de pins et de mélèzes : SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle*. Juin : SIMON, 1875a.

*Philodromus glaucinus* Simon, 1870

**Répartition.** Corse : SIMON, 1875a, 1932. Landes : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1875a. Var : DENIS, 1934a, 1937a ; KOVOOR & al., 2000. — Midi de la France : SIMON, 1932. Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Buissons : SIMON, 1932. **Période.** — *Femelle*. Mai : DENIS, 1934a.

*Philodromus histrio* (Latreille, 1819)

**Répartition.** Aube, Calvados : SIMON, 1875a, 1932. Eure : LANCELEVÉE, 1884. Hérault : EMERIT & al., 1985. Indre-et-Loire : SIMON, 1932. Morbihan : YSNEL, 1990c. Oise : SIMON, 1932. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996c. "Seine" : SIMON, 1875a, 1932. Seine-Maritime : SIMON, 1932. Seine-et-Marne : SIMON, 1875a, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & al., 1985. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Forêt, clairière et bord des chemins : LANCELEVÉE, 1884. Friche : SIMON, 1932. Friches, bruyères : SIMON, 1875a. Prairie : LEDOUX & al., 1996c. **Période.** — *Femelle*. Septembre : EMERIT & al., 1999.

*Philodromus lepidus* Blackwall, 1870

*P. maritimus*.

**Répartition.** Corse : SIMON, 1875a (*P. m.*), 1932. Vendée : DENIS, 1964b. — Provence : SIMON, 1932. Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Inde. **Habitat.** Bord de mer, sable : SIMON, 1932. Bord de mer, sur le sable : SIMON, 1875a. Forêt en bordure de dune, chênes-verts : DENIS, 1964b. Terrains salés, plantes : SIMON, 1932. **Période.** — *Femelle*. Juin : DENIS, 1964b.

*Philodromus lividus* Simon, 1875

*P. aureolus lividus*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône : SEGERS, 1992. Corse : SIMON, 1875a. Gard : CHANSIGAUD & al., 1994. Var : BECKER, 1880 ; MUSTER & al., 2004a ; SEGERS, 1992. Vaucluse : LEDOUX, 2000. — Région méditerranéenne : SIMON, 1932 (*P. a. l.*). Portugal, Algérie, Maroc. [SIMON, 1932 indique : « *P. a. lividus* E. S. est surtout de la région méditerranéenne, où dans beaucoup de localités, notamment dans les Pyrénées orientales, il remplace le type »]. **Habitat.** Forêt de chênes-verts : CHANSIGAUD & al., 1994. Ripisilve, zone des chênes-verts : LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Juin : CHANSIGAUD & al., 1994 ; SEGERS, 1992. — *Femelle*. Mai : MUSTER & al., 2004a ; SEGERS, 1992. Juin : CHANSIGAUD & al., 1994.

*Philodromus longipalpis* Simon, 1870

[Citée seulement d'Espagne par SIMON, 1932 qui la considère comme une sous-espèce de *P. aureolus*].

**Répartition.** Corse : MUSTER & al., 2004a. Pyrénées-Orientales : SIMON, 1875a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse. Europe. **Période.** — *Femelle*. Mai : MUSTER & al., 2004a.

*Philodromus lunatus* Muster & Thaler, 2004

**Répartition.** Alpes-Maritimes : MUSTER & al., 2004a. — [Méditerranée : MUSTER & al., 2004a].

*Philodromus margaritatus* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ariège : LUCANTE, 1880b. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1932. Dordogne : LUCANTE, 1880b. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : SIMON, 1909b. Garonne (Haute-), Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b. Hérault : EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine :



YSNEL, 1990c. Landes : LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b ; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996c ; LESSERT, 1910. "Seine" : ROLLARD, 2000. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 ; SIMON, 1898b. Somme : ROSELLE, 1888a. Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b. Var : DENIS, 1934a, 1936 ; KOVOOR & al., 2000. — Toute la France : SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2170 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne ; bois de chênes : EMERIT & al., 1997. Bois, troncs d'arbres : SIMON, 1875a. Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & al., 1985. Forêt : LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de mélèzes : LEDOUX & al., 1996c. Forêt, troncs : DOIGNON, 1976. Haie : BRAUD & al., 2005. Jardin : LE PERU, 2004. Jardins, clôtures en planches : SIMON, 1875a. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Prairie : LEDOUX & al., 1996c. Sous des écorces d'ormes : ROSELLE, 1888a. Troncs d'arbres à écorces blanches : SIMON, 1932. Troncs des pins : SIMON, 1909b. **Période.** — *Mâle.* Novembre : LE PERU, 2004. — *Femelle.* Mai : DENIS, 1936. Juin : DENIS, 1933b ; LE PERU, 2004. — *Femelle avec cocon.* Juin : SIMON, 1875a.

*Philodromus parietalis* Simon, 1875

**Répartition.** Pyrénées-Orientales : SIMON, 1875a, 1932. — Espagne. **Habitat.** Troncs de conifères : SIMON, 1932.

*Philodromus poecilus* (Thorell, 1872)

**Répartition.** Gironde : LUCANTE, 1880b. Landes : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1875a. Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b. Oise, "Seine" : SIMON, 1875a. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976. Var : KOVOOR & al., 2000 ; SIMON, 1898c. — Presque toute la France : SIMON, 1932. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Forêt, clairière : DOIGNON, 1976. Rochers exposés au soleil ; troncs d'arbres : SIMON, 1875a. Troncs de conifères, lichens : SIMON, 1932.

*Philodromus praedatus* O. P.-Cambridge, 1871

[SIMON, 1932 regroupe *P. praedatus* sous le nom *P. collinus*. Ces deux espèces ont pu être confondues par les autres auteurs. Leur répartition est à considérer avec réserve]. **Répartition.** Aube : SIMON, 1875a. Corse : MUSTER & al., 2004a. Finistère : LEDOUX & al., 1996a. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Orne : SIMON, 1875a. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1996a. "Seine" : ROLLARD, 2000. Seine-et-Marne : SIMON, 1875a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** 180 m (MUSTER & al., 2004a). **Habitat.** Garrigue : MUSTER & al., 2004a. Haie : BRAUD & al., 2005. Ripisilve : LEDOUX & al., 2002. Sous-bois : LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Mai : MUSTER & al., 2004a. — *Femelle.* Juin : LEDOUX & al., 1996a, 2002.

*Philodromus pulchellus* Lucas, 1846

*P. bistigma* ; *P. debilis*.

**Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1957, 1965 ; BIGOT & al., 1973 ; SOYER, 1963. Corse : SIMON, 1875a (*P. b.*), 1875a (*P. d.*), 1932 ; TIBERGHEN & al., 1993a. Gard : LEDOUX, 2000. Hérault : EMERIT & al., 1985. Loire-Atlantique : SIMON, 1932 ; YSNEL, 1990c. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Morbihan : MURPHY, 1994 ; SIMON, 1932 ; YSNEL, 1990c. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1933b, 1943c ; LEDOUX & al., 1995, 1995 (*P. b.*), 1996a, 1999a, 2003 (*P. b.*) ; TAMBS-LYCHE, 1957. Var : BECKER, 1880 (*P. b.*) ; DENIS, 1933a, 1934a ; KOVOOR & al., 2000 (*P. b.*) ; PONEL & al., 1993. Vaucluse : FAVET, 1984. Vendée : DENIS, 1941, 1964b, 1965c, 1966a ; YSNEL, 1990c. — Midi de la France et ouest jusqu'en Bretagne : SIMON, 1932. Espagne, Italie, Méditerranée. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Arrière-dune : DENIS, 1964b, 1965c ; LEDOUX & al., 1999a. Bois de chênes-lièges : TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de rivière, *Populetum albae* : LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & al., 1985. Buissons et herbes : SIMON, 1932. Bâtiment : DENIS, 1966a. Dune : DENIS, 1965c ; LEDOUX & al., 1999a. Dune, oyats : DENIS, 1964b. Formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-verts, litière : LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins laricio : TIBERGHEN & al., 1993a. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Garrigue, litière ; littoral, *Crithmo-station* : SOYER, 1963. Marécage salé : BIGOT, 1965. Oyats : DENIS, 1964b. Pelouse à *Brachypodium* : SOYER, 1963. Pelouse à plantain caréné : LEDOUX & al., 1995. Ripisilve : LEDOUX, 2000. *Salicornietum* : BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle.* Mai : DENIS, 1934a, 1965c. Juin : DENIS, 1964b, 1966a ; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle.* Mai : LEDOUX, 2000. Juin : DENIS, 1941, 1964b ; LEDOUX & al., 1999a. Juillet : DENIS, 1964b ; LEDOUX & al., 1996a.

*Philodromus ruficapillus* Simon, 1885

**Répartition.** Ardèche : RAPHAËL & al., 1992 ; SIMON, 1932. Doubs : EMERIT & al., 1997. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; LEDOUX & al., 1999a ; SIMON, 1932 ; TAMBS-LYCHE, 1957. — Espagne, Kazakhstan, Tunisie. **Altitude.** 150 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Berges sableuses des rivières, détritiques : SIMON, 1932. Bois de chênes-lièges : TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de rivière, fourrés de saules ; dune : LEDOUX & al., 1999a. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Prairie : LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Mâle.* Juin : EMERIT & al., 1997 ; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle.* Juin : LEDOUX & al., 1999a.

*Philodromus rufus* Walckenaer, 1826

[Selon SEGERS, 1989, cette espèce a souvent été confondue avec *P. albidus*]. **Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes : BECKER, 1882. Ardennes : LENICE, 1992. Aube : SIMON, 1875a. Aude : DELFOSSÉ, 2000b. Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1983 ; SOYER, 1963. Calvados : GUIBÉ, 1946 ; LUCAS, 1874c. Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corrèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1875a. Dordogne : LUCANTE, 1880b. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE,



VÉE, 1884. Finistère: DENIS, 1938a. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Indre-et-Loire: SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Marne (Haute-): SIMON, 1875a. Morbihan: MURPHY, 1994; YSNEL, 1990c. Orne: SIMON, 1875a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1995, 1999a; SIMON, 1932. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989; SIMON, 1875a. Var: BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; SIMON, 1875a. [Les citations du Jura et de la Seine par DONDALE, 1972 sous le nom *P. "near" rufus* sont étonnées selon SEGERS, 1989, et se rapportent à *P. albidus*]. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: BRAUD & al., 2005; DENIS, 1938a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Buissons: SIMON, 1932. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989. Clôture: BRAUD & al., 2005. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1963c, 1964b, 1965c. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b. Garrigue: SOYER, 1963. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 1999; VILLEPOUX, 1990b. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, chênes: LEDOUX, 2000. Sur sol sec et caillouteux: DELFOSSE, 2000b. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. Taillis de chênes: SOYER, 1963. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965c. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1938a, 1964b, 1965c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002. Juillet: DENIS, 1963c, 1964b. Août: DENIS, 1964b.

#### *Philodromus salinarum* Denis, 1939

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Vendée: DENIS, 1939b; MURPHY, 1994. — Connue seulement de France. **Habitat.** Dune: MURPHY, 1994. Marais salant: DENIS, 1939b. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1939b.

#### *Philodromus vagulus* Simon, 1875

##### *P. alpestris.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a, 1932. Alpes-Maritimes: PLANET, 1905. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1939b, 1950b, 1955c. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932. Savoie: SIMON, 1932. Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*P. a.*). — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** De 1710 m (DENIS, 1955c) jusqu'à 2500 m (SIMON, 1932). **Habitat.** Bord de lac, bois: DENIS, 1952c. Éboulis; prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Sous une pierre: SIMON, 1932. Sur les rochers: DENIS, 1955c. **Période.** — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1939b, 1950b, 1952c; LEDOUX & al., 1996a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1955c. Août: DENIS, 1952c.

#### *Thanatus arenarius* L. Koch, 1872

##### *T. mundus.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; SIMON, 1875a. Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963 (*T. m.*). Hérault: EMERIT & al., 1990 (*T. m.*). Landes: LUCANTE, 1880b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Oise: SIMON, 1875a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*T. m.*); LEDOUX & al., 1995, 1999a; TAMBS-LYCHE, 1957 (*T. m.*). "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Var: BECKER, 1882; DENIS, 1935b (*T. m.*); SIMON, 1875a, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1963c. — Presque toute la France: SIMON, 1932 (*T. m.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Dune: LEDOUX & al., 1999a. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Garrigue: SOYER, 1963. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Lieux sablonneux: LUCAS, 1882a. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Prairies exposées au soleil: SIMON, 1875a. Sable, herbes sèches: DENIS, 1963c. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. — *Femelle.* Mai: BONTE, 2000. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1999a. Août: LUCAS, 1882a.

#### *Thanatus atratus* Simon, 1875

##### *T. vulgaris atratus.*

[Considérée par SIMON, 1932 comme une sous-espèce de *T. vulgaris* ("forme alpine")]. **Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a, 1932 (*T. v. a.*). Gard: LEDOUX & al., 1996a (*T. v. a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a (*T. v. a.*), 2003; SIMON, 1932 (*T. v. a.*). — Allemagne, Espagne, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Prairie alpestre: SIMON, 1932. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juin, juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 2003. Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

*Thanatus coloradensis* Keyserling, 1880*T. alpinus*.

**Taxonomie.** La synonymie *T. alpinus* Kulczynski, 1887 = *T. coloradensis* est établie par DONDALE & al., 1964. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1932 (*T. a.*). Savoie: BERLAND, 1937 (*T. a.*). — Alpes du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1932 (*T. a.*). Espagne, Suisse. Holarctique. **Altitude.** 2700 m (BERLAND, 1937). **Période.** — *Femelle.* Juillet: BERLAND, 1937.

*Thanatus dissimilis* Denis, 1960

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1960a. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1400 m (DENIS, 1960a). **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1960a. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1960a.

*Thanatus formicinus* (Clerck, 1757)

**Répartition.** Ain, Aube: SIMON, 1875a. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1932. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Oise: SIMON, 1875a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1995. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": LUCAS, 1876; ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a. Seine-et-Marne: SIMON, 1898b. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1590 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1876. Bord de rivière, sous *Calluna*: BOSMANS & al., 1985a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Herbes humides: DENIS, 1961b. Jardin: LE PERU, 2004. Lieux découverts et sablonneux: SIMON, 1875a. Lieux sablonneux et secs: SIMON, 1932. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Mars, avril: LE PERU, 2004. Mai: LESSERT, 1910. Juin: CORNIC, 1978. — *Femelle.* Avril: LE PERU, 2004. Mai: CORNIC, 1978. Juin: CORNIC, 1978; LE PERU, 2004. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1961b. Août: LUCAS, 1882a. Octobre: LUCAS, 1876.

*Thanatus lineatipes* Simon, 1870

**Répartition.** Bouches-du-Rhône, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1932. — Espagne. Méditerranée, Géorgie.

*Thanatus rayi* Simon, 1875

**Répartition.** Aube: SIMON, 1875a, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Espagne. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Période.** — *Femelle.* Juin: CORNIC, 1978.

*Thanatus sabulosus* (Menge, 1875)*T. gratosus*.

**Répartition.** Allier: SIMON, 1932. Alpes (Hautes-), Aube: SIMON, 1875a (*T. g.*), 1932. Dordogne, Isère: SIMON, 1932. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1932. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois, sous les

touffes d'herbes: SIMON, 1875a. Lieux secs, sous les pierres: SIMON, 1932. Sous une pierre: LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1932. Juin: LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Août, septembre: SIMON, 1932.

*Thanatus striatus* C. L. Koch, 1845*T. hirsutus*; *T. jugorum*; *T. ursus*.

**Taxonomie.** La synonymie *T. jugorum* Simon, 1916 = *T. striatus* est établie par MUSTER & al., 2004b. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a (*T. u.*), 1932. Ardèche: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SIMON, 1932; SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & al., 1989. Isère: SIMON, 1932. Loire-Atlantique: YSNEL, 1990c. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: YSNEL, 1990c. Oise: SIMON, 1932. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; SIMON, 1932. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1932 (*T. j.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (*T. j.*); SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a (*T. j.*); SIMON, 1916 (*T. j.*), 1932 (*T. j.*). Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998. "Seine": SIMON, 1932. Somme: SIMON, 1875a (*T. h.*), 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2020 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Dune: SIMON, 1932; SOYER, 1963. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Dune, litière: DENIS, 1950c. Dune, sur le sable au pied des grosses touffes de graminées: SIMON, 1875a. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt marécageuse: SIMON, 1932. Friche: LEBORGNE & al., 1998; VEILLON, 1997. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & al., 1970. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Littoral, zone halophile à salicorne: SOYER, 1963. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Prairie: SIMON, 1875a, 1932. Prairie marécageuse: LEDOUX, 2000. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre: SIMON, 1916. Tas de cailloux très secs: DENIS, 1957a. Tourbière: SIMON, 1932. **Période.** — *Mâle.* Avril: CLARK & al., 1970. Mai: DENIS, 1950c. Juillet: DENIS, 1957a; SIMON, 1875a, 1932. — *Femelle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a. Juin: LEDOUX, 2000. Juillet: CORNIC, 1978; SIMON, 1932. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1932.

*Thanatus vulgaris* Simon, 1870*T. major*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): HELSDINGEN, 1995. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1973, 1983; DENIS, 1954b; SOYER, 1963. Cher: DENIS, 1943b. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1875a, 1875a (*T. m.*), 1932. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Hérault: EMERIT & al., 1990. Lozère: DENIS, 1939b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1875a (*T. m.*); TAMBS-LYCHE, 1957. Var: BECKER, 1880; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Provence, Languedoc: SIMON, 1932. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (HELSDINGEN, 1995). **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al.,

1999a. Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1954b. Broussailles: CHANSIGAUD & al., 1994. Garrigue: KOVOOR & al., 2000; SOYER, 1963. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Lieu aride et sablonneux: SIMON, 1875a. Lieux sablonneux: KOVOOR & al., 2000. Marécage salé: BIGOT, 1965. Milieu urbain, places publiques: SIMON, 1875a. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Plage: TAMBS-LYCHE, 1957. Prairie: SIMON, 1932. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Mai: TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1933b, 1939b, 1943b; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1939b. — *Femelle*. Mai: TAMBS-LYCHE, 1957. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1939b; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: CANARD, 1989; CORNIC, 1978; DENIS, 1939b. Août: LEDOUX, 1993.

#### *Tibellus macellus* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a, 1932. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1875a, 1932. Marne: SIMON, 1932. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Var: DENIS, 1935b; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1875a, 1932. — Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Juillet: CANARD, 1989; CORNIC, 1978; DENIS, 1948b; LEDOUX & al., 1996a.

#### *Tibellus maritimus* (Menge, 1875)

**Taxonomie.** Les espèces *T. maritimus*, *T. oblongus* et *T. parallelus* ont souvent été confondues par les auteurs. Ainsi selon PLATNICK, 2004, les descriptions et citations de *T. parallelus* par SIMON, 1932, se rapportent à *T. oblongus* alors que les descriptions et citations de *T. oblongus* par ce même auteur se rapportent à *T. maritimus*. Les citations plus récentes de *T. parallelus* paraissent devoir être rapportées à *T. oblongus*. Quant aux citations de *T. oblongus*, il est difficile de savoir à quelle espèce les rapporter. La solution, quelque peu arbitraire, adoptée ici est de placer sous *T. oblongus* toutes les citations faites sous le nom de *T. parallelus*, et de laisser les autres citations sous leur nom d'origine. Certaines citations placées sous *T. oblongus* se rapportent donc à *T. maritimus*. La répartition de ces espèces est à prendre avec réserve. **Répartition.** Ardennes: LENICE, 1992. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Eure: EMERIT & al., 2003. Loir-et-Cher: HENRY, 1981. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. "Seine": ROLLARD, 2000. Vendée: DUFFEY, 1964. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Dune: DUFFEY, 1964; SOYER, 1963. Estuaire, schorre: BONTE, 2000. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; HENRY, 1981. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Mai: EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Mai: EMERIT & al., 2003.

#### *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)

*Thanatus o.*; *T. parallelus* [err.]; *T. propinquus*.

**Taxonomie.** Voir la note de taxonomie sous *T. maritimus*. La répartition de ces espèces est à prendre avec réserve. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a (*T. p.*). Ardennes: LENICE, 1992. Aube: SIMON, 1875a, 1875a (*T. p.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; DENIS, 1954b; SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946 [*T. parallelus*, err. et *T. oblongus*]; LUCAS, 1870d (*T. o.*); SIMON, 1875a. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1932 [*T. parallelus* err.]. Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990c [*T. parallelus*, err.], 1990c. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a (*T. p.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Marne: LUCAS, 1878a (*T. o.*). Morbihan: YSNEL, 1990c [*T. parallelus*, err.], 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord: GOULLIART, 1980. Oise: SIMON, 1875a (*T. p.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999; SIMON, 1875a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (*T. o.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; LUCAS, 1875 (*T. o.*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a, 1875a (*T. p.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1875a. Seine-et-Marne: COCQUEMOT & al., 1989; DOIGNON, 1976, 1976 (*T. p.*); SIMON, 1898b (*T. p.*). Somme: ROSELLE, 1887; SIMON, 1875a. Var: BIGOT & al., 1987a; DENIS, 1933a [*T. parallelus*, err. et *T. oblongus*] 1933a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1875a (*T. p.*). Vendée: DENIS, 1962b [*T. parallelus*, err.], 1963c [*T. parallelus*, err. et *T. oblongus*], 1964b [*T. parallelus*, err.], 1965c [*T. parallelus*, err.]; DUFFEY, 1964; YSNEL, 1990c. Vienne: DUREPAIRE & al., 1994. Yonne: LUCAS, 1872 (*T. o.*). — Toute la France: SIMON, 1932 [*T. parallelus*, err. et *T. oblongus*]. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Bois: DENIS, 1967e; LUCAS, 1875. Bois, grandes herbes: LUCAS, 1878a. Bord d'étang: LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1965c; DUFFEY, 1964; GOULLIART, 1980; LEDOUX & al., 1999a; SOYER, 1963. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, clairière, litière: DENIS, 1963c. Forêt, clairière; forêt, clairière, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Jardin: LENICE, 1992. Lande: LE PERU, 2004. Lande humide: DUREPAIRE & al., 1994. Lieux humides et herbus; lieux sablonneux et secs: SIMON, 1875a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marais, roseaux secs: ROSELLE, 1887.

Marécage: BELIN, 2001; SIMON, 1932. Oyats: DENIS, 1963c, 1964b. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1932. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Therobra-chypodion: BIGOT, 1965. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b, 1963c; LEDOUX, 2000. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1965c, 1967e; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1964b; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1963c. Août: LE PERU, 2004; LUCAS, 1870d, 1878a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875.

#### THOMISIDAE

ONO, 1988 a établi la synonymie *Psammitis* = *Xysticus*. Cette synonymie est adoptée ici, les espèces qui étaient placées dans le genre *Psammitis* (*P. bufo*, *P. caperatus*, *P. cribratus*, *P. robustus*, *P. sabulosus*) se retrouvent donc dans le genre *Xysticus*.

Deux noms sont exclus de la liste: *Oxyptila bauderi* Simon, 1877, décrite sur une femelle juvénile, est considérée *nomen dubium* par WUNDERLICH, 1994e; *Xysticus intersectus* (Foucroy, 1785) est une espèce inconnue selon BONNET, 1959, elle n'est pas citée par SIMON et ne figure pas dans le catalogue de PLATNICK, 2004. À propos de la citation d'*Oxyptila bauderi* par SIMON, 1932, on peut noter la contradiction suivante: la légende du dessin de l'épigyne mentionne «exemplaire d'Espagne», et l'auteur écrit plus loin «Nous l'avons aussi indiqué d'Espagne mais par confusion avec une espèce de même faciès, devenue le type du genre *Platyxysticus* Dalmas».

#### *Coriarachne depressa* (C. L. Koch, 1837)

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Isère. "Seine": SIMON, 1875a. Var: DENIS, 1937a. [SIMON, 1932 doute de sa citation de la "Seine": «Je l'ai aussi indiqué des environs de Paris, ce qui n'a pas été confirmé»]. — Jura et Alpes: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Conifères: SIMON, 1932.

#### *Coriarachne versicolor* (Keyserling, 1880)

##### *Bassaniana* v.

**Taxonomie.** L'espèce *Coriarachne versicolor* Keyserling, 1886 a été transférée dans le genre *Bassaniana* par ONO, 1988. **Répartition.** Landes: SIMON, 1932. [SIMON, 1932 indique: «Espèce américaine connue de France par un seul mâle peut-être par suite d'une introduction accidentelle»]. — Amérique du Nord (*B. v.*).

#### *Diaea dorsata* (Fabricius, 1777)

[SIMON, 1932 a confondu sous ce nom les deux espèces *D. dorsata* et *D. livens*]. **Répartition.** Ain: CHAN-SIGAUD, 1991; VILLEPOUX, 1990b. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE,

1880b. Ille-et-Vilaine: MARC, 1990b; YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine": PLANET, 1905; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOU & al., 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888a. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: DENIS, 1937a. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois: SIMON, 1875a. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: CHAN-SIGAUD, 1991. Bruyères: CANARD, 1989. Buissons: SIMON, 1932. Champ de céréales: COCQUEMPOU & al., 1989. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt d'épicéas: LEDOUX & al., 1996b. Forêt de chênes et châtaigniers; forêt de chênes-verts; forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, buissons: PLANET, 1905. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Jardin: CLARK & al., 1970. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Mélezes: LEDOUX & al., 1996c. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois, buisson de houx; tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1965c. Juin: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX & al., 1996c. Septembre: LEDOUX & al., 1996a.

#### *Diaea livens* Simon, 1876

[SIMON, 1932 a confondu sous le nom *D. dorsata* les deux espèces *D. dorsata* et *D. livens*]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 2003. Var: SIMON, 1876c. — Allemagne, Espagne, Suisse. USA, de l'Europe Centrale à l'Azerbaïdjan. **Habitat.** Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX & al., 2003.

#### *Firmicus bivittatus* Simon, 1895

**Répartition.** Gard: SIMON, 1932. — Espagne. Algérie.

#### *Heriaeus hirtus* (Latreille, 1819)

##### *H. hirsutus*; *H. savignyi*; *Thomisus villosus*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1887b (*H. s.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1875a (*H. s.*). Ardèche: LUCAS, 1870b (*T. v.*). Ariège: DENIS, 1953b. Aube: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983; DENIS, 1954b; SOYER, 1963. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1875a (*H. s.*), 1932. Doubs: EMERIT &

*al.*, 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*H. h.*); SIMON, 1880a (*H. h.*). Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; EMERIT & *al.*, 1994. Hérault: SIMON, 1875a (*H. s.*). Loiret: SIMON, 1932. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Oise: SIMON, 1880a (*H. s.*), 1932. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. "Seine": SIMON, 1880a (*H. s.*), 1932. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*H. h.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1898b (*H. s.*), 1932. Somme: ROSELLE, 1888a (*H. h.*), 1888b (*H. s.*); SIMON, 1932. Var: BIGOT & *al.*, 1987a; DENIS, 1934a, 1935b, 1937a; SIMON, 1875a (*H. s.*), 1898c (*H. s.*), 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; SIMON, 1875a (*H. s.*). [Les citations de *H. hirsutus* par SIMON, 1875a sont erronées selon PLATNICK, 2004, et se rapportent à *H. melloteei*]. — Espagne, Italie. De l'Europe à la Géorgie. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois: LANCELEVÉE, 1884. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord de canal: DENIS, 1954b. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & *al.*, 1999a. Collines crayeuses et sèches: SIMON, 1880a. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Friche: PASQUET & *al.*, 1992. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Herbes sèches: DENIS, 1934a. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & *al.*, 1994. Maquis de cistes: LEDOUX & *al.*, 1996a. Marécage: ROSELLE, 1888a, 1888b; SIMON, 1880a; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & *al.*, 1996a. Pelouses hautes à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Prairies marécageuses: SIMON, 1932. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Ripisilve, sous des pierres: LEDOUX, 2000. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a. Juin: LEDOUX & *al.*, 1999a. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a; LEDOUX, 2000; TAMBS-LYCHE, 1957. Août: DENIS, 1953b.

### *Heriaeus melloteei* Simon, 1886

*H. hirsutus* [err.]; *H. oblongus*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1875a [*H. hirsutus*, *err.* selon PLATNICK, 2004], 1932 (*H. o.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Eure: SIMON, 1932 (*H. o.*). Gard: DENIS, 1962a (*H. o.*). Loir-et-Cher: SIMON, 1932 (*H. o.*). Morbihan: YSNEL, 1990c (*H. o.*). Moselle: IORIO, 2004a. Oise: SIMON, 1875a [*H. hirsutus*, *err.* selon PLATNICK, 2004]. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b (*H. o.*); LEDOUX, 1993 (*H. o.*); LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003 (*H. o.*); SIMON, 1875a [*H. hirsutus*, *err.* selon PLATNICK, 2004], 1932 (*H. o.*). Seine, Seine-Maritime: SIMON, 1932 (*H. o.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1875a [*H. hirsutus*, *err.* selon PLATNICK, 2004]. Var: DENIS, 1935b (*H. o.*); SIMON, 1932 (*H. o.*). — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Champ: LEDOUX & *al.*, 1996a. Falaises crayeuses sèches: SIMON, 1932. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 2003. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse calcaire thermophile: IORIO, 2004a. Pelouse sèche, parsemée de chênes-verts et de *Viburnum tinus*: DENIS, 1962a. Pelouse à thym: LEDOUX & *al.*, 2003. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2003; SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1932. Août: LEDOUX & *al.*, 2003. — *Femelle*. Juin: LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: SIMON,

1932. Août: DENIS, 1962a; LEDOUX, 1993. Septembre: LEDOUX & *al.*, 1996a. Novembre: LEDOUX & *al.*, 2003.

### *Heriaeus setiger* (O. P.-Cambridge, 1872)

**Répartition.** Corse: SIMON, 1875a, 1932. — Espagne, Paléarctique.

### *Misumena bicolor* Simon, 1875

[Femelle inconnue. SIMON, 1932 indique: «Peut-être une variété de couleur de *M. vatia*» et «Connu par un seul mâle»]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1875a, 1932. — Connue seulement de Corse.

### *Misumena vatia* (Clerck, 1757)

*M. occidentalis*; *M. personata*; *Thomisus vatius*.

**Taxonomie.** La synonymie *M. occidentalis* Kulczynski, 1911 = *M. vatia* est établie par URONES, 1996. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: REHFELDT, 1992; SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955; ROEWER, 1926; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990c. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: YSNEL, 1990c. Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994 (*M. o.*). Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; PIONNEAU, 1911. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: YSNEL, 1990c. Nord: GOULLIART, 1980. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1963e; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1995 (*M. o.*), 1996a, 2003; SIMON, 1916 (*M. p.*), 1932 (*M. o.*). Rhin (Bas-): PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1904. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887; SUEUR, 1992. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880; BIGOT & *al.*, 1987a; DENIS, 1934a (*M. o.*); KOVOOR & *al.*, 2000, 2000 (*M. o.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (*T. v.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1967e; LUCAS, 1875. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de canal, juncs: REHFELDT, 1992. Bord de rivière: LEDOUX & *al.*, 2002. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Champ: LEDOUX & *al.*, 1996a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Feuilles et fleurs: SIMON, 1875a. Fleurs d'ombellifères: GOULLIART, 1980. Fleurs en ombelles: SIMON, 1932. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*,

1995. Forêt: DOIGNON, 1976. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins, hautes herbes: DENIS, 1965c. Forêt de pins, herbes sèches: DENIS, 1962b. Forêt, clairière: LANCELEVÉE, 1884. Friche: VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004. Lisière de bois: LUCAS, 1872. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: BELIN, 2001; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse à thym: LEDOUX & al., 2003. Prairie: KOVOOR & al., 2000, 2000; LEDOUX & al., 1996b, 1996c, 2002, 2003; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Sous-bois: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Mars: ROEWER, 1926. Avril: LEDOUX & al., 2002. Mai: DENIS, 1933b; LESSERT, 1904. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2002; LESSERT, 1904. Juillet: LESSERT, 1904. Août: LEDOUX, 1993. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1965c, 1967e; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904; VEILLON, 1997. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2002; LESSERT, 1904; SUEUR, 1992; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1967e; LESSERT, 1904; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996b, 1996c; VEILLON, 1997. Septembre: LUCAS, 1875. Octobre: LEDOUX & al., 2002.

*Misumenops tricuspoidatus* (Fabricius, 1775)

*Misumena tricuspoidata*; *M. tricuspoidata*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b (*M. t.*). Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & al., 1997 (*M. t.*); SOYER, 1963 (*M. t.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*M. t.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001 (*M. t.*); SIMON, 1876b (*Misumena t.*). Doubs: EMERIT & al., 1997 (*M. t.*). Eure: EMERIT & al., 2003 (*M. t.*); LANCELEVÉE, 1884 (*Misumena t.*); SIMON, 1899 (*Misumena t.*), 1909b (*Misumena t.*). Gard: EMERIT & al., 1994 (*M. t.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*Misumena t.*). Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c (*M. t.*). Loir-et-Cher: HENRY, 1981 (*M. t.*); HILLYARD, 1975 (*M. t.*); LEDOUX & al., 1999b (*M. t.*). Loire-Atlantique: MURPHY, 1994 (*M. t.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002 (*M. t.*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Misumena t.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*M. t.*); VEILLON, 1997 (*M. t.*). Morbihan: MURPHY, 1994 (*M. t.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*M. t.*). Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*Misumena t.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895 (*Misumena t.*); SCHALLER, 2000 (*M. t.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*Misumena t.*), 1910 (*Misumena t.*). "Seine": ROLLARD, 2000 (*M. t.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*Misumena t.*). Somme: ROSELLE, 1891 (*Misumena t.*). Var: DENIS, 1933a (*M. t.*), 1935b (*M. t.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*M. t.*). — Toute la France: SIMON, 1932 (*M. t.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord d'étang, prairie: LEDOUX, 2000. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, végétation à *Fraxinus* et *Populus*: KABOUCHE & al., 1997. Buissons: SIMON, 1932. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Forêt: DOIGNON, 1976. Forêt, clairière: LANCELEVÉE, 1884. Haie: BRAUD & al., 2005. Maré-

cage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; HENRY, 1981; MURPHY, 1994; SCHALLER, 2000; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: SOYER, 1963. Prairie: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve: EMERIT & al., 1994; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Tourbière: GUIBÉ, 1946. **Période.** — *Mâle*. Janvier: LEDOUX, 2000. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1875a. Juin: LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1875a; VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 1997, 2003; VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. — *Femelle*. Avril: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX, 2000. Septembre: EMERIT & al., 2003.

*Monaeses paradoxus* (Lucas, 1846)

**Répartition.** Var: SIMON, 1932. — Espagne, Italie. De l'Europe à l'Azerbaïdjan, Afrique.

*Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801)

*O. horticola*; *Thomisus atomarius*; *Xysticus horticola*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*O. h.*). Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1967d. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870e (*T. a.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1932. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*O. h.*); SIMON, 1899 (*O. h.*), 1909b (*O. h.*). Finistère: LUCAS, 1868 (*X. h.*); YSNEL, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d; KERVILLE, 1932. Gers: LUCANTE, 1880b (*O. h.*). Gironde: CAUSSANEL, 1970. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979; DENIS, 1940a; YSNEL, 1990c. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911 (*O. h.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002. Manche: LUCAS, 1878b (*O. h.*). Morbihan: YSNEL, 1990c. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904 (*O. h.*), 1910 (*O. h.*). "Seine": LUCAS, 1876 (*O. h.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*O. h.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*O. h.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*O. h.*). Var: BECKER, 1880 (*O. h.*); BIGOT, 1993; KOVOOR & al., 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1830 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1876; SIMON, 1875a. Bois, mousses: SIMON, 1932. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b, 1965c. Dune, *Ammophiletum*: CAUSSANEL, 1970. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b. Forêt de pins, herbes couchées: DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière très humide: DENIS, 1963c. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Forêt, mousses, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Garrigue, litière: SOYER, 1963. Herbes: DENIS, 1950b. Jardin: DENIS, 1963c; LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Lande sèche: CANARD,

1979. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lisière de forêt humide, mousses: LE PERU, 2004. Litière très sèche: DENIS, 1963c. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Marécages, mousses: SIMON, 1932. Mousses: SIMON, 1909b. Mousses très humides: DENIS, 1933b. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Prairie: LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Sol humide, sous les pierres: DENIS, 1961b. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1868, 1878b. **Période.** — *Mâle*. Février: DENIS, 1967d. Mars: DENIS, 1964b; LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b. Mai: CORNIC, 1978; LE PERU, 2004. Août: DENIS, 1962b; LUCAS, 1868, 1870e, 1878b. Septembre: DENIS, 1962b, 1963c; EMERIT & al., 1999; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: LEDOUX & al., 2002. Novembre: LEDOUX & al., 2003. Décembre: LE PERU, 2004. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Février: DENIS, 1965c, 1967d. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1933b, 1965c, 1967d. Juin: DENIS, 1933b, 1938a, 1962b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1963c. Août: DENIS, 1962b, 1967d; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1870e. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & al., 1997; LEDOUX & al., 1996a. Octobre: EMERIT & al., 1999; LUCAS, 1876. Novembre: DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a, 2003. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1962b, 1964b. Juillet: DENIS, 1950b, 1960a, 1961b; SIMON, 1875a.

*Ozyptila bicuspis* Simon, 1932

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SOYER, 1963. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1932. Var: DENIS, 1934a, 1935a. — Espagne. **Altitude.** Jusqu'à 1550 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Herbes humides: DENIS, 1934a. Littoral, zone halophile à salicorne: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a, 1950c. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1934a, 1950c. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1957a.

*Ozyptila blackwalli* Simon, 1875

**Répartition.** Aube, Côte-d'Or: SIMON, 1875a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Gers: LUCANTE, 1880b. Isère: SIMON, 1875a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b. "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 200 m (DENIS, 1953b). **Habitat.** Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Friche: VEILLON, 1997. Haie, litière: BRAUD & al., 2005. Herbes sèches: LANCELEVÉE, 1884. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle*. Juin: VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 1997. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Février: DENIS, 1953b. Septembre: EMERIT & al., 1997.

*Ozyptila brevipes* (Hahn, 1826)

**Répartition.** Aube: SIMON, 1875a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Gers: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Morbihan: YSNEL, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Nord:

EMERIT & al., 1999. Orne: SIMON, 1875a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1875a. Var: BIGOT, 1993. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Mousses: SIMON, 1909b. Prairie: PASQUET & al., 1992. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: EMERIT & al., 1999. — *Femelle*. Septembre: EMERIT & al., 1997.

*Ozyptila confluens* (C. L. Koch, 1845)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1932. — Italie. Europe du Sud, Syrie.

*Ozyptila leprieuri* Simon, 1875

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989. — Maroc, Algérie. **Habitat.** Bois de chênes, litière: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Septembre: CANARD, 1989.

*Ozyptila nigrita* (Thorell, 1875)

*O. claveata.*

**Taxonomie.** La synonymie *O. nigrita* = *O. claveata* (Walckenaer, 1837) est établie par DONDALE & al., 1975, mais le nom *O. nigrita*, utilisé par la plupart des auteurs, est maintenu ici. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998 (*O. c.*). Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Aube: SIMON, 1875a, 1932. Calvados: SIMON, 1932. Eure: EMERIT & al., 2003. Isère: SIMON, 1875a. Loire-Atlantique: SIMON, 1932. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*O. c.*). Manche: LUCAS, 1878b; SIMON, 1932. Nord: EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1875a, 1932. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*O. c.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": SIMON, 1875a, 1932. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse (*O. c.*). Paléarctique (*O. c.*). **Altitude.** Jusqu'à 720 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de conifères: SIMON, 1875a, 1932. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Lieux sablonneux: SIMON, 1875a, 1932. Marécage: EMERIT & al., 2003. Sous une pierre: MÜLLER, 1985. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle*. Avril: SIMON, 1875a. Mai: SIMON, 1932. Juin: CORNIC, 1978; SIMON, 1932. Août: LUCAS, 1878b; SIMON, 1875a. — *Femelle*. Février: EMERIT & al., 1999. Avril: LESSERT, 1910. Mai: EMERIT & al., 2003. Juillet: MÜLLER, 1985. Août: LUCAS, 1878b.

*Ozyptila pauxilla* (Simon, 1870)

*O. nigella.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1875a (*O. n.*), 1932 (*O. n.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a; SIMON,



1932 (*O. n.*). — Espagne. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Bord de rivière, *Populeum albae*, sous une pierre; dune: LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Juin: LEDOUX & al., 1999a.

*Ozyptila perplexa* Simon, 1875

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Ariège: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a, 1932. Lozère, Pyrénées-Orientales: SIMON, 1932. — Espagne. Algérie. **Habitat.** Marécage: SIMON, 1932. **Période.** — *Mâle*. Juin: SIMON, 1932.

*Ozyptila praticola* (C. L. Koch, 1837)

*O. caligans*; *Xysticus p.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a (*O. c.*). Aube: SIMON, 1875a. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1874c (*X. p.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999; SIMON, 1876b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003. Gers: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: DENIS, 1940a; YSNEL, 1990c. Isère: SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: YSNEL, 1990c. Nord: EMERIT & al., 1999. Oise: SIMON, 1875a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): MULLER & al., 1895. "Seine": LUCAS, 1876; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; SIMON, 1875a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Aulnaie, litière: BOSMANS & al., 1985a. Bois: BRAUD & al., 2005; LUCAS, 1876. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de hêtres, chênes et charmes: EMERIT & al., 1997. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Éboulis: EMERIT & al., 1997. Friche: PASQUET & al., 1992. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: SIMON, 1875a. Ripisilve, litière: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: LUCAS, 1874c; SIMON, 1875a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. Verger: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle*. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1997; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a, 1999a. Juillet: VEILLON, 1997. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle*. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: EMERIT & al., 1999. Juillet: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Septembre: EMERIT & al., 1997. Octobre: EMERIT & al., 1999; LUCAS, 1876. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle avec cocon*. Juin: SIMON, 1875a.

*Ozyptila rauda* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a, 1932. Ariège: DENIS, 1967d. Aveyron, Cantal: SIMON, 1932. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1932. Lozère: DENIS, 1939b. Meuse, Morbihan, Pas-de-Calais: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. "Seine": SIMON, 1932. Var: KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Litière de chênes: KOVOOR & al., 2000. **Période.** — *Mâle*. Février, décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1939b.

*Ozyptila sanctuaria* (O. P.-Cambridge, 1871)

**Répartition.** Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; SOYER, 1963. Calvados: LUCAS, 1877b; SIMON, 1875a. Finistère: YSNEL, 1990c. Gers, Landes: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: KERVILLE, 1898; LUCAS, 1878b. Orne, Seine, Seine-Maritime: SIMON, 1875a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Vendée: CLARK & al., 1970. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Garrigue: SOYER, 1963. Jardin: CLARK & al., 1970. Marécage salé: BIGOT, 1965. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. *Salicornietum*: BIGOT, 1965. Sous une pierre: LUCAS, 1877b, 1878b. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle*. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: CLARK & al., 1970; LUCAS, 1877b.

*Ozyptila scabricula* (Westring, 1851)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Côtes-d'Armor, Finistère: YSNEL, 1990c. Hérault: EMERIT & al., 1990. Morbihan: YSNEL, 1990c. Oise: SIMON, 1875a. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. Seine, Seine-Maritime, Somme: SIMON, 1875a. Var: BIGOT & al., 1979; KOVOOR & al., 2000. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Pelouses rases: SOYER, 1963. Terrains crayeux ou sableux: SIMON, 1932. Terrains sablonneux: SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle*. Juin: LESSERT, 1904, 1910. Septembre: SIMON, 1875a.

*Ozyptila simplex* (O. P.-Cambridge, 1862)

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Ariège: DENIS, 1961b, 1967d. Aube: SIMON, 1875a. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1875a. Charente-Maritime: SIMON, 1876b. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Eure: EMERIT & al., 2003. Finistère, Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: PÉTILLON & al., 2004; YSNEL, 1990c. Morbihan: YSNEL, 1990c. Moselle: LEBORGNE & al., 1998. Oise: SIMON, 1875a, 1887a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX



& al., 1999a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1875a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1989. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1963c, 1964b, 1965c. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord d'étang: DENIS, 1938a. Bord de canal: DENIS, 1964b. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, herbes couchées: DENIS, 1965c. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Herbes humides: DENIS, 1941. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 1999a; PASQUET & al., 1992; SIMON, 1875a. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sur la boue sèche, herbes: DENIS, 1965c. Sur une route: DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1875a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1959d. Octobre: DENIS, 1967d. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a, 1941; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1961b; LEDOUX, 2000. Septembre: EMERIT & al., 1999, 2003. Novembre: EMERIT & al., 2003. Décembre: DENIS, 1964b. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1963c.

*Ozyptila trux* (Blackwall, 1846)

**Répartition.** Ain: CHANSIGAUD, 1991. Aisne, Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Ariège: DENIS, 1967d. Calvados: ASSELIN & al., 1989; GUIBÉ, 1946; SIMON, 1875a. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Finistère: DENIS, 1940a; YSNEL, 1990c. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Isère, Marne (Haute-): SIMON, 1875a. Morbihan: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Nord, Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1888a. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique (Canada, introduit). **Habitat.** Bois, au sol: CHANSIGAUD, 1991. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Forêt: DENIS, 1938a. Friche: PASQUET & al., 1992. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Lieu humide: LANCELEVÉE, 1884. Marécage: EMERIT & al., 1999; LANCELEVÉE, 1884. Mousses: SIMON, 1909b. Prairie: ROSELLE, 1888a. Sous une pierre: DENIS, 1940a. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Avril: EMERIT & al., 1999. Mai: DENIS, 1967d; EMERIT & al., 2003. Juin: DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999. — *Femelle.* Février: EMERIT & al., 1999. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1999. Octobre: CHANSIGAUD, 1991; DENIS, 1967d; EMERIT & al., 1999. Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1940a.

*Ozyptila umbraculorum* Simon, 1932

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1932. — Espagne. Portugal.

*Pistius truncatus* (Pallas, 1772)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Gard: EMERIT & al., 1994. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: SIMON, 1875a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Morbihan: YSNEL, 1990c. Moselle: SIMON, 1875a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1891. Var: DENIS, 1935b; SIMON, 1875a. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Buissons de chênes: SIMON, 1932. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1891. Forêt humide, sous écorce d'arbre mort: LE PERU, 2004. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Sur un buisson de buis: DENIS, 1933b. **Période.** — *Mâle.* Juin: CORNIC, 1978; SIMON, 1875a.

*Psammitis* (voir *Xysticus*)

*Runcinia lateralis* (C. L. Koch, 1838)

*R. grammica.*

**Taxonomie.** Le nom *R. lateralis*, utilisé par la plupart des auteurs, est maintenu ici (au lieu de *R. grammica*). **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; SOYER, 1963. Charente: SIMON, 1932. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1875a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & al., 1990. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994; YSNEL, 1990c. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1999a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*R. g.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880, 1882; BIGOT & al., 1987a, 1987b; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vienne: SIMON, 1875a, 1932. — Midi de la France, le centre jusqu'à Poitiers, l'ouest jusqu'en Charente et en Anjou: SIMON, 1932. Allemagne, Espagne, Italie (*R. g.*). Paléarctique, Ste Hélène, Afrique du Sud (*R. g.*). **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Bord d'étang: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX, 2000.

Bord de rivière, fourrés de saules et *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Carrière de calcaire; coteau calcaire: VEILLON, 1997. Dune: SOYER, 1963. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Graminées: SIMON, 1932. Littoral, zone halophile: SOYER, 1963. Marécage: BELIN, 2001. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996c, 1999a; SIMON, 1875a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. *Salicornietum*: BIGOT, 1965; EMERIT & al., 1994. Taillis de chênes: SOYER, 1963. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période**. — *Mâle*. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: CANARD, 1989; MÜLLER, 1985. Août: CANARD, 1989. — *Femelle*. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; VEILLON, 1997. Août: CANARD, 1989.

*Synaema globosum* (Fabricius, 1775)

*S. globosa*; *Synaema globosa*; *Synaema g.*; *Thomisus globosus*.

**Répartition**. Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*Synaema globosa*). Ardèche: LUCAS, 1870b (*T. g.*); RAPHAËL & al., 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973 (*Synaema g.*); DENIS, 1954b. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955 (*Synaema g.*); ROEWER, 1926; SIMON, 1875a (*Synaema globosa*), 1932; TIBERGHEN & al., 1993a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b; LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Hérault: DENIS, 1963e; EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Lot: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Lot-et-Garonne: DALINGWATER, 1991; LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Marne: LUCAS, 1878a (*S. globosa*). Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1967d; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*Synaema g.*). Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": LUCAS, 1875 (*S. globosa*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a (*Synaema globosa*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*Synaema g.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*Synaema g.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Synaema g.*). Var: BECKER, 1880 (*Synaema globosa*), 1882 (*Synaema globosa*); BIGOT, 1993 (*Synaema g.*); BIGOT & al., 1979 (*Synaema g.*), 1987a (*Synaema g.*), 1987b, 1988 (*Synaema g.*); DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; CORNIC, 1978. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique (*Synaema g.*). **Altitude**. Jusqu'à 2000 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat**. Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: LUCAS, 1875. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord d'étang:

VEILLON, 1997. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bord de torrent, sur inules: CANARD, 1989. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Clôture: BRAUD & al., 2005. Fleurs en ombelles: SIMON, 1875a, 1932. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994; LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEDOUX & al., 2003. Friche, sur inules: CANARD, 1989. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Maquis, sur inules: CANARD, 1989. Marécage: BELIN, 2001; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 2003; PASQUET & al., 1992. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Sur un buisson: CHANSIGAUD, 1992. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période**. — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a; LE PERU, 2004. Juin: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904. Août: CANARD, 1989. — *Femelle*. Février: CANARD, 1989. Mars: ROEWER, 1926. Avril: LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1934a, 1967e; LE PERU, 2004. Juin: LE PERU, 2004; LESSERT, 1904; VEILLON, 1997. Juillet: CANARD, 1989; DENIS, 1963e, 1967e. Août: LUCAS, 1878a. Septembre: LUCAS, 1875.

*Thomisus citrinellus* Simon, 1875

*T. spinifer*.

**Répartition**. Var: DENIS, 1937a (*T. s.*). — Midi de la France: SIMON, 1932 (*T. s.*). Espagne. Méditerranée, Afrique, Seychelles.

*Thomisus onustus* Walckenaer, 1805

*T. abbreviatus*; *T. albus*; *T. hilarulus*.

**Taxonomie**. La synonymie *T. hilarulus* Simon, 1875 = *T. onustus* est établie par URONES, 1996. **Répartition**. Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881; SIMON, 1875a (*T. h.*), 1932 (*T. h.*). Ardèche: LUCAS, 1870b (*T. abbreviatus*); RAPHAËL & al., 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b. Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; BIGOT & al., 1983; SOYER, 1963. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1874d, 1876b. Corse: KRAUS, 1955; ROEWER, 1926 (*T. albus*); SIMON, 1875a, 1932, 1932 (*T. h.*); TIBERGHEN & al., 1993a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & al., 1985, 1990. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: YSNEL, 1990c. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; TAMBS-LYCHE, 1957. "Seine": ROL-

LARD, 2000. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880; BIGOT & al., 1979, 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1933a, 1934a, 1935a, 1935b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*T. albus*), 1932 (*T. h.*). Vaucluse: CORNIC, 1978, 1978 (*T. h.*); FABRE, 1905; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1964b; DUFFEY, 1964; YSNEL, 1990c. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1100 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord d'étang, prairie: LEDOUX, 2000. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & al., 1992. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bruyères: HILLYARD, 1975. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire: VEILLON, 1997. Dune: DENIS, 1964b; DUFFEY, 1964; LEDOUX & al., 1999a. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Fleurs en ombelles: SIMON, 1875a, 1875a. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins, sur un chêne: DENIS, 1962b. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994; RAPHAËL & al., 1992. Littoral, zone halophile: SOYER, 1963. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Marécage: BELIN, 2001; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. *Salicornietum*: EMERIT & al., 1994. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1933b, 1962b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: VEILLON, 1997. — *Femelle*. Mars: ROEWER, 1926. Mai: DENIS, 1934a. Juin: DELFOSSE, 2000b; DENIS, 1964b; DUFFEY, 1964; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978, 1978. Août: VEILLON, 1997. — *Femelle avec cocon*. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994.

#### *Tmarus horvathi* Kulczynski, 1895

**Répartition.** Gard: EMERIT & al., 2004b; LEDOUX & al., 1996a, 2001. Hérault: EMERIT & al., 2004b. Pyrénées-Orientales: EMERIT & al., 2004b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2001. — Russie, de l'Asie Centrale au Japon. **Altitude.** 950 m (EMERIT & al., 2004b; LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Garrigue; lande à genêts: EMERIT & al., 2004b. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Maquis à *Cystus laurifolius*: EMERIT & al., 2004b. **Période.** — *Mâle*. Avril: EMERIT & al., 2004b. Mai: EMERIT & al., 2004b; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle*. Juillet: EMERIT & al., 2004b; LEDOUX & al., 1996a.

#### *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802)

**Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998; SIMON, 1875a; VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: LUCANTE, 1880b. Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corrèze: JUBERTHIE, 1954. Corse: SIMON, 1875a, 1932. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-), Gers, Gironde:

LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Oise: SIMON, 1875a. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1891. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BIGOT & al., 1987a; DENIS, 1934a; KOVOOR & al., 2000. Vendée: SIMON, 1875a. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arbres sempervirens: SIMON, 1875a. Bois: DENIS, 1967e. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998. Branches de chênes-verts ou d'arbousiers: KOVOOR & al., 2000. Clôture: BRAUD & al., 2005. Forêt: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1891. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Marécage: VILLEPOUX, 1990b. Taillis de chênes: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1933b, 1934a; LESSERT, 1904; SIMON, 1875a. Juin: DENIS, 1933b. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1967e; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1933b; EMERIT & al., 1997. Septembre: EMERIT & al., 1997.

#### *Tmarus piochardi* (Simon, 1866)

**Répartition.** Corse: SIMON, 1875a, 1932. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a, 1937a; KOVOOR & al., 2000. — Provence: SIMON, 1932. Espagne, Italie, Méditerranée. **Habitat.** Buissons exposés au soleil: SIMON, 1875a.

#### *Tmarus staintoni* (O. P.-Cambridge, 1873)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992; SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1963. Doubs: EMERIT & al., 1997. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1932. Var: DENIS, 1934a, 1935b, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1932. — Espagne, Italie, Algérie. **Altitude.** 250 m (RAPHAËL & al., 1992). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Branches de chênes-verts ou d'arbousiers: KOVOOR & al., 2000. Garrigue: SOYER, 1963. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1934a.

#### *Tmarus stellio* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SIMON, 1932; SOYER, 1963. Dordogne, Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1878b, 1932. Gironde: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1878b. Hérault: SIMON, 1932. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Var: BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1875a, 1932. Vaucluse: SIMON, 1932. Vendée: DENIS, 1963c. [SIMON, 1932 ne reprend pas ses citations antérieures des Alpes-de-Haute-Provence et de Gironde]. — Italie, Suisse, Paléarctique. **Habi-**

**tat.** Forêt: LEDOUX & al., 1999b. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1963c. Garrigue: SOYER, 1963. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX & al., 1999b. — *Femelle.* Août: DENIS, 1963c.

*Xysticus acerbus* Thorell, 1872

**Répartition.** Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corse: SIMON, 1875a, 1932. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1909b. Gers: LUCANTE, 1880b. Hérault: SIMON, 1875a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Oise: SIMON, 1875a. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1875a. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & al., 1895. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: DENIS, 1937a; SIMON, 1898c. Vendée: SIMON, 1875a. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois humides: SIMON, 1932. Dune: ROSELLE, 1888b. Friche: VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005. Lieux humides, sous les pierres: SIMON, 1875a. Marécage: EMERIT & al., 2003; SIMON, 1932. Pelouses sèches à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Prairie: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. — *Femelle.* Mai: EMERIT & al., 2003. Juin: EMERIT & al., 1997.

*Xysticus arenicola* Simon, 1875

**Taxonomie.** L'espèce *Xysticus arenicola* Simon, 1875 est maintenue dans la liste, bien que les indications de SIMON, 1932 soient contradictoires à son sujet; page 833 il note: « Espèce connue par une seule femelle, peut-être une forme locale de *X. luctuosus*, mimétique des sables blancs, et ressemblant à *X. sabulosus* » et page 879 il admet la synonymie de *X. arenicola* avec *X. sabulosus*, tout en notant: « Peut-être synonyme de *X. albomaculatus* Kulczynski ». Cette contradiction a été relevée par BONNET, 1959. **Répartition.** Gironde: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. — Connue seulement de France.

*Xysticus audax* (Schrank, 1803)

*X. pini.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Aube: SIMON, 1875a (*X. p.*). Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1875a (*X. p.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*X. p.*); SIMON, 1909b (*X. p.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*X. p.*). Isère: SIMON, 1875a (*X. p.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*X. p.*); SIMON, 1875a (*X. p.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*X. p.*). Mayenne: SIMON, 1875a (*X. p.*). Pas-de-Calais: BONTE, 2000. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1932. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-):

BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880 (*X. p.*); REIBER, 1880 (*X. p.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*X. p.*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a (*X. p.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*X. p.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1875a (*X. p.*). Somme: ROSELLE, 1887 (*X. p.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1880 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois: LUCAS, 1875. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de conifères: SIMON, 1875a, 1932. Jardin: LE PERU, 2004. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Sur les pins: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Mai: BONTE, 2000; LE PERU, 2004. Juin: CORNIC, 1978; LE PERU, 2004. Juillet: CORNIC, 1978. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle.* Avril: LEDOUX & al., 1996a. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1933b; LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1950b. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon.* Juillet: SIMON, 1875a.

*Xysticus bifasciatus* C. L. Koch, 1837

**Répartition.** Ain, Aisne, Allier: SIMON, 1932. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a, 1932. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège, Aube, Aude: SIMON, 1932. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: GROS, 1982. Eure: SIMON, 1899, 1909b. Garonne (Haute-): DENIS, 1967d. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1932. Indre-et-Loire: SIMON, 1932. Isère: SIMON, 1875a, 1932. Oise: SIMON, 1887a, 1932. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Bas-): LEBORNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1932. "Seine": SIMON, 1932. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1932. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b, 1932. Somme: ROSELLE, 1888a. Var: KOVOOR & al., 2000. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt: LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888a; SIMON, 1932. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Jardin: LE PERU, 2004; LENICE, 1992. Prairie: PASQUET & al., 1992; SIMON, 1875a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORNE & al., 1998. **Période.** — *Mâle.* Avril: LE PERU, 2004; LESSERT, 1910. Mai: LE PERU, 2004; LESSERT, 1910; SIMON, 1932. Juin: SIMON, 1932. — *Femelle.* Mars: DENIS, 1967d. Avril: LESSERT, 1904, 1910. Mai: LESSERT, 1910; SIMON, 1932. Juin, juillet: LE PERU, 2004. Septembre, octobre: GROS, 1982. — *Femelle avec cocon.* Juin: SIMON, 1875a.

*Xysticus bliteus* (Simon, 1875)

*Ozyptila blitea.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude: SIMON, 1932 (*O. b.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*O. b.*); SIMON, 1932 (*O. b.*); SOYER, 1953a (*O. b.*), 1963 (*O. b.*). Corse: KRAUS, 1955 (*O. b.*); SIMON, 1875a (*O. b.*), 1932 (*O. b.*). Hérault: SIMON, 1932 (*O. b.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*O. b.*); LEDOUX & al., 1999a (*O. b.*); SIMON, 1932 (*O. b.*); TAMBS-LYCHE, 1957 (*O. b.*). Var: BIGOT, 1993 (*O. b.*); DENIS, 1934a (*O. b.*), 1935a (*O. b.*), 1935b (*O. b.*); KOVOOR & al.,

2000 (*O. b.*); SIMON, 1932 (*O. b.*). — Espagne. Méditerranée. **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & *al.*, 1999a. Bois, sous les cistes: DENIS, 1950c. Herbes sèches: DENIS, 1934a. Lieux secs et arides, sous les pierres: SIMON, 1875a. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Pelouse sèche: SOYER, 1953a. Pelouses rases à *Brachypodium*: SOYER, 1963. Plage: TAMBS-LYCHE, 1957. Sous une pierre: DENIS, 1935a. **Période.** — *Mâle.* Septembre: DENIS, 1935a. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1934a, 1950c. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a.

*Xysticus bonneti* Denis, 1938

*X. johannis lupi.*

**Taxonomie.** La synonymie *X. johannis lupi* Denis, 1952 = *X. bonneti* est établie par HEIMER & *al.*, 1991. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c (*X. j.*); LEDOUX & *al.*, 1996a (*X. j.*), 2003 (*X. j.*). — Espagne. Paléarctique. **Altitude.** 2910 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Champ: LEDOUX & *al.*, 1996a. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2003. **Période.** — *Femelle.* Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996a. Novembre: LEDOUX & *al.*, 2003. — *Femelle avec cocon.* Août: DENIS, 1952c.

*Xysticus bufo* (Dufour, 1820)

*Ozyptila albimana*; *Ozyptila b.*; *Proxysticus b.*; *X. albimanus.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a (*O. b.*). Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*O. a.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a (*O. b.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965 (*O. a.*); BIGOT & *al.*, 1983 (*O. a.*); KABOUCHE & *al.*, 1997; SOYER, 1953a (*O. a.*), 1963 (*O. a.*). Corse: SIMON, 1875a (*O. b.*), 1932 (*X. a.*). Hérault: EMERIT & *al.*, 1990 (*X. a.*). Oise: SIMON, 1875a (*O. b.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a (*X. a.*); DENIS, 1933b (*X. a.*), 1953b (*X. a.*), 1967d (*P. b.*); SIMON, 1875a (*O. b.*). Var: BECKER, 1882 (*O. a.*); DENIS, 1934a (*X. a.*), 1935a (*X. a.*), 1935b (*X. a.*); GROS, 1983a (*P. b.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*P. b.*); SIMON, 1875a (*O. a.*). — Midi de la France: SIMON, 1932 (*X. a.*). Espagne, Italie. Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 540 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Bois de pins, sous les pierres: SIMON, 1875a. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & *al.*, 1997. Garrigue: DENIS, 1953b. Garrigue calcaire: EMERIT & *al.*, 1990. Herbes sèches: DENIS, 1934a. Lieux sablonneux, sous des pierres: SIMON, 1875a. Littoral, *Crithmo-staticion*: SOYER, 1963. Pelouse ensoleillée: SOYER, 1953a. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1963. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle.* Juin: CORNIC, 1978. Septembre: DENIS, 1967d. Octobre: DENIS, 1935a; 1967d. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1933b. Mai: DENIS, 1934a. Juillet, août: GROS, 1983a. Septembre: DENIS, 1935a. Octobre: DENIS, 1953b; KABOUCHE & *al.*, 1997. Décembre: DENIS, 1933b. — *Femelle avec cocon.* Avril: DENIS, 1933b.

*Xysticus caperatus* Simon, 1875

**Répartition.** Corse: SIMON, 1875a, 1932. — Espagne, Italie. Méditerranée, Russie. **Habitat.** Lieux arides, sous les pierres: SIMON, 1875a, 1932.

*Xysticus cor* Canestrini, 1873

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Aude: SIMON, 1932. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse, Gard, Hérault: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a; SIMON, 1932. Var, Vaucluse: SIMON, 1932. — Espagne, Italie, Suisse. Europe du Sud, Açores. **Altitude.** Jusqu'à 1280 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Bois de conifères: SIMON, 1932. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Littoral, *Crithmo-staticion*: SOYER, 1963. Terrain vague: BOSMANS & *al.*, 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1996a. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1933b. Août: LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a.

*Xysticus corsicus* Simon, 1875

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1875a, 1932. — Espagne.

*Xysticus cribratus* Simon, 1885

*X. lalandei.*

[La citation de SIMON, 1875a sous le nom *X. lalandei* se rapporte bien à *X. cribratus*, et non à l'espèce valide *X. lalandei* (Audouin, 1826)]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1875a (*X. l.*), 1932. Garonne (Haute-): KERVILLE, 1932. Var: SIMON, 1932. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à la Chine, Soudan. **Altitude.** De 1050 m jusqu'à 1100 m (KERVILLE, 1932). **Habitat.** Sous une pierre: SIMON, 1875a.

*Xysticus cristatus* (Clerck, 1757)

*Thomisus c.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne: GROS, 2004. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardennes: LENICE, 1992. Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. Ariège: DENIS, 1953b, 1961b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870e (*T. c.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*T. c.*); YSNEL, 1990c. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1940a; LUCAS, 1868; YSNEL, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a, 1967d. Gers: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; LUCAS, 1882a. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; KERVILLE, 1900; LUCAS, 1878b; PÉTILLON & *al.*, 2004; YSNEL, 1990c. Morbihan: YSNEL, 1990c. Moselle: IORIO, 2004a; LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: GOULLIART, 1980. Orne: YSNEL, 1990c. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1951c, 1953a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b, 1952c; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK,

2000; LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1904, 1910; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; LUCAS, 1875; ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989; DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Somme: ROSELLE, 1887; SUEUR, 1993. Var: BIGOT & al., 1987a; DENIS, 1933a, 1934a, 1936, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1965c. [La citation de Corse par SIMON, 1875a est erronée selon SIMON, 1932 qui indique: «étranger à la Corse»]. — Toute la France sauf la région méditerranéenne: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2910 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1967e; LUCAS, 1875; SIMON, 1875a. Bord d'étang: DENIS, 1952c; VEILLON, 1997. Bord de l'eau, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de mer, sous une pierre: KERVILLE, 1900. Buissons et herbes: SIMON, 1932. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1962b; MÜLLER, 1985. Forêt, buissons: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005. Herbes humides: DENIS, 1934a. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LE PERU, 2004; LENICE, 1992; SIMON, 1875a. Lande: DENIS, 1940a; VEILLON, 1997. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lieux sablonneux: LUCAS, 1878b. Lisière de forêt de chênes et hêtres: LE PERU, 2004. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Marécage: BELIN, 2001; EMERIT & al., 2003; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: BERLAND, 1924; SOYER, 1963. Pelouse calcaire thermophile: IORIO, 2004a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992; ROSELLE, 1887; SIMON, 1875a. Prairie en friche, mousses; prairie très humide, mousses: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sous une pierre: DENIS, 1953a; LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1868, 1882a. Sous-bois: VEILLON, 1997. Sur un mur: DENIS, 1965c. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Tourbière: LEDOUX & al., 1996c; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 2002. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1933b, 1934a, 1936, 1965c, 1967e; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1952c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LUCAS, 1868, 1870e; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle*. Février: VEILLON, 1997. Avril: LEDOUX & al., 2002; VEILLON, 1997. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1933b, 1934a, 1936, 1953b, 1967e; EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b, 1962b; EMERIT & al., 1997, 1999; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1940a, 1961b; GROS, 2004; LEDOUX & al., 1996c; MÜLLER, 1985. Août: CORNIC, 1978; DENIS,

1953a, 1967d; LEDOUX & al., 1996b; LUCAS, 1868, 1870e, 1878b, 1882a; VEILLON, 1997. Septembre: CORNIC, 1978; DENIS, 1951c; LEDOUX & al., 1996c; LUCAS, 1875. Novembre: LE PERU, 2004. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1954a, 1957a; SIMON, 1875a. Août: DENIS, 1952c.

#### *Xysticus desidiosus* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Corse: SIMON, 1875a, 1932. Savoie: BERLAND, 1937. Savoie (Haute-): SIMON, 1932. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Balkans, Bulgarie. **Altitude.** 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Prairie: SIMON, 1932. Sous une pierre: SIMON, 1875a. **Période.** — *Femelle*. Juillet: BERLAND, 1937.

#### *Xysticus erraticus* (Blackwall, 1834)

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Ariège: DENIS, 1967d. Aude: DELFOSSE, 2000b. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Eure: SIMON, 1899, 1909b. Eure-et-Loire: SIMON, 1875a. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a; YSNEL, 1990c. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1982b; YSNEL, 1990c. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: YSNEL, 1990c. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche: LUCAS, 1878b. Morbihan: YSNEL, 1990c. Oise: SIMON, 1887a. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; LESSERT, 1910; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895; SCHALLER, 2000. "Seine": SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Somme: ROSELLE, 1888a. Var: GROS, 2004. Vendée: DENIS, 1939b, 1962b. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (LEDOUX & al., 1996a, 2003). **Habitat.** Bois humides: SIMON, 1932. Bord de ruisseau, sous des pierres: DENIS, 1961b. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Jardin: LE PERU, 2004. Jardin, clôture: LUCAS, 1877b. Lande: DENIS, 1940a. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande, pelouse à *Agrostis setacea*: CANARD, 1982b. Marais salant: DENIS, 1939b. Marécage: HENRY, 1981; SIMON, 1932. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Prairie: LEDOUX & al., 2003; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & al., 1998. Sol humide, sous les pierres: DENIS, 1961b. Sous une pierre: DENIS, 1938a, 1962b. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Mai: LE PERU, 2004. Juin: DENIS, 1938a, 1962b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 2003; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a. — *Femelle*. Juin: EMERIT & al., 1999; GROS, 2004; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1939b, 1940a. Août: LUCAS, 1878b. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1877b.

Décembre: DENIS, 1967d. — *Femelle avec cocon*.  
 Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1940a, 1961b.

*Xysticus ferrugineus* Menge, 1876

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1932. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Côtes-d'Armor: YSNEL, 1990c. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979; YSNEL, 1990c. Landes: SIMON, 1932. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Morbihan: YSNEL, 1990c. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b; SIMON, 1932. Pyrénées-Atlantiques: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; SIMON, 1932; TAMBS-LYCHE, 1957. Var: DENIS, 1937a. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: MURPHY, 1994. Vienne (Haute-): SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord d'étang, prairie: LEDOUX, 2000. Dune: MURPHY, 1994. Forêt: SIMON, 1932. Lande sèche: CANARD, 1979. Pelouse: SOYER, 1963. Sous une pierre: DENIS, 1950b. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992; SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle*. Mars: SIMON, 1932. Avril: DENIS, 1933b. Juin: CORNIC, 1978. — *Femelle*. Mars: SIMON, 1932. Avril: LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1948b. Juillet: CORNIC, 1978. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b.

*Xysticus gallicus* Simon, 1875

**Répartition.** Ain: SIMON, 1875a. Alpes (Hautes-): HELSDINGEN, 1995. Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1875a, 1932. Cantal, Gard: SIMON, 1932. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Isère: SIMON, 1875a. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Lozère: SIMON, 1932. Nièvre: DENIS, 1943b. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1932. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1933b, 1963e; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898; SIMON, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1875a, 1932. Vosges: SIMON, 1932. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1800 m (HELSDINGEN, 1995; LEDOUX & al., 1996a, 2003). **Habitat.** Bois, sous des pierres: SIMON, 1875a. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Champ de trèfle: DENIS, 1933b. Forêt: SIMON, 1932. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères; lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1996a, 1996c, 2003; SIMON, 1932. Sous des grosses pierres: DENIS, 1957a. Sur *Picea excelsa*: DENIS, 1943b. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a. Juin: LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1932. Juillet: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898; SIMON, 1875a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1933b, 1967e; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1943b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1932. Juillet: DENIS, 1954a, 1963e; LEDOUX & al., 1996a, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: LEDOUX & al., 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Septembre: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1957a.

*Xysticus grallator* Simon, 1932

**Répartition.** Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1932. — Espagne, Italie. **Période.** — *Mâle*. Septembre: KRAUS, 1955. — *Femelle*. Septembre: KRAUS, 1955.

*Xysticus ibex* Simon, 1875

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a, 1932. Lozère: SIMON, 1932. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; SIMON, 1875a, 1932. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. — Espagne, Italie. **Altitude.** De 1900 m (BOSMANS & al., 1986) jusqu'à 2910 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Prairie: LEDOUX & al., 1996c. Prairie alpestre: SIMON, 1875a, 1932. **Période.** — *Mâle*. Août: LEDOUX & al., 1996c. — *Femelle avec cocon*. Juillet: SIMON, 1875a. Août: DENIS, 1952c.

*Xysticus kempeleni* Thorell, 1872

*X. lineatus* [err.].

**Répartition.** Ain, Aube: SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932]. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Corse: SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932], 1932. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Landes: SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932]. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Mayenne: SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932]. Morbihan: YSNEL, 1990c. Nord: DENIS, 1952b. Oise, Orne: SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932]. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932], 1932. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932]. Var: SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon SIMON, 1932]. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1964b, 1965c; SIMON, 1875a [*X. lineatus*, err. selon DENIS, 1963c et SIMON, 1932]. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b. Bruyères et genêts: SIMON, 1875a. Champ de trèfle: DENIS, 1933b. Dune: DENIS, 1962b. Forêt: DENIS, 1952b. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, mousses épaisses: DENIS, 1965c. Friches chaudes, bruyères, genêts, ajoncs: SIMON, 1932. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1962b; LEDOUX & al., 1996a. Mai: DENIS, 1933b, 1965c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Juin: DENIS, 1952b, 1962b; LESSERT, 1910. Juillet: DENIS, 1964b. Septembre: CLARK & al., 1970.

*Xysticus kochi* Thorell, 1872

*X. calenzanae*.

**Taxonomie.** La synonymie *X. calenzanae* Kraus, 1955 = *X. kochi* est établie par WUNDERLICH, 1994e. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983; SOYER, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1874d, 1875a. Cher: DENIS, 1943b. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955,



1955 (*X. c.*); SIMON, 1875a, 1932; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Finistère: DENIS, 1939a, 1940a; YSNEL, 1990c. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; KERVILLE, 1932; LUCANTE, 1880b. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Isère: SIMON, 1875a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: PIONNEAU, 1911. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: YSNEL, 1990c. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: GOULLIART, 1980. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b, 1960a; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b, 1961b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1995, 1999a; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; ROLLARD, 2000; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1875a. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & *al.*, 1989; SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1887. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1933a, 1934a, 1937a; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1965c; YSNEL, 1990c. Vienne: SIMON, 1875a. — Toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, de la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 2700 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1999a. Bois: DENIS, 1941. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1989, 1991. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Dune: LEDOUX & *al.*, 1999a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1965c. Forêt de pins, lièze; forêt, sous des pierres: DENIS, 1963c. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992; VEILLON, 1997. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994; LE PERU, 2004. Lieux ensoleillés, à végétation courte: SOYER, 1963. Marécage: BELIN, 2001. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & *al.*, 1995. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1999a; PASQUET & *al.*, 1992; ROSELLE, 1887; SIMON, 1875a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BRAUD & *al.*, 2005. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Rivière, sur un banc de sable: DENIS, 1943b. Sol humide, sous les pierres: DENIS, 1961b. Sur une ombelle: DENIS, 1950b. Talus sableux, lièze: DENIS, 1963c. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1933b, 1934a, 1965c; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; SIMON, 1875a. Juin: DENIS, 1933b, 1941; LEDOUX & *al.*, 1999a; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b; KRAUS, 1955. Mai: DENIS, 1934a; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1943b, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a, 1940a, 1950b, 1963c. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1939a, 1954a, 1960a, 1961b.

### *Xysticus lanio* C. L. Koch, 1835

*Thomisus l.*; *X. lateralis*.

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1963. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870e (*T. l.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: CANARD, 1989; O'NEIL, 1979; SIMON, 1875a. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Gers: LUCANTE, 1880b. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e; PIONNEAU, 1911. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Mayenne: SIMON, 1875a. Morbihan: YSNEL, 1990c. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Nord: GOULLIART, 1980. Oise, Orne: SIMON, 1875a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1933b; LEDOUX & *al.*, 1995. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1904 (*X. l.*), 1910 (*X. l.*). "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1888b. Var: BIGOT, 1993; BIGOT & *al.*, 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1933a, 1935b; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1962b; SIMON, 1875a. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Ancienne carrière d'argile: VEILLON, 1997. Arrière-dune: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1962b. Bois: DENIS, 1967e. Buissons de chênes: SIMON, 1932. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: ROSELLE, 1888b. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & *al.*, 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins maritimes: CLARK & *al.*, 1970. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lieux sablonneux: SIMON, 1875a. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Marécage: BELIN, 2001. Prairie: PASQUET & *al.*, 1992. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Taillis de chênes-verts, lièze: SOYER, 1963. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: CORNIC, 1978; DENIS, 1967e; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904; SIMON, 1932. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904. Juillet: CANARD, 1989. Septembre: CLARK & *al.*, 1970. — *Femelle.* Mai: CORNIC, 1978; DENIS, 1967e; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1932. Juin: CORNIC, 1978; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1962b, 1967e. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b; LUCAS, 1870e. Septembre: CLARK & *al.*, 1970.

### *Xysticus lineatus* (Westring, 1851)

*X. dentiger*.

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aube: SIMON, 1932. Calvados: GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1878e (*X. d.*), 1932. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1932. Lot-



et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Oise: SIMON, 1887a (*X. d.*), 1932. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895. "Seine": SIMON, 1878e (*X. d.*), 1932. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884, 1884 (*X. d.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1878e (*X. d.*), 1932. [La citation de Vendée par SIMON, 1875a est erronée selon DENIS, 1963c, et se rapporte à *X. kempelini*. Selon SIMON, 1932, toutes les citations de *X. lineatus* par SIMON, 1875a se rapportent à *X. kempelini*]. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois: LANCELEVÉE, 1884. Forêt: SIMON, 1932. Forêt, clairière: LANCELEVÉE, 1884. Jardin: LE PERU, 2004. Marécage: SIMON, 1932; VILLEPOUX, 1990b. Prairie en friche: LE PERU, 2004. **Période.** — *Mâle.* Mai, juin: LE PERU, 2004. — *Femelle.* Juin: LE PERU, 2004.

*Xysticus luctator* L. Koch, 1870

*X. cambridgei.*

**Répartition.** Allier: SIMON, 1932 (*X. c.*). Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1875a, 1932 (*X. c.*). Eure, Gers: SIMON, 1932 (*X. c.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Oise: SIMON, 1932 (*X. c.*). Pas-de-Calais: DENIS, 1956. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1932 (*X. c.*). "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1932 (*X. c.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1932 (*X. c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978 (*X. c.*). Yonne: SIMON, 1932 (*X. c.*). — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Forêt: SIMON, 1932. Friche: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: SIMON, 1932. Juin: LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1932; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mai: SIMON, 1932. Juin: CORNIC, 1978; SIMON, 1932. Septembre: SIMON, 1932.

*Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836)

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1875a, 1932. Calvados: GUIBÉ, 1943, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Eure: SIMON, 1932. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Oise: SIMON, 1932. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1932. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; MULLER & *al.*, 1895; REIBER, 1880; SIMON, 1932. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c. Somme: ROSELLE, 1888b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b, 1962d, 1964b. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Habitat.** Dune, sous les *Helichrysum*: DENIS, 1964b. Forêt: ROSELLE, 1888b; SIMON, 1932. Forêt d'épicéas: LEDOUX & *al.*, 1996c. Forêt de pins: DENIS, 1962d. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Friche: VEILLON, 1997. Lisière de forêt: LE PERU, 2004. Prairie: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: GUIBÉ, 1943. **Période.** — *Mâle.* Mars: GUIBÉ, 1943. Avril: VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1967e. Juin: SIMON, 1932. Juillet: SIMON, 1875a. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b, 1962d; VEILLON, 1997. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: VEILLON, 1997. Juillet: LE PERU, 2004; SIMON, 1875a. Septembre: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996c. — *Femelle avec cocon.* Août: DENIS, 1964b.

*Xysticus ninnii* Thorell, 1872

*X. perileucus.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1875a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881; SIMON, 1875a, 1932. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a, 1932. Bouches-du-Rhône: BIGOT & *al.*, 1983; SOYER, 1963. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a; SIMON, 1932. Lozère: DENIS, 1939b. Morbihan, Oise: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1932. "Seine": SIMON, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1876c (*X. p.*), 1880a, 1932. Somme: SIMON, 1880a, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978. — Alpes du Dauphiné et de Provence: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & *al.*, 1996a). **Habitat.** Dune; forêt: SIMON, 1932. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 2003. Lande à genêts, sous les pierres: LEDOUX & *al.*, 1996a. Lieux sablonneux, sous des pierres: LUCAS, 1882a. Pelouse sèche: SOYER, 1963. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & *al.*, 1995. Prairie: SIMON, 1932. Prairie alpestre: SIMON, 1875a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & *al.*, 1983. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1939b; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1880a, 1932. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1939b; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: CORNIC, 1978. — *Femelle.* Juin, juillet: DENIS, 1939b. Août: LEDOUX & *al.*, 2003; LUCAS, 1882a.

*Xysticus nubilus* Simon, 1875

*X. baleatus*; *X. comptulus.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a (*X. c.*). Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1875a, 1875a (*X. b.*), 1875a (*X. c.*), 1932. Lozère: SIMON, 1932. Var: BECKER, 1880 (*X. c.*), 1882 (*X. c.*). — Espagne, Italie. Méditerranée, Macaronésie. **Habitat.** Bois; jardin; pins et sapins; plantes basses; prairie: SIMON, 1875a. **Période.** — *Mâle.* Février: CANARD, 1989.

*Xysticus ovatus* Simon, 1876

**Répartition.** Garonne (Haute-): KERVILLE, 1932. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1985b, 1986; DENIS, 1951c; SIMON, 1932. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985b; DENIS, 1957a; SIMON, 1876c. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1680 m (BOSMANS & *al.*, 1985b) jusqu'à 2380 m (DENIS, 1951c). **Habitat.** Lieu aride, sous des pierres: DENIS, 1957a. Pelouse sèche; prairie à rhododendron: BOSMANS & *al.*, 1985b. Sous une pierre: DENIS, 1951c. **Période.** — *Mâle.* Juillet: BOSMANS & *al.*, 1985b. — *Femelle.* Juillet: BOSMANS & *al.*, 1985b. Septembre: DENIS, 1951c. — *Femelle avec cocon.* Août: DENIS, 1957a.

*Xysticus parallelus* Simon, 1873

**Répartition.** Corse: SCHARFF, 1894; SIMON, 1875a, 1932. Landes, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. [Les citations des Alpes-de-Haute-Provence et des Landes par SIMON, 1875a sont erronées selon SIMON, 1932]. — Espagne, Italie.

*Xysticus robustus* (Hahn, 1832)*Proxysticus r.*

**Répartition.** Ain: SIMON, 1932. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875a, 1932. Ardèche: SIMON, 1932. Ariège: DENIS, 1961b (*P. r.*). Corse: ROEWER, 1926; SIMON, 1875a, 1932. Drôme, Gard: SIMON, 1932. Ille-et-Vilaine: YSNEL, 1990c. Indre-et-Loire: SIMON, 1932. Isère, Oise: SIMON, 1875a, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b; LEDOUX & al., 1996a, 2003; SIMON, 1875a, 1932. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1932. "Seine": SIMON, 1875a, 1932. Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Vaucluse: CORNIC, 1978 (*P. r.*); SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, de l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bois, sous des pierres: SIMON, 1875a. Forêt, sous les pierres: SIMON, 1932. Sous une pierre: LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1933b. Juin: CORNIC, 1978. Juillet: SIMON, 1932. Août: LEDOUX & al., 2003. — *Femelle.* Mars: ROEWER, 1926. Mai: LESSERT, 1904, 1910. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1933b. Juillet: DENIS, 1961b.

*Xysticus sabulosus* (Hahn, 1832)*Psammitis sabulosa*; *Psammitis s.*; *Thomismus s.*

**Répartition.** Aube: SIMON, 1875a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; BIGOT & al., 1983; SOYER, 1953a, 1963. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: SIMON, 1875a. Corse: SIMON, 1932. Finistère: LUCAS, 1868. Gers: LUCANTE, 1880b. Gironde: CAUSSANEL, 1970; LUCANTE, 1880b; SIMON, 1932. Hérault: EMERIT & al., 1990. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1875a. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997 (*P. s.*). Nord: GOULLIART, 1980. Pas-de-Calais: BONTE, 2000. "Seine": SIMON, 1875a. Somme: ROSELLE, 1888b. Vaucluse: CORNIC, 1978 (*P. sabulosa*). Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c. Yonne: LUCAS, 1872 (*T. s.*). — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire, près d'une mare temporaire: VEILLON, 1997. Arrière-dune, oyats: CLARK & al., 1970. Dune: GOULLIART, 1980; ROSELLE, 1888b. Dune, *Ammophiletum*: CAUSSANEL, 1970. Dune, oyats; dune, sous des pierres: DENIS, 1963c. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Lieux ensoleillés, à végétation courte: SOYER, 1963. Lieux sablonneux, sous des pierres: LUCAS, 1872. Marécage salé: BIGOT, 1965. Oyats secs: DENIS, 1963c. Plage: SIMON, 1875a, 1932. Sous une pierre: LUCAS, 1868; SIMON, 1875a. Terrains sablonneux: SIMON, 1875a, 1932. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Juillet: VEILLON, 1997. Septembre: CLARK & al., 1970. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Mai: CORNIC, 1978. Juillet: DENIS, 1963c. Août: LUCAS, 1868. Octobre: DENIS, 1963c.

*Xysticus semicarinatus* Simon, 1932

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Gard: SIMON, 1932. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1933b. — Espagne. Portugal. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1933b.

*Xysticus striatipes* L. Koch, 1870

**Répartition.** Oise: SIMON, 1875a, 1932. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895; SIMON, 1932. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois, friche sablonneuse: SIMON, 1875a. Friche sablonneuse: SIMON, 1932. **Période.** — *Mâle.* Juillet, août: LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. Septembre: SIMON, 1932. — *Femelle.* Juillet, août: MULLER & al., 1895. Septembre: SIMON, 1932.

*Xysticus tortuosus* Simon, 1932

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; YSNEL, 1990c. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; YSNEL, 1990c. Landes: SIMON, 1932. Morbihan: SIMON, 1932; YSNEL, 1990c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1932. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1932. Vendée: DENIS, 1941. [Les citations de *X. ulmi* par SIMON, 1875a sont en partie erronées selon PLATNICK, 2004, et se rapportent à *X. tortuosus*]. — Espagne, Portugal, Maroc, Algérie. **Habitat.** Bois: DENIS, 1941. Forêt de conifères: SIMON, 1932. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Juin: DENIS, 1941. Juillet: DENIS, 1938a. — *Femelle.* Juin: DENIS, 1941. Juillet: DENIS, 1938a. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1938a.

*Xysticus ulmi* (Hahn, 1831)*Thomismus u.*

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Aisne: SIMON, 1875a. Ardennes: LENICE, 1992. Aube: SIMON, 1875a. Calvados: LUCAS, 1870e (*T. u.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corse: KRAUS, 1955. Eure: EMERIT & al., 2003. Gers: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HENRY, 1981; HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Nord: EMERIT & al., 1999; GOULLIART, 1980. Oise: SIMON, 1875a. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Rhin (Bas-): LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c. "Seine": COCQUEMPOT & al., 1991; SIMON, 1875a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989. Somme: ROSELLE, 1888b. Vaucluse: LEDOUX, 2000. [Les citations de *X. ulmi* par SIMON, 1875a sont en partie erronées selon PLATNICK, 2004, et se rapportent à *X. tortuosus*]. — Presque toute la France: SIMON, 1932. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2300 m (LEDOUX & al., 1996c). **Habitat.** Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1984, 1989, 1991. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Friche: LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Jardin: LENICE, 1992. Marécage: EMERIT & al., 1999, 2003; HENRY, 1981; SIMON, 1932; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: SCHALLER, 2000. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002; PASQUET & al., 1992; ROSELLE, 1888b; SIMON, 1875a, 1932. **Période.** — *Mâle.* Avril: EMERIT & al., 1999; KRAUS, 1955; LEDOUX & al., 2002. Mai: EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000. Juin: VEILLON, 1997. — *Femelle.* Avril:

KRAUS, 1955; LEDOUX & *al.*, 2002. Mai: EMERIT & *al.*, 2003; LEDOUX, 2000. Août: LUCAS, 1870e. Septembre: EMERIT & *al.*, 1999, 2003; LEDOUX & *al.*, 1996c.

## SALTICIDAE

Plusieurs espèces sont maintenues ici dans le genre *Euophrys*, alors qu'elles sont placées par certains auteurs dans le genre *Pseudeuophrys* (*E. erratica*, *E. lanigera*, *E. obsoleta*, *E. vafra*). Il est à noter que le genre *Pseudeuophrys* est considéré synonyme de *Euophrys* par PROSZYNSKI, 1962, alors que LOGUNOV, 1998, les sépare.

Deux espèces, citées par CANARD & *al.*, 1997, sont exclues du catalogue: *Heliophanus recurvus* Simon, 1868, considérée *nomen dubium* par WESOŁOWSKA, 1986; *Panyssimus nicholsoni* (O. P.-Cambridge, 1899), au sujet de laquelle SIMON, 1937 indique: «Espèce originaire de Malaisie, acclimatée dans les serres chaudes de Kew en Angleterre, et dans celles du Muséum de Paris».

*Aelurillus affinis* (Lucas, 1846)

*Aelurops a.*

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a (*A. a.*), 1937. Espagne, Italie. De la Méditerranée au Turkménistan. **Habitat.** Maquis, rochers; plage, galets; plateau calcaire: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Septembre: CANARD, 1989. — *Femelle*. Juillet, septembre: CANARD, 1989.

*Aelurillus festivus* (C. L. Koch, 1834)

*Aelurops festiva*; *Aelurops f.*; *Asianellus f.*

**Taxonomie.** Le nom *Aelurillus festivus* est retenu ici, pour une espèce placée successivement dans les genres *Euophrys*, *Aelurops*, *Aelurillus*, *Phlegra* et *Asianellus*. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Gironde: SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): MULLER & *al.*, 1895 (*Aelurops f.*). Var: KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse: CORNIC, 1978. [citée par SIMON, 1876a sans localité précise (*Aelurops f.*)]. — Allemagne, Belgique, Suisse (*Asianellus f.*). Paléarctique (*Asianellus f.*). **Altitude.** Jusqu'à 600 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Friche: LEDOUX & *al.*, 2003. **Période.** — *Mâle*. Septembre: SIMON, 1937. — *Femelle*. Juillet: CORNIC, 1978; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: LEDOUX & *al.*, 2003.

*Aelurillus v-insignitus* (Clerck, 1757)

*A. insignitus*; *A. litera-v-insignitus*; *Aelurops insignita*; *Aelurops v.*; *Phlegra v-insignita*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*Aelurops i.*). Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. Ariège: DENIS, 1960a. Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & *al.*, 1997; SOYER, 1959. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1876a (*Aelurops i.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955 (*A. l.*). Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1990c (*P. v.*); COUTANT, 1990. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: COUTANT, 1990; SIMON, 1876a (*Aelurops i.*). Oise, Orne, Puy-de-Dôme: SIMON, 1876a (*Aelurops i.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b,

1955c, 1960a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1943c, 1952c, 1961b, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1996a; SIMON, 1876a (*Aelurops i.*); SOYER, 1965; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910 (*A. i.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000; MULLER & *al.*, 1895 (*A. v.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. "Seine": SIMON, 1876a (*Aelurops i.*), 1937. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*A. i.*); SIMON, 1898b (*A. i.*). Var: BECKER, 1882 (*Aelurops i.*); DENIS, 1937b (*A. i.*); GROS, 1982, 1983a, 1983b; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1876a (*Aelurops i.*), 1898c (*A. i.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1962b. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2250 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de lac: DENIS, 1955c. Buissons: SIMON, 1937. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Éboulis: LEDOUX & *al.*, 1996b. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & *al.*, 1997. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Garrigue: SOYER, 1965. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & *al.*, 1994. Gorge humide, mousses: BOSMANS & *al.*, 1985a. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Lieux arides et pierreux: SIMON, 1876a. Lieux découverts et pierreux: SIMON, 1937. Maison: BRAUD & *al.*, 2005. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse à *Brachypodium ramosum*: SOYER, 1959. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Terrain sec avec buissons et pins: DELFOSSE, 2000b. Terrains sablonneux: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Avril: LEDOUX & *al.*, 1996a; SOYER, 1959. Mai: DENIS, 1937b, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1954a, 1955c. Octobre: KABOUCHE & *al.*, 1997. — *Femelle*. Mars: LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1937b; LE PERU, 2004. Juin: DELFOSSE, 2000b; LE PERU, 2004. Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1960a; GROS, 1983a. Août: LEDOUX & *al.*, 1996b. Septembre: GROS, 1982, 1983b. Octobre: KRAUS, 1955. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1960a.

*Attulus helveolus* (Simon, 1871)

*Attus cinereus*.

**Taxonomie.** Le catalogue de CANARD & *al.*, 1997 met en synonymie *Attulus helveolus* et *Sitticus distinguendus*, mais il s'agit de deux espèces bien distinctes. **Répartition.** Charente-Maritime: SIMON, 1876a (*A. c.*), 1937. Gard: EMERIT & *al.*, 1994. Gironde: CAUSFANEL, 1970; LUCANTE, 1880b (*A. c.*); SIMON, 1876a (*A. c.*), 1937. Landes: LUCANTE, 1880b (*A. c.*); SIMON, 1876a (*A. c.*), 1937. Morbihan: SIMON, 1937. Vendée: COUTANT, 1990; DENIS, 1962b, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c. — Midi de la France, sur le bord de la mer: SIMON, 1937. Europe. **Habitat.** Dune: DENIS, 1963c, 1964b; SIMON, 1937. Dune à oyats: EMERIT & *al.*, 1994. Dune, *Ammophiletum*: CAUSFANEL, 1970. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962d. Plage: DENIS, 1962b, 1964b. Plages sablonneuses: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1962b. Août: DENIS, 1963c. Septembre: DENIS, 1962d, 1964b. Octobre: EMERIT & *al.*, 1994. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1964b, 1965c.

*Ballus armadillo* (Simon, 1871)

**Répartition.** Corse: SIMON, 1876a, 1937. — Italie.  
**Habitat.** Haie: SIMON, 1876a.

*Ballus depressus* (Walckenaer, 1802)

*Attus d.*; *B. chalybeius*.

**Taxonomie.** Le nom *Ballus depressus*, utilisé régulièrement et sans problème par tous les auteurs pendant plus d'un siècle, est conservé ici; l'utilisation de *B. chalybeius* est contraire à l'esprit de l'ICZN. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Ariège: LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; SOYER, 1959. Calvados: LUCAS, 1874c (*A. d.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001 (*B. c.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Eure: EMERIT & al., 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1909b. Gard: CHANSIGAUD & al., 1994. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: COUTANT, 1990; MARC, 1990b. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1937. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Lozère: DENIS, 1939b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*B. c.*). Morbihan, Orne: COUTANT, 1990. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1953b; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: ALICATA & al., 1987; BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; SIMON, 1937. Rhin (Haut-): BLICK, 2000 (*B. c.*); LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": LUCAS, 1875 (*A. d.*); ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: COCQUEMPOUT & al., 1989; DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: DENIS, 1937a, 1937b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c, 1937. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*B. c.*). Europe, de l'Afrique du Nord à l'Asie Centrale (*B. c.*). **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1965c. Bois: DENIS, 1938a, 1941; LUCAS, 1875. Bois, litière: BRAUD & al., 2005. Bois, mousses et détrit: SIMON, 1876a. Bord de rivière: LEDOUX & al., 2002. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bruyères: LUCAS, 1874c. Buissons bas: SIMON, 1937. Bétulaie, branches: EMERIT & al., 2003. Champ de céréales: COCQUEMPOUT & al., 1989. Chênes-verts: KOVOOR & al., 2000. Clôture: BRAUD & al., 2005. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt de pins, troncs: MARC, 1990b. Forêt, chênes: DENIS, 1963c. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Forêt, clairière, buissons: DOIGNON, 1976. Garrigue: SOYER, 1959. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Marécage: BELIN, 2001; VILLEPOUX, 1990b. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Mousses et détrit: SIMON, 1937. Ripisilve: LEDOUX & al., 2002. Ripisilve, pelouse sur galets: LEDOUX,

2000. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1939b, 1962b; LEDOUX & al., 2003; LESSERT, 1904. Mai: DENIS, 1937b, 1965c, 1967e; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1876a, 1937. Juin: DENIS, 1943c; LESSERT, 1904, 1910; SIMON, 1876a, 1937. Juillet: SIMON, 1876a. Septembre: ALICATA & al., 1987. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b; LESSERT, 1904. Mai: DENIS, 1937b; EMERIT & al., 2003; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: LEDOUX, 2000. Août: DENIS, 1964b. Septembre: ALICATA & al., 1987; LEDOUX & al., 1996a; LUCAS, 1875.

*Ballus rufipes* (Simon, 1868)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Morbihan: MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales: ALICATA & al., 1987. "Seine": SIMON, 1937. — Allemagne, Espagne, Italie, Europe, Afrique du Nord. **Habitat.** Taillis de chênes-verts, clairière: SOYER, 1959.

*Ballus variegatus* Simon, 1876

**Répartition.** Aude: SIMON, 1876a, 1937. — Espagne, Italie, Portugal. **Habitat.** Collines arides, sous les pierres: SIMON, 1876a, 1937. **Période.** — *Mâle.* Septembre: SIMON, 1876a.

*Bianor albobimaculatus* (Lucas, 1846)

*Eris albobimaculata.*

**Répartition.** Aude: SIMON, 1937. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1965; PETIT & al., 1945; SIMON, 1937; SOYER, 1959. Corse: KRAUS, 1955; ROEWER, 1926 (*E. a.*); SIMON, 1876a (*E. a.*), 1937. Pyrénées-Orientales, Var: SIMON, 1937. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c. [LOGUNOV, 2000 cite l'espèce de France, sans autre précision]. — Espagne, Italie, Afrique du Sud, de la Méditerranée à l'Asie Centrale. **Habitat.** Bord d'étang: PETIT & al., 1945. Fossé, herbes humides: DENIS, 1963c. Marais salant: SIMON, 1937. Marécage salé: BIGOT, 1965. Sous les salicornes sur la vase salée fluide: DENIS, 1962b. Terrains salés, pelouse: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Mars: ROEWER, 1926; SIMON, 1937. Septembre: DENIS, 1962b.

*Bianor aurocinctus* (Ohlert, 1865)

*Ballus aenescens*; *B. aenescens*; *Sibianor a.*

**Répartition.** Calvados: GUIBÉ, 1946 (*B. a.*). Cantal: SIMON, 1876a (*Ballus a.*), 1937 (*B. a.*). Corse: LOGUNOV, 2000 (*S. a.*). Doubs: EMERIT & al., 1997 (*B. a.*). Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b (*B. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Orne: SIMON, 1876a (*Ballus a.*), 1937 (*B. a.*). Pyrénées (Hautes-): SIMON, 1937 (*B. a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993 (*B. a.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (*B. a.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": LOGUNOV, 2000 (*S. a.*). Seine-et-Marne: COCQUEMPOUT & al., 1989 (*B. a.*). Vendée: DENIS, 1962d (*B. a.*), 1964b (*B. a.*), 1965c (*B. a.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*S. a.*). Paléarctique (*S. a.*). **Altitude.** Jusqu'à 850 m (LOGUNOV, 2000). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1965c. Bois de châtaigniers: LOGUNOV, 2000. Bois, lisière: SIMON,

1876a. Champ de céréales: COCQUEMPOT & al., 1989. Forêt de pins, sur un talus, litière: DENIS, 1964b. Forêt de pins, talus sablonneux: DENIS, 1962d. Friche: PASQUET & al., 1992; VEILLON, 1997. Haie: BRAUD & al., 2005. Prairie: PASQUET & al., 1992. Sous une pierre: EMERIT & al., 1997. **Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962d. Juin: VEILLON, 1997. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1965c. Août: LEDOUX, 1993. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1964b.

***Bianor tantulus*** (SIMON, 1868)

*Ballus t.*; *B. aenescens tantulus*; *B. aurocinctus tantulus*; *Sibianor t.*

**Répartition.** Ain, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*B. t.*), 1937 (*B. aenescens tantulus*). Ariège: LOGUNOV, 2000 (*S. t.*). Aube, Corse: SIMON, 1876a (*B. t.*), 1937 (*B. aenescens tantulus*). Gers: SIMON, 1937 (*B. aenescens tantulus*). Gironde: LUCANTE, 1880b (*B. t.*); SIMON, 1876a (*B. t.*), 1937 (*B. aenescens tantulus*). Oise: SIMON, 1876a (*B. t.*), 1937 (*B. aenescens tantulus*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2003; LOGUNOV, 2000 (*S. t.*); SIMON, 1937 (*B. aenescens tantulus*). Rhône: SIMON, 1937 (*B. aenescens tantulus*). "Seine": SIMON, 1876a (*B. t.*), 1937 (*B. aenescens tantulus*). Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, Vaucluse, Vienne (Haute-): SIMON, 1937 (*B. aenescens tantulus*). — Allemagne, Espagne (*B. aurocinctus tantulus*; *S. t.*). Paléarctique (*S. t.*). **Altitude.** De 850 m jusqu'à 2000 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois: SIMON, 1937. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: SIMON, 1937. Prairie: LEDOUX & al., 1996a, 2003; LOGUNOV, 2000. Tourbière: LEDOUX & al., 1996a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 1996a; SIMON, 1937. Mai: LOGUNOV, 2000. Juin, juillet: LEDOUX & al., 1996a. Septembre: LEDOUX & al., 1996a; LOGUNOV, 2000. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juin: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Novembre: LEDOUX & al., 1996a.

***Carrhotus xanthogramma*** (Latreille, 1819)

*C. bicolor*; *Philaeus bicolor*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1876a (*P. b.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959 (*C. b.*). Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1876a (*P. b.*). Gard: CHANSIGAUD & al., 1994 (*C. b.*); EMERIT & al., 1994 (*C. b.*); RAHOLA, 2005 (*C. b.*). Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b (*P. b.*); SIMON, 1876a (*P. b.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*P. b.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975 (*C. b.*); LEDOUX & al., 1999b (*C. b.*). Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d (*C. b.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c (*C. b.*); LEDOUX & al., 1996a (*C. b.*). "Seine": SIMON, 1876a (*P. b.*), 1878f (*P. b.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1876a (*P. b.*). Var: DENIS, 1937a (*C. b.*), 1937b (*C. b.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*C. b.*). Vendée: CLARK & al., 1970 (*C. b.*); DENIS, 1962b (*C. b.*). — Toute la France: SIMON, 1937 (*C. b.*). Allemagne, Espagne, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b. Garrigue: SOYER, 1959. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Haie: BRAUD & al., 2005. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1959.

**Période.** — *Mâle.* Avril: DENIS, 1962b; KRAUS, 1955. Mai: DENIS, 1937b, 1943c; LEDOUX & al., 1996a. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994. Juillet: DENIS, 1959d. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1937b; LEDOUX, 2000. Octobre: EMERIT & al., 1994.

***Chalcoscirtus atratus*** (Thorell, 1875)

*C. insularis*.

[DENIS, 1963c note: « Simon ne distinguait pas cette espèce de son *Ch. infimus*. Les deux espèces ont été habituellement confondues, de sorte qu'il n'est pas possible de répartir les citations entre chacune d'elles »]. **Répartition.** Var: DENIS, 1937b (*C. i.*). Vendée: DENIS, 1963c. — Europe. **Période.** — *Femelle.* Mai: DENIS, 1937b.

***Chalcoscirtus difficilis*** (Simon, 1868)

*Euophrys d.*

**Répartition.** Corse: SIMON, 1876a (*E. d.*), 1937 (*E. d.*). — Italie (*E. d.*). Europe du Sud.

***Chalcoscirtus infimus*** (Simon, 1868)

*Calliethera infima*.

[Selon DENIS, 1963c, Simon confondait les deux espèces *C. atratus* et *C. infimus*]. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1937. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*C. i.*), 1937. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c; SOYER, 1959. Charente-Maritime, Corse: SIMON, 1876a (*C. i.*), 1937. Gers: LUCANTE, 1880b (*C. i.*); SIMON, 1876a (*C. i.*), 1937. Morbihan: SIMON, 1876a (*C. i.*), 1937. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1999a. "Seine": SIMON, 1876a (*C. i.*), 1937. Var: DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c, 1937. Vaucluse: SIMON, 1876a (*C. i.*), 1937. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe du Sud à l'Asie Centrale. **Habitat.** Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Dune: DENIS, 1950c; LEDOUX & al., 1999a. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Lieux arides et pierreux: SIMON, 1876a. Littoral. *Crithmo-stacion*: SOYER, 1959. Marais salant: DENIS, 1950c. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1959. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & al., 1995. Sous une pierre: DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1937b, 1950c; SIMON, 1937. Juin: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle.* Mai: DENIS, 1950c. Juin: LEDOUX & al., 1999a. Juillet: DENIS, 1959d.

***Cyrba algerina*** (Lucas, 1846)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881, 1882. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aude: DELFOSSE, 2000b. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a, 1937. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 2003. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880, 1882; DENIS, 1937a, 1937b; SIMON, 1898c. Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992. — Région méditerranéenne: SIMON, 1937. Espagne, Italie. Des Canaries à l'Asie Centrale. **Habitat.** Friche: LEDOUX & al., 2003. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue, sous des pierres: SOYER, 1959. Lieux arides et chauds: SIMON, 1876a. Maquis, sous des pierres: CANARD,

1989. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Sous une pierre: CHANSIGAUD, 1992. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Terrain sec avec buissons et pins: DELFOSSE, 2000b. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1937b. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1937b. Juin: DELFOSSE, 2000b. Juillet: LEDOUX & al., 2003.

#### *Dendryphantes hastatus* (Clerck, 1757)

*Attus medius*.

**Taxonomie.** La présence en France de *Dendryphantes hastatus* (Clerck, 1757) peut paraître douteuse. Cette espèce est citée sous *Attus medius* par LUCAS, 1872 et 1878a. SIMON, 1876 indique, sous *D. hastatus*: « Il n'est pas absolument certain qu'il se trouve en France; une description très courte et très incomplète de Walckenaer (sous le nom d'*Attus lunulatus*) semble cependant s'y rapporter ». SIMON, 1937 ne reprend pas cette espèce. Dans une note (p. 1263) il indique: « *D. hastatus* (Clerck) et *bombycius* (G. S.) que je supposais pouvoir se rencontrer en France, sont décidément étrangers à notre faune ». BONNET, 1956 note (p. 1394): « Simon, en 1876, admettait que l'*Aranea lunulata* de la faune parisienne de Walckenaer était un synonyme possible de *Dendryphantes hastatus*; en 1937, notre grand arachnologue est convaincu que *D. hastatus* n'existe pas en France, mais il ne dit pas ce que devient alors l'*Aranea lunulata* ». Les synonymies de *Aranea lunulata*, *Attus lunulatus* et *A. medius* avec *D. hastatus* sont admises par ROEWER, 1954 et PLATNICK, 2004. Donc, et malgré le doute, cette espèce est maintenue dans la liste. **Répartition.** Marne: LUCAS, 1878a (*A. m.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*A. m.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Jardin: LUCAS, 1878a. **Période.** — *Mâle*. Août: LUCAS, 1878a.

#### *Dendryphantes nidicolens* (Walckenaer, 1802)

*Eris n.*; *Macaroesis n.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1959. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: SIMON, 1876a. Corse: SIMON, 1876a, 1937. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Gironde: LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine: COUTANT, 1990. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*M. n.*); VEILLON, 1997 (*E. n.*). Morbihan: COUTANT, 1990; MURPHY, 1994 (*E. n.*). Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; SIMON, 1876a. "Seine": SIMON, 1876a. Var: BECKER, 1880, 1882; BIGOT, 1993; BIGOT & al., 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1936, 1937a, 1937b; GROS, 1983a; KOVOOR & al., 2000 (*E. n.*); PONEL & al., 1993; SIMON, 1876a, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; FAVET, 1984. Vendée: DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie (*E. n.*; *M. n.*). De la Méditerranée à l'Asie Centrale (*M. n.*). **Altitude.** Jusqu'à 910 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Aulnaie: LEDOUX & al., 1999a. Bois: DENIS, 1941. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Conifères: HILLYARD, 1975; SIMON, 1937. Dune: LEDOUX & al.,

1999a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1963c. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & al., 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de feuillus: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt, chênes-verts: DENIS, 1964b. Garrigue: SOYER, 1959. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Haie: BRAUD & al., 2005. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Massif de millepertuis: VEILLON, 1997. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1936, 1937b, 1965c. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b; LEDOUX & al., 1999a; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1937b, 1965c. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1941, 1964b; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: DENIS, 1964b; GROS, 1983a. Août: DENIS, 1964b. Septembre: DENIS, 1937b, 1964b; LEDOUX & al., 1996a.

#### *Dendryphantes rudis* (Sundevall, 1833)

*Attus r.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Côtes-d'Armor: COUTANT, 1990. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980; COUTANT, 1990. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Morbihan: COUTANT, 1990. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880; REIBER, 1880. "Seine": LUCAS, 1875 (*A. r.*); SIMON, 1878f. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1887. Var: DENIS, 1936, 1937a; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1962b. — Toute la France, sauf dans les montagnes: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2170 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: LUCAS, 1875. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois de pins: DENIS, 1952c. Conifères: SIMON, 1937. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a, 2003. Forêt de pins, chênes-verts: DENIS, 1962b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Pins: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1936. Août: LEDOUX & al., 2003. Septembre: EMERIT & al., 1997. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1936. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Juillet: DENIS, 1952c. Août: DENIS, 1962b; LUCAS, 1882a. Septembre: EMERIT & al., 1997; LUCAS, 1875.

#### *Euophrys acripes* (Simon, 1871)

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a, 1937. — Provence: SIMON, 1937. Italie. **Habitat.** Bois, litière; maquis, litière; plage, sous les plantes: CANARD, 1989. **Période.** — *Femelle*. Septembre, octobre: CANARD, 1989.

#### *Euophrys alticola* Denis, 1955

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c. — Espagne. **Altitude.** 2900 m (DENIS, 1955c). **Habitat.**

Sous les plaques de schistes secs reposant sur l'herbe rare ou plus souvent sur de menus cailloux secs: DENIS, 1955c. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1955c. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1955c. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1955c.

***Euphrys baliola*** (Simon, 1871)

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1876a, 1937 [Les deux citations de SIMON se rapportent à un même spécimen]. — Connue seulement de Corse.

***Euphrys erratica*** (Walckenaer, 1826)

*Attus erraticus*; *E. erraticus*; *E. misera*; *Pseudoeuphrys e.*

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1876a. Charente-Maritime: SIMON, 1876a, 1876b. Corse: SIMON, 1876a, 1876a (*E. m.*). Côtes-d'Armor: LUCAS, 1871a (*A. e.*). Finistère: DENIS, 1938a. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Isère: SIMON, 1876a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005 (*P. e.*); VEILLON, 1997. Morbihan: COUTANT, 1990 (*E. e.*). Puy-de-Dôme: SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*E. e.*); DENIS, 1961b; LEDOUX & al., 1996a. Savoie (Haute-): GROS, 1983a; LEDOUX & al., 1996b, 1996c; LESSERT, 1910; MULLER & al., 1895. "Seine": LUCAS, 1880, 1882b; SIMON, 1876a, 1878f. Seine-et-Marne, Tarn: SIMON, 1876a. Var: BECKER, 1882; SIMON, 1876a, 1898c. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (*A. e.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*P. e.*). Paléarctique (USA, introduit) (*P. e.*). **Altitude.** Jusqu'à 1730 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bâtiment: LUCAS, 1880. Dune: DENIS, 1962b. Dune, oyats ou sous des pierres: DENIS, 1964b. Dune, sous les oyats et les *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Forêt: DENIS, 1961b. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, litière: DENIS, 1964b. Grotte: DENIS, 1967d. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lieux arides: SIMON, 1876a. Maison: CLARK & al., 1970; LUCAS, 1882a. Sous une pierre: LUCAS, 1872, 1882a; VEILLON, 1997. Sur un mur: DENIS, 1965c. **Période.** — *Mâle*. Mai: CLARK & al., 1970; DENIS, 1965c; LESSERT, 1910. Août: LEDOUX & al., 1996b; LUCAS, 1882a. — *Femelle*. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b, 1964b. Mai: DENIS, 1965c. Juin: DENIS, 1938a, 1964b. Juillet: DENIS, 1964b; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1963c; GROS, 1983a; LUCAS, 1882a. Septembre: CLARK & al., 1970. Octobre: DENIS, 1962b, 1967d. Novembre: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon*. Mars, avril: DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1961b.

***Euphrys frontalis*** (Walckenaer, 1802)

*Attus f.*

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1983; DENIS,

1954b. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*A. f.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1937. Côtes-d'Armor: COUTANT, 1990. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: DENIS, 1940a. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a; LUCANTE, 1880b. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ile-et-Vilaine: CANARD, 1979, 1980, 1990c; COUTANT, 1990. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: COUTANT, 1990. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005. Manche: BERLAND, 1924; LUCAS, 1878b. Marne: LUCAS, 1878a (*A. f.*). Mayenne, Morbihan: COUTANT, 1990. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & al., 1999; GROS, 1983a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1960a; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996c; LESSERT, 1904, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Yonne: LUCAS, 1872 (*A. f.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2040 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1965c. Bois: DENIS, 1941; SIMON, 1876a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Cour caillouteuse: BERLAND, 1924. Dune: DENIS, 1965c. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux; estuaire, schorre: BONTE, 2000. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins maritimes, détritrus: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt, clairière, mousses: DOIGNON, 1976. Forêt, litière et mousses humides: DENIS, 1964b. Friche: PASQUET & al., 1992. Genêts: LEDOUX & al., 1996a. Jardin: LE PERU, 2004; SIMON, 1876a. Lande: CANARD, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Mousses: SIMON, 1909b. Murs: LUCAS, 1878a. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1996c, 2002. Prairie calcaire: EMERIT & al., 1999. Prairie en friche, mousses: LE PERU, 2004. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Sous les écorces: LUCAS, 1872. Sous une pierre: DENIS, 1952c, 1963c; LUCAS, 1878b. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962b. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Juin: EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002; LESSERT, 1904, 1910. Juillet: DENIS, 1960a, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. — *Femelle*. Février: LEDOUX & al., 1996a. Mars: LE PERU, 2004. Avril: DENIS, 1962b. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1937b, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1941, 1962b, 1964b; EMERIT & al., 1997, 1999; LEDOUX & al., 1996a, 2002. Juillet: DENIS, 1940a, 1954a, 1960a, 1961b, 1963c; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août: DENIS, 1952c, 1962b; GROS, 1983a; LUCAS, 1870d, 1878a, 1878b. Septembre: CLARK & al., 1970; EMERIT & al., 1997; LEDOUX &

*al.*, 1996c. Octobre : DENIS, 1962b ; LE PERU, 2004. — *Femelle avec cocon*. Mai : DENIS, 1965c. Juin : DENIS, 1964b. Juillet : DENIS, 1950b, 1952c, 1959d, 1960a, 1961b.

***Euophrys gambosa*** (Simon, 1868)

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BECKER, 1881, 1882 ; SIMON, 1876a. Aude : SIMON, 1876a, 1937. Charente-Maritime : SIMON, 1876a. Corse : METZNER, 1999 ; SCHARFF, 1894 ; SIMON, 1876a, 1937. Hérault : SIMON, 1876a. Lot : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. Var : BECKER, 1880, 1882 ; SIMON, 1876a. — Espagne, Italie. Méditerranée. **Habitat.** Maquis de cistes : LEDOUX & *al.*, 1996a. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Prairie : LEDOUX & *al.*, 2003. **Période.** — *Mâle*. Mai : METZNER, 1999. — *Femelle*. Février, mai : LEDOUX & *al.*, 1996a. Août : LEDOUX & *al.*, 2003.

***Euophrys herbigrada*** (Simon, 1871)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corse : METZNER, 1999 ; SIMON, 1876a, 1937. Hérault : EMERIT & *al.*, 1985. Morbihan : COUTANT, 1990. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1961b, 1967d ; LEDOUX & *al.*, 1995, 1999a. Var : DENIS, 1937b ; KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse : LEDOUX, 2000. Vendée : CLARK & *al.*, 1970 ; COUTANT, 1990 ; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** Jusqu'à 1550 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Arrière-dune : DENIS, 1962b, 1965c. Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & *al.*, 1985. Dune : DENIS, 1963c, 1964b, 1965c ; LEDOUX & *al.*, 1999a. Formation à chênes-verts : LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins : DENIS, 1962b, 1965c. Marécage : BELIN, 2001. Oyats : DENIS, 1963c. Pelouse à *Brachypodium phoenicoides* : SOYER, 1959. Prairie : LEDOUX & *al.*, 1999a. Ripisilve, dans une touffe de *Schoenus* : LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Avril : DENIS, 1962b. Mai : DENIS, 1937b, 1965c ; METZNER, 1999. Juin : DENIS, 1965c. — *Femelle*. Février : DENIS, 1965c. Avril : DENIS, 1962b. Mai : DENIS, 1937b, 1965c, 1967d ; LEDOUX, 2000 ; METZNER, 1999. Juin : DENIS, 1965c ; LEDOUX & *al.*, 1999a. Juillet : DENIS, 1963c, 1964b ; LEDOUX, 2000. Septembre : CLARK & *al.*, 1970. Octobre : DENIS, 1962b, 1963c. — *Femelle avec cocon*. Avril : DENIS, 1962b. Juillet : DENIS, 1961b.

***Euophrys innotata*** (Simon, 1868)

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1937. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. Vaucluse : SIMON, 1876a, 1937. — Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée **Habitat.** Pelouse à *Brachypodium ramosum* : SOYER, 1959.

***Euophrys lanigera*** (Simon, 1871)

*Attus laniger* ; *Pseudeuophrys l.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : HECIAK & *al.*, 1984 ; SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a. Ariège : DENIS, 1967d. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. Corse : SIMON, 1937. Garonne (Haute-) : DENIS, 1959a. Gers : LUCANTE, 1880b. Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Maine-et-Loire : BRAUD & *al.*, 2005 (*P. l.*) ; VEILLON, 1997. Morbihan : COUTANT,

1990. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1955c. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & *al.*, 1985a ; DENIS, 1952c ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a ; SIMON, 1876a. "Seine" : ROLLARD, 2000. Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. Var : BECKER, 1880 (*A. l.*) ; SIMON, 1876a. Vaucluse : HECIAK & *al.*, 1984 ; SIMON, 1876a, 1937. Vendée : DENIS, 1962b, 1964b. — Midi de la France, Alpes, Pyrénées : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*P. l.*). Ouest-Europe (*P. l.*). **Altitude.** Jusqu'à 2670 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois, litière : BRAUD & *al.*, 2005. Bord d'étang, sous des pierres : DENIS, 1952c. Bord de lac : DENIS, 1955c. Bord de lac, bois, sous des pierres : DENIS, 1952c. Clôture : BRAUD & *al.*, 2005. Éboulis : LEDOUX & *al.*, 1996a. Formation à bruyères et genévriers : LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de pins, litière : DENIS, 1964b. Forêt, litière : SOYER, 1959. Grotte : DENIS, 1959a. Maison : BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994 ; BRAUD & *al.*, 2005 ; DENIS, 1962b. Murailles ; parois des rochers : SIMON, 1876a. Pelouse sèche : BRAUD & *al.*, 1995. Rochers calcaires : HECIAK & *al.*, 1984. Sur un mur : BERANGER-LEVEQUE & *al.*, 1994. **Période.** — *Mâle*. Avril : VEILLON, 1997. Juillet : DENIS, 1952c ; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août : DENIS, 1952c ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & *al.*, 1996a. Septembre : DENIS, 1959a. Octobre : DENIS, 1962b. — *Femelle*. Février : DENIS, 1967d. Avril : VEILLON, 1997. Juillet : DENIS, 1952c, 1955c, 1964b ; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août : DENIS, 1952c ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & *al.*, 1996a. Décembre : DENIS, 1964b.

***Euophrys littoralis*** Soyer, 1959

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. — Connue seulement de France. **Habitat.** Littoral, *Crithmo-stacion*, sur les rochers : SOYER, 1959.

***Euophrys luteolineata*** (Simon, 1871)

[Connue par un seul spécimen mâle]. **Répartition.** Corse : SIMON, 1876a, 1937 [Les deux citations de SIMON se rapportent à un même spécimen]. — Connue seulement de Corse.

***Euophrys nigripalpis*** Simon, 1937

**Répartition.** Ardèche, Corse : SIMON, 1937. Pyrénées-Atlantiques : BOSMANS & *al.*, 1985a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & *al.*, 1985a ; LEDOUX & *al.*, 2003 ; SIMON, 1937. — Connue seulement de France. **Altitude.** 1300 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Forêt de chênes-verts, litière : LEDOUX & *al.*, 2003. Forêt, sous les pierres, dans les mousses : BOSMANS & *al.*, 1985a. Friche : LEDOUX & *al.*, 2003. **Période.** — *Mâle*. Août, novembre : LEDOUX & *al.*, 2003. — *Femelle*. Avril, août, novembre : LEDOUX & *al.*, 2003.

***Euophrys nigratarsis*** (Simon, 1868)

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : BIGOT & *al.*, 1983. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1954a. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & *al.*, 1985a ; DENIS, 1952c ; SIMON, 1876a, 1937. — Connue seulement de France. **Altitude.** De 1120 m (BOSMANS & *al.*, 1985a) jusqu'à 2960 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bord de lac, bois : DENIS, 1952c. Forêt de pins, sous des pierres : BOS-



MANS & al., 1985a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Août: DENIS, 1952c. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1954a. Août: DENIS, 1952c. — *Femelle avec cocon*. Juillet, août: DENIS, 1952c.

***Euophrys obsoleta*** (Simon, 1868)

*Attus pictilis*; *E. pictilis*; *Pseudeuophrys o.*

**Taxonomie.** La synonymie *E. pictilis* (Simon, 1871) = *E. obsoleta* est établie par LOGUNOV, 1998. **Répartition.** Corse: SIMON, 1876a (*E. p.*), 1937 (*E. p.*). Savoie (Haute-): PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*A. p.*). — Allemagne, Grande-Bretagne (*P. o.*). Paléarctique (*P. o.*). **Période.** — *Mâle*. Juillet, août: PICKARD-CAMBRIDGE, 1898.

***Euophrys pexa*** Simon, 1937

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1937. — Connue seulement de France.

***Euophrys rufibarbis*** (Simon, 1868)

*E. comptula.*

**Répartition.** Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1961b. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; DENIS, 1954b; SOYER, 1959. Corse: SIMON, 1876a (*E. c.*), 1937. Gironde: DENIS, 1951b. Hérault, Puy-de-Dôme: SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1876a. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1946b, 1962b, 1962d, 1964b. — France centrale et méridionale: SIMON, 1937. Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (DENIS, 1961b). **Habitat.** Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt de pins: DENIS, 1962d. Marécage salé: BIGOT, 1965. Pelouse à *Brachypodium ramosum*, sous des pierres: SOYER, 1959. Pierraille: DENIS, 1964b. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle*. Août: DENIS, 1962d. Septembre: DENIS, 1946b, 1951b, 1964b. Octobre: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Janvier: LEDOUX, 2000. Juillet: DENIS, 1961b. Août: DENIS, 1962d. Septembre: DENIS, 1946b, 1951b.

***Euophrys rufimana*** (Simon, 1875)

*Attus rufimanus*; *E. rufimanus.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1875d (*A. r.*), 1876a, 1937 (*E. r.*). — Connue seulement de France.

***Euophrys sedula*** (Simon, 1875)

*Attus sedulus.*

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875d (*A. s.*), 1876a, 1937. Pyrénées-Orientales: SIMON, 1937. — Connue seulement de France. **Habitat.** Forêt de sapins: SIMON, 1937.

***Euophrys semiglabrata*** (Simon, 1868)

*Phlegra s.*

**Répartition.** Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (*P. s.*), 1959d (*P. s.*); SIMON, 1937 (*P. s.*). Pyrénées-

Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*P. s.*). — Espagne. Portugal. **Altitude.** De 1400 m jusqu'à 1800 m (DENIS, 1957a). **Habitat.** Bois, sous des pierres: DENIS, 1957a. Éboulis calcaire; sous une pierre: DENIS, 1959d. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1957a, 1959d. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1959d. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1957a, 1959d.

***Euophrys sulphurea*** (L. Koch, 1867)

*E. sulfurea.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992 (*E. s.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1937. Corse: SIMON, 1876a, 1937. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; SIMON, 1937. Var: DENIS, 1937b. Vendée: MURPHY, 1994. — Espagne, Italie. Europe du Sud, Syrie. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Dune: MURPHY, 1994. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle*. Mai: LEDOUX & al., 1996a. Juin: LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1937b. Juin: LEDOUX & al., 1999a.

***Euophrys terrestris*** (Simon, 1871)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Corse: SIMON, 1876a, 1937. Hérault: SIMON, 1876a. Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Var: SIMON, 1898c. Vendée: DENIS, 1941. — Presque tout le Midi de la France: SIMON, 1937. Espagne, Italie, Suisse. Europe. **Habitat.** Garrigue, litière; taillis de chênes-verts, litière: SOYER, 1959. **Période.** — *Femelle*. Juin: DENIS, 1941.

***Euophrys vafra*** (Blackwall, 1867)

*E. finitima*; *Pseudeuophrys v.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*E. f.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Corse: SIMON, 1937. Hérault: EMERIT & al., 1990. "Seine": SIMON, 1876a (*E. f.*). Var: DENIS, 1937b; SIMON, 1876a (*E. f.*). Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; SIMON, 1876a (*E. f.*). — Midi de la France: SIMON, 1937. Espagne, Italie, Suisse (*P. v.*). Açores, Madère, Méditerranée (*P. v.*). **Habitat.** Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Littoral, *Crithmo-stacion*, sur les rochers: SOYER, 1959. Murailles, rochers: SIMON, 1937. Sur un platane: CHANSIGAUD, 1992. **Période.** — *Mâle*. Septembre: DENIS, 1937b. — *Femelle*. Octobre: DENIS, 1937b.

***Evarcha arcuata*** (Clerck, 1757)

*Attus arcuatus*; *Ergane a.*; *E. arcuatus*; *Hasarius arcuatus.*

[Selon SIMON, 1937, SIMON, 1876a a partiellement confondu *Hasarius arcuatus* et *H. falcatus*; les synonymies avec respectivement *E. arcuata* et *E. falcata* ne sont valables que pour les mâles, elles sont inversées pour les femelles]. **Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence: MÜLLER, 1985. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Ariège: DENIS, 1967d. Calvados: GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*A. a.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1876a (*H. a.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure:

LANCELEVÉE, 1884 (*H. a.*); SIMON, 1899 (*Ergane a.*), 1909b. Gers: LUCANTE, 1880b (*H. a.*). Ille-et-Vilaine: COUTANT, 1990. Jura: LESSERT, 1910. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & *al.*, 1999b. Loire: LEDOUX & *al.*, 2002. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*H. a.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: COUTANT, 1990. Moselle: LEBORGNE & *al.*, 1998. Orne: COUTANT, 1990. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1950b, 1955c. Pyrénées-Atlantiques: BOSMANS & *al.*, 1985a; LUCANTE, 1880b (*H. a.*). Pyrénées-Orientales: LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996a. Rhin (Bas-): LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1904 (*E. a.*), 1910; MULLER & *al.*, 1895 (*H. a.*). "Seine": GROS, 1983a; ROLLARD, 2000; SIMON, 1878f (*H. a.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*H. a.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b (*H. a.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: DENIS, 1962b. Vienne: DUREPAIRE & *al.*, 1994. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (LEDOUX & *al.*, 1996b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Bois: SIMON, 1876a. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bois, clairière: LUCAS, 1870d. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de chênes: MÜLLER, 1985. Forêt de pins: DENIS, 1950b. Forêt de pins, chênes-verts; forêt de pins, herbes sèches: DENIS, 1962b. Forêt, allée: VEILLON, 1997. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Friche: LEBORGNE & *al.*, 1998; PASQUET & *al.*, 1992; VEILLON, 1997. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Haie: SIMON, 1876a. Jardin: LE PERU, 2004. Lande humide: DUREPAIRE & *al.*, 1994. Marécage: BELIN, 2001; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: SCHALLER, 2000. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & *al.*, 1996a. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996c, 2002. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Pâturage: LEBORGNE & *al.*, 1998. Rhododendrons: LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. Sous-bois: LEDOUX & *al.*, 1996a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Tourbière: LEDOUX & *al.*, 1996c; VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle.* Mai: LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2002; LESSERT, 1904, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b, 1955c; LEDOUX, 2000; MÜLLER, 1985; VEILLON, 1997. Août: LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c. Septembre: EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c; VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & *al.*, 2002. — *Femelle.* Avril: KRAUS, 1955. Mai: LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juin: DENIS, 1967d; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2002; LESSERT, 1904, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b; GROS, 1983a; MÜLLER, 1985. Août: DENIS, 1962b; LE PERU, 2004; LEDOUX, 1993; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LUCAS, 1870d. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c; VEILLON, 1997. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1996a; VEILLON, 1997.

### *Evarcha falcata* (Clerck, 1757)

*Attus falcatus*; *Ergane f.*; *E. flammata*; *Hasarius falcatus*.

[Voir la note sous *E. arcuata*]. **Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d (*E. f.*). Calvados: GUIBÉ, 1946 (*E. f.*); LUCAS, 1870d (*A. f.*). Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: SIMON, 1937 (*E. f.*). Côtes-d'Armor: COUTANT, 1990 (*E. f.*); DENIS, 1938a (*E. f.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997 (*E. f.*). Eure: LANCELEVÉE, 1884 (*H. f.*); SIMON, 1899 (*Ergane f.*), 1909b. Gers: LUCANTE, 1880b (*H. f.*). Ille-et-Vilaine: COUTANT, 1990 (*E. f.*); DENIS, 1938a (*E. f.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*H. f.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997 (*E. f.*). Nord: DENIS, 1952b (*E. f.*); GOULLIART, 1980 (*H. f.*). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*H. f.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a (*E. f.*), 1987 (*E. f.*); LEDOUX, 1993 (*E. f.*). Rhin (Haut-): LEPRIEUR, 1880 (*H. f.*); REIBER, 1880 (*H. f.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*A. f.*); SIMON, 1878f (*H. f.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*H. f.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b (*H. f.*). Vendée: DENIS, 1962b (*E. f.*), 1963c (*E. f.*), 1964b (*E. f.*). Yonne: LUCAS, 1872 (*A. f.*). — Toute la France: SIMON, 1937 (*E. f.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Bois: DENIS, 1938a; LUCAS, 1875; SIMON, 1876a. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Buissons: SIMON, 1937. Chênes-verts: DENIS, 1964b. Forêt: DENIS, 1952b; ROSELLE, 1888b. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & *al.*, 1985a, 1987. Forêt de pins: DENIS, 1964b. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt, allée: VEILLON, 1997. Forêt, chênes et sur les chênes-verts: DENIS, 1963c. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Lande: DENIS, 1938a; LANCELEVÉE, 1884. Marécage: SIMON, 1876a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & *al.*, 1985a. **Période.** — *Mâle.* Mars: DENIS, 1967d. Juin: DENIS, 1938a, 1952b, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997. Août: DENIS, 1964b; LEDOUX, 1993. Septembre: DENIS, 1963c; EMERIT & *al.*, 1997; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1938a. Juin: DENIS, 1938a, 1964b; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004. Juillet: DENIS, 1964b. Août: DENIS, 1963c; LUCAS, 1870d. Septembre: DENIS, 1963c; LUCAS, 1875. Octobre: DENIS, 1963c.

### *Evarcha jucunda* (Lucas, 1846)

*Ergane j.*; *Hasarius jucundus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*H. j.*); SIMON, 1876a (*H. j.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*H. j.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; DENIS, 1954b; KABOUCHE & *al.*, 1997; SOYER, 1959. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1876a (*H. j.*), 1937. Gard: CHANSIGAUD & *al.*, 1994; EMERIT & *al.*, 1994. Hérault: EMERIT & *al.*, 1985; SIMON, 1876a (*H. j.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 1999a; SIMON, 1876a (*H. j.*). Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*H. j.*); SIMON, 1876a (*H. j.*). Var: BECKER, 1880 (*H. j.*), 1882 (*H. j.*); DENIS, 1937b; GROS, 2004; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1876a (*H. j.*), 1898c (*E. j.*). Vaucluse: CHANSIGAUD, 1992; COR-

NIC, 1978; SIMON, 1876a (*H. j.*). — Midi de la France: SIMON, 1937. Belgique, Espagne, Italie. Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Arbustes: CANARD, 1989. Bord de rivière, *Populeum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Broussailles: CHANSIGAUD & al., 1994. Dune: SOYER, 1959. Dune à oyats: EMERIT & al., 1994. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins: CANARD, 1989. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Garrigue: SOYER, 1959. Garrigue à chênes-verts: CHANSIGAUD & al., 1994. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & al., 1994. Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1959. Maquis, litière: CANARD, 1989. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie: LEDOUX & al., 1999a. Ripisilve: CHANSIGAUD & al., 1994. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre; talus: CHANSIGAUD, 1992. *Theorobrachypodium*: BIGOT, 1965. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1937b; SOYER, 1959. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 1999a. Octobre: CANARD, 1989; LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle.* Avril: KRAUS, 1955. Mai: DENIS, 1937b. Juin: CHANSIGAUD & al., 1994; CORNIC, 1978; GROS, 2004; LEDOUX & al., 1999a. Juillet: LEDOUX & al., 1996a. Octobre: KABOUCHE & al., 1997.

***Evarcha laetabunda*** (C. L. Koch, 1848)

*Ergane l.*; *Hasarius laetabundus*.

[Certaines citations de cette espèce, antérieures à 1992, pourraient se rapporter à *E. michailovi*]. **Répartition.** Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*H. l.*). Ardèche: SIMON, 1937. Aube: SIMON, 1876a (*H. l.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Drôme: SIMON, 1937. Isère: SIMON, 1876a (*H. l.*). Loiret: LEDOUX & al., 2002, 2004a. Nièvre: DENIS, 1943b. Puy-de-Dôme: LEDOUX & al., 2004a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; SIMON, 1876a (*H. l.*). "Seine": SIMON, 1876a (*H. l.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1898b (*E. l.*). Var: SIMON, 1876a (*H. l.*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: DENIS, 1947b, 1962b. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 800 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois, chênes: DENIS, 1943b. Forêt: DENIS, 1947b. Forêt de pins, chênes-verts; forêt de pins, herbes: DENIS, 1962b. Marécage: LEDOUX & al., 2004a. Marécage salé: BIGOT, 1965. Pelouse calcaire: BOSMANS & al., 1985a. Prairie: LEDOUX & al., 2002, 2004a. Prairie sèche: LEDOUX & al., 2004a. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. Tourbière: LEDOUX & al., 2004a. **Période.** — *Mâle.* Avril: LEDOUX & al., 2002, 2004a. Juin: CORNIC, 1978; LEDOUX & al., 2004a. Juillet, août: LEDOUX & al., 2004a. Octobre: LEDOUX & al., 2002, 2004a. Novembre: SIMON, 1937. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1943b, 1947b. Octobre: LEDOUX & al., 2002, 2004a.

***Evarcha michailovi*** Logunov, 1992

**Répartition.** Dordogne, Gard, Hérault: LEDOUX & al., 2001, 2004a. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a, 2001, 2004a. Vaucluse: LEDOUX & al., 2001. — Russie, Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1550 m

(LEDOUX & al., 2004a). **Habitat.** Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a, 2004a. Maquis de cistes; pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Prairie; prairie sèche: LEDOUX & al., 2004a. **Période.** — *Mâle.* Mai: LEDOUX & al., 1996a, 2004a. Juin: LEDOUX & al., 2004a. Juillet: LEDOUX & al., 1996a, 2004a. — *Femelle.* Mai à juillet: LEDOUX & al., 1996a, 2004a. Octobre: LEDOUX & al., 2004a.

***Habrocestum pullatum*** Simon, 1876

[*Mâle* inconnu]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1876a, 1937. [SIMON, 1937 indique à propos de la citation des Pyrénées-Orientales: «Localité incertaine»]. — Espagne, Italie.

***Hasarius adansoni*** (Sav. & Aud., 1825)

*Plexippus a.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales: SIMON, 1876a. "Seine": LUCAS, 1874a (*P. a.*); SIMON, 1876a. [SIMON, 1937 note: «Espèce tropicale probablement introduite en France et en Angleterre où elle ne se trouve guère que dans les serres chaudes»]. — Toute la France, acclimatée dans les serres chaudes: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Cosmopolite. **Habitat.** Murailles: SIMON, 1876a.

***Heliophanus aeneus*** (Hahn, 1831)

*H. muscorum.*

**Répartition.** Aisne: SIMON, 1876a, 1937. Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Cantal: SIMON, 1876a. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Garonne (Haute-): DENIS, 1953b, 1954a. Isère: SIMON, 1876a. Jura: SIMON, 1937. Oise: SIMON, 1876a, 1937. Pas-de-Calais: DENIS, 1937d. Puy-de-Dôme: DENIS, 1948b. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*H. m.*); DENIS, 1952c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Vendée: DENIS, 1963c. Vosges: SIMON, 1876a, 1937. Yonne: SIMON, 1937. — Alpes, Auvergne, Cévennes, Pyrénées: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2400 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1960a. Bord de lac, sous des pierres: DENIS, 1955c. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1952c. Éboulis: LEDOUX & al., 1996a, 1996b. Éboulis calcaire: DENIS, 1959d. Gorge humide, mousses: BOSMANS & al., 1985a. Litière de pins: DENIS, 1963c. Prairie: LEDOUX & al., 1996b. Prairie alpestre: BOSMANS & al., 1985a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Rhododendrons: LEDOUX & al., 1996c. Sous une pierre: DENIS, 1950b, 1952c. Sur un sapin; tourbière, sous les pierres: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Juillet: DENIS, 1950b, 1952c, 1954a, 1960a; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1937d, 1952c; LEDOUX & al., 1996a, 1996b. Septembre: DENIS, 1953b. — *Femelle.* Juillet: DENIS, 1938a, 1950b, 1952c, 1954a, 1955c, 1959d, 1960a; LEDOUX & al., 1996a, 1996c. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996b. Septembre: DENIS, 1953b. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1938a, 1948b, 1950b, 1952c. Août: DENIS, 1952c.

*Heliophanus apiatus* Simon, 1868

**Répartition.** Vaucluse: SIMON, 1937. — Espagne, Italie.

*Heliophanus auratus* C. L. Koch, 1835*H. exultans.*

**Répartition.** Allier: SIMON, 1876a. Alpes (Hautes-): SIMON, 1937. Alpes-Maritimes: SIMON, 1937 (*H. e.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a, 1937, 1937 (*H. e.*). Aube, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1876a, 1937. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Finistère: COUTANT, 1990. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a, 1937. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1937. Indre: SIMON, 1876a, 1937. Landes: SIMON, 1937. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: COUTANT, 1990. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b (*H. e.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a (*H. e.*); LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1937. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Seine-et-Marne, Var: SIMON, 1937. Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a, 1937. Vienne (Haute-): SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (LEDOUX & al., 1996b). **Habitat.** Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & al., 1999a. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Clôture: BRAUD & al., 2005. Éboulis: LEDOUX & al., 1996b. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Friche: VEILLON, 1997. Marécage: BELIN, 2001. Prairie: LEDOUX & al., 2002; SIMON, 1876a. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996b. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous l'écorce d'un pin abattu; sous une pierre: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle.* Avril, mai: LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX & al., 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Août: LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a, 2002; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1950b. — *Femelle avec cocon.* Juillet: DENIS, 1950b.

*Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802)*H. metallicus.*

[Les citations sous *H. metallicus* pourraient se rapporter à *H. patagatius*. Voir la note sous *H. patagatius*].

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1882; SIMON, 1876a. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1960a, 1961b. Aube: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Calvados: GUIBÉ, 1946; SIMON, 1876a. Cantal: SIMON, 1876a. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999. Corrèze: LE PERU, 2004. Corse: HARM, 1971; KRAUS, 1955; SIMON, 1876a, 1937; TIBERGHEN & al., 1993a; WESOLOWSKA, 1986. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: COUTANT, 1990. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: WESOLOWSKA, 1986. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979; COUTANT, 1990; DENIS, 1938a. Indre: SIMON, 1876a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a; PIONNEAU,

1911. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: COUTANT, 1990; DENIS, 1938a; SIMON, 1876a. Nord: GOULLIART, 1980. Oise: SIMON, 1876a. Orne: COUTANT, 1990. Pas-de-Calais: GROS, 1983a. Puy-de-Dôme: LE PERU, 2004; SIMON, 1876a. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1955c; LUCANTE, 1880b (*H. m.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a, 1959d; LUCANTE, 1880b (*H. m.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003. Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880; MULLER & al., 1895 (*H. m.*); REIBER, 1880. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": ROLLARD, 2000; SIMON, 1876a, 1878f. Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: SIMON, 1876a. Somme: ROSELLE, 1887. Tarn: SIMON, 1876a. Var: DENIS, 1937b; SIMON, 1876a, 1898c. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. Vosges: SIMON, 1876a. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1750 m (LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1965c. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, lisière: DENIS, 1959d. Bord d'étang; bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de ruisseau, litière: LEDOUX & al., 2003. Bord de ruisseau, sous des pierres: BOSMANS & al., 1985a. Champ: LEDOUX & al., 1996a. Clôture: BRAUD & al., 2005. Dune, oyats: DENIS, 1963c. Écorces: GOULLIART, 1980. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: DENIS, 1938a, 1960a. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière: BOSMANS & al., 1985a. Forêt de bouleaux et de hêtres: BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de conifères: LEDOUX & al., 2003. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt, litière: DENIS, 1964b. Friche: VEILLON, 1997. Friches, sous les pierres: SIMON, 1876a. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; DENIS, 1965c; LE PERU, 2004. Jardin, sous les pierres: SIMON, 1876a. Lande: DENIS, 1938a. Lande sèche: CANARD, 1979. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Lisière de forêt humide: LE PERU, 2004. Lit de rivière, sous des pierres: DENIS, 1943c. Maison: BRAUD & al., 2005. Marécage: BELIN, 2001. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse sèche: BRAUD & al., 2005. Pelouse à *Brachypodium*: LEDOUX & al., 1996a. Plage, rouleaux de *Fucus* secs: CLARK & al., 1970. Prairie: PASQUET & al., 1992; ROSELLE, 1887; TIBERGHEN & al., 1993a. Prairie avec buissons: LEDOUX & al., 1999a. Prairie en friche: LE PERU, 2004. Prairie humide: BOSMANS & al., 1985a. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 2002. Sous une pierre: DENIS, 1963c. Sur un mur: LENICE, 1992. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1959. Terrain vague: BOSMANS & al., 1985a. **Période.** — *Mâle.* Avril: CLARK & al., 1970; DENIS, 1943c, 1962b; LEDOUX & al., 1996a, 2002, 2003. Mai: DENIS, 1965c; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b, 1964b; EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a, 1999a, 2002; LESSERT, 1904. Juillet: DENIS, 1938a, 1954a,

1955c, 1960a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 2003. Septembre: DENIS, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997. — *Femelle*. Avril: DENIS, 1937b, 1962b; VEILLON, 1997. Mai: DENIS, 1937b, 1938a, 1965c; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a; LESSERT, 1904. Juin: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1938a; EMERIT & *al.*, 1997; LE PERU, 2004; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1999a; LESSERT, 1904; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1957a, 1959d, 1961b, 1963c; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: GROS, 1983a; LEDOUX, 1993; LUCAS, 1882a. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1962b; KRAUS, 1955; WESOLOWSKA, 1986. Octobre: DENIS, 1962b. — *Femelle avec cocon*. Avril: DENIS, 1943c. Mai: DENIS, 1937b. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1962b. Juillet: DENIS, 1938a, 1961b, 1964b.

*Heliophanus dampfi* Schenkel, 1923

**Répartition.** Charente-Maritime: JOURDE & *al.*, 1999. Puy-de-Dôme: VILLEPOUX, 1990a. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Europe, Russie. **Altitude.** Jusqu'à 1200 m (VILLEPOUX, 1990a). **Habitat.** Tourbière à sphaignes: VILLEPOUX, 1990a.

*Heliophanus dubius* C. L. Koch, 1835

**Répartition.** Corse: WESOLOWSKA, 1986. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Lozère: SIMON, 1937. Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. "Seine": SIMON, 1876a. Vaucluse: LEDOUX, 1972. [À propos de la citation de Lozère, SIMON, 1937 note: «Seule localité française certaine, mais il y en a certainement d'autres car plusieurs individus se trouvaient mêlés à nos *H. cupreus*»]. — Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Forêt de conifères: LEDOUX & *al.*, 1996a. Forêt de pins, sous des pierres; pins: DENIS, 1950b. Prairie: LEDOUX & *al.*, 2003. Sous les écorces de pins abattus: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Mai: LEDOUX & *al.*, 1996a. Juin: EMERIT & *al.*, 1997; LEDOUX & *al.*, 1996a, 2003. — *Femelle*. Juin: EMERIT & *al.*, 1997. Juillet: DENIS, 1950b; LEDOUX, 1972.

*Heliophanus edentulus* Simon, 1871

**Répartition.** Corse: SIMON, 1876a, 1937. — Méditerranée.

*Heliophanus encifer* Simon, 1871

**Répartition.** Corse: SIMON, 1876a, 1937. — Italie. Méditerranée.

*Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832)

*H. corsicus*; *H. fulvignathus*; *H. hecticus*.

**Répartition.** Ain: SIMON, 1876a; VILLEPOUX, 1990. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*H. h.*). Aube: SIMON, 1876a. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; JOURDE & *al.*, 1999. Corse: KRAUS, 1955 (*H. c.*); SIMON, 1876a (*H. c.*), 1937 (*H. c.*); WESOLOWSKA, 1986. Côtes-d'Armor: COUTANT, 1990; DENIS, 1938a. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: SIMON, 1909b. Finistère: COUTANT, 1990; DENIS, 1938a, 1939a. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990c; COUTANT, 1990. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b.

Loire-Atlantique: COUTANT, 1990; DENIS, 1967e. Loiret: LEDOUX & *al.*, 2002. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005; VEILLON, 1997. Manche: BERLAND, 1924; LUCAS, 1878b; SIMON, 1876a. Marne (Haute-): SIMON, 1876a. Morbihan: COUTANT, 1990; SIMON, 1876a. Orne: COUTANT, 1990. Pas-de-Calais: BONTE, 2000; EMERIT & *al.*, 1999. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & *al.*, 1986; DENIS, 1955c. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1961b; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a; SIMON, 1876a (*H. f.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LESSERT, 1904. "Seine": COCQUEMPOT & *al.*, 1991; SIMON, 1876a. Seine-Maritime: SIMON, 1876a. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: SIMON, 1876a. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1962b, 1963c. Vienne: SIMON, 1876a. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1600 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a, 1967e. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de torrent: DENIS, 1955c. Champ de céréales: COCQUEMPOT & *al.*, 1991. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & *al.*, 1999. Dune: CLARK & *al.*, 1970. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux: BONTE, 2000. Forêt: DENIS, 1963c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962b. Forêt, sous les pierres: DOIGNON, 1976. Friche: VEILLON, 1997. Genêts: LEDOUX & *al.*, 1996a. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Lande: CANARD, 1990c. Littoral, dans la végétation sèche: CLARK & *al.*, 1970. Marécage: BELIN, 2001; VILLEPOUX, 1990b. Pelouse: BERLAND, 1924. Pelouse à plantain caréné: LEDOUX & *al.*, 1995. Prairie: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c, 2002. Prairie calcaire: EMERIT & *al.*, 1999. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: EMERIT & *al.*, 1997; LUCAS, 1878b. **Période.** — *Mâle*. Avril: KRAUS, 1955; WESOLOWSKA, 1986. Mai: BONTE, 2000; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904. Juin: EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002; LESSERT, 1904; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 1996c. Novembre: LESSERT, 1904. — *Femelle*. Avril: CLARK & *al.*, 1970. Mai: BONTE, 2000; DENIS, 1967e; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904. Juin: DENIS, 1938a, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997, 1999; LEDOUX & *al.*, 2002; LESSERT, 1904; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1939a, 1955c; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c. Août: DENIS, 1962b; LEDOUX & *al.*, 1996b, 1996c; LUCAS, 1878b. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1963c; LEDOUX & *al.*, 1996a, 1996c. Novembre: LESSERT, 1904. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1939a, 1961b.

*Heliophanus kochii* Simon, 1868

*H. armatus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881, 1882; SIMON, 1876a; WESOLOWSKA, 1986. Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aveyron: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: KABOUCHE & *al.*, 1997; SOYER, 1959. Charente-Maritime: SIMON, 1876b. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Finistère: DENIS, 1938a, 1940a. Gers: SIMON, 1876a. Jura: SIMON, 1937. Lot: LUCANTE, 1880b. Morbihan: COUTANT, 1990. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b (*H. a.*), 1880b; SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 2003; SIMON, 1876a (*H. a.*), 1937. Savoie (Haute-): LESSERT,

1910. Tarn: SIMON, 1876a. Var: BECKER, 1880; DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000. Vendée: DENIS, 1941, 1962d, 1963c. — Midi de la France: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1120 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Dune: DENIS, 1941, 1962d. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt de pins clairsemée: KABOUCHE & al., 1997. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962d. Friche: LEDOUX & al., 2003. Littoral, *Crithmo-station*: SOYER, 1959. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Sous une pierre: DENIS, 1940a. **Période.** — *Mâle*. Février: LESSERT, 1910. Avril, mai: LEDOUX & al., 1996a. Juillet: DENIS, 1940a. Août: DENIS, 1962d. Octobre: SIMON, 1937. Décembre: LESSERT, 1910. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1937b, 1967d; LEDOUX & al., 1996a; LESSERT, 1910. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1938a, 1963c; LEDOUX & al., 2003. Août: LEDOUX & al., 2003. Octobre: SIMON, 1937. Décembre: LESSERT, 1910. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1941. Juillet: DENIS, 1940a.

#### *Heliophanus lineiventris* Simon, 1868

*H. albonotatus*; *H. semipullatus*.

**Taxonomie.** Les synonymies *H. albonotatus* Denis, 1962 = *H. lineiventris* et *H. semipullatus* Denis, 1953 = *H. lineiventris* sont établies par WESOLOWSKA, 1986. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; SOYER, 1959. Corse: KRAUS, 1955; SIMON, 1876a, 1937. Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*H. s.*); DENIS, 1953a (*H. s.*), 1955c (*H. s.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (*H. s.*). Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1876a. Var: SIMON, 1898c. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962d (*H. a.*), 1963c, 1963c (*H. a.*), 1964b (*H. a.*). — Midi de la France: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2760 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970; LEDOUX & al., 1999a. Dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b. Dune, oyats; dune, sous les *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Forêt de pins maritimes: CLARK & al., 1970. Forêt de pins, litière: DENIS, 1962d. Marécage salé: BIGOT, 1965. Pelouse à *Brachypodium ramosum*, sous des pierres: SOYER, 1959. Sable, oyats secs: DENIS, 1963c. *Salicornietum*; *Therobrachypodium*: BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1955c, 1957a. Août: DENIS, 1953a, 1964b. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1963c. Octobre: DENIS, 1963c, 1963c. — *Femelle*. Juillet: DENIS, 1963c. Septembre: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962d. — *Femelle avec cocon*. Août: DENIS, 1953a.

#### *Heliophanus melinus* L. Koch, 1867

*H. expers*; *H. grammicus*; *H. viriatus*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1882 (*H. g.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*H. g.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1876a (*H. g.*); SOYER, 1959 (*H. v.*). Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corse: SIMON, 1937 (*H. v.*). Pyrénées-Orientales: DENIS, 1967d (*H. v.*); SIMON, 1876a (*H. g.*); TAMBS-LYCHE, 1957 (*H. v.*). "Seine": SIMON, 1876a (*H. e.*), 1937 (*H. v.*). Var: BECKER, 1880 (*H. g.*); BIGOT & al., 1979 (*H. v.*); KOVOOR & al., 2000, 2000 (*H. v.*); SIMON, 1876a (*H. g.*), 1898c (*H. g.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000;

SIMON, 1876a (*H. g.*). Vendée: DENIS, 1962d (*H. v.*), 1963c (*H. v.*). — Midi de la France: SIMON, 1937 (*H. v.*). Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Dune: DENIS, 1963c. Forêt de pins, sous *Tamarix anglica*: DENIS, 1962d. Milieu urbain, jardin: SIMON, 1876a. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Pelouse à *Brachypodium ramosum*: SOYER, 1959. Plantations d'oliviers, sous les pierres: SIMON, 1876a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1967d; LEDOUX, 2000; TAMBS-LYCHE, 1957. — *Femelle*. Mai: LEDOUX, 2000. Août: DENIS, 1962d, 1963c.

#### *Heliophanus patagiatus* Thorell, 1875

*H. metallicus* [err.].

[Les citations sous le nom *H. metallicus* par SIMON, 1876a sont erronées selon SIMON, 1937, et se rapportent à *H. patagiatus*. *H. metallicus* est en fait un synonyme de *H. cupreus*]. **Répartition.** Ain: HEIDT & al., 1998. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a [*H. metallicus*, err. selon SIMON, 1937]. Ardèche: SIMON, 1937. Rhin (Haut-): LESSERT, 1910. Savoie: SIMON, 1876a [*H. metallicus*, err. selon SIMON, 1937]. — Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de Provence; Pyrénées: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Bord de rivière, graviers: HEIDT & al., 1998.

#### *Heliophanus rufithorax* Simon, 1868

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; SIMON, 1876a, 1937; WESOLOWSKA, 1986. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979. Maine-et-Loire: BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Morbihan: MURPHY, 1994. Vendée: DENIS, 1962b, 1962d, 1964b. — Espagne, Italie. De l'Europe du Sud à l'Asie Centrale. **Altitude.** 400 m (KRAUS, 1955). **Habitat.** Arbustes: CANARD, 1989. Bâtiment, sur une fenêtre: VEILLON, 1997. Dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Haie: BRAUD & al., 2005. Lande sèche: CANARD, 1979. Maison: BRAUD & al., 2005. Maquis: CANARD, 1989. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b. Mai: VEILLON, 1997. Juin: SIMON, 1937. Septembre: CANARD, 1989; DENIS, 1962d. — *Femelle*. Avril: KRAUS, 1955. Juin: SIMON, 1937. Juillet: DENIS, 1962b. Août: VEILLON, 1997. Septembre: CANARD, 1989.

#### *Heliophanus tribulosus* Simon, 1868

*H. cambridgei*; *H. pubescens*.

**Taxonomie.** La synonymie *H. pubescens* Denis, 1964 = *H. tribulosus* est établie par CANTARELLA, 1974. **Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*H. c.*). Ardennes: LENICE, 1992. Ariège: DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b (*H. c.*). Aveyron: SIMON, 1876a (*H. c.*). Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; SOYER, 1959. Calvados: GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime: BELIN, 2001; SIMON, 1876b (*H. c.*). Corse: WESOLOWSKA, 1986. Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a. Dordogne: LUCANTE, 1880b (*H. c.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1899 (*H. c.*), 1909b (*H. c.*). Finistère: DENIS, 1939a. Garonne (Haute-): LUCANTE, 1880b (*H. c.*). Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b (*H. c.*); SIMON, 1876a (*H. c.*). Hérault: EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine: COUTANT, 1990. Indre: SIMON, 1876a (*H. c.*). Landes: LUCANTE, 1880b (*H. c.*); SIMON, 1876a (*H. c.*). Loire-Atlantique: COUTANT, 1990; LUCAS,

1882a (*H. c.*). Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*H. c.*). Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Manche: LUCAS, 1878b (*H. c.*); SIMON, 1876a (*H. c.*). Morbihan: COUTANT, 1990; DENIS, 1938a; MURPHY, 1994; SIMON, 1876a (*H. c.*). Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b (*H. c.*). Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b (*H. c.*); WESOLOWSKA, 1986. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a; SIMON, 1876a (*H. c.*). "Seine": SIMON, 1876a (*H. c.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*H. c.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1876a (*H. c.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*H. c.*). Var: BECKER, 1880 (*H. c.*); DENIS, 1937b; KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1876a (*H. c.*), 1898c (*H. c.*). Vaucluse: CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & *al.*, 1970; COUTANT, 1990; DENIS, 1941, 1959c, 1962b, 1963c (*H. p.*), 1964b (*H. p.*), 1965c (*H. p.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 1300 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1965c. Arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1963c, 1964b. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & *al.*, 1985. Dune: CLARK & *al.*, 1970. Dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt: DENIS, 1938a. Forêt de pins: DENIS, 1965c. Forêt de pins, litière; forêt, chênes-verts: DENIS, 1964b. Garrigue: SOYER, 1959. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & *al.*, 1973. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Herbes sèches: LANCELEVÉE, 1884. Lande: LUCAS, 1878b, 1882a. Maquis de cistes: LEDOUX & *al.*, 1996a. Maquis, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Marécage: BELIN, 2001. Plage, galets: DENIS, 1959c. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous une pierre: DENIS, 1963c; LUCAS, 1878b, 1882a. Sur un mur: LENICE, 1992. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Mai: DENIS, 1937b, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1938a, 1964b. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1963c, 1964b. Août: LUCAS, 1878b, 1882a. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1959c. Octobre: DENIS, 1963c. — *Femelle.* Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1937b, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin: CORNIC, 1978; DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1960a; LEDOUX & *al.*, 1996a. Août: DENIS, 1964b; LUCAS, 1878b, 1882a. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; EMERIT & *al.*, 1997. — *Femelle avec cocon.* Juin: DENIS, 1941, 1964b. Juillet: DENIS, 1939a, 1963c.

*Icius congener* Simon, 1871

*I. nebulosus.*

**Répartition.** Corse: KRAUS, 1955 (*I. n.*); SIMON, 1876a, 1937. — Espagne, Italie. Ouest-Méditerranée.

*Icius hamatus* (C. L. Koch, 1846)

*I. striatus*; *I. striatus hamatus.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*I. s.*). Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Charente: SIMON, 1937. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; METZNER, 1999; SIMON, 1876a (*I. s.*), 1937. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX & *al.*, 1995, 1996a, 1999a, 2003; TAMBS-LYCHE, 1957. Var: BIGOT, 1993; BIGOT & *al.*, 1979, 1987a, 1987b, 1988; DENIS, 1937a (*I. s. h.*), 1937a (*I. s.*), 1937b; KOVOOR & *al.*, 2000. Vaucluse:

SIMON, 1876a (*I. s.*). — Midi de la France: SIMON, 1937. Espagne, Italie. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Bois de chênes-lièges: TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de rivière, buissons: METZNER, 1999. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & *al.*, 1999a. Formation à chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 1995. Forêt de chênes-lièges: BIGOT & *al.*, 1987b, 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes: BIGOT & *al.*, 1987a. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & *al.*, 2003. Garrigue: SOYER, 1959. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Maquis: CANARD, 1989. Maquis de cistes: LEDOUX & *al.*, 1996a. Taillis de chênes-verts: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Février: DENIS, 1943c. Avril: LEDOUX & *al.*, 2003. Mai: DENIS, 1937b. Juin: DENIS, 1943c. Août: LEDOUX & *al.*, 2003. Septembre: CANARD, 1989; METZNER, 1999. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a, 2003. — *Femelle.* Avril: KRAUS, 1955. Mai: DENIS, 1937b; SOYER, 1959. Juin: DENIS, 1943c. Juillet: CANARD, 1989. Août: LEDOUX & *al.*, 2003. Septembre: METZNER, 1999. Octobre: LEDOUX & *al.*, 1999a.

*Icius subinermis* Simon, 1937

*I. notabilis.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881 (*I. n.*); SIMON, 1876a (*I. n.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*I. n.*). Ardèche: RAPHAËL & *al.*, 1992. Aude, Corse: SIMON, 1876a (*I. n.*). Gard: EMERIT & *al.*, 1994. Gers: LUCANTE, 1880b (*I. n.*); SIMON, 1876a (*I. n.*). Hérault: EMERIT & *al.*, 1985. Lot: LUCANTE, 1880b (*I. n.*); SIMON, 1937. Maine-et-Loire: SIMON, 1937. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a; LEDOUX & *al.*, 1999a. Var: BECKER, 1880 (*I. n.*); KOVOOR & *al.*, 2000; SIMON, 1876a (*I. n.*), 1898c (*I. n.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a (*I. n.*). Vendée: COUTANT, 1990; SIMON, 1876a (*I. n.*), 1937. Vienne: SIMON, 1876a (*I. n.*). — Midi de la France jusque dans le Lot et en Vendée: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Ouest-Méditerranée. **Habitat.** Bord de rivière, fourrés de saules: LEDOUX & *al.*, 1999a. Bord de rivière, galets: RAPHAËL & *al.*, 1992. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & *al.*, 1985. Bord de ruisseau: BOSMANS & *al.*, 1985a. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & *al.*, 1992. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins: EMERIT & *al.*, 1994. Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Janvier, mai: LEDOUX, 2000. Juin: LEDOUX & *al.*, 1999a. Novembre: LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Janvier, novembre: LEDOUX, 2000.

*Leptorchestes berolinensis* (C. L. Koch, 1846)

*Salticus formicoeformis.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Gers: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Isère: SIMON, 1876a. Landes: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c. Rhin (Haut-): SCHALLER, 2000. "Seine": LUCAS, 1849b (*S. f.*); SIMON, 1876a. Var: SIMON, 1898c. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse. De l'Europe au Turkménistan. **Habitat.** Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1954b. Jardin: LUCAS, 1849b. Palissades en planches: SIMON, 1876a. Sous une pierre: DENIS, 1943c. Vieux troncs d'arbres: SIMON, 1876a. [SIMON, 1876a ajoute: «elle ne paraît pas s'éloigner



des endroits cultivés »]. **Période.** — *Femelle.* Janvier : DENIS, 1943c.

***Leptorchestes mutilloides*** (Lucas, 1846)

*L. chrysopogon.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a. Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1973 ; DENIS, 1954b ; SOYER, 1959. Corse : SIMON, 1876a, 1876a (*L. c.*), 1937. Hérault : BONARIC, 1974 ; METZNER, 1999. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; LEDOUX & al., 1996a, 2003. Var : BERLAND, 1926 ; SIMON, 1876a. Vaucluse : SIMON, 1876a. — Midi de la France : SIMON, 1937. Espagne, Italie, Suisse. Europe du Sud, Algérie. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Lieux découverts et pierreux : SOYER, 1959. Prairie : LEDOUX & al., 2003. Sous une pierre : METZNER, 1999. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. **Période.** — *Mâle.* Mai : METZNER, 1999. — *Femelle.* Juillet : LEDOUX & al., 1996a.

***Marpissa canestrinii*** (Ninni, 1868)

*Hycia c.* ; *Mendoza c.* ; *Mithion c.*

**Taxonomie.** L'espèce *Marpissa canestrinii* a été placée successivement dans plusieurs genres : *Marpissa*, *Hycia*, *Mithion* et *Mendoza*. Devant le désaccord des auteurs, le nom *Marpissa canestrinii* est arbitrairement retenu ici. **Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b (*Mithion c.*). Alpes-Maritimes, Charente : SIMON, 1937 (*Mithion c.*). Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corse : SIMON, 1876a (*H. c.*), 1937 (*Mithion c.*). Dordogne, Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1937 (*Mithion c.*). Var : DENIS, 1937b (*Mithion c.*). Vaucluse : LEDOUX, 2000 (*Mithion c.*). — Espagne, Italie, Suisse (*Mendoza c.* ; *Mithion c.*). Afrique du Nord, Paléarctique (*Mendoza c.*). **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord d'étang : LEDOUX, 2000. Marécage : BELIN, 2001 ; VILLEPOUX, 1990b. **Période.** — *Mâle.* Avril, juin : LEDOUX, 2000. — *Femelle.* Mai : DENIS, 1937b.

***Marpissa muscosa*** (Clerck, 1757)

*Attus muscosus* ; *Marpissus muscosus*.

**Répartition.** Calvados : GUIBÉ, 1946. Charente-Maritime : BELIN, 2001 ; JOURDE & al., 1999. Corrèze : LE PERU, 2004. Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : SIMON, 1909b. Gers : LUCANTE, 1880b. Gironde : DENIS, 1951b, 1952a. Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Marne : LUCAS, 1878a (*M. m.*). Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910. Rhin (Haut-) : MULLER & al., 1895 ; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910. "Seine" : ROLLARD, 2000. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976. Somme : ROSELLE, 1887. Vendée : DENIS, 1962b. Yonne : LUCAS, 1871b (*M. m.*), 1872 (*A. m.*). — Toute la France sauf la région méditerranéenne : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Ancienne vigne : EMERIT & al., 1997. Bord d'étang : VEILLON, 1997. Estuaire, sous des joncs coupés : DENIS, 1951b. Forêt, troncs : DOIGNON, 1976. Jardin : LE PERU, 2004. Maison : BRAUD & al., 2005. Marécage : BELIN, 2001 ; DENIS, 1952a ; SCHALLER, 2000. Murs : LUCAS, 1878a. Piquets de jardin :

SIMON, 1876a. Prairie : ROSELLE, 1887. Sous l'écorce d'un vieux chêne : LUCAS, 1871b. Sous les écorces de cerisiers : LANCELEVÉE, 1884. Sous les écorces de saules : SIMON, 1876a. Sous les écorces des chênes : LUCAS, 1872. **Période.** — *Mâle.* Juillet : DENIS, 1962b. — *Femelle.* Février : LESSERT, 1910. Mai : LE PERU, 2004. Août : LUCAS, 1878a ; VEILLON, 1997. Septembre : DENIS, 1951b. — *Femelle avec ses jeunes.* Août : LUCAS, 1871b.

***Marpissa nivoyi*** (Lucas, 1846)

*Hycia n.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aude : SIMON, 1876a (*H. n.*). Bouches-du-Rhône : DENIS, 1954b (*H. n.*) ; KABOUCHE & al., 1997 (*H. n.*). Calvados : GUIBÉ, 1946 (*H. n.*). Charente-Maritime : BELIN, 2001. Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1876a (*H. n.*), 1937 (*H. n.*). Doubs : EMERIT & al., 1997 ; SIMON, 1876a (*H. n.*). Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*H. n.*). Gard : EMERIT & al., 1994 ; LEDOUX, 2000 (*H. n.*). Gers : LUCANTE, 1880b (*H. n.*) ; SIMON, 1876a (*H. n.*). Gironde : DENIS, 1951b (*H. n.*), 1952a (*H. n.*). Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 (*H. n.*) ; LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire : VEILLON, 1997. Morbihan : COUTANT, 1990. Pas-de-Calais : BONTE, 2000. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1943c (*H. n.*). "Seine" : ROLLARD, 2000 ; SIMON, 1876a (*H. n.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*H. n.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*H. n.*) ; SIMON, 1876a (*H. n.*). Var : DENIS, 1937b (*H. n.*). Vaucluse : LEDOUX, 2000 (*H. n.*). Vendée : CLARK & al., 1970 (*H. n.*) ; DENIS, 1941 (*H. n.*), 1962b (*H. n.*), 1963c (*H. n.*), 1964b (*H. n.*), 1965c (*H. n.*) ; DUFFEY, 1964 (*H. n.*). — Presque toute la France : SIMON, 1937 (*H. n.*). Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 200 m (KABOUCHE & al., 1997). **Habitat.** Ancienne vigne : EMERIT & al., 1997. Arrière-dune : DENIS, 1964b, 1965c. Bois de chênes : EMERIT & al., 1997. Bois humides : SIMON, 1937. Bord d'étang : LEDOUX, 2000. Bord de mare : DOIGNON, 1976. Bord de torrent, joncs : CANARD, 1989. Dune : DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c ; DUFFEY, 1964. Dune à oyats : EMERIT & al., 1994. Estuaire, schorre : BONTE, 2000. Estuaire, sous des joncs : DENIS, 1952a. Estuaire, sous des joncs coupés : DENIS, 1951b. Forêt de pins : DENIS, 1962b, 1964b, 1965c. Forêt de pins clairsemée : KABOUCHE & al., 1997. Forêt, sous les pierres : DOIGNON, 1976. Lande : VEILLON, 1997. Lieux humides : SIMON, 1876a. Littoral, dans la végétation sèche : CLARK & al., 1970. Marécage : BELIN, 2001 ; SIMON, 1937. Mousses humides : LANCELEVÉE, 1884. *Populetum albae*, pelouse ; ripisilve, pelouse sur galets : LEDOUX, 2000. **Période.** — *Mâle.* Mars : DENIS, 1963c, 1964b. Avril : VEILLON, 1997. Mai : BONTE, 2000. Juin : DENIS, 1941, 1964b. Juillet : DENIS, 1963c. Août : DENIS, 1964b. Septembre : CANARD, 1989 ; DENIS, 1937b, 1951b, 1963c. Octobre : DENIS, 1963c ; KABOUCHE & al., 1997 ; LEDOUX, 2000. Novembre : DENIS, 1965c. Décembre : DENIS, 1964b. — *Femelle.* Janvier : DENIS, 1963c. Février : DENIS, 1965c. Mars : DENIS, 1952a, 1964b. Avril : CLARK & al., 1970 ; LEDOUX, 2000 ; VEILLON, 1997. Mai : BONTE, 2000 ; DENIS, 1937b, 1965c. Juin : DENIS, 1941. Juillet : DENIS, 1963c ; LEDOUX, 2000. Août : DENIS, 1964b. Septembre : DENIS, 1937b, 1951b, 1963c ; EMERIT & al., 1997. Octobre : DENIS, 1937b, 1963c. Novem-



bre : DENIS, 1965c ; LEDOUX, 2000. Décembre : DENIS, 1964b.

*Marpissa pomatia* (Walckenaer, 1802)

*Attus promptus*; *Marpissus pomatius*.

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube : SIMON, 1876a, 1937. Calvados : LUCAS, 1870e (*M. p.*). Cher : DENIS, 1943b. Eure : SIMON, 1937. Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Isère, Jura : SIMON, 1937. Marne (Haute-), Pyrénées-Orientales : SIMON, 1876a, 1937. Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000 ; LESSERT, 1910 ; MULLER & al., 1895. Savoie : SIMON, 1937. "Seine" : SIMON, 1878f, 1937. Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne : SIMON, 1937. Somme : DENIS, 1946b ; ROSELLE, 1888b ; SIMON, 1937. Yonne : LUCAS, 1872 (*A. p.*). — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bois humides : SIMON, 1937. Forêt : ROSELLE, 1888b. Friche, hautes herbes : SIMON, 1937. Marais, roseaux : DENIS, 1943b. Marécage : DENIS, 1946b ; SIMON, 1937 ; VILLEPOUX, 1990b. Sous les écorces : LUCAS, 1872. **Période.** — *Mâle.* Juin : SIMON, 1937. Août : LUCAS, 1870e ; SIMON, 1937. Septembre : DENIS, 1946b. Octobre : SIMON, 1937. — *Femelle.* Juin : DENIS, 1943b. Août : LUCAS, 1870e. Septembre : DENIS, 1946b.

*Marpissa radiata* (Grube, 1859)

**Répartition.** Aisne : SIMON, 1937. Aube : SIMON, 1876a, 1937. Calvados : GUIBÉ, 1946. Eure : EMERIT & al., 2003 ; LANCELEVÉE, 1884. Gironde : DENIS, 1952a. Loir-et-Cher : HENRY, 1981 ; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique : MURPHY, 1994. Nord : EMERIT & al., 1999. Oise, "Seine" : SIMON, 1876a, 1937. Seine-Maritime, Seine-et-Marne : SIMON, 1937. Vienne : DUREPAIRE & al., 1994. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Forêt : LANCELEVÉE, 1884. Lande humide : DUREPAIRE & al., 1994. Marais, épis secs de phragmites : SIMON, 1937. Marécage : DENIS, 1952a ; EMERIT & al., 2003 ; HENRY, 1981 ; MURPHY, 1994 ; SIMON, 1876a. Tourbière : EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Février : DENIS, 1952a. Mars : SIMON, 1937. Septembre : EMERIT & al., 2003. — *Femelle.* Mars : SIMON, 1937. Octobre : EMERIT & al., 1999.

*Menemerus bivittatus* (Dufour, 1831)

**Répartition.** [Selon SIMON, 1937 : « Trouvée en France et dans le sud de l'Angleterre probablement par suite d'introduction accidentelle ». Aucune localité précise]. — Espagne, Italie. Pantropical.

*Menemerus falsificus* Simon, 1868

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. Charente : SIMON, 1937. Charente-Maritime : SIMON, 1876a, 1937. Corse : SIMON, 1876a. Gers : LUCANTE, 1880b. Gironde, Landes : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1876a. Tarn : LUCANTE, 1880b. Var : BECKER, 1880, 1882 ; KOVOOR & al., 2000. — Midi de la France et l'ouest jusqu'en Charente : SIMON, 1937. Italie, Suisse. Europe du Sud. **Habitat.** Haie ; murailles : SIMON, 1876a. Murs des

maisons : SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Septembre : SIMON, 1937.

*Menemerus schutzae* Denis, 1961

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales : DENIS, 1961c, 1967d. — Connue seulement de France. **Période.** — *Femelle.* Mai : DENIS, 1967d.

*Menemerus semilimbatus* (Hahn, 1827)

**Répartition.** Alpes-Maritimes : BECKER, 1881. Ariège : LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1876a, 1937. Dordogne, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1943c. Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b. Var : BECKER, 1882 ; DENIS, 1937b. — Midi de la France : SIMON, 1937. Espagne, Italie. Des Canaries à l'Azerbaïdjan ; Argentine. **Habitat.** Maison, sur le mur extérieur : CANARD, 1989. Murailles : SIMON, 1876a. Murs des maisons : SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Septembre : CANARD, 1989. — *Femelle.* Mai : DENIS, 1943c.

*Menemerus taeniatus* (L. Koch, 1867)

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1937. Corse : KRAUS, 1955. Var : SIMON, 1937. — Italie. De la Méditerranée au Kazakhstan ; Argentine. **Période.** — *Mâle.* Avril : KRAUS, 1955. Juillet : SIMON, 1937. Septembre : KRAUS, 1955. — *Femelle.* Avril : KRAUS, 1955. Juillet : SIMON, 1937. Septembre : KRAUS, 1955.

*Mogrus frontosus* (Simon, 1871)

*Hasarius f.*

**Répartition.** Corse : SIMON, 1876a (*H. f.*), 1937. — Italie.

*Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778)

*M. formicarius*; *Pyroderes formicarius*; *Salticus formicarius*; *Salticus tyrolensis*.

**Répartition.** Ain : VILLEPOUX, 1990b. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a (*S. t.*). Ariège : DENIS, 1967d ; LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1957, 1965 ; BIGOT & al., 1977 ; DENIS, 1954b ; SOYER, 1959. Calvados : GUIBÉ, 1946 ; LUCAS, 1870d (*P. f.*). Charente-Maritime : BELIN, 2001 ; JOURDE & al., 1999. Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1876a (*S. f.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a ; LUCAS, 1871a (*P. f.*). Dordogne : LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : EMERIT & al., 2003 ; LANCELEVÉE, 1884 (*S. f.*) ; SIMON, 1909b. Garonne (Haute-), Gers : LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Gironde : DENIS, 1951b, 1952a ; LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Landes : GOULLIART, 1980 (*M. f.*) ; LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Loir-et-Cher : HENRY, 1981 ; HILLYARD, 1975 ; LEDOUX & al., 1999b. Loiret : LEDOUX & al., 2002. Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005 ; VEILLON, 1997. Manche : PÉTILLON & al., 2004. Morbihan : COUTANT, 1990 ; MURPHY, 1994. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b ; LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1943c. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000 ; LESSERT, 1910 ; MULLER & al., 1895 (*S. f.*) ; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910. "Seine" : ROL-

LARD, 2000; SIMON, 1878f (*S. f.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*S. f.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976 (*S. f.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*S. f.*). Var: DENIS, 1937b; KOVOOR & *al.*, 2000; PONEL, 1984; PONEL & *al.*, 1993. Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & *al.*, 1970; COUTANT, 1990; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1950 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & *al.*, 1997. Arrière-dune: DENIS, 1962b, 1965c. Bois: DENIS, 1941. Bord d'étang: VEILLON, 1997. Bord de plage: BIGOT & *al.*, 1977. Bord de rivière: LEDOUX & *al.*, 2002. Bord de torrent, joncs: CANARD, 1989. Clôture: BRAUD & *al.*, 2005. Cupule de gland: DENIS, 1965c. Dune: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1954b, 1962b, 1965c; DUFFEY, 1964. Estuaire, sous des joncs coupés: DENIS, 1951b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Forêt de pins: DENIS, 1962b, 1965c. Forêt de pins maritimes, détritus: CLARK & *al.*, 1970. Forêt de pins, sous des pierres: BOSMANS & *al.*, 1985a. Forêt, clairière: DOIGNON, 1976. Forêt, troncs des arbres: GOULLIART, 1980. Friche: VEILLON, 1997. Grotte: DENIS, 1967d. Haie: BRAUD & *al.*, 2005. Herbes humides: DENIS, 1937b. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & *al.*, 2004. Maison: BRAUD & *al.*, 2005. Maison, sur une porte: VEILLON, 1997. Marais saumâtre: DENIS, 1954b. Marécage: BELIN, 2001; DENIS, 1952a; EMERIT & *al.*, 2003; HENRY, 1981; LANCELEVÉE, 1884; VILLEPOUX, 1990b. Oyats: DENIS, 1964b. Pelouse: SCHALLER, 2000. Pelouse sèche: BRAUD & *al.*, 2005. Plage: PONEL, 1984. Plage, *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Ripisilve: LEDOUX, 2000; LEDOUX & *al.*, 2002. *Salicornietum*: BIGOT, 1957, 1965. *Therobrachypodium*: BIGOT, 1965. Tourbière: VEILLON, 1997. **Période.** — *Mâle*. Mars: DENIS, 1964b. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1937b, 1943c, 1965c. Juin: DENIS, 1962b, 1964b; LEDOUX, 2000; VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1962b, 1964b; LUCAS, 1870d. Septembre: CANARD, 1989; CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1951b, 1962b, 1964b; EMERIT & *al.*, 1997. Octobre: DENIS, 1963c. Novembre: DENIS, 1965c, 1967d. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1943c. Avril: DENIS, 1962b. Mai: DENIS, 1937b, 1965c; VEILLON, 1997. Juin: DENIS, 1964b; EMERIT & *al.*, 1997; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Juillet, août: DENIS, 1964b. Septembre: CLARK & *al.*, 1970; DENIS, 1951b, 1962b; EMERIT & *al.*, 1997. Octobre: DENIS, 1937b, 1962b; LEDOUX & *al.*, 2002. — *Femelle avec cocon*. Juin: DENIS, 1964b. Juillet: DENIS, 1938a.

*Neaetha membroza* (Simon, 1868)

*Neera m.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche: SIMON, 1876a (*N. m.*). Aveyron: SIMON, 1876a (*N. m.*), 1937. Corse: SIMON, 1876a (*N. m.*), 1937; TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Hérault: SIMON, 1876a (*N. m.*), 1937. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a. "Seine": SIMON, 1880a (*N. m.*), 1937. Var: SIMON, 1876a (*N. m.*), 1937. Vaucluse: SIMON, 1876a (*N. m.*). — Midi de la France: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Méditerranée. **Habitat.** Dune: TIBERGHEN & *al.*, 1993a. Sablière: SIMON, 1880a. **Période.** — *Mâle*. Mars: SIMON, 1937.

*Neon convolutus* Denis, 1937

*N. pusio*.

**Répartition.** Ardèche, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1937 (*N. p.*). — Açores, Algérie.

*Neon levis* (Simon, 1871)

*N. laevis*.

**Répartition.** Ariège: DENIS, 1967d (*N. l.*). Cher: DENIS, 1943b (*N. l.*). Corse: SIMON, 1876a, 1937 (*N. l.*). Doubs: EMERIT & *al.*, 1997 (*N. l.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & *al.*, 1996c (*N. l.*). Vaucluse: LEDOUX, 1972 (*N. l.*). Vendée: DENIS, 1962d (*N. l.*). Vienne (Haute-): SIMON, 1937 (*N. l.*). [La citation des Hautes-Alpes par SIMON, 1876a est erronée selon SIMON, 1937 qui note: «Les *N. laevis* cités des Alpes sont réellement des *N. reticulatus*». La citation des Hautes-Pyrénées par BOSMANS & *al.*, 1986 est erronée selon BOSMANS & *al.*, 2002, et se rapporte à *N. robustus*]. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Bois: DENIS, 1943b. Bois de chênes: EMERIT & *al.*, 1997. Éboulis: LEDOUX & *al.*, 1996c. Prairie: SIMON, 1876a. Prairies alpestres: SIMON, 1937. Sous une pierre: DENIS, 1962d. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1962d. Mai: DENIS, 1967d. Juin: EMERIT & *al.*, 1997. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1943b; LEDOUX, 1972. Juillet: LEDOUX & *al.*, 1996c.

*Neon muticus* (Simon, 1871)

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1876a, 1937. — Connue seulement de Corse.

*Neon pictus* Kulczynski, 1891

**Répartition.** Lozère: DENIS, 1939b. — Grande-Bretagne. De l'Europe du Sud-est à l'Asie Centrale. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1939b.

*Neon rayi* (Simon, 1875)

*Attus r.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1875d (*A. r.*), 1876a, 1937. Côte-d'Or: SIMON, 1876a, 1937. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & *al.*, 1985a. Seine-et-Marne: SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Italie. De l'Europe du Sud et de l'Est au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & *al.*, 1985a). **Habitat.** Friches arides et très sèches, sous les pierres: SIMON, 1876a.

*Neon reticulatus* (Blackwall, 1853)

*N. levis* [err.].

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a [*N. levis*, err. selon SIMON, 1937]. Ariège: DENIS, 1960a, 1967d; LUCANTE, 1880b. Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b. Calvados: ASSELIN & *al.*, 1989; GUIBÉ, 1946. Corrèze: LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor: COUTANT, 1990. Dordogne: LUCANTE, 1880b. Doubs: EMERIT & *al.*, 1997. Eure: EMERIT & *al.*, 2003; LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1899, 1909b. Finistère: COUTANT, 1990; DENIS, 1938a. Garonne (Haute-), Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Ile-et-Vilaine: CANARD, 1990c; COUTANT, 1990. Landes: LUCANTE, 1880b. Loir-et-Cher: LEDOUX & *al.*, 1999b. Lot, Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire: BRAUD & *al.*, 2005. Morbihan: COUTANT, 1990; DENIS, 1938a. Nord: EMERIT & *al.*,

1999. Orne: COUTANT, 1990. Pas-de-Calais: EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques: LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": CHRISTOPHE, 1974; CHRISTOPHE & al., 1977. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976; SIMON, 1898b. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: MÜLLER, 1985. Vendée: DENIS, 1962b, 1963c, 1964b, 1965c. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1480 m (LESSERT, 1910). **Habitat.** Bois: SIMON, 1876a. Bois calcicole de hêtres: EMERIT & al., 1999. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, mousses: SIMON, 1937. Bord de rivière, sous *Calluna*: BOSMANS & al., 1985a. Bétulaie, au sol: EMERIT & al., 2003. Carrière: DENIS, 1967d. Dune: DENIS, 1964b. Forêt: DENIS, 1938a; LANCELEVÉE, 1884. Forêt de châtaigniers: CHRISTOPHE, 1974. Forêt de châtaigniers, litière: CHRISTOPHE & al., 1977. Forêt de chênes et hêtres, litière: LE PERU, 2004. Forêt de pins: DENIS, 1964b, 1965c. Forêt de pins, mousses sèches: MÜLLER, 1985. Forêt, litière: DENIS, 1963c. Forêt, mousses, clairière: DOIGNON, 1976. Jardin, mousses: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1990c. Lande aride: LANCELEVÉE, 1884. Marécage: DENIS, 1938a; LANCELEVÉE, 1884. Mousses: SIMON, 1909b. Prairie très humide, mousses: LE PERU, 2004. Tourbière: EMERIT & al., 1999. **Période.** — *Mâle.* Mai: EMERIT & al., 2003; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1964b, 1967d; EMERIT & al., 1997, 1999; LESSERT, 1904, 1910. — *Femelle.* Avril: LE PERU, 2004. Mai: DENIS, 1965c; LE PERU, 2004; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1938a, 1964b, 1967d; EMERIT & al., 1999; LESSERT, 1904, 1910. Juillet, août: DENIS, 1964b. Septembre: MÜLLER, 1985. Octobre: EMERIT & al., 1999. Décembre: DENIS, 1964b.

#### *Neon robustus* Lohmander, 1945

*N. laevis* [err.].

**Répartition.** Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 [*N. laevis*, err. selon BOSMANS & al., 2002], 2002. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. — Espagne, Grande-Bretagne, Finlande, Suède. **Altitude.** 1100 m (BOSMANS & al., 1986, 2002; LEDOUX & al., 1996a). **Habitat.** Bois mixte: BOSMANS & al., 2002. Forêt de chênes-verts: LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères, litière: LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres: LEDOUX & al., 1995. **Période.** — *Mâle.* Juillet: LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle.* Juin, juillet: LEDOUX & al., 1996a. Août: LEDOUX & al., 2003. Septembre: BOSMANS & al., 2002.

#### *Neon valentulus* Falconer, 1912

**Répartition.** Ain: VILLEPOUX, 1990b. Loire-Atlantique: MURPHY, 1994. Loiret: LEDOUX & al., 2002. Vaucluse: LEDOUX, 1972, 1973b, 2000. — Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Bord de fleuve, forêt: LEDOUX, 1973b. Bord de rivière, forêt: LEDOUX, 1972. Forêt, clairière: LEDOUX, 2000. Marécage: MURPHY, 1994; VILLEPOUX, 1990b. Prairie: LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Femelle.* Mai: LEDOUX, 1972, 2000. Juin: LEDOUX & al., 2002.

#### *Pellenes arcigerus* (Walckenaer, 1837)

*P. arciger.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1983; SOYER, 1959. Corse: KRAUS, 1955; METZNER, 1997, 1999; SIMON, 1876a, 1937. Gers: LUCANTE, 1880b. Hérault: SIMON, 1876a. Morbihan: COUTANT, 1990. Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse: SIMON, 1876a. — Midi de la France: SIMON, 1937. Espagne, Italie. Europe du Sud (*P. a.*). **Habitat.** Coquilles vides d'*Helix*: SIMON, 1876a. Marécage salé: BIGOT, 1965. Penthes arides et pierreuses: SIMON, 1876a. Prairie salée, coquilles vides d'*Helix*: METZNER, 1997. *Salicornietum*; *Therobrachypodium*: BIGOT, 1957, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase: BIGOT & al., 1983. Zone halophile: METZNER, 1999. Zones pierreuses: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Septembre: KRAUS, 1955; METZNER, 1997, 1999. — *Femelle.* Septembre: METZNER, 1997, 1999.

#### *Pellenes brevis* (Simon, 1868)

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1937. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a, 1937. Bouches-du-Rhône: METZNER, 1997, 1999; SIMON, 1937; SOYER, 1959. Calvados: GUIBÉ, 1946. Cantal: SIMON, 1876a, 1937. Charente-Maritime: SIMON, 1876b, 1937. Eure, Morbihan: SIMON, 1937. Puy-de-Dôme, "Seine": SIMON, 1876a, 1937. Seine-et-Marne: SIMON, 1937. Vaucluse: SIMON, 1876a, 1937. — Allemagne, Espagne, Italie. Grèce. **Habitat.** Pelouse: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Mai: METZNER, 1997, 1999. — *Femelle.* Juin: SOYER, 1959.

#### *Pellenes canosus* Simon, 1937

[Connue par un seul spécimen femelle]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales: SIMON, 1937. — Connue seulement de France.

#### *Pellenes geniculatus* (Simon, 1868)

*P. subsultans.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1876a. Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a (*P. s.*), 1937. Ardèche: RAPHAËL & al., 1992. Aveyron: SIMON, 1876a (*P. s.*), 1937. Bouches-du-Rhône: SOYER, 1959. Corse: SIMON, 1876a, 1937. Garonne (Haute-): DENIS, 1954a. Gers: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & al., 1990; METZNER, 1999. Pyrénées-Orientales: BOSMANS & al., 1985a; GROS, 2004. Vaucluse: CORNIC, 1978; SIMON, 1876a (*P. s.*), 1937. — Midi de la France: SIMON, 1937. Espagne, Italie. Sud-Paléarctique, Tanzanie. **Altitude.** Jusqu'à 1250 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bord de ruisseau: BOSMANS & al., 1985a. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Rochers: SIMON, 1876a. Taillis de chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Zones pierreuses: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle.* Mai: METZNER, 1999. — *Femelle.* Juillet: CORNIC, 1978; DENIS, 1954a; GROS, 2004.

#### *Pellenes lapponicus* (Sundevall, 1833)

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. — Alpes du Dauphiné: SIMON, 1937. Suisse. Paléarctique. **Altitude.** [SIMON, 1876a indique: «Dans les Alpes, cette espèce ne se trouve pas au-dessous des prairies les plus élevées»].

*Pellenes nigrociliatus* (Simon, 1875)

*Attus bedeli*; *P. bedeli*; *P. bilunulatus*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1875d (A. b.), 1876a (*P. bedeli*), 1937. Morbihan: COUTANT, 1990; MURPHY, 1994. Savoie (Haute-): LESSERT, 1910. Tarn: LUCANTE, 1880b (*P. bilunulatus*); SIMON, 1877b (*P. bilunulatus*), 1937. Var: DENIS, 1937a (*P. bedeli*). Vaucluse: CORNIC, 1978. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1962b, 1963c, 1964b. — Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 830 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Arrière-dune: CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b. Dune: DENIS, 1963c. Dune, oyats très secs: DENIS, 1964b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Pentcs arides, sous les pierres: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Juin: DENIS, 1964b; LESSERT, 1910. — *Femelle*. Juin: CORNIC, 1978. Août: SIMON, 1877b.

*Pellenes tripunctatus* (Walckenaer, 1802)

*Attus crucigerus*.

**Répartition.** Ain, Aube: SIMON, 1876a. Calvados: LUCAS, 1870e (A. c.), 1877b. Cantal: SIMON, 1876a. Corrèze: LE PERU, 2004. Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: LANCELEVÉE, 1884. Ille-et-Vilaine: CANARD, 1990c; COUTANT, 1990. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Manche: KERVILLE, 1900. Morbihan: COUTANT, 1990; MURPHY, 1994; SIMON, 1876a. Oise: SIMON, 1876a. Pyrénées (Hautes-): LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Bas-): LESSERT, 1910. Rhin (Haut-): MULLER & al., 1895. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. "Seine": SIMON, 1876a. Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884. — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2500 m (SIMON, 1876a). **Habitat.** Ancienne carrière de calcaire, près d'une mare temporaire: VEILLON, 1997. Dune: KERVILLE, 1900. Dune, sous des pierres: LUCAS, 1877b. Forêt: LANCELEVÉE, 1884. Jardin: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1990c. Lieux chauds: SIMON, 1876a. Marécage: LANCELEVÉE, 1884. Prairies alpêtres: SIMON, 1876a. Sur un mur: LUCAS, 1870e. **Période.** — *Femelle*. Mai: LESSERT, 1904, 1910. Juin: EMERIT & al., 1997; LE PERU, 2004; LESSERT, 1910; VEILLON, 1997. Juillet: LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Août: LUCAS, 1870e. Septembre: LUCAS, 1877b. — *Femelle avec cocon*. Juin: LESSERT, 1904; SIMON, 1876a. Juillet: DENIS, 1959d.

*Philaeus chrysops* (Poda, 1761)

*Dendryphantès dorsatus*; *P. bilineatus*; *Salticus sloani*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes: BECKER, 1881, 1882; DENIS, 1938b (*S. s.*). Alpes-de-Haute-Provence: SIMON, 1876a, 1876a (*P. b.*). Ardèche: LUCAS, 1870b (*D. d.*); RAPHAËL & al., 1992. Aube: SIMON, 1876a, 1876a (*P. b.*). Aude: DELFOSSE, 2000a, 2000b. Bouches-du-Rhône: BIGOT & al., 1973; KABOUCHÉ & al., 1997; SOYER, 1959. Charente-Maritime: JOURDE & al., 1999. Corse: SIMON, 1876a, 1937. Doubs: EMERIT & al., 1997. Garonne (Haute-): BONNET, 1932; LUCANTE, 1880b. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Hérault: EMERIT & al., 1990. Isère: SIMON, 1876a. Loir-et-Cher: LEDOUX & al., 1999b. Maine-et-Loire: VEILLON, 1997. Pyrénées-Orientales: BOSMANS

& al., 1985a; DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 2003. Savoie (Haute-): LESSERT, 1904, 1910. Seine, Seine-et-Marne: SIMON, 1876a. Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Var: BECKER, 1880, 1882; DENIS, 1937a; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vaucluse: CORNIC, 1978; FAVET, 1984; LEDOUX, 2000. Vendée: COUTANT, 1990. — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1500 m (CORNIC, 1978). **Habitat.** Agaves, cactus et lentisques: SIMON, 1876a. Carrière de calcaire: VEILLON, 1997. Formation à chênes-verts: LEDOUX & al., 1995. Forêt: BONNET, 1932. Friche: LEDOUX & al., 2003. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Garrigue à chênes-verts: RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quercus coccifera*: BIGOT & al., 1973. Garrigue, sous des pierres: SOYER, 1959. Lieux caillouteux: CORNIC, 1978. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Parois de rochers: SIMON, 1876a. Pelouses xérophiiles: JOURDE & al., 1999. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus*: KABOUCHÉ & al., 1997. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Rocher: EMERIT & al., 1997. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996a. Tas de pierres: SIMON, 1876a. Terrain sec avec buissons et pins: DELFOSSE, 2000b. Vieux murs: SIMON, 1876a. Zones pierreuses: SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle*. Avril: DENIS, 1943c; SOYER, 1959. Mai: BONNET, 1932; DENIS, 1943c; LEDOUX, 2000; LESSERT, 1904, 1910. Juin: DENIS, 1943c; VEILLON, 1997. — *Femelle*. Janvier: LESSERT, 1910. Mai: LEDOUX, 2000. Juin: DELFOSSE, 2000b. Novembre: LEDOUX & al., 2003. Décembre: LESSERT, 1910. — *Femelle avec ses jeunes*. Juin: DELFOSSE, 2000a.

*Phintella castriesiana* (Grube, 1861)

*Telamonia c.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Var: SIMON, 1937 (*T. c.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000 (*T. c.*). — Espagne. Paléarctique. **Habitat.** Ripisilve: LEDOUX, 2000. **Période.** — *Femelle*. Mai: LEDOUX, 2000.

*Phlegra bresnieri* (Lucas, 1846)

*P. lippiens*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes: BECKER, 1881, 1882. Ariège: DENIS, 1967d. Aube: SIMON, 1876a, 1937. Bouches-du-Rhône: BIGOT, 1957, 1965; BIGOT & al., 1983; DENIS, 1954b; SOYER, 1959. Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: CANARD, 1989; KRAUS, 1955; METZNER, 1999; SIMON, 1876a, 1876a (*P. l.*), 1937; TIBERGHEN & al., 1993a. Gers, Gironde: LUCANTE, 1880b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a. Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b. Morbihan: COUTANT, 1990; MURPHY, 1994. Pyrénées-Orientales: DENIS, 1943c; LEDOUX & al., 1999a. Var: BECKER, 1880, 1882; DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b. — Midi de la France et ouest jusqu'en Bretagne: SIMON, 1937. Espagne, Italie. De l'Europe du Sud à l'Azerbaïdjan, Tanzanie. **Habitat.** Arrière-dune: LEDOUX & al., 1999a. Bois: DENIS, 1941. Dune: DENIS, 1941, 1962b. Dune, sous des pierres: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins maritimes, détritus: CLARK & al., 1970. *Helichrysum*: DENIS, 1963c. Littoral, *Crithmo-stacion*: SOYER, 1959. Marécage:

BELIN, 2001. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Pelouse à *Brachypodium ramosum* : SOYER, 1959. Plage : DENIS, 1962b. Prairie : TIBERGHEN & al., 1993a. *Salicornietum* : BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre : DENIS, 1963c ; LUCAS, 1882a. Terrains salés : SOYER, 1959. *Therobrachypodium* : BIGOT, 1965. Zone caillouteuse sèche à végétation rase : BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle*. Août : LUCAS, 1882a. Septembre : DENIS, 1937b ; METZNER, 1999. — *Femelle*. Juin : DENIS, 1941. Juillet : DENIS, 1963c. Août : CANARD, 1989 ; LUCAS, 1882a. Septembre : CLARK & al., 1970. — *Femelle avec cocon*. Juin : DENIS, 1964b.

*Phlegra cinereofasciata* (Simon, 1868)

*P. fuscipes*.

**Taxonomie.** La synonymie *P. fuscipes* Kulczynski, 1891 = *P. cinereofasciata* est établie par AZARKINA, 2004. **Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a. Aube : SIMON, 1876a, 1937. Aveyron : SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône : SIMON, 1876a ; SOYER, 1959. Corse : METZNER, 1999 (*P. f.*) ; SIMON, 1937. Hérault : EMERIT & al., 1990. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 2003 ; METZNER, 1999 ; SIMON, 1876a, 1937. Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1876a. Var : SIMON, 1937. — Italie. De la France à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 1470 m (METZNER, 1999). **Habitat.** Friche : LEDOUX & al., 2003. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Pelouse à *Brachypodium* : SOYER, 1959. **Période.** — *Mâle*. Novembre : METZNER, 1999. — *Femelle*. Novembre : LEDOUX & al., 2003 ; METZNER, 1999.

*Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)

*Attus fasciatus*.

**Répartition.** Ain : SIMON, 1876a ; VILLEPOUX, 1990b. Alpes (Hautes-), Alpes-de-Haute-Provence, Aube : SIMON, 1876a. Aveyron : GROS, 1983a. Calvados : GUIBÉ, 1946 ; SIMON, 1876a. Corrèze : LE PERU, 2004. Côtes-d'Armor : LUCAS, 1871a (*A. f.*). Doubs : EMERIT & al., 1997. Finistère : COUTANT, 1990 ; DENIS, 1938a. Garonne (Haute-) : DENIS, 1954a. Gironde : LUCANTE, 1880b. Ile-et-Vilaine : CANARD, 1979, 1990c ; COUTANT, 1990. Isère : SIMON, 1876a. Morbihan : COUTANT, 1990 ; MURPHY, 1994 ; SIMON, 1876a. Orne : SIMON, 1876a. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 ; DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1961b ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1996a ; TAMBS-LYCHE, 1957. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996c ; LESSERT, 1910. "Seine" : SIMON, 1876a, 1937. Seine-Maritime : SIMON, 1876a. Somme : ROSELLE, 1888b. Vaucluse : CORNIC, 1978 ; LEDOUX, 2000. — Presque toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2620 m (DENIS, 1954a). **Habitat.** Bois de chênes-lièges : TAMBS-LYCHE, 1957. Bord de ruisseau, sous des pierres : BOSMANS & al., 1985a. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Forêt : DENIS, 1961b. Jardin, sur sol sablonneux : LE PERU, 2004. Lande : CANARD, 1990c. Lande sèche : CANARD, 1979. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex* : LUCAS, 1871a. Marécage : VILLEPOUX, 1990b. Plage : TAMBS-LYCHE, 1957. Prairie : LEDOUX & al., 1996c. Prairie tourbeuse : LEDOUX & al., 1996a.

Ripisilve, tas de graviers : LEDOUX, 2000. Sous une pierre : DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Février : EMERIT & al., 1999 ; LEDOUX & al., 1996a. Mai : LEDOUX & al., 1996a. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1938a ; LEDOUX & al., 1996a. Juillet : DENIS, 1954a, 1961b. Août : CORNIC, 1978. — *Femelle*. Avril : LEDOUX, 2000. Mai : LE PERU, 2004 ; LEDOUX & al., 1996a ; LESSERT, 1910. Juin : CORNIC, 1978 ; DENIS, 1938a ; EMERIT & al., 1997 ; LE PERU, 2004. Juillet : DENIS, 1961b. Août : GROS, 1983a ; LEDOUX, 1993 ; LEDOUX & al., 1996a. — *Femelle avec cocon*. Juillet : DENIS, 1950b.

*Phlegra loripes* Simon, 1876

**Répartition.** Somme : SIMON, 1876a, 1937. — Portugal.

*Phlegra rogenhoferi* (Simon, 1868)

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Landes : SIMON, 1937. — Italie. Autriche.

*Plexippus paykulli* (Sav. & Aud., 1825)

*Hasa ius p.*

**Répartition.** "Seine" : SIMON, 1876a (*H. p.*), 1878f (*H. p.*). [SIMON, 1876a indique : « Cette grande espèce, qui est très répandue en Afrique et dans l'Inde, se trouve accidentellement en France. Je possède un exemplaire, pris à Saint-Germain-en-Laye, et j'en ai vu un autre, trouvé par le comte Keyserling aux environs de Paris »]. — Espagne, Italie. Cosmopolite.

*Pseudeuophrys* (voir *Euophrys*)

*Pseudicius badius* (Simon, 1868)

*Dendryphantes b.*

**Répartition.** Corse : SIMON, 1876a (*D. b.*), 1937. — Espagne, Italie. Europe du Sud.

*Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802)

*Dendryphantes e.*

**Répartition.** Ariège : LUCANTE, 1880b (*D. e.*). Corse : CANARD, 1989 ; SIMON, 1876a (*D. e.*). Dordogne : LUCANTE, 1880b (*D. e.*). Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : EMERIT & al., 2003. Garonne (Haute-), Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b (*D. e.*). Hérault : EMERIT & al., 1985. Landes : LUCANTE, 1880b (*D. e.*). Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975 ; LEDOUX & al., 1999b. Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (*D. e.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a. Rhin (Haut-) : METZNER, 1999 ; SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910. "Seine" : SIMON, 1878f (*D. e.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*D. e.*). Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*D. e.*). — Presque toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. De l'Europe au Kazakhstan. **Altitude.** Jusqu'à 750 m (BOSMANS & al., 1985a). **Habitat.** Bois, sous les écorces et dans les mousses : SIMON, 1876a. Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & al., 1985. Forêt, troncs : DOIGNON, 1976. Marécage : EMERIT & al., 2003. Roselière : SCHALLER, 2000. **Période.** — *Mâle*. Mai : METZNER, 1999. Juillet : CANARD, 1989. Septembre : EMERIT & al., 1997. — *Femelle*. Février : LESSERT, 1910. Mai : METZNER, 1999.

*Saitis barbipes* (Simon, 1868)

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1876a. Alpes-Maritimes : BECKER, 1881, 1882; SIMON, 1876a. Alpes-de-Haute-Provence : METZNER, 1999; SIMON, 1876a. Ardèche : RAPHAËL & al., 1992. Ariège : DENIS, 1967d. Aude, Aveyron : SIMON, 1876a. Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1973, 1983; KABOUCHE & al., 1997; SOYER, 1959. Charente, Charente-Maritime : SIMON, 1937. Corse : CANARD, 1989; KRAUS, 1955; METZNER, 1999; SIMON, 1876a, 1937; TIBERGHEN & al., 1993a. Dordogne : SIMON, 1937. Gard : CHANSIGAUD & al., 1994; EMERIT & al., 1994; LEDOUX, 2000. Garonne (Haute-) : LUCANTE, 1880b. Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Hérault : EMERIT & al., 1985. Landes : LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Loir-et-Cher : HILLYARD, 1975. Loire-Atlantique : COUTANT, 1990; LUCAS, 1882a; SIMON, 1937. Lot-et-Garonne : DALINGWATER, 1991; LUCANTE, 1880b. Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; SIMON, 1937; VEILLON, 1997. Morbihan : COUTANT, 1990. Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales : BERLAND, 1922; BOSMANS & al., 1985a, 1987; DENIS, 1943c, 1967d; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1995, 1996a, 1999a, 2003; METZNER, 1999; SIMON, 1876a. Rhône : SIMON, 1937. Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a. Var : BECKER, 1880, 1882; BERLAND, 1922; BIGOT, 1983; BIGOT & al., 1987a, 1988; DENIS, 1937a, 1937b; GROS, 1983a, 2004; KOVOOR & al., 2000; PONEL, 1983; SIMON, 1876a, 1898c. Vaucluse : CORNIC, 1978; LEDOUX, 2000; SIMON, 1876a. Vendée : CLARK & al., 1970; COUTANT, 1990; DENIS, 1941, 1962d, 1963c, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964; MURPHY, 1994. — Midi de la France jusque dans le Rhône, la Dordogne et les Charentes; à l'ouest jusque dans l'Anjou et à l'embouchure de la Loire : SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Italie, Suisse. Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 2000 m (BOSMANS & al., 1985a, 1987). **Habitat.** Arrière-dune : CLARK & al., 1970; DENIS, 1965c. Bois : BRAUD & al., 2005; DENIS, 1941. Bois, litière : CANARD, 1989; SOYER, 1959. Bord d'étang : VEILLON, 1997. Bord de rivière, *Populetum albae* : LEDOUX & al., 1999a. Bord de rivière, sous *Calluna* : BOSMANS & al., 1985a. Bord de route, troncs de platanes : EMERIT & al., 1985. Bord de ruisseau; carrière de pierres à chaux : BOSMANS & al., 1985a. Clôture : BRAUD & al., 2005. Coteau boisé, mousses : VEILLON, 1997. Cultures : KOVOOR & al., 2000. Dune : DENIS, 1964b, 1965c; DUFFEY, 1964; MURPHY, 1994; PONEL, 1983. Formation à bruyères et genévriers; formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt d'aulnes et de bouleaux, mousses et litière : BOSMANS & al., 1985a. Forêt de chênes : BOSMANS & al., 1985a, 1987. Forêt de chênes et châtaigniers : LEDOUX & al., 2003. Forêt de chênes-lièges : BIGOT & al., 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes : BIGOT & al., 1987a. Forêt de chênes-verts : CHANSIGAUD & al., 1994. Forêt de chênes-verts, litière : LEDOUX & al., 2003. Forêt de conifères; forêt de feuillus : LEDOUX & al., 1996a. Forêt de hêtres : LEDOUX & al., 1995, 1996a. Forêt de pins : DENIS, 1963c, 1964b. Forêt de pins maritimes : CLARK & al., 1970. Forêt de pins, chênes-verts; forêt de pins, litière; forêt de pins, sous des pierres : DENIS, 1962d. Forêt, entrée de grotte : BOSMANS & al., 1985a. Friche : KOVOOR & al., 2000. Garrigue à chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Garrigue à *Quer-*

*cus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Haie; haie, litière : BRAUD & al., 2005. *Helichrysum* : DENIS, 1963c. Jardin en milieu urbain; jardin, sous des pierres; lande : VEILLON, 1997. Lande à genêts : LEDOUX & al., 1996a. Lieu humide : LEDOUX & al., 2003. Lisière de bois sec de chênes, peupliers noirs, trembles et pins : EMERIT & al., 1994. Maison : BRAUD & al., 2005; CLARK & al., 1970; VEILLON, 1997. Maquis : KOVOOR & al., 2000. Montagne pierreuse, pâturage maigre : BECKER, 1882. Oyats : DENIS, 1964b. Pelouse calcaire : BOSMANS & al., 1985a. Pelouse à *Brachypodium* : LEDOUX & al., 1996a. Pelouse à plantain caréné : LEDOUX & al., 1995. Plage, sur le sable : DENIS, 1964b. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus* : KABOUCHE & al., 1997. *Populetum albae*, pelouse : LEDOUX, 2000. Prairie : TIBERGHEN & al., 1993a. Prairie alpestre : BOSMANS & al., 1985a. Prairie rudérale : BOSMANS & al., 1987. Ripisilve; ripisilve, litière : LEDOUX, 2000. Sous des grands rochers : BOSMANS & al., 1985a. Sous une pierre : DENIS, 1963c; LUCAS, 1882a. Sous-bois clairs : KOVOOR & al., 2000. Taillis de chênes-verts : RAPHAËL & al., 1992. Terrain vague : BOSMANS & al., 1985a. Zone caillouteuse sèche à végétation rase : BIGOT & al., 1983. **Période.** — *Mâle.* Février : LEDOUX & al., 1996a. Mars : DENIS, 1943c; VEILLON, 1997. Mai : DENIS, 1937b, 1943c, 1965c; LEDOUX, 2000. Juin : BERLAND, 1922; CHANSIGAUD & al., 1994; CLARK & al., 1970; CORNIC, 1978; DENIS, 1941, 1943c, 1962d, 1964b; LEDOUX & al., 1996a, 1999a; VEILLON, 1997. Juillet : LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Août : DENIS, 1964b; LUCAS, 1882a; VEILLON, 1997. Septembre : CANARD, 1989; CLARK & al., 1970; DENIS, 1967d; KRAUS, 1955; LEDOUX & al., 1996a; METZNER, 1999; VEILLON, 1997. — *Femelle.* Janvier : DENIS, 1963c; LEDOUX, 2000. Février : DENIS, 1965c; LEDOUX & al., 1996a. Mars : CLARK & al., 1970; DENIS, 1964b. Avril : LEDOUX & al., 1996a, 2003. Mai : DENIS, 1937b, 1943c, 1965c. Juin : BERLAND, 1922; CORNIC, 1978; DENIS, 1941, 1964b; LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. Juillet : DENIS, 1963c, 1964b; GROS, 2004; LEDOUX & al., 1996a. Août : DENIS, 1964b; GROS, 1983a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 2003; LUCAS, 1882a. Septembre : CANARD, 1989; CLARK & al., 1970; DENIS, 1962d; LEDOUX & al., 1996a; METZNER, 1999. Octobre : DENIS, 1963c. Novembre : LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1996a. Décembre : DENIS, 1967d; VEILLON, 1997.

*Salticus cingulatus* (Panzer, 1797)

*Calliethera cingulata*; *Epiblemum cingulatum*.

**Répartition.** Ardennes : LENICE, 1992. Ariège : LUCANTE, 1880b (*C. c.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a. Dordogne, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*C. c.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b; LUCANTE, 1880b (*C. c.*). Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b (*C. c.*). Rhin (Haut-) : MULLER & al., 1895 (*E. c.*); SCHALLER, 2000. Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976 (*C. c.*). Tarn, Tarn-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*C. c.*). — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1850 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Arbres sempervirens : SIMON, 1876a. Coteau calcaire à genévriers : EMERIT & al., 1999. Forêt, clairière : DOI-

GNON, 1976. Jardin : LENICE, 1992. Sous les écorces de pins abattus : DENIS, 1950b. Vieilles murailles : SIMON, 1876a. **Période.** — *Femelle.* Juin : DENIS, 1938a; EMERIT & al., 1999. Juillet : DENIS, 1950b.

*Salticus confusus* Lucas, 1846

*Calliethera confusa.*

**Répartition.** Corse : SIMON, 1876a (C. c.), 1937. — Espagne. Algérie, Bulgarie.

*Salticus conjunctus* (Simon, 1868)

*Calliethera notia.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1937. Bouches-du-Rhône : KABOUCHE & al., 1997; SOYER, 1959. Corse : KRAUS, 1955; METZNER, 1999. Pyrénées-Orientales : LEDOUX & al., 1999a; SIMON, 1876a (C. n.), 1937. Vendée : DENIS, 1962b. — Italie. **Altitude.** Jusqu'à 600 m (SOYER, 1959). **Habitat.** Bord de mer, rochers : SIMON, 1876a. Littoral, *Crithmum maritimum*, sur les rochers ou sous les pierres : SOYER, 1959. Plage, sous des galets : DENIS, 1962b. Plateau calcaire avec une végétation xérophile à *Quercus coccifera* et *Cistus albidus* : KABOUCHE & al., 1997. Prairie avec buissons : LEDOUX & al., 1999a. **Période.** — *Mâle.* Mai : METZNER, 1999. Octobre : KABOUCHE & al., 1997. — *Femelle.* Juin : LEDOUX & al., 1999a.

*Salticus major* (Simon, 1868)

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Landes, Pyrénées-Atlantiques : SIMON, 1937. — Espagne. Portugal. **Habitat.** Marécages littoraux : SIMON, 1937.

*Salticus modicus* (Simon, 1875)

*Calliethera modica.*

**Répartition.** Calvados : GUIBÉ, 1946. Charente : SIMON, 1937. Loiret : LEDOUX & al., 2002. "Seine" : SIMON, 1937. Var : DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1875d (C. m.), 1876a (C. m.), 1937. — Connue seulement de France. **Habitat.** Prairie; ripisilve : LEDOUX & al., 2002. **Période.** — *Mâle.* Mai : DENIS, 1937b. — *Femelle.* Juin : LEDOUX & al., 2002.

*Salticus mutabilis* Lucas, 1846

*Calliethera m.*

**Répartition.** Aube : SIMON, 1876a (C. m.). Bouches-du-Rhône : DENIS, 1954b; SOYER, 1959. Charente-Maritime : SIMON, 1876b (C. m.). Corse : SIMON, 1876a (C. m.), 1937. Hérault : EMERIT & al., 1990. Lot : LUCANTE, 1880b (C. m.). Maine-et-Loire : SIMON, 1937. Var : DENIS, 1937b; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1898c (C. m.). Vendée : COUTANT, 1990; DENIS, 1964b, 1965c. — Midi de la France : SIMON, 1937. Espagne, Italie, Europe, Açores, Géorgie, Argentine. **Habitat.** Dune : SOYER, 1959. Forêt, chênes-verts : DENIS, 1964b. Garrigue calcaire : EMERIT & al., 1990. Haies sèches : SIMON, 1876a. Sur un mur : DENIS, 1965c. **Période.** — *Mâle.* Mai : DENIS, 1937b, 1965c. Juin : DENIS, 1964b. — *Femelle.* Mai : DENIS, 1937b. Juin : DENIS, 1964b.

*Salticus propinquus* Lucas, 1846

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude : SIMON, 1937. Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1957, 1965;

BIGOT & al., 1973; DENIS, 1950c; METZNER, 1999; PETIT & al., 1945; SIMON, 1937; SOYER, 1959. Gard : EMERIT & al., 1994. Gironde : DENIS, 1951b; SIMON, 1937. Hérault : LEDOUX, 1967. Pyrénées-Orientales : DENIS, 1952c; LEDOUX & al., 1995, 1999a. Rhône : SIMON, 1937. Var : BIGOT, 1983; BIGOT & al., 1979, 1987a, 1988; KOVOOR & al., 2000; PONEL, 1983; PONEL & al., 1993; SIMON, 1937. Vendée : DENIS, 1963c. — Espagne, Italie, Méditerranée. **Altitude.** Jusqu'à 2120 m (DENIS, 1952c). **Habitat.** Bord d'étang : DENIS, 1952c; PETIT & al., 1945. Dune : LEDOUX, 1967; LEDOUX & al., 1999a; METZNER, 1999; PONEL, 1983. Dune à oyats : EMERIT & al., 1994. Estuaire, sous des joncs coupés; estuaire, terrain salé : DENIS, 1951b. Formation à chênes-verts : LEDOUX & al., 1995. Forêt de chênes-lièges : BIGOT & al., 1988. Forêt de chênes-lièges, arbustes : BIGOT & al., 1987a. Forêt, litière très sèche : DENIS, 1963c. Garrigue à *Quercus coccifera* : BIGOT & al., 1973. Marais salant : DENIS, 1950c. Marécage salé : BIGOT, 1965. Prairie : LEDOUX & al., 1999a. *Salicornietum* : BIGOT, 1957, 1965. Sous une pierre : DENIS, 1963c. Terres salées, pelouse : SOYER, 1959. *Therobrachypodion* : BIGOT, 1957, 1965. **Période.** — *Mâle.* Mars : LEDOUX, 1967. Mai : DENIS, 1950c; LEDOUX, 1967. Juin : LEDOUX & al., 1999a; METZNER, 1999. — *Femelle.* Mai : LEDOUX, 1967. Juin : LEDOUX & al., 1999a. — *Femelle avec cocon.* Juillet : DENIS, 1963c. Août : DENIS, 1952c.

*Salticus scenicus* (Clerck, 1757)

*Calliethera goberti*; *Calliethera scenica*; *Callietherus histrionicus*; *Callietherus s.*; *Epiblemum scenicum.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1876a (*Calliethera s.*). Alpes-Maritimes : BECKER, 1882 (*Calliethera s.*); DENIS, 1938b. Ardennes : LENICE, 1992. Ariège : DENIS, 1960a, 1961b; LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870e (*Callietherus s.*). Charente-Maritime : BELIN, 2001; JOURDE & al., 1999; SIMON, 1876b (C. g.). Corèze : LE PERU, 2004. Corse : SIMON, 1876a (*Calliethera s.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a; LUCAS, 1871a (*Callietherus s.*); SALMON, 1959. Dordogne : LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Doubs : EMERIT & al., 1997. Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*Calliethera s.*); SIMON, 1909b. Finistère : COUTANT, 1990; DENIS, 1938a, 1939a, 1940a; LUCAS, 1868 (*Calliethera s.*). Garonne (Haute-) : JUBERTHIE, 1954; KERVILLE, 1932; LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Gers, Gironde : LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Hérault : EMERIT & al., 1985. Ille-et-Vilaine : CANARD, 1990c; COUTANT, 1990. Landes : LUCANTE, 1880b (C. g.), 1880b (*Calliethera s.*); SIMON, 1875d (C. g.), 1876a (C. g.). Loir-et-Cher : LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique : COUTANT, 1990; DENIS, 1967e; LUCAS, 1882a (*Calliethera s.*). Lot, Lot-et-Garonne : LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005; VEILLON, 1997. Manche : BERLAND, 1924; KERVILLE, 1900; LUCAS, 1878b (*Callietherus s.*); PÉTILLON & al., 2004. Marne : LUCAS, 1878a (*Callietherus s.*). Mayenne : COUTANT, 1990. Morbihan : COUTANT, 1990; DENIS, 1938a. Nord : GOULLIART, 1980. Pas-de-Calais : EMERIT & al., 1999. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b, 1953a, 1955c, 1960a; LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Pyrénées-Orientales : BOSMANS

& al., 1985a; DENIS, 1943c, 1952c, 1961b; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a. Rhin (Haut-): BLICK, 2000; LEPRIEUR, 1880 (*Calliethera s.*); REIBER, 1880 (*Calliethera s.*); SCHALLER, 2000. Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b, 1996c; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898 (*E. s.*). "Seine": LUCAS, 1875 (*Calliethera s.*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1878f (*Calliethera s.*). Seine-Maritime: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*Calliethera s.*). Seine-et-Marne: DOIGNON, 1976. Somme: ROSELLE, 1888b (*Calliethera s.*). Tarn, Tarn-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*Calliethera s.*). Var: KOVOOR & al., 2000; SIMON, 1898c (*Calliethera s.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Vendée: CLARK & al., 1970; DENIS, 1941, 1962b, 1963c, 1964b. Yonne: LUCAS, 1872 (*C. h.*), 1872 (*Callietherus s.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Holarctique. **Altitude.** Jusqu'à 2790 m (DENIS, 1953a). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: DENIS, 1938a, 1941, 1967e; LUCAS, 1875. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bois, lisière: DENIS, 1959d. Bord d'étang: LEDOUX, 2000. Bord d'étang, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bord de mer: KERVILLE, 1900. Bord de mer, rochers: LUCAS, 1868. Bord de rivière: DENIS, 1938a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Bord de torrent, sous des pierres: DENIS, 1952c. Bâtiment: DENIS, 1955c. Bâtiment, sur une fenêtre: VEILLON, 1997. Clôture: BRAUD & al., 2005. Coteau calcaire à genévriers: EMERIT & al., 1999. Dune: DENIS, 1962b. Dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Éboullis: LEDOUX & al., 1996b. Estuaire, sur un mur: SALMON, 1959. Forêt: ROSELLE, 1888b. Forêt de pins: DENIS, 1962b. Forêt de pins, sous des pierres: DENIS, 1950b. Forêt, troncs: DOIGNON, 1976. Haie: BRAUD & al., 2005. Jardin: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Jardin, sur un mur: LE PERU, 2004. Lande: CANARD, 1990c. Lande à genêts: LEDOUX & al., 1996a. Lande à *Ulex*: LUCAS, 1871a. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Maison: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994. Maquis de cistes: LEDOUX & al., 1996a. Marécage: BELIN, 2001; LANCELEVÉE, 1884. Montagne pierreuse, pâturage maigre: BECKER, 1882. Murailles: SIMON, 1876a. Murs: DOIGNON, 1976; GOULLIART, 1980; LUCAS, 1872, 1878a, 1878b, 1882a; SIMON, 1909b. Murs des bâtiments: DENIS, 1950b. Palissades en planches: SIMON, 1876a. Prairie: LEDOUX & al., 1996b. Prairie tourbeuse: LEDOUX & al., 1996a. Sous une pierre: DENIS, 1940a, 1943c; LUCAS, 1872. Sur un mur: BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; BERLAND, 1924; LENICE, 1992; LUCAS, 1870e. Tourbière, sous les pierres: DENIS, 1950b. Troncs d'arbres: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1943c. Juin: DENIS, 1938a; LE PERU, 2004; LEDOUX, 2000. Juillet: DENIS, 1952c, 1955c; LEDOUX & al., 1996a. Août: DENIS, 1953a; LUCAS, 1868, 1878a, 1878b. Septembre: LUCAS, 1875. — *Femelle*. Mai: DENIS, 1943c, 1967e. Juin: DENIS, 1938a, 1941, 1964b; LE PERU, 2004; LEDOUX & al., 1996a; VEILLON, 1997. Juillet: DENIS, 1938a, 1939a, 1940a, 1950b, 1952c, 1955c, 1959d, 1960a, 1961b; LEDOUX & al., 1996a; PICKARD-CAMBRIDGE, 1898. Août: DENIS, 1952c, 1953a; LEDOUX, 1993; LEDOUX & al., 1996a, 1996b; LUCAS, 1868, 1870e, 1878a, 1878b, 1882a; PICKARD-CAMBRIDGE,

1898. Septembre: CLARK & al., 1970; LUCAS, 1875. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1938a, 1961b.

#### *Salticus scitulus* (Simon, 1868)

##### *Calliethera scitula*.

[Femelle inconnue]. **Répartition.** Corse: SIMON, 1876a (*C. s.*), 1937. — Connue seulement de Corse et de Sicile.

#### *Salticus truncatus* Simon, 1937

[Femelle inconnue. SIMON, 1937 indique: «Peut-être une forme anormale et individuelle de *S. zebraeus* ou *cingulatus*»]. **Répartition.** Ardèche: SIMON, 1937. — Connue seulement de France.

#### *Salticus unciger* (Simon, 1868)

##### *S. simoni*.

**Taxonomie.** La synonymie *S. simoni* Kulczynski, 1907 = *S. unciger* est établie par PROSZYNSKI, 1984. **Répartition.** Alpes-Maritimes: SIMON, 1937 (*S. s.*). — Italie. Europe du Sud.

#### *Salticus zebraeus* (C. L. Koch, 1837)

##### *Calliethera tenera*; *Calliethera zebraea*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence, Aube: SIMON, 1876a (*C. z.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1954b; SOYER, 1959. Calvados: LUCAS, 1877b (*C. z.*). Charente-Maritime: BELIN, 2001. Corse: SIMON, 1876a (*C. z.*). Doubs: EMERIT & al., 1997. Eure: SIMON, 1909b. Finistère: LUCAS, 1868 (*C. t.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*C. z.*); SIMON, 1876a (*C. z.*). Hérault: EMERIT & al., 1985. Landes: LUCANTE, 1880b (*C. z.*); SIMON, 1876a (*C. z.*). Loir-et-Cher: HILLYARD, 1975; LEDOUX & al., 1999b. Loire-Atlantique: LUCAS, 1882a (*C. z.*). Lot-et-Garonne: LUCANTE, 1880b (*C. z.*). Pyrénées (Hautes-): DENIS, 1950b. Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1999a. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991; LUCAS, 1876 (*C. z.*); ROLLARD, 2000; SIMON, 1876a (*C. z.*). Seine-Maritime: LANCELEVÉE, 1884 (*C. z.*). Seine-et-Marne: SIMON, 1876a (*C. z.*). Somme: ROSELLE, 1888b (*C. z.*). Var: BIGOT, 1993; KOVOOR & al., 2000; PONEL & al., 1993; SIMON, 1876a (*C. z.*). Vaucluse: LEDOUX, 2000. Yonne: SIMON, 1876a (*C. z.*). — Toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1850 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Ancienne vigne: EMERIT & al., 1997. Bois: LUCAS, 1876. Bois de chênes: EMERIT & al., 1997. Bord de mer, rochers: LUCAS, 1868. Bord de rivière, *Populetum albae*: LEDOUX & al., 1999a. Bord de route, troncs de platanes: EMERIT & al., 1985. Branches, lichens: HILLYARD, 1975. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Lande: LUCAS, 1882a. Littoral, taillis de chênes-verts: BIGOT, 1993. Marécage: BELIN, 2001; LANCELEVÉE, 1884; ROSELLE, 1888b. Murailles: SIMON, 1876a. Murs: LUCAS, 1882a; SIMON, 1909b. Prairie avec buissons: LEDOUX & al., 1999a. Ripisilve: LEDOUX, 2000. Sous les écorces de pins abattus: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Juin: LEDOUX, 2000; LEDOUX & al., 1999a. Août: LUCAS, 1882a. — *Femelle*. Juin: EMERIT & al., 1997. Août: LUCAS, 1868, 1882a. Septembre: LUCAS, 1877b. Octobre: LEDOUX & al., 1999a; LUCAS, 1876.



*Sitticus caricis* (Westring, 1861)*Attus atellanus*.

**Répartition.** Ain : SIMON, 1876a (*A. a.*); VILLEPOUX, 1990b. Aube : SIMON, 1876a (*A. a.*). Bouches-du-Rhône : BIGOT, 1957, 1965. Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Oise : SIMON, 1876a (*A. a.*). Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910. "Seine" : SIMON, 1876a (*A. a.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*A. a.*). Somme : ROSELLE, 1887 (*A. a.*). — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** 230 m (VILLEPOUX, 1990b). **Habitat.** Forêt : LANCELEVÉE, 1884. Marécage : LANCELEVÉE, 1884; SIMON, 1876a; VILLEPOUX, 1990b. Prairie : ROSELLE, 1887. *Salicornietum* : BIGOT, 1957, 1965. *Therobrachypodium* : BIGOT, 1965. **Période.** — *Femelle*. Juin : LESSERT, 1910.

*Sitticus distinguendus* (Simon, 1868)*Attulus histrio*; *Attus frigidus*; *Attus histrio*; *S. frigidus*.

**Taxonomie.** Le catalogue de CANARD & al., 1997 met en synonymie *Attulus helveolus* et *Sitticus distinguendus*, mais il s'agit de deux espèces bien distinctes. **Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1875d (*A. f.*), 1876a (*A. f.*), 1876a (*Attus h.*), 1937 (*Attulus h.*), 1937 (*S. f.*). Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1875d (*Attus h.*), 1876a (*Attus h.*), 1937 (*Attulus h.*). Corse : SIMON, 1937 (*Attulus h.*). Vendée : MURPHY, 1994. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Dune : MURPHY, 1994. Prairie : SIMON, 1937.

*Sitticus dzieduszycii* (L. Koch, 1870)**Répartition.** Alpes-Maritimes : SIMON, 1937. — Allemagne, Italie. Europe, Russie.*Sitticus floricola* (C. L. Koch, 1837)*Attus f.*

**Répartition.** Ain, Alpes (Hautes-), Aube, Aude : SIMON, 1876a (*A. f.*). Bouches-du-Rhône : BIGOT & al., 1977; SOYER, 1959. Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1870d (*A. f.*). Corrèze : LE PERU, 2004. Gard : BIGOT, 1983. Gers : LUCANTE, 1880b (*A. f.*). Hérault : SIMON, 1876a (*A. f.*). Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Landes : LUCANTE, 1880b (*A. f.*); SIMON, 1876a (*A. f.*). Moselle : LEBORGNE & al., 1998. Oise, Orne : SIMON, 1876a (*A. f.*). Rhin (Bas-) : LEBORGNE & al., 1998; PASQUET & al., 1992. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. "Seine" : SIMON, 1876a (*A. f.*). Seine-Maritime : LANCELEVÉE, 1884 (*A. f.*). Seine-et-Marne : DOIGNON, 1976. Somme : ROSELLE, 1888b (*A. f.*). Vaucluse : LEDOUX, 2000. Vosges : SIMON, 1876a (*A. f.*). — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** Jusqu'à 1900 m (LEDoux & al., 1996b). **Habitat.** Bord de mare : DOIGNON, 1976. Bord de plage : BIGOT & al., 1977. Éboulis : LEDOUX & al., 1996b. Forêt, mousses : DOIGNON, 1976. Friche : LEBORGNE & al., 1998. Lande, sous les pierres : LEDOUX & al., 1996c. Littoral, zone halophile à salicorne : SOYER, 1959. Marécage : LANCELEVÉE, 1884. Plage : BIGOT, 1983. Prairie : LEDOUX, 2000; PASQUET & al., 1992. Prairie en friche : LE PERU, 2004. Prairies marécageuses : SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Août : LEDOUX

& al., 1996b. — *Femelle*. Avril : LEDOUX, 2000. Mai : LE PERU, 2004. Juillet : LEDOUX & al., 1996c. Août : LEDOUX & al., 1996b; LUCAS, 1870d.

*Sitticus longipes* (Canestrini, 1873)*Attus l.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : HELSDINGEN, 1995; SIMON, 1876a (*A. l.*). Alpes-Maritimes : BERLAND, 1935. Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a (*A. l.*), 1937. Isère : SIMON, 1876a (*A. l.*). Savoie : BERLAND, 1937. Vaucluse : CORNIC, 1978. — Alpes du Dauphiné et de la Savoie : SIMON, 1937. Italie, Suisse. Europe. **Altitude.** De 720 m (CORNIC, 1978) jusqu'à 2700 m (BERLAND, 1937). **Habitat.** Rochers, anfractuosités : SIMON, 1876a. Sous une pierre : BERLAND, 1935. **Période.** — *Femelle*. Juin : CORNIC, 1978. Juillet : BERLAND, 1937. Août : BERLAND, 1935.

*Sitticus penicillatus* (Simon, 1875)*Attulus guttatus*; *Attulus p.*; *Attus p.*

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1875d (*Attus p.*), 1876a (*Attus p.*), 1937 (*Attulus p.*). Rhin (Bas-) : LESSERT, 1910 (*Attulus p.*). Rhin (Haut-) : MULLER & al., 1895 (*Attus p.*). Savoie (Haute-) : LESSERT, 1904 (*A. g.*), 1910 (*Attulus p.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Pierres, anfractuosités : LESSERT, 1904. **Période.** — *Mâle*. Avril : MULLER & al., 1895. — *Femelle*. Décembre : LESSERT, 1904, 1910.

*Sitticus pubescens* (Fabricius, 1775)*Attus p.*; *S. truncorum*.

**Répartition.** Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a (*A. p.*). Calvados : GUIBÉ, 1946; LUCAS, 1877b (*A. p.*). Corse : KRAUS, 1955 (*S. t.*). Côtes-d'Armor : DENIS, 1938a. Eure : LANCELEVÉE, 1884 (*A. p.*). Maine-et-Loire : BRAUD & al., 2005. Manche : GUIBÉ, 1946; SIMON, 1876a (*A. p.*). Morbihan : COUTANT, 1990; SIMON, 1876a (*A. p.*). Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1960a; LUCANTE, 1880b (*A. p.*). Pyrénées-Atlantiques : DENIS, 1959d; LUCANTE, 1880b (*A. p.*). Savoie : SIMON, 1876a (*A. p.*). "Seine" : SIMON, 1878f (*A. p.*). Seine-Maritime : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; LANCELEVÉE, 1884 (*A. p.*). Somme : ROSELLE, 1888a (*A. p.*). Vendée : DENIS, 1962b. — Toute la France : SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Europe, Russie, USA. **Altitude.** Jusqu'à 2900 m (DENIS, 1960a). **Habitat.** Maison : ROSELLE, 1888a. Murailles : LUCAS, 1877b; SIMON, 1876a. Murs : LANCELEVÉE, 1884. Prairies alpestres, sous les pierres : SIMON, 1876a. Sur un mur : BERANGER-LEVEQUE & al., 1994; DENIS, 1962b. **Période.** — *Mâle*. Juin : DENIS, 1938a. Juillet : DENIS, 1959d. Septembre : LUCAS, 1877b. — *Femelle*. Avril : DENIS, 1962b. Septembre : KRAUS, 1955; LUCAS, 1877b.

*Sitticus rivalis* Simon, 1937*S. lineatus*; *S. striatus* [err.].

**Répartition.** Lozère : ALDERWEIRELDT, 2001 [*S. striatus*, err. selon LOGUNOV, 2004]; LOGUNOV, 2004. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1950b (*S. l.*). Vaucluse : SIMON, 1937. — Pyrénées : SIMON, 1937. **Altitude.** Jusqu'à 2320 m (DENIS, 1950b). **Habitat.** Bord de lac,

sous des pierres : DENIS, 1950b. Bord de rivière : SIMON, 1937. Marécage : LOGUNOV, 2004. Marécage à *Sphagnum* : ALDERWEIRELDT, 2001. **Période.** — *Mâle*. Août : ALDERWEIRELDT, 2001 ; LOGUNOV, 2004. — *Femelle*. Juillet : DENIS, 1950b.

*Sitticus rupicola* (C. L. Koch, 1837)

*Attus r.*

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence : SIMON, 1876a (*A. r.*). Ardèche : SIMON, 1937. Rhin (Bas-) : PASQUET & al., 1992. Savoie : SIMON, 1876a (*A. r.*). Savoie (Haute-) : LEDOUX & al., 1996b, 1996c ; LOGUNOV & al., 1997. — Alpes du Dauphiné et de la Savoie : SIMON, 1937. Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Holarctique. **Altitude.** De 1000 m jusqu'à 2000 m (SIMON, 1937). **Habitat.** Éboulis : LEDOUX & al., 1996c. Prairie : PASQUET & al., 1992. Prairies alpêtres, sous les pierres : SIMON, 1876a, 1937. Rhododendrons, sous les pierres : LEDOUX & al., 1996c. Sous une pierre : LOGUNOV & al., 1997. **Période.** — *Mâle*. Juillet : LEDOUX & al., 1996c. Août : LEDOUX & al., 1996b. Septembre : LOGUNOV & al., 1997. — *Femelle*. Juillet : LEDOUX & al., 1996c. Août : LEDOUX & al., 1996b, 1996c. Septembre : LOGUNOV & al., 1997.

*Sitticus saltator* (O. P.-Cambridge, 1868)

*Attulus s.* ; *Attus s.*

**Répartition.** Bouches-du-Rhône : SIMON, 1937 (*Attulus s.*). Calvados : LUCAS, 1870d (*Attus s.*). Charente, Finistère : SIMON, 1937 (*Attulus s.*). Gironde : LUCANTE, 1880b (*Attus s.*) ; SIMON, 1937 (*Attulus s.*). Hérault : SIMON, 1876a (*Attus s.*), 1937 (*Attulus s.*). Landes : LUCANTE, 1880b (*Attus s.*) ; SIMON, 1937 (*Attulus s.*). Loire-Atlantique : LUCAS, 1882a (*Attus s.*) ; SIMON, 1937 (*Attulus s.*). Manche : LUCAS, 1878b (*Attus s.*) ; SIMON, 1876a (*Attus s.*), 1937 (*Attulus s.*). Morbihan, Oise : SIMON, 1876a (*Attus s.*), 1937 (*Attulus s.*). Pas-de-Calais : SIMON, 1937 (*Attulus s.*). "Seine" : SIMON, 1876a (*Attus s.*), 1937 (*Attulus s.*). Seine-et-Marne : SIMON, 1937 (*Attulus s.*). Somme : SIMON, 1876a (*Attus s.*), 1937 (*Attulus s.*). Vendée : COUTANT, 1990 (*Attulus s.*) ; DENIS, 1941 (*Attulus s.*), 1963c (*Attulus s.*), 1965c (*Attulus s.*). Yonne : SIMON, 1876a (*Attus s.*), 1937 (*Attulus s.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne. Paléarctique. **Habitat.** Dune : DENIS, 1941, 1963c, 1965c ; SIMON, 1876a, 1937. Lieux sablonneux : LUCAS, 1882a. Murs : LUCAS, 1878b. Plage : SIMON, 1937. Terrains sablonneux : SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Octobre : DENIS, 1963c. — *Femelle*. Mai : DENIS, 1965c. Juin : DENIS, 1941. Août : LUCAS, 1870d, 1878b, 1882a. Octobre : DENIS, 1963c.

*Sitticus saxicola* (C. L. Koch, 1848)

*Attus cingulatus* ; *S. cingulatus*.

**Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1876a (*A. c.*). — Alpes du Dauphiné : SIMON, 1937 (*S. c.*). Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique.

*Sitticus terebratus* (Clerck, 1757)

*Attus t.*

**Répartition.** "Seine" : SIMON, 1876a (*A. t.*). [Cette citation de la Seine est douteuse ; SIMON, 1937 note :

«*S. terebratus* Cl. ne se trouve ni aux environs de Paris, ni aux environs de Lyon)]. — Alpes : SIMON, 1937. Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique.

*Sitticus zimmermanni* (Simon, 1877)

*S. semivittatus*.

[SIMON, 1937 note sous *S. semivittatus* : « jusqu'ici confondu avec *S. cingulatus* »]. **Répartition.** Alpes (Hautes-) : SIMON, 1937, 1937 (*S. s.*). Pyrénées (Hautes-) : BOSMANS & al., 1986 ; DENIS, 1953a (*S. s.*). — Allemagne, Italie, Suisse. Paléarctique. **Altitude.** De 2100 m (BOSMANS & al., 1986) jusqu'à 2310 m (DENIS, 1953a). **Période.** — *Mâle*. Août : DENIS, 1953a.

*Synageles albotrimaculatus* (Lucas, 1846)

[Mâle inconnu]. **Répartition.** Pyrénées-Orientales : SIMON, 1937. — Italie. Algérie, Tunisie.

*Synageles dalmaticus* (Keyserling, 1863)

*S. todillus*.

**Répartition.** Corse : SIMON, 1876a (*S. t.*), 1937. — Espagne, Italie. De la Méditerranée à l'Asie Centrale.

*Synageles hilarulus* (C. L. Koch, 1846)

**Répartition.** Aube : SIMON, 1937. Bouches-du-Rhône : DENIS, 1950c. Doubs : EMERIT & al., 1997. Seine-et-Marne : SIMON, 1937. — Allemagne, Belgique, Italie, Suisse. Paléarctique. **Habitat.** Dune à coquilles, salicornes : DENIS, 1950c. **Période.** — *Femelle*. Mai : DENIS, 1950c. Juin : EMERIT & al., 1997.

*Synageles venator* (Lucas, 1836)

*Attus v.* ; *Leptorchestes ludibundus* ; *S. ludibundus*.

**Répartition.** Aube : SIMON, 1875d (*L. l.*), 1876a (*S. l.*). Bouches-du-Rhône : SOYER, 1959. Eure : EMERIT & al., 2003. Finistère : COUTANT, 1990. Garonne (Haute-) : LUCANTE, 1880b ; SIMON, 1876a. Ille-et-Vilaine : COUTANT, 1990. Loire-Atlantique : MURPHY, 1994. Morbihan : COUTANT, 1990. Pas-de-Calais : BONTE, 2000. Pyrénées (Hautes-) : DENIS, 1939b, 1950b. Pyrénées-Atlantiques : LUCANTE, 1880b. Pyrénées-Orientales : BOSMANS & al., 1985a ; DENIS, 1943c, 1961b ; LEDOUX & al., 1999a ; SIMON, 1937. Rhin (Haut-) : BLICK, 2000. Rhône : SIMON, 1937. Savoie (Haute-) : LESSERT, 1910. "Seine" : LUCAS, 1836 (*A. v.*) ; SIMON, 1876a, 1937. Somme : SIMON, 1876a. — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Paléarctique, Canada. **Altitude.** Jusqu'à 1700 m (DENIS, 1939b, 1950b). **Habitat.** Arrière-dune : LEDOUX & al., 1999a. Dune : SOYER, 1959. Dune et arrière-dune avec marais tourbeux : BONTE, 2000. Dune, à la base des herbes : SIMON, 1876a. Dunes, à la base des touffes d'herbes ; écorces des arbres : SIMON, 1937. Estuaire, schorre : BONTE, 2000. Forêt : DENIS, 1961b. Haie : SIMON, 1876a, 1937. Jardin : SIMON, 1937. Jardin, sous les écorces des pins : LUCAS, 1836. Lieux cultivés, troncs d'arbres : SIMON, 1876a. Marécage : EMERIT & al., 2003 ; MURPHY, 1994. Palissades : SIMON, 1876a. Pelouse calcaire : BOSMANS & al., 1985a. Rochers, anfractuosités : DENIS, 1943c. **Période.** — *Mâle*. Avril : SIMON, 1937. Mai : BONTE, 2000. Septembre : EMERIT & al., 2003. — *Femelle*. Février : DENIS, 1943c. Mai : BONTE, 2000. Juin : LEDOUX & al., 1999a ; LESSERT,

1910. Juillet: DENIS, 1939b, 1950b, 1961b. Octobre, novembre: LUCAS, 1836.

**Talavera aequipes** (O. P.-Cambridge, 1871)

*Euophrys a.*; *Euophrys ludio*; *Euophrys molesta*.

**Répartition.** Alpes-Maritimes, Aude: SIMON, 1937 (*E. a.*). Bouches-du-Rhône: DENIS, 1950c (*E. a.*); SOYER, 1959 (*E. a.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876b (*E. a.*), 1937 (*E. a.*). Corse: SIMON, 1876a (*E. l.*), 1937 (*E. a.*). Finistère: COUTANT, 1990 (*E. a.*). Gers: LUCANTE, 1880b (*E. a.*); SIMON, 1937 (*E. a.*). Hérault: EMERIT & al., 1990 (*E. m.*). Ille-et-Vilaine: COUTANT, 1990 (*E. a.*). Maine-et-Loire: VEILLON, 1997 (*E. a.*). Morbihan: COUTANT, 1990 (*E. a.*); SIMON, 1876a (*E. a.*), 1937 (*E. a.*). Orne: COUTANT, 1990 (*E. a.*). Rhin (Bas-): PASQUET & al., 1992 (*E. a.*). Rhin (Haut-): BLICK, 2000. "Seine": COCQUEMOT & al., 1991 (*E. a.*); ROLLARD, 2000 (*E. a.*); SIMON, 1876a (*E. a.*), 1937 (*E. a.*). Vendée: DENIS, 1963c (*E. a.*), 1964b (*E. a.*). — Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Paléarctique. **Habitat.** Arrière-dune, mousses; arrière-dune, sous des pierres: DENIS, 1964b. Bord d'étang saumâtre: DENIS, 1950c. Champ de céréales: COCQUEMOT & al., 1991. Dune, oyats: DENIS, 1964b. Dune, sous des tamaris: DENIS, 1963c. Forêt de pins, litière: DENIS, 1963c, 1964b. Forêt, sous des pierres: DENIS, 1964b. Friche: PASQUET & al., 1992. Garrigue calcaire: EMERIT & al., 1990. Lande: VEILLON, 1997. Littoral, *Crithmo-staticion*: SOYER, 1959. Marais salant: DENIS, 1950c. Pelouse à *Brachypodium*: SOYER, 1959. Prairie: PASQUET & al., 1992. Talus exposés au soleil et couverts d'herbes courtes: SIMON, 1876a. **Période.** — *Mâle*. Mai: DENIS, 1950c. Juin: DENIS, 1964b. — *Femelle*. Janvier: DENIS, 1963c. Avril: VEILLON, 1997. Août: DENIS, 1964b.

**Talavera aperta** (Miller, 1971)

**Répartition.** Rhin (Haut-): BLICK, 2000. — De la Belgique à l'Asie Centrale.

**Talavera inopinata** Wunderlich, 1993

**Répartition.** Yonne: LOGUNOV & al., 2003. — Allemagne, Suisse, Luxembourg. **Altitude.** 200 m (LOGUNOV & al., 2003). **Habitat.** Débris de roche: LOGUNOV & al., 2003. **Période.** — *Mâle*. Mai: LOGUNOV & al., 2003. — *Femelle*. Mai: LOGUNOV & al., 2003.

**Talavera krocha** Logunov & Kronstedt, 2003

**Répartition.** Yonne: LOGUNOV & al., 2003. — De la France à l'Asie Centrale. **Altitude.** 200 m (LOGUNOV & al., 2003). **Habitat.** Carrière: LOGUNOV & al., 2003. **Période.** — *Femelle*. Mai: LOGUNOV & al., 2003.

**Talavera monticola** (Kulczynski, 1884)

*Euophrys m.*

**Répartition.** Pyrénées-Orientales: LEDOUX & al., 1995 (*E. m.*). — Allemagne, Belgique, Suisse. Centre Europe. **Habitat.** Formation à bruyères et genévriers: LEDOUX & al., 1995.

**Talavera petrensis** (C. L. Koch, 1837)

*Euophrys p.*

**Répartition.** Alpes (Hautes-): SIMON, 1876a (*E. p.*). Ariège: DENIS, 1960a (*E. p.*). Aube, Cantal: SIMON, 1876a (*E. p.*). Côtes-d'Armor: DENIS, 1938a (*E. p.*). Finistère: DENIS, 1939a (*E. p.*). Garonne (Haute-): DENIS, 1954a (*E. p.*), 1967d (*E. p.*). Ille-et-Vilaine: CANARD, 1979 (*E. p.*), 1980 (*E. p.*), 1990c (*E. p.*); COUTANT, 1990 (*E. p.*). Isère: SIMON, 1876a (*E. p.*). Manche: PÉTILLON & al., 2004. Morbihan: COUTANT, 1990 (*E. p.*). Oise: SIMON, 1876a (*E. p.*). Pyrénées (Hautes-): BOSMANS & al., 1986 (*E. p.*); DENIS, 1950b (*E. p.*), 1953a (*E. p.*), 1954a (*E. p.*), 1955c (*E. p.*), 1960a (*E. p.*). Pyrénées-Atlantiques: DENIS, 1957a (*E. p.*), 1959d (*E. p.*). Pyrénées-Orientales: TAMBS-LYCHE, 1957 (*E. p.*). Savoie (Haute-): LEDOUX & al., 1996b (*E. p.*), 1996c (*E. p.*). Vendée: DENIS, 1962b (*E. p.*). — Presque toute la France: SIMON, 1937. Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse (*E. p.*). De l'Europe à l'Asie Centrale. **Altitude.** Jusqu'à 3180 m (DENIS, 1955c). **Habitat.** Bois: DENIS, 1938a. Bord de lac: DENIS, 1955c. Bord de torrent, mousses et sous les pierres: DENIS, 1950b. Lande: CANARD, 1990c. Lande sèche: CANARD, 1979, 1980. Littoral, marais salé: PÉTILLON & al., 2004. Sous des schistes délités très secs: DENIS, 1955c. Sous une pierre: LEDOUX & al., 1996c. Tourbière, sous les pierres: DENIS, 1950b. **Période.** — *Mâle*. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1959d. Août: DENIS, 1953a. — *Femelle*. Juin: DENIS, 1938a. Juillet: DENIS, 1939a, 1950b, 1954a, 1955c, 1960a, 1962b; LEDOUX & al., 1996c. Août: DENIS, 1953a, 1967d; LEDOUX & al., 1996b. — *Femelle avec cocon*. Juillet: DENIS, 1950b, 1954a, 1955c, 1957a, 1960a. Août: DENIS, 1957a.

**Thyene imperialis** (Rossi, 1846)

*Thya i.*

**Répartition.** Corse: CANARD, 1989; SIMON, 1876a (*T. i.*), 1937. — Espagne, Italie. Ancien Monde. **Habitat.** Buissons au soleil: SIMON, 1937. Maquis, sur inules: CANARD, 1989.

**Yllenus salsicola** (Simon, 1937)

*Attulus s.*

**Répartition.** Aude, Bouches-du-Rhône: SIMON, 1937 (*A. s.*). — Espagne, Italie. De la France à Israël. **Habitat.** Plages, Salsolacées; terrains sablonneux et salés: SIMON, 1937.




**Yllenus univittatus** (Simon, 1871)


*Attulus u.*; *Pseudomogrus u.*

**Répartition.** Aude: SIMON, 1937 (*P. u.*). Bouches-du-Rhône: SIMON, 1937 (*P. u.*); SOYER, 1959 (*P. u.*). Charente-Maritime: SIMON, 1876a, 1937 (*P. u.*). Gironde: LUCANTE, 1880b; SIMON, 1876a, 1937 (*P. u.*). Hérault: SIMON, 1876a, 1937 (*P. u.*). Morbihan: MURPHY, 1994; SIMON, 1876a, 1937 (*P. u.*). Var: SIMON, 1898c (*A. u.*). Vendée: COUTANT, 1990 (*P. u.*). — Italie. Peut-être Turkménistan. **Habitat.** Dune: SIMON, 1937; SOYER, 1959. Plage: SOYER, 1959.


ATYPIDAE – CTENIZIDAE – NEMESIIDAE

Cartes de répartition


-  Présence formelle de l'espèce dans le département
-  Présence probable selon les indications de SIMON, 1914 à 1937
-  Aucune localité précise Voir le texte




NEMESIIDAE – FILISTATIDAE – SICARIIDAE – SCYTODIDAE – LEPTONETIDAE




## LEPTONETIDAE



LEPTONETIDAE – TELEMIDAE – PHOLCIDAE – SEGESTRIIDAE


















SEGESTRIDAE – DYSDERIDAE







DYSDERIDAE

		
<i>Dysdera scabricula</i>	<i>Dysdera subsquarrosa</i>	<i>Dysdera westringi</i>
		
<i>Harpactea arguta</i>	<i>Harpactea corticalis</i>	<i>Harpactea haymozi</i>
		
<i>Harpactea hispana</i>	<i>Harpactea hombergi</i>	<i>Harpactea lepida</i>
		
<i>Harpactea muscicola</i>	<i>Harpactea serena</i>	<i>Harpactocrates apennicola</i>
		
<i>Harpactocrates cantabrorum</i>	<i>Harpactocrates drassoides</i>	<i>Harpactocrates gurdus</i>


DYSDERIDAE – OONOPIDAE




OONOPIDAE – MIMETIDAE – ERESIDAE – OECOBIDAE




## OECOBIIDAE – ULOBORIDAE – NESTICIDAE – THERIDIIDAE




Theridiidae




THERIDIIDAE



THERIDIIDAE




THERIDIIDAE







Theridiidae




THERIDIIDAE




Theridiidae




Theridiidae – Theridiosomatidae – Mysmenidae – Linyphiidae




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE



LINYPHIIDAE




## LINYPHIIDAE





















LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE

		
Diplocephalus permixtus	Diplocephalus picinus	Diplocephalus procer
		
Diplocephalus protuberans	Diplocephalus pullinus	Diplocephalus rectilobus
		
Diplostyla concolor	Dismodicus bifrons	Dismodicus elevatus
		
Dismodicus fungiceps	Donacochara speciosa	Drapetisca socialis
		
Drepanotylus uncutus	Dresconella nivicola	Entelecara acuminata


LINYPHIDAE


















LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE



LINYPHIIDAE


		
Gonatium nemorivagum	Gonatium occidentale	Gonatium paradoxum
		
Gonatium rubellum	Gonatium rubens	Gongyliellum calcariferum
		
Gongyliellum edentatum	Gongyliellum latebricola	Gongyliellum murcidum
		
Gongyliellum vivum	Gongylidium rufipes	Halorates reprobis
		
Helophora insignis	Hilaira excisa	Hybocoptus corrugis

LINYPHIIDAE






LINYPHIIDAE




## LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE

Lepthyphantes gladiola	Lepthyphantes hamifer	Lepthyphantes herbicola
Lepthyphantes homonymus	Lepthyphantes huberti	Lepthyphantes ignavus
Lepthyphantes improbulus	Lepthyphantes insignis	Lepthyphantes johannislupi
Lepthyphantes jugorum	Lepthyphantes keyserlingi	Lepthyphantes leprosus
Lepthyphantes leucopygius	Lepthyphantes liguricus	Lepthyphantes longiseta


## LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE



LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE







LINYPHIIDAE




## LINYPHIDAE




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE



LINYPHIIDAE




## LINYPHIIDAE







LINYPHIIDAE




LINYPHIDAE




LINYPHIDAE




LINYPHIIDAE




LINYPHIIDAE – TETRAGNATHIDAE




TETRAGNATHIDAE



TETRAGNATHIDAE – ARANEIDAE




ARANEIDAE







ARANEIDAE




ARANEIDAE




ARANEIDAE – LYCOSIDAE




LYCOSIDAE




LYCOSIDAE



LYCOSIDAE




LYCOSIDAE






## LYCOSIDAE







LYCOSIDAE – PISAURIDAE – OXYOPIDAE – ZORIDAE




ZORIDAE – AGELENIDAE




AGELENIDAE




AGELENIDAE – CYBAEIDAE – HAHNIIDAE




HAHNIIDAE – DICTYNIDAE



DICTYNIDAE




DICTYNIDAE – AMAUROBIIDAE






AMAUROBIIDAE







AMAUROBIIDAE – TITANOECIDAE – ANYPHAENIDAE




ANYPHAENIDAE – LIOCRRANIDAE




LIOCRANIDAE – CLUBIONIDAE




CLUBIONIDAE




CLUBIONIDAE




CLUBIONIDAE – CORINNIDAE – ZODARIIDAE



ZODARIIDAE




ZODARIIDAE – GNAPHOSIDAE







GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE



GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE







GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE




GNAPHOSIDAE – SPARASSIDAE – PHILODROMIDAE




PHILODROMIDAE




PHILODROMIDAE



PHILODROMIDAE – THOMISIDAE




THOMISIDAE






THOMISIDAE







THOMISIDAE




## THOMISIDAE




SALTICIDAE




SALTICIDAE


















SALTICIDAE




SALTICIDAE



SALTICIDAE


		
Heliophanus patagiatus	Heliophanus rufithorax	Heliophanus tribulosus
		
Icius congener	Icius hamatus	Icius subinermis
		
Leptorchestes berolinensis	Leptorchestes mutilloides	Marpissa canestrinii
		
Marpissa muscosa	Marpissa nivoyi	Marpissa pomatia
		
Marpissa radiata	Menemerus bivittatus	Menemerus falsificus

SALTICIDAE







SALTICIDAE




SALTICIDAE




SALTICIDAE



SALTICIDAE





dépôt légal : 1<sup>er</sup> trimestre 2007

J.-C. LEDOUX  
imprimeur-éditeur  
43370 Solignac-sur-Loire

ISSN 0398-4346  
&  
ISBN 2-909329-03-8