

CATALOGUS VAN DE NEDERLANDSE SPINNEN

PETER VAN HELSDINGEN



VERSIE 2024.3

CATALOGUS VAN DE NEDERLANDSE SPINNEN

P.J. van Helsdingen

Citeren: Helsdingen, P.J. van 2024. Catalogus van de Nederlandse spinnen. Versie 2024.3.
Laatst bijgewerkt: **25 juli 2024**

SUMMARY

The Catalogue of the Spiders of the Netherlands consists of three parts: the catalogue, the literature references, and the checklist with the distribution of the species over the twelve provinces. All data concern published records. Families and species are listed in alphabetical order within their categories. For each species the literature references are given followed by their distribution and the literature source of that record, indicated by a number. Both authors and numbers relate to the List of References. The third part summarizes the distributions over the provinces. In the catalogue and the checklist dubious records are indicated by a question mark (?). Incidentally imported species are put in square brackets [].

In 2024 is een kleine wijziging aangebracht in de opmaak. In de paragraaf met literatuurverwijzingen bij iedere soort zijn de verschillende namen, waaronder de soort in de loop van de tijd is vermeld, door markering beter zichtbaar gemaakt. Een handreiking aan de gebruiker.

VOORWOORD

Historie

Deze nieuwe catalogus van de spinnen van Nederland is een voortzetting van de in 1999 verschenen Catalogus van de Nederlandse spinnen. Die catalogus was een herziening van de eerdere "Novus Catalogus Aranearium hucusque in Hollandia inventarum". Deze electronische catalogus heeft hetzelfde doel als toen: de ontsluiting van de faunistische literatuur over deze diergroep, zodat alle gepubliceerde opgaven over voorkomen en verspreiding van de spinnensoorten in ons land gemakkelijk zijn te vinden.

Een catalogus als deze is een historisch belast document. Eenmaal gepubliceerde opgaven van voorkomen en verspreiding van dieren blijven bestaan, ook de twijfelachtige en vrijwel zeker onjuiste. Het blijven aanwijzingen van het voorkomen van een soort ergens in het verleden, die steeds zo goed mogelijk moeten worden geïnterpreteerd. Dat kan goed wanneer er materiaal is bewaard gebleven dat kan worden gecontroleerd, maar van auteurs uit het verleden zijn vaak geen collecties meer behouden gebleven. In dergelijke gevallen zijn gegevens niet meer te verifiëren, maar zij vallen ook niet te ontkennen. Zij blijven meegaan in onze overzichten.

Gelukkig werd de collectie van A.W.M. van Hasselt wel tijdig in een museumcollectie (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, nu Naturalis Biodiversity Centre te Leiden) ondergebracht. Helaas is deze collectie van Van Hasselt, hoe waardevol ook, niet meer dan een referentiecollectie, waaruit zijn opvattingen over de soorten zijn af te leiden, maar niet de relatie tussen exemplaar en vermelde vindplaatsen kan worden gelegd. Komt de identiteit van de exemplaren overeen met de huidige opvatting van de soort, dan is er geen probleem en kunnen de genoemde vindplaatsen voor die soort worden gehandhaafd. Wanneer de exemplaren tot een andere soort blijken te behoren, kunnen de vindplaatsen voor die soort gelden. Helaas komt het regelmatig voor dat het materiaal van één van de door Van Hasselt bewaarde soorten, meestal 2 ♂ en 2 ♀, tot meer dan één soort behoren, zodat de vindplaatsen niet met zekerheid voor één soort kunnen gelden. De vindplaatsen worden dan bij beide soorten genoemd, maar wel met vraagtekens. Van een aantal soorten was geen materiaal meer in de collectie te vinden, waardoor eveneens onzekerheid over soort en vindplaatsen bestaat.

Catalogus

De oude opzet uit 1999 is in grote lijnen gehandhaafd, zij het dat de families nu alfabetisch zijn gerangschikt, de geslachten alfabetisch binnen de families en de soorten alfabetisch binnen de geslachten. Daarmee is de klassieke volgorde van de families opgegeven, met de vogelspinachtigen (Theraphosomorpha) voorop en de kruisspinachtigen (Araneoida) achteraan. De vindbaarheid is daardoor

vergroot. De nomenclatuur en erkenning van soorten is gebaseerd op de on-line World Spider Catalog van Platnick en later van de World Spider Catalogue.

Naast veranderingen door taxonomische en nomenclatorische ontwikkelingen zijn er ook andere factoren, die een fauna dynamisch maken. Nieuwe soorten worden gevonden, wat deels misschien te verklaren valt door meer inzet en betere methoden, maar stellig ook het gevolg is van het binnenkomen van soorten in ons land door areaalsuitbreidingen. *Argiope bruennichi* is daarvan een opvallend en bekend voorbeeld. Het is vaak moeilijk vast te stellen of een nieuwe soort voor ons land te danken is aan een dergelijke recente binnenkomst, of dat de soort lange tijd over het hoofd werd gezien. Voor een aantal soorten geldt het tegengestelde. Zij werden gedurende een eeuw niet meer gezien, en de vraag is ook daar of er onvoldoende naar is gezocht, of dat die soorten door natuurlijke oorzaken uit ons land zijn verdwenen. Misschien waren oude waarnemingen soms ook gebaseerd op per ongeluk meegebrachte exemplaren, zoals ook nu regelmatig gebeurt. Daarnaast moet ook verarming optreden ten gevolge van negatieve menselijke invloeden, zoals eutrofiëring van wateren, verdroging van natte terreinen, vergrassing van heideterreinen, enz. Het is moeilijk de juiste causale verbanden te leggen.

Onze fauna omvat 638 inheemse soorten spinnen. Er worden in deze catalogus ook 24 soortnamen genoemd, maar tussen haken () geplaatst ten teken dat zij, hoewel ooit vermeld, niet uit ons land bekend zijn en om de daar aangegeven reden van de faunalijst moesten worden verwijderd. Soms is het materiaal verloren gegaan en is bevestiging onmogelijk. Indien niet naar een publicatie wordt verwezen waarin de verandering, bijv. een onjuiste determinatie, werd vermeld, is de conclusie van mijzelf afkomstig. Voor 4 soorten is het voorkomen in ons land niet zeker, wat wordt aangeduid met een vraagteken (?). Soorten die in ons land zijn gevonden, maar waarvoor het aannemelijk is dat zij werden ingevoerd, bijvoorbeeld omdat zij in distributiecentra werden gevonden, zijn tussen vierkante haken [] geplaatst. Deze soorten [33] behoren (nog) niet tot onze inheemse fauna. Mochten ze zich in de loop van de tijd toch tot voortplantingspopulaties ontwikkelen, dan kunnen die haken worden verwijderd. Sommige zijn maar een keer gevonden, andere worden regelmatig gezien, maar nooit als populatie. Een aantal andere soorten {2} kan als gevestigde exoten worden beschouwd, omdat men ze regelmatig tegenkomt en ze zich blijkbaar door voortplanting kunnen handhaven. Onze fauna omvat daarom 636 soorten spinnen die met zekerheid in ons land voorkomen of voorkwamen. Een aantal daarvan is al lange tijd niet meer gezien, maar bij een diergroep als spinnen, waarvan vele soorten erg klein zijn, is het niet eenvoudig om vast te stellen of ze nog steeds met een goede populatie in ons land aanwezig zijn. En de grens tussen exoot – door de mens ingevoerd en niet op eigen kracht naar ons land gekomen – en inheemse soort vervaagt soms in de loop van de tijd. *Pholcus phalangioides* werd begin 20^e eeuw als exoot gesigneerd en is nu niet meer weg te denken uit onze leefomgeving.

Van zes nominale soorten ligt de typelocaliteit in Nederland. Zij werden alle door Thorell beschreven aan de hand van exemplaren, welke hem door Van Hasselt werden toegestuurd: *Sagana rutilans* (= *Liocranum rutilans*) (♂♀), *Zilla mordax* (= *Enoplognatha mordax*) (♂), *Theridium hasseltii* (= *Theridion blackwalli* O.P.-Cambridge) (♂♀), *Erigone speciosa* (♀) en *Erigone leptocarpa* (♂) (beide = *Donacochara speciosa*), en *Erigone tarsalis* (♂) (= *Oedothorax fuscus* (Blackwall)). Het faunistisch, en in samenhang daarmee het taxonomisch, onderzoek aan spinnen kwam in Nederland pas laat op gang en de meeste soorten waren toen al beschreven. Kennelijk miste Van Hasselt in 1875, aan het begin van zijn studie aan de Nederlandse spinnen, nog het zelfvertrouwen om nieuwe soorten te beschrijven en liet hij dit aan een arachnoloog van naam over. Later heeft hij dat wel voor spinnen uit onze koloniën gedaan. Sedert de catalogus van 1999 werden een aantal soorten aan onze faunalijst toegevoegd. Dat is te danken aan een aantal factoren: vooruitgang in de soorterkenning, zoals boven al aangegeven; betere literatuur in de vorm van overzichtswerken; betere optiek en verlichting; en uitgebreidere inventarisaties. Er zijn nog vele soorten die in de ons omringende gebieden voorkomen, maar nog niet bij ons werden gevonden, zodat het aantal soorten stellig nog zal groeien. Voor het verfijnen van het verspreidingsbeeld is nog veel aanvullend werk nodig.

Literatuurlijst

Bij iedere soort zijn de literatuurverwijzingen vermeld en werden de correcties, die in de loop der jaren noodzakelijk zijn gebleken, verwerkt. Per soort worden alle vindplaatsen opgesomd, terwijl door middel van een nummer is aangegeven welke auteur voor die opgave verantwoordelijk is; de nummers

corresponderen met de literatuurlijst. Vanwege de toename van aantallen auteurs en publicaties wordt de nummering voortdurend aangepast en zijn de nummers uit eerdere catalogi vaak niet meer van toepassing. Gebruik dus steeds de laatste versie.

Verspreiding van de Nederlandse spinnen over de provincies

Aan het eind van dit document – na de catalogus en de literatuurlijst – wordt een samenvatting van de verspreiding over de provincies in ons land gegeven. Daar wordt de kolom Nederland (NL) alleen van een + teken voorzien als de soort ooit in de literatuur voor Nederland werd vermeld zonder nadere aanduiding van een vindplaats.

Onze kennis over de verspreiding van onze spinnen is over het algemeen erg onvolledig. Het ontbreken van een opgave voor een bepaalde provincie heeft daarom maar beperkte betekenis. Het wil alleen zeggen dat in de literatuur geen opgave te vinden is. In collecties, zoals op het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden, zitten nog vele nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna en vele aanvullingen op de verspreiding opgeslagen. Dit is een aansporing om nieuwe faunistische gegevens voor publicatie aan te bieden. De Nieuwsbrief SPINED is daarvoor een geschikt medium. Neemt u daarvoor contact op met Peter.vanhelsdingen@naturalis.nl

Voor de provincies zijn de volgende afkortingen gebruikt: NL = Nederland, W = waddengebied, GR = Groningen, FR = Friesland, DR = Drenthe, OV = Overijssel, GL = Gelderland, FL = Flevoland, UT = Utrecht, NH = Noord-Holland, ZH = Zuid-Holland, ZE = Zeeland, NB = Noord-Brabant, LI = Limburg.

CATALOGUS – CATALOGUE - CATALOG

AGELENIDAE

***Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757)**

- *Agelena labyrinthica*; Van Hasselt 1871: 46; 1872b: xxxiii; 1877: xxvi; 1885c: 147; 1893b: xxxii. Becker 1879a: xl; 1896b: 206. Bouwman 1935: 81. Chrysanthus 1948a: 43; 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254. Van Helsdingen 1976: 38; 2011: 4; 2019b: 36. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Van Wezel 1987: 13. Kessler 1993: 6. Koomen et al. 1995: xxix; 2005: 87. De Bruyn 1996: 42. Spoek 1997b: 7. Koomen 1998b: 225. Tutelaers 2000: 9; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28; 2017: 278. Prinsen 2002: 118; 2005: 113. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 21. Noordijk et al. 2008b: 260. Lambeets 2008: 14. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van Helsdingen et al. 2010: 16; 2012: 28; 2013: 25. Lambregts et al. 2013: 16. Colijn et al. 2017: 14. Joven 2023: omslag. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (13b, 22, 30, 119, 149u (kaartje), 174d (duinen)). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Schiermonnikoog (160a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (Havelterberg) (230i). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Hoge Veluwe (244), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (170a). UT: Amersfoort (69n). NH: (7), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7), Wassenaar (94), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg ? (107). NB: (7), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (96), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Hoogeloon (Cartierheide) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Roosendaal (Rozenven) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Wintelre (182t). LI: Brunssum (44), Obbicht - Grevenbicht (186c), Reuver (193b), Roerdalen (Melick, Sint-Odiliënberg) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

***Allagelena gracilens* (C.L. Koch, 1841)**

Agelena gracilens C.L. Koch, 1841

- *Agelena similis* Van Hasselt 1879b: xxv; 1885c: 147. Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254.

FR: Schiermonnikoog (160a). GL: Nijmegen (119). ZH: Loosduinen (119). LI: Brunssum (44), Mook (109).

(*Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830))

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 145; 1887a: xxxii; 1889b: xxviii; 1890a: xiv; 1890b: 207; 1898: 69. Becker 1896b: 189. Chrysanthus 1951g: 99; 1965: 70 (Nederlandse opgaven *atropos* = *terrestris*).

Volgens Chrysanthus (1965: 70) hebben al deze opgaven betrekking op *Coelotes terrestris* (Wider). Deze soort is niet uit Nederland bekend.

***Coelotes terrestris* (Wider, 1834)**

- *Amaurobius terrestris*; Van Hasselt 1872c: lxiv; 1879b: xxv; 1882: xxvii.
□ *Coelotes atropos*; Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 145; 1887a: xxxii; 1889b: xxviii; 1890a: xiv; 1890b: 207; 1898: 69. Becker 1896b: 189. Chrysanthus 1951g: 99; 1965: 70 (Nederlandse opgaven *atropos* = *terrestris*).
□ *Coelotes terrestris*; Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 5. Jacobs 1992: 132. Koomen 1992: xxvii; 1994: xxxiii. Siepel et al. 1996: 46, 49, 53. Mabelis 1996: 125-132. Noordijk 2005: 33. IJland et al. 2011: 20.

NL: (13b). OV: Twente (191b). GL: Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoog Soeren (127, 128, 129), Nijmegen (119), Winterswijk (123, 182g). FL: Almere (218b). NB: Breda (97), idem (Liesbos) (117, 119), idem (Ulvenhoutse bos) (119). LI: Cadier en Keer (193b), Eperheide (Onderste Bos) (164n), Geleen (44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mechelen (193b), Mook (109), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Rijckholt (193b), Vaals (182e), Valkenburg (111, 119).

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)

- *Tegenaria agrestis*; Van der Hammen 1950: 112. Chrysanthus 1951f: 77; 1951g: 99. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Jacobs 1992: 132. Noordam 1996: 12. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www). Heuts 2001: 11. Bonte et al. 2003a: 27. Prinsen 2005: 113. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 21. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2010: 16. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Bink 2014b: 13. Wielink et al. 2020: 341.

GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). ZH: Wassenaar (Meijendel) (201k). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Huizen (Gooise heide) (151u). ZH: Rotterdam (Maasvlakte) (16g). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250c), Tilburg (Kaaistoep-Sijsten) (215f, 71p, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (43, 44), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Sint Pietersberg (in grot) (43, 83), Vlodrop (43, 83), idem (Meinweg) (239d, 239f)

Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843)

Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843

- *Avagena atrica*; Six 1858c: 20.
- *Philoica atrica*; Van Hasselt 1863: 127.
- *Tegenaria atrica*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 198. Van Hasselt 1885c: 145; 1886c: 103, 105. Pinkhof 1913: 467; 1941: 225. Chrysanthus 1947b: 103; 1951g: 99. Van der Hammen 1949a: 80; 1950: 112. Hulsebos 1959: 254; 1962: 234. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 5. Koomen 1994: xxxiii; 1998a: xxv. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 28. Decae 2003: 8. Bonte et al. 2003a: 27. Prinsen 2005: 113. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 21. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2010: 26. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341.
- *Tegenaria larva*; Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Van 't Veer et al. 2012: 14.
- *Tegenaria saeva*; Bonte et al. 2003a: 27. Bonte 2006: 12. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 14. Wielink et al. 2020: 341.
- *Eratigena atrica*; Bloem et al. 2021: 38.

NL: (7, 13b, 29, 119). FR: Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Meppel (160b, 160c). OV: Ommen (Lemelerberg) (182i), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: (221, 222b), Amersfoort (69n), Baarn (in kas) (81), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amsterdam (206a, 206f), Zaandstad (Zaandam, Guisveld) (232b). ZH: Delft (in kas) (81), Leiden (in kas) (81), Lisse (in kas) (81), Rotterdam (71 l), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Beek-Ubbergen (215f), Cranendonck (230e), Gilze-Rijen (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Brunssum (44), Heerdeberg (in grot) (83), Jabeek (193b), Maastricht (44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mheer (193b), Reuver (193b), Sint Pietersberg (44).

Eratigena picta (Simon, 1870)

Malthonica picta (Simon, 1870)

- *Tegenaria pusilla*; Van Hasselt 1890b: 182.
- *Tegenaria picta*; De Jong 1949b: 215. Van Helsdingen 1976: 38. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 14; 2001e (www). Koomen 1986: 202; 2000: xxxviii. Jacobs 1992: 132. Versteegen et al. 1992: 73. Koomen et al. 1995: xxx. Wielink et al. 2020: 341.
- *Malthonica picta*; Roelofs-Ditters 2007: 21. Tutelaers 2008: 28. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. IJland et al. 2011: 20. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 341.

- *Eratigena picta*: Tutelaers 2017: 278. Van Helsdingen 2019b: 36.

NL: (232w: heide hogere gronden). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Breda (Cauwelaarse beek) (169e), Cranendonck (230e), Cuijk (129), Eersel (182t), Heeze (Heezerven) (230d), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunnsummerheide) (164n), Eperheide (Onderste Bos, Bovenste Bos) (164n), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

***Histopona torpida* (C.L. Koch, 1834)**

- *Textrix torpida*; Van Hasselt 1885c: 147; 1898: 51.
- *Histopona torpida*; Chrysanthus 1953d: 88. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1994: xxxiii. Jacobs 1992: 132.

DR: (119). GL: Winterswijk (182g). ZH: (119). LI: Bunde (50), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (193b), Valkenburg (Geuldal) (136), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

***Inermocoelotes inermis* (L. Koch, 1855)**

Coelotes inermis (L. Koch, 1855); *Eurocoelotes inermis* (L. Koch, 1855)

- *Coelotes inermis*; Chrysanthus 1958b: 144. Koomen 1986: 202. Jacobs 1992: 132.

L: Heerlen (64), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a).

***(Tegenaria campestris)* (C.L. Koch, 1834)**

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1870b: 30; 1885c: 146; 1898: 50 (= *Tegenaria silvestris*). Pinkhof 1913: 467.

De soort is niet uit Nederland bekend en werd uit onze faunalijst geschrapt.

***Tegenaria domestica* (Clerck, 1757)**

- *Aranea domestica*; Bennet et al. 1825: 472.
- *Epeira domestica*; Groneman 1899: 69. 1947b: 103.
- *Tegenaria domestica*; Six 1858b: 296. Snellen van Vollenhoven 1859: 55; 1868: 55. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 196. Van Hasselt 1885c: 146. Pinkhof 1913: 466; 1933: 198. Chrysanthus 1951g: 99. Van der Hammen 1949a: 81; 1950: 112. Hulsebos 1959: 254; 1962: 234. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202. Koomen et al. 1996: xxv. Simon Thomas et al. 2000: 5. Roelofs-Ditters 2007: 21. Noordijk et al. 2011: 17. Colijn et al. 2017: 14.
- *Philoica civilis*; Six 1858b: 296.
- *Tegenaria civilis*; Snellen van Vollenhoven 1859: 56; 1868: 56.
- *Tegenaria derhammi*; Van Hasselt 1886c: 103. Pinkhof 1941: 223. Chrysanthus 1947b: 103; 1951g: 99.

NL: (7, 13b, 15c, 29, 119, 206a, 224a, 224b). FR: Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160c), Meppel (160c). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Arnhem (76a), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Oosterbeek (76a), Wageningen (81). UT: (220), Amersfoort (69n), Utrecht (224a, 224b). NH: Amsterdam (206d, 206f). ZH: Leiden (220, 224a, 224b), Rotterdam (215f). LI: Gronsveld (44), Heerdeberg (in grot) (83), Maastricht (193b), Neercanne (in grot) (83), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (44), Sint Pietersberg (in grot) (83).

***Tegenaria ferruginea* (Panzer, 1804)**

Malthonica ferruginea (Panzer, 1804)

- *Tegenaria ferruginea*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 193. Pinkhof 1913: 466. Chrysanthus 1947b: 103. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 5. Koomen 1991: xviii; 1998a: xxxv; 2000: xxxvii. Spoek 1999: 3.

NL: (7, 29). DR: Emmen (Oevermansbosje) (225c). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Eerde) (182i). NH: Amsterdam (206a). NB: Oirschot (13b). LI: Jabeek (193b), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m).

Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840*Malthonica pagana* (C.L. Koch, 1840)

- Tegenaria urbana*; Van Hasselt 1885c: 146; 1886c: 105; 1890b: 207.
- Tegenaria pagana*; Van der Hammen 1950: 112.

GL: Nijmegen (122). ZE: Oostkapelle (119). LI: Heerderberg (in grot) (83), Neercanne (grot) (83), Sint Pietersberg (in grot) (83).

Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)

- Tegenaria guyonii*; Van Hasselt 1885c: 146; 1886c: 103.
- Tegenaria parietina* Pinkhof 1913: 467. Hulsebos 1961: 3. Meijer 1985: 136. Roelofs-Ditters 2007: 21.

NL: (119, 206a). FR: Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Meppel (160b). ZH: Leerdam (Fort Asperen) (215f). LI: Jabeek (193b).

Tegenaria silvestris L. Koch, 1872*Malthonica silvestris* (L. Koch), 1872

- Tegenaria silvestris*; De Jong 1949b: 215. Van der Hammen 1950: 112. Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 45. Van Helsdingen 1976: 38; 2019: 47. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 5. Jacobs 1992: 132. Koomen 1992: xxvii. Prinsen 2005: 113. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2015a: 4. Bink 2016: 3.
- Tegenaria campestris*; Van Hasselt 1870b: 30; 1885c: 146; 1898: 50. Pinkhof 1913: 467.
- Malthonica silvestris*; Roelofs-Ditters 2007: 21. IJland et al. 2010: 26.

NL: ? (206a). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Ermelo (Speulderbos) (150w2), Hattem (119), Molencate (91), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: Leusden (De Treek) (169e), Rhenen (Grebbeberg) (164m). ZH: Papendrecht (import) (16h). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Gronsveld (44), Heerderberg (in grot) (83), Maastricht (136), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Rijckholt (193b), Sint Pietersberg (in grot) (83), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Textrix denticulata (Olivier, 1789)

- Textrix lycosina*; Six 1858b: 296. Van Hasselt 1876b: lii.
- Textrix denticulata* Van Hasselt, 1885a: 147; 1886c: 103. Becker, 1879a: xlvi; 1896b: 210. Van der Hammen, 1949a: 80 . Chrysanthus, 1951g: 99. Hulsebos, 1959: 254; 1961: 3. Meijer, 1973b: 28. Meijer, 1985: 136. Poot et al., 1989: 5. Koomen, 1990: xv. Siepel et al., 1996: 46, 53. Koomen et al., 1997: xxxvii; 2005: 87. Spoek 1999: 3; 2005: 26. Noordijk et al. 2001: 23. Faber et al. 2001: 46. Decae 1998b: 59. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 27; 2003b: 911. Prinsen 2005: 113. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 21. Prinsen et al. 2009: 191. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2013: 25. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 14. Bink 2014b: 13. Colijn et al. 2017: 14. Van Helsdingen 2019b: 36. Wielink et al. 2020: 341.

GR: Nieuw Wolda (202m). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum, Hoorn) (182v), Bolsward (122), Harlingen(202m), Oranjewoud (122), Sneek (202m). DR: Assen (202m), Dwingeloo (160b), Emmen (202m), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Meppel (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Deventer (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Zwartebroek (202m). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119, 220), Amersfoort (69n). NH: (7, 119), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Amsterdam (202m), Bergen (202m), Hilversum (103), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Zaandstad (Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7, 119), Delft (202m), Gouda (202m), Leiden (in kas) (81), Lisse (in kas) (81), Rotterdam (71f), Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Schiedam (in kas) (81), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Westerschouwen (182c). NB: Asten (202m), Bergen op Zoom (202m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: (119), Geleen (Danekerberg) (44), Jabeek (193b), Maastricht (13b, 193b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Roerdalen (Holst) (150s).

AMAUROBIIDAE

Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768)

- *Amaurobius fenestralis*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 232. Van Hasselt 1885c: 144; 1886c: 103; 1890b: 207 (alle p. p.). Bouwman-Buis 1939b: 75. Chrysanthus 1958b: 144. Hulsebos 1961: 2. Koomen 1994: xxxii. Spoek 1999: 3. Prinsen 2005: 111. Roelofs-Ditters 2007: 17. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (7, 119, 129). FR: Bolsward ? (122), Oranjewoud ? (122). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Oevermansbosje) (225c). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: Amersfoort (69n). NB: Tilburg (Kaaistoep-dal Oude Ley) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Heerlen (64), Kunrade (64), Maastricht (13b).

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)

- *Amaurobius ferox*; Six 1858b: 297. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 235. Van Hasselt 1885c: 143; 1886c: 103, 105; 1890b: 207. Bouwman-Buis 1939b: 79. Van der Hammen 1949a: 74; 1950: 110. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1961: 2. Meijer 1985: 136. Decae 2000b: 48. Roelofs-Ditters 2007: 17. Colijn et al. 2017: 14. Oldenburg 2023: 25.

NL: (7, 13b, 24, 119, 202zz). FR: Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Zwartemeer (160b). UT: Amersfoort (69n), Rijnsburg ? (220). ZH: Delft (in kas) (81), Leiden (in kas) (81), Leerdam (Fort Asperen) (215f), Rotterdam (71i). NB: (129). LI: (129), Brunssum ? (44), Heerderberg (in grot) (83), Jabeek (193b), Maastricht (193b), Neercanne (in grot) (83), Valkenburg (in grot) (83).

Amaurobius similis (Blackwall, 1861)

- *Amaurobius atrox*; Six 1858b: 297. Snellen van Vollenhoven 1859: 58; 1868: 58.
□ *Amaurobius similis*; Becker 1881: xxviii; 1896b: 234. Maurissen 1882: cxx. Van Hasselt 1885c: 144 (p. p.). Bouwman-Buis 1939b: 79. Pinkhof 1941: 224. Van der Hammen 1949a: 74; 1950: 110. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1961: 2. Vossen 1983: 236. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 6. Koomen 1992: xxvi; 1999: xxxiv. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2001: xxxviii; 2005: 87. Prinsen 2002: 118. Roelofs-Ditters 2007: 17. Van 't Veer et al. 2012: 13. Van Helsdingen et al. 2015a: 4. Titulaers 2017: 279. Van Helsdingen 2019b: 36.
□ *Amaurobius fenestralis*; Van Hasselt 1885c: 144; 1886c: 103; 1890b: 207 (alle p. p.).
□ *Ciniflo similis*; Hulsebos 1959: 253. Meijer 1973b: 26.

NL: (24, 224a, 224b). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum) (182v), Bolsward ? (122), Oranjewoud ? (122). DR: Dwingeloo (160b), Havelte (160b), Klazienaveen (160b), Zwartemeer (160b). UT: Driebergen (220), Utrecht (220). NH: Amsterdam (206f), Egmond (182w), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Zaanstad (232b). ZH: Delft (in kas) (81), Leiden (in kas) (81), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (119). NB: (119), Castelré (Het Merkske) (150t), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f). LI: (119), Echt (in grot) (239b), Heerderberg (in grot) (83), Jabeek (193b), Maastricht (11, 13b, 44, 192c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mechelen (Elset) (182e), Mheer (193b), Rijckholt (44).

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

- *Amaurobius claustrarius*; Van Hasselt 1885c: 144.

NB: Oirschot (119). LI: Maastricht (119).

ANAPIDAE

Comaroma simoni Bertkau, 1889

□ *Comaroma simoni*; Poot et al. 1989: 8.

L: Margraten (Schiepersberg) (210b).

ANYPHAENIDAE

***Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802)**

□ *Anyphaena accentuata*; Six 1858b: 297; 1863: 127. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 292. Van Hasselt 1885c: 135; 1889b: xxviii; 1898: 58. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1951g: 100. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1976: 37; 2019b: 36. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1996: 171, 218; 1998a: xxxiv; 1998b: 225; 2000: xxxviii; 2010: 210. Poot et al. 1989: 6. Koomen et al. 1996: xxvi. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2001d (www); 2017: 279. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 191. Wielink et al. 2009: 221. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2013: 25; 2015a: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2010: 26; 2011: 20. Noordijk et al. 2011: 17. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 341 (250d). Noordam 2024: 24.

NL: (13b). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (Havelterberg) (230i), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i), Ommen (Eerde, Lemelerberg) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (119), Apeldoorn (Hoog Soeren) (127, 182u), idem (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119), Amersfoort (69n), De Bilt (220), Driebergen (222b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: (7, 119). ZH: (7, 119), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 119). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250c), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: (7, 119), Brunssum (44), Eperheide (Onderste Bos) (164n), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (44), Roerdalen (Holst, Hoosden) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Valkenburg (Geuldal) (136), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

ARANEIDAE

***Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802)**

Araneus ceropegius (Walckenaer, 1802)

□ *Epeira ceropegia*; Van Hasselt 1886b: 57; 1891: xli.

GL: Arnhem (121), Groesbeek (130). NB: Oirschot (121).

***Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)**

Araneus redii (Scopoli, 1763)

□ *Epeira redii*; Becker 1879a: xlvi; 1896a: 30. Van Hasselt 1898: 49.
□ *Epeira solers*; Van Hasselt 1886b: 63.
□ *Araneus redii*; Chrysanthus 1951g: 99. Van Heerdt et al. 1960: 235. Hulsebos 1961: 3. Van Helsdingen 1981a: 36. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215.
□ *Agalenatea redii*; Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiv; 1998a: xxxv; 2015: 158. Koomen et al. 1993a: 572; 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxxvii. Tutelaers 2000: 20; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2005: 114. Roelofs-Ditters 2007: 23. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Noordijk et al. 2011: 17. IJland et al. 2011: 20. Colijn et al. 2017: 14. Van Helsdingen 2019b: 36. Wielink et al. 2020: 341.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand Hildenberg, 't Groote Veen) (183a), Terschelling (137), idem (Koegelwieck) (182v). DR: Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Havelte (Havelterberg) (230i), Westerbork (182f), Westerveld (Doldersumerveld) (183a). OV: Ommen (Archem) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (121), Arnhem (13a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: (121), Amersfoort (69n). NH: (7), Amsterdam (13a), Texel (136). ZH: (7, 121), Delft (13a), Leiden (13a), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 121), Middelburg (13a), Vlissingen (13a). NB: (121), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Moergestel (182s¹), Oirschot (13a), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (Oorschotse Heide) (215f), Tilburg (13a), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: (7, 121), Brunssum (44), Griendtsveen (Griendtsveense Peel) (147f), Maastricht (13a), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

- *Epeira alsine*; Van Hasselt 1886b: 58; 1887a: xxxii; 1890b: 202. Becker 1896a: 23. Bouwman 1916: 246.
- *Epeira bohemica*; Van Hasselt 1886b: 59.
- *Araneus alsine*; Chrysanthus 1951e: 62; 1951g: 99. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Tutelaers 2005: 19, 20; 2017: 278. Roelofs-Ditters 2007: 23.

OV: Enschede (42). GL: Nijmegen (121), Winterswijk (13a, 123, 129). UT: De Bilt (21). ZH: Loosduinen (121). NB: Breda (121), Hapert (230m), Heeze (230m), Helenaveen (42), 's-Hertogenbosch (De Geelders), Leende (230m), Moorsel (230m), Oirschot (121), Soerendonk (230m), Vught (Vughtsche Heide) (215f). LI: Brunssum (42, 44), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Araneus angulatus Clerck, 1757

- *Epeira angulata*; Becker 1879a: xlvi; 1896a: 13. Van Hasselt 1886b: 60; 1890b: 202; 1891: xli; 1898: 62.
- *Araneus angulatus*; Bennet et al. 1825: 471. Chrysanthus 1951g: 99. Spoek 1999: 3. Van Helsdingen et al. 2013: 25. Tutelaers 2007: 4-6; 2017: 278. Vogels 2019: 28.

NL: (15c). DR: Emmen (Oeversebosje) (225c). GL: (13a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (129), Groesbeek (130), Nunspeet (136). NH: (7). ZH: (7). NB: (7), Bergeijk (De Maaij) (230o), Eindhoven (begraafplaats Stratum, Eikenburg) (230o), Geldrop (230o), Geldrop (Strabrechtse Heide) (230o), Heeze (Van Tuijlhoeve) (230o), Oirschot (13a), Oirschot (De Mortelen) (230v, 236c), Tilburg (13a), Valkenswaard (Valkenhorst) (230o), Weert (Wijffelterbroek) (230o). LI: (7), Brunssum (44), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Maastricht (13a).

Araneus diadematus Clerck, 1757

- *Araneus diadematus*; Bennet et al. 1825: 469. Pinkhof 1924: 95; 1941: 226. Van der Hammen 1949: 71. Chrysanthus 1951g: 99; 1957a: 44. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Benno 1969: 75. Klomp 1973: 330. Van Helsdingen 1976: 39; 1981a: 38; 1999b: 10; 2019b: 36. Vermeulen et al. 1980: 157. Buizer 1982: 73. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Poot et al. 1989: 6. Kessler 1993: 6. Koomen 1993: xxxiii; 1996: 171, 218; 1998a: xxv; 1998b: 225; 2010: 210. Koomen et al. 2005: 88. Siepel et al. 1996: 46, 53. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Fokkema 1996: 16; 2000: 2077. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 15; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2002: 119. Decae 2001b: 48. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2010: 26. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 15. Lambregts et al. 2013: 17. Colijn et al. 2017: 14. Bloem et al. 2021: 38. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 183, 183, 341.
- *Epeira diademata*; Six 1858b: 292. Snellen van Vollenhoven 1859: 48; 1868: 48. Van Hasselt 1877: xxvi; 1886b: 58; 1886c: 103. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 19. Tiddo-Folmer 1896: 152. Bouwman 1916: 246; 1935: 80. Waage 1938: 181. Prinsen 2005: 114. Bink 2016: 3.

NL: (7, 13a, 15c, 22, 121, 224a, 224b, 230a). GR: Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: (75t), Schiermonnikoog (160a, 174d, 232 m), Bolsward (121), Damwoude (75u), Drachten (75v), Oranjewoud (121). DR: Diever (160b), Dwingeloo (160b), Emmen (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen

(Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Havelte (160b), Havelte (Havelterberg) (230i), Klazienaveen (160b), Meppel (160b), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zwartemeer (160b). OV: Ommen (Archem) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (191a), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Babberich (16a), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Almere (218b), Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m). UT: (220), Amersfoort (69n), De Bilt (21), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (206c, 206f), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaanstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (Blijdorp) (16 I), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg ? (107). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p), Tilburg (Kaaistoep-dal Oude Ley) (215f), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Brunssum (44), Gronsveld (44), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Jabeek (193b), Maastricht (44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Araneus marmoreus Clerck, 1757

- *Epeira pyramidata*; Six 1858b: 292. Snellen van Vollenhoven 1859: 50; 1868: 50. Tiddo-Folmer 1896: 152.
- *Epeira marmorea*; Becker 1879a: xlvi; 1896a: 21. Van Hasselt 1886b: 58. Waage 1938: 181.
- *Epeira marmorea pyramidata*; Becker 1879a: xlvi. Waage 1938: 181.
- *Epeira scalaris*; Van Hasselt 1886b: 59; 1890b: 195. Van Helsdingen 1981a: 38.
- *Araneus marmoreus*; Chrysanthus 1951g: 99; 1953a: 212. Van Helsdingen 1981a: 38. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Spoek 1997b: 8; 2005: 26. Tutelaers 2006: 17; 2017 278. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van 't Veer et al. 2012: 15. Wielink et al. 2020: 341.
- *Araneus marmoreus pyramidatus*; Chrysanthus 1951g: 99; 1953a: 212. Coolen 1994: 36.

NL: (224a, 224b, 230a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Almelo (121), Enschede (47). UT: (7, 13a), Harmelen (121), Utrecht (220), Vleuten (121). NH: (7), Amsterdam (121), Ankeveen (47), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: (7), Delft (121), 's-Gravenhage (13a), Wassenaar (121). ZE: (7), Walcheren (121). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (De Geelders, De Scheeken) (230v), Tilburg (47, 47), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Brunssum (44), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Maasbree (Dubbroek) (70a), Maastricht (121), Sint Pietersberg (240), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Araneus quadratus Clerck, 1757

- *Epeira quadrata*; Six 1863: 125. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 25. Van Hasselt 1886b: 62.
- *Araneus quadratus*; Chrysanthus 1951g: 99. Van Heerdt et al. 1960: 235. Meijer 1973b: 28. Van Helsdingen 1976: 39; 1981a: 38. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii; 2015: 158. Spoek 1997b: 8; 2005: 26. Tutelaers 2000: 20; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28; 2017: 278. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van Helsdingen et al. 2010: 16; 2013: 25. Noordijk et al. 2011: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Feenstra 2016: 14. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 185, 341.

GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Hildenberg, Terschelling (137). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (Havelterberg) (230i), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersumerveld) (183a). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (121), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: (7, 13a, 121), Amersfoort (69n), Driebergen (222b). ZH: 's-Gravenhage (13a). NB: (7, 121), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (13a), Tilburg (Kaaistoep) (71p), Tilburg (Kaaistoep-dal Donge) (215f), Tilburg (Kaaistoep-dal Oude Ley) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Venray (Casterayse vennen) (75d). LI: (7, 121), Brunssum (44), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Maastricht (13a), Sittard (13a), Roerdalen (Holst) (150s), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Araneus sturmii (Hahn, 1831)

Atea sturmii (Hahn, 1831)

- Atea agalena*; Six 1858b: 292. Van Hasselt 1877: xxvii.
- Epeira agalena*; Van Hasselt 1886b: 60; 1898: 55, 63.
- Araneus sturmii*; Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1961: 3. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1976: 39.
- Atea sturmii*; Bosmans 1988: 32. Koomen et al. 1997: xxxvii. Koomen 1998b: 225; 2015: 158. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2005: 114.
- Araneus sturmii*; Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 23. Noordijk et al. 2011: 17. Van Helsdingen et al. 2013: 25. Colijn et al. 2017: 14. Van Helsdingen 2019b: 36.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Terschelling (West-Terschelling) (182v). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), Lievinge (160b). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (121), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (136, 181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Kekerdom (Millingerwaard) (215f), Nijkerk (136), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: (121, 220), Amersfoort (69n). ZH: (121), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Domburg (107). NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Gorp en Rovert (211m), 's-Hertogenbosch (De Mortellen, De Scheeken), Sint Michielsgestel (215f), Udenhout (De Brand) (182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44), Geleen (Danekeberg) (44), Roerdalen (Hoosden) (150s).

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775)

Atea triguttata (Fabricius, 1757)

- Epeira triguttata*; Becker 1879a: xlivi; 1896a: 28. Van Hasselt 1886a: xxxvi; 1886b: 61; 1898: 55.
- Araneus triguttatus*; Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1961: 3. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Prinsen et al. 2006: 88. Tutelaers 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van Helsdingen et al. 2012: 26. Bink 2019: 7. Van Helsdingen 2019b: 36.
- Atea triguttata*; Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi. Spoek 1997b: 8. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www). Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 341.

DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: (7), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Amerongen (121), Arnhem (13a), Nijmegen (13a). UT: (7), Utrecht (13a). NH: (7), Valkeveen (120, 121). ZH: (7), Barendrecht (import) (16 i), 's-Gravenhage (13a), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel/Casteren (Grijze Steen) (211m), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Oirschot (De Mortelen) (236c), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 215f, 250d). LI: Roermond (50), Sittard (13a), Valkenburg (136), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Araneus cucurbitinus Clerck, 1757

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

- Araneus cucurbitinus*; Bennet et al. 1825: 470.
- Miranda cucurbitinus*; Six 1858b: 292. Van Hasselt 1870b: 30; 1872b: xxxiii; 1873a: xxvii; 1877: xxvi.
- Epeira cucurbitinus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 48; 1868: 48.1886b: 57. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 27.
- Araneus cucurbitinus*; Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1951g: 99; 1955f: 301; 1956: 139. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1974: 172; 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2. Fokkema 1978: 100. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1996: 218. *Araniella cucurbitina*; Bosmans 1988: 32. Koomen 1993: xxxiv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 2001: xxxix; 2004: 207. Spoek 1997b: 8. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2002: 119; 2005: 114; 2007: 141. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 23. Prinsen et al. 2009: 191. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 26; 2013: 25; 2015a: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2011: 20. Van 't Veer et al. 2012: 15. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Franken et al. 2018: 46. Vogels 2019: 29. Van Helsdingen 2019b: 36. Wielink et al. 2020: 185, 341.

NL: (7, 13a, 15c, 60, 121, 224a, 224b). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (160a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (75n). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (182f). OV: Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n), Molencate (91), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Dronten (Harderbos) (182m), Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (69n), Utrecht (220). NH: Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Schoorl (Schoorlse Duinen) (75w2), Velsen (100), Zaanstad (Guisveld, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg (107). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Breda (96), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-dal Oude Ley) (215f), Udenhout (De Brand) (182h), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44), Cadier en Keer (193b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Holst, Hoosden, Herkenbosch (De Muitert)) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Araniella displicata (Hentz, 1847)

Araneus displicatus (Hentz, 1847)

- *Araneus displicatus*; De Jong 1947: 511; 1949b: 215. Hulsebos 1959: 254. Klomp et al. 1973: 330. Koomen 1998a: xxxv. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2017: 278. Roelofs-Ditters 2007: 23.

FR: Schiermonnikoog (160a). OV: Ommen (Eerde) (182i). GL: Arnhem (181a), Bennekom (169e), Hoge Veluwe (169e). UT: Den Dolder (169e). NH: Bergen (169b). NB: Cranendonck (230e), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f).

Araniella inconspicua (Simon, 1874)

Araneus inconspicuus (Simon, 1874)

- *Araniella inconspicua*; Koomen et al. 1996: xxvi. Noordijk et al. 2011: 17. Bink 2016: 3.

OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u). ZH: Papendrecht (import) (16h).

Araniella opistographa (Kulczynski, 1905)

Araneus opistographus Kulczynski, 1905

- *Araneus cucurbitinus opistographus*; Chrysanthus 1955c: 16; 1955f: 301. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3.
- *Araneus opistographus*; Van Helsdingen 1984: 2. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1996: 218. Wielink et al. 2020: 341.
- *Araniella opistographa*; Van Helsdingen 1987: 187; 1999a: 6; 1999b: 10; 2019b: 36. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xix; 1993: xxxiii; 1994: xxxii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2010: 210; 2015: 158. Koomen et al. 1996: xxvi; 2001: xxxix; 2004: 207; 2005: 88. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Kessler 2004: 8. Tutelaers 2006: 17; 2017: 278. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2011: 20. Van Helsdingen et al. 2012: 26; 2013: 25; 2015a: 4. Bink 2016: 3. Franken et al. 2018: 46.

GR: Leens (182k), Vlagtwedde (Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: Schiermonnikoog (160a), Fochteloërvéen (148e). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160b), Orvelte (211k), Westerbork (182f), Westerveld (Boschoord, Doldersumerveld, Vledder Aa, Wapserveld) (183a). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Eerde) (182i), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n),

Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Zeewolde (Winkelse Zand) (182m). NH: Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Biezenmortel (215f), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (Empel-Pottenbakker) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Wellerlooi (55).

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

- *Argiope bruennichi*; Felix 1986: 145.
- *Argiope bruennichi*; Van Helsdingen 1982: 122; 2002a: 11. 2003c: 9; 2009d: 29; 2019b: 36. Koster 1985: 197. Petit 1987: 100. Peeters et al. 1987a: 14; 1987b: 114. De Graaf 1988: 2. Jansen et al. 1991: 214. Jansen et al. 1994: 26. Lejeune et al. 1996: 64; 1997: 46. Van der Linden 2000: 47-49; 2002: 87; 2004: 27-30. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2003: 4, 6; 2017: 278. Kooistra-Vroegop 2002: 20. Anonymus 2003: 22. Prinsen 2005: 114. Anonymus 2005: 14. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 23. Noordijk et al. 2009a: 71. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van Helsdingen et al. 2010: 16; 2012: 26. Cuppen 2010: 192. Koomen 2010: 210. Colijn 2011: 83. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 184, 341.

NL: (189a, 189b, 189c: kaartjes; 202p: wegbermen). GR: Rottumerplaat (149m), Sellingen (Zwartveen) (148m, 189c). FR: Olterterp (148m, 189c). DR: Echten (148m, 189c). OV: Colmschate (189c), De Lutte (189c), Denekamp (189c), Sint Jansklooster (189c), Weerselo (189c). GL: Angeren (189c), Apeldoorn (189a), Bemmel (189c), Beneden-Leeuwen (189c), Bennekom (Bennekomse Meent) (148m), Beuningen (189c), Epe (189c), Doetinchem (189c), Epe (Vossenbroek) (148m), Groesbeek (189a), Hall (189c), Hierden (189c), Hoog-Buurlo (148m), Kootwijk (189c), Kootwijk (Radio Kootwijk) (148m), Lichtenvoorde (Mariënvelde) (148m, 189c), Lievelede (189c), Millingen (189a), Miste (189c), Nijmegen (189a, 189c), Planken Wambuis (189a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Velp (189c), Staverden (Leemputten) (181d, 183n), Tongeren (189c), Wageningen (189c), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i), Zevenaar (Rijnstrangen gebied) (148m, 189c). FL: Dronten (Harderbos) (70c, 182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (69m). UT: Amerongen (189c), Amersfoort (69n), Elst (189c), Rhenen (Laarsenberg) (189a), Soesterberg (189c). NH: Bussummerheide (189c), Hoofddorp (189c), Kennemerduinen (4n, 189c), Santpoort (Duin en Kruidberg) (189c), Zaandstad (Noordzeekanaal (Buitenhuijsen), polder Westzaan en West-Knollendam, Heemtuin Zaandam) (232b). ZH: Goedereede (Kwade Hoek) (189c), Krimpenerwaard (o.a. Berkenwoude) (4p), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Verdrunken land van Saeftinghe (189c). NB: Baarle-Nassau (189c), Best (De Scheeken) (230v), Breda (189c), Cranendonck (230e, 230k), Deurnese Peel (189a), Dintelse Gorzen (189c), Eindhoven (189c), Grave (189c), Grote Peel (189a), Heeze (Strabrechtse Heide) (189a), Hoogerheide (189c), Kasteren (De Geelders) (230v), Nistelrode (189a), Reusel (189a), Sprundel (189c), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Regte heide) (189a), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Wouw (189c). LI: (204s, 204t, kaartjes), Eijsden (183m, 189a, 204s), Eijsder Beemden (188b), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (215f), Houthem (204s), Leudal (189a), Maastricht (Kleine Weerd) (188c), Maastricht (St. Pietersberg) (75z, 166, 204s), Margraten (75f, 204s), idem (Bemelerberg) (166), Swalmdal (De Hout) (166, 168b, 189a), Vlodrop (Meinweg) (75z, 150r, 166, 189a), Waterop bij Gulpen (75f, 147h, 189a, 204s, 205b), Weert (Ravenvennen) (189a).

Cercidia prominens (Westring, 1851)

- *Cercidia prominens*; Becker 1879a: xlivi; 1896a: 50. Van Hasselt 1885a: xxix; 1886b: 56. Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 49. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1999a: 6; 1999b: 10; 2019b: 36. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxiii. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 8; 2005: 26. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2003: 6; 2017: 278. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 25; 2003b: 910. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 18. Prinsen et al. 2009: 191. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Lambregts et al. 2013: 17. Wielink et al. 2020: 341.

FR: Fochteloërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Saasveld (Molenvelden) (70d, 147a). GL: (7, 121), Arnhem (13a), 's-Heerenberg (13a), Lochem/Klein Dochteren (211n), Nijmegen (13a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m). UT: (7, 121), Utrecht (13a). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (121), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (Liesbos) (117), Cranendonck (230e, 230k), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: (7, 121), Brunssum (44), Maastricht (13a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

- *Singa conica*; Six 1858b: 293; 1863: 125. Snellen van Vollenhoven 1859: 51; 1868: 51.
- *Epeira conica*; Van Hasselt 1876b: lii.
- *Cyclosa conica*; Van Hasselt 1886b: 54; 1887a: xxxii. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 9. Chrysanthus 1954b: 40. Hulsebos 1961: 3. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1974: 172. Van Helsdingen 1976: 39; 2019b: 36. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Poot et al. 1989: 6. Koomen 1993: xxxiii; 1998a: xxxv. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaars 2000: 20; 2001e (www); 2017: 278. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Noordijk et al. 2011: 17. IJland et al. 2011: 20. Van Helsdingen et al. 2013: 25. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (224a, 224b). FR: Terschelling (Formerum) (182v). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f). OV: Ommen (Eerde) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese) (197). GL: (7), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Arnhem (13a, 181a), Nijmegen (13a), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (123). UT: (7, 121), Amersfoort (69n), De Bilt (220), Driebergen (220, 222b), Maartensdijk (13a). NH: (7, 121), Amsterdam (13a), Haarlem (13a), Hilversum (103), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7, 121), Delft (13a), Dordrecht (13a), 's-Gravenhage (13a), Leiden (13a), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (13a), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 121), Domburg (13a), Middelburg (13a), Vlissingen (13a). NB: (7, 121), Best (De Scheeken) (230v), Breda (13a), Cranendonck (230e), 's-Hertogenbosch (13a), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (13a), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (13a), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Arcen (52), Maasdorp (Linnerheide) (150s), Maastricht (13a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Sittard (13a), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)

- *Cyclosa oculata*; Peeters 1984a: 181.

L: Beesel (204a).

Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758)

- *Gasteracantha cancriformis*; IJland 2023: 21.

NH: Aalsmeer of Kudelstaart (import, in kas) (164f).

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

Araneus bituberculatus (Walckenaer, 1802)

- *Epeira dromedaria*; Six 1860: 21; 1863: 125. Van Hasselt 1886b: 60; 1889b: xxviii; 1892: xxviii. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 15.
- *Araneus bituberculatus*; Vossen 1985b: 8; 1985c: 215.
- *Gibbaranea bituberculata*; Tutelaars 2003: 6; 2017: 278. Van Helsdingen et al. 2012: 26. Vogels 2019: 29.

OV: De Lutte (131). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (127). UT: (7, 121), Driebergen (222a, 222b), Maartensdijk (13a). NH: Amsterdam (13a), Haarlem (13a). ZH: (121), Dordrecht (13a), 's-Gravenhage (13a), Leiden (13a). NB: (7, 121), Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230k), Oirschot (13a), Tilburg (13a). LI: (7, 121), Maastricht (13a), Roerdalen (Meinweg) (236c), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)

Araneus gibbosus (Walckenaer, 1802)

- Epeira bicornis*; Six 1858b: 292; 1858c: 20. Tiddo-Folmer 1896: 152.
- Epeira gibbosa*; Becker 1879a: xlvi; 1896a: 17.
- Epeira arbustorum*; Van Hasselt 1876b: lii; 1886b: 60.
- Araneus gibbosus*; Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1962: 234. Klomp et al. 1973: 330.
- Gibbaranea gibbosa*; Bosmans 1988: 32. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 158. Koomen et al. 1996: xxvi; 2001: xl. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 88. Kessler 2004: 8. Roelofs-Ditters 2007: 23. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Noordijk et al. 2011: 17. IJland et al. 2011: 20. Van Helsdingen et al. 2012: 26. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Franken et al. 2018: 46. Vogels 2019: 28. Van Helsdingen 2019b: 36; 2019c 47. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (230a). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: (121), Dwingeloo (160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Orvelte (211k), Westerbork (182f), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Arnhem (181a), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: (7, 121), Amersfoort (69n), Driebergen (221), Maartensdijk (13a), Utrecht (220). NH: (7, 121), Bergen aan Zee (Zuider achterevelde) (75w2), Egmond (182w), Hilversum (103), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7, 121), 's-Gravenhage (13a), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (121). NB: (121), Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250c, 250d), Tilburg (Kaaistoep-dal Oude Ley) (215f), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Veldhoven (Halfmijl) (236c), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44), Geleen (Danekeberg) (44), Gronsveld (44), Schinveld (Breukberg) (164n).

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)

- Gibbaranea ullrichi*; Van Helsdingen 2010b: 22; 2010c: 7.

GL: Kootwijk (149o, p).

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)

- Singa albovittata*; Van Hasselt 1876b: lii; 1886b: 55. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 46. De Bruyn 1996: 45.
- Hypsosinga albovittata*; Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2008: 28. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 22, 25, 57; 2003b: 910. Koomen et al. 2005: 88. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 9, 12. Roelofs-Ditters 2007: 23. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van Helsdingen 2019b: 36..

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: (7), Utrecht (13a). NH: (7), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Hilversum (103, 121), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7), duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (121), Scheveningen (121), Wassenaar (121), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p).

Hypsosinga heri (Hahn, 1831)

- Epeira heri*; Six 1858a: 168.
- Singa nigrifrons*; Six 1858b: 293.
- Singa heri*; Van Hasselt 1890b: 191; 1898: 55.
- Hypsosinga heri*; Koomen 1994: xxxiii; 1996: 218. Van Helsdingen 1999b: 10. Tutelaers 2006: 17.

GL: Winterswijk (182g). UT: De Bilt (219, 220), Driebergen (220). NH: Zwanenwater (148f). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Udenhout (De Brand) (182h). LI: Venlo (136), Roermond (129).

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

- *Singa trifasciata*; Six 1858b: 293.
- *Singa pygmaea*; Becker 1879a: xlvi; 1896a: 47. Van Hasselt 1886b: 54; 1898: 54.
- *Hypsosinga pygmaea*; Van Helsdingen 1976: 36. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. IJland et al. 2011: 20. Van Helsdingen et al. 2012: 26. Lambregts et al. 2013: 17.

GL: (121), Angerlo (136), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a). UT: (7, 121), De Bilt (220), Driebergen (220), Utrecht (13a). ZE: (7, 121). NB: (121), Bladel (187a), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)

- *Singa sanguinea*; Van Hasselt 1886b: 55.
- *Hypsosinga sanguinea*; Chrysanthus 1951g: 99. Koomen 1986: 202; 1991: xix; 1993: xxxiii. Bosmans 1988: 32. IJland et al. 2011: 20. Van Helsdingen et al. 2012: 26.

DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f). OV: Haaksbergen (182d). UT: De Bilt (121). NB: Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Eysden (44), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Schinveld (Breukberg) (164n).

Larinioides cornutus (Clerck, 1757)

Araneus cornutus Clerck, 1757

- *Epeira arundinacea*; Six 1858b: 292. Snellen van Vollenhoven 1859: 50; 1868: 50. Van Hasselt 1862: 18; 1879b: xxiv.
- *Epeira cornuta*; Van Hasselt 1886b: 61. Becker 1879a:xlvi; 1896a: 35. Bouwman 1935: 85.
- *Aranea foliata*; Feekes 1936: 224. Pinkhof 1941: 227.
- *Araneus cornutus*; Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos; 1959:254. Van Heerdt et al. 1960: 235. Meijer 1973b: 28; 1974: 172; 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1981a: 38; 1984: 2; 1987: 187. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Siepel et al. 1996: 49, 52, 53. Koomen 1996: 218. Ma et al. 1997: 76.
- *Larinioides cornutus*; Koomen 1991: xix; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2010: 210 ; 2015: 158. Koomen et al. 1993a: 572; 1995: xxx; 1997: xxvii; 2004: 207; 2005: 88. Spoek 1997b: 8. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Van Helsdingen 1999a: 6; 1999b: 10; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 36. Tutelaers 2000: 20; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Prinsen 2002: 119. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 23. Lambeets 2008: 14. Wielink et al. 2009: 221. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 26, 28; 2013: 25; 2015a: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2010: 26. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 15. Franken et al. 2016: 177. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (7, 13a, 88, 121, 224a, 224b). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg) (183a), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (137), idem (Formerum) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Anloo/Andersen/Elsbroek (Scheebroekerloop) (211k), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (Havelterberg) (230i), Ruinen (Dwingelderveld) (182f), Vries (De Punt) (211k), Westerveld (Boschoord, Doldersumerveld) (183a), Wijster (IJsbaan) (211k). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Eerde) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Bronckhorst/Baak (waard) (211n), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w11), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m), Zeewolde (Winkelse

Zand) (182m). UT: (220), Amersfoort (69n), Kromme Rijn en Eem (22), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (206f), Kortenhoefse Plassen (147j), Wieringermeer-polder (75c), Texel (Mokbaai) (182y), Texel (Den Hoorn) (182y), Zaanstad (Zaandam, Westzaan) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Helvoirt (182s¹), Kasteren (De Geelders) (230v), Moergestel (Helsbroek) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Brunssum (44), Gronsveld (44), Gulpen (Waterop) (147o), Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Heerlen (202c), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Illikhoven (Visserweert) (186c), Mook (109), Reuver (193b), Rijckholt (44), Roerdalen (Hoosden) (150s), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (44), idem (Kruisberg) (182e).

Larinoides ixobolus (Thorell, 1873)

Larinoides ixobolus; Roelofs-Ditters 2001: 3; 2007: 23.

GL: Beek-Ubbergen (215d, 215f).

Larinoides patagiatus (Clerck, 1757)

Araneus patagiatus Clerck, 1757

- Epeira patagiata*; Six 1858b: 292. Van Hasselt 1886b: 61; 1890b: 210. Becker 1879a: xlili; 1896a: 37. Tiddo-Folmer 1896: 152 (*Epeira p.*).
- Epeira patagiata* var. *nauseola*; Van Hasselt 1876b: lii; 1879b: xxiv; 1886a: xxxvi.
- Araneus ocellatus*; Chrysanthus 1955c: 16.
- Araneus patagiatus*; Hulsenbos 1961: 3. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2.
- Larinoides patagiatus*; Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xix; 1993: xxxiii; 2000: xxxviii; 2010: 210. Koomen et al. 1995: xxx. Van Helsdingen 2002b: 11. Tutelaers 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 23. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Cuppen 2010: 192. Vogels 2019: 28. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (7, 13a, 121, 230a). DR: Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Ruinen (182f). OV: Haaksbergen (182d). GL: Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Millingen aan de Rijn (Millingerwaard) (236c). FL: Dronten (Harderbos) (70c, 182m). UT: De Bilt (220). NH: Hilversum (103), Kortenhoefse Plassen (147j), Valkeveen (120). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r, 182t), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Mook (109), Thorn (Koningssteen) (182m), Wellerloo (55).

Larinoides sericatus (Clerck, 1757)

Araneus sericatus Clerck, 1757

- Epeira sclopetaria*; Six 1863: 125. Becker 1879a: xlili; 1896a: 33. Van Hasselt 1886b: 62; 1886c: 103. Hulsenbos 1961: 3.
- Aranea undata*; Pinkhof 1941: 227.
- Araneus sericatus*; Van der Hammen 1949a: 79. Chrysanthus 1953d: 88. Van Heerdt et al. 1967: 112. Ma et al. 1997: 76.
- Larinoides sericatus*; Koomen 1999: xxv; 2000: xxxviii; 2010: 210. Van Helsdingen 2003d: 22; 2019b: 36. Kessler 2004: 8. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341.
- Larinoides sclopetarius*; Faber et al. 2001: 46. Decae 1997b: 47. Tutelaers 2006: 17.

NL: (7, 13a, 121). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k). FR: Terschelling (138), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Zeewolde (Winkelse Zand) (182m). UT: Amersfoort (69n), Driebergen (222b). NH: Amsterdam (206f) (in kas) (81), Zaanstad (Guisveld, Reef, Westzijderveld, Zaandam, Wormerveer), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Leiden (in kas) (81), Rotterdam (71d), Schiedam (in kas) (81), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Eindhoven

(Urkhoense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-dal Oude Ley) (215f). LI: Hunsel (182m), Roermond (50), Roggel & Neer en Haelen (Leubekendal) (182m).

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

- Zilla acalypha*; Six 1858b: 293. Van Hasselt 1873a: xxvi.
- Epeira acalypha*; Van Hasselt 1886b: 62. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 46.
- Mangora acalypha*; Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 49. Hulsebos 1961: 3. Klomp et al. 1973: 334. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1987: 187; 2019b: 36. Tutelaers 1978: 88; 2000: 20; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 17; 2017: 278. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xix; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 2001: xl; 2004: 207. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Prinsen 2005: 114; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Noordijk et al. 2011: 17. IJland et al. 2011: 20. Van Helsdingen et al. 2012: 26; 2013: 25; 2015a: 4. Krediet, 2015b: 9. Colijn et al. 2017: 14. Franken et al. 2018: 46. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (13a). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg, 't Groote Veen) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Diever (160b), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Springendaal) (182x), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: (7, 121), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: (7, 121), Amersfoort (69n), Rijnsenburg (220). NH: Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2), Velsen (100). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 121). NB: (7, 121), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e, 230k), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg) (230d). LI: (7, 121), Brunssum (44), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Eys (De Piepert) (183r), Gulpen (Waterop) (147o), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Roerdalen (Hoosden, Herkenbosch (De Muiter)) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Araneus adiantus (Walckenaer, 1802)

- Epeira adianta*; Van Hasselt 1884a: xxiii; 1886b: 57; 1887a: xxxii; 1898: 55. Becker 1896a: 39.
- Araneus adiantus*; Chrysanthus 1954b: 40. Van Heerdt et al. 1960: 235. Hulsebos 1962: 234. Meijer 1973b: 28. Van Helsdingen 1976: 39. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215.
- Neoscona adianta*; Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 2005: 88. Spoek 1997b: 8. Van Helsdingen 1999a: 7; 1999b: 10; 2019b: 36. Tutelaers 2001e (www); 2003: 4, 6; 2017 278. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van Helsdingen et al. 2012: 26, 28. Colijn et al. 2017: 14.

FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Terschelling (137), Fochteloërvéen (148e). DR: Dwingeloo (160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Smilde (114, 121), Westerbork (182f), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Almelo (121). GL: Apeldoorn (136), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nijmegen (121), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (123, 182g). UT: Amersfoort (69n). NH: Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (De Cocksdrorp, De Slufter) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Scheveningen (121, 13a), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Walcheren (121). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230k), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f). LI: Belfeld (193b), Lerop (52), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

Araneus umbraticus Clerck, 1757

- *Epeira umbratica*; Six 1858b: 292. Becker 1879a: xlvi; 1896a: 32. Van Hasselt 1886b: 62; 1886c: 103. Tiddo-Folmer 1896: 152.
- *Aranea sexpunctata*; Kluyver 1933: 136. Pinkhof 1941: 227.
- *Araneus umbraticus*; Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Van der Hammen 1969: 27. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 6. Ma et al. 1997: 76.
- *Nuctenea umbratica*; Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1999: xxxv; 2015: 158. Koomen et al. 1993b: 217; 1995: xxx; 1997: xxvii; 2001: xl. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 17; 2017: 278. Noordijk et al. 2001: 24. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Van Helsdingen 2003d: 22; 2019b: 36. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 26; 2013: 25. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al. 2017: 14. Bloem et al. 2021: 38. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (7, 13a, 121, 230a). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k), Vlagtwedde (Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Hoorn) (182v), Bolsward (122), Oranjewoud (122), Sneek (202m). DR: Dwingeloo (160b), Meppel (160b), Ruinen (182f), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Vries (De Punt) (211k), Westerveld (Boschoord) (183a). OV: Hengelo (202m), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Vorden (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wageningen (182), Winterswijk (182g), Zwartebroek (202m), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (220), Amersfoort (69n), Utrecht (in kas) (85), Baarn (in kas) (85). NH: Amsterdam (206f), Castricum (182w), Zaandam (232b). ZH: Delft (202m), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Wassenaar (182s²); Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e, 230k), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Moergestel (182s¹), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d). LI: Brunssum (44), Jabeek (193b), Herkenboch (Meinweg) (150r), Maastricht (44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Rijckholt (44), Roerdalen (Holst) (150s), Swalmen (193b), Wahlwiller (44).

Singa hamata (Clerck, 1757)

- *Singa hamata*; Becker 1879a: xlvi; 1896a: 44. Van Hasselt 1886b: 54; 1891: xli. Chrysanthus 1953d: 88. Koomen 1991: xix; 1994: xxxiii. Roelofs-Ditters 2007: 23.

DR: Grollo (Grolloerveen) (215f). OV: (121), Haaksbergen (182d). GL: Groesbeek (130), Winterswijk (182g). UT: (7, 121), Maartensdijk (13a). NB: (121). LI: (7, 121), Grevenbicht (50), Maastricht (13a), Sittard (13a).

Singa nitidula C.L. Koch, 1844

- *Singa nitidula*; Becker 1896a: 45. Ma et al. 1997: 76. Van Helsdingen et al. 2013: 25.

GL: uiterwaarden Waal (191a). UT: Utrecht (13a). LI: Roerdalen (Hoosden) (150s).

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

- *Epeira diodia*; Van Hasselt 1886b: 58; 1890b: 202. Becker 1896a: 42.
- *Zilla diodia*; Chrysanthus 1951g: 99. Van Helsdingen 1984: 2; 1987: 187; 2019b: 47. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1991: xix; 1992: xxvii; 1998a: xxxv; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 2004: 207. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2006: 17; 2017 278. Prinsen 2005: 114; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 23. Prinsen et al. 2009: 191. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2015a: 5; 2019: 36. IJland et al. 2011: 21. Colijn et al. 2017: 14. Noordam 2024: 24.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a). DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Eerde) (182i), Tubbergen (Springendaal) (182x). GL: Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (69n), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Kortenhoefse

Plassen (147j). ZH: Wassenaar (121), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (121), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Gorp en Rovert (211m), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f). LI: Brunssum (44), Gulpen (Waterop) (147o), Jabeek (193b), Maastricht (13a), Schinveld (Breukberg) (164n), Vaals (182e), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)

- Eucharia atrica*; Six 1858b: 294.
- Zilla atrica*; Becker 1879a: xlivi; 1896a: 52. Van Hasselt 1886b: 56. Mac Gillavry 1914: 91 (*Zilia* (!) *atrica*). Heselhaus 1915: 273. Van der Boorn 1939: 85.
- Zygiella atrica*; Hulsebos 1959: 259; 1962: 234. Van Helsdingen 1976: 39; 2019b: 36. Vermeulen et al. 1980: 155. Kessler 1993: 6. De Bruyn 1996: 46. Kessler 2004: 7. Spoek 2005: 26. Roelofs-Ditters 2007: 23. Prinsen et al. 2009: 191. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van 't Veer et al. 2012: 15. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (121). FR: Schiermonnikoog (160a, 174d, 232 m), Terschelling (192a). DR: Dwingeloo (160c), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n). UT: (7, 220), Utrecht (13). NH: Amsterdam (17p), Zaandstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f). LI: (7), Maastricht (13a), Valkenburg (in nestkast) (151c).

Zygiella x-notata (Clerck, 1757)

- Zilla calophila*; Van Hasselt 1870b: 30.
- Zilla x-notata*; Van Hasselt 1886b: 56; 1886c: 103. Becker 1879a: xlivi; 1896a: 54.
- Zilla litterata*; Pinkhof 1935: 176; 1941: 226. Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. *Zygiella x-notata*; Van der Hammen 1949a: 80. Meijer 1973b: 28. Vossen 1983: 236. Meijer 1985: 136. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. Van 't Veer et al. 2012: 15. Van Helsdingen et al. 2013: 25. Bink 2014b: 13. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341.
- Zygiella calophylla*; Chrysanthus 1954b: 40. Noordijk et al. 2001: 25. Van Helsdingen 2019b: 36.

NL: (7, 13a, 121). GR: Scheemda (202m). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Drachten (202m), Oranjewoud (122), Sneek (202m). DR: Dwingeloo (160b), Klazienaveen (160b), Meppel (160b), Zwartemeer (160b). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Deventer (202m), Harderwijk (202m), 's Heerenberg (202m), Molencate (91). UT: Amersfoort (69n), Baarn (in kas) (81). NH: Amsterdam (202m, 206e, 206f), Zaandam (202m), Zaandstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Delft (202m), Gouda (202m), Rotterdam (in kas) (81), Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Stellendam (202m), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg (202m), Oude Tonge (202m). NB: Beek-Ubbergen (215f), Cranendonck (230e), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Brunssum (44), Echt (in grot) (239b), Jabeek (193b), Maastricht (44), Rijckholt (44), Roerdalen (Holst) (150s), Wellerloo (52).

ATYPIDAE

Atypus affinis Eichwald, 1830

- Atypus sulzeri*; Van Hasselt 1869: 25; 1872b: xxxiv; 1883a: xxxiv. Honig 1903: 20 (*A. sulrezi*).
- Atypus affinis*; Van Hasselt 1883b: 229; 1885c: 119; 1886c: 103. Pinkhof 1919: 40. Hoogenraad 1928: 204. Chrysanthus 1957a: 44; 1957b: 31. Kleinhout 1963: 165, 167; 1967: 156. Van Helsdingen 1980: 99. Meijer 1984: 26; 1987a: 66. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Van Wezel 1987: 13. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 73. Koomen 1992: xxvi. Koomen et al. 1995: xxix. Tutelaers 2000: 8, 17; 2003: 4, 6; 2008: 27; 2010: 4. Heuts 2003: 8. Prinsen 2005: 111. Noordijk 2005: 29, 33. Roelofs-Ditters

2007: 17. Noordijk et al. 2008a: 83, 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 15, 18; 2010: 16. Dekkers-Scheutjens 2010: 14. IJland et al. 2010: 26. Van Grunsven 2010: 4. Lambregts et al. 2013: 15. □ *Atypus* spec.; Van Kampen 1906: 151. Franken et al. 2016: 177. Wielink et al. 2020: 182, 341.

NL: (61, 113, 147e; 232w: heide hogere gronden). OV: Ommen (Archemerberg) (76b). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn ? (158), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Bronckhorst ('t Klooster) (76b), Ede (Planken Wambuis, Mossel, Mosselsche Veld) (75w1), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Hoenderlo (179, 180a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), 's-Heerenberg (Bergherbosch) (76b), Hoge Veluwe (179, 180a, 244), Nijmegen (119, 206b), Otterlo (179, 180a), Planken Wambuis (230t), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Roosendaal ? (155), Vorden (Grote Veld) (76b). UT: Amersfoort (119, 171, 206b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Soest (119), Zeist (89, 119, 206b), Zeister- en Soesterbos (122). NH: NW deel van het Gooi (206b), Huizen (151w). NB: Bladel (187a), Breda (Mastbos, Ulvenhoutse bos) (96, 119, 206b), Casteren (Cartierheide) (182t, 223), Cranendonck (230e, 230k), Ginneken (112), Hapert (Cartierheide) (215f, 223), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p, 223), Heeze-Leende (Grote Heide) (230t), Heeze-Leende (Heezerven) (230t), Heeze-Leende (Leenderbos) (230t), Oisterwijk ? (206b), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Someren (Lieropse Heide) (230t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Bemelerberg (193d), Maastricht ? (206b), Maastricht (St. Pietersberg) (193a), Sittard ? (62), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Atypus piceus (Sulzer, 1776)

□ *Atypus piceus*; Ausserer 1871: 132. Becker 1879a: xlvi. Van Hasselt 1890b: 182. Oudemans 1903: 72; 1918: 71. Heimans 1906: 25. Bouwman 1915: 244. Van Iersel 1938: 329. Van Helsdingen 1980: 100. Koomen 1986: 202. Meijer 1987a: 66. Krediet, 2015b: 9.
□ *Atypus* spec.; Bouwman 1909: 9.

NL: (6, 13a). GL: Nijmegen ? (203a), Roosendaal ? (203a, 203b). UT: (7), Amersfoort ? (139, 203a), De Bilt ? (prooi van *Pompilus plumbeus* (F.)) (20), Soest ? (203a), Zeist ? (203a). NB: (7), Breda ? (18), Eys (De Piepert) (183r), Goirle ? (164a), Hapert (Cartierheide) (215f). LI: Bemelerberg (193d), Maastricht (129, 193d, 203a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (147e, 182a, 193d).

CHEIRACANTHIIDAE EUTICHURIDAE, MITURGIDAE

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)

□ *Cheiracanthium carnifex*; Six 1858b: 296. Van Hasselt 1885c: 135. Wilcke 1947: 45.
□ *Cheiracanthium erraticum*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 288. De Meijere 1920: 191. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1961: 2. Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 11 (kaart); 1979: 298; 1999a: 6. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1991: xviii; 1993: xxxii; 1994: xxxii; 2015: 158. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Tutelaers 2000: 8; 2001d (www); 2001e (www): 2017: 279. Prinsen 2002: 118; 2005: 112. Heuts 2002: 7. Bonte et al. 2003a: 25; 2003b: 910. Koomen et al., 2004: 206. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 15. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260; 2011: 17. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Colijn et al. 2017: 14. Van Helsdingen 2019b: 36; 2019c: 47.
□ *Cheiracanthium nutrix*; Van Hasselt 1870b: 30; 1872b: xxxiii; 1885c: 135 (alle p. p.).
□ *Cheiracanthium erroneum*; Van Hasselt 1886c: 104 (p. p.).

Onjuiste vermelding: Meijer 1973b: 27 (= *Cheiracanthium virescens*) (zie 147c).

NL: (252). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (147c, 198b), Fochteloeरveen (148e). DR: Balinger en Mantinger Zand (147c), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (147c, 160b), Havelte (Havelterberg) (230i), Oosterhesselen (147c), Uffelte (147c), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: (119), Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Enschede (147c), Haaksbergen (182d), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Barneveld (147c), Ede (147c), Ede (Otterlose Zand) (215m),

Elburg (de Haere) (202a), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Hoge Veluwe (147c), Hoog-Buurlo (Gerritsfles) (147c, 199), Hoog Soeren (147c), Hulshorst (147c), Korenburgerveen (147c), Kotten (147c), Molencate ? (91, 147c), Otterlo (147c), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Staverden (147c), Winterswijk (182g). UT: (7, 119), Amersfoort (69n), Amersfoort (De Treck) (147c), Rijssenburg (147c, 220). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17c), Huizen (Gooise heide) (151v). ZH: ? (119), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: ? (119), Breda ? (96), Cranendonck (147c, 230e), Kasteren (De Geelders) (230v), Oisterwijk (147c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), St. Anthonie (147c), Tilburg (147c), Udenhout (147c), Waalre (147c). LI: Brunssum (44, 147c), Maastricht (13b, 147c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

[*Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864]

- Cheiracanthium mildei*; Bink 2019: 7.

ZH: Barendrecht (import) (16 i).

***Cheiracanthium montanum* L. Koch, 1877**

- Cheiracanthium montanum*; Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Roelofs-Ditters 2011: 14. Van Helsdingen 2019b: 36.

GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215g, 215m). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).

***Cheiracanthium pennyi* O.P.-Cambridge, 1873**

- Cheiracanthium pennyi*; Van Hasselt 1885c: 135; 1886c: 104 (beide p. p.); 1898: 50. Van Helsdingen 1978b: 11 (kaart); 1979: 298.
- Cheiracanthium erroneum*; Van Hasselt 1885c: 135; 1886c: 104 (beide p. p.).

GL: Apeldoorn (136, 147c). ZH: Loosduinen (119, 147c).

? *Cheiracanthium punctorum* (Villers, 1789)

- Cheiracanthium nutrix*; Six 1858b: 296. Snellen van Vollenhoven 1859: 54; 1868: 54.
- Cheiracanthium punctorum*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 285. Van Helsdingen 1978b: 13 (kaart); 1979: 298 (Nederland?).

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1870b: 30; 1872b: xxxiii; 1885c: 134 (alle drie *Cheiracanthium nutrix*) (= *Cheiracanthium erraticum* en *Cheiracanthium virescens*) (zie 147c). Chrysanthus 1961: 41 (= *Cheiracanthium virescens*) (zie 147c). Het voorkomen van deze soort in Nederland is twijfelachtig.

NL: mogelijk niet inheems (147d). UT: (7), Driebergen (147c, 220, 224a, 224b). NH: (7). ZH: (7). LI: Maastricht (13b, 147c).

***Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833)**

- Cheiracanthium nurix*; Van Hasselt 1870b: 30; 1872b: xxxiii; 1885c: 134 (alle drie p. p.).
- Cheiracanthium virescens*; Virgilius 1967: 149. Tutelaers 1978: 87. Van Helsdingen 1978b: 13 (kaart); 1979: 298; 1999b: 9; 2019b: 36. Koomen 1993: xxxii; 1999: xxxiv. De Bruyn 1996: 46. Koomen et al. 1997: xxxvi. Bonte et al. 2003a: 21, 25, 56; 2003b: 910. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260; 2010: 745; 2011: 17. Tutelaers 2008: 28. IJland 2009: 4. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 15.
- Cheiracanthium punctorum*; Chrysanthus 1961: 41.
- Cheiracanthium erraticum*; Meijer 1973b: 27.

NL: (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Ameland (147c, 196), Schiermonnikoog (147c), Terschelling (Nes) (147c), idem (Jan Thijssensduin) (182v). DR: Westerbork (182f). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o),

Hoog Soeren (147c), Molencate ? (91, 147c), Putterkoppel (147c), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: ? (119). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zwanenwater (148f). ZH: ? (119), duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Breda (96, 147c), Heeze (Heezerven) (147c, 230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f, 230p), Oosterhout (147c), Ossendrecht (147c), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: ? (119, 233), Heerlen (65, 147c).

CICURINIDAE

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

- Cicurina cinerea; Becker 1896b: 183.
- Cicurina cicur; Van Hasselt 1898: 47. Van der Hammen 1950: 112. Chrysanthus 1955c: 16; 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 46. Van Helsdingen 1976: 38. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 2000: xxxviii. Poot et al. 1989: 5. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 49, 53. Tutelaers 2001e (www). Prinsen 2005: 111. Noordijk 2006b: 20, 21. Roelofs-Ditters 2007: 17. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2009a: 6; 2010: 16. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Noordijk et al. 2010: 745. Krediet, 2015b: 9. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341. Noordam 2024: 24.

NL: (202s: wegbermen). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Vorden (83, 136). FL: Almere (218b). UT: Amersfoort (69n), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NB: Cranendonck (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (55, 202c), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (193b), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Valkenburg (83), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

CLUBIONIDAE

Clubiona brevipes Blackwall, 1841

- Clubiona fuscula; Van Hasselt 1879b: xxv; 1883a: xxxii.
- Clubiona brevipes; Van Hasselt 1885c: 132; 1890b: 206. Becker 1896b: 279. Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1955c: 16. Van der Drift 1951: 120. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 15 (kaart); 2019b: 36. Jacobs 1992: 132. Ma et al. 1997: 76. Koomen 1998a: xxxiv; 2015: 158. Koomen et al. 1993a: 572; 1993b: 217; 2004: 206. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Noordijk et al. 2001: 20. Kessler 2004: 7. Tutelaers 2006: 18. Roelofs-Ditters 2007: 19. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 279. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 26; 2013: 25; 2015a: 5. Van 't Veer et al. 2012: 13. Franken et al. 2016: 177. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 341.

DR: Leggelderveld (147c), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Enschede (147c), Ommen (Eerde) (182i), Tubbergen (Hezingen, Paardenslenkte) (182x). GL: (119), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (147c), idem (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 147c), Hoog Soeren (147c), Tiel (202m), Wageningen (112, 147c), Wissel (147c). UT: (119), Baarn (147c), Elst (147c). NH: Aerdenhout (147c), Amsterdam (147c), Zaandstad (Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (147c, 174i). ZH: (119), Leiden (182s²), Oostvoorne (147c), Voorschoten (147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (119), 's Heer Arendske (147c). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Leende (Strijperheg) (230x), Oirschot (14, 147c), Oosterhout (147c), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c), Tilburg (Kaaistoep) (202af, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (182s¹). LI: Heerlen (147c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Kanner bos (147c), Maastricht (13b, 147c), Mook (109, 147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Slavante (147c), Valkenburg (in nestkast) (147c, 151c), Wellerloo (55, 147c).

Clubiona caeruleascens L. Koch, 1867

□ *Clubiona coerulescens*; Van Hasselt 1885c: 132; 1898: 57. Chrysanthus 1955c: 16. Van Helsdingen 1978b: 15 (kaart). Vossen 1985b: 6; 1985c: 215.

GL: Hoge Veluwe (147c). ZH: Loosduinen (119, 147c), Scheveningen (119, 147c). NB: Oisterwijk (147c). LI: Maastricht (Sint Pietersberg) (147c), Mheer (147c), Schweiberg (147c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerloo (55, 147c).

Clubiona comta C.L. Koch, 1839

Clubiona comptata C.L. Koch, 1839

□ *Clubiona comptata*; Six 1863: 127. Van Hasselt 1872b: xxxiii; 1885c: 133; 1886a: xxxvi; 1890b: 206. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 283. Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1961: 41. Hulsebos 1961: 2. Meijer 1973b: 27; 1974: 171. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 18 (kaart); 1984: 2. Fokkema 1978: 100. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1998a: xxix; 1998b: 225; 2015: 158. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxvi. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Ma et al. 1997: 76. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www); 2006: 18. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 33. □ *Clubiona comta*; Kessler 2004: 7. Prinsen et al. 2006: 88. Noordijk 2006b: 21. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 18; 2009a: 6; 2009b: 17; 2010: 16; 2012: 26; 2013: 25; 2015a: 5. Wielink et al. 2009: 221. Tutelaers 2009c (www); 2017: 279. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26; 2011: 21. Noordijk et al. 2010: 745; 2011: 17. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Colijn et al. 2017: 14. Van Helsdingen 2019b: 36. Vogels 2019: 28. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (202s: wegbermen). FR: Ameland (147c, 196), Terschelling (147c), idem (Huneplak, Jan Thijssensduin, Kroonpolders, Oosterend) (182v), Gaasterland (147c). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (147c, 160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Norg (147c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Oldemarkt (Weerribben) (147c, 197), Ommen (Lemelerberg) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese) (147c, 196). GL: uiterwaarden Waal (191a), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Epe (147c), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoog Soeren (147c), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Tondensche heide (147c), Wageningen (147c), Wiessel (147c). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119), Amersfoort (147c, 222b, 69n), idem (De Treek) (147c), Baarn (147c), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (119), Kortenhoefse Plassen (147j), Valkeveen (120, 147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (119), Leiden (147c), Noordwijkerhout (147c), Oostvoorne (147c), Voorne (Quakjeswater) (147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (119), Bavel (147c), Best (De Scheeken) (230v), Breda (13b, 96, 147c), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (147c, 230e), Eersel (182t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (13b, 147c), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Veldhoven (Halfmijl) (236c). LI: (119), Bergen (Maasduinen) (215m), Heerlen (65, 147c, 202c), Maastricht (13b, 147c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (147c, 151c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)

□ *Clubiona corticalis*; Van Hasselt 1885c: 133; 1890b: 206. Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1959: 253. Van Helsdingen 1978b: 18 (kaart); 1997a: 116; 2015a: 5; 2019b: 36; 2019c: 47. Koomen 1986: 202; 1991: xviii. De Bruyn 1996: 42. Ma et al. 1997: 76. Noordijk et al. 2001: 20. Kessler 2004: 7. Koomen et al., 2004: 206. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 191. Wielink et al. 2009: 221; 2020: 341. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Bink 2016: 3. Noordijk 2022: 51.

FR: Schiermonnikoog (147c, 160a). OV: Almelo (119, 147c), Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Ommen (202m). GL: uiterwaarden Waal (191a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Nijmegen (119, 147c), Wiessel (147c). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: Heemstede (147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (147c, 174i). ZH:

Oegstgeest (147c), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (Raaphorst) (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Breda (202m), Castelré (Het Merkske) (150t), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250c, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Vierlingsbeek (147c). LI: (119), Brunssum (44, 147c), Bunde (147c), Epen (147c), Grevenbicht (147c), Heerlen (147c), Maastricht (147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), St. Geertruid (147c), Valkenburg (in nestkast) (147c, 151c), Wellerlooi (147c), Wittem (Hilleshagen) (147c).

Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862

- *Clubiona pallens*; Van Hasselt 1885c: 133; 1886c: 104 (beide p. p.).
- *Clubiona diversa*; Meijer 1973b: 27. Van Helsdingen 1978b: 18 (kaart). Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxii; 1998a: xxiv. Koomen et al. 1995: xxix; 2001: xxxix. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Faber et al. 1999: bijlage 2. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 12. Noordijk et al. 2008a: 93. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2010: 16. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Lambregts et al. 2013: 15. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 341.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 233 (= *Clubiona trivialis*) (zie 147c).

FR: Ameland (147c, 196), Schiermonnikoog (147c), Terschelling (147c), Oude Mirdum (147c). DR: (122), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem, Eerde) (182i). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Hoog Soeren (147c), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: Amersfoort (69n), De Bilt (119, 147c). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Naardermeer (147c), Zandvoort (147c). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), De Beer (147c), Loosduinen (119, 147c), Wassenaar (Kijfhoek) (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Sint Pietersberg (147c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Clubiona frisia Wunderlich & Schütt, 1995

Clubiona similis L. Koch, 1995

- *Clubiona neglecta*; Van Hasselt 1882: xxvii; 1885c: 131.
- *Clubiona frutetorum*; Van Hasselt 1885c: 132 (p. p.).
- *Clubiona similis*; Chrysanthus 1957a: 45; 1958a: 111; 1958b: 144. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1978b: 29 (kaart). Noordam 1998: 136.
- *Clubiona frisia*; Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 25, 56; 2003b: 910. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 19. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Wielink et al. 2020: 341.

W: (201p). FR: Ameland (147c), Schiermonnikoog (147c), Terschelling (61, 63, 137, 147c). DR: Meppel (147c). GL: Hoog Soeren (147c), Nijmegen (Millingerwaard) (202r). UT: (119), Utrecht (147c). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Groet (147c), Texel (Slufter) (147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (119; 201n (duinen)), duinen (AWD) (17a, 17b), De Beer (147c), Katwijk (147c), Loosduinen (119, 147c), Oostvoorne (147c), Scheveningen (119, 147c). NB: Breda (Gelderse heide) (147c), Eindhoven (Gestel) (215f), Oosterhout (61, 147c), Riel (61, 147c), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Heerlen (64, 147c), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Valkenburg (111, 147c).

Clubiona frutetorum L. Koch, 1867

- *Clubiona lutescens*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1885c: 132; 1890b: 196 (alle drie p. p.).
- *Clubiona frutetorum*; Van Hasselt 1885c: 132 (p. p.). Chrysanthus 1951g: 100. Van Damme et al. 1959: 38. Hulsebos 1964a: 93. Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 20 (kaart); 1979: 298; 1999b: 9. Bosmans 1988: 32. Koomen 1990: xv; 1991: xviii. De Bruyn 1996: 46. Noordam 1997: 29. Koomen et al., 2001: xxxix; 2004: 206. Kessler 2004: 7. Spoek 2005: 25.
- *Clubiona stagnatilis*; Hulsebos 1961: 2.

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (147c, 198a). DR: Dwingeloo (147c, 160b, 160d), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 147c). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 147c). UT: Amersfoort (147c), Leersum (147c). NH: Aerdenhout (147c), Egmond (182w), Wijk aan Zee (147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleiding duinen) (147c, 174i), Zwanenwater (148f). ZH: (119), Noordwijkerhout (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b). ZE: Haamstede (182c), Westerschouwen (182c). NB: Oosterhout (147c), Udenhout (147c), Vesse (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44, 147c), Heerlen (147c), Venray (147c).

Clubiona germanica Thorell, 1871

- *Clubiona germanica*; Chrysanthus 1951c: 272. Van Helsdingen 1978b: 21 (kaart). Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen et al. 1995: xxix. Koomen 1996: 172, 218; 1998b: 225.

GL: Kotten (147c), Tondensche heide (147c). NB: Breda (147c), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Riel (147c), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vierlingsbeek (40, 147c). LI: Herkenbosch (147c), Maastricht (147c), Slavante (147c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Clubiona juvenis Simon, 1878

- *Clubiona juvenis*; De Jong 1982: 113. Van Helsdingen 1996a: 2. Noordam 1998: 139.

OV: De Wieden (147z). UT: Noord-Maarsseveense Plass (147z). NH: Ankeveense Plassen (147z), Kortenhoefse Plassen (147z), Naardermeer (147z, 169f, 201p)

Clubiona lutescens Westring, 1851

- *Clubiona amarantha*; Van Hasselt 1877: xxvi (p. p.).
- *Clubiona lutescens*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1885c: 132; 1890b: 196 (alle drie p. p.). Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1961: 2; 1990: 155. Van Helsdingen 1978b: 21 (kaart); 1984: 2; 1999b: 9; 2002b: 11; 2019b: 36. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Koomen 1992: xxvii; 1994: xxxii; 1996: 172, 218; 1998b: 225; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii; 2010: 210. De Bruyn 1996: 49. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2004: 206. Spoek 1997b: 6. Ma et al. 1997: 76. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Kessler-Geschiere 2001: 15. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 19. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 6; 2012: 26, 28; 2015a: 5. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Cuppen 2010: 192. Van 't Veer et al. 2012: 13. Wielink et al. 2020: 341. Noordam 2024: 24.
- *Clubiona terrestris*; Van Hasselt 1885c: 131 (p. p.).

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Schiermonnikoog (147c), Terschelling (147c), idem (Formerum, Oosterend) (182v), Gaasterland (147c), Bakkeveen (147c), Duurswoude (147c). DR: Dwingeloo (Leggeloo) (147c, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinerwold (147c, 160b), De Wijk (147c, 160b). OV: Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), Apeldoorn (147c), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Doetinchem (147c), Korenburgherveen (147c), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Wageningen (147c), Winterswijk (182g). FL: Dronten (Harderbos) (70c, 182m). UT: Baarn (147c), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (147c), Kortenhoef (147c, 147j), Naardermeer (147c), Nederhorst den Berg (147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zaandstad (Guisveld) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: ? (119), Ackerdijkse Plassen (148j), De Beer (147c), Leiden (147c), Voorschoten (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Walcheren ? (107). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhevense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Westendorp (147c). LI: ? (119), Broekhuizen (147c), Brunssum (44, 147c), Bunde (147c), Cottessen (182e), Grevenbicht (147c), Heerlen (147c), Houthem (147c), Jabeek (193b), Kannerbos (147c), Maastricht (147c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mheer (147c), Mook ? (109, 147c), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (147c, 165a), Oud-Vroenhoven ? (129, 147c), Rijckholt (147c), Sint Pietersberg (147c), Swalmen (147c),

Thorn (Koningssteen) (182m), Voorendaal (Wrakelberg) (150n), Vlodrop (147c), idem (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wellerlooi (147c).

Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862

- Clubiona grisea*; Van Hasselt 1885c: 131; 1886c: 103; 1890b: 206 (alle drie p. p.).
- Clubiona neglecta*; Chrysanthus 1958a: 115; 1958b: 144. Kessler-Geschiere 1965: 158. Meijer 1973b: 27. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1978b: 24 (kaart). Koomen 1986: 202; 1992: xxvii. Koomen et al. 1997: xxxvi. Spoek 1997b: 6. Noordam 1997: 29. Tutelaers 2000: 8; 2001e (www). Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 33; 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2009a: 6; 2010: 16. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 22; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 341.

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1882: xxvii; 1885c: 131 (= *Clubiona similis*) (zie 63).

NL: (202s: wegbermen). FR: Ameland (147c, 196), Schiermonnikoog (147c, 175a, 210a), Vlieland (147c), Terschelling (Oosterend) (182v), Bolsward ? (122, 147c), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m), Oranjewoud ? (122, 147c). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Oosterhesselen (147c). GL: Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: ? (119). NH: Texel (Slufter) (147c), Zandvoort (147c). ZH: ? (119), De Beer (147c), Schiebroek (147c), Wassenaar (147c), duinen (201n). NB: Bladel (187a), Cranendonck (147c, 230e), Eindhoven (Gestel) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Colmond (63, 64, 147c), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Voorendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Clubiona norvegica Strand, 1900

- Clubiona norvegica*; Koomen et al., 2004: 206.

OV: Tubbergen (Springendal) (182x).

Clubiona pallidula (Clerck, 1757)

- Clubiona incomita*; Six 1858b: 297.
- Clubiona holoserica*; Snellen van Vollenhoven 1859: 59; 1868: 59.
- pallidula*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 275. Van Hasselt 1885c: 130; 1886c: 103; 1890b: 206. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1957b: 31. Hulsebos 1959: 253; 1961: 2. Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 24 (kaart); 1984: 2; 2003d: 22; 2019b: 36. Koomen 1986: 202; 1998b: 225; 2010: 210. Meijer 1985: 136. De Bruyn 1996: 47. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2004: 206. Spoek 1997b: 6. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Noordijk et al. 2010: 745. Cuppen 2010: 192. Tutelaers 2017: 279. Wielink et al. 2020: 341.
- Clubiona reclusa*; Van Hasselt 1885c: 132; 1890b: 206 (beide p. p.). Bink 2016: 3.

NL: (7, 13b, 119, 224a, 224b), (202s: wegbermen). GR: Grijpskerk (147c). FR: Schiermonnikoog (147c, 160a), Terschelling (147c), idem (Formerum, Hoorn) (182v), Gaasterland (Mirnsr Klif) (147c), Bolsward (122, 147c), Oldeberkoop (Delleburen) (147c, 198a), Oranjewoud (122, 147c). DR: Dwingeloo (147c, 160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (147c), Ruinerwold (147c, 160b), Zwartemeer (147c, 160b). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Enschede (147c). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (147c), idem (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 147c), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Dronten (Harderbos) (70c, 182m). UT: ? (119), Baarn (147c), Driebergen (147c), Hamersveld (147c), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (147c). NH: Amsterdam (147c), Heemstede (147c), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (147c). ZH: ? (119), Hazerswoude-Rijndijk (147c), Leiden (147c, 220), Papendrecht (import) (16h), Voorschoten (147c), Warmond (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b, 147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v),

Oosterhout (147c), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (147c), idem (De Brand) (182j), Vierlingsbeek (147c). LI: Heerlen (147c), Jabeek (193b), Mheer (147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Sint Pietersberg (147c), Wellerlooi (62, 147c).

Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843

- *Clubiona holoserica*; Six 1858b: 297. Van Hasselt 1885c: 131; 1890b: 206; 1898: 57.
- *Clubiona phragmitis*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 268. Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1961: 2; 1990: 155. Meijer 1973a: 179. Van Helsdingen 1978b: 26 (kaart); 1981a: 34; 1984: 2; 1997a: 116; 2002a: 10; 2002b: 11; 2003d: 22; 2006c: 24; 2019b: 36. Koomen 1996: 172, 218; 1998b: 225. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Spoek 1997b: 6. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 15. Prinsen 2002: 118. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 12. Tutelaers 2006: 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 19. Tutelaers et al. 2008: 12. Lambeets 2008: 13. Prinsen et al. 2009: 191. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2010: 16; 2012: 26; 2013: 25; 2015a: 5. Noordijk et al. 2009c: 22; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Van 't Veer et al. 2012: 13. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (7, 119), (202s: wegbermen). GR: Grijpskerk (147c), Lauwerszeepolder (147c, 195), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g), Zoutkamp (147c). FR: Ameland (Hollum) (147c), Terschelling (147c), idem (Kroonpolders) (182v), Oudemirdum (147c), Slotermeer (147c). DR: Dwingeloo (147c, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Lieveinge (147c, 160b), Norg (147c), Oosterhesselen (147c), Smilde (147c). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Hulshorst (147c), Kampereiland (147c), Korenburgrerveen (147c), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150o), Voorst (147c), Wageningen (147c), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Kraggenburg (Waterloopbos) (149d), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zuid-Flevoland (Zuiddijk) (147c), NO-polder (omgeving Kadoelen) (147c), Schokland (147c). UT: (220), Abcoude (147c), Botshol (147c), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (147c), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Ankeveen (147c), Diemen (147c), Ilperveld (147c), Kinselmeer (147c), Kortenhoef (147c, 147j), Loenerveen (147c), Naardermeer (147c), Nederhorst den Berg (147c), Texel ('t Horntje) (182y), Zaandstad (Westzaan) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (147c, 174i). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), De Beer (147c), Gouderak (147c), Hoogmade (Wijde Aa) (147c), Leiden (147c), Nieuwkoop (147c), Oegstgeest (147c), Rotterdam (Hillegersberger plassen) (136, 147c), Voorne (147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Erp (147c), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oisterwijk (147c), Tilburg (Wilhelmina kanaal) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (147c), Udenhout (De Brand) (182h, 182j, 215f), Valkenswaard (Het Heike) (230x). LI: Grevenbicht (50, 147c), Griendtsveen (Griendtsveense Peel) (147c, 147f), Heerlen (147c), Helenaveen (Mariapeel) (147c, 147f), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (15, 147c), Meers (Weerterhof) (186a), Mook (Plasmolen) (147c), Obbicht - Grevenbicht (186c), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roermond (50, 147c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994

- *Clubiona pseudoneglecta*; Noordam 1997: 29. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 12. Noordijk 2006b: 20, 21. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Noordijk et al. 2010: 745. Franken et al. 2018: 46. Van Helsdingen 2019: 36. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (202s: wegbermen). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond-Binnen (75w2). ZH: duinen (201n), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Heerlen (202c).

Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863

- *Melanophora pallens*; Six 1863: 127.
- *Clubiona grisea*; Van Hasselt 1885c: 131; 1886c: 103; 1890b: 206 (alle drie p. p.).
- *Clubiona reclusa*; Van Hasselt 1885c: 132; 1890b: 206 (beide p. p.). Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1962: 233 (p. p.). Meijer 1973b: 27; 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 27 (kaart); 1984: 2; 1987:

187; 1997a: 116; 1999a: 6; 1999b: 9; 2003d: 22; 2019b: 36. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii; 1993: xxxii; 1994: xxxii; 1998b: 225; 1999: xxxiv; 2010: 210; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 46, 47, 51, 53. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 15. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Bonte 2006: 12. Tutelaers 2006: 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2009a: 6; 2009b: 17; 2010: 16; 2013: 25. Lambeets 2008: 13. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Van 't Veer et al. 2012: 13. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 341.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwerszeepolder (147c), Lauwersmeer (198u), Leens (182k). FR: Ameland (Nes) (147c, 196), idem (Hollum) (147c), Schiermonnikoog (147c), Terschelling (Midsland: Bosplaat) (147c), idem (Formerum, Hoorn, Midsland, Oosterend) (182v), Bolsward ? (122, 147c), Fochteloërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (147c, 198a), Oranjewoud ? (147c). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (147c, 160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Ruinen (182f), Veenhuizen (147c), Vries (De Punt) (211k), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Enschede (147c), Haarle (147c), Kampen (147c), Ommen (147c). GL: ? (119), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (147c), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Kotten (147c), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Dronten (Harderbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbos) (182m), Zeewolde (Winkelse Zand) (182m). UT: ? (119), Amersfoort (147c), Driebergen (147c, 222b), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (147c), Kortenhoef (147c, 147j), Wijk aan Zee (147c), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Zaandstad (Reef, Guisveld, Noordzeekanaal) (232b), Zandvoort (147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: ? (119), Katwijk (147c), Krimpen a.d. IJssel (147c), Voorne (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (147c), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Ulvenhout (147c), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Bunde (147c), Cottessen (182e), Eys (De Piepert) (183r), Grevenbicht (50, 147c), Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (147c), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Ospel (Grote Peel) (147a, 147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Holst) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Swalmen (50, 147c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Clubiona rosserae Locket, 1953

□ *Clubiona rosserae*; Van Helsdingen 1996a: 2; 1996b: 7. Van Helsdingen et al. 2012: 28.

OV: De Wieden (147z, 148a). NH: Naardermeer (147z, 148a). LI: Melick en Herkenbosch (Meinweg) (148a, 150r).

Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897

□ *Clubiona stagnatilis*; De Jong 1949b: 216. Van Heerdt et al. 1960: 235; 1967: 112. Kessler-Geschiere 1965: 158; 2001: 15. Meijer 1973a: 179; 1974: 171; 1979: 49; 1980a: 229. Van Helsdingen 1978b: 29 (kaart); 1981a: 34; 1984: 2; 1999a: 6; 1999b: 9. Bosmans 1988: 32. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Spoek 1997b: 6. Koomen 1999: xxxiv; 2015: 158. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Tutelaers 2006: 15, 18; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2010: 16. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Van 't Veer et al. 2012: 13. Franken et al. 2016: 177. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 341.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1961: 2 (= *Clubiona frutetorum* L. Koch) (zie 147c).

GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k), Eenrum (Pieterburen) (182k), Lauwerszeepolder (147c, 195, 198b, 198e, 198d), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (147c), Schiermonnikoog (147c, 175a), Terschelling (137, 138, 147c), idem (Noordvaarder, Seeryp) (182v), Vlieland (147c), Fochteloërvveen (148e). DR: Diever (Berkenheuvel) (230n), Dieverbrug (147c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (147c), Oosterhesselen (147c), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Oldemarkt (Weerribben) (147c, 197). GL: Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Gerritsfles (147c), Lochem (Groot Boevink) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Staverden (147c), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: Baarn (147c), Rhenen (Grebbbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Halfweg (147c), Kortenhoef (147c, 147j), Twiske (147c, 169e), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Zaanstad (Guisveld, Euverenweg) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: De Beer (147c), Hoogmade (Wijde Aa) (147c), Nieuwkoop (147c), Oostvoorne (147c). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), 's-Hertogenbosch (Moerputten) (230n), 's-Hertogenbosch (Parklaan) (215f), Leende (Klein Hasselsven) (230n), Nuenen (147c), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (230n), Vasse (Landschotse Heide) (17r), Vught (Bleijendijk) (215f), Waalre (Elshouters) (230n). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147c, 147f), Swalmen (147c), Epen (147c).

Clubiona subsultans Thorell, 1875

- *Clubiona subsultans*; Chrysanthus 1955e: 494; 1966: 156. Hulsebos 1959: 253; 1962: 233; 1995: 5. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1978b: 31 (kaart). Tutelaers 2000: 13; 2001e (www). Kessler 2004: 7. Spoek 2005: 25. Roelofs-Ditters 2007: 19. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.
- *Clubiona reclusa*; Hulsebos 1962: 233 (p. p.).

FR: Schiermonnikoog (147c, 160a). DR: Diever (160h), Dwingeloo (147c, 160b), Havelte (147c, 160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Arnhem (147c, 181a), Kootwijkerzand (147c). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Breda (Mastbos) (147c), Cranendonck (147c, 215f, 230e), Galderse heide (147c), Oosterhout (57, 147c). LI: Heerlen (68, 147c), Wellerloo (68, 147c).

Clubiona subtilis L. Koch, 1867

- *Clubiona subtilis*; Van Hasselt 1885c: 134. Chrysanthus 1966: 156. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 31 (kaart); 1999a: 6; 2019b: 36. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1991: xviii; 1994: xxxii. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Koomen et al. 2001: xxxix; 2005: 87. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www); 2009c (www). Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 28. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2011: 21. Lambregts et al. 2013: 15. Wielink et al. 2020: 341.

FR: Fochteloërvveen (148e). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zeijen (147c). OV: Haaksbergen (182d). GL: Apeldoorn (Kootwijkerzand) (147a, 147c), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (119). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Texel (Slufter, De Muy) (147c), Texel (Mokbaai) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: De Beer (147c), Katwijk (147c), Loosduinen (119), Wassenaar (Voorlinden, Kijfhoek) (147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (68, 147c), Helenaveen (Mariapeel) (147c), Ospel (Grote Peel) (147c), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Clubiona terrestris Westring, 1851

- *Clubiona amarantha*; Van Hasselt 1877: xxvi (p. p.). Maurissen 1882: cxx.
- *Clubiona terrestris*; Van Hasselt 1885c: 131 (p. p.). Becker 1896b: 270. Van der Hammen 1950: 110. Chrysanthus 1951g: 100. Van Damme et al. 1959: 38. Hulsebos 1961: 2. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 33 (kaart); 2007a: 35; 2019b: 36. Vossen 1983: 236. Koomen 1986: 202; 1994: xxxii; 1998a: xxxiv. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1993a: 572; 1996: xxiv; 1997: xxxvi. Spoek 1997b: 6; 1999: 3. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2;

2001: 46. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www); 2006: 18. Decae 1996: 46. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Noordijk 2005: 33; 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 19. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2010: 16; 2012: 28; 2013: 25; 2015a: 5. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Noordijk et al. 2010: 745. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Bink 2019: 7. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Hoorn, Huneplak) (182v), Bakkeveen (147c). DR: Dwingeloo (147c, 160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Eursinge (147c, 160b), Roden (147c), De Wijk (147c, 160b). OV: Ommen (Lemelerberg) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 147c). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (147c), idem (Kootwijkerveen) (147c), Asselt (147c), Barneveld (147c), Doetinchem (147c), Ede (147c), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoog Buurlo (147c), Hoog Soeren (147c), Niersen (147c), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Vierhouten/Gortel (149f), Wageningen (147c), Wiessel (147c). UT: Amersfoort (De Treek) (147c), Botshol (147c), Leersum (147c), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (147c), Hilversum (147c), Laren (147c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Barendrecht (import) (16 i), 's-Gravenhage (147c), Rotterdam (71b), Warmond (147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Walcheren ? (107, 147c). NB: Breda (13b, 147c), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (147c, 230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Hilvarenbeek (182s¹), Ossendrecht (147c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), St. Anthonius (147c), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Ulvenhout (147c), Valkenswaard (Tongelreep) (230x), Vught (Marktveld) (215f). LI: ? (119), Bunderbos (147c), Echt (in grot) (239b), Heerlen (147c, 202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (14, 147c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Neercanne (in grot) (83, 147c), Nuth (147c, 192c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Holst) (150s), Sint Pietersberg (in grot) (44, 147c), Sittard (Watersley) (147c), Slavante (147c), Swalmen (147c), Wellerloo (147c).

Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843

□ *Clubiona trivialis*; Becker 1879a: xlvi. Van Hasselt 1885c: 133 (p. p.). Hulsebos 1961: 2; 1962: 233. Meijer 1976a: 6. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8; 2001e (www). Van Helsdingen 1978b: 33 (kaart). Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Spoek 1997b: 6. Bonte et al. 2003a: 25. Prinsen 2005: 112. Bonte 2006: 12. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2011: 17. IJLAND ET AL. 2011: 21. Lambregts et al. 2013: 15.
□ *Clubiona pallens*; Van Hasselt 1885c: 133; 1886c: 104 (p. p.).

GR: L auwerszeepolder (147c). FR: Ameland (147c), Terschelling (Midsland) (147c), Bakkeveen (147c), Oldeberkoop (Delleburen) (147c, 198a). DR: Dwingeloo (147c, 160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (147c, 160b). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Apeldoorn (147c), Ede (147c), Hoog Soeren (147c), Kootwijk (147c), Kootwijkerveen (147c), Niersen (147c), Otterlo (147c), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Tondensche heide (147c), Wiessel (147c). UT: (7, 119), Amersfoort (De Treek) (147c). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Texel (Den Burg) (147c). NB: Bladel (187a), Cranendonck (147c, 230e), Heeze (Heezerven) (147c, 230d), Oosterhout (147c), Veessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (147c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

(Clubiona vegeta L. Koch, 1874)

Onjuiste vermelding: Van Heerdt et al. 1960: 235 (= Clubiona genevensis L. Koch) (zie 147c).
Deze soort is niet uit ons land bekend.

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866)

Clubiona genevensis L. Koch, 1866

□ *Clubiona stigmatica*; Van Hasselt 1885c: 134.
□ *Clubiona stigmatisata*; Van Hasselt 1896: lvii.
□ *Clubiona vegeta*; Van Heerdt et al. 1960: 235.

□ *Clubiona genevensis*; Van Helsdingen 1978b: 21 (kaart); 1979: 299. Vangsgård et al. 1996: 80.

Tutelaers 2000: 13; 2001e (www).

□ *Porrhoclubiona genevensis*; Versteeg 2023: 14. Versteeg 2024: 11, 12

W: (231a). FR: Schiermonnikoog (147c), Terschelling (137, 147c). GL: Apeldoord/Ede (Hoge Veluwe) (232o), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). ZH: Loosduinen (119, 135, 147c), Scheveningen (119, 147c). NB: Cranendonck (147c, 230e).

Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932)

□ *Porrhoclubiona leucaspis*; Noordijk 2022: 51.

NB: Tilburg (Kaaistoep) (202af).

CORINNIDAE, zie PHRUROLITHIDAE

CTENIDAE

[Phoneutria boliviensis (F.O. P.-Cambridge, 1879)]

□ *Phoneutria* spec.; Van Helsdingen 2015: 33.

□ *Phoneutria boliviensis*; Noordijk 2019: 203.

NH: (import) (202aa), Alkmaar (import) (202a), Amsterdam (import) 202aa). ZH: Rijnsburg (import) (149x, 202aa). NB: (import) (292aa).

CYBAEIDAE

Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)

□ *Cryphoeca silvicola*; Hulselbos 1962: 234. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Van Helsdingen et al. 2009b: 17.

DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p).

Mastigusa arietina (Thorell, 1871)

Tetrilus arietinus (Thorell, 1871)

□ *Cryphoeca arietinus*; Van Hasselt 1890a: xvii; 1890b: 183; 1898: 70. Schmitz 1915: 174, 190.

□ *Tetrilus arietinus*; Wasmann 1891: 57, 61.

NL: (217z, in mierennesten). UT: Doorn (128, 129, 136). ZH: (129, 136). LI: (129, 136), Exaeten (242).

Mastigusa macrourhalma (Kulczynski, 1897)

□ *Mastigusa macrourhalma*; Noordam 1998: 268.

NL: (201p).

Tuberta maerens (O. P.-Cambridge, 1863)

□ *Tuberta maerens*; Noordijk 2022: 52.

NB: Tilburg (Kaaistoep) (202af).

DICTYNIDAE

(Argenna pallida L. Koch, 1881)

Onjuiste vermelding: De Jong 1949b: 216 (= Argenna subnigra (O. P.-Cambridge)).

Het voorkomen van deze soort in ons land is niet aangetoond.

Argenna patula (Simon, 1874)

- *Argenna patula*; Meijer 1973a: 179; 1980a: 229. Van Wingerden 1977: 105. Meijer & Van Wingerden 1975: 135. Kessler et al. 1984: 262. Vangsgård et al. 1996: 80. Koomen et al. 1997: xxxvi. Koomen et al. 2005: 87. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141.
- *Protadia patula*; Van Wingerden 1973: 208.

W: (231a). GR: Lauwerszeepolder (195, 198e, 198v), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 180b, 198v, 253, 254a), Terschelling (Noordvaarder, Seeryp) (182v). NH: Texel ('t Horntje) (182y). ZH: Oostvoorne (De Beer) (198v). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b).

Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861)

- *Lethia albispirculus*; Van Hasselt 1885c: 143.
- *Argenna pallida*; De Jong 1949b: 216.
- *Argenna subnigra*; Van Heerd et al. 1960: 235. Meijer 1973b: 26. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Noordam 1996: 16. De Bruyn 1996: 44. Vangsgård et al. 1996: 80. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2001: xxviii; 2005: 87. Koomen 1999: xxiv. Tutelaers 2000: 8; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 21, 24, 56; 2003b: 910. Spoek 2005: 25. Bonte 2006: 10, 12. Van Helsdingen et al. 2008: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Krediet, 2015b: 9. Van Helsdingen 2019b: 36. Van Colen et al. 2022: 141.

W: (231a). GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (210a), Terschelling (137), idem (Bosplaat) (169e), idem (Noordvaarder) (182v). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Zwolle (119). GL: Renkum (Reijerscamp) (150m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Texel (Mokbaai) (182y). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: .NB: Cranendonck (230e). LI : Eys (De Piepert) (183r).

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)

- *Aranea aquatica*; Bennet et al. 1825: 471.
- *Argyroneta aquatica*; Walckenaer 1842: 379. Snellen van Vollenhoven 1859: 57; 1868: 57. Six 1858b: 297. Becker 1879a: xlv; 1896b: 186. Van Hasselt 1883a: xxxii; 1885c: 144; 1896: lvii; 1898: 50. Leesberg 1903: 74. Uyttenboogaart 1905: 2. Romijn 1918: 126. Redeke et al. 1932: 23. Pinkhof 1941: 228. Van der Hammen 1949a: 80. Van Nieukerken et al. 1972: 135, 136; 1973: 276. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 38; 1981a: 35; 2019b: 36. Hermans et al. 1984: 185. Torenbeek 1988: 91. Koomen 1991: xviii; 2015: 158. Steenbergen 1993: 221. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxxvi. Verdonschot 1996: 82. Vangsgård et al. 1996: 80. Spoek 1997b: 7. De Bokx 1997: 9-93. Lamberigts et al. 2003: 114. Kessler 2004: 7. Prinsen 2007: 141. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 14.

NL: (7, 15c, 119, 224a, 224b, 241). W: (231a). GR: (230c). FR: (230c), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Terschelling (Kroonpolders, West aan Zee) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: (230c), Dwingeloo (212b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: (230c), Haaksbergen (182d), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (230c), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Gerritsfles (212b), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Putten (Schuitenbeek) (232e), Wageningen (112). UT: (230c), Utrecht (13b, 220), Lage Vuursche (212b). NH: (226, kaart), Amsterdam (206f), Texel (136), Zaandstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (16m, 174i). ZH: (230c), Delft (81), Hoekse Waard (Strijen) (201a), Loosduinen (135, 188a), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (230c), Bergen op Zoom (212b), Best (212b), Casteren (Cartierheide, (182t), Grote Peel (147a, 200), Heusden (Hooibroeken) (215f), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Reusel-De Mierden (Lage Mierde, Welleneindsche Heide, Panneven) (211m). LI: (230c), Beegden (Beegderheide, vennen) (186k), Echt (Vulensbeek) (151a), Grote Peel (147a, 200), Meijel (147a, 212b), Neer (216), Peelgebieden (147f).

Brigittea civica (Lucas, 1850)

***Dictyna civica* (Lucas, 1850)**

- Dictyna major*; Van Helsdingen 1976: 37.

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1885c: 142 (p. p. = *Dictyna uncinata* Thorell, p. p. = *Dictyna pusilla* Thorell).

L: Helenaveen (Mariapeel) (147a).

***Brigittea latens* (Fabricius, 1775)**

Dictyna latens (Fabricius, 1775)

- Dictyna latens*; Van Hasselt 1885c: 141; 1886c: 105; 1890b: 196, 206. Chrysanthus 1954b: 40. Van Heerd et al. 1960: 235. Koomen 1990: xv. Vangsgård et al. 1996: 80. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Van Helsdingen et al. 2012: 26; 2013: 25.
- Dictyna lugubris*; Van Hasselt 1885c: 141; 1886c: 105; 1890b: 206. Heuts 2001: 10. Spoek 2005: 25.
- Brigittea latens*; Van Helsdingen 2019b: 36.

W (231a). FR: Terschelling ? (137), idem (Koegelwieck) (182v). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). UT: (119). NH: Amsterdam (151u), Huizen (Gooise heide) (151u), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Texel (Den Hoorn) (182y). ZH: Giessendam (122), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c). LI: Arcen (52), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (122), Maasdrouw (Linnerheide) (150s), Roerdalen (Holst) (150s), Roermond (129).

***Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)**

- Snellen van Vollenhoven 1859: 54; 1868: 54.
- Dictyna arundinacea*; Van Hasselt 1877: xxvii; 1885c: 141. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 221. Bouwman-Buis 1939c: 142. Chrysanthus 1954b: 40. Van Damme et al. 1959: 36. Hulsebos 1961: 2. Meijer 1974: 171; 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37. Tutelaers 1978: 85, 87; 2000: 8; 2001e (www); 2017: 279. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xviii; 1993: xxvii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxiv; 2004: 206; 2005: 87. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Heuts 2001: 10. Noordijk et al. 2001: 18; 2011: 17. Prinsen 2002: 118; 2005: 112; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Roelofs-Ditters 2007: 17, 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 26, 28. Van 't Veer et al. 2012: 13. Colijn et al. 2017: 14. Franken et al. 2018: 46. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 341.
- Dictyna uncinata*; Chrysanthus 1951g: 100 (p. p.).
- Dictyna bicolor*; De Jong 1949b: 216.

NL: (13b, 119, 224a, 224b). GR: Nieuw Wolda (202m), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord) (183a), Wijster (169e). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: (7, 220), Amersfoort (69n), Bilthoven ? (25a). NH: Amsterdam (151u), Egmond-Binnen (75w2), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaanstad (Euverenweg) (232b). ZH: 's-Gravesande ? (129), Loosduinen ? (122). ZE: Domburg (107). NB: (7), Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d), Kasteren (De Geelders) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r, 182t), Wintelre (182t). LI: (7), Brunssum (44), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Melick (52), Mook(169e), Ospel (Grote Peel) (147a), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schinveld (Breukberg) (164n).

***Dictyna major* Menge, 1869**

- Dictyna cognata*; Pickard-Cambridge 1885: 237. Van Hasselt 1886c: 104; 1890b: 196 (beide p. p.).
- Dictyna major*; Hulsebos 1961: 2. Noordam 1998: 86. Sies 2023: 19. Versteeg 2024: 12.

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1886c: 104; 1890b: 196 (p. p. = *Dictyna arundinacea* (L.)). Van Helsdingen 1976: 37 (= *Dictyna civica* (Lucas)).

NL: (26). DR: Dwingeloo ? (160b). GL: Hall (201p), Harderwijk (Beekhuizerzand) (218c), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). ZH: 's-Gravesande ? (129), Loosduinen ? (122).

Dictyna pusilla Thorell, 1856

- *Dictyna pusilla*; Van Hasselt 1898: 47. Hulsebos 1962: 233. Koomen et al. 1995: xxix; 2004: 206. Prinsen 2007: 141. Tutelaers 2017: 279.
- *Dictyna uncinata*; Van Hasselt 1885c: 141 (p. p.).
- *Dictyna civica*; Van Hasselt 1885c: 142 (p. p.).

NL: (119). DR: Dwingeloo ? (160c). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x). ZH: 's-Gravenhage (136). NB: Best (De Scheeken) (230v), Gorp en Rovert (211m), Wintelre (182t).

Dictyna uncinata Thorell, 1856

- *Dictyna uncinata*; Becker 1879a: xlv; 1896b: 218. Van Hasselt 1885c: 141. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1959: 253; 1961: 2. Van Heerdet et al. 1967: 111. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1994: xxxii; 1996: 172, 218; 1998b: 225; 2000: xxxviii. Koomen et al., 2004: 206. Van Helsdingen 1987: 187; 1999a: 6; 2002b: 11. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2006: 18; 2017: 279. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 18. Prinsen et al. 2009: 191. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 25; 2015a: 5. Van 't Veer et al. 2012: 13.
- *Dictyna civica*; Van Hasselt 1885c: 142 (p. p.).

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1885c: 141 (p. p. = *Dictyna pusilla* Thorell). Chrysanthus 1951g: 100 (p. p. = *Dictyna arundinacea* (L.)).

NL: (13b, 119). FR: Schiermonnikoog (160a), Terschelling ? (138), Fochteloërveen (148e). DR: Dwingeloo (160b), Meppel (160b). OV: Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Winterswijk (182g). NH: ? (7), Zaanstad (Euverenweg) (232b). ZH: ? (7), Ackerdijkse Plassen (148j). ZE: ? (7). NB: ? (7), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Nuenen (Heerendonk) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Brunssum (44), Gulpen (Waterop) (147o), Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Hoosden, Herkenbosch (Turfkoelen, De Muiter)) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Thorn (Koningssteen) (182m).

Lathys humilis (Blackwall, 1855)

- *Lethia humilis*; Van Hasselt 1885c: 142; 1886c: 103; 1890b: 196. Bouwman-Buis 1939c: 146.
- *Lathys humilis*; Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1962: 233. Klomp et al. 1973: 330. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxiv; 2001: xxxviii. Koomen 1996: 172, 218; 1998b: 225. Faber et al. 1999: bijlage 2. Noordijk et al. 2001: 18. Prinsen 2002: 118; 2005: 112; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 191. Kessler 2004: 7. Spoek 2005: 25. Tutelaers 2006: 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2011: 21. Van 't Veer et al. 2012: 13. Van Helsdingen et al. 2013: 25; 2015a: 5. Bink 2016: 3. Van Helsdingen 2019b: 37. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 341.

GR: Haren (202m), Nieuw Wolda (202m), Scheemda (202m), Vlagtwedde (Sellingen) (211g), Winschoten (202m). FR: Bolsward (122), Dokkum (202m), Drachten (202m), Harlingen (202m), Metslawier (202m), Oranjewoud (122), Sneek (202m). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Assen (202m), Dwingeloo (160c), Emmen (202m), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Deventer (202m), Ommen (202m), Zwolle (202m). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Arnhem (181a),

Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Harderwijk (202m), 's Heerenberg (202m), Hoevelaken (202m), Nijmegen (119), Nunspeet (182u), Oosterbeek (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Tiel (202m), Ulft (202m), Wageningen (119), Zwartebroek (202m). FL: Lelystad (202m). UT: Bilthoven ? (25a), Houten (202m). NH: Amsterdam (202m), Bergen (202m), Egmond (182w), Enkhuizen (202m), Hippolytushoef (202m), Zaandam (202m, 232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Delft (202m), 's-Gravenhage (119), Oude Tonge (202m), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg (202m), Zierikzee (129). NB: Asten (202m), Bergen op Zoom (202m), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Boxmeer (202m), Boxtel (202m), Breda (202m), Breda (Liesbos) (119), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Gorp en Rovert (211m), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Valkenswaard (202m). LI: Maastricht (202m), Schinveld (Breukberg) (164n), Roerdalen (Herkenbosch (De Muitert)) (150s), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wahlwiller (44).

(*Lathys stigmatisata* (Menge, 1869))

De soort wordt voor Nederland opgegeven door Bristowe (1939, *The Comity of Spiders*, 1: 13, *Lathys stigmatisata*), maar deze opgave kan op geen enkele wijze bevestigd worden en berust niet op andere gepubliceerde bronnen. Het voorkomen van deze soort in ons land is niet aangetoond.

(*Marilynia bicolor* (Simon, 1870))

Dictyna bicolor Simon, 1870

Onjuiste vermelding: De Jong 1949b: 26 (= *Dictyna arundinacea* (L.)).

Het voorkomen van deze soort in ons land is niet aangetoond.

***Nigma flavescens* (Walckenaer, 1830)**

Heterodictyna flavescens (Walckenaer, 1830)

- Dictyna variabilis*; Six 1858b: 296; 1863: 126. Snellen van Vollenhoven 1859: 54; 1868: 54. Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 142; 1886a: xxxv; 1886c: 105.
- Dictyna flavescens*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 215. Chrysanthus 1954b: 40.
- Dictyna pallens*; Van Hasselt 1883a: xxxii.
- Nigma flavescens*; Bosmans 1988: 32. Koomen 1992: xxvi; 1998b: 225; 2000: xxxviii. Tutelaers 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 18. Prinsen et al. 2009: 191.
- Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2011: 21. Van Heldingen et al. 2013: 25; 2015a: 5. Bink 2019: 7. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 341. Versteeg 2024: 11.
- Heterodictyna flavescens*; Vossen 1985b: 6; 1985c: 215.

Onjuiste vermelding: Van der Hammen 1949a: 74 (*Dictyna flavescens*) (= *Nigma walckenaeri* (Roewer)).

NL: (224a, 224b). GL: Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Nijmegen (119), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Wageningen (112, 119). UT: (7), De Bilt (119, 222b), Soest (119), Utrecht ? (220). NH: Valkeveen (119, 120). ZH: Barendrecht (import) (16 i). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bosscha (122), Breda ? (13b), Breda (Liesbos) (117, 119), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230j), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Nuenen (Heerendonk) (215f), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Broekhuizen (52), Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Maastricht? (13b), Maastricht (Pietersberg) (182e), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

***Nigma puella* (Simon, 1870)**

- Nigma puella*; Van de Putte 2018: 2.

ZE: Middelburg (211p).

***Nigma walckenaeri* (Roewer, 1951)**

Heterodictyna walckenaeri Roewer, 1951

- *Dictyna viridissima*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 217. Van Hasselt 1885c: 142; 1886c: 105. Bouwman-Buis 1939c: 14. Chrysanthus 1951g: 100; 1956: 139. Hulsebos 1962: 233.
- *Dictyna flavescens*; Van der Hammen 1949a: 74.
- *Nigma walckenaeri*; Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2013: 25. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 279. Van Helsdingen 2019b: 37. Noordam 2024: 24.

NL: (60). DR: Emmen ? (160c), Meppel ? (160c). GL: Nijmegen (122). UT: (7, 119), Amersfoort (69n), Bilthoven (25a), Utrecht (Amelisweerd) (201v). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NH: (7), Amsterdam (81, 122). ZH: (7, 119). NB: (7, 119), Best (De Scheeken) (230v), Vught (Marktveld) (215f). LI: (7, 119), Eijsden (44), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Maastricht ? (13b, 44), Roerdalen (Herkenbosch (De Muitert)) (150s).

DYSDERIDAE

***Dysdera crocata* C. L. Koch, 1838**

- *Dysdera cambridgei*; Van Hasselt 1879a: xiv; 1883a: xxxiii; 1885c: 121 (alle p. p.).
- *Dysdera crocata*; Van Hasselt 1885c: 121 (p. p.). Chrysanthus 1951g: 98. Deeleman-Reinhold et al. 1988: 158. Meijer 1985: 136. Fokkema 2000: website. Roelofs-Ditters 2007: 18. Colijn et al. 2017: 14.

FR: Huins (75v), Spannum (75v). UT: (119), Amersfoort (69n). NH: (119). ZH: (119), Delft (71l). ZE: (119), Hoek (71l). NB: 's-Hertogenbosch (Parklaan) (215f). LI: (119), Maastricht (193b), Venlo (44).

***Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802)**

- *Dysdera erythrina*; Six 1858b: 302. Snellen van Vollenhoven 1859: 66; 1868: 66. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 315. Van Hasselt 1879: xiv; 1883a: xxxiii. Van der Hammen 1949a: 75. Chrysanthus 1958b: 143. Deeleman-Reinhold et al. 1988: 164. Jacobs 1992: 132. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2009a: 6. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Wielink et al. 2020: 341.
- *Dysdera cambridgei*; Van Hasselt 1885c: 121; 1898: 68 (beide p. p.). Schmitz 1915: 167.

NL: (217z, in mierennesten; 224a, 224b). UT: (7, 119), Utrecht (220). NH: ? (7, 119). ZH: ? (7, 119), Leiden (in kas) (81). ZE: ? (7, 119), Zierikzee (112). NB: 's-Hertogenbosch (Parklaan) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Vught (Marktveld) (215f). LI: (119), Colmond (64), Heerlen (71l), Maastricht ? (13b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (64, 165a), Schin op Geul (64), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

***Harpactea hombergi* (Scopoli, 1763)**

- *Dysdera hombergi*; Van Hasselt 1887a: xxxi.
- *Harpactea hombergi*; Van Hasselt 1890b: 182; 1898: 50, 69. Schmitz 1915: 174. Chrysanthus 1958b: 143. IJland et al. 2010: 26. IJland et al. 2011: 21.

NL: (217z, in mierennesten). GL: Nijmegen (123). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NB: Cuijk (129). LI: Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Maastricht (64), Roermond (129), Valkenburg (136).

ERESIDAE

***Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778)**

Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)
Eresus niger (Petagna, 1787)

- *Eresus annulatus*; Van Hasselt 1872a: xix; 1872d: 113.
- *Eresus cinnabarinus*; Van Hasselt 1879a: xiii; 1883a: xxxiii; 1885c: 140; 1889a: xiv. Becker 1879a: xlii; 1896a: 3.
- *Eresus niger*; Chrysanthus 1952b: 45. Van Wezel 1987: 13. Jansen et al. 1992: 138.

- Eresus sandaliatus*; Raemakers et al. 1999: 1. Van Helsdingen 2000b: 23; 2005b: 8; 2009c: 18. Noordijk 2005: 29, 33. Noordijk et al. 2008a: 82, 93. Peeters et al. 2009: 153.
- Eresus spec.*; Prinsen 2005: 111.

NL: (46, 148q: kaartje). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Arnhem (108, 168a), Bennekom (119), Hoge Veluwe (244), Oud-Reemst (148h, 212a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Velp (7, 95, 98, 119, 168a), Wageningen (112, 126, 168a). NB: (149 I, 204v). LI: Maastricht (13a, 168a), Nieuw-Bergen (168a), Wellerloo (De Hamert) (149 I).

Opmerking. Deze soort was lange tijd bekend onder de naam *Eresus niger*. De soort werd door Petagna in 1787 beschreven als *Aranea nigra*. Later werd er een apart geslacht *Eresus* opgericht, waarin *niger* werd ondergebracht. Achteraf bleek dat de naam *Aranea nigra* ook al in 1772 door Olafsen was gebruikt, welke naam nu een synoniem is van *Pardosa groenlandica* (Thorell 1872). Volgens de internationale nomenclatuurregels mag een jonger primair homoniem (hier dus *Aranea nigra* Petagna) niet meer worden gebruikt. Het oudste synoniem van *Aranea nigra* Petagna komt dan automatisch beschikbaar, en dat is *Aranea sandaliata* Martini & Goeze, 1778. De soort heet nu daarom *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze). Een ander synoniem is *Aranea cinnaberina* Olivier, 1789. Een tijd lang werd de naam *Eresus cinnaberinus* (Olivier) ook wel gebruikt in plaats van *Eresus niger*. De naam *sandaliatus* was eigenlijk de oudste, maar desondanks werd hij niet gebruikt. Inmiddels is de opvatting ontstaan dat er in Noord- en Centraal-Europa twee soorten voorkomen, waarvoor de namen *cinnaberinus* en *sandaliatus* dienen te worden gebruikt. Deze opvatting wordt momenteel met behulp van DNA-onderzoek getoetst, en het laatste woord lijkt nog niet te zijn gezegd.

EUTICHURIDAE, MITURGIDAE, zie CHEIRACANTHIIDAE

FILISTATIDAE

[*Filistata insidiatrix* (Forsskål, 1775)]

- Filistata insidiatrix*; Van Helsdingen 2011a: 5, 6.

UT: Utrecht (149s) (import).

GNAPHOSIDAE

***Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758)**

- Phytonissa nocturna*; Six 1858c: 20; 1863: 127. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 265.
- Drassus nocturna*; Van Hasselt 1870b: 30.
- Melanophora nocturna*; Van Hasselt 1876b: lii.
- Gnaphosa nocturna*; Van Hasselt 1883a: xxxii; 1885c: 125; 1890b: 194.
- Callilepis nocturna*; Noordijk 2006b: 20, 21. Noordijk et al. 2009a: 71; 2010: 745. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 26.

NL: (202p, 202s: wegbermen). GL: Molencate ? (91), Wageningen ? (112). UT: Amersfoort (221), Driebergen (119, 221, 222b). NH: Hilversum ? (103). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (7, 13b, 119).

De met een vraagteken aangeduide vindplaatsen, genoemd door Van Hasselt in 1870, 1876 en 1883, worden later (in 1885) niet meer herhaald; het bijbehorende materiaal werd later door hem zelf wellicht herkend als behorend tot een andere soort (*Kishidaia conspicua* L. Koch?).

***Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834)**

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Onderzoek van het beschikbare materiaal toonde aan dat in ons land *Drassodes cupreus* (Blackwall) voorkomt; *Drassodes lapidosus* (Walckenaer), die vooral op kalkrijke terreinen heet voor te komen, kan wellicht in het uiterste zuiden van ons land gevonden worden.

- *Drassus lapidicola*; Six 1863: 127. Van Hasselt 1877: xxvii; 1885c: 129.
- *Drassus villosus*; Van Hasselt 1885c: 129.
- *Drassus lapidicolens*; Van Hasselt 1890b: 205.
- *Drassus lapidosus*; Becker 1896b: 254.
- *Drassodes lapidosus*; Becker 1879a: xlvi. Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1959: 253; 1962: 233. Van Damme et al. 1959: 36. Kessler-Geschiere 1965: 158 (*Drassodes lapidosus* var. *macer en cupreus*). Van der Aart et al. 1971: 119. Meijer 1973b: 26. Van Helsdingen 1976b: 37. Verstegen et al. 1992: 71. Koomen et al. 1995: xxix. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 6. Bonte et al. 2003a: 21; 2003b: 910. Bonte 2006: 12.
- *Drassodes cupreus*; Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 29; 2009c (www); 2017: 279. Koomen 1986: 202; 1992: xxvi. Bosmans 1988: 32. Hulsebos 1989: 23. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 73. Koomen et al. 1993a: 572; 1997: xxxvi; 2001: xxxix. Koomen 1998a: xxxiv. Van Helsdingen 1999a: 6. Bonte et al. 2003a: 21, 25; 2003b: 910; Van Helsdingen 2019b: 37. Spoek 2005: 25. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2009a: 6. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Bink 2019: 7. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (13b, 119, 129; 232o: heide hogere gronden). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a, 175a), Terschelling (Huneplak) (182v), Fochteloërvéen (148e). DR: Dwingeloo (160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Renkum (Reijerscamp) (150m). UT: (7), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Schoorl (182w). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Barendrecht (import) (16 i), 's-Gravenhage (Bierlap) (3), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7), Bladel (187a), Boxtel (182s¹), Cranendonck (230e), Heeze (Heezervelen) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f, 230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Veessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d), Woensdrecht (107). LI: Eys (De Piepert) (183r), Haelen (50), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

***Drassodes pubescens* (Thorell, 1856)**

- *Drassus pubescens*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1885c: 130.
- *Drassodes pubescens*; Hulsebos 1962: 233. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxii; 1998a: xxxiv. Koomen et al. 1995: xxix. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 29. Bonte et al. 2003a: 25; 2003b: 910. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2010: 16; 2012: 26. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 15. Wielink et al. 2020: 341.

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Havelte (160c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f, 230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Gennep (Sint Jansberg) (119), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Mook (109).

(*Drassodes villosus* (Thorell, 1856))

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1885c: 129 (*Drassus villosus*) (= *Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834)). Er bestaan geen betrouwbare vermeldingen van deze soort uit ons land.

***Drassyllus lutetianus* (L. Koch, 1866)**

***Zelotes lutetianus* (L. Koch, 1866)**

- Prosthesima lutetiana*; Van Hasselt 1885c: 127.
- Zelotes lutetianus*; Van Damme et al. 1959: 37. Van Helsdingen 1976: 37. Koomen 1994: xxxii. Wielink et al. 2020: 342.
- Drassyllus lutetianus*; Koomen 2000: xxxviii. Spoek 2005: 25. Roelofs-Ditters 2007: 18. Lambeets 2008: 13. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Tutelaers 2017: 279. Wielink et al. 2020: 341.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 233 (= *Zelotes pusillus* (C.L. Koch)).

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Winterswijk (182g). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven en Waschven) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Gennep (Sint Jansberg) (119), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Ter Hagen (186c).

***Drassyllus praeficus* (L. Koch, 1866)**

Zelotes praeficus (L. Koch, 1866)

- Prosthesima latitans*; Van Hasselt 1885c: 127.
- Zelotes praeficus*; Noordam 1998: 116.
- Drassyllus praeficus*; Tutelaers 2000: 13; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Wielink et al. 2020: 341.

GL: (119). ZH: (119). NB: (201p), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d).

***Drassyllus pusillus* (C. L. Koch, 1833)**

Zelotes pusillus (C. L. Koch, 1833)

- Prosthesima nigrita*; Van Hasselt 1885c: 127; 1890b: 196.
- Zelotes lutetianus*; Hulsebos 1962: 233.
- Zelotes pusillus*; Van Damme et al. 1959: 37. Van der Aart et al. 1971: 119. Meijer 1973b: 26. Van Helsdingen 1976: 37. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13. Koomen 1986: 202; 1993: xxxii; 1999: xxxiv. Koomen et al. 1995: xxix; 2001: xxxix. Siepel et al. 1996: 46, 48, 52, 53. De Bruyn 1996: 45. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Bonte et al. 2003a: 23, 27; 2003b: 911. Bonte 2006: 13.
- Drassyllus pusillus*; Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 37. Tutelaers 2001e (www); 2009c (www). Noordijk 2005: 33; 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93; 2009c: 22; 2010: 745. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 18; 2009a: 6; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (197), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). FL: Almere (218b), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w); Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Katwijk (119), Loosduinen (119), Wassenaar (119), Wassenaar (Bierlap) (3), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Scheidingsven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond (129), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

***Gnaphosa leporina* (L. Koch, 1866)**

- *Gnaphosa leporina*; Chrysanthus et al. 1959: 182. Van Damme et al. 1959: 38. Van Helsdingen 1976: 37. Tutelaers 1978: 87. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxii. Koomen et al. 1996: xxiv. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a). GL: Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u). NB: NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Maasven) (215f), Waalre (Landschut) (230d). LI: Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

(*Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802))

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1885c: 125; 1890b: 195 (= *Gnaphosa montana* (L. Koch)).
Deze soort is niet uit ons land bekend.

(*Gnaphosa lugubris* (C. L. Koch, 1839))

- *Gnaphosa lugubris*; Van Hasselt 1885c: 125.

UT: Amersfoortse Berg (119). ZH: 's-Gravenhage (Haagse Bos) (119).

Het betreft hier uitsluitend juveniele exemplaren, die, zoals Van Hasselt al schreef, niet met zekerheid te determineren zijn. Zolang er geen nieuw materiaal van deze soort wordt gevonden wordt deze soort als niet in ons land voorkoend beschouwd.

***Gnaphosa montana* (L. Koch, 1866)**

- *Gnaphosa lucifuga*; Van Hasselt 1885c: 125; 1890b: 195.

GL: Arnhem (129). LI: Valkenburg (119).

***Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861)**

- *Drassus cognatus*; Becker 1881: xxviii. Van Hasselt 1885c: 129. Prinsen et al. 2009: 191.

GL: Bronckhorst/Veldwijk (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n). NB: Oirschot (11, 119). LI: Maastricht (119).

Van Hasselt citeerde slechts de opgave van Becker en een niet gepubliceerde waarneming van Maurissen. Beide zijn niet meer te controleren.

***Haplodrassus dalmatensis* (L. Koch, 1866)**

- *Drassus umbratilis*; Van Hasselt 1885c: 129.
- *Drassus minusculus*; Van Hasselt 1885c: 130.
- *Haplodrassus dalmatensis*; Van Heerdt et al. 1960: 236. De Bruyn 1996: 42. Vangsgård et al. 1996: 81. Koomen et al. 1993b: 217. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 22, 25, 57; 2003b: 910. Bonte 2006: 10, 12. Noordijk 2007: 2, 3. Noordijk et al. 2008b: 260. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.

W: (231a). FR: Terschelling (137), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: (119). GL: (119), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Hulshorst (Hulshorsterzand) (202d, 202o), Kootwijk (Caitwickerzand) (202d), Nunspeet (De Haere) (202d). UT: (119). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: (119), duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (182s²), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: (119), Cranendonck (230e). LI : Bergen (Maasduinen) (215m).

***Haplodrassus signifer* (C. L. Koch, 1839)**

- *Drassus troglodytes*; Van Hasselt 1885c: 129; 1890b: 205; 1898: 69. Becker 1896b: 258.
- *Drassodes signifer*; Chrysanthus 1953d: 88. Hulsenbos 1961: 2. Van der Aart et al. 1971: 119.
- *Haplodrassus signifer*; Van Damme et al. 1959: 37. Van Helsdingen 1976: 37; 1999b: 9; 2019b: 37. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 29; 2009c (www); 2017: 279. Koomen 1986: 202; 1992: xxvi; 1993: xxxii; 1994: xxxii; 1998a: xxxiv. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 109.

Hulsebos 1995: 5. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxiv; 2001: xxxix. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Koomen 1999: xxxiv. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 25; 2003b: 910. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 9, 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2009a: 6; 2010: 16. Noordijk et al. 2008b: 260. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (119, 129, 136). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f); Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 2020), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 2020), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 2020), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 2020), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Schoorl (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (Bierlap) (3), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d, 230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Azenray (50) Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Vierendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

- *Drassus infuscatus*; Van Hasselt 1885c: 130; 1890b: 196; 1898: 50. Van der Drift 1951: 120. Van Damme et al. 1959: 37. Hulsebos 1962: 233. Van Helsdingen 1976: 37.
- *Haplodrassus sylvestris*; Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxii; 1998a: xxxiv; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1999: 3; 2005: 25; 2009 (www). Prinsen 2002: 118; 2005: 112. Bonte et al. 2003a: 25. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2010: 16; 2012: 26. Tutelaars 2009c (www). Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26; 2011: 21. Van Helsdingen 2019b: 37. Vogels et al. 2023: 6. Wielink et al. 2020: 341.
- *Drassodes silvestris*; Mabelis 1996: 125.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: Terschelling (Huneplak) (182v). DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zweeloo (Mepperveld) (182f). OV: Twente (191b), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (129), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Hoenderloo (72), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (119), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: (119), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).. NB: Cranendonck (230e), Eersel (182t), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Nederweert (De Banen) (182m), Oisterwijk (136), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Brunsum (Brunsummerheide) (164n), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

- *Haplodrassus umbratilis*; Chrysanthus 1958b: 144. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202. Poot et al. 1989: 6. Noordam 1998: 112. Tutelaars 2000: 13; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 25; 2003b: 910. Prinsen 2005: 112. Bonte 2006: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2009: 6. Krediet, 2015b: 9.

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1885c: 129 (*Drassus umbratilis*) (= *Haplodrassus dalmatensis* (L. Koch)).

GL: Veluwe (201p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). NB: Cranendonck (230e). LI: Eys (De Piepert) (183r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Vlodrop (Meinweg) (64, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866)

Poecilochroa conspicua (L. Koch, 1866)

- Poecilochroa conspicua*; Becker 1879a: xlvi. Van Hasselt 1885c: 125; 1891: xli; 1893b: xxxii. Chrysanthus 1954b: 40.
- Kishidaia conspicua*; Noordijk 2005: 32, 33. Noordijk et al. 2008a: 82, 93. Versteeg et al. 2015: 2. Fleurbaaij 2024: 2.

OV: (119). GL: (7, 119), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Gerritsfles) (232n), Groesbeek (130). UT: (7, 119). NH: (119), Bergen (Noordhollands Duinreservaat) (75g). NB: De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (75g). LI: Horn (52), Lerop (52).

(Micaria albovittata (Lucas, 1846))

Micaria scintillans (O. P.-Cambridge, 1846)

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1885c: 124 (= *Micaria silesiaca* L. Koch).
De soort is niet uit ons land bekend.

Micaria dives (Lucas, 1846)

Micariolepis dives (Lucas, 1846)

- Micaria splendidissima*; Van Hasselt 1885c: 124.
- Micariolepis dives*; Chrysanthus 1953c: 113. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www).
- Micaria dives*; Bonte et al. 2003a: 22, 26, 57; 2003b: 910. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Tutelaers 2008: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.

NL: (49). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202o). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: Loosduinen (119), Scheveningen (119), Wassenaar (119). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d, 230p).

Micaria formicaria (Sundevall, 1831)

- Micaria formicaria*; Becker 1879a: xlvi. Chrysanthus 1954b: 40. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Van Helsdingen et al. 2012: 26.

UT: (7). NH: (7). ZH: (7). LI: Melick (52), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

- Micaria fulgens*; Six 1860: 22; 1863: 127 (*Macaria fulgens*). Becker 1879a: xlvi. Chrysanthus 1954b: 40. Van Helsdingen 1976: 37. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8; 2001e (www); 2008: 29. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Noordijk 2005: 33. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Wielink et al. 2020: 341.

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202o), Apeldoorn (Bremert) (202o). UT: (7), Driebergen (222a, 222b). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d, 230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Roggel (52), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839)

□ *Micaria guttulata*; Bonte et al. 2003a: 22, 26. Van Helsdingen 2005a: 18. Bonte 2006: 7, 12.

NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 149a).

***Micaria lenzi* Bösenberg, 1899**

□ *Micaria lenzi*; Noordam 1996: 7; 1998a: 128. De Bruyn 1996: 42. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.

GL: Barneveld (Kootwijkzand) (215m). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201p). LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

***Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831)**

□ *Macaria formosa*; Six 1858b: 297; 1858c: 20; 1863: 127.

□ *Micaria nitens*; Van Hasselt 1877: xxvii.

□ *Micaria pulicaria*; Van Hasselt 1885c: 124. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 239. Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1951g: 100; 1953c: 113. Van Helsdingen 1976: 37; 1999a: 6; 2003d: 22; 2019b: 37. Tutelaers 1978: 87; 2009c (www). Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1992: xxvi; 1993: xxxii; 1998a: xxxiv. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1996: xxiv; 1997: xxxvi. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Heuts 2001: 10. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 33; 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2009a: 6; 2009b: 17; 2010: 16; 2012: 26. Lambeets 2008: 13. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 22; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 13. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 341. Versteeg 2024: 11.

NL: (13b, 49), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Amelanderduin, Huneplak, Oosterend) (182v), Fochteloeरveen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119), Driebergen (219, 221, 222b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (222b). NH: Amsterdam (151u), Huizen (Gooise heide) (151u), Naarden (151u), Zaandstad (Geusveld, Zaandam) (232b). ZH: (119), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (119), Domburg (107). NB: (7, 119), Bladel (187a), Heeze (De Plaetse) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leempadden) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: (119), Brunssum (44), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

***Micaria silesiaca* L. Koch, 1875**

□ *Micaria scintillans*; Van Hasselt 1885c: 124.

□ *Micaria silesiaca*; Chrysanthus 1953c: 113. Noordijk 2005: 30, 33. Noordijk et al. 2008a: 82, 93; 2008b: 260. De Koninck 2010: 32. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.

NL: (49). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkzand) (215m), Elburg (de Haere) (202o). UT: (119). ZH: (119). NB: Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f). LI: (119).

***Micaria subopaca* (Westring, 1861)**

- *Micaria subopaca*; De Jong 1949b: 216. Chrysanthus 1958b: 144. Meijer 1973b: 26. Van Helsdingen 1976: 37. Koomen et al. 1995: xxix; 2001: xxxix. Noordijk et al. 2001: 20. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 112. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 18. Lambeets 2008: 14. IJland et al. 2011: 21.

FR: Ameland (196). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Emmen (202m). OV: Zwolle (202m). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NH: Egmond (182w), Huizen (169e), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Sint Michielsgestel (215f), Wintelre (182t). LI: Kerkrade (64), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Schinveld (Breukberg) (164n).

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)

- *Phaeocedus braccatus*; Tutelaers 1978: 86, 87; 2000: 8, 13, 17; 2001e (www); 2009c (www). Peeters 1984a: 180; 1985: 50. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxii. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 30, 33. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 82, 93; 2008b: 260. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 15. Wielink et al. 2020: 341. Versteeg 2024: 11.

DR: Ruinen (182f). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NB: Bladel (187a), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Landschut) (230d). LI: Beesel (204a, 204c).

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)

Herpyllus blackwallii (Thorell, 1871)

- *Drassus sericeus*; Six 1858b: 297. Snellen van Vollenhoven 1859: 59; 1868: 59.
- *Drassus quadripunctatus*; Becker 1879a: xlvi.
- *Drassus blackwallii*; Van Hasselt 1885c: 128; 1886c: 103.
- *Drassus gotlandicus*; Van Hasselt 1885c: 128.
- *Scotophaeus blackwalli*; Chrysanthus 1955c: 16. Hulsebos 1959: 253. Koomen et al. 1996: xxiv. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 18. Van 't Veer et al. 2012: 13.
- *Herpyllus blackwallii*; Hulsebos 1961: 2. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 6.

NL: (119, 222b, 224a). FR: Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Klazinaveen (160b), Mappel (160b), Zwartemeer (160b). GL: Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m). UT: (7), Driebergen (219). NH: Zaandam (232b). NB: Cranendonck (230e), Sint Michielsgestel (215f). LI: Jabeek (193b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Wellerlooi (55).

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Herpyllus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

- *Scotophaeus quadripunctatus*; Heuts 2001: 10.

Onjuiste vermelding: Becker 1879a: xlvi (*Drassus quadripunctatus*).

NH: Uithoorn (151u).

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)

Herpyllus scutulatus (L. Koch, 1866)

- *Drassus scutulatus*; Van Hasselt 1885c: 128.

NL: (119).

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

Zelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

- *Melanophora pedestris*; Van Hasselt 1877: xxvii.

- *Prosthesima pedestris*; Van Hasselt 1885c: 127; 1890b: 196. Becker 1881: xxviii; 1896b: 243.
- *Zelotes pedestris*; Chrysanthus 1958b: 144. Koomen 1986: 202; 1992: xxvi. Bonte et al. 2003a: 27, 60; 2003b: 911. Bonte 2006: 12.
- *Trachyzelotes pedestris*; Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Noordijk 2005: 30, 33; 2006b: 21; 2010: 745. Noordijk et al. 2008a: 93; 2009c: 22. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 6; 2010: 16; 2012: 26; 2015a: 5. IJland et al. 2010: 26. Krediet, 2015b: 9. Tutelaers 2017: 279. Van Helsdingen 2019b: 37. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (202s: wegbermen). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Arnhem (129), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Domburg (107), Middelburg (119). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (64, 202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), IJkhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (11, 13b, 119), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

(*Urozelotes rusticus* (L. Koch, 1872))

Zelotes rusticus (L. Koch, 1872).

- *Prosthesima rustica*; Van Hasselt 1885c: 128.

OV: (119).

Het voorkomen van deze soort in ons land is twijfelachtig te noemen. Het materiaal in de collectie Van Hasselt bestaat uitsluitend uit pulli. Ook Van Hasselt zelf twijfelde al aan zijn determinatie. Voorkomen van deze soort in Nederland niet vastgesteld.

***Zelotes aeneus* (Simon, 1878)**

- *Zelotes aeneus*; De Koninck 2010: 31.

NB: Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f).

(*Zelotes apricorum* (L. Koch, 1876))

Zie opmerking onder *Zelotes subterraneus*-complex.

***Zelotes electus* (C. L. Koch, 1839)**

- *Prosthesima electa*; Van Hasselt 1885c: 127.

Zelotes electus; Van Heerd et al. 1960: 263. Kessler-Geschiere 1965: 158. Van der Aart et al. 1971: 119. Meijer 1973b: 26. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 29. Koomen 1993: xxxii. De Bruyn 1996: 45. Faber et al. 1999: bijlage 2. Van Helsdingen 1999b: 9; 2003d: 22. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 23, 27, 59; 2003b: 911. Prinsen 2005: 112. Spoek 2005: 25. Noordijk 2005: 33; 2008: 31, 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260; 2010: 745. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (197), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (137), Terschelling (Hee-De Riesen) (215f), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Renkum (Laag-Wolfheze) (211i), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Katwijk (119), Loosduinen (119), Wassenaar (119), Wassenaar (Bierlap) (3), Wassenaar

(Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d, 230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

- *Prosthesima latreillei*; Van Hasselt 1885c: 126.
- *Zelotes latreillei*; Chrysanthus 1954b: 40. Van Damme et al. 1959: 37. Kessler-Geschiere 1965: 158; 2001: 15. Van der Aart et al. 1971: 119. Meijer 1973b: 26. Van Helsdingen 1976: 37. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2009c (www); 2017: 279. Koomen 1986: 202; 1993: xxxii. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 73. De Bruyn 1996: 45. Koomen et al. 1997: xxxvi. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Heuts 2001: 10. Bonte et al. 2003a: 23, 27; 2003b: 911. Prinsen 2005: 112. Prinsen et al. 2006: 88. Bonte 2006: 9, 12. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 22; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2011: 21. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (232w: heide hogere gronden), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (197), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (Huneplak, Kroonpolders, Oosterend) (182v). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Huizen (Gooise heide) (151u). ZH: (119), duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (Bierlap) (3), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Bladel (187a), Budel-Dorplein (215f), Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Arcen (52), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Schinveld (Breukberg) (164n).

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

Zelotes serotinus (L. Koch, 1866)

- *Prosthesima longipes*; Van Hasselt 1885c: 126. Chrysanthus 1954b: 40.
- *Prosthesima serotina*; Van Hasselt 1885c: 127.
- *Zelotes serotinus*; Van Heerdet et al. 1960: 236. Hulsebos 1962: 233 (p. p.). Van der Aart et al. 1971: 119. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13. Verstegen et al. 1992: 71, 74. Koomen 1993: xxxii. De Bruyn 1996: 44.
- *Zelotes petrensis*; Hulsebos 1962: 233 (p. p.).
- *Zelotes longipes*; Koomen et al. 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2005: 87. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Tutelaers 2001e (www); 2008: 25, 29. Bonte et al. 2003a: 23, 27, 60; 2003b: 911. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 12. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 19; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Helsdingen 2019b: 37. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (232o: heide hogere gronden). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (137), idem (Huneplak) (182v), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: (119), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Schoorl (182w), Texel (Den Burg, 't Mientje) (182y). ZH: (119), duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (Bierlap) (3), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d, 230p), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Horn (52).

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)

- Melanophora petrensis*; Van Hasselt 1882: xxvii; 1883a: xxxii.
- Prosthesima petrensis*; Van Hasselt 1885c: 126; 1891: xli. Becker 1896b: 246.
- Zelotes petrensis*; Chrysanthus 1953d: 88. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1996: xxiv. Siepel et al. 1996: 48, 53. Spoek 1997b: 6. Noordam 1998: 118. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 29; 2009c (www). Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 33. Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2008a: 93. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 15. Vogels 2014: 2; 2023: 6. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 233 (= *Zelotes serotinus* (L. Koch)).

DR: Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Nijverdal (NP Sallandse Heuvelrug) (236b). GL: (119), Veluwe (201p), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a) Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Groesbeek (130), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (112). FL: Almere (218b). UT: (119), Amersfoort (69n), tussen Hilversum en Amersfoort (13b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (119). ZH: (119). NB: Bladel (187a), Budel-Dorplein (215f), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: (119), Bergen (Maasduinen) (215m), Buggenum (50), Valkenburg (111).

Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)

Zelotes apricorum (L. Koch, 1833)

Onder dit collectivum zijn alle opgaven van *Zelotes apricorum* (L. Koch) en *Zelotes subterraneus* (C. L. Koch) samengevoegd. Het lijkt of er in Nederland slechts sprake is van één variabele soort.

- Phytonissa subterraneus*; Six 1863: 127.
- Prosthesima subterranea*; Becker 1879a: xlv.
- Melanophora subterranea*; Van Hasselt 1879b: xxiv.
- Prosthesima petiverii*; Van Hasselt 1885c: 126.
- Zelotes subterraneus*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 38. Meijer 1973b: 26 (p. p.). Meijer & Van Wingerden 1975: 137. Van Helsdingen 1976: 37; Van Helsdingen 2019b: 37. Tutelaers 1978: 87; 2017: 279. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 132. Koomen 1994: xxxii; 1998a: xxxiv. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2004: 206. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www); 2008: 29; 2009c (www). Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 27; 2003b: 911. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16; 2012: 26. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.
- Zelotes apricorum*; Meijer 1973b: 26 (p. p.). Deeleman-Reinhold 1990: 109. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www). IJland et al. 2010: 26.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196, 198v), Terschelling (Hoorn, Huneplak) (182v), idem (West-Terschelling) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: (14, 119), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). UT: (13a, 119), Driebergen (222b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (14, 119), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (14, 119), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Gorp en Rovert (211m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: (119), Eys (De Piepert) (183r),

Haelen (64), Heerlen (64), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Mook (109), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

HAHNIIDAE

Antistea elegans (Blackwall, 1841)

- *Hahnia elegans*; Van Hasselt 1885c: 148; 1890b: 197.
- *Antistea elegans*; Van Damme et al. 1959: 46. Chrysanthus 1961: 41. Kessler-Geschiere 1965: 159. Van Helsdingen 1976: 38; 1981a: 35; 2002a: 10; 2003d: 22; 2019: 47. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1994: xxxiii; 1996: 173, 218; 1998b: 225. Vangsgård et al. 1996: 81. Spoek 1997b: 7. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2006: 17; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 21. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

W: (231a). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (175a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Ermelo (Speulderveld) (150w2), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Zeister bos (119). NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Maasven en Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Heerlen (65), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Roermond (129).

Hahnia helveola Simon, 1875

- *Hahnia helveola*; Van Hasselt 1885c: 149; 1890b: 197; 1898: 59, 70. Schmitz 1915: 190. Van der Hammen 1947a: 289. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 46. Hulsebos 1962: 234. Van Helsdingen 1976: 38. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 28. Fokkema 1978: 100. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1998a: xxxv. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2005: 87. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25. Prinsen 2005: 113. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 21. Tutelaers et al. 2008: 12. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 11.

NL: (217z, in mierennesten). FR: Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 78), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: (136), Doorn (129), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Leende (Strijperheg) (230x), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Tongelreep) (230x), Valkenswaard (Dommeldal) (230x), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x), Vesse (Landschotse Heide) (182t), Waalre (Meelberg) (230d). LI: (136), Bergen (Maasduinen) (215m), Gennep (St. Jansberg) (119), Kerkrade (64), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (129), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

- *Hahnia nava*; Van Hasselt 1885c: 148 (p. p.). Van der Hammen 1947a: 287. Van Damme et al. 1959: 46. Hulsebos 1962: 234. Meijer 1973b: 28. Van Helsdingen 1976: 38; 2003d: 22. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 28. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 202. De Bruyn 1996: 46. Koomen et al. 2001: xxxix. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 25, 57; 2003b: 910. Spoek 2005: 26. Bonte 2006: 9, 13. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2009a: 6; 2010: 16. Lambeets 2008: 14. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. IJland et al. 2010: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (202s: wegbermen). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (174h), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: Driebergen ? (119), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Zaanstad (Jagresveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen ? (119), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Bladel (187a), Breda ? (119), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f, 230p), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Maasband (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Ter Hagen (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Hahnia ononidum Simon, 1875

- Hahnia nava*; Van Hasselt 1885c: 148 (p. p.).
- Hahnia ononidum*; Van der Hammen 1947a: 287. Van der Drift 1951: 120.

GL: Hoge Veluwe (772, 78).

Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841

- Hahnia pusilla*; Six 1863: 127. Becker 1879a: xlvi. Van Hasselt 1890b: 183. Chrysanthus 1961: 41. Van Helsdingen 1976: 38. Koomen 1986: 202. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 132. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 13. Van Helsdingen et al. 2009a: 6. IJland et al. 2010: 26. Tutelaers 2017: 279. Noordam 2024: 24.

UT: (7), Driebergen (222b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). NB: Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Heerlen (65), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Valkenburg (129), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Iberina candida (Simon, 1875)

Hahnia candida Simon, 1875

- Hahnia candida*; Noordam 1998: 273.

GL: Veluwe (201p).

Iberina montana (Blackwall, 1841)

Hahnia montana (Blackwall, 1841)

- Hahnia cacuminata*; Van der Hammen 1947a: 287 (is niet *Hahnia montana*). Chrysanthus 1958b: 144.
- Hahnia montana*; Chrysanthus 1961: 40. Hulsebos 1962: 234; 1995: 5. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1988: 135. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 132. Koomen 1993: xxxiii; 1998a: xxxv. Koomen et al. 1995: xxx; 2004: 207. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www); 2017: 279. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25; 2003b: 910. Prinsen 2005: 113. Bonte 2006: 9, 13. Roelofs-Ditters 2007: 21. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16; 2012: 26. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 26; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Fochteloeërveen (148e), Ooststellingwerf (75n). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Hoge Veluwe (78), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH:

duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Roggebotzand (174g), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x). LI: Heerlen (64), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Schinveld (Breukberg) (164n).

LINYPHIIDAE

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

- Abacoproeces saltuum*; Tutelaers 1978: 88, 89. Roelofs-Ditters 2007: 23. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Wielink et al. 2020: 342.

GL: Bronckhorst/Veldwijk (211n). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d).

Acartauchenius scurrilis (O.P.-Cambridge, 1873)

- Walckenaera scurrilis*; Van Hasselt 1886c: 107; 1890b: 187, 200, 209; 1898: 73.
- Acartauchenius scurrilis*; Wasmann 1899a: 63; 1899b: 18. Schmitz 1915: 190, 224. Van Helsdingen 1961: 250; 1963b: 15. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9; 2001e (www); 2008: 27. Noordam 1996: 16; 1998: 4. Koomen 1998a: xxxv. Bonte et al. 2003a: 24; 2003b: 910. Spoek 2005: 27. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 23. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 235 (= *Minyriolus pusillus* (Wider)) (zie 142).

NL: (217z, in mierennesten). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Valkeveen (122, 140, 142). ZH: (217z, in mierennesten), Loosduinen (129, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (201k, 201q). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p), Waalre (Landschut) (230d). LI: (136), Exaeten (243a, 243b), Valkenburg (243a, 243b).

Agyneta affinis (Kulczynski, 1898)

Meioneta affinis (Kulczynski, 1898), *Meioneta beata* (O.P.-Cambridge, 1907)

- Meioneta beata*; Van Helsdingen 1963b: 24; 1976: 40. Bosmans 1988: 33. Koomen et al. 1995: xxx. Spoek 1997b: 10. Van Helsdingen et al. 2012: 27.
- Meioneta affinis*; Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2008: 27; 2009c (www). Prinsen 2002: 119. Roelofs-Ditters 2007: 25.

GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). DR: Emmen (Bargerveen) (225b). GL: Apeldoorn (Wiessel) (142), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f, 230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Vasse (Landschotse Heide) (17r). LI: Heerlen (142), Herkenbosch (Meinweg) (150r).

Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1903)

- Agyneta cauta*; Hulsebos 1962: 235; 1964a: 95. Van Helsdingen 1963b: 24; 1984: 3. Hulsebos 1989: 23. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 16.

DR: Brandeveen (160d), Dwingeloo (160c, 160d, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f), Vught (Bleijendijk) (215f).

Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863)

- Agyneta conigera*; Van Helsdingen 1963b: 24; 1976: 40; 1984: 3. Kessler et al. 1988: 135. Versteegen et al. 1992: 73. Hulsebos 1995: 4, 5. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Koomen 1998a: xxxvi. Tutelaers

2000: 15; 2001e (www); 2009c (www). Bonte et al. 2003a: 24. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2012: 26. Van 't Veer et al. 2012: 15.

NL: (232w: heide hogere gronden). DR: Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Zaanstad (Reef, Euverenweg) (232b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s). LI: Herkenbosch (Meinweg) (150r).

Agyneta decora (O.P.-Cambridge, 1871)

□ *Agyneta decora*; Van Helsdingen 1963b: 24. Van Wingerden 1973: 208. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Bonte et al. 2003a: 24. Bonte 2006: 9, 13. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 19. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Lambregts et al. 2013: 18. Koomen 2015: 158. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (252). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). GL: Renkum (Reijerscamp) (150m). FL: Almere (218b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Texel (142). NB: Bladel (187a), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d).

Agyneta innotabilis (O.P.-Cambridge, 1863)

Meioneta innotabilis (O.P.-Cambridge, 1863), *Syedrula innotabilis* (O.P.-Cambridge, 1863)

□ *Neriene innotabilis*; Van Hasselt 1885c: 168; 1890b: 198 (beide p. p.).
□ *Syedrula innotabilis*; Chrysanthus 1954b: 39. Van Helsdingen 1961: 256; 1963b: 23; 1976: 40. Hulsebos 1962: 235.
□ *Meioneta innotabilis*; Koomen et al. 1995: xxx; 2001: xl; 2005: 88. Koomen 2000: xxxix. Noordijk et al. 2001: 27. Prinsen 2002: 119; 2005: 115. Van Helsdingen et al. 2009b: 17.

GR: Haren (202m), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). DR: Dwingeloo (160c). OV: Zwolle (202m). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (129), 's Heerenberg (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: Amsterdam (202m), Egmond (182w), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y). NB: Wintelre (182t). LI: Broekhuizen (52), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m).

Agyneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)

Meioneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)

□ *Meioneta mollis*; Van Helsdingen 1963b: 24. Koomen 1986: 203. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16.

NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). ZH: Brasemermeer (142), Nieuwkoopse Plassen (142), Zaanstad (Guisveld) (232b). NB: 's-Hertogenbosch (Moerputten) (215f). LI: Heerlen (142), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Agyneta ramosa Jackson, 1912

□ *Agyneta ramosa*; Van Helsdingen 1984: 3. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www).

NH: Kortenhoefse Plassen (147j). NB: Cranendonck (230e).

Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)

Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836)

□ *Micryphantes rurestris*; Van Hasselt 1872e: 461; 1873b: 62.
□ *Neriene fuscipalpis*; Van Hasselt 1885c: 169 (p. p.); 1886c: 107; 1890b: 208 (*Neriene fuscipalpis* s. *rurestris*).
□ *Microneta rurestris*; Becker 1896b: 72.

- *Meioneta rurestris*; Chrysanthus 1955c: 16. Van Helsdingen 1961: 256; 1963b: 24; 197: 40; 1981a: 38; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Hulsebos 1962: 235. Meijer 1973a: 179; 1977: 84, 85. Buizer 1982: 73. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203; 1992: xxviii; 1994: xxxiv. Bosmans 1988: 33. Poot et al. 1989: 7. Jacobs 1992: 133. Verstegen et al. 1992: 71. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 2004: 207. Siepel et al. 1996: 45, 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 42. Spoek 1997b: 10; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 27; 2009c (www). Heuts 2003: 8. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2010: 17. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.
- *Agyneta rurestris*; Van Helsdingen et al. 2015a: 5. Krediet, 2015b: 9. Bink 2016: 3. Tutelaers 2017: 277. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Helsdingen 2019b: 37. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: Lauwerszeepolder (195, 198c), Lauwersmeer (198u). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amsterdam (151w), Uithoorn (151w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (13b), Loosduinen (99, 101), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (25s), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreid) (231b), Middelburg (14). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (14), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), 's-Hertogenbosch (14), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Illikhoven (Visserweert) (186c), Kerkrade (55), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

***Agyneta saxatilis* (Blackwall, 1844)**

Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844)

- *Neriene saxatilis*; Van Hasselt 1885c: 168.
- *Neriene rustica*; Van Hasselt 1890b: 196.
- *Centromerus obscurus*; De Jong 1949b: 212. Van Helsdingen 1963b: 22.
- *Meioneta saxatilis*; Van Helsdingen 1961: 256; 1963b: 24; 1999b: 10. Meijer 1974: 172. Koomen 1986: 203; 1994: xxxiv. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 2001: xl. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 26. Prinsen 2005: 115; 2007: 142. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Van 't Veer et al. 2012: 16. Wielink et al. 2020: 342.
- *Agyneta saxatilis*; Wielink et al. 2020: 342.

OV: Steenwijk (De Eese) (197). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: Leersum (169e), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: Loosduinen (129). NB: Heeze (Kleine Dommel) (215f), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)

- *Agyneta subtilis*; Hulsebos 1962: 235; 1964a: 95. Van Helsdingen 1963b: 23; 1984: 3; 1997a: 116. Meijer 1973b: 29; 1974: 172. Kessler et al. 1988: 135. Spoek 1997b: 9; 1999: 4. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www). Noordijk et al. 2001: 27; 2009c: 22. Bonte et al. 2003a: 24. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Van 't Veer et al. 2012: 15. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196). DR: Dwingeloo (160c, 160d), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Oosterbeek (202m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b). ZH: Noordwijkerhout (142). NB: Cranendonck (215f, 230e), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d).

Allomengea scopigera (Grube, 1859)

- *Mengea scopigera*; De Jong 1949b: 214. Van Heerdet et al. 1967: 111.
- *Allomengea scopigera*; Van Helsdingen 1974: 302. Vangsgård et al. 1996: 81. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

W: (231a). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b), Terschelling (138, 169e).

Allomengea vidua (L. Koch, 1879)

- *Mengea warburtoni*; Chrysanthus et al. 1959: 184. Van Damme et al. 1959: 59. Hulsebos 1961: 4. Hulsebos 1961: 4 (p. p.). Van Helsdingen 1963b: 32; 1997a: 116; 2003d: 22.
- *Allomengea vidua*; Van Helsdingen 1974: 306; 1976: 41; 1999b: 102002a: 10,11. Spoek 1997b: 9. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Heuts et al. 2009: 28. IJland et al. 2010: 26. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: Lauwersmeer (198u). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Lievelde (160b). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Voorst (147), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (151z), Zwanenwater (148f).

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)

Lepthyphantes angulipalpis (Westring, 1851)

- *Lepthyphantes angulipalpis*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Helsdingen 1963b: 28. Jacobs 1992: 132. Spoek 1999: 4.

DR: Emmen (Oevermansbosje) (225c). L: Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Wellerloo (62).

Aphileta misera (O.P.-Cambridge, 1882)

- *Hillhousia misera*; Van Helsdingen 1963b: 30.
- *Aphileta misera*; Van Helsdingen 1976: 40; 1981a: 37; 1999a: 7. Meijer 1976a: 7. Joosten 1985: 25. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Versteegen et al. 1992: 74. Spoek 1997a: 4; 2005: 27. Spoek 1997b: 9. Koomen 1998a: xxvi; 2015: 158. Prinsen 2007: 142. Herkenbosch (Meinweg) (150r). Meijer & Barendrecht 2018: 128.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg) (183a), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a, 225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a). NB: Bladel (Cartierheide) (211m). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147f, 170), Ospel (Grote Peel) (147a, 170), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)

- *Araeoncus crassiceps*; Van Helsdingen 1963b: 9; 1976: 40. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1993: xxxiii; 2015: 158. Spoek 1997b: 5; 2005: 27. Kessler-Geschiere 2001: 15; 2003: 12. Roelofs-Ditters 2007: 23.

Onjuiste vermeldingen: Chrysanthus et al. 1959: 183 (= *Diplocephalus permixtus* (O.P.-Cambridge)); Van Damme et al. 1959: 54 (= *Diplocephalus permixtus* (O.P.-Cambridge)) (zie142).

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg) (183a), Schiermonnikoog (174h). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). ZH: Nieuwkoop (142). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven en Waschven) (215f).

***Araeoncus humilis* (Blackwall, 1841)**

- *Walckenaera humilis*; Van Hasselt 1885c: 171; 1890b: 199.
- *Walckenaera sarcinata*; Van Hasselt 1890b: 189.
- *Araeoncus humilis*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Helsdingen 1961: 245; 1963b: 9. Van Heerd़t et al. 1967: 111. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2008: 27; 2017: 277. Bonte et al. 2003a: 21, 24; 2003b: 910. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 19; 2010: 16. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 17. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Terschelling (138). DR: Assen (119, 140, 142), Borger (Drouwenerzand) (215m). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (129, 140, 142), Nootdorp (129, 140, 142). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Cuijk (129, 140, 142), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Wellerloo (62, 142).

***Asthenargus paganus* (Simon, 1884)**

- *Asthenargus paganus*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 54. Hulsebos 1962: 235; 1995: 5. Van Helsdingen 1963b: 19; 1976: 40. Kessler-Geschiere 1965: 159. Meijer 1980b: 19. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 27. Tutelaers 2001e (www). Van Helsdingen et al. 2009a: 6; 2009b: 17. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: Lauwerszeepolder (198f), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (175a), Terschelling (69b, 70d). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NB: Cranendonck (230j). LI: Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

***Baryphyma maritimum* (Crocker & Parker, 1970)**

Minyrioloides maritimus Crocker & Parker, 1970

- *Hypomma bituberculatum*; Van Heerd़t et al. 1960: 234; 1967: 111.
- *Minyrioloides trifrons*; Van Helsdingen 1963b: 13.
- *Minyrioloides maritimus*; Meijer et al. 1975: 139.
- *Baryphyma maritima/mum*; Noordam 1996: 12. Vangsgård et al. 1996: 81. Van Helsdingen 2019b: 37.

W: (231a). FR: Ameland (Hollum) (198v), Schiermonnikoog (198v), Terschelling (137, 138, 142, 198v). ZH: Wassenaar (Meijendel) (201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).

***Baryphyma pratense* (Blackwall, 1861)**

- *Baryphyma pratense*; Hulsebos 1962: 235; 1964a: 94. Van Helsdingen 1963b: 9; 2003d: 22. Spoek 1997b: 8. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: 34; 2001: 46. Van Helsdingen et al. 2008: 19. Lambeets 2008: 10, 13. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22.

DR: Dwingeloo (142, 160c, 160d), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

Baryphyma trifrons (O.P.-Cambridge, 1863)

Minyriolooides trifrons (O.P.-Cambridge, 1863)

- Walckenaera trifrons*; Van Hasselt 1885c: 174.
- Walckenaera altifrons*; Van Hasselt 1885c: 176 (p. p.); 1890b: 200; 1898: 54.
- Minyriolooides trifrons*; Van Helsdingen 1961: 248; 1963b: 13; 1984: 3. Meijer 1974: 172.
- Baryphyma trifrons*; Kessler-Geschier 2001: 15; 2003: 12. Koomen 2010: 210. Van 't Veer et al. 2012: 15.

OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). FL: Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: Zeist ? (119). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Westzaan, Euverenweg) (232b). ZH: Loosduinen (119, 140, 142), Scheveningen (119, 140, 142), Wassenaar ? (119). ZE: Zierikzee ? (129).

Bathyphantes approximatus (O.P.-Cambridge, 1871)

- Linyphia approximata*; Thorell 1875b: 20. Van Hasselt 1885c: 182; 1886c: 109; 1890b: 201 (alle p. p.).
- Bathyphantes approximatus*; Chrysanthus 1955a: 16. Van Damme et al. 1959: 57. Van Helsdingen 1961: 261; 1963b: 31; 1976: 41; 1980: 36; 1984: 3; 1997a: 116; 2002b: 11; 2003d: 22. Meijer 1974: 172. Hulsebos 1995: 5. Siepel et al. 1996: 46, 47, 50, 53. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2006: 16; 2009c (www). Kessler-Geschier 2001: 15; 2003: 12. Roelofs-Ditters 2007: 23. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 26. Van Helsdingen et al. 2010: 16; 2012: 26. Van 't Veer et al. 2012: 16. Vogels 2019: 28. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (229). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Noordvaarder) (182v). DR: Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Veenhuizen ? (119, 140), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Reijerscamp) (150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld, Noordzeekanaal) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), 's Gravenhage ? (122). NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (236c), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Heerlen (55), Helenaveen (147f), idem (Mariapeel) (147f), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Liesselse Peel (147f), Roermond ? (129, 140).

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

- Linyphia vilis*; Thorell 1875a: 87; 1875b: 30. Van Hasselt 1885c: 182.
- Linyphia circumspecta*; Van Hasselt 1885c: 182; 1886c: 109.
- Linyphia parvula*; Van Hasselt 1885c: 184 (p. p.).
- Lepthyphantes ericaea*; Van Hasselt 1886c: 108 (p. p.).
- Bathyphantes gracilis*; Becker 1896b: 57. Van der Hammen 1949a: 79. Chrysanthus 1954b: 39. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1961: 260; 1963b: 30; 1976: 41; 1984: 3; 1997a: 116; 1999a: 7; 2002a: 10, 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 37. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23; 1995: 5. Meijer 1973a: 179; 1973b: 30; 1974: 172; 1976a: 7; 1977: 84, 85, 88; 1979: 49; 1980a: 229; 1980b: 20. Fokkema 1978: 100; 1980: 72. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203; 1991: xix; 1996: 173, 218; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 158. Bosmans 1988: 32. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxvii;

2004: 207; 2005: 88. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 57. De Bruyn 1996: 45. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 16; 2008: 27; 2009c (www); 2017: 277. Kessler-Geschiere 2001: 15; 2003: 12. Prinsen 2002: 119; 2005: 115; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Bonte et al. 2003a: 21, 24. Bonte 2006: 9, 13. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2009a: 6; 2009b: 17; 2010: 16; 2013: 25; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 18. Van Klink 2015: 195. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

- Bathyphantes nigrinus*; Chrysanthus 1953d: 88 (p. p.).
- Bathyphantes parvulus*; Chrysanthus 1958b: 143. Van Damme et al. 1959: 57.

NL: (228, 229). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Eenrum (Pieterburen) (182k), Lauwerszeepolder (195, 198b, 198d, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: (75r), Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 180b), Terschelling (137), idem (Koegelwieck, Kroonpolders, Midsland, Noordvaarder, Oosterend, Seeryp) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: (119), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nijmegen (122, 140), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: (119), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (in kas) (81), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: (122), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Mokbaai) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b). ZH: (119), duinen (AWD) (17a, 17b), Ackerdijkse Plassen (148j), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (119), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (13b), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e, 230k), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Ulvenhout (St. Anna-bosch) (215f). Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: (122), Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c) Bergen (Maasduinen) (215m), Broekhuizen (52), Bunde (50, 52), Eys (De Piepert) (183r), Grevenbicht (52), Gronsveld (52), Heerlen (64, 202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Illikhoven (Visserweert) (186c), Kerkrade (64), Maastricht (13b, 64), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)

- Linyphia nigrina*; Van Hasselt 1885c: 182 (p. p.).
- Linyphia approximata*; Van Hasselt 1885c: 182; 1890b: 201 (beide p. p.).
- Bathyphantes nigrinus*; Chrysanthus 1953d: 88 (p. p.). Van Helsdingen 1961: 260; 1963b: 31; 1984: 3; 1987: 187; 1997a: 116; 2003d: 22. Hulsebos 1989: 23. Koomen 1991: xix; 1994: xxxiv; 2000: xxviii; 2010: 210. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxx; 2004: 207. Noordam 1996: 7. De Bruyn 1996: 49. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2006: 16; 2009c (www); 2017: 277. Prinsen 2005:

115. Roelofs-Ditters 2007: 23. Tutelaers et al. 2008: 12. Lambeets 2008: 14. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22. IJland et al. 2010: 27. Noordam 2024: 25.

DR: Dwingeloo (160f), Veenhuizen ? (119, 140). OV: Haaksbergen (182d), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). ZH: 's Gravenhage ? (119, 140), Wassenaar ? (119, 140), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (215f, 230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Valkenswaard (Het Heike) (230x), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x). LI: Bunde (50), Grevenbicht (50), Gulpen (Waterop) (147o), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht (50), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roermond ? (129, 140), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Thorn (Koningssteen) (182m).

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)

- *Linyphia parvula*; Van Hasselt 1885c: 184 (p. p.); 1886c: 109.
- *Bathyphantes parvulus*; Van Helsdingen 1961: 260; 1963b: 30; 1976: 41; 1984: 3; 1997a: 116; 1999a: 7; 2003d: 22. Van Heerdt et al. 1976: 111. Meijer 1973b: 30; 1974: 172. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 203; 1993: xxxiv; 1999: xxxv. Poot et al. 1989: 7. Hulsebos 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxx; 2001: xl. Siepel et al. 1996: 46, 47, 50, 53. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Kessler-Geschiere 2001: 15; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 24. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 13. Tutelaers 2006: 16; 2017: 277. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermeldingen: Chrysanthus 1958b: 143 (= *Bathyphantes gracilis* (Blackwall)). Van Damme et al. 1959: 57 (= *Bathyphantes gracilis* (Blackwall)) (zie 142).

GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u), Leens (182k). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (174h), Terschelling (138), Fochteloeरveen (148e), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160f, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m), Steenwijk (De Eese) (197). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen, Hoog Soeren, Wiessel) (142, 147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaandstad (Euveneweg, Reef) (232b). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 142). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Bathyphantes setiger F.O.P.-Cambridge, 1894

- *Bathyphantes setiger*; Chrysanthus 1961: 40. Van Helsdingen 1963b: 31; 1981a: 36. Bosmans 1988: 32. Koomen 1993: xxxiv. Koomen et al. 1995: xxx. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Prinsen 2007: 142.

DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). NB: Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Vasse (Landschotse Heide) (17r). LI: Deurnese Peel (147f), Griendtsveen (300-bunders) (147f), Heerlen (65), Liesselse Peel (147f), Ospel (Grote Peel) (147f), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m).

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833)

- *Linyphia luteola*; Van Hasselt 1885c: 181; 1890b: 201.
- *Bolyphantes luteolus*; Van Heerd et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1961: 257; 1963b: 26; 1976: 41. Meijer 1973b: 30. Koomen et al. 1996: xxvi. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 9. Heuts et al. 2009: 28.

FR: Ameland (196), Terschelling (137). DR: Emmen (Bargerveen) (225b). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Winterswijk (129). NH: Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Uithoorn (Libellenbos) (151z). ZH: Loosduinen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b).

Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927)

- *Carorita limnaea*; Koomen 1999: xxxv. Koomen et al., 2004: 207.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k). OV: Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x).

Caviphantes saxetorum (Hull, 1916)

- *Caviphantes saxetorum*; Lambeets 2008: 10, 13.

LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

- *Linyphia bicolor*, Van Hasselt 1885c: 183 (p. p.).
- *Centromerita bicolor*; Van Damme et al. 1959: 56. Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 22; 1976: 40; 1997a: 117; 2003d: 22; Van Helsdingen 2019b: 37. Hulsebos 1962: 235. Van Wingerden 1973: 208; 1977: 110; 1980: 91. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Vugts et al. 1976: 437. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2008: 27. Fokkema 1978: 100. Buizer 1982: 73. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 203; 1998b: 225. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Siepel et al. 1996: 45, 47, 51, 53. De Bruyn 1996: 43. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Heuts 2001: 11. Kessler-Geschier 2001: 15; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 24. Bonte 2006: 13. Tutelaers 2006: 16. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16. Wielink et al. 2009: 221. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1958b: 143 (= *Centromerita concinna* (Thorell)) (zie 68, 142).

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (174h, 210a, 239v, 253, 254a, 254b), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (151u), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: Loosduinen (119), Rotterdam (25s), Wassenaar (119), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Bergen (Maasdijken) (215m), Heerlen (202c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Centromerita concinna (Thorell, 1875)

- Linyphia concinna*; Van Hasselt 1885c: 183; 1890b: 201; 1898: 54.
- Centromerita bicolor*; Chrysanthus 1958b: 143.
- Centromerita concinna*; Chrysanthus 1958b: 143; 1966: 156. Van Damme et al. 1959: 56. Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 23; 1976: 40. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23; 1995: 5. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2008: 25, 27; 2009c (www). Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203; 1999: xxxv. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Noordam 1996: 6, 16. De Bruyn 1996: 45. Berg 1997: 162. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 24. Bonte 2006: 10, 13. Roelofs-Ditters 2007: 23. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 18. Wielink et al. 2020: 342.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Terschelling (Huneplak) (182v), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: (119), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160c, 160h), Dwingeloo (160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Wekerom (16b). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Texel (136), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Kunrade (64), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond (129), Schin op Geul (64), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Centromerus arcanus (O.P.-Cambridge, 1873)

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1890b: 191 (= *Centromerus incilium* (L. Koch)) (zie 140).

- Centromerus arcanus*; Van Helsdingen et al. 2012: 29.

LI: Herkenbosch (Meinweg) (150r).

Centromerus brevipalpus (Menge, 1866)

Centromerus brevivulvatus Dahl, 1912

Centromerus aequalis (Westring, 1851)

- Neriene brevipalpa*; Van Hasselt 1898: 47.
- Centromerus aequalis*; Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 21. Chrysanthus 1966: 156. Jacobs 1992: 132. Noordam 1996: 17. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Koomen 1998b: 225. Noordam et al. 1998: 344. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Heuts 2001: 11.
- Centromerus brevivulvatus*; Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Roelofs-Ditters 2007: 23. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 15, 19; 2010: 16. Prinsen et al. 2009: 191. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Bronckhorst/Veldwijk (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). NH: Huizen (Gooise heide) (151u), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen (136), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201z). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Leende (Strijperheg) (230x), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Udenhout (De Brand) (182j), Veldhoven (Run) (230x), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Heerlen (68), Nijswiller (142), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875)

- Neriene diluta*; Van Hasselt 1890b: 186.

- Sintula diluta*; Becker 1896b: 74.

- Centromerus dilutus*; Van der Drift 1951: 120. Van Damme et al. 1959: 56 (p. p.). Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 22; 1976: 40; 1999a: 7. Hulsebos 1962: 235 (p. p.); 1995: 5. Meijer 1973b: 30. Tutelaers

1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2009c (www); 2017: 277. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1984: 262; 1988: 135. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen 1993: xxxiv. Berg 1997: 162. Koomen et al. 1997: xxvii; 2001: xl. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 24. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2009b: 17; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 11.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (174h), Terschelling (Huneplak) (182v), Fochteloërvéen (148e), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenveld) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (129), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Roggebotzand (174g), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (13b), Tilburg (Kaaistoe) (71p, 250d), Waalre (Meelberg) (230d) (Heezerven) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Roermond (129).

Centromerus incilium (L. Koch, 1881)

- *Linyphia arcana*; Van Hasselt 1890b: 191.
- *Centromerus incilium*; Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 21; 2019b: 37. Noordam 1996: 18. De Bruyn 1996: 45. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Noordam et al. 1998: 344. Bonte et al. 2003a: 21, 24; 2003b: 910. Bonte 2006: 9, 13. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Versteeg 2023: 15.

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Apeldoorn/Ede (Hoge Veluwe) (232o). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Roermond (129).

Centromerus leruthi Fage, 1933

- *Centromerus leruthi*; Koomen 1986: 203. Van Helsdingen et al. 2009a: 7.

L: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Centromerus levitarsis (Simon, 1884)

- *Centromerus levitarsis*; Van Helsdingen 1963b: 22. Spoek 1997b: 9; 2005: 27.

DR: Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (142, 225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d).

(Centromerus obscurus Bösenberg, 1902)

Onjuiste vermelding: De Jong 1949b: 212 (= *Meioneta saxatilis* (Blackwall)) (zie 142).
De soort is niet in Nederland gevonden.

Centromerus pabulator (O.P.-Cambridge, 1875)

- *Centromerus pabulator*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Helsdingen 1963b: 21. Tutelaers 1978: 88; 2008: 27. Koomen 1986: 203. Siepel et al. 1996: 52. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Prinsen 2005: 115. Van Helsdingen et al. 2008: 15, 19; 2010: 16. Lambregts et al. 2013: 18.

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b). FL: Almere (218b). NB: Bladel (187a),

Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Waalre (Landschut) (230d). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Wellerlooi (62).

Centromerus persimilis (O.P.-Cambridge, 1912)

- Centromerus persimilis*; Kronestedt 1968: 127. Alderweireldt 1987: 18-20. Kessler-Geschiere 2001: 15; 2003: 12.

NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (4a, 184).

Centromerus prudens (O.P.-Cambridge, 1873)

- Linyphia prudens*; Van Hasselt 1885c: 183; 1890b: 209.
- Neriene electa*; Van Hasselt 1890b: 186.
- Centromerus sylvaticus*; Chrysanthus 1953d: 88.
- Centromerus prudens*; Van Hasselt 1954b: 40. Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 21. Hulsebos 1962: 235. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www). Deeleman-Reinhold 1990: 110. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Noordam et al. 1998: 344. Bonte et al. 2003a: 24. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 19. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Lambregts et al. 2013: 18. Versteeg 2023: 15. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Apeldoord/Ede (Hoge Veluwe) (232o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Reijerscamp) (150m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: Loosduinen (119), Monster (119), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Roermond (129), Haelen (50).

Centromerus semiater (L. Koch, 1879)

Centromerus alnicola Schenkel, 1936

- Centromerus alnicola*; Van Helsdingen 1963b: 22; 1981a: 36.
- Centromerus incultus*; Spoek 2005: 27.
- Centromerus semiater*; Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers 2009c (www). Van 't Veer et al. 2012: 16.

DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). NH: Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: Brasemermeer (142). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Oisterwijk (247). LI: Deurnese Peel (147f), IJsselsteyn (147f), Liesselse Peel (147f).

Centromerus serratus (O.P.-Cambridge, 1875)

- Centromerus serratus*; Van Helsdingen 1963b: 21. Chrysanthus 1966: 156. Jacobs 1992: 132.

L: Gronsveld (142), Heerlen (68), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

- Neriene sylvatica*; Van Hasselt 1890b: 185; 1898: 53.
- Tmeticus sylvaticus*; Becker 1896b: 68.
- Centromerus sylvaticus*; Heselhaus 1915: 273. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1958b: 143. Van Damme et al. 1959: 55. Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 21; 1976: 40; 1997a: 117; 2019b: 37. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Fokkema 1978: 100. Koomen 1986: 203; 1994: xxxiv; 1998a: xxxvi. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Noordam 1996: 7. Siepel et al. 1996: 46, 47, 51, 53. De Bruyn 1996: 48. Mabelis 1996: 128. Berg 1997: 162. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2001: xl. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Noordam et al. 1998: 344. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www). Kessler-Geschiere 2001: 15; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 25. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 9, 13. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 19; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 16. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1953d: 88 (= *Centromerus prudens* (O.P.-Cambridge)) (zie 52, 142).

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Huneplak, Oosterend) (182v), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160c, 160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Twente (191b), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaanstad (Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: 's-Gravenhage (Haagse Bos) (136), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).. NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Leende (Strijperheg) (230x), Ossendrecht (Leemptputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Tongelreep) (230x). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Colmond (64), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (129), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Ceraticelus bulbosus (Emerton, 1882)

Ceraticelus bulbosus; Van Helsdingen 1995a: 1. Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 8.

DR: Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (147w, 225a, 225b).

Ceratinella brevipes (Westring, 1851)

Walckenaera brevipes; Van Hasselt 1885c: 170.
 Ceratinella brevipes; Van Helsdingen 1961: 243; 1963b: 5; 2019b: 37. Meijer 1973b: 28. Kessler et al. 1984: 262. Peeters 1985: 50. Koomen 1986: 202; 1994: xxxiii. Poot et al. 1989: 6. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2001: xl. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Kessler-Geschiere 2001: 15; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Tutelaars 2006: 16; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 19; 2009b: 17. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (174h), Terschelling (Midsland, Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c). GL: Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Driebergen ? (119, 140, 142), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Brasemermeer (142), Scheveningen ? (119, 140, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Breda ? (119, 140, 142), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Reuver (204c), Roosteren (Schansberg) (186c).

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

Micryphantes phaeopus; Six 1858b: 295.
 Linyphia phaeopus; Six 1863: 126.
 Erigone brevis; Becker 1879a: xliv.
 Walckenaera scabrosa; Van Hasselt 1885c: 170.
 Walckenaera obscura; Van Hasselt 1885c: 173 (p. p.); 1890b: 199 (p. p.).
 Ceratinella brevis; De Jong 1949b: 214. Van Helsdingen, 1961: 243; 1963b: 5; 1976: 39. Chrysanthus 1966: 156. Koomen 1986: 202; 1994: xxxiii. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Berg 1997: 162. Spoek

1997b: 8; 2005: 27. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Prinsen 2005: 114. Tutelaers 2006: 16; 2009 (www). Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 11.

DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a), Barneveld (Gerritsfles) (142), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wageningen ? (119, 140, 142), Wekerom (16b), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Utrecht ? (7, 220, 222b). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Naardermeer (142, 169e). ZH: 's-Gravensande ? (129, 140, 142). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Bladel (187a), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Heerlen (68, 202c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond ? (129, 140, 142).

Ceratinella scabrosa (O.P.-Cambridge, 1871)

- Walckenaera scabrosa*; Van Hasselt 1885c: 170 (p. p.).
- Ceratinella scabrosa*; Chrysanthus 1961: 40. Van Helsdingen 1961: 243; 1963b: 5; 1984: 2; 2019b: 37. Koomen 1986: 202; 1999: xxxv. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. De Bruyn 1996: 50. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. IJland et al. 2010: 27. Tutelaers 2017: 277. Noordam 2024: 24.

NL: (119). GR: Leens (182k). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v). LI: Heerlen (65), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)

- Walckenaera scabricula*; Van Hasselt 1885c: 172 (p. p.).
- Walckenaera obscura*; Van Hasselt, 173 (p. p.); 1890b: 199 (p. p.).
- Crustulina guttata*; Van Damme et al. 1959: 47.
- Cnephalocotes obscurus*; Van Damme et al. 1959: 52. Hulsebos 1961: 4; 1989: 23. Van Helsdingen 1961: 249; 1963b: 13; 1976: 40. Meijer 1973b: 29. Tutelaers 1978: 88; 2008: 27. Buizer 1982: 74. Koomen 1986: 202. Deeleman-Reinhold 1990: 110. De Bruyn 1996: 44. Spoek 1997b: 8; 2005: 27. Noordam et al. 1998: 344. Koomen et al. 2001: xl. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 9, 13. Noordijk 2006b: 21. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 16; 2012: 26. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Bink 2016: 3. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196). DR: Dwingeloo (160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Wijster (142, 160b). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). GL: Renkum (Reijerscamp) (150o), Wageningen ? (119, 140, 142). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaandstad (Euverenweg, Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravensande ? (119, 140, 142), Loosduinen ? (119, 140, 142), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (25s), Scheveningen (119, 140, 142), Wassenaar ? (119, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z). NB: Bladel (187a), Heeze (Heezerveen) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond ? (129, 140, 142), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Collinsia distincta (Simon, 1884)

Halorates distinctus (Simon, 1884)

- *Collinsia distincta*; Van Helsdingen 1963b: 16; 1997a: 117; 2002a: 10,11; 2003d: 22. Ma et al. 1997: 76. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Lambeets 2008: 10, 13. Noordijk et al. 2009c: 22. IJland et al. 2010: 27. *Halorates distinctus*; Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46.

GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Voorst (142), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NB: Cranendonck (230e). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Obbicht - Grevenbicht (186c), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

***Collinsia inerrans* (O.P.-Cambridge, 1885)**

Milleriana inerrans (O.P.-Cambridge, 1885)

- *Milleriana inerrans*; Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46.
- *Collinsia inerrans* Van Helsdingen 2002a: 10,11; 2003d: 22. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 15, 17, 20; 2010: 16; 2015a: 5. Tutelaers 2008: 27. Lambeets 2008: 13. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Koomen Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a). Wielink et al. 2020: 342.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Smilde (boswachterij Smilde) (183a). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), 's-Hertogenbosch (Moerputten) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Illikhoven (Visserweert) (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roosteren (Schansberg) (186c).

***Dicymbium brevisetosum* Locket, 1962**

- *Dicymbium nigrum*; Chrysanthus 1954b: 40.
- *Dicymbium nigrum brevisetosum*; Locket 1962: 7, 8. Koomen 1986: 202. Roelofs-Ditters 2007: 24. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6.
- *Dicymbium brevisetosum*; Van Helsdingen 1997a: 117.

GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (52, 190).

***Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834)**

- *Neriene nigra*; Van Hasselt 1855c: 163 (p. p.).
- *Dicymbium nigrum*; Van Helsdingen 1961: 245; 1963b: 8; 1976: 39; 1997a: 117; 2003d: 22; 2019b: 37. Locket 1962: 7, 8. Meijer 1973b: 29; 1974: 172. Buizer 1982: 74. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 51, 53. Spoek 1997b: 8; 2005: 27. Koomen 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii. Koomen et al. 2001: xl. Kessler-Geschier 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 13. Prinsen et al. 2006: 89. Tutelaers 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2010: 16; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1954b: 40 (= *Dicymbium brevisetosum* Locket) (zie 190).

NL: (119). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Renkum

(Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Zaanstad (Guisveld, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Rotterdam (25s), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (190), IJkhoven (Visserweert) (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836)

□ *Dicymbium tibiale*; Chrysanthus 1961: 40. Van Helsdingen 1963b: 8; 1997a: 117; 2002a: 10; 2003d: 22. Poot et al. 1989: 6. Koomen et al. 1997: xxxvii. Ma et al. 1997: 76. Tutelaers 2006: 16. Tutelaers et al. 2008: 12. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Van Helsdingen et al. 2010: 17. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

FR: Terschelling (Midsland, Noordvaarder) (182v). GL: uiterwaarden Waal (191a), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Leende (Strijperheg) (230x), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Het Heike) (230x). LI: Heerlen (65, 142), IJkhoven (Visserweert) (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Obbicht - Grevenbicht (186c), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

Diplocephalus graecus (O.P.-Cambridge, 1873)

□ *Diplocephalus graecus*; Kocsis et al. 2024: 7. Sies 2024: 103.

ZE: Oosterscheldekering (landzijde, tussen Roompotsluis en Matenhaven) (218d). NB: Roosendaal (Heerle) (181c). LI: Elsloo (218d).

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)

□ *Walckenaera cristata*; Van Hasselt 1885c: 172; 1898: 61.
 □ *Diplocephalus cristatus*; Van der Hammen 1949a: 78; 1950: 110. Chrysanthus 1958b: 144. Hulsebos 19591973b: 254; 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 252; 1963b: 17; 1997a: 117; 2002a: 10; 2003d: 22. Meijer: 29. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1996: xxvi; 2004: 207; 2005: 88. Siepel et al. 1996: 45, 51, 53. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Heuts 2001: 11. Spoek 2005: 27. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17; 2010: 17; 2013: 26. Lambeets 2008: 13. IJland et al. 2010: 27. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (142, 160a). DR: Dwingeloo (142, 160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (119, 140), Baarn (in kas) (81, 142), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (151u), Uithoorn (151u), Texel ('t Horntje) (182y). ZH: (119, 140), Delft (in kas) (81, 142), 's-Gravenhage (136), Leiden (in kas) (81, 142), Schiedam (in kas) (81, 142). NB: Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), IJkhoven (Visserweert) (186c), Kunrade (64, 142), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Sint Pietersberg (in grot) (83, 142).

Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambridge, 1863)

□ *Walckenaera latifrons*; Van Hasselt 1885c: 174.
 □ *Diplocephalus latifrons*; Van Helsdingen 1961: 252; 1963b: 17; 2019b: 37. Chrysanthus 1966: 156. Koomen 1986: 202; 1999: xxxv. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. De Bruyn 1996: 50. Koomen et al.

2001: xl; 2004: 207. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 13. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Leens (182k). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: Wageningen ? (119, 140, 142). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: 's-Gravenhage ? (119, 140, 142), Loosduinen ? (119, 140), Scheveningen ? (119, 140), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Heerlen (68), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Diplocephalus permixtus (O.P.-Cambridge, 1871)

- Araeoncus crassiceps*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 54.
- Diplocephalus permixtus*; Van Helsdingen 1963b: 17; 1976: 40; 1981a: 36; 1984: 2. Kessler-Geschiere 1965: 159; 2001: 16; 2003: 12. Chrysanthus 1966: 156. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Spoek 1997b: 8. Spoek 2005: 27. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20. Lambeets 2008: 14. Van 't Veer et al. 2012: 16. Koomen 2015: 158. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (174h, 175a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). GL: Renkum (Reijerscamp) (150m), Winterswijk (142). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Guisveld) (232b). NB: Breda (Kogelvanger) (215f). LI: Deurne (Deurnese peel (147f), Griendtsveen (300-bunders) (147f), Heerlen (68), Helenaveen (Mariapeel) (147f), IJsselsteyn (Paardekop) (147f), Liessel (Liesselse Peel) (147f), Ospel (Grote Peel) (147f), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

- Walckenaera picina*; Van Hasselt 1885c: 175; 1890b: 199.
- Walckenaera flavipes*; Van Hasselt 1898: 48.
- Diplocephalus picinus*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Helsdingen 1961: 252; 1963b: 17; 1976: 40; 1984: 3; 1999b: 10; 2019b: 37. Meijer 1974: 172; 1976b: 251. Fokkema 1978: 100. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1994: xxxiii; 1999: xxv; 2000: xxviii. Hulsebos 1989: 23; 1990: 155. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 1997: xxvii; 2001: xl. Siepel et al. 1996: 52, 53. De Bruyn 1996: 50. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 27. Simon Thomas et al. 2000: 5. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Noordijk et al. 2001: 27. Bonte et al. 2003a: 21. Prinsen 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17; 2010: 17; 2013: 26. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Tutelaers 2017: 277. Vogels 2019: 28, 30. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.
- Entelecara meticulosa*; Peeters 1985: 50.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Schiermonnikoog (198b), Terschelling (Huneplak, Oosterend) (182v), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Steenwijk (De Eese). GL: Bronckhorst/Veldwijk (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rheden (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (AWD) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (202m), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Zaandam) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: Loosduinen (129, 136, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v,

236c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Beesel (204c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (Sint Pietersberg) (in grot) (236b), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerlooi (62, 142).

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

- *Linyphia concolor*; Van Hasselt 1885c: 184; 1890b: 201, 209.
- *Bathyphantes concolor*; Becker 1896b: 53. Chrysanthus 1955c: 16. Van Damme et al. 1959: 57. Hulsebos 1961: 4. Meijer 1973a: 179.
- *Stylophora concolor*; Van der Hammen 1949a: 79. Van Helsdingen 1961: 260; 1963b: 31.
- *Diplostyla concolor*; Van Helsdingen 1976: 41; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Fokkema 1978: 100. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203; 1998a: xxxvi; 2000: xxxviii. Kessler et al. 1988: 135. Poot et al. 1989: 7. Hulsebos 1989: 23; 1990: 155. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 57. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2004: 207; 2005: 88. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 25. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 277. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 18. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

GR: Lauwerszeepolder (195), Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Noordvaarder) (182v), Ooststellingwerf (75n). DR: Dwingeloo (160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Meppel (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: (129), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophevert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Nijmegen (119), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Roggebotzand (174g), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaanstad (Guisveld, Westzijderveld, Zaandam) (232b). ZH: Delft (119; 81: in kas), Lisse (in kas) (81), Scheveningen (119). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (13b), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Leende (Strijperheg) (230x), Mierlo ('t Sang) (230x), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Het Heike) (230x), Veldhoven (Run) (230x). LI: (129), Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Cadier en Keer (193b), Eys (De Piepert) (183r), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Rijckholt (193b), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Valkenburg (129), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a), Weert (Wijffelterbroek) (230x), Wellerlooi (55).

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)

- *Dismodicus bifrons*; Meijer 1973b: 29; 1974: 172. Meijer et al. 1975: 139. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Koomen 1986: 202; 1992: xxviii; 1994: xxxiii; 1999: xxxv. Bosmans 1988: 32. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 46, 47, 50, 53. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 8; 2005: 27. Van Helsdingen 1999b: 10; 2019b: 37. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 13. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 16. Tutelaers 2017: 277. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196, 198v), Schiermonnikoog (198v, 210a), Terschelling (West-Terschelling) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork

(Mantingerveld) (225d). OV: Steenwijk (De Eese) (197, 198v). GL: Winterswijk (182g). FL: Almere (218b), Luttegeest (Kuinderbos) (150p). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f), Vasse (Landschotse Heide) (17r), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Dismodicus elevatus (C.L. Koch, 1838)

- *Dismodicus elevatus*; Becker 1896b: 115. Chrysanthus 1954b: 40. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Van Helsdingen 1963b: 10. Koomen 1993: xxxiii; 2015: 158. Prinsen et al. 2009: 191.
- *Dismodicus bifrons*; Chrysanthus 1953d: 88.
- *Hypomma cornuum* Hulsebos 1961: 4.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (142, 160a). DR: Dwingeloo (142, 160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Echten (142, 160b). GL: Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n). LI: Maastricht (13b, 50, 142), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

Donacochara speciosa (Thorell, 1875)

- *Erigone speciosa* Thorell 1875a: 87 (spec. nov., ♀); 1875b: 32.
- *Erigone leptocarpa* Thorell 1875a: 88 (spec. nov., ♂); 1875b: 34.
- *Neriene speciosa*; Van Hasselt 1885c: 169; 1890b: 199; 1898: 53, 61.
- *Donacochara speciosa*; Becker 1896b: 78. Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 20; 1978a: 194; 1996a: 4; 2002b: 11. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Tutelaars 2006: 14, 16. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van 't Veer et al. 2012: 16.

NL: (228, 229). OV: Weerribben (147z), De Wieden (147z). UT: (119, 136, 147b), Noord-Maarsseveense Plas (147z). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Ankeveense Plassen (147z), Kortenhoefse Plassen (147z), Naardermeer (147z), Zaanstad (Euverenweg) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Nieuwkoopse Plassen (142, 147z), Rhoon (136), Rotterdam (Hillegersbergse Plassen) (129, 136). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Oisterwijkse vennen (136).

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

- *Meta tigrina*; Six 1858b: 293.
- *Linyphia socialis*; Becker 1879a: xlivi. Van Hasselt 1885c: 181.
- *Drapetisca socialis*; Chrysanthus 1951d: 84; 1955c: 16. Hulsebos 1959: 254; 1961: 4; 1990: 155. Van Helsdingen 1961: 256; 1963b: 25; 1976: 41; 2019: 47. Klomp et al. 1973: 330. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203; 1991: xix. Koomen et al. 2001: xl; 2005: 88. De Bruyn 1996: 49. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Tutelaars 2000: 20; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 16; 2017: 277. Noordijk et al. 2001: 25. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. IJland et al. 2010: 27. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 16.

NL: (7, 119). FR: Schiermonnikoog (160a). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160b, 160g), Emmen (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (Havelterberg) (230i), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Haaksbergen (182d), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Harderwijk (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Luttegeest (Kuinderbos) (150p). UT: (220), Rheden (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (202m), Egmond (182w), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Stellendam (202m), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (Empel-Pottenbakker) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond (55), Vijlen (55), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Drepanotylus uncatus (O.P.-Cambridge, 1873)

- *Drepanotylus uncatus*; Van Helsdingen 1963b: 20; 1976: 40; 1981a: 37. Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 9. Koomen 2015: 158.

DR: Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (148a, 225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a, 225b), Westerveld (Vledder Aa) (183a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 146a). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a, 147f).

Entelecara acuminata (Wider, 1834)

- *Walckenaera latifrons*; Van Hasselt 1885c: 174 (p. p.).
- *Walckenaera altifrons*; Van Hasselt 1885c: 176; 1890b: 200; 1898: 54 (alle p. p.).
- *Entelecara acuminata*; Becker 1896b: 123. Hulsebos 1961: 3. Van Helsdingen 1961: 248; 1963b: 12; 2019b: 37. Meijer 1976a: 7; 1976b: 251. Peeters 1984a: 181. Bosmans 1988: 32. Koomen 1993: xxxiii; 1996: 172, 218; 1998b: 225. Spoek 1997b: 8. Koomen et al. 2001: xl; 2004: 207. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2017: 277. Noordijk et al. 2001: 25. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Kessler 2004: 8. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2013: 26; 2015a: 5. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Van 't Veer et al. 2012: 16. Wielink et al. 2020: 342.
- *Entelecara flavipes*; Hulsebos 1962: 235.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1957b: 31 (= *Entelecara congenera* (O.P.-Cambridge)) (zie 68, 142).

GR: Haren (202m), Nieuw Wolda (202m), Vlagtwedde (Sellingen) (211g), Winschoten (202m). FR: Schiermonnikoog (198b), Dokkum (202m), Drachten (202m), Metsalawier (202m), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Assen (202m), Dwingeloo (142, 160b, 160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Echten (142, 160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x). GL: Angerlo ? (136, 142), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Deventer (202m), Harderwijk (202m), Oosterbeek (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m), Tiel (202m), Ulft (202m), Wageningen ? (119), Zwartebroek (202m). UT: Houten (202m), Zeist (119, 142). NH: Amsterdam (202m), Bergen (202m), Egmond (182w), Enkhuizen (202m), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Gouda (202m), 's-Gravenhage ? (119, 142), Leiden (202m), Loosduinen ? (119), Oegstgeest (202m), Scheveningen ? (119), Stellendam (202m), Wassenaar ? (119), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg (202m), Zierikzee ? (129, 142). NB: Asten (202m), Bergen op Zoom (202m), Boxtel (202m), Breda (13b), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Putte ? (136, 142), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (13b), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Valkenswaard (202m), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Reuver (204a), Roerdalen (Hoosden) (150s).

Entelecara congenera (O.P.-Cambridge, 1879)

- *Entelecara acuminata*; Chrysanthus 1957b: 31.
- *Entelecara congenera*; Chrysanthus 1966: 156. Hulsebos 1959: 254; 1962: 235; 1964a: 94. Van Helsdingen 1963b: 12; 1976: 40. Klomp et al. 1973: 330. Koomen 1991: xix; 1998b: 225. Spoek 1997b: 8. Koomen et al. 2001: xl. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 26. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Schiermonnikoog (142, 160a, 160d). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160d), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte ? (142, 160c, 160d). OV: Haaksbergen (182d). GL: Veluwe (160d), Arnhem (181a). NH: Egmond (182w). NB: Cranendonck (230e), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Wellerlooi (62, 68, 142).

Entelecara erythropus (Westring, 1851)

- *Walckenaera erythropus*; Van Hasselt 1885c: 175; 1890b: 200; 1898: 61.
- *Tiso vagans*; Hulsebos 1959: 254; 1961: 4 (beide p. p.).
- *Entelecara erythropus*; Van Heerdt et al. 1960: 234. Van Helsdingen 1963b: 13; 2019b: 37. Chrysanthus 1966: 156. Meijer 1973b: 29; 1974: 172. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Heuts

2001: 11. Koomen et al., 2004: 207. Koomen 2010: 210; 2015: 158. Cuppen 2010: 192. Van Helsdingen et al. 2013: 26.

□ *Entelecara media*; Van Helsdingen 1961: 248.

FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (142, 160a), Terschelling (137, 142). DR: Havelte (142, 160b), Rolde (119, 142), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Veenhuizen (119, 142). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Angerlo (136, 142), Arnhem (136, 142), Winterswijk (129, 136, 142). FL: Dronten (Harderbos) (70c, 182m). NH: Uithoorn (151u). ZH: Scheveningen (129, 136, 142), Wassenaar (129, 136, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Oisterwijk (136, 142). LI: Maasgouw (Linnerheide) (150s), Roerdalen (Hoosden) (150s).

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)

□ *Entelecara flavipes*; Becker 1896b: 124. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www).

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 235 (= *Entelecara acuminata* (Wider)) (zie 142).

NB: Cranendonck (230e). L: Maastricht (13b).

Entelecara media Kulczynski, 1887

□ *Entelecara media*; Peeters et al. 1986: 93, 94.

L: Reuver (204u).

Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903

□ *Entelecara omissa*; Van Helsdingen 1996a: 4; 1996b: 8.

NH: Ankeveense Plassen (147z, 148a), Kortenhoefse Plassen (147z, 148a).

Erigone atra Blackwall, 1833

□ *Neriene atra*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).
□ *Neriene dentipalpis*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).
□ *Neriene nigra*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).
□ *Erigone atra*; Chrysanthus 1951g: 99 (p. p.). Van Heerdt et al. 1960: 234; 1967: 111. Hulsebos 1961: 4; 1990: 155; 1995: 5. Van Helsdingen 1961: 253; 1963b: 19; 1976: 40; 1984: 3; 1987: 187; 1997a: 117; 1997b: 11; 1999b: 10; 2002a: 10,11; 2003d: 22; 2019b: 37. Meijer 1971: 61; 1973a: 175, 179; 1973b: 29; 1977: 84, 85, 88; 1980a: 228; 1980b: 20. Klomp et al. 1973: 330. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Wingerden 1977: 18. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 16; 2008: 25, 27; 2017: 277. Fokkema 1978: 100; 1978b: 609. Van der Velde 1978: 130. Kessler et al. 1984: 262. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Peeters et al. 1986: 93, 95. Koomen 1986: 202; 1992: xxviii; 1994: xxxiii; 1996: 172, 218; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 158. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Verstegen et al. 1992: 74, 75. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxvii; 2001: xl; 2004: 207; 2005: 88. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 57. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Noordijk et al. 2001: 27. Prinsen 2002: 119; 2005: 114; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Decae 1998a: 21. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 13. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33; 2022: 51. Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 277. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2010: 17; 2012: 27; 2013: 26; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Franken et al. 2016: 177. Bink 2016: 3. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Bloem et al. 2021: 38. Versteeg 2023: 15. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.
□ *Erigone dentipalpis*; Hulsebos 1961: 4 (p. p.). Van Klink 2015: 195.

NL: (119; 232w: heide hogere gronden). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Eenrum (Pieterburen)

(182k), Haren (202m), Lauwerszeepolder (194, 195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: (75q), Ameland (196), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 180b, 210a, 254a), Terschelling (137, 138, 142), idem (Formerum, Seeryp) (182v), idem (West-Terschelling) (182v), Ooststellingwerf (75n). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo-/Vries (De Heest) (211k), Beilen (142, 160b), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (142, 160b, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Havelte (142, 160b), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Ruinerwold (142, 160b), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Ommen (Eerde) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Tubbergen (Hezingenn, Paardenslenkte) (182x), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn/Ede (Hoge Veluwe) (232o), Arnhem (181a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Ede (Ginkelse Zand) (75w1), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nijmegen (Oude Waal) (232d), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (182m), Zeewolde (Winkelse Zand) (182m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (202m), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Zaanstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Leiden (148c), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (71e), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Boxmeer (202m), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e, 230k), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Waalre (Landschut) (230d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44, 142), Cottessen (182e), Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (202c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Rijckholt (193b), Rijke (204u), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a), Weert (Wijffelterbroek) (230x).

Erigone dentigera O.P.-Cambridge, 1874

Erigone capra Simon, 1884

- Erigone capra*; De Jong 1982: 114.
- Erigone dentigera*; Wielink et al. 2020: 342.

DR: Oosterhesselen (169f). NB: Tilburg (Kaaistoep) (250d).

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

- Erigone dentipalpis*; Six 1858b: 295. Becker 1879a: xlivi; 1896b: 96. Feekes 1936: 224. Van der Hammen 1950: 110. Chrysanthus 1954b: 40. Hulsebos 1959: 254 (p. p.; *E. atra*, p. p.); 1961: 4 (p. p.); 1990: 155; 1995: 5. Van Helsdingen 1961: 253; 1963b: 19; 1976: 40; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 37; 2019c: 47. Van Heerdt et al. 1967: 111. Meijer 1971: 61; 1973a: 175, 179; 1973b: 29; 1977: 84, 85, 88; 1980a: 229; 1980b: 20. Klomp et al. 1973: 330. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Wingerden 1977: 18. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 16; 2008: 27; 2009c (www); 2017: 277. Fokkema 1978: 100; 1978b: 609. Buizer 1982: 74. Kessler et al. 1984: 262. Peeters et al. 1986: 93, 95. Koomen 1986: 202; 1991: xix; 1992: xxviii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2010: 210;. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Verstegen et al. 1992: 74. Koomen et al. 1995: xxx; 1997: xxxvii; 2001: xl; 2004: 207; 2005: 88. Siepel et al. 1996:

45, 47, 50, 53, 58. Spoek 1997b: 8; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Prinsen 2002: 119; 2005: 114; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Bonte 2006: 13. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27; 2013: 26; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22; 2011: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Van Klink 2015: 195. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2016: 177. Bink 2016: 3. Versteeg 2023: 15. Van Colen et al. 2022: 141. NOORDAM 2024: 24.

□ *Neriene dentipalpis*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.). Meijer & Barendrecht 2018: 128.

□ *Neriene atra*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).

□ *Neriene nigra*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).

□ *Erigone atra*; Chrysanthus 1951g: 99 (p. p.).

NL: (7, 119; 232w: heide hogere gronden). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwerszeepolder (194, 195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Weende) (211g), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b). DR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (142, 160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Ommen (Eerde) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn/Ede (Hoge Veluwe) (232o), Arnhem (181a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Ede (Ginkel Zand) (75w1), Ermelo (Speulderveld, Speulderbos) (150w2), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Dronten (Harderbos) (182m), Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m). UT: (7, 142), Driebergen (142, 220), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (AWD, Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Haarlem (13b), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Wieringermeer-polder (75c), Zaanstad (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Ackerdijkse Plassen (148j), 's-Gravenhage (13b), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (25s); Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Middelburg (13b). NB: (7), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Breda (13b), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e, 230k), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Heeze (Heezerveen) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (13b), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (13b), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f), Udenhout (De Brand) (182j), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Rijkel (204u), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Sint Pietersberg (in grot) (83, 142), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e), Wellerloo (52, 142).

Erigone dentosa O.P.-Cambridge, 1894

□ *Erigone dentosa*; Noordijk & Boer 2021: 109.

NH: Zuid-Scharwoude (import) (202ac).

Erigone longipalpis (Sundevall, 1830)

- *Erigone longipalpis*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.). Becker 1896b: 94. Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 19; 1997a: 117; 2002a: 11; 2003d: 22. Van Heerdt et al. 1967: 111. Meijer 1971: 61; 1973a: 175, 179; 1977: 84, 85, 88; 1979: 49; 1980a: 229; 1980b: 20. Van Wingerden 1977: 18. Fokkema 1978: 100; 1978b: 609. Peeters et al. 1986: 93, 94. Koomen 1986: 202; 1991: xix; 1999: xxv; 2010: 210. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 46, 48, 52, 53. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 8. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2017: 277. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 13. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Roelofs-Ditters 2007: 24. Lambeets 2008: 14. Van 't Veer et al. 2012: 16. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141.

NL: (119). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k), Lauwerszeepolder (75q, 194, 195, 198c, 198e, 198f, 198d), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b, 254a), Terschelling (138), idem (Midsland, Oosterend, Seeryp) (182v), Dronrijp (75q), Hennaard (75q), Ooststellingwerf (75n, 75q), Rinsumageest (75q), Wijns (75q). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Haaksbergen (182d). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Voorst (142), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: Dordrecht (13b), Oost-Voorne (De Beer) (142), Rotterdam (13b). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Vlissingen (142). NB: Cranendonck (215f, 230e), 's-Hertogenbosch (De Geelders, De Mortellen) (230v), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijkel (204u).

Erigone maritima Kulczynski, 1902

Erigone arctica maritima Kulczynski, 1902

- *Erigone atra*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).
 □ *Erigone longipalpis*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).
 □ *Erigone arctica*; Chrysanthus 1955e: 494. Hulsebos 1959: 254. Van Heerdt et al. 1960: 234; 1967: 111. Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 19; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Meijer 1971: 61; 1973a: 175, 179; 1977: 84, 85, 88; 1980a: 229; 1980b: 20. Van Wingerden 1973: 208; 1975: 71; 1977: 1; 1980: 91. Van Wingerden et al. 1974: 6. Vugts et al. 1976: 434. Peeters et al. 1986: 93, 94. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiv. Noordam 1996: 12. Siepel et al. 1996: 46, 53. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2017: 277. Koomen et al., 2004: 207. Bonte et al. 2003a: 25, 56. Bonte 2006: 13. Prinsen 2007: 141. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2010: 17. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Bink 2016: 3. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwerszeepolder (194, 195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (142, 160a, 239v, 253, 254, 254a, 254b, 255a), Terschelling (57, 137, 138, 142). DR: Zweeloo (Mepperveld) (182f). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Vorden (Kasteel Hackfort) (211n), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (Meijendel) (201k). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikven) (215f). LI: Rijkel (204u).

***Erigone promiscua* (O.P.-Cambridge 1872)**

- *Erigone promiscua*; Bonte et al. 2003a: 21, 57; 2003b: 910. Koomen et al., 2004: 207. Van Helsdingen 2005b: 18. Bonte 2006: 7, 13. Tutelaers 2017: 277.

OV: Tubbergen (Springendal) (182x). NH: duinen (AWD) (17a, 17b, 17c, 149a). NB: Best (De Scheeken) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v).

***Erigonella hiemalis* (Blackwall, 1841)**

- *Erigonella hiemalis*; Tutelaers, 2001c: 8; 2001d (www). Spoek 2005: 27. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Havelte (Havelterberg) (230h, 230i), Westerbork (Mantingerveld) (225d). LI: Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

***Erigonella ignobilis* (O.P.-Cambridge, 1871)**

- *Erigonella ignobilis*; Van Helsdingen 1963b: 18; 1984: 3. Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers 2009c (www). Van 't Veer et al. 2012: 16.

NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld) (232b). ZH: Brasemermeer (142), Nieuwkoop (142). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s).

***Floronia bucculenta* (Clerck, 1757)**

- *Linyphia bucculenta*; Van Hasselt 1876b: iii. Becker 1879a: xlivi.
- *Theridium pallidum*; Van Hasselt 1879b: xxv.
- *Linyphia frenata*; Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 179; 1887a: xxxii; 1890b: 201.
- *Floronia bucculenta*; Chrysanthus 1951g: 98. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1961: 257; 1963b: 25; 1976: 41; 1999a: 7. Meijer 1973b: 30. Noordam 1996: 9. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 22. Bonte 2006: 14. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Van 't Veer et al. 2012: 16. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 277.

FR: Ameland (196), Terschelling (137), Fochteloërvéen (148e). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Winterswijk (123, 129). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Amersfoort (69n). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Hilversum (103), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7), duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (119), Loosduinen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). ZE: (7). NB: Breda (Liesbos) (117, 119), Kasteren (De Geelders) (230v). LI: Brunssum (44), Mook (109), Ospel (Grote Peel) (147a).

(*Frontinellina fruetorum* (C.L. Koch, 1834))

Onjuiste vermeldingen: Six 1858b: 295 (*Linyphia fruetorum*). Becker 1879a: xlivi (*Linyphia fruetorum*) (= *Linyphia hortensis* (Sundevall)).

Het voorkomen van deze mediterrane soort in Nederland is hoogst onwaarschijnlijk.

***Glyphesis servulus* (Simon, 1882)**

- *Walckenaera servula*; Van Hasselt 1890b: 188; 1898: 73. Wasmann 1891: 56. Schmitz 1915: 190.
- *Glyphesis servulus*; Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 20. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers et al. 2008: 12. Noordam 2024: 24.

NL: (217z, in mierennesten). UT: Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). ZH: 's-Gravenhage (in mierennesten) (129, 136, 140, 142, 242). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Valkenswaard (Het Heike) (230x).

***Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834)**

- *Micryphantes dentatus*; Six 1858b: 295.
- *Erigone dentata*; Becker 1879a: xlivi.
- *Gongylidium dentatum*; Becker 1896b: 89.
- *Neriene dentata*; Van Hasselt 1885c: 165.
- *Gnathonarium dentatum*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 51. Van Helsdingen 1961: 248; 1963b: 13; 1976: 40; 1984: 3; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2002b: 11; 2003d: 22. Meijer 1973b: 29; 1974: 172. Koomen 1986: 202; 2015: 158. Noordam 1996: 12. Siepel et al. 1996: 52, 53. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2005: 88. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 24. Prinsen et al. 2009: 191. Wielink et al. 2009: 221. Van Helsdingen et al. 2009b:

17; 2013: 26. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Van 't Veer et al. 2012: 16. Franken et al. 2016: 177. Tutelaers 2017: 277. Wielink et al. 2020: 342. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Ameland (196), Terschelling (Noordvaarder) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: (119, 140), Oldemarkt (Weerribben) (197), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (119, 140, 142), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (7, 13b, 220). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld, Noordzeekanaal) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (119, 140), Ackerdijkse Plassen (148j), Wassenaar (Meijendel) (201k). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (13b), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (13b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Wellerlooi (62, 142).

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)

Gonatium corallipes (O.P.-Cambridge, 1875)

- Gonatium corallipes*; Van Helsdingen 1963b: 12.

L: Epen (142).

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)

- Neriene isabellina*; Van Hasselt 1885c: 164; 1886c: 106; 1890b: 208.
- Gonatium isabellinum*; Chrysanthus 1951g: 99.
- Gonatium rubellum*; Van Helsdingen 1961: 247; 1963b: 12; 2019b: 37. Siepel et al. 1996: 48, 53. De Bruyn 1996: 50. Mabelis 1996: 126-131. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114.

OV: Twente (191b). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wageningen (119, 140, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). FL: Almere (218b). UT: Driebergen (119, 140, 142). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen (119, 140, 142), Wassenaar (119, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Breda (Liesbos) (119, 140, 142). LI: Gronsveld (44, 142).

Gonatium rubens (Blackwall, 1833)

- Micryphantes cheliferus*; Six 1863: 126.
- Erigone rubens*; Becker 1879a: xliv.
- Gonatium rubens*; Becker 1896b: 107. Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 51. Van Helsdingen 1961: 247; 1963b: 12; 1976: 40; 2019b: 37. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23. Meijer 1976a: 7. Tutelaers 1978: 88. Fokkema 1978: 100. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 202. Deeleman-Reinhold 1990: 110. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 27. Noordam et al. 1998: 344. Bonte et al. 2003a: 25. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 14. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17. IJland 2009: 4. IJland et al. 2010: 27.
- Erigone chelifera*; Van Hasselt 1883a: xxxii (p. p.).
- Neriene rubens*; Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 164 (beide p. p.); 1886c: 106.

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (75n). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Havelte (142, 160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wageningen ? (112, 119, 140, 142). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Driebergen (119, 140, 142, 222b), Maartensdijk (13b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (13b). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: Loosduinen ? (119, 140, 142), Wassenaar ? (119, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB:

Breda (Liesbos) ? (117), Heeze (Heezerveen) (230d), Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Brunssum (44, 142), Geleen (44, 142), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (13b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Sittard (13b), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Gongyliellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Gongyliellum latebricola*; Van Helsdingen 1963b: 16; 1976: 40; 1987: 187; 1997a: 117. Klomp et al. 1973: 334. Peeters 1985: 51. Poot et al. 1989: 6. Hulsebos 1989: 23. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Verstegen et al. 1992: 73. Koomen 1992: xxviii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 8. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2008: 27; 2009c (www); 2017: 277. Prinsen 2005: 114. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2010: 17; 2012: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Lambregts et al. 2013: 17. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (232w: heide hogere gronden). DR: Dwingeloo (160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Smilde (boswachterij Smilde) (183a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a), Arnhem (181a), Brummen (Empesche en Tondensche Heide) (142), Kootwijk (142), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Wiessel (142). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Beesel (204c), Gulpen (Waterop) (147o), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Vaals (182e).

Gongyliellum murcidum Simon, 1884

- *Gongyliellum murcidum*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 53. Van Helsdingen 1963b: 17; 1976: 40. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen et al. 1997: xxxvii. Roelofs-Ditters 2007: 24.

Onjuiste vermeldingen: Chrysanthus 1958b: 144; Chrysanthus et al. 1959: 183 (= *Gongyliellum vivum* (O.P.-Cambridge)) (zie 68, 142). Hulsebos 1959: 254 (= *Gongylium rufipes* (L.)) (zie 142).

FR: Terschelling (Noordvaarder) (182v). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Ossendrecht (Leemputten) (71m).

Gongyliellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875)

- *Neriene viva*; Van Hasselt 1885c: 167; 1890b: 198; 1898: 53.
- *Gongyliellum vivum*; Heselhaus 1913: 224; 1915: 273. Chrysanthus 1958b: 144; 1966: 156. Hulsebos 1959: 254; 1961: 4; 1995: 5. Van Helsdingen 1961: 252; 1963b: 17; 1976: 40. Meijer 1974: 172; 1976a: 7. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxvii; 2001: xl; 2005: 88. Siepel et al. 1996: 48, 50, 53. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 8; 2005: 27. Koomen 1999: xxxv. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2009c (www); 2017: 277. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2009b: 17; 2012: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.
- *Gongyliellum murcidum*; Chrysanthus 1958b: 144; 1959: 183.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (142, 160a, 174h), Terschelling (Kroonpolders, Oosterend) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Diever (160h), De Wijk (142, 160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Groesbeek (136, 140, 142), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wekerom (16b). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Schoorl (182w), Texel (Mokbaai) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b). NB: Bladel (187a), Breda (119, 140, 142), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (64, 68, 69b, 142), Ospel (Grote Peel) (147a), Roermond (129, 140, 142), Sittard (in mierennest) (151b), Valkenburg (in gang *Talpa*

europaea L.) (151c), Vijlen (64, 142), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)

- Micryphantes crassipalpus*; Six 1858b: 295.
- Erigone rufipes*; Becker 1879a: xliv.
- Neriene rufipes*; Van Hasselt 1885c: 164 (p. p.).
- Neriene rubens*; Van Hasselt 1885c: 164 (p. p.).
- Neriene fusca*; Van Hasselt 1885c: 165 (p. p.).
- Gongylidium rufipes*; Chrysanthus 1951g: 98. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3; 1989: 23; 1990: 155. Van Helsdingen 1961: 250; 1963b: 14; 1984: 3; 1997a: 117; 1999b: 10; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 37. Meijer 1974: 172; 1976a: 7. Fokkema 1978: 100. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 6. Koomen 1992: xxviii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxix; 2010: 210; 2015: 158. De Bruyn 1996: 50. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2005: 88. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Tutelaers 2006: 16; 2009c (www); 2017: 277. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17. Noordijk et al. 2009c: 22; 2011: 17. IJland et al. 2010: 27. 3
- Gongylidiellum murcidum*; Hulsebos 1959: 254.

GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k), Leens (182k). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (142, 160a), Terschelling (Formerum, Huneplak, Oosterend) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (75n). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Dwingeloo (160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160b), Ruinen (182f), Westerveld (Wapserveld) (183a). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Eerde, Eerder Achterbroek) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese). GL: ? (119, 140, 142), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Baak (waard) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wageningen (119), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Dronten (Harderbos) (182m), Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119, 140), De Bilt ? (119, 140, 142), Driebergen ? (119, 140), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaanstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: ? (119), Ackerdijkse Plassen (148j), Loosduinen ? (119, 140), Wassenaar ? (119, 140), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Nuenen (Heerendonk) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Cadier en Keer (193b), Cottessen (182e), Maastricht (44, 142), Margraten (Schiepersberg) (210b), Thorn (Koningssteen) (182m).

Halorates reprobus (O.P.-Cambridge, 1879)

- Halorates reprobus*; Van Helsdingen 2003a: 10.

ZE: Markiezaat (148k).

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

- Linyphia insignis*; De Jong 1949b: 214.
- Helophora insignis*; Chrysanthus 1955c: 16. Van Helsdingen 1963b: 32. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1999: 4. Kessler 2004: 8.

DR: Emmen (Oeversebosje) (225c). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Oost-Voorne (169e), Wassenaar (Meijendel) (25b). LI: Heerlen (55).

Hybocoptus corrugis (O.P.-Cambridge, 1875)

Hybocoptus decollatus (Simon, 1882)

- Hybocoptus decollatus*; Deeleman-Reinhold 1990: 110.

NB: Ossendrecht (Leemputten) (71m).

Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)

Erigonidium graminicola (Sundevall, 1830)

- Erigone graminicola*; Becker 1879c: clxxvi; 1881: xxviii.
- Gongylidium graminicola*; Becker 1896b: 80.
- Neriene graminicola*; Van Hasselt 1885c: 163; 1886c: 103.
- Erigonidium graminicola*; Hulsebos 1959: 254; 1962: 235; 1964a: 95. Van Helsdingen 1961: 249; 1963b: 14; 1987: 187. Chrysanthus 1966: 156.
- Hylyphantes graminicola*; Koomen 2000: xxxix. Heuts 2002: 7. Van Helsdingen 2002b: 11. Koomen et al. 2005: 88. Roelofs-Ditters 2007: 24. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Van Helsdingen 2015a: 5. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 119). FR: Schiermonnikoog (142, 160a, 160d), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160d). NH: Huizen (Gooise heide) (151v), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y). ZE: Hoek (160d). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (68), Maastricht (11, 13b, Thorn (Koningssteen) (182m).

Hylyphantes nigritus (Simon, 1882)

- Hylyphantes nigritus*; De Jong 1982: 114.

GL: Apeldoorn (169a), Hoog Soeren-Kootwijk (169f), Mook (Plasmolen) (169f).

Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)

- Micryphantes bituberculatus*; Six 1858b: 295. Van Hasselt 1879b: xxv.
- Erigone bituberculata*; Becker 1879a: xliv.
- Neriene bituberculata*; Van Hasselt 1885c: 167; 1886c: 107; 1890b: 208; 1898: 60 (alle p. p.).
- Hypomma bituberculatum*; Chrysanthus 1955c: 16. Hulsebos 1961: 4. Van Helsdingen 1976: 40; 1984: 3; 1999a: 7; 2002b: 11; 2003d: 22. Meijer 1977: 84, 85, 88; 1980a: 229; 1980b: 20. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen 1992: xxviii; 1996: 172, 218; 1998b: 225. Koomen et al. 1995: xxx; 1997: xxxvii. Noordam 1996: 12. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Tutelaars 2006: 16; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 24. Lambeets 2008: 10, 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 26. Van 't Veer et al. 2012: 16. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.
- Enidia bituberculata*; Van Helsdingen 1961: 246; 1963b: 11. Meijer 1973a: 175, 179; 1973b: 29.

Onjuiste vermelding: Van Heerdt et al. 1960: 234 (= *Minyrioloides maritimus* Crocker & Parker); 1967: 111 (= *Minyrioloides maritimus*) (beide zie 198v).

GR: Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b), Terschelling (Noordvaarder, Oosterend) (182v), Fochteloeरveen (148e). DR: Beilen (142, 160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Lievinge (160b), Vries (De Punt) (211k), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: ? (119, 140, 142), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: (7, 119, 140, 142), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (220). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zaandstad (Guisveld, Noordzeekanaal) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Giesendam ? (122, 140, 142), Rotterdam ? (Hillegersberg) (136, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (201k). NB: Baarle-Nassau (Halsche Beemden) (215f), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Oisterwijk ? (136, 140, 142), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h,

182j), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Cottessen (182e), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Mook (109), Obbicht - Grevenbicht (186c), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Vijlen (55, 142).

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)

- Neriene cornuta*; Van Hasselt 1885c: 167.
- Gonatium cornutum*; Becker 1896b: 111.
- Hypomma cornutum*; Hulsebos 1959: 254; 1964a: 94. Meijer 1976a: 7. Spoek 1997b: 9; 1999: 4. Koomen 1998b: 225; 2015: 158. Van Helsdingen 1999a: 7; 2019b: 37. Noordijk et al. 2001: 25. Faber et al. 2001: 46. Koomen et al., 2004: 207. Prinsen 2005: 114; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Tutelaers 2006: 16; 2017: 277. Van Helsdingen 2015a: 5.
- Enidia cornuta*; Van Helsdingen 1961: 247; 1963b: 11. Klomp et al. 1973: 330.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1961: 4 (= *Dismodicus elevatus* (C.L. Koch)) (zie 142).

GR: Winschoten (202m). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (142, 160a, 160d), Dokkum (202m), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c). OV: Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Arnhem (181a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Maastricht (13b).

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902)

- Neriene bituberculata*; Van Hasselt 1885c: 167; 1886c: 107; 1898: 60 (alle drie p. p.).
- Hypomma fulvum*; De Jong 1949: 214. Fokkema 1980: 721. Van Helsdingen 1996a: 4; 2002b: 11; 2019b: 37. Koomen 1996: 172, 218; 1998b: 225; 1999: xxxv. Koomen et al. 1997: xxxvii. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2006: 14, 16; 2017: 277. Roelofs-Ditters 2007: 24. Prinsen et al. 2009: 191. Noordijk et al. 2009c: 22. Van 't Veer et al. 2012: 16.
- Enidia fulva*; Van Helsdingen, 1961: 247; 1963b: 11; 1999b: 10.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k). FR: Terschelling (Kroonpolders) (182v), Dronrijp (75r), Menaldum (75r), Pingum (75r). OV: Kampereiland (142, 169c), Weerribben (147z), De Wieden (147z). GL: ? (119), Kekerdom (Millingerwaard) (215f), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r). UT: ? (119), Botshol (147z), Loosdrecht (169c), Molenpolder (147z), Noord-Maarsseveense Plas (147z). NH: Ankeveense Plassen (147z), Kortenhoefse Plassen (147z), Naardermeer (142, 147z), Wormer- en Jisperveld (147z), Zaanstad (Guisveld, Noordzeekanaal) (232b) Zwanenwater (148f). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Giesendam ? (122), Nieuwkoopse Plassen (142, 147z), Reeuwijkse Plassen (147z), Rotterdam ? (Hillegersberg) (136), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Oisterwijk ? (136), Udenhout (De Brand) (182h, 182j).

Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1903)

- Hypselistes jacksoni*; Bosmans 1988: 32. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 24.

DR: Anloo/Andersen/Elsbroek (Scheebroekerloop) (211k). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Scheidingsven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Vessem (Landschotse Heide) (17r).

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908)

- Tapinocyba praecox*; Chrysanthus et al. 1959: 183 (p. p.).

- *Jacksonella falconeri*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 53. Van Helsdingen 1963b: 20; 1976: 40. Kessler et al. 1984: 262. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Van Helsdingen et al. 2009a: 7.

FR: Schiermonnikoog (174h). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). NB: Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Kaestneria dorsalis (Wider, 1834)

- *Micryphantes quaternus*; Six 1860: 20; 1863: 126.
- *Linyphia dorsalis*; Van Hasselt 1885c: 181; 1890b: 201.
- *Linyphia anthracina*; Van Hasselt 1886a: xxxv (var. *anthracina*); 1898: 48.
- *Bathyphantes dorsalis*; Becker 1896b: 56. Hulsebos 1961: 4; 1990: 155. Van Helsdingen 1961: 261; 1963b: 32. Meijer 1976a: 7.
- *Kaestneria dorsalis*; Koomen 2000: xxxix. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Tutelaers 2017: 277.

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Dwingeloo (160g), Havelte (160b), Ruinerwold (160b), Veenhuizen (119). GL: Apeldoorn (136), Nijmegen (119). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Driebergen (119, 222a, 222b), Utrecht (222b). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Valkeveen (119, 120). NB: Best (De Scheeken) (230v), Nuenen (Heerendonk) (215f). LI: Maastricht (13b), Roermond (129), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m).

Kaestneria pullata (O.P.-Cambridge, 1863)

- *Centromerus dilUus*; Hulsebos 1962: 235 (p. p.).
- *Bathyphantes pullatus*; Van Helsdingen 1963b: 31. Kessler-Geschiere 1965: 159. Meijer 1973b: 30; 1974: 172.
- *Kaestneria pullata*; Van Helsdingen 1984: 3. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Hulsebos 1989: 23; 1990: 155. Koomen et al. 1997: xxxvii. Koomen 1999: xxxv. Kessler 2004: 8. Tutelaers 2006: 16; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2012: 29. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (Kroonpolders, Oosterend) (182v). DR: Dwingeloo (160f, 160g), Meppel (160c). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: Brummen (Empesche en Tondensche Heide) (142). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Brasemermeer (142), Nieuwkoopse plassen (142), Voorne (142). NB: Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Labulla thoracica (Wider, 1834)

- *Labulla thoracica*; Chrysanthus 1958b: 143. Van Helsdingen 1963b: 32; 2009b: 15. Koster 2009: 8.

OV: Losser (Duivelshof) (149k, 183n). L: Heerlen (64).

Leptyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

- *Linyphia leprosa*; Van Hasselt 1885c: 179 (p. p.).
- *Linyphia nigrina*; Van Hasselt 1885c: 182 (p. p.).
- *Leptyphantes leprosus*; Leruth 1939: 381. Van der Hammen 1949a: 79; 1950: 110, 111. Chrysanthus 1951g: 98. Hulsebos 1959: 254; 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 257; 1963b: 26; 1965: 15. Klomp et al. 1973: 334. Fokkema 1978: 100; 1980: 720. Vossen 1983: 236. Meijer 1985: 136. Roelofs-Ditters 2007: 24. Vogels 2019: 30.
- *Leptyphantes zimmermanni*; Hulsebos 1961: 4 (p. p.).
- *Leptyphantes nebulosus*; Fokkema 1978: 100.

Onjuiste vermelding: Van der Hammen 1947c: 480 (= *Leptyphantes pallidus* (O.P. Cambridge)) (zie 83).

NL: (119). FR: Schiermonnikoog (160a), Ooststellingwerf (75n, 75r). DR: Dwingeloo (160b), Meppel (160b), Zwartemeer (160b). GL: Arnhem (181a). ZH: Delft (in kas) (81), 's-Gravenhage (Haagse Bos) (119), Leiden (in kas) (81), Wassenaar (119). NB: Oss (215f), Vught (Marktveld) (215f). LI: Brunssum (44), Echt (in grot) (239b), Heerderberg (in grot) (83), Maastricht (193b), Maastricht (Sint Pietersberg) (in grot) (236b), Neercanne (in grot) (83, 143), Rijckholt (44), Sint Pietersberg (in grot) (80, 83, 188d).

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

- *Linyphia minuta*; Van Hasselt 1885c: 179.
- *Lepthyphantes minutus*; Chrysanthus 1953d: 88. Van Damme et al. 1959: 57. Hulsebos 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 257; 1963b: 26; 1976: 41; 2015a: 5; 2019b: 37. Koomen 1986: 203. Jacobs 1992: 132. De Bruyn 1996: 50. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001d (www); 2001e (www). Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 24. Tutelaers et al. 2008: 12. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Noordijk et al. 2011: 17. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (119). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (Havelterberg) (230i), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld Molenven) (70d, 147a); Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Valkenswaard (Tongelreep) (230x). LI: Grevenbicht (50), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a).

(*Lepthyphantes mughi* (Fickert, 1875))

- Lepthyphantes mughi*; Becker 1896b: 42.
Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1885c: 181 (*Linyphia Mughi*) (= *Lepthyphantes tenuis* (Blackwall)) (zie 140).

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)

- *Leptorhoptrum robustum*; Van Helsdingen 1963b: 20; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Meijer 1977: 84, 85; 1980a: 229. Koomen 1986: 203; 1999: xxxv. Poot et al. 1989: 7. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Heuts 2001: 11. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Spoek 2005: 27. Roelofs-Ditters 2007: 24. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 22. IJland et al. 2010: 27. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwerszeepolder (198c, 198e), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijken (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Voorst (142), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Uithoorn (151u). NB: Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Schipperskerk (Koeweide) (186c).

Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850)

Phaulothrix hardyi (Blackwall, 1850)

- *Walckenaera Hardii*; Van Hasselt 1885c: 170.
- *Phaulothrix hardyi*; Van Helsdingen 1961: 254; 1963b: 20. De Bruyn 1996: 42.
- *Leptothrix hardyi*; Noordam 1996: 5, 6, 16. Noordam et al. 1998: 344. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). ZH: Loosduinen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201z).

Lessertia dentichelis (Simon, 1884)

- *Lessertia dentichelis*; Kessler et al. 1984: 262. Heuts 2001: 11; 2006: 9. Roelofs-Ditters 2007: 24. Lambeets 2008: 14. Heuts et al. 2009: 28.

FR: Schiermonnikoog (174h). NH: Uithoorn (151u, 151y, 151z). NB: Sint Michielsgestel (215f). LI: Terhagen (186c).

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

- *Linyphia frutetorum*; Six 1858b: 295. Becker 1879a: xlivi.
- *Linyphia hortensis*; Becker 1896b: 30. Van Hasselt 1885c: 186; 1890b: 201. Chrysanthus 1951d: 83; 1958b: 144. Van Helsdingen 1961: 262; 1963b: 34; 1969: 61; 1987: 187; 2019b: 37. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203; 1991: xix; 1993: xxxiv; 1994: xxxiv; 1998a: xxxvi; 1999: xxxv; 2010: 210; 2015: 158. Hulsebos 1995: 4, 5. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 1997: xxxviii; 2001: xl; 2004: 207. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2006: 16; 2017: 277. Prinsen 2002: 119; 2005: 115; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Kessler 2004: 8. Roelofs-Ditters 2007: 24. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17; 2013: 26. IJland et al. 2010: 27; 2011: 21. Bink 2016: 3. Wielink et al. 2020: 342.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Vlagtwedde (Weende) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg) (183a), Terschelling (Hoorn) (182v). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Diever (160h), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Wijster (IJsbaan) (211k). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Ommen (Eerde, Nieuwebrug) (182i), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wageningen (119), Winterswijk (182g). FL: Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: De Bilt (220, 7), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Egmond (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7), 's-Gravenhage (Scheveningse Bosjes, Haagse Bos) (119), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Cuijk (129), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Bemelen (145), Cottessen (182e), Epen (145), Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (64), Maastricht (13b, 129, 145), Mheer (145), Oud-Valkenburg (Gerendal) (145, 182a), Rijckholt (193b), Roerdalen (Hoosden) (150s), Vaals (182e).

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884

- *Linyphia tenuipalpis*; Van Helsdingen 1969: 55. Fokkema 1980: 724. Tutelaers 2000: 19, 20; 2001c: 8; 2001d (www); 2001e (www). Prinsen 2005: 115.

GR: Sellingen (145). FR: Elsloo (Schapepoel) (75r). DR: Havelte (Havelterberg) (230h, 230i). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NB: Cranendonck (230e).

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

- *Linyphia montana*; Van Hasselt 1870d: 30. Pinkhof 1941: 230.
- *Linyphia triangularis*; Van Hasselt 1876b: lii; 1885c: 186; 1886c: 103. Becker 1896b: 19. Bouwman 1935: 83. Van der Hammen 1949a: 79. Chrysanthus 1951d: 83; 1951g: 98. Kleinhout 1958: 181. Van Damme et al. 1959: 59. Hulsebos 1959: 254; 1961: 4. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1961: 261; 1963b: 33; 1976: 41; 1984: 3; 1999b: 10; 2019b: 37; 2019c: 47. Klomp et al. 1973: 330, 337. Meijer 1973b: 30. Vermeulen et al. 1980: 155. Poot et al. 1989: 7. Fokkema 1980: 724. Meijer 1985: 136. Van Wezel 1987: 13. Jacobs 1992: 133. Kessler 1993: 6. De Bruyn 1996: 49. Spoek 1997b: 10; 2005: 27. Koomen 1998b: 225. Tutelaers 2000: 16; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 16; 2017: 277. Prinsen 2002: 119; 2005: 115; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 191. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 26. Koomen et al., 2004: 207; 2005: 88. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 24, 25. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2015a: 5. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Noordijk et al. 2011: 17. Colijn et al. 2017: 14. Bink 2019: 7. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (22, 119, 174d (duinen)). GR: Vlagtwedde (Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: (75r), Ameland (196), Schiermonnikoog (160a, 232m), Terschelling (137), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (160b), Havelte (Havelterberg) (230i), Meppel (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zwartemeer (160b). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Hezingenn, Paardenslenkte) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ermelo (Speulderveld, Speulderbos) (150w2), Hoge Veluwe (178, 244), Molencate (91), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (69n), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat (17a, 17b), Amsterdam (206f), Kortenhoefse Plassen (147j), Hilversum (103), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Barendrecht (import) (16 i), Leiden (in kas) (81), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (13b), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182j), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Cadier en Keer (193b), Gronsveld (44), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (13b, 44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Neercanne (44), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Rijckholt (44), Sint Pietersberg (44). Roelofs-Ditters 2007: 24.

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)

□ *Lophomma punctatum*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 53. Chrysanthus 1961: 40. Van Helsdingen 1963b: 18; 1976: 40; 1981a: 36; 1984: 3; 2019b: 37. Meijer 1973b: 29. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Van Helsdingen et al. 2012: 29. Van 't Veer et al. 2012: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Terschelling (Kroonpolders, Noordvaarder) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). UT: Rhenen (Grebeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Zaandstad (Euverenweg, Westzijderveld) (232b). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Heerlen (65, 142), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Peelgebieden (147f).

Macrargus carpenteri (O.P.-Cambridge, 1895)

□ *Macrargus carpenteri*; De Jong 1982: 115. Koomen 1993: xxxiv. De Bruyn 1996: 43. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 27. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25.

DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f). GL: Nunspeet (169f), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Breda (169f), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Soerendonk (169f). IJehoven 1859: 54; 1868: 54. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

Macrargus rufus (Wider, 1834)

□ *Micryphantes erythrocephalus*; Six 1858b: 295. Snellen van Vo
 □ *Neriene rufa*; Van Hasselt 1885c: 168.
 □ *Erigone rufa*; Becker 1879a: xliv.
 □ *Linyphia bicolor*; Van Hasselt 1885c: 183 (p. p.).
 □ *Macrargus rufus*; Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 56. Van Helsdingen 1961: 256; 1963b: 23; 1976: 41; 2019b: 37. Hulsebos 1962; 235; 1989: 23; 1990: 155; 1995:

5. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 27. Fokkema 1978: 100; 1980: 721. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203; 1993: xxiv; 1998a: xxxvi. Kessler et al. 1988: 135. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 133. De Bruyn 1996: 50. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Prinsen 2002: 119; 2005: 115. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 14. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 277. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen) (211g). FR: (75r), Ooststellingwerf (75n). DR: (160c), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160c, 160h), Dwingeloo (160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119, 224a, 224b), De Bilt (20), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Roggebotzand (174g), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (119), Loosduinen ? (119), Wassenaar ? (119), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (230e), Drimmelen (De Worp) (215f), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Leende (Strijperheg) (230x), Lieshout (Ruweelsels) (230x), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leempuppen) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Tongelreep) (230x), Waalre (Dommeldal) (230x). LI: Bergen (Maasdijken) (215m), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (193b), Schinveld (Breukberg) (164n), Weert (Wijffelterbroek) (230x), Wellerloo (62).

Maro minutus O.P.-Cambridge, 1907

Maro minutus; Van Helsdingen 1963b: 25; 1984: 3. Spoek 1997b: 10.

DR: Dalen (142), Emmen (Bargerveen) (225b). NH: Kortenhoefse Plassen (147j).

Maso gallicus Simon, 1894

Maso gallicus; Peeters 1985: 50. Herkenbosch (Meinweg) (150r). Vogels 2019: 29.

LI: Beesel (204c), Belfeld (204c), Reuver (204c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Roerdalen (Meinweg) (236c).

Maso sundevalli (Westring, 1851)

Neriene sundevalli; Van Hasselt 1885c: 168; 1890b: 198; 1898: 53.
 Maso sundevalli; Van Damme et al. 1959: 52. Hulsebos 1959: 254. Van Helsdingen 1961: 242; 1963b: 4; 1976: 40; 1984: 3; 2019b: 37. Chrysanthus 1966: 156. Fokkema 1978: 100. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Koomen 1992: xxviii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1999: xxxv; 2000: xxxix; 2010: 210; 2015: 158. Koomen et al. 1996: xxvi; 2001: xl; 2004: 207. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www) 2017: 277. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Prinsen et al. 2009: 191. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 27; 2013: 26. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.
 Mecynargus paetulus; Koomen 1999: xxxv. (foute determinatie, = *Maso sundevalli* (Westring, 1851) (pers. med.)

GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (142, 160a), Ooststellingwerf (75n). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa, Wapserveld) (183a). OV: Ommen (Archem) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Bronckhorst/Veldwijk

(211n), Lochem (136, 140, 142), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Winterswijk (182g). FL: Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: 's-Gravenhage (129, 140, 142). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Cottessen (182e), Heerlen (68, 142), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

(*Mecynargus paetus* (O.P.-Cambridge, 1875))

- Mecynargus paetus*; Koomen 1999: xxxv. (foutie determinatie, = *Maso sundevalli* (Westring, 1851) (pers. med.)

GR: De Marne (Marnewaard) (182k).

Er zijn geen andere meldingen van deze soort. De soortnaam is van de Nederlandse lijst geschrapt.

***Megalepthyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830)**

Lepthyphantes nebulosus (Sundevall)

- Linyphia circumflexa*; Six 1858b: 295.
- Linyphia nebulosa*; Becker 1879a: xlivi.
- Leptyphantes nebulosus*; Van der Hammen 1950: 111. Chrysanthus 1957b: 31. Van Helsdingen 1963b: 26.

Onjuiste vermelding: Fokkema 1978: 100 (= *Leptyphantes leprosus* (Ohlert)) (zie 75r).

UT: Utrecht (7, 220). ZH: Leiden (83). LI: Heerlen (62), Sint Pietersberg (in grot) (83).

***Mermessus denticulatus* (Banks, 1898)**

Eperigone eschatologica (Crosby, 1924)

- Eperigone eschatologica*; Prinsen 1996: 1.
- Mermessus denticulatus*; Van Helsdingen & IJland 2007: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Van Helsdingen et al. 2013: 26. Wielink et al. 2020: 342.

GL: Zaltbommel (Gamrensche Waard, Hurwenensche Waard) (150 l). ZH: Westland (211e). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Roerdalen (Hoosden) (150s).

***Mermessus trilobatus* (Emerton, 1882)**

- Mermessus trilobatus*; Van Helsdingen et al. 2007: 28; 2008: 15, 20; 2010: 17; 2015a: 5. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Tutelaars 2017: 277. Bloem et al. 2021: 38. Wielink et al. 2020: 342.

OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Reijerscamp) (150 l, 150m, 150o). ZH: Rotterdam (Blijdorp) (16 l). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r).

***Metopobactrus prominulus* (O.P.-Cambridge, 1873)**

- Walckenaera prominula*; Van Hasselt 1885c: 171; 1890b: 208 (beide p. p.).
- Metopobactrus prominulus*; Van Heerdt et al. 1960: 234. Van Helsdingen 1961: 246; 1963b: 9; 2019b: 37. Meijer 1976a: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen et al. 1995: xxx. Vangsgård et al. 1996: 81. Bonte et al. 2003a: 26, 57; 2003b: 910. Spoek 2005: 27. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Koomen 2015: 158. Wielink et al. 2020: 342.

W: (231a). FR: Terschelling (137, 142), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: Loosduinen (119, 140, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Heeze (Strabrechtse Heide-Scheidingsven) (215f), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d).

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

- *Neriene herbigrada*; Van Hasselt 1885c: 165.
- *Micrargus herbigradus*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 53. Van Helsdingen 1961: 246; 1963b: 10; 1976: 40; 1997a: 117; 1999a: 7; 2003d: 22. Hulsebos 1962: 235; 1995: 5. Meijer 1974: 172. Koomen 1986: 202; 1992: xxviii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxix; 2015: 158. Kessler et al. 1988: 135. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxvii; 2001: xl. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. Mabelis 1996: 127. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 27. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 277. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009a: 7; 2010: 17; 2012: 27. Lambeets 2008: 14. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

GR: Lauwersmeer (198u), Leens (182k). FR: Terschelling (Formerum, Hoorn) (182v), Fochteloeरveen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (142, 160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Twente (191b), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Roggebotzand (174g), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119, 140, 142). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Leende (Strijperheg) (230x), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Valkenswaard (Het Heike) (230x), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (64, 142), Colmond (64, 142), Eys (De Piepert) (183r), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Thorn (Koningssteen) (182m), Vaals (182e), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a), Weert (Wijffelterbroek) (230x).

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

Nothocyba subaequalis (Westring, 1851)

- *Nothocyba sunaequalis*; De Jong 1949: 215. Van Helsdingen 1963b: 10. Chrysanthus 1966: 156.
- *Micrargus subaequalis*; Koomen 1986: 202; 1999: xxxv; 2000: xxxix. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. Van Helsdingen 1997a: 117; 2003d: 22. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2017: 277. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 26; 2003b: 910. Spoek 2005: 27. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u), Leens (182k). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst)

(75b), Apeldoorn (142), Renkum (Reijerscamp) (150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Abcoude (Botshol) (142, 169c), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (68), Maasband (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Thorn (Koningssteen) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Microctenonyx subitaneus (O.P.-Cambridge, 1875)

- *Aulacocyba subitanea* (O.P.-Cambridge)
- *Walckenaera insecta*; Van Hasselt 1885c: 175 (p. p.); 1890b: 199 (p. p.); 1898: 73 (p. p.).
- *Walckenaera subitanea*; Van Hasselt 1890b: 187; 1898: 54, 73. Schmitz 1915: 190.
- *Walckenaera parisiensis*; Van Hasselt 1890b: 187 (p. p.).
- *Aulacocyba subitanea*; Van Helsdingen 1961: 251; 1963b: 16.
- *Microctenonyx subitaneus*; Prinsen 2005: 114.

NL: (217z, in mierennesten). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: Doorn (in mierennesten) (136, 140, 142). ZH: Loosduinen ? (119, 140, 142), Nootdorp (129, 140, 142), Wassenaar ? (129, 140, 142).

Microlinyphia impigra (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Linyphia impigra*; De Jong 1949b: 214. Van Helsdingen 1963b: 34; Meijer 1974: 172. Fokkema 1980: 724.
- *Microlinyphia impigra*; Van Helsdingen 1970: 56; 1984: 3; 1999b: 10; 2002b: 11. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 10; 2001e (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Koomen et al. 2005: 88. Van 't Veer et al. 2012: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: (75r). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b). FL: N.O.-Polder (169e). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Zaandstad (Euverenweg) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Brielse Maas (146), Hoogmade (146), Nieuwkoopse Plassen (146). NB: Cranendonck (230e). LI: Heerlen (146).

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

- *Linyphia pratensis*; Six 1858b: 295.
- *Linyphia pusilla*; Becker 1879a: xlili. Van Hasselt 1885c: 186 (p. p.). Chrysanthus 1951d: 83; 1951g: 98. Van Helsdingen 1961: 262; 1963b: 34. Meijer 1973b: 30; 1974: 172.
- *Microlinyphia pusilla*; Van Helsdingen 1970: 16; 1976: 41; 1984: 3; 1999a: 7; 2003d: 22. Fokkema 1980: 724. Koomen 1986: 203; 1991: xix; 1993: xxxiv; 1994: xxxiv; 2015: 158. Bosmans 1988: 33. Koomen et al. 1995: xxx; 1997: xxxviii; 2004: 207. Spoek 1997b: 10; 2005: 27. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2003: 6. Prinsen 2002: 119; 2005: 115. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 25. Lambeets 2008: 14. Noordijk 2008: 33. IJland et al. 2010: 27. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 18. Bink 2016: 3. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Versteeg 2024: 11.

NL: (119). GR: Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: (75r), Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg) (183a), Terschelling (Noordvaarder, Koegelwieck) (182v), Fochteloeërveen (148e). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Hoog Soeren (146), Kootwijk (146), Kootwijkerveen (146, 147a), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Staverden (146), Tondensche Heide (146), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: (7), Driebergen (220), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zaandstad (Zaandam, Giusveld) (232b). ZH: Papendrecht (import) (16h). NB: Bladel (187a), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e, 230k), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Vessem (Landschotse Heide) (17r),

Wintelre (182t). LI: Brunssum (44), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (146, 182a), Rijckholt (44).

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

- Erigone quisquiliarum*; Van Hasselt 1885b: xciv.
- Neriene viaria*; Van Hasselt 1885c: 167; 1890b: 208.
- Neriene innotabilis*; Van Hasselt 1885c: 168; 1890b: 198 (beide p. p.).
- Microneta viaria*; Becker 1896b: 70. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 55. Van Helsdingen 1961: 256; 1963b: 25; 1976: 40; 1984: 3; 2019b: 37. Hulsebos 1962: 235; 1990: 155; 1995: 5. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 203; 1998a: xxxvi; 1999: xxv; 2000: xxxix; 2015: 158. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 133. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 48. Mabelis 1996: 127. Koomen et al. 1997: xxxviii. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2017: 277. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 20; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27; 2013: 26. Prinsen et al. 2009: 192. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

NL: (119). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (174h), Terschelling (Huneplak) (182v), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160c, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Twente (191b), Ommen (Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (129), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (118), Cranendonck (230e), Leende (Strijperheg) (230x), Mierlo ('t Sang) (230x), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Valkenswaard (Tongelreep) (230x), Valkenswaard (Dommeldal) (230x), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x), Veldhoven (Run) (230x). LI: Eys (De Piepert) (183r), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (13b), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Weert (Wijffelterbroek) (230x), Wellerloo (62).

(Micryphantes lichenis (Wider, 1834))

Micryphantes lichenis; Six, 1858b: 295.

Micryphantes olivaceus; Van Hasselt, 1885c: 177.

Opmerking. Het is niet meer te achterhalen welke soort Wider voor zich had. Simon synonimiseerde deze soort met *Micryphantes olivaceus* C.L. Koch, maar met die naam weet men evenmin raad. Volgens Braun (in litt.) is *Micryphantes lichenis* een synoniem van *Moebelia penicillata* (Westring).

Minicia marginella (Wider, 1834)

- Minicia marginella*; Van Helsdingen 1963b: 4; 1976: 40.

GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a).

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

- Micryphantes ochropus*; Six 1858b: 295.
- Erigone pusilla*; Becker 1879a: xlivi.
- Walckenaera pusilla*; Van Hasselt 1885c: 174.

- *Minyriolus pusillus*; Van Damme et al. 1959: 52. Van Helsdingen 1961: 245; 1963b: 8; 1976: 40. Hulsebos 1962: 235. Meijer 1973b: 29. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxvii; 2001: xl. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Koomen 1998a: xxv; 2015: 158. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2009c (www). Kessler-Geschire 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Prinsen 2005: 114; 2007: 142. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Wielink et al. 2020: 342.
- *Acartauchenius scurribilis*; Hulsebos 1962: 235. Versteeg 2024: 11.

FR: Ameland (196), Terschelling (Oosterend) (182v). DR: Dwingeloo (142, 160c), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Ommen (Archem) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wekerom (16b). UT: Utrecht (7, 140, 142, 220). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Schoorl (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119, 140, 142). NB: Cranendonck (230e), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Leende (Strijperheg) (230x), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d).

Mioxena blanda (Simon, 1884)

- *Mioxena blanda*; Meijer et al. 1975: 139. Prinsen 1985: 1. Siepel et al. 1996: 46, 48, 52, 53. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 25. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: Lauwerszeepolder (198v), Lauwersmeer (198u). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m). FL: Almere (218b), NO-polder (211b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s).

Moebelia penicillata (Westring, 1851)

- *Micryphantes lichenis*; Six 1858b: 295. -Volgens Braun (in litt.) is *Microphantes lichenis* (Wider) een nomen oblitum en tevens een synoniem van *Moebelia penicillata* (Westring)].
- *Micryphantes olivaceus*; Van Hasselt 1885c: 177.
- *Neriene penicillata*; Van Hasselt 1885c: 169; 1890b: 198; 1898: 53.
- *Moebelia penicillata*; Chrysanthus 1958b: 144. Hulsebos 1959: 254; 1962: 235. Van Helsdingen 1961: 245; 1963b: 8; 1976: 40; 2019b: 37. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2001: xl. Simon Thomas et al. 2000: 5. Noordijk et al. 2001: 25. Prinsen 2005: 114. Prinsen et al. 2009: 192. Van Helsdingen et al. 2010: 17. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17.

FR: Schiermonnikoog (142, 160a), Terschelling (Formerum) (182v), Dokkum (202m), Metsalawier (202m). DR: Assen (202m), Dwingeloo (142, 160c), De Wijk (142, 160c), Emmen (202m). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Oosterbeek (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Ulft (202m), Wageningen (119, 140, 142). UT: Utrecht (20). NH: Amsterdam (202m), Egmond (182w), Zaandam (202m, 232b). ZH: Gouda (202m), 's-Gravenhage (Haagse bos) (136, 140, 142), Leiden (202m), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Zierikzee (129, 140, 142). NB: Bladel (187a). LI: Heerlen (64, 140, 142), Maastricht (129, 140, 142), Roermond (129, 140, 142), Stokhem (202m), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Monocephalus castaneipes (Simon, 1884)

- *Monocephalus castaneipes*; IJland et al. 2011: 19, 21.

LI: Eperheide (Bovenste Bos) (164n).

Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836)

□ *Monocephalus fuscipes*; Chrysanthus 1961: 40. Van Helsdingen 1963b: 20. Meijer 1973a: 179. Koomen 1986: 202. Lambeets 2008: 14. Vogels 2019: 30.

GR: Lauwerszeepolder (195). LI: Heerlen (65, 142), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (Sint Pietersberg) (in grot) (236b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841)

□ *Micryphantes sanguinolentus*; Six 1860: 21; 1863: 126.
□ *Walckenaera sanguinolenta*; Van Hasselt 1885c: 176; 1887a: xxxii; 1892: xxviii; 1898: 54.
□ *Nematogmus sanguinolentus*; Van Helsdingen 1961: 249; 1963b: 14. IJland 2009: 4.

OV: De Lutte (131), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c). GL: Winterswijk (123). UT: (119, 140, 142), Driebergen (142, 222a, 222b). NH: Texel (136, 140, 142). ZH: (119, 140, 142).

Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

□ *Linyphia multiguttata*; Six 1858b: 295; 1863: 125.
□ *Linyphia clathrata*; Becker 1879a: xlivi; 1896b: 32. Van Hasselt 1885c: 185. Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1951d: 83; 1951g: 98. Van Damme et al. 1959: 59. Hulsebos 1959: 254; 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 261; 1963b: 33; 1987: 187. Meijer 1973b: 30; 1974: 172. Kessler et al. 1988: 135. De Bruyn 1996: 46.
□ *Linyphia pusilla*; Van Hasselt 1885c: 186 (p. p.).
□ *Neriene clathrata*; Van Helsdingen 1969: 91; 1976: 41; 1984: 3; 1997a: 117; 1999a: 7; 2002b: 11; 2019b: 37. Fokkema 1978: 100; 1980: 724. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 7. Hulsebos, 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Jacobs 1992: 133. Koomen 1993: xxxiv; 1996: 173, 218; 1998a: xxxvi; 1998b: 225; 2000: xxxix; 2010: 210; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxxvi; 1997: xxxviii; 2001: xl; 2004: 207. Noordam 1996: 9, 22. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Noordam et al. 1998: 344. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2006: 16; 2009c (www); 2017: 277. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 26. Prinsen 2005: 115; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 192. Bonte 2006: 14. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 20; 2009b: 17; 2012: 27, 29; 2013: 26. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 16. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

NL: (7, 13b, 119). FR: (75r), Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum, Hoorn, Oosterend) (182v), Fochtelooërveen (148e), Ooststellingwerf (75n). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160f, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Meppel (160b), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Ruinerwold (160b), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zweeloo (Mepperveld) (182f). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Archem, Eerde) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: (222b), De Bilt (220), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (220), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Hoogmade (145), Nieuwkoopse Plassen (145), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (230e), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhouwense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Brunssum (44, 145), Gulpen (Waterop) (147o), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (193b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Nederweert (De Banen) (182m), Neercanne (44), Obbicht - Grevenbicht (186c), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal)

(145, 165a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Valkenburg (in gang van *Talpa europaea* L.) (151c).

Neriene emphana (Walckenaer, 1841)

- Linyphia emphana*; Chrysanthus 1951d: 83; 1951f: 77; 1951g: 98; 1963: 25. Van Helsdingen 1963b: 33.
- Neriene emphana*; Van Helsdingen 1969: 216. Koomen 1986: 203.

GL: Apeldoorn (Hoog Soeren, Wiessel, Niersen) (145), Epen (145), Nijmegen (145). NB: Boxtel (Kampina) (145). LI: Zuid-Limburg (41, 66), Rijckolt (43, 44).

Neriene furtiva (O.P.-Cambridge, 1871)

- Linyphia furtiva*; Van Helsdingen 1963b: 34.
- Neriene furtiva*; Van Helsdingen 1969: 112. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi. Prinsen 2005: 115. IJland et al. 2011: 21. Franken et al. 2016: 177.

GL: Apeldoorn (Hoog Soeren, Hoog Buurloo) (142, 145), Ede (Hindekamp, Mosselsche Veld) (75w1), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NB: Casteren (Cartierheide) (182t). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (142, 145), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Neriene hammeni (Van Helsdingen, 1963)

- Linyphia hammeni*; Van Helsdingen 1963a: 153; 1963b: 34. Chrysanthus 1966: 157.
- Neriene hammeni*; Van Helsdingen 1969: 130; 1987: 185-186. Blick et al. 1993: 40. Jacobs 1992: 133.

L: Gulpen (Waterop) (16k, 147o), Heerlen (68, 141, 142, 145, 147o), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

Neriene montana (Clerck, 1757)

- Linyphia resupina*; Six 1858b: 294. Snellen van Vollenhoven 1859: 53; 1868: 53. Van Hasselt 1870b: 30. Becker 1879a: xliii; 1879c: clxxvi. Pinkhof 1941: 230.
- Linyphia montana*; Six 1858b: 295. Van Hasselt 1876b: iii; 1885c: 185; 1886c: 103. Becker 1879a: xliii; 1896b: 17. Van der Hammen 1949a: 79. Chrysanthus 1951d: 83; 1951g: 98. Hulsebos 1959: 254 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 261; 1963b: 30; 1969: 99; 1984: 3; 2019: 38. Meijer 1974: 172. Fokkema 1978: 100; 1980: 724. Vossen 1983: 236. Kessler et al. 1988: 135.
- Neriene montana*; Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203; 1992: xxviii; 1994: xxxiv; 2000: xxxix; 2010: 210. Koomen et al. 1997: xxxviii. Spoek 1997b: 10. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Prinsen 2002: 119. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 192. Van Helsdingen 2002b: 11; 2019b: 47. Tutelaers 2003: 6; 2006: 16; 2017: 277. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. IJland et al. 2010: 28. Van 't Veer et al. 2012: 16. Bink 2019: 7. Vogels 2019: 28.

NL: (7, 119, 224a, 224b). GR: Vlagtwedde (Weende) (211g). FR: (75r), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum, Hoorn) (182v), Bolsward (122), Heerenveen (215f), Ooststellingwerf (75n), Oranjewoud (122). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (160b), Meppel (160b), Vries (De Punt) (211k). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: (7), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Baak (waard) (211n), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Molencate (91), Winterswijk (182g). FL: Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: (7, 220), Baarn (in kas) (81), Driebergen (220), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (206f), Hilversum (103), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Zaanstad (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Barendrecht (import) (16 i), Leiden (145), Nieuwkoopse Plassen (145), Oegstgeest (145), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7), Cranendonck (230k), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (236c), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x). LI: Brunssum (44), Cottessen (182e), Echt (in grot) (239b), Jabeek (193b), Maastricht (9,

13b, 145), Mechelen (Elset) (182e), Mheer (145), Oud-Valkenburg (Gerendal) (145, 182a), Rijckholt (44), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Vaals (182e), Wahlwiller (44).

Neriene peltata (Wider, 1834)

- *Linyphia peltata*; De Jong 1949b: 214. Chrysanthus 1951f: 77; 1951g: 98. Van Heerdт et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1963b: 33.
- *Neriene peltata*; Van Helsdingen 1969: 257; 1976: 41; 1984: 3; 2002b: 11; 2019: 47; 2019b: 38. Koomen 1991: xix; 1992: xxviii; 1993: xxxiv; 1994: xxxiv; 1996: 218; 1998a: xxxvi; 1998b: 225; 2000: xxxix; 2010: 210; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 1997: xxviii; 2004: 207. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Simon Thomas et al. 2000: 6. Prinsen 2005: 115. Prinsen et al. 2006: 89. Tutelaers 2006: 16; 2009b: 13; 2017: 277. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 27; 2013: 26; 2015a: 5. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 181, 342.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg) (183a), Terschelling (137), idem (Formerum) (182v). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (182f). OV: Ommen (Lemelerberg) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren, Wiessel) (145), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Kotten (43, 169e), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Winterswijk (182g). FL: Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Zaandam, Guisveld) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Groote Heide) (230r), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Ulvenhout (43, 169e), Veldhoven (Halfmijl) (236c), Wintelre (182t). LI: Brunssum (43, 44), Epen (145), Eperheide (Bovenste Bos, Onderste Bos) (164n), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (145), Mheer (145), Oud-Valkenburg (Gerendal) (145), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Vaals (182e), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Neriene radiata (Walckenaer, 1841)

- *Linyphia marginata*; Becker 1896b: 22.
- *Neriene radiata*; Van Helsdingen 1981b: 15. Koomen 1992: xxviii.

NL: nog voorkomend? (147g). LI: Maastricht (13b), Vaals (182e).

Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)

Leptyphantes obscurus (Blackwall, 1841)

- *Linyphia obscura*; Van Hasselt 1885c: 180.
- *Leptyphantes obscurus*; Hulsebos 1959: 254; 1962: 235. Van Helsdingen 1961: 257; 1963b: 27; 1984: 3. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Prinsen et al. 2009: 192.
- *Obscuriphantes obscurus*; Roelofs-Ditters 2007: 24. IJland et al. 2011: 20, 21.

FR: Schiermonnikoog (160a). DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Veenhuizen (119), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). ZH: Wassenaar (119). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (215f, 230e), Oirschot (De Mortelen) (230v). LI: Eperheide (Bovenste Bos) (164n).

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)

- *Oedothorax agrestis*; Chrysanthus 1958b: 144. Hulsebos 1962: 235 (p. p.). Van Helsdingen 1963b: 15. Koomen 1994: xxxiii. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 25.

Onjuiste opgave: Van Hasselt 1885c: 165 (= *Oedothorax fuscus* (Blackwall)) (zie 140).

DR: Meppel ? (142, 160c). GL: Winterswijk (182g). NB: Cranendonck (215f, 230e), NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f). LI: Heerlen (64, 142).

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

- *Neriene apicata*; Van Hasselt 1885c: 166.
- *Oedothorax apicatus*; Chrysanthus 1958b: 144. Hulsebos 1959: 254; 1961: 4. Van Damme et al. 1959: 52. Van Helsdingen 1961: 250; 1963b: 15; 1976: 40; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Meijer 1973a: 179; 1976b: 251; 1977: 84, 85, 88; 1980a: 229. Fokkema 1978: 100. Koomen 1986: 202; 1994: xxxiii. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 58. Spoek 1997b: 5; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2006: 16. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Bonte 2006: 9, 14. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 20; 2009a: 7; 2010: 17. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwerszeepolder (195, 198b, 198c, 198e), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (142, 160a), Ooststellingwerf (75n). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Dwingeloo (142, 160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). ZH: Loosduinen (119, 142), Monster (119, 142). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Heerlen (64, 142), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)

- *Erigone tarsalis* Thorell 1875a: 90 (spec. nov., ♂); 1875b: 43.
- *Neriene fusca*; Van Hasselt 1885c: 165 (p. p.).
- *Neriene agrestis*; Van Hasselt 1885c: 165.
- *Neriene retusa*; Van Hasselt 1885c: 166 (p. p.).
- *Neriene tarsalis*; Van Hasselt 1898: 52.
- *Oedothorax fuscus*; Chrysanthus 1955c: 16. Van Helsdingen 1961: 251; 1963b: 16; 1976: 40; 1978a: 194; 1984: 3; 1997a: 117; 1998: 5; 2002a: 10, 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 38. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23; 1990: 155; 2019: 47. Meijer 1971: 61; 1973a: 179; 1977: 84, 85, 88; 1980: 229; 1980b: 20. Fokkema 1978: 100. 1978b: 609. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 202; 1992: xxviii; 1993: xxxiv; 1994: xxxiii; 1996: 172, 218; 1998b: 225; 2000: xxxix. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Verstegen et al. 1992: 74, 75. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 58. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2001: xl; 2005: 88. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2006: 16; 2008: 27; 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Noordijk et al. 2001: 25. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Bonte 2006: 9, 14. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 192. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 20; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.
- *Oedothorax agrestis*; Hulsebos 1962: 235 (p. p.).

NL: (228, 229; 232w: heide hogere gronden). GR: Groningen (148d), Lauwerszeepolder (194, 195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u). FR: (75q), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 180b), Terschelling (Formerum, Seeryp) (182v), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo

(142, 160c, 160f, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (119, 140, 142, 147b), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld) (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Ackerdijkse Plassen (148j), 's-Gravenhage (Haagse bos) (119, 140, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Boxmeer (202m), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Oisterwijk (136, 140, 142), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Illikhoven (Visserweert) (186c), Kerkrade (55, 142), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

Oedothorax tuberosus (Blackwall, 1841)

- Oedothorax tuberosus*; Van Helsdingen 1963b: 16; 1976: 40. Meijer 1974: 172. Hulsebos 1989: 23.
- Oedothorax gibbosus/tuberosus*; Van Helsdingen 1984: 3. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215.
- Oedothorax gibbosus*; Koomen 1991: xix; 1999: xxxv. Siepel et al. 1996: 51, 53. Van Helsdingen 1997a: 117; 1999a: 7. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Tutelaers 2000: 16; 2001e ([www](#)); 2009c ([www](#)). Koomen et al., 2004: 207. Prinsen 2007: 142. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12. IJland et al. 2010: 28. Van Helsdingen et al. 2012: 29; 2013: 26; 2015a: 5.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k). FR: Fochtelooërveen (148e). DR: Dwingeloo (160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a), Winterswijk (142). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Leende (Strijperheg) (230x). LI: Maasgouw (Linnerheide) (150s), Roerdalen (Hoosden) (150s), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

- Neriene fusca*; Van Hasselt 1885c: 165 (p. p.).
- Neriene retusa*; Van Hasselt 1885c: 166 (p. p.).
- Gongylidium retusum*; Becker 1896b: 85.
- Oedothorax retusus*; Van Heerdt et al. 1960: 234; 1967: 111. Van Helsdingen 1961: 251; 1963b: 15; 1997a: 117; 1998: 6; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23. Meijer 1973a: 179; 1977: 84, 85; 1980a: 229; 1980b: 20. Van Wingerden 1973: 208; 1977: 105. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Kessler et al. 1984: 262. Peeters 1985: 51. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Koomen 1994: xxxiii; 1998b: 225; 2000: xxxix. Siepel et al. 1996: 45, 48, 51, 53. Koomen et al. 1997: xxvii. Spoek 1997b: 9. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e ([www](#)); 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Bonte 2006: 14. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 20; 2009a: 7; 2010: 17. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 17. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 10.

GR: Groningen (148d), Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 180b, 210a, 253, 254a), Terschelling (137, 138, 142), idem (Midsland, Noordvaarder, Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Barneveld (Kootwijkerveld) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b). ZH: 's-Gravenhage (Haagse bos) (119, 140, 142). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Bladel (187a), Breda (13b), Cranendonck (230e), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Illikhoven (Visserweert) (186c), Jabeek (193b), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Reuver (204c), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1880)

- *Ostearius melanopygius*; De Jong 1982: 115. Koomen 1996: 173, 218; 1998b: 225. Siepel et al. 1996: 48, 53. Prinsen 1997: 1. Van Helsdingen 1997a: 117; 2003d: 22. Ma et al. 1997: 76; 2002a: 10, 11. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 10; 2001e (www). Heuts 2001: 11. Koomen et al., 2004: 207; 2005: 88. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Bink 2014b: 13. Noordijk & Groenendijk 2020: 14. Bloem et al. 2021: 38. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Barneveld (Kootwijkerveld) (215m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (Wageningseberg) (202ab), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: Amsterdam (151u), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y). ZH: Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Westland (211e). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Soerendonk (169f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j).

Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853)

Lepthyphantes ericaeus (Blackwall, 1853)

- *Linyphia ericaea*; Van Hasselt 1886c: 108; 1890b: 190.
- *Leptyphantes ericaeus*; Chrysanthus 1958b: 143. Van Damme et al. 1959: 58. Van Helsdingen 1961: 259; 1963b: 28; 1976: 41; 1999a: 7; 2002a: 11; 2003d: 22. Meijer 1976a: 7. Koomen 1986: 203; 1999: xxxv. Bosmans 1988: 32. Deelman-Reinhold 1990: 110. Versteegen et al. 1992: 71. Siepel et al. 1996: 51, 53. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28.
- *Centromerus dilutus*; Van Damme et al. 1959: 56 (p. p.).
- *Palliduphantes ericaeus*; Van Helsdingen 2003d: 22. Prinsen 2005: 115. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2010: 17. Tutelaers 2009c (www). IJland 2009: 4. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: Lauwersmeer (198u), Leens (182k). FR: Fochteloevréen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Overmansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerven) (147a), Nijmegen (122, 129), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o),

Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vesse (Landschotse Heide) (17r). LI: Heerlen (64), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Palliduphantes insignis O.P.-Cambridge, 1913

Lepthyphantes insignis O.P.-Cambridge, 1913

- *Lepthyphantes insignis*; Meijer 1973b: 30. Meijer & Van Wingerden 1975: 139. Koomen 1986: 203. Van Helsdingen 1997a: 117; 2002a: 10, 11. Koomen et al. 1997: xxxviii. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2009c (www). Heuts 2003: 8.
- *Palliduphantes insignis*; Van Helsdingen 2003d: 22. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwerszeepolder (198v), Lauwersmeer (198u), Vierhuizen (198a). FR: Ameland (196), Terschelling (Koegelwieck) (182v). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (151w), Zaandstad (Euverenweg) (232b). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Palliduphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871)

Lepthyphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Linyphia zebrina*; Van Hasselt 1885c: 179 (p. p.).
- *Linyphia pallida*; Van Hasselt 1885c: 184.
- *Lepthyphantes pallidus*; Heselhaus 1913: 224. Van der Hammen 1950: 111. Van Damme et al. 1959: 59. Van Helsdingen 1961: 258; 1963b: 28; 1976: 41; 1984: 3; 1997a: 117; 2002a: 11; 2019b: 38. Kessler-Geschire 1972: 153; 2001: 16; 2003: 12. Meijer 1973a: 179. Tutelaers 1978: 88; 2000: 15; 2001e (www). Vossen 1983: 236. Koomen 1986: 203; 1993: xxxiv; 1994: xxxiv; 1999: xxxv. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Hulsebos 1990: 155; 1995: 5. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. De Bruyn 1996: 49. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Noordam et al. 1998: 344. Faber et al. 1999: bijlage 2. Koomen et al. 2001: xl; 2005: 88. Bonte et al. 2003a: 22, 25. Bonte 2006: 14. Noordam 2024: 25.
- *Lepthyphantes leprosus*; Van der Hammen 1947c: 480.
- *Palliduphantes pallidus*; Van Helsdingen 2003d: 22. Kessler 2004: 8. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 16. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwerszeepolder (195), Lauwersmeer (198u), Leens (182k). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (182f). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Nijmegen (83, 119), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (175c), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaandstad (Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Cranendonck (230e), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f), Woudrichem (Fort Giessen) (215f), Waalre (Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Echt (in grot) (239b), Geulhem (in grot) (80, 83), Heerdeberg (in grot) (83), Margraten (Schiepersberg) (210b),

Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Sint Pietersberg (in grot) (83), Sittard (in gang *Talpa europaea* L.) (151b), Valkenburg (in grot) (83), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Panamomops mengei Simon, 1926

Panamomops mengei; Van Helsdingen 1963b: 8. IJland et al. 2010: 28.

UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NB: Oosterhout (142).

Panamomops sulcifrons (Wider, 1834)

Micryphantes sulcifrons; Six 1860: 21; 1863: 126.

Erigone sulcifrons; Becker 1879a: xliv.

Panamomops sulcifrons; Van Helsdingen 1963b: 9.

UT: Utrecht (7, 142, 222a, 222b).

Parapelecopsis nemoraliooides (O.P.-Cambridge, 1884)

Pelecopsis nemoraliooides (O.P.-Cambridge, 1884)

Pelecopsis nemoraliooides; Noordam 1996: 15.

Pelecopsis locketi; De Bruyn 1996: 43.

ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k).

Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)

Pelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)

Walckenaera nemoraliooides; Van Hasselt 1885c: 176.

Lophocarenum nemoralis; Becker 1896b: 134.

Pelecopsis nemoralis; Van Helsdingen 1961: 242; 1963b: 5. Bonte et al. 2003a: 26, 58; 2003b: 910. Bonte 2006: 10, 14.

Parapelecopsis nemoralis; Van Helsdingen 1999b: 10. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www). Spoek 2005: 27. Roelofs-Ditters 2007: 25.

DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zwanenwater (148f). ZH: Loosduinen (119, 140, 142). NB: Cranendonck (215f, 230e). LI: Maastricht (13b).

Pelecopsis elongata (Wider, 1834)

Micryphantes inaequalis; Six 1858b: 295. Ritsema 1872: xxviii. Van Hasselt 1872e: 460; 1873b: 61.

Walckenaera parallela; Van Hasselt 1885c: 173; 1886c: 108 (beide p. p.).

Theridium elongatum; Van Hasselt 1885c: 177.

Erigone elongata; Becker 1879a: xliv.

Pelecopsis elongata; Van Helsdingen 1961: 242; 1963b: 4. Hulsebos 1989: 23. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www).

DR: Dwingeloo (160f). UT: De Bilt (7, 220). NH: Naarden ? (119, 140), Haarlem (99, 101, 142), Overveen (215a), Valkenveen ? (120). ZH: Scheveningen ? (119, 140, 142). NB: Cranendonck (230e). LI: Maastricht ? (122, 140, 142).

Pelecopsis mengei (Simon, 1884)

Pelecopsis mengei; Van Helsdingen 1997a: 117. Lambeets 2008: 10, 14.

UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). LI: Obbicht - Grevenbicht (186c).

Pelecopsis parallela (Wider, 1834)

Walckenaera parallela; Van Hasselt 1885c: 173; 1886a: xxxv; 1886c: 108 (alle drie p. p.).

Lophocarenum parallelum; Chrysanthus 1958b: 144.

- *Pelecopsis parallelia*; Van Helsdingen 1961: 242; 1963b: 4; 1997a: 117; 2003d: 22. Koomen 1986: 203; 1999: xxxv; 2000: xxxix. Hulsebos 1989: 23. Siepel et al. 1996: 52, 53. De Bruyn 1996: 45. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Koomen et al. 2001: xl. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2017: 278. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Bonte 2006: 9, 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 17, 21; 2010: 17. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Prinsen et al. 2009: 192. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 17. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 11.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160f). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Naarden ? (119, 140, 142), Valkenveen ? (120), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Scheveningen ? (119, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Bladel (187a), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Maastricht (64, 122, 140, 142), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)

- *Pelecopsis radicicola*; Koomen 1986: 203. IJland et al. 2010: 28.

UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). L: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Peponocranium ludicum (O.P.-Cambridge, 1861)

- *Walckenaera prominula*; Van Hasselt 1885c: 171 (p. p.).
- *Walckenaera ludicra*; Van Hasselt 1885c: 176; 1898: 53.
- *Peponocranium ludicum*; Van Helsdingen 1961: 247; 1963b: 11. Meijer 1973b: 29. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 27; 2009c (www). Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen et al. 1995: xxx; 1997: xxvii; 2001: xl; 2004: 207; 2005: 88; 2015: 158. Vangsgård et al. 1996: 81. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Bonte et al. 2003a: 22, 26; 2003b: 910. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2010: 17. IJland 2009: 4. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 235 (= *Pocadicnemis pumila* (Blackwall)) (zie 142).

W: (231a). FR: Ameland (196), Terschelling (Huneplak, Noordvaarder) (182v). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c). GL: Nijkerk (136, 140, 142), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Schoorl (182w), Texel (142), Texel (Mokbaai) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119, 140, 142), Monster (119, 140, 142). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f, 230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pityophyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836)

- *Pityophyphantes phrygianus*; De Jong 1982: 115. Hulsebos 1995: 4, 5. Spoek 1997b: 10. Lambregts et al. 2013: 18.

DR: Diever (160h), Emmen (Oosterbos) (225b). NB: Bladel (187a). LI: Eperheide (169f).

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

- *Pocadicnemis juncea*; Van Helsdingen 1987: 187; 1997a: 117; 2019b: 38. Koomen 1986: 203; 1994: xxxiii; 1999: xxv; 2000: xxix. Poot et al. 1989: 6. Siepel et al. 1996: 46, 47, 50, 53. De Bruyn 1996: 48. Koomen et al. 1997: xxvii; 2001: xl. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Faber et al. 1999: bijlage 2. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Bonte 2006: 14. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 25. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Terschelling (Amelanderduin, Oosterend) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Tubbergen (Springendal) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Lochem (Groot Boevink) (211n), Winterswijk (182g). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Schoorl (182w), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld, Zaandam) (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (202c), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

- *Walckenaera pumila*; Van Hasselt 1890b: 190.
- *Pocadicnemis pumila*; Chrysanthus 1955c: 16. Van Damme et al. 1959: 52. Van Heerdt et al. 1960: 234; 1967: 111. Van Helsdingen 1961: 248; 1963b: 13; 1976: 40; 1984: 3; 1999a: 7. Meijer 1973b: 29; 1976a: 7. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Poot et al. 1989: 6. Hulsebos 1989: 23; 1995: 5. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Verstegen et al. 1992: 74, 78. Koomen 1992: xxviii; 1993: xxxiv; 1994: xxxiii; 1998a: xxxvi. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 2004: 207; 2005: 88. Spoek 1997b: 9; 2005: 27. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 29. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.
- Peponocranium ludicum*; Hulsebos 1962: 235.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (210a), Terschelling (137, 138, 142), Fochtelooërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Diever (160h), Dwingeloo (142, 160c, 160f), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Lochem (Groot Boevink) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Mokbaai) (182y), Zaanstad (Euverenweg) (232b). ZH: Loosduinen (129, 140, 142). NB: Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Eersel (182t), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182e), Wellerloo (55, 142).

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)

Poeciloneta globosa (Wider, 1834)

- *Linyphia variegata*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1885c: 180.
- *Lepthyphantes tenuis*; Chrysanthus 1951g: 98 (p. p.).
- *Poeciloneta globosa*; Chrysanthus 1966: 156. Hulsebos 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 259; 1963b: 29. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 10. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www).

DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: Nijmegen (119). ZH: Katwijk (119), Loosduinen (119), Scheveningen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (230e). LI: Brunssum (44), Mook (109).

Porrhomma cambridgei Merrett, 1994

□ *Porrhomma cambridgei*; Faber et al. 1999: 31, bijlage 2.

GL: uiterwaarden Waal (Ophemert) (75a2).

Porrhomma campbelli F.O.P.-Cambridge, 1894

□ *Linyphia oblonga*; Van Hasselt 1885c: 187 (p. p.).
□ *Linyphia errans*; Van Hasselt 1886c: 108; 1890b: 202 (beide p. p.). Van Helsdingen 1961: 259; 1963b: 30.
□ *Porrhomma campbelli*; Koomen et al. 1995: xxx. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2008: 21. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Wielink et al. 2020: 342.

Herkomst van Van Hasselt's materiaal onzeker: één exemplaar, afkomstig uit het materiaal van *Porrhomma microphthalmum* uit de collectie Van Hasselt, door Van Hasselt verzameld in Arnhem, De Bilt en Scheveningen.

GL: Renkum (Reijerscamp) (150m). NB: Cranendonck (215f, 230e), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t).

Porrhomma convexum (Westring, 1851)

□ *Porrhomma convexum*; Chrysanthus et al. 1959: 184. Van Damme et al. 1959: 54. Van Helsdingen 1963b: 29; 1976: 40. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Van 't Veer et al. 2012: 17.

OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Zaanstad (Guisveld) (232b). NB: Cranendonck (230e).

Porrhomma egeria Simon, 1884

□ *Porrhomma egeria*; Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1958b: 144. Van Helsdingen 1961: 259; 1963b: 29. Koomen 1986: 203. Poot et al. 1989: 7. Jacobs 1992: 133. Heuts 2002: 7.

NH: Uithoorn (151v). LI: Colmond (64), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (136), Schin op Geul (64), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c).

Porrhomma errans (Blackwall, 1841)

□ *Porrhomma errans*; Meijer & Van Wingerden 1975: 140. Koomen 1986: 203; 1999: xxxv. Noordam 2024: 25.

Onjuiste vermelding: Hulsebos 1962: 235 (= *Porrhomma montanum* Jackson) (zie 142).

GR: Grijpskerk (198v). UT: Utrecht (Amelisweerd) (201v). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990

□ *Porrhomma spec.*; IJland et al. 2010: 25.
□ *Porrhomma rosenhaueri*; Faber et al. 1999: bijlage 2; Van Helsdingen 2003d: 22.
□ *Porrhomma microcavense*; Van Helsdingen et al. 2011: 23.

GL: Ophemert (Stiftsche Waarden) (150q), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: Rhenen (Grebbeberg) (150q).

Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Neriene pygmaea*; Van Hasselt 1885c: 165; 1886c: 107; 1898: 52.
- *Linyphia oblonga*; Van Hasselt 1885c: 187 (p. p.).
- *Linyphia errans*; Van Hasselt 1885c: 108; 1890b: 202 (beide p. p.).
- *Porrhomma microphthalmum*; Van Helsdingen 1961: 259; 1963b: 29; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Meijer 1973a: 175, 179; 1977: 84, 85, 88; 1979: 49; 1980a: 229; 1980b: 20. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. Ma et al. 1997: 76. Koomen 1999: xxxv. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009a: 7; 2010: 17. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Bink 2016: 3. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342. Sies 2024: 104.

GR: Lauwerszeepolder (195, 198c, 198d, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Angerlo (136), Arnhem (129), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: De Bilt (129), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: Papendrecht (import) (16h), Scheveningen (122, 129). ZE: Oosterscheldekering (landzijde, tussen Roompotsluis en Matenhaven) (218d). NB: Breda (119), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), 's-Hertogenbosch (Moerputten) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Tongelreep) (230x). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Porrhomma microps (Roewer, 1931)

- *Porrhomma lativela*; Van Helsdingen 1985: 4; 1986c: 14; 2002a: 11; 2003d: 22. Spoek 1997b: 10. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 25. Noordam 2024: 21, 25.

DR: Emmen (Oosterbos) (225b). GL: Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Utrecht (Amelisweerd) (147k, 147n, 201v). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f).

Porrhomma montanum Jackson, 1913

- *Porrhomma errans*; Hulsebos 1962: 235.
- *Porrhomma montanum*; Hulsebos 1964a: 95. Van Helsdingen 1963b: 29; 1997a: 117. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 27.

DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b).

Porrhomma oblitum (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Linyphia oblitum*; Van Hasselt 1890b: 190.
- *Porrhomma oblitum*; Van Helsdingen 1961: 260; 1963b: 30; 1981a: 37. Koomen 1986: 203. Poot et al. 1989: 7. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Roelofs-Ditters 2007: 25.

GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b). ZH: Nootdorp (129). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f). LI: IJsselsteyn (Paardekop) (147f), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Porrhomma pallidum Jackson, 1913

- *Linyphia decens*; Van Hasselt 1885c: 184.
- *Porrhomma pallidum*; Chrysanthus et al. 1959: 184. Van Damme et al. 1959: 55. Van Helsdingen 1961: 259; 1963b: 30; 1976: 40. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10. Poot et al. 1989: 7. Hulsebos 1990: 155; 1995: 5, 6. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 10; 2005: 27. Roelofs-Ditters 2007: 25. Van Helsdingen et al. 2010: 17. Lambregts et al. 2013: 18

DR: Diever (160h), Dwingeloo (160g), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Renkum

(Reijerscamp) (150o), Wekerom (16b). ZH: Delft (119). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Heezerven) (230d). LI: Margraten (Schiepersberg) (210b).

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)

- *Porrhomma pygmaeum*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 54. Van Helsdingen 1963b: 29; 1976: 40; 1997a: 117; 1999b: 10; 2002a: 11; 2003d: 22. Kessler-Geschiere 1965: 159. Jacobs 1992: 133. Koomen 1993: xxiv; 1994: xxiv; 1996: 173, 218; 1998b: 225; 2015: 158. Koomen et al. 1997: xxxviii. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 28. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers et al. 2008: 12. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Van Helsdingen et al. 2010: 17. Van 't Veer et al. 2012: 17. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Schiermonnikoog (175a), Terschelling (Kroonpolders) (182v). DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Zaanstad (Guisveld) (232b), Zwanenwater (148f). NB: Cranendonck (215f, 230e), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Lieshout (Ruweelsels) (230x), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Kerkrade (64), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roosteren (Schansberg) (186c).

(Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872))

Onjuiste vermelding: Faber et al. 1999: bijlage 2. (= Porrhomma spec.) (IJland et al. 2010: 25); Van Helsdingen 2003d: 22 (= Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990) (Van Helsdingen et al. 2011: 23).

Praestigia duffeyi (Millidge, 1954)

Baryphyma duffeyi Millidge, 1954

- *Praestigia duffeyi*; Meijer 1973a: 179; 1977: 84, 85. Meijer et al. 1975: 138. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 129.
- *Baryphyma duffeyi*; Koomen 1999: xxxv.

GR: Eenrum (Pieterburen) (182k), Lauwerszeepolder (195, 198c, 198v), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b).

Prinerigone vagans (Audouin, 1826)

Erigone vagans (Audouin, 1826)

- *Neriene longimana*; Van Hasselt 1885c: 163; 1890b: 198 (beide p. p.).
- *Erigone vagans*; De Jong 1949b: 215. Van Helsdingen 1961: 253; 1963b: 18; 1997a: 117; 2002a: 10, 11. Meijer 1973a: 179. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Peeters 1985: 51. Peeters et al. 1986: 93, 94. Bosmans 1988: 32. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46.
- *Prinerigone vagans*; Van Helsdingen 2002a: 10, 11; 2003d: 22; 2019b: 38. Bonte et al. 2003a: 26. Koomen et al., 2004: 207; 2005: 88. Prinsen 2005: 114. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaers 2008: 28; 2017: 278. Lambeets 2008: 13. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Lambregts et al. 2013: 17. Van Helsdingen et al. 2013: 26. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwerszeepolder (195), Lauwersmeer (198u). OV: Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: ? (119), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: N.O.-Polder (142, 169e). UT: ? (119), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y). ZH: ? (119), Nieuwkoop (142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikven) (215f), Vessem

(Landschotse Heide) (17r). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Reuver (204c), Rijkel (204u), Roermond ? (129), Roerdalen (Herkenbosch (De Muitert)) (150s), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)

Oreonetides abnormis (Blackwall, 1841)

- Linyphia abnormis*; Van Hasselt 1898: 48.
- Oreonetides abnormis*; Van Damme et al. 1959: 56. Chrysanthus 1961: 40. Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 23; 1976: 40; 1984: 3; 1997a: 117. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Meijer 1973b: 30; 1976a: 7. Vossen 1983: 236. Koomen 1986: 203; 1993: xxxiv; 1994: xxxiv; 2000: xxxix. Kessler et al. 1988: 135. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi.
- Saaristoa abnormis*; Poot et al. 1989: 7. De Bruyn 1996: 48. Koomen et al. 1997: xxxviii; 2001: xl; 2004: 207. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 28. Koomen 1999: xxxv. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaars 2000: 16; 2001e (www); 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Prinsen 2002: 119. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 14. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 25. Tutelaars et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009b: 17; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Helsdingen 2019b: 38. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Ellersinghuizen) (211g). FR: Ameland (196), Terschelling (Huneplak) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160c, 160f, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenvelden) (70d, 147a), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Lochem (136), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Uithoorn (Biezenwaard) (151x). ZH: Loosduinen (136), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Valkenswaard (Tongelreep) (230x). LI: Echt (in grot) (239b), Heerlen (65), Margraten (Schiepersberg) (210b), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1906)

Oreonetides firmus (O.P.-Cambridge, 1906)

- Oreonetides firmus*; Van Helsdingen 1976: 40.
- Saaristoa firma*; Spoek 2005: 28. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). NB: Boxtel (Kampina) (147a), Tilburg (Kaaistoep) (250d).

Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)

- Saloca diceros*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Helsdingen 1963b: 9. Koomen 1986: 203. Noordam 2024: 19-21, 24.

UT: Utrecht (Amelisweerd) (201v). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Vijlen (64, 142).

Satilatlas britteni (Jackson, 1913)

Perimones arenarius (Emerton, 1911)

- Perimones britteni*; Van Wingerden 1973: 208.
- Perimones arenarius*; 1977: 105. Meijer et al. 1975: 137. Kessler et al. 1984: 262.
- Satilatlas britteni*; Roelofs-Ditters 2007: 26. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

FR: Schiermonnikoog (174h, 198v, 253, 254a). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f).

Savignia frontata Blackwall, 1833

- Walckenaera frontata*; Van Hasselt 1885c: 177; 1890b: 200.
- Savignya frontata*; Van Damme et al. 1959: 54. Van Helsdingen 1961: 253; 1963b: 18; 1876: 40. Siepel et al. 1996: 52, 53. Prinsen 2002: 119.

GR: Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). DR: (119, 140, 142). OV: (119, 140, 142), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Arnhem (129, 140, 142). FL: Almere (218b). UT: (119, 140, 142). NH: (119, 140, 142). NB: (119, 140, 142).

Silometopus ambiguus (O.P.-Cambridge, 1906)

Silometopus curtus (Simon, 1882)

- Silometopus ambiguus*; Van Klink 2015: 195.
- Silometopus curtus*; Van Helsdingen 1963b: 10. Kessler et al. 1984: 262. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (174h, 180b). ZH: Oostvoorne (De Beer) (142).

Silometopus bonessi Casemir, 1970

- Silometopus bonessi*; Jacobs 2017: 22.

NB: Kalmthoutse Heide (165d).

Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872)

- Walckenaera elegans*; Van Hasselt 1898: 48.
- Silometopus elegans*; Hulsebos 1961: 4. Van Helsdingen 1961: 246; 1963b: 10. Meijer 1973a: 179. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2000: xxxix. Tutelaers 2000: 10; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 27. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 26. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

GR: Lauwerszeepolder (195), Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Kroonpolders, Oosterend) (182v). DR: Dwingeloo (142, 160b). GL: Doesburg (136, 140, 142). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f). LI: Nederweert (De Banen) (182m).

Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873)

- Silometopus incurvatus*; Tutelaers 1978: 88, 89; 2000: 10, 16, 19; 2001e (www); 2008: 28. Verstegen et al. 1992: 73. Roelofs-Ditters 2007: 26. De Koninck 2010: 32.

NL: (232w: heide hogere gronden). NB: Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f).

Silometopus reussi (Thorell, 1871)

- Walckenaera obscura*; Van Hasselt 1885c: 173 (p. p.).
- Walckenaera hasseltii*; Van Hasselt 1885c: 174.
- Walckenaera interjecta*; Van Hasselt 1890b: 189.
- Walckenaera obscura*; Van Hasselt 1890b: 199 (p. p.).
- Silometopus interjectus*; Chrysanthus 1957a: 44. Van Heerd et al. 1967: 111. Van Wingerden 1973: 208. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1984: 262.
- Silometopus reussi*; Van Helsdingen 1961: 246; 1963b: 10. Van Wingerden 1977: 113. Koomen et al. 1997: xxxvii. Faber et al. 1999: bijlage 2. Bonte et al. 2003a: 27. Bonte 2006: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (174h, 253, 254a), Terschelling (61, 138, 142), idem (Amelandduin, Formerum) (182v), Ooststellingwerf (75n). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Wageningen ? (119, 140, 142). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: 's-

Gravensande ? (129, 140, 142), Loosduinen (119, 140, 142), Wassenaar (129, 140, 142). NB: Riel (61, 142). LI: Roermond ? (129, 140, 142).

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

- Bolyphantes trilineatus*; Six 1858b: 296.
- Linyphia bucculenta*; Van Hasselt 1885c: 185.
- Stemonyphantes bucculentus*; Heselhaus 1915: 273.
- Stemonyphantes lineatus*; Van der Hammen 1950: 111. Chrysanthus 1951d: 84; 1951g: 98. Van Damme et al. 1959: 57. Van Heerdet et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1961: 261; 1963b: 32; 1968: 126; 1976: 41; 1999a: 7; 2019b: 38. Kessler-Geschierie 1965: 160; 2001: 16; 2003: 12. Meijer 1973b: 30. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Wingerden 1977: 110. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www). Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203. Bosmans 1988: 33. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 133. Hulsebos 1995: 5, 6. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 10. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Kessler 2004: 8. Koomen et al. 2005: 88. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 26. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2010: 17. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (119). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (174h, 175a, 210a, 254a), Terschelling (137), idem (Huneplak) (182v), Fochteloërvéen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: De Bilt (220), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel ('t Hornetje) (182y), Zaandstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), De Beer (144), Voorne (144), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreidig) (231b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemplassen) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Bergen (Maasdijken) (215m), Brunssum (44), Geleen (44), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (44), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijkholt (44), Sint Pietersberg (44) (83: in grot), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Styloctetor compar (Westring, 1861)

Styloctetor stativus (Simon, 1881)

Ceratinopsis stativa (Simon, 1881)

- Anacotle stativa*; Meijer 1973b: 28. Van der Ploeg et al. 1975: 171.
- Ceratinopsis stativa*; Meijer et al. 1975: 138. Koomen 1986: 202; 1999: xxxv. Koomen et al. 1996: xxvi. Vangsgård et al. 1996: 81. Spoek 1997b: 5. Simon Thomas et al. 2000: 5. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 13.

W: (231a). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwerszeepolder (198v). FR: Ameland (196, 198v), Schiermonnikoog (198v, 210a). DR: Emmen (Bargerveen) (225b). GL: Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1873)

Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872)

- Styloctetor romanus*; Chrysanthus 1955e: 494. Van Heerdet et al. 1960: 234. Van Helsdingen 1963b: 9; 2019b: 38.

- *Ceratinopsis romana*; Noordam 1996: 15. De Bruyn 1996: 42. Vangsgård et al. 1996: 81. Noordam et al. 1998: 344. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 21, 56; 2003b: 910. Bonte 2006: 10, 13. Roelofs-Ditters 2007: 26.

W: (231a). FR: Terschelling (137, 142). NH: duinen (AWD) (17a, 17c). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 57, 142, 201k, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (215f, 230e).

Syedra gracilis (Menge, 1869)

- *Syedra gracilis*; Van Helsdingen 1996b: 8. Spoek 2005: 28. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). NB: Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Gulpen (Wrakelberg) (148a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)

Centromerus expertus (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Linyphia experta*; Van Hasselt 1885c: 183; 1890b: 201, 209.
- *Centromerus expertus*; Van Damme et al. 1959: 55. Van Helsdingen 1961: 255; 1963b: 21; 1976: 40; 1981a: 36. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen 1996: 173, 218; 1998a: xxxvi; 1998b: 225. Koomen et al. 1997: xxviii. Spoek 1997b: 10; 1999: 4.
- *Tallusia experta*; Van Helsdingen 1999a: 7; 2002b: 11. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2006: 16; 2008: 28; 2009c (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Spoek 2005: 28. Roelofs-Ditters 2007: 26. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 10.

GR Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Oosterend) (182v), Fochteloeरveen (148e). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c). Veenhuizen (119), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Ede (Otterlose Zand) (215m), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). UT: Zeist (129). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Gouda (119). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Peelgebieden (147f).

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

- *Walckenaera insecta*; Van Hasselt 1885c: 175; 1890b: 199, 208; 1898: 73 (alle drie p. p.).
- *Plaesiocraerus insectus*; Schmitz 1915: 190.
- *Tapinocyba insecta*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 53. Van Helsdingen 1961: 252; 1963b: 18; 1976: 40; 1984: 3. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23. Meijer 1974: 172. Fokkema 1978: 100. Koomen 1986: 203; 2000: xxxix. Kessler et al. 1988: 135. De Bruyn 1996: 50. Koomen et al. 1997: xxvii. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2009c (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Kessler 2004: 8. Spoek 2005: 28. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Vogels et al. 2023: 6.

NL: (217z, in mierennesten). FR: Terschelling (Oosterend) (182v), Ooststellingwerf (75n). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen ? (119, 140, 142), Wassenaar ? (129, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Valkenswaard (Het Heike) (230x). LI: Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873)

- *Walckenaera parisiensis*; Van Hasselt 1890b: 187 (p. p.).

- Walckenaera ingrata*; Van Hasselt 1890b: 188.
- Tapinocyba praecox*; Van Damme et al. 1959: 52 (p. p.). Van Helsdingen 1961: 253; 1963b: 18; 1976: 40; 1981a: 36. Hulsebos 1962: 235. Chrysanthus 1966: 156. Meijer 1976b: 251. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28. Kessler et al. 1984: 262; 1988: 135. Deeleman-Reinhold 1990: 110. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 9; 2005: 28. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Bonte 2006: 14. Roelofs-Ditters 2007: 26. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009a: 7. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 12.

FR: Schiermonnikoog (174h, 198b), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (142, 160c), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Barneveld (Kootwijkzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Reijerscamp) (150m). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Roggebotzand (174g), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Nootdorp (129, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Heerlen (68), Heidse Peel (147f), IJsselsteyn (Paardekop) (147f), Valkenburg (129, 140, 142); Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

***Tapinopa longidens* (Wider, 1834)**

- Linyphia longidens*; Van Hasselt 1879b: xxv.
- Tapinopa longidens*; Van Hasselt 1885c: 178; 1890b: 201. Chrysanthus 1951g: 98. Van Helsdingen 1961: 257; 1963b: 25; 1976: 41. Hulsebos 1962: 235. Kessler-Geschire 1965: 160. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Fokkema 1978: 100. Jacobs 1992: 133. Spoek 1997b: 10; 1999: 4; 2005: 28. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2008: 28. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 27. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Van Helsdingen et al. 2008: 21. IJland et al. 2010: 28. Lambregts et al. 2013: 18.

FR: Schiermonnikoog (175a, 210a), Ooststellingwerf (75n). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: (119). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nijmegen (119), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m). UT: (119), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Bergen op Zoom (119), Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p). LI: Bunde (129), Geleen (44), Mook (189), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

***Taranucnus setosus* (O.P.-Cambridge, 1863)**

- Taranucnus setosus*; Van Helsdingen 1963b: 35; 1976: 41; 1981a: 37; 1984: 3; 1999a: 7. Tutelaers 1978: 88; 2000: 20; 2001e (www). Joosten 1985: 25. Bosmans 1988: 33. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen 1993: xxxiv; 1998a: xxxvi. Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 10; 2005: 28. Tutelaers 2006: 14, 16. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van Helsdingen et al. 2012: 29. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

GR Lauwersmeer (198u). FR: Fochteloërvéen (148e). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (148a, 225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a, 225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (142), idem (Kootwijkerveen) (142, 147a). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). NB: Budel-Dorplein (De Hoort) (230n), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a, 147f, 170), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Ospel (Grote Peel) (147a, 170).

***Tenuiphantes alacris* (Blackwall, 1853)**

Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853)

- Lepthyphantes alacris*; De Jong 1949b: 213. Van Helsdingen 1963b: 26. Meijer 1973b: 30. Hulsebos 1990: 155; 1995: 4, 5. Spoek 1997b: 9.

FR: Ameland (196). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160g), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: Hulshorst (169e).

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

Lepthyphantes cristatus (Menge, 1866)

- Linyphia cristata*; Van Hasselt 1885c: 181.
- Lepthyphantes cristatus*; Van Helsdingen 1961: 258; 1963b: 27. Van Helsdingen et al. 1977: 41. Chrysanthus 1966: 156. Koomen 1986: 203. Kessler et al. 1988: 135. Hulsebos 1989: 23; 1995: 5. Spoek 1999: 4.
- Tenuiphantes cristatus*; Spoek 2005: 28.

NL: (150k). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160f), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Woold (142). UT: De Bilt (119). NH: Roggebotzand (174g). LI: Heerlen (68), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854)

- Neriene fuscipalpis*; Van Hasselt 1885c: 169 (p. p.).
- Theridium henricae*; Six 1858b: 294 (spec. nov.).
- Lepthyphantes henricae*; Van Hasselt 1885c: 180 (= *Linyphia tenebricola*). Van Helsdingen 1961: 262 (exemplaar niet met zekerheid te determineren, maar behoort waarschijnlijk tot *L. flavipes*).
- Lepthyphantes concinnus*; De Jong 1949b: 213.
- Lepthyphantes flavipes*; Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 58. Van Helsdingen 1961: 258; 1963b: 28; 1976: 41; 1980: 103; 1999b: 10. Van Helsdingen et al. 1977: 15. Kessler-Geschiere 1972: 153; 2001: 16; 2003: 12. Meijer, 1974: 172. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www). Koomen 1986: 203; 1992: xxviii; 1993: xxxiv; 1994: , 1; 1998a: xxxvi; 2000: xxxix. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Hulsebos 1990: 155; 1995: 5. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 1997: xxvii; 2001: xl; 2004: 207; 2005: 88. De Bruyn 1996: 48. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 2001: 47. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 14.
- Lepthyphantes mengei*; Chrysanthus 1954b: 40; Chrysanthus et al. 1959: 184 (p. p.). Van Damme et al. 1959: 58 (p. p.).
- Lepthyphantes tenuis*; Van Damme et al. 1959: 58 (p. p.).
- Tiso vagans*; Hulsebos 1961: 4 (p. p.).
- Tenuiphantes flavipes*; Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 192. Spoek 2005: 28. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 21; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27; 2013: 26. Tutelaers 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Noordijk et al. 2011: 17. Koomen 2015: 158. Van Helsdingen 2019b: 38; 2019c: 47. Vogels et al. 2023: 6. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (119, 150k). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Terschelling (Formerum, Hoorn, Huneplak, Oosterend) (182v). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 147a), Nunspeet (182u), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Winterswijk (182g), Zutphen (Warnsveld) (211n). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: De Bilt (220), Rheden (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (175c), Egmond (182w), Schoorl (182w), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b),

Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (169e), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eersel (182t), Heeze (Heezerveen) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Leende (Strijperheg) (230x), Mierlo ('t Sang) (230x), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Valkenswaard (Dommeldal) (230x), Waalre (Dommeldal) (230x). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (147e, 165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Vaals (182e), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Watersley (52, 62), Weert (Tungelrooijse Wallen) (182m), Wellerloo (62).

Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887)

Leptyphantes mengei Kulczynski, 1887

- *Lepthyphantes mengei*; Chrysanthus et al. 1959: 184 (p. p.). Van Damme et al. 1959: 8 (p. p.). Van Helsdingen 1961: 258; 1963b: 28; 1976: 41; 1997a: 117. Van Helsdingen et al. 1977: 10; 1987: 187; 1999a: 7; 1999b: 10. Meijer 1976a: 7. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2003: 6. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203; 1992: xxviii; 1993: xxxiv; 1994: xxxiv; 1996: 173, 218; 1998a: xxxvi; 1998b: 225; 2000: xxxix. Bosmans 1988: 32. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Hulsebos 1990: 155; 1995: 5. Jacobs 1992: 132. Verstegen et al. 1992: 74, 75. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxvi; 1997: xxviii; 2001: xl. Noordam 1996: 22. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 22, 25; 2003b: 910. Bonte 2006: 14.
- *Tenuiphantes mengei*; Prinsen 2005: 115. Prinsen et al. 2006: 89. Spoek 2005: 28. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 278. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27, 29. Tutelaers 2008: 28; 2009c (www). IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Noordijk et al. 2011: 17. Lambregts et al. 2013: 18. Koomen 2015: 158. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1954b: 40 (= *Leptyphantes flavipes* (Blackwall)) (zie 62).

NL: (150k; 232w: heide hogere gronden). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Terschelling (Huneplak) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Diever (160h), Dwingeloo (160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Schoorl (182w), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e, 230k), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Leende (Strijperheg) (230x), Oosterhout (69b), (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Vaals (182e), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)

Leptyphantes tenebricola (Wider, 1834)

- *Linyphia pygmaea*; Becker 1879a: xlili (p. p.?).
- *Linyphia tenebricola*; Becker 1879c: clxxvi.

- *Leptyphantes tenebricola*; Becker 1896b: 49. Chrysanthus 1958b: 143. Van Damme et al. 1959: 58. Van Helsdingen 1961: 262; 1963b: 27; 1976: 41. Van Helsdingen et al. 1977: 32. Hulsebos 1962: 235; 1989: 23; 1995: 5. Meijer 1974: 172. Koomen 1986: 203; 1998a: xxxvi; 1998b: 225. Kessler et al. 1988: 135. Mabelis 1996: 127. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Noordam 2024: 25.
- *Leptyphantes zimmermanni*; Hulsebos 1961: 4 (p. p.).
- *Tenuiphantes tenebricola*; Spoek 2005: 28. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1885c: 180 (*Linyphia tenebricola*) (= *Leptyphantes tenuis* (Blackwall) en *Leptyphantes zimmermanni* Bertkau) (zie 140).

NL: (9, 150k). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Twente (191b), Ommen (Archem) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (De Eese) (197). GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215m). UT: Utrecht (7), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Roggebotzand (174g). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (13b), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Heerlen (64), Maastricht (13b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

Leptyphantes tenuis (Blackwall, 1852)

- *Linyphia pygmaea*; Becker 1879a: xliii (p. p.?).
- *Linyphia tenebricola* var. *tenuis*; Van Hasselt 1883a: xxxii.
- *Linyphia leprosa*; Van Hasselt 1885c: 179 (p. p.).
- *Linyphia tenebricola*; Van Hasselt 1885c: 180 (p. p.).
- *Linyphia Mughi*; Van Hasselt 1885c: 181.
- *Leptyphantes tenuis*; Van der Hammen 1950: 111. Chrysanthus 1951g: 98 (p. p.); 1966: 156. Van Damme et al. 1959: 58 (p. p.). Hulsebos 1959: 254 (p. p.); 1961: 4; 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1961: 258; 1963b: 27; 1976: 41; 1997a: 117; 1999b: 10; 2002a: 10, 11. Van Helsdingen et al. 1977: 20; 1984: 3. Kessler-Geschiere 1972: 153; 2001: 16; 2003: 12. Klomp et al. 1973: 334. Meijer 1973a: 175, 179; 1973b: 30; 1974: 172; 1977: 84, 85, 88; 1980a: 229. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10, 16; 2001e (www); 2003: 6. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1984: 262. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203; 1992: xxviii; 1994: xxxiv; 1996: 173, 218; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxix. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxviii; 2001: xl; 2005: 88. Noordam 1996: 22. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 58. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 47. Prinsen 2002: 119. Bonte et al. 2003a: 22, 25. Bonte 2006: 14.
- *Leptyphantes zimmermanni*; Hulsebos 1961: 4 (p. p.).
- *Tenuiphantes tenuis*; Van Helsdingen 2003d: 22; 2019b: 38. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115; 2007: 142. Prinsen et al. 2006: 89; 2009: 192. Spoek 2005: 28. Tutelaers 2006: 16; 2008: 28; 2009c (www). Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 278. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27; 2013: 26; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28; 2011: 21. Koomen 2010: 210. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 18. Bink 2014b: 13. Van Klink 2015: 195. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Bink 2019: 7. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342. Sies 2024: 104.

NL: (119, 150k). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e), Lauwersmeer (198u), Leens (182k), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (30), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (160a, 174h, 180b, 210a), Terschelling (137), idem (Amelandduin, Koegelwieck, Noordvaarder, Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b),

Emmen (Oevermansbosje) (225c), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (De Eese) (197). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningse berg (112, 119), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: (8), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (175c), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaandstad (Euverenweg, Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Barendrecht (import) (16 i), Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Oosterscheldekering (landzijde, tussen Roompotsluis en Matenhaven) (218d). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (215f, 230e, 230k), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoepr) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44), Cadier en Keer (193b), Cottessen (182e), Eys (De Piepert) (183r), Geleen (44), Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Maasband (186c), Maastricht (44), Margraten (Schietersberg) (210b), Nederweert (De Banen) (182m), Neercanne (in grot) (83), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (44), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Schinveld (Breukberg) (164n), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Tenuiphantes zimmermanni Bertkau, 1890

Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890

- Linyphia terricola*; Van Hasselt 1877: xxvi.
- Linyphia zebrina*; Van Hasselt 1885c: 179; 1886c: 109 (beide p. p.).
- Linyphia tenebricola*; Van Hasselt 1885c: 180 (p. p.).
- Lepthyphantes tenuis*; Chrysanthus 1951g: 98 (p. p.).
- Lepthyphantes zimmermanni*; Chrysanthus 1966: 156. Van Helsdingen 1961: 258; 1963b: 27; 1976: 41; 1997a: 117. Van Helsdingen et al. 1977: 26; 1984: 3; 1999b: 10. Kessler-Geschire 1972: 153; 2001: 16; 2003: 12. Meijer 1973b: 30. Klomp et al. 1973: 334. Fokkema 1978: 100. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203; 1999: xxxv; 2000: xxxix. Kessler et al. 1988: 135. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Hulselbos 1990: 155; 1995: 5. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1996: xxvi; 1997: xxxviii; 2001: xl; 2004: 207; 2005: 88. Noordam 1996: 7. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 10; 1999: 4. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www). Prinsen 2002: 119. Noordam 2024: 25.
- Tenuiphantes zimmermanni*; Kessler 2004: 8. Spoek 2005: 28. Tutelaers 2006: 16; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009a: 7; 2012: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17. Bink 2019: 7. Van Helsdingen 2019b: 38. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 21, 25.

Onjuiste vermelding Hulselbos 1961: 4 (= *Lepthyphantes leprosus* (Ohlert), *Lepthyphantes tenebrichola* (Wider) en *Lepthyphantes tenuis* (Blackwall)) (zie 142).

NL: (119, 150k). GR: Leens (182k), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Terschelling (Formerum, Hunepak, Oosterend) (182v), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Tubbergen-

Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Reijerscamp) (150m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (175c), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Roggebotzand (174g), Schoorl (182w), Texel (Westerduinen) (182y), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Westzijderveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Barendrecht (import) (16 i), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg (107). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Lieshout (Ruweelsels) (230x), Mierlo ('t Sang) (230x), Ossendrecht (Leempadden) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Cadier en Keer (193b), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (44, 68), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Theonina cornix (Simon, 1881)

□ *Theonina cornix*: Van Helsdingen et al. 2013: 26.

LI: Roerdalen (Hoosden) (150s).

Thyreosthenius biovatus (O.P.-Cambridge, 1875)

□ *Walckenaera biovata*; Van Hasselt 1890a: xvii; 1890b: 188, 209; 1898: 72. Wasmann 1891: 56, 58.
 □ *Thyreosthenius biovatus*; Schmitz 1915: 190, 191. Chrysanthus 1953d: 88. Van Helsdingen 1961: 250; 1963b: 15. Koomen 2000: xxxix. Wielink et al. 2020: 175.

NL: (217z, in mierennesten). UT: Doorn (in mierennesten) (128, 129, 136, 140, 142), Leersum (in mierennesten) (129, 140, 142). LI: Exaeten (242), Haelen (50, 142), Roermond (in mierennesten) (129, 136, 140, 142), Weert (Tungelrooijse Wallen) (in nest *Formica pratensis*) (182m).

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)

□ *Walckenaera beckii*; Van Hasselt 1890b: 189.
 □ *Thyreosthenius parasiticus*; Chrysanthus 1961: 41. Van Helsdingen 1961: 250; 1963b: 15. Poot et al. 1989: 6. Koomen et al. 1997: xxvii. Spoek 1997b: 9.

FR: Terschelling (Huneplak) (182v). DR: Emmen (Oosterbos) (225b). LI: Bunde (129, 140, 142), Heerlen (65, 142), Margraten (Schiepersberg) (210b).

Tiso vagans (Blackwall, 1834)

□ *Micryphantes longipalpus*; Six 1858b: 295.
 □ *Erigone longipalpis*; Becker 1879a: xliii.
 □ *Neriene longimana*; Van Hasselt 1885c: 163; 1890b: 198 (beide p. p.).
 □ *Tiso vagans*; Van Helsdingen 1961: 249; 1963b: 14; 2019b: 38. Meijer 1973b: 29. Koomen 1986: 203; 1992: xxviii; 1999: xxxv; 2010: 210. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. Koomen et al. 1997: xxvii. Spoek 1997b: 9, 2005: 28. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2006: 16. Prinsen 2002: 119; 2005: 115. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Bonte 2006: 9, 17. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 26. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2018: 46. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermeldingen: Hulsebos 1959: 254; 1961: 4 (= *Entelecara erythropus* (Westring) en *Lepthyphantes flavipes* (Blackwall)) (zie 142).

GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Terschelling (Noordvaarder) (182v), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: ? (119, 140, 142), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Laag-Wolfheze)

(211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Winkelse Zand) (182m). UT: (7, 119, 140, 142), Utrecht (220). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: ? (119, 140, 142), duinen (AWD) (17a, 17b), Egmond-Binnen (75w2). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: (7), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Cottessen (182e), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (129, 140, 142), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)

- Neriene bituberculata*; Van Hasselt 1885c: 167; 1886c: 107; 1898: 60 (beide p. p.).
- Tmeticus affinis*; Van Helsdingen 1961: 249; 1963b: 14; 1984: 3; 1997a: 117; 2003d: 22. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2008: 28.

GL: ? (119, 140), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Voorst (142). UT: ? (119, 140), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). ZH: ? (119, 140), Giesendam ? (122), Nieuwkoop (142), Rotterdam ? (136). NB: Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Oisterwijk (136).

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

- Trematocephalus cristatus*; Peeters 1984a: 181. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1991: xix; 2000: xxxix. Koomen et al., 2004: 207. Prinsen et al. 2006: 89. Tutelaers 2006: 14, 16; 2017: 278. Prinsen 2007: 142. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2015a: 5.

DR: Wijster (IJsbaan) (211k). OV: Haaksbergen (182d), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Lieshout (Ruwheelsels) (230n), Moorsel (Strabrechtse Heide) (230n). LI: Reuver (204a), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Trichoncus affinis Kulczynski, 1894

- Trichoncus affinis*; Tutelaers 2000: 16; 2001e (www).

NB: Cranendonck (230e).

Trichoncus hackmanni Millidge, 1955

- Trichoncus hackmanni*; Tutelaers 2000: 16; 2001e (www).

NB: Cranendonck (230e).

Trichoncus saxicola (O.P.-Cambridge, 1861)

Trichoncus varipes Denis, 1965

Trichoncus saxicola; De Jong 1982: 114.

Trichoncus varipes; Van Helsdingen 1996b: 8.

NH: Ankeveen (169f). L: Margraten (Bemelerberg) (148a).

Trichoncus vasconicus Denis 1944

Trichoncus vasconicus; Roelofs-Ditters 2007: 26.

NB: Cranendonck (215f).

Trichopterna cito (O.P.-Cambridge, 1873)

- Walckenaera blackwallii*; Van Hasselt 1885c: 175; 1890b: 200. De Koninck 2010: 32.
- Trichopterna cito*; Van Helsdingen 1961: 242; 1963b: 5. Noordam 1996: 15. De Bruyn 1996: 43. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 25, 28. Bonte et al. 2003a: 22, 27, 59;

2003b: 911. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. De Koninck 2010: 32. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Versteeg 2023: 15.

OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoord/Ede (Hoge Veluwe) (232o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (129, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f). LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

Trichopternoides thorelli (Westring, 1861)

Trichopterna thorelli (Westring, 1861)

- Trichopterna thorelli*; Hulsebos 1962: 235. Van Helsdingen 1963b: 5. Spoek 1999: 4. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 26.

DR: Emmen (Oevermansbosje) (225c), Havelte ? (142, 160c). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s).

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

- Walckenaera scabricula*; Van Hasselt 1885c: 172 (p. p.).

Troxochrus scabriculus; Chrysanthus 1958b: 144. Van Heerdt et al. 1960: 234; 1967: 111. Van Helsdingen 1961: 251; 1963b: 16; 1997a: 117; 2002a: 10, 11; 2003d: 22; 2019b: 38. Meijer 1973b: 29; 1976b: 251. Meijer & Van Wingerden 1975: 139. Koomen 1986: 203; 2000: xxxix. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Siepel et al. 1996: 51, 53. Ma et al. 1997: 76. Heuts 2001: 11. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Kessler 2004: 8. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Van Helsdingen et al. 2010: 17; 2013: 26; 2015a: 5. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.

- Walckenaera cirrifrons*; Van Hasselt 1885c: 172.
- Troxochrus cirrifrons*; Meijer & Van Wingerden 1975: 139. Koomen 1986: 203. Poot et al. 1989: 6. Bonte et al. 2003a: 27. Bonte 2006: 17. Van Helsdingen et al. 2008: 21. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u), Vierhuizen (198v). FR: Ameland (196), Terschelling (137, 138, 142). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). GL: uiterwaarden Waal (191a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen ? (119, 140, 142), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amsterdam (151u), Huizen (Gooise heide) (151u), Uithoorn (151u), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen ? (119, 140, 142), Scheveningen ? (119, 140, 142), Wassenaar ? (119, 140, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (64, 142), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Meerssen (198b), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Typhocrestus digitatus (O.P.-Cambridge, 1873)

- Neriene digitata*; Van Hasselt 1890b: 187.
- Typhocraestus digitatus*; Van Helsdingen 1961: 247; 1963b: 11. Van Wingerden 1977: 16. Tutelaers 1978: 88; 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28. Koomen 1986: 203. Noordam 1996: 15. Bonte et al. 2003a: 22, 27; 2003b: 911. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Versteeg 2024: 12.

FR: Schiermonnikoog (254a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m). GL: Arnhem (129, 140, 142), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m),

Kootwijk (142), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (201k). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833

- *Walckenaeria acuminata*; Van Hasselt 1885c: 177; 1890a: xvii; 1890b: 200; 1898: 54. Becker 1896b: 160. Chrysanthus 1958b: 144. Van Helsdingen 1961: 243; 1963b: 6. Hulsebos 1962: 234; 1989: 23; 1990: 155. Kessler-Geschierie 1965: 159. Tutelaers 1978: 88. Fokkema 1978: 100. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 203.
- *Walckenaeria acuminata*; Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Koomen 1994: xxxiii. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 46. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2000: xxix; 2001: xl. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 28. Noordam et al. 1998: 344. Van Helsdingen 1999a: 7. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28; 2017: 278. Kessler-Geschierie 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 27. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 17. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 9, 12. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 21; 2009b: 17; 2010: 17. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Vogels et al. 2023: 6. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (175a), Terschelling (Huneplak) (182v), Fochteloërveld (148e), Ooststellingwerf (75n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: De Bilt (119, 140, 142), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Egmond (182w), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaandstad (Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: 's-Gravenhage (119, 136, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Leende (Strijperheg) (230x), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Soerendonk (230x), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Heerlen (64, 142), Kunrade (64, 142), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (193b), Roermond (128, 129, 140, 142), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Vijlen (64, 142), Weert (Wijffelterbroek) (230x).

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

- *Walckenaeria alticeps*; Koomen 1994: xxxiii. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. Spoek 1997b: 9. Prinsen 2005: 115. Tutelaers 2006: 14, 16; 2008: 28; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 17. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Zaandstad (Euverenweg, Westzaan) (232b). NB: Bladel (187a), Eindhoven (Urkhoevense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Maasven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Weert (Wijffelterbroek) (230x).

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

- *Walckenaeria antica*; Van Hasselt 1885c: 173; 1886c: 108; 1890b: 199. Van Helsdingen 1976: 39. Tutelaers 1978: 88. Buizer 1982: 74. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203. IJland et al. 2011: 21.
- *Wideria antica*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Helsdingen 1961: 243; 1963b: 6. Kessler-Geschierie 1965: 159. Meijer 1973b: 29.

- *Walckenaeria antica*; Poot et al. 1989: 6. Siepel et al. 1996: 52, 53. De Bruyn 1996: 45. Noordam et al. 1998: 344. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www). Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Bonte 2006: 9, 17. Noordijk 2006b: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009a: 7. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 17.

FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (174h, 175a). GL: Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Reijerscamp) (150m), Winterswijk (129, 140, 142). FL: Almere (218b). UT: Zeist (119, 140, 142). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Zaanstad (Jagersveld) (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119, 140, 142), Rotterdam (25s), Wassenaar (119, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (62, 142, 202c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

***Walckenaeria atrotibialis* O.P.-Cambridge, 1878**

Walckenaera melanocephala O.P.-Cambridge, 1881

- *Wideria melanocephala*; Van Helsdingen 1963b: 6. Meijer 1973b: 29; 1976a: 7; 1976b: 251. Van der Ploeg et al. 1975: 171.
- *Walckenaera melanocephala*; Van Helsdingen 1976: 39. Peeters 1985: 51. Koomen 1986: 203. Siepel et al. 1996: 45, 51, 53.
- *Walckenaeria atrotibialis*; Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Verstegen et al. 1992: 71, 74. Koomen 1993: xxiv; 1994: xxxiii; 1999: xxxv; 2015: 158. Koomen et al. 1996: xxvi. Siepel et al. 1996: 48, 53. De Bruyn 1996: 45. Van Helsdingen 1997a: 118; 1999a: 7. Spoek 1997b: 9; 2005: 28. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2003: 6; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Heuts 2001: 12. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 17. Prinsen et al. 2006: 89. Roelofs-Ditters 2007: 26. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2010: 17. IJland 2009: 4. Heuts et al. 2009: 28. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 25.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: Lauwersmeer (198u), Vierhuizen (Westpolder) (198b). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Applescha: Hildenberg) (183a), Schiermonnikoog (210a), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dalen (142), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (142, 147a), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (151z), Huizen (Gooise heide) (151u). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 142). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Cranendonck (230e, 230k), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Beesel (204c), Eys (De Piepert) (183r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

***Walckenaeria capito* (Westring, 1861)**

- *Wideria capito*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 50.
- *Walckenaera capito*; Van Helsdingen 1963b: 6; 1976: 39. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Siepel et al. 1996: 46, 51, 53. De Bruyn 1996: 45. Bonte et al. 2003a: 27; 2003b: 911. Spoek 2005: 28. Bonte 2006: 17.

DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 142, 147a). FL: Almere (218b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (250d).

Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882)

- Walckenaeria clavicornis*; Heuts et al. 2009: 27.

NH: Amsterdam (import?) (151z).

Walckenaeria corniculans (O.P.-Cambridge, 1875)

- Prosopotheca corniculans*; Van der Ploeg et al. 1975: 171.
- Walckenaera corniculans*; Koomen 1986: 203.
- Walckenaeria corniculans*; Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen 1992: xxviii. Koomen et al. 1996: xxvi. Simon Thomas et al. 2000: 5. Prinsen 2005: 115. Spoek 2005: 28. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2010: 17.

FR: Schiermonnikoog (210a). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). NB: Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Vaals (182e).

Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836)

- Walckenaera cucullata*; Van Hasselt 1885c: 173; 1886c: 108; 1890b: 199; 1898: 53. Van Helsdingen 1976: 39. Tutelaers 1978: 88. Fokkema 1978: 100. Koomen 1986: 203. Hulsebos 1989: 23.
- Neriene fugax*; Van Hasselt 1898: 53 (p. p.).
- Wideria cucullata*; Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 50. Van Helsdingen 1961: 244; 1963b: 6. Hulsebos 1962: 234.
- Walckenaeria cucullata*; Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Hulsebos 1995: 5. De Bruyn 1996: 48. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 28; 2015: 158. Koomen 1998a: xxxvi. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www). Heuts 2001: 12. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Kessler 2004: 8. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2009b: 17; 2010: 17. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van Helsdingen 2019b: 38. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Terschelling (Formerum, Huneplak) (182v), Ooststellingwerf (75n). DR: Diever (160h), Dwingeloo (142, 160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Groesbeek (136, 140, 142), Hoenderlo (72, 142), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Huizen (Gooise heide) (151u), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (129, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Rijen (136, 140, 142), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44, 142), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (129, 140, 142).

Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833

- Walckenaera cuspidata*; Van Hasselt 1890b: 190 (p. p.). Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 3. Meijer 1976a: 7. Tutelaers 1978: 88. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215.
- Cornicularia cuspidata*; Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 51. Van Helsdingen 1961: 244; 1963b: 7. Hulsebos 1962: 235.
- Walckenaeria cuspidata*; Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen et al. 1996: xxvi. Spoek 1997b: 9; 2005: 28. Koomen 1998a: xxxvi; 1998b: 225; 2015: 158. Simon Thomas et al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12. Noordijk et al. 2009c: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Versteeg 2024: 10.

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Dwingeloo (142, 160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (142, 160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Kortenhoefse Plassen (147j). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Maasven en Witte Loop) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Udenhout (De Brand) (182j), Valkenswaard (Drie Bruggen) (230x), Veldhoven (Run) (230x), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Ospel (Grote Peel) (147a), Roermond (129, 140, 142), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerloo (62, 142).

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

- Neriene fugax*; Van Hasselt 1890b: 185 (p. p.).
- Wideria fugax*; Van Damme et al. 1959: 50. Van Helsdingen 1961: 244 1963b: 6. Meijer 1973b: 29.
- Walckenaeria dysderoides*; Van Helsdingen 1976: 39. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Koomen 1986: 203.
- Walckenaeria dysderoides*; Deeleman-Reinhold 1990: 110. Jacobs 1992: 132. Versteegen et al. 1992: 73. Hulsebos 1995: 5. Siepel et al. 1996: 52, 53. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 28. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www). Bonte et al. 2003a: 22, 27; 2003b: 911. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 21; 2009a: 7. Lambeets 2008: 13. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 18. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (232w: heide hogere gronden). FR: Ameland (196), Terschelling (Formerum, Huneplak, Oosterend) (182v). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (129, 140, 142), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m); Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)

- Walckenaeria furcillata*; De Jong 1982: 115. Koomen 1986: 203; 1991: xix.
- Walckenaeria furcillata*; Peeters et al. 1986: 93, 95. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Poot et al. 1989: 6. Jacobs 1992: 132. Koomen 1993: xxxiv; 1994: xxxiii; 1998a: xxxvi; 2000: xxxix; 2004: 207. Spoek 1997b: 9; 2005: 28. Prinsen 2005: 115. Roelofs-Ditters 2007: 26. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 28. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 18. Tutelaers 2017: 278. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Archem) (182i), Tubbergen (Hezingen, Paardenslenkte) (182x). GL: Apeldoorn (169f), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: Baarn (Groeneveld) (169f), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NB: Bladel (187a), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Belfeld (Holzmühle) (204u), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m).

Walckenaeria incisa (O.P.-Cambridge, 1871)

- Walckenaeria incisa*; Peeters et al. 1986: 93, 95. Noordam 1996: 17. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 28. Heuts 2002: 7. Tutelaers 2006: 14, 16. IJland et al. 2010: 29. Noordam 2024: 25.

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Huizen (Gooise heide) (151v). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n). LI: Belfeld (Holtmühle) (204u).

Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1873)

- *Walckenaera kochi*; Van Hasselt 1890b: 190. Van Helsdingen 1976: 39. Meijer 1977: 84, 85; 1980a: 229. Meijer 1977: 105. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215.
- *Cornicularia kochi*; Van Damme et al. 1959: 51. Van Helsdingen 1961: 244; 1963b: 7. Van Heerdt et al. 1967: 111. Meijer 1973a: 179; 1973b: 29. Van Wingerden 1973: 208.
- *Walckenaeria kochi*; Bosmans 1988: 32. Vangsgård et al. 1996: 81. Spoek 1997b: 9. Koomen 1999: xxxv. Van Helsdingen 1999b: 10. Tutelaers 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 26. Van 't Veer et al. 2012: 17. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

W: (231a). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k), Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 180b, 253, 254a), Terschelling (138). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a). NH: Zaanstad (Guisveld) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: 's-Gravenhage (129, 140, 142). NB: Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

- *Walckenaeria mitrata*; Koomen 1986: 203. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2009a: 7.
- NB: Waalre (Dommeldal) (230x). L: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)

- *Micryphantes monoceros*; Six 1858b: 295. Van Hasselt 1873a: xxvi.
- *Walckenaera monoceros*; Van Hasselt 1885c: 171; 1886c: 108. Tutelaers 1978: 88. Kessler et al. 1984: 262.
- *Erigone monoceros*; Becker 1879a: xliv.
- *Prosopotheca monoceros*; Van Helsdingen 1961: 244; 1963b: 7. Hulsebos 1962: 235.
- *Walckenaeria monoceros*; Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxx. De Bruyn 1996: 43. Noordam et al. 1998: 344. Tutelaers 2000: 10, 16; 2001e (www); 2008: 28. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Spoek 2005: 28. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

FR: Schiermonnikoog (174h), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (142, 160c), Havelte (142, 160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Apeldoorn (142), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m). UT: Utrecht (7, 142, 220). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Velsen (100), Texel (142). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119, 140, 142), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230c), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p). LI: Bergen (Maasdijken) (215m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

- *Neriene dentipalpis*; Van Hasselt 1885c: 163 (p. p.).
- *Walckenaera nudipalpis*; Van Hasselt 1885c: 170 (p. p.); 1886c: 108. Becker 1896b: 159. Van Helsdingen 1976: 39. Hulsebos 1989: 23; 1990: 155.
- *Trachynella nudipalpis*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 50. Van Helsdingen 1961: 245; 1963b: 8. Hulsebos 1962: 234. Meijer 1974: 172.
- *Walckenaeria nudipalpis*; Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 110. Koomen 1993: xxxiv; 2015: 158. Hulsebos 1995: 5. Siepel et al. 1996: 46, 53. Berg 1997: 162. Van Helsdingen 1997a: 118; 2003d: 22; 2019b: 38. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 28. Simon Thomas et

al. 2000: 5. Tutelaers 2000: 16; 2001e (www); 2006: 16; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Heuts 2001: 12. Kessler-Geschire 2001: 16; 2003: 12. Bonte et al. 2003a: 23, 27. Kessler 2004: 8. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 278. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 29. Noordijk et al. 2009c: 22. Heuts et al. 2009: 28. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 29. Van 't Veer et al. 2012: 17. Lambregts et al. 2013: 18. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v). DR: Diever (160h), Dwingeloo (142, 160c, 160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a), Zweeloo (Mepperveld) (182f). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Wekerom (16b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (151u, 151z), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Breda (119, 140, 142), Cranendonck (215f, 230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Lieshout (Ruweelsels) (230x), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Herkenbosch (Meinweg) (150r), Kerkrade (64, 142), Maastricht (13b), Margraten (Schiepersberg) (210b).

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

- Walckenaera nudipalpis*; Van Hasselt 1885c: 170 (p. p.).
- Walckenaera cuspidata*; Van Hasselt 1890b: 190 (p. p.).
- Walckenaera obtusa*; Heselhaus 1913: 224. Van Helsdingen 1976: 39. Fokkema 1978: 100. Kessler et al. 1984: 262.
- Trachynella obtusa*; Van der Drift 1951: 120. Van Damme et al. 1959: 50. Van Helsdingen 1961: 245; 1963b: 7.
- Trachynotus obtusus*; Chrysanthus 1955e: 494.
- Walckenaeria obtusa*; Noordam 1996: 17. De Bruyn 1996: 50. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 9; 1999: 4; 2005: 28. Noordam et al. 1998: 344. Van Helsdingen 1999a: 7; 2019b: 38. Bonte et al. 2003a: 27. Prinsen 2005: 115. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 26. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 29. Van 't Veer et al. 2012: 17. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Schiermonnikoog (174h), Fochteloërveen (148e), Ooststellingwerf (75n). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Saasveld (Molenven) (70d, 142, 147a). GL: Doorwerth (57, 142), Hoenderlo (72, 142), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wekerom (16b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zaanstad (Euverenweg) (232b). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 57, 142, 201k, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Breda (119, 140, 142), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Roermond (129, 140, 142), Sittard (in gang *Talpa europaea* L.) (151b).

Walckenaeria stylifrons (O.P.-Cambridge, 1875)

- Walckenaeria stylifrons*; Noordam 1996: 10, 16. De Bruyn 1996: 45.

ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k).

Walckenaeria unicornis O.P.-Cambridge, 1861

- Walckenaera unicornis*; Van Hasselt 1885c: 171. Van Helsdingen 1976: 39. Vossen 1985b: 8; 1985c: 215. Hulsebos 1989: 23.
- Cornicularia unicornis*; Chrysanthus 1953d: 88. Van Heerdt et al. 1960: 234. Van Helsdingen 1961: 244; 1963b: 7. Hulsebos 1962: 235. Meijer 1973b: 29; 1974: 172. Van der Ploeg et al. 1975: 171.

- *Walckenaeria unicornis*; Koomen 1992: xxviii. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9. Faber et al. 1999: bijlage 2. Heuts 2001: 12. Kessler-Geschiere 2001: 16; 2003: 12. Van Helsdingen 2003d: 22; 2019b: 38. Kessler 2004: 8. Bonte et al. 2003a: 27. Spoek 2005: 28. Bonte 2006: 17. Tutelaers 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 26. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. IJland et al. 2010: 29. Van 't Veer et al. 2012: 17. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

GR Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (210a), Terschelling (137, 142), idem (Noordvaarder) (182v). DR: Dwingeloo (142, 160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (142, 160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Wageningen (119, 140, 142), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d, 175e), Amsterdam (151u), Zaandam (Euverenweg, Westzijderveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (119, 140, 142), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f). LI: Cottessen (182e), Grevenbicht (50, 142), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

- *Neriene vigilax*; Van Hasselt 1890b: 185; 1898: 53.
- *Cornicularia vigilax*; Van Helsdingen 1961: 244; 1963b: 7.
- *Walckenaera vigilax*; Kessler et al. 1984: 262. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 9. Faber et al. 1999: bijlage 2.
- *Walckenaeria vigilax*; Van Helsdingen 2003d: 22. Koomen et al. 2005: 88. Van Helsdingen et al. 2008: 21; 2010: 17. Noordijk 2008: 33. Noordijk et al. 2009c: 22. De Koninck 2010: 32. Van 't Veer et al. 2012: 17. Sies 2024: 104.

FR: Schiermonnikoog (174h), Terschelling (Kroonpolders, Noordvaarder, Oosterend) (182v). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Lochem (136, 140, 142), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). NH: Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Texel (De Cocksdorp, De Slufter) (182y), Zaandam (Euverenweg, Guisveld) (232b). ZH: Rijswijk (129, 140, 142), Scheveningen (129, 140, 142), Wassenaar (129, 140, 142). ZE: Oosterscheldekering (landzijde, tussen Roompotsluis en Matenhaven) (218d). NB: Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f).

LIOCRANIDAE

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

- *Agelena brunnea*; Van Hasselt 1872b: xxxiv (p. p.).
- *Agroeca brunnea*; Van Hasselt 1876a: x; 1876b: liii, liv; 1876c: 29, 31; 1876d: 117, 119; 1879b: xxv; 1885c: 136; 1898: 58 (alle p. p.). Becker 1879a: xlvi; 1896b: 301. Mahler & Heimans 1910: 64. Hoogenraad 1911: 160d; 1912: 297. Thijssse 1926: 109. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1951g: 100. Christilla 1957: 86. Van Damme et al. 1959: 39. Arnoud 1965: 87. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 7 (kaart); 1999b: 9; 2006c: 24; 2019b: 38. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www); 2017: 279. Vossen 1983: 236; 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1993: xxxii; 1998a: xxxiv. Poot et al. 1989: 7. Hulsebos 1989: 23. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1993a: 572; 1995: xxix; 1996: xxiv. Mabelis 1996: 128. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 33. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: ? (119), Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (147c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Norg (147c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Twente (191b), Ommen (Lemelerberg) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 147c). GL: (7, 119, 227a), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Arnhem ? (104, 106, 147c),

Barneveld (Kootwijkzerzand) (215m), Doorwerth (147c), Ede (147c), Gerritsfles (147c), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 147c), Hulshorst (147c), Leuvenum (147c, 156), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Valouwe (147c), Wageningen (147c), Wiessel (147c), Winterswijk (147c). FL: Kraggenburg (Waterloopbos) (149d). UT: (7, 102, 119), Amersfoort (147c, 192b), Baarn ? (104, 106, 147c), Bilthoven (147c), Lage Vuursche ? (104, 106, 147c), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Rijnsburg (147c), Soest ? (104, 106, 147c). NH: (7), Hilversum ? (103, 104, 106, 147c), Zwanenwater (148f). ZH: (7, 119), 's-Gravenhage ? (13b, 104, 106, 147c), Scheveningen ? (103, 147c), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7, 102, 119), Breda ? (96, 104, 106, 147c), Breda (Mastbos) (147c), Breda (Princenhage) (147c), Cranendonck (147c, 215f, 230e), Eersel (182t), Effen (147c), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), 't Loon (147c), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oosterhout (147c), Ossendrecht (147c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Waalre (Meelberg, Landschut) (147c, 230d). LI: (5, 27), Asenray (147c), Beegden (182s¹), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44, 147c), Cadier en Keer (147c), De Hamert (147c), Echt (in grot) (239b), Eys (De Piepert) (183r), Herkenbosch (147c), Maastricht (13b, 147c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mook ? (109, 147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Weert (Weerterbos) (147c), Wellerloo (147c).

Agroeca cuprea Menge, 1873

- Agroeca chrysea; Van Hasselt 1883a: xxxii; 1885c: 137; 1898: 58.
- Agroeca cuprea; Van Helsdingen 1978b: 9 (kaart); 2019b: 38. Noordam 1996: 6, 9, 18. De Bruyn 1996: 46. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24, 55; 2003b: 910. Bonte 2006: 9, 17.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). GL: Wageningen (112, 119, 147c). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Noordwijkerhout (147c), Loosduinen (119, 147c), De Beer (147c), Oostvoorne (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).

Agroeca dentigera Kulczynski, 1913

- Agroeca dentigera; Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 6. Roelofs-Ditters 2007: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

DR: Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a, 225b). NB: Breda (Kogelvanger) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f).

Agroeca inopina O.P.-Cambridge, 1886

- Agroeca inopina; Bonte et al. 2003a: 24. Van Helsdingen 2005d: 18. Bonte 2006: 7, 17.

NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 149a).

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)

- Agelena brunnea; Van Hasselt 1872b: xxxiii (p. p.).
- Agroeca brunnea; Van Hasselt 1876a: 2; 1876b: liii, liv; 1876c: 29, 31; 1876d: 117, 119; 1879b: xxv; 1885c: 136; 1898: 58 (alle p. p.).
- Agroeca proxima; Van Hasselt 1885a: xxix (p. p.); 1885c: 136; 1898: 58 (beide p. p.).
- Agroeca lusatica; Chrysanthus 1957a: 45. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 29. Van Helsdingen 1978b: 9 (kaart). Verstegen et al. 1992: 71. Noordam 1996: 6, 18. De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Bonte et al. 2003a: 21, 24, 55; 2003b: 910. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 19. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

NL: (232w: heide hogere gronden). FR: Terschelling (61, 147c), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m).

DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d).

GL: Arnhem ? (104, 106, 147c), Oosterbeek ? (119, 147c). UT: Baarn ? (104, 106, 147c), Lage Vuursche ? (104, 106, 147c), Soest ? (104, 106, 147c). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Hilversum ? (103, 104, 106, 147c). ZH: De Beer (147c), 's-Gravenhage ? (13b, 104, 106, 147c),

Loosduinen ? (119, 147c), Oostvoorne (147c), Scheveningen ? (103, 119, 147c), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: Breda ? (96, 104, 106, 117, 119, 147c), Cranendonck (147c, 215f, 230e), Heeze (Heezerven) (147c, 230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Waalre (Meelberg) (147c, 230d).

Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Agroeca proxima*; Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 136; 1898: 58 (p. p.). Becker 1896b: 303. Van Damme et al. 1959: 39. Van Heerdt et al. 1960: 235. Hulsebos 1962: 233. Kessler-Geschiere 1965: 158. Van der Aart et al. 1971: 119. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 9 (kaart); 2019b: 38. Kessler et al. 1984: 262; 1988: 135. Deelman-Reinhold 1990: 109. Hulsebos 1995: 5. Noordam 1996: 3, 6. De Bruyn 1996: 45. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Noordam et al. 1998: 344. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www); 2008: 25, 29; 2009c (www). Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24; 2003b: 910. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 15. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.
- *Agroeca brunnea*; Van Hasselt 1885a: xxix; 1885c: 136; 1898: 58 (p. p.).

GR: Lauwerszeepolder (147c), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (147c), Schiermonnikoog (147c, 174h, 175a), Terschelling (137, 147c), idem (Bosplaat) (147c), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (147c, 160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zeyen (147c). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 147c). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Bekhuizerzand) (202a), Hulshorst (Hulshorsterzand) (202o), Oosterbeek ? (119, 147c), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Staverden (147c), Tondensche heide (147c), Wiessel (147c). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Bussum (147c), Roggebotzand (174g), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: 's-Gravenhage (3, 13b, 147c), Loosduinen ? (119, 147c), Scheveningen ? (119, 147c), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k, 201z). NB: Bladel (187a), Breda (Liesbos) ? (117, 119, 147c), Cranendonck (147c, 215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oosterhout (147c), Ossendrecht (147c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

Apostenus fuscus Westring, 1851

- *Apostenus fuscus*; Koomen 1986: 202. Noordam 1998: 150.

GL: Nijmegen (201p). LI: Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a).

Liocranoeca striata (Kulczynski, 1882)

Agraecina striata (Kulczynski, 1882)

- *Agraecina striata*; Noordam 1998: 148.

NL: (201p).

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)

- *Philoica notata*; Van Hasselt 1876b: lii.
- *Liocranum rupicola*; Van Helsdingen 1978b: 35; 1981b: 15.

NL: nog voorkomend? (147g). NH: Hilversum (103, 147c).

Sagana rutilans Thorell, 1875

Liocranum rutilans (Thorell, 1875)

- *Sagana rutilans* Thorell 1875a: 96 (*Sagana rutilans* spec. nov., ♂♀); 1875b: 97. Van Hasselt 1885c: 138.
- *Liocranum rutilans* Van Helsdingen 1978a: 195; 1978b: 35 (kaart); 1981b: 15.

NL: (228, 229); nog voorkomend? (147g). NH: Naarden (119, 147b). NB: Breda (119, 147b).

Scotina celans (Blackwall, 1841)

□ *Scotina celans*; Van Helsdingen 1978b: 36 (kaart). Jacobs 1992: 133.

L: Neercanne (Kannerbos) (147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a).

Scotina gracilipes (Blackwall, 1859)

□ *Scotina gracilipes*; Van Hasselt 1885c: 137; 1890b: 196. Van Damme et al. 1959: 40. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 38 (kaart). De Bruyn 1996: 43. Spoek 1997b: 6. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 26; 2003b: 910. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 19.

GR: Lauwerszeepolder (147c). FR: Schiermonnikoog (147c), Terschelling (137, 147c). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 147c). GL: (119). UT: (119). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Texel (Slufter) (147c). ZH: (119), Loosduinen (129, 147c), Noordwijkerhout (147c), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (147c, 215f, 230e). LI: Roermond (129, 147c).

Scotina palliardii (L. Koch, 1881)

□ *Scotina palliardii*; Van Helsdingen 1978b: 38 (kaart). Noordam 1998: 150. Tutelaers 2000: 8, 18; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 27; 2003b: 910. Bonte 2006: 17.

DR: (201p). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). NB: Cranendonck (147c, 230e).

LYCOSIDAE

(Alopecosa aculeata (Clerck, 1757))

Tarentula aculeata; Kluyver 1933: 136. Waage 1938: 181. Wiebes 1959b: 6, 7, 10 (betwijfelt oude opgaven).

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1954b: 40 (*Tarentula aculeata*) (= *Alopecosa trabalis* (Clerck, 1757)) (zie 65, 247).

GL: Wageningen ? (181b). LI: Maastricht (Sint Pietersberg) ? (240).

Het voorkomen van deze soort in ons land is onwaarschijnlijk en de naam is daarom van de lijst geschrapt.

Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833)

□ *Lycosa inquilina*; Six 1858b: 298. Van Hasselt 1879b: xxiv.
□ *Lycosa barbipes*; Van Hasselt 1876b: lii.
□ *Tarentula andrenivora*; Van Hasselt 1886b: 84.
□ *Tarentula inquilina*; Van Hasselt 1886b: 85.
□ *Lycosa accentuata*; Becker 1879c: cxxix; 1882: 94.
□ *Tarentula barbipes*; Chrysanthus 1953d: 88. Van Damme et al. 1959: 44. Hulsebos 1959: 254.
□ *Alopecosa accentuata*; Wiebes 1959b: 12; 1960: 86; 1962: 7. Van der Aart 1973: 272; 1974: 180. Wiebes et al. 1974: 8, 16. Van der Aart et al. 1975: 4. Tutelaers 1978: 87. Vossen 1985a: 2. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1998a: xxxv. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 74. Koomen et al. 1993a: 572. De Bruyn 1996: 43.
□ *Tarentula accentuata*; Hulsebos 1961: 3.
□ *Alopecosa barbipes*; Van Helsdingen 1976: 38; 1999b: 9; 2019b: 38. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001d (www); 2001e (www); 2003: 6; 2008: 25, 28. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24, 55; 2003b: 910. Spoek 2005: 26. Noordijk 2005: 33; 2008: 31, 33. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260; 2010: 745. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 16.

NL (121, 249; 232w: heide hogere gronden; 250b: kaart), (202s: wegbermen). FR: Schiermonnikoog (160a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160b, 247), Havelte (Havelterberg) (230i), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Ootmarsum (247), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Wezep (247). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Stroe (247). UT: Driebergen (220, 247), Oud-Leusden (247), Woudenberg (247). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Bloemendaal (247), Hilversum (103, 247), tussen Hilversum en Naarden (9, 12, 247), Huizen (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (12, 247), Katwijk (247), Leiden (247), Wassenaar (Meijendel) (1, 2, 4, 25b, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e, 230k), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Oirschot (12, 247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Waalre (Landschut) (230d). LI: Bemelen (247), Bergen (Maasduinen) (215m), Herkenbosch (247), Kerkrade (247), Maastricht (12, 247), Mook (109, 247), Nieuw-Bergen (182s¹), Roermond (50, 247), Schin op Geul (247), Ubachsberg (247), Vlodrop (247), idem (Meinweg) (239c, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

- *Lycosa clavipes*; Six 1858b: 298. Snellen van Vollenhoven 1859: 61; 1868: 61. Van Hasselt 1883a: xxxiii.
- *Lycosa cuneata*; Becker 1879a: xl; 1882: 100. Van Hasselt 1879b: xxv.
- *Tarentula clavipes*; Van Hasselt 1886b: 84.
- *Tarentula cuneata*; Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1954b: 40.
- *Alopecosa cuneata*; Wiebes 1959b: 7; 1960: 86; 1962: 7. Kessler-Geschiere 1965: 159; 2001: 15. Virgilius 1967: 149. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Meijer 1973b: 27. Van der Aart 1973: 272; 1974: 182. Wiebes et al. 1974: 7, 16. Koomen 1986: 202. De Bruyn 1996: 45. Van Heltsdingen 1997a: 116; 2019b: 38. Koomen et al. 1997: xxxvi. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www); 2017: 278. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24, 55; 2003b: 910. Prinsen 2005: 113. Noordijk 2005: 33; 2006b: 21; 2008: 33; 2009: 68. Bonte 2006: 10, 17. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93; 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745. Van Heltsdingen et al. 2008: 22; 2009a: 7; 2010: 17; 2012: 27. Lambeets 2008: 14. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (224a, 224b, 249; 250b: kaart; 202p, 202s: wegbermen). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (West-Terschelling) (182v), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Hoge Veluwe) (247), Arnhem (121, 247), Barneveld (247), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nijmegen (121, 247), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Voorst (121, 247), Wageningen (112, 121, 181b, 247), Wilp (247). UT: (7), Amersfoort (121, 247), tussen Amersfoort en Hilversum (12, 247), De Bilt (121, 220, 247), Bilthoven (247), Driebergen (121, 247), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (12, 247). NH: duinen (AWD, Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Zaanstad (Reef) (232b), Zandvoort (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7), duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (121, 247), Scheveningen (121, 247), Wassenaar (Meijendel) (1, 2, 3, 4, 25b, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreidings) (231b). NB: Bladel (187a), Cranendonck (230e), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: (7, 233), Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Eysden (247), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (12, 247), Mook (109, 247), Obbicht - Grevenbicht (186c), Odiliënberg (52, 247), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Sint Pietersberg (247), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Alopecosa cursor (Hahn, 1831)

- Lycosa cursor*; Becker 1879c: cxxix; 1882: 101.
- Tarentula cursor*; Van Hasselt 1886b: 83.
- Alopecosa cursor*; Wiebes 1959b: 14; 1962: 7. Wiebes et al. 1974: 8. Van Helsdingen 1981b: 15. Tutelaers 2000: 9, 14, 19; 2001e (www). Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

NL: (249, 250b); nog voorkomend? (147g). GL: Arnhem (121, 247), Ede (Otterlose Zand) (215m). NH: Hilversum (121, 247), tussen Hilversum en Naarden (9, 12, 247). NB: Cranendonck (230e). LI: Maastricht (12, 121, 247).

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)

- Lycosa febrilis*; Van Hasselt 1879b: xxv.
- Tarentula fabrilis*; Van Hasselt 1886b: 85. Waage 1938: 181.
- Alopecosa fabrilis*; Wiebes 1959b: 10; 1960: 86; 1962: 7. Hulsebos 1961: 3. Van der Aart 1973: 272. Wiebes et al. 1974: 8, 17. Van der Aart et al., 1975: 4. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Noordam 1996: 16. De Bruyn 1996: 42. Koomen et al. 1993a: 572; 1993b: 217. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 38. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 25, 28. Bonte et al. 2003a: 24, 55; 2003b: 910. Spoek 2005: 26. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93. Van Helsdingen et al. 2008: 22.
- Tarentula (Alopecosa) fabrilis*; Van Heerdt et al. 1960: 235. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7.

NL: (249; 250b: kaart). FR: Terschelling (137, 247), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Dwingeloo (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (247), Hulshorst (247), Hulshorst (Hulshorsterzand) (202o), Nijmegen (121, 247), Renkum (Reijerscamp) (150m), Schaarsbergen (247). UT: Amersfoort (121, 247). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), tussen Huizen en Blaricum (247), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (121, 247), Noordwijk (182s²), Wassenaar (Meijendel) (1, 4, 25b, 201k, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (247), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Herkenbosch (247), Maastricht (121, 247), Mook (109, 247), Nieuw-Bergen (182s¹), Sint Pietersberg (240, 247), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

(Alopecosa inquilina (Clerck, 1757))

- Lycosa inquilina*; Becker 1879a: xl; 1882: 92.
Tarentula inquilina; Van Hasselt 1886b: 85; 1890b: 194.
Alopecosa inquilina; Wiebes 1959b: 14; 1962: 7. Wiebes et al. 1974: 8.

NL: ? (249, 250b). UT: ? (7, 12, 247). ZH: ? (7, 247). ZE: ? (7, 12, 247). NB: ? (7, 247). LI: ? (7, 12, 247).

Het is de vraag of deze soort tot onze fauna behoort. Van Hasselt (1886b: 85) wijst er op dat de soort ten onrechte op de "Lijst van spinnen in de provincie Utrecht gevonden en gedetermineerd" (Six 1858b) is beland, en dat hij zelf de soort niet kent (1886b: 85; 1890b: 194). Dat er desondanks een exemplaar van Alopecosa inquilina in de collectie Van Hasselt voorkomt (Wiebes 1959b: 15) zou verklaard kunnen worden door aan te nemen dat dit een door ruil verkregen exemplaar betreft. Door het ontbreken van etiketten in deze collectie is dit helaas niet met zekerheid vast te stellen. De soortnaam is van de Nederlandse lijst geschrapt.

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

- Lycosa cuneata*; Six 1858b: 298.
- Lycosa pulverulenta*; Becker 1879a: xl; 1882: 98.
- Tarentula pulverulenta*; Van Hasselt 1886b: 83. Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1955: 16; 1961: 40. Van Damme et al. 1959: 44. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3.

- *Tarentula tratalis*; Chrysanthus 1957b: 31.
- *Alopecosa pulverulenta*; Wiebes 1959b: 8; 1962: 7. Kessler-Geschiere 1965: 159; 2001: 15. Wiebes et al. 1974: 8, 16. Power 1974: 9. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 38. Tutelaers 1978: 87; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2006: 17. Koomen 1986: 202; 1998a: xxxv; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii. Poot et al. 1989: 7. Hulsebos 1989: 23; 1995: 5. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi. Siepel et al. 1996: 47, 53. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2. Kessler 2004: 7. Bone et al. 2003a: 21, 24. Prinsen 2005: 113. Noordijk 2005: 33; 2006b: 21. Bonte 2006: 9, 17. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745; 2011: 17. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. IJland et al. 2010: 29; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (249; 250b: kaart), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u), Leens (182k). FR: Schiermonnikoog (160a, 175a, 210a, 247), Terschelling (Huneplak, Koegelwieck, Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v), Fochteloërvéen (148e). DR: (121, 247), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Enschede (247), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Herikerberg (247), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 247), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Elburg (de Haere) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (181b, 247), Wooldse Veen (247). FL: Almere (218b), O. & Z. Flevoland (211a), NO-polder (211a), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Amersfoort (121, 247), De Bilt (220), tussen Maartensdijk en De Bilt (12, 247), Bilthoven (247), Driebergen (220, 247), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Zaandstad (Guisveld, Westzijderveld, Noordzeekanaal) (232b). Zwanenwater (148f), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Baarle-Nassau (247), Bladel (187a), Breda (12, 247), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhoevense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Oisterwijk (247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Cottessen (247), Eys (De Piepert) (183r), Eysden (247), Heerlen (247, 202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Houhem (247), Maastricht (12, 247), Margraten (Schietersberg) (210b), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (247), Roosteren (Schansberg) (186c), Schinnen (247), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Sint Pietersberg (247), Ter Hagen (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a), Wellerloo (55, 65, 247).

***Alopecosa tratalis* (Clerck, 1757)**

- *Trochosa tratalis*; Six 1858b: 298.
- *Lycosa tratalis*; Becker 1879a: xl; 1882: 96.
- *Tarentula tratalis*; Van Hasselt 1886b: 83; 1893b: xxxii. Waage 1938: 181.
- *Tarentula aculeata*; Chrysanthus 1954b: 40.
- *Alopecosa tratalis*; Chrysanthus 1961: 40. Van der Land 1960: 2. Wiebes 1959b: 9; 1962: 7. Wiebes et al. 1974: 7, 16. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Vogels et al. 2023: 6.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1957b: 31 (*Tarentula tratalis*) (= *Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757)) (zie 65, 247).

NL: (249; 250b: kaart). DR: Veenhuizen (121, 247). GL: Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Elten (186a), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (247), Nijmegen (121, 247), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (121, 247). UT: (7), Driebergen (220, 247). ZH: (7), Noordwijk (220, 247). ZE: (7), Walcheren (121, 247). NB: Oisterwijk (133, 247). LI: Herkenbosch (247), Lerop (65, 247), Maastricht (12, 121, 247), Sint Pietersberg (247), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)

□ *Arctosa cinerea*; De Jong 1982: 114. Kessler 1997: 4. Faber et al. 1999: 31, bijlage 2; 2001: 46. Van Helsdingen, 2002a: 10; 2003d: 22. Lambeets 2008: 8, 13. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23.

GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert, Wamel) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), N. van Arnhem (169f), Nijmegen (Millingerwaard) (174e, 202q, 202r), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). LI: Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c).

Arctosa figurata (Simon, 1876)

□ *Arctosa figurata*; Tutelaers 1978: 87, 89; 2000: 9, 14, 19; 2001e (www); 2008: 28. Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Wielink et al. 2020: 342.

NB: Hapert (Cartierheide) (230d), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Luijcksgestel (Stevensbergen) (230d), Soerendonk (Cranendonck) (215f, 230d, 230e), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpie) (230d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)

□ *Arctosa farinosa*; Six 1858b: 298.
 □ *Lycosa leopardus*; Becker 1879a: xl; 1882: 110.
 □ *Trochosa leopardus*; Van Hasselt 1886b: 81.
 □ *Arctosa leopardus*; Wiebes 1959b: 28; 1962: 8; 1964: 97. Kessler-Geschiere 1965: 159. Vlijm et al. 1968: 153. Wiebes et al. 1974: 9, 18. Power 1974: 9. Van Wingerden 1977: 105. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 202; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii; 2015: 158. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53, 58. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2004: 206; 2005: 87. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2006: 15, 17; 2009c (www); 2017: 278. Van Helsdingen 2003d: 22; 2019b: 38. Bonte et al. 2003a: 24. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 20. Lambeets 2008: 14. Noordijk 2008: 31. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23. Wielink et al. 2009: 221. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2016: 177. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (220, 249; 250b: kaart). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (174h, 175a, 235c, 254a), Terschelling (247), idem (Kroonpolders, Noordvaarder, Oosterend) (182v). DR: Anloo/Andersen/Elsbroek (Scheebroekerloop) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a), Wijster (IJsbaan) (211k). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x). GL: Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Elspeterheide (250a), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), O. & Z. Flevoland (211a), N.O.-polder (211a), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Utrecht (12, 247), Zeist (121, 247). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Texel (Mokbaai) (182y), Texel ('t Horntje) (182y), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Zaanstad (Guisveld, Euverenweg, Noordzeekanaal) (232b). ZH: Katwijk (121), Oostvoorne (235c, 247), Rockanje (247), Warmond (247), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Bladel (187a), Breda (12, 247), Casteren (Landschotse Heide) (230n), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Leende (Klein Hasselsven) (230n), Moorsel (Strabrechtse Heide) (230n), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg

(Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Vught (Marktveld) (215f). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Cottessen (247), Eys (De Piepert) (183r), Nederweert (De Banen) (182m), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a).

Arctosa lutetiana (Simon, 1876)

- *Tricca lutetiana*; Wiebes 1956: 405.
- *Arctosa lutetiana*; Wiebes 1959b: 31; 1960: 86; 1962: 9; 1964: 97. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Van der Aart 1973: 272. Wiebes et al. 1974: 9. Noordam 1996: 16, 22. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 7.

DR: (249), Dalen (250a, 250b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Zwarte Meer (250a, 250b). ZH: Wassenaar (Meijendel) (1, 3, 4, 25b, 201k, 245, 247, 248, 249, 250a, 250b).

Arctosa perita (Latreille, 1799)

- *Arctosa picta*; Six 1858b: 298.
- *Lycosa perita*; Becker 1879a: xl; 1882: 106. Bouwman 1915: 243.
- *Trochosa picta*; Van Hasselt 1886b: 81.
- *Arctosa perita*; Chrysanthus 1951g: 100; 1963: 18. Wiebes 1959b: 32; 1960: 85; 1962: 8. Van Heerdt et al. 1960: 235. Hulsebos 1961: 3. Kessler-Geschiere 1965: 159. Vlijm 1968: 153. Van der Aart 1973: 272; 1974: 181. Wiebes et al. 1974: 9, 18. Koomen 1994: xxxiii. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi; 1993b: 217; 2005: 87; 2015: 158. Noordam 1996: 8, 13; 1998: 6; 2003: 29. De Bruyn 1996: 42. Spoek 1997b: 7. Van Helsdingen 1999b: 9; 2003d: 22; 2019b: 38. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www). Prinsen 2002: 118. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24, 56; 2003b: 910. Bonte 2006: 10, 17. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Noordijk et al. 2008b: 260; 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745. Noordijk 2008: 31, 33. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 14. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (121, 201q (duinen), 249; 250b: kaart), (202s: wegbermen). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (137, 247), idem (Noordvaarder) (182v), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160b, 247), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (247), Westerveld (Boschoord) (183a). OV: Enschede (247), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: (7), Veluwe (berm autoweg) (202s), Barneveld (247), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bemmel (202e), Ede (Otterlose Zand) (215m), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202o), Hoge Veluwe (247), Hulshorst (247), Hulshorst (Hulshorsterzand) (202o), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Otterlo (182s²), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (247), Wilp (247), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: (7), De Bilt (20), Maartensdijk - De Bilt (12, 247), Bilthoven (247), Driebergen (220, 247), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Amsterdam (235c), Den Helder (247), Hilversum - Naarden (12, 247), Hilversum (247), Texel (247), Texel (Den Hoorn) (182y), Zaandstad (Zaandam, Westzaan) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zandvoort (182s²), Zwanenwater (148f). ZH: (7), duinen (AWD) (17a, 17b), duinen van Meijendel en Berkheide (201r), Katwijk (247), Leiden (247), Noordwijk (182s²), Oostvoorne (247), Wassenaar (Meijendel) (1, 2, 25b, 201k, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7), Haamstede (247). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Esp (247), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Tilburg (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (182t), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44, 247), Helenaveen (247), Maastricht (12, 247), idem (Sint Pietersberg) (247), Wellerloo (247).

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

- *Aulonia albimana*; Van Hasselt 1886b: 89. Wiebes 1959b: 56; 1960: 86; 1962: 11. Vlijm et al. 1968: 154. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Van der Aart 1973: 272. Power 1974: 9. Wiebes et al. 1979: 11. Van Helsdingen 1983: 4; 2019b: 38. Meijer 1986: 122. Koomen 1986: 202. Poot et al. 1989: 7. Noordam 1996: 11, 16, 22. De Bruyn 1996: 46. Koomen et al. 2001: xxxix. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24; 2003b: 910. Bonte 2006: 9, 17. Noordijk 2006b: 20, 21. Noordijk et al. 2010: 745. Krediet, 2015b: 9.

NL: (202s: wegbermen). GL: (121). FL: O. & Z. Flevoland (211a). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Duin en Kruidberg (147i), Egmond (182w), Velzen (Vogelenzang) (235c, 250b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (121), Wassenaar (Meijendel) (1, 3, 4, 25b, 201k, 235c, 247, 248, 249, 250b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a, 193c), Schiepersberg (193c), Sint-Pietersberg (193c).

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)

□ *Hygrolycosa rubrofasciata*; Chrysanthus 1951f: 77; 1951g: 100. Chrysanthus et al. 1959: 182. Van Damme et al. 1959: 43. Wiebes 1959b: 33; 1962: 9. Van der Land 1960: 2. Vlijm 1968: 153. Wiebes et al. 1974: 8, 17. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1991: xviii. Koomen et al. 1995: xxix; 2004: 206. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2001e (www); 2009c (www); 2017: 278. Prinsen 2005: 113. Roelofs-Ditters 2007: 20. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Van Helsdingen et al. 2012: 27, 29. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 342. Fleurbaaij 2024: 6.

NL: (250b: kaart). FR: Fochteloevréen (148e). DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Denekamp (235c), Haaksbergen (182d), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a, 247), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (Korenburgerveen) (186a), idem (Wooldse veen) (186, 247). NB: Bladel (187a), Chaam (235c), Cranendonck (230j), De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Esbeek (247), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oisterwijk (247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (247). LI: (235c), Brunssum (43, 44, 247), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (247), Ospel (Grote Peel) (147a), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

□ *Lycosa agrestis*; Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254.
 □ *Pardosa agrestis* var. *pseudoagricola*; Wiebes 1959b: 39; 1962: 10, 11. Wiebes et al. 1974: 10, 11, 21.
 □ *Pardosa agrestis* var. *pseudomonticola*; Wiebes 1959b: 39; 1962: 10, 11. Wiebes et al. 1974: 10, 11, 21. Koomen 1990: xv.
 □ *Pardosa agrestis*; Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxxvi. Siepel et al. 1996: 45, 47, 51, 53. Koomen 1999: xxxiv. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Koomen et al. 2001: xxxix; 2005: 87. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www). Van Helsdingen 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Spoek 2005: 26. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 22; 2010: 17. Lambeets 2008: 10, 13. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (249; 250b: kaart). GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k). FR: Schiermonnikoog (160a, 247), Terschelling (Koegelwieck) (182v). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Boeschoten (*pseudoagricola*) (247), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). NH: Egmond (182w), Texel (Den Burg, Gortersmient) (182y), Texel (De Cocksdrorp, De Slufter) (182y). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Renesse (182c). NB: Breda (247), Cranendonck (230e), Oosterhout (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Geleen (*pseudomonticola*) (44, 247), Maasband (186c), Maastricht (Sint Pietersberg) (*pseudomonticola*) (247), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerloo (*pseudomonticola*) (247).

Pardosa agricola (Thorell, 1856)

□ *Pardosa agricola*; Wiebes 1959b: 42; 1962: 10. Wiebes et al. 1974: 11. Power 1974: 9. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen et al. 1995: xxix. Kessler 1997: 4. Van Helsdingen et al. 2008: 22. Lambeets 2008: 9, 13. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23.

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1890b: 192 (= *Pardosa amentata*) (zie 247); Chrysanthus 1954b: 40 (sub *Lycosa agricola*) (= *Pardosa monticola*) (zie 65, 247).

NL: (249). GL: Nijmegen (Millingerwaard) (174e, 202q, 202r), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wilp (247, 250b). FL: O. & Z. Flevoland (211a). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Riel (247, 250b). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Obbicht - Grevenbicht (186c), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833)

Pardosa alacris; Koomen et al. 2001: xxxix.

NH: Egmond (182w).

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

- Aranea saccata*; Bennet et al. 1825: 472.
- Lycosa saccata*; Six 1858b: 299. Snellen van Vollenhoven 1859: 61; 1868: 61. Feekes 1936: 224. Waage 1938: 181.
- Pardosa amentata*; Becker 1879a: xli; 1882: 141. Chrysanthus 1961: 40. Hulsebos 1961: 3; 1990: 155; 1995: 5. Wiebes 1959b: 42, 50; 1962: 10. Van der Land 1960: 2. Vlijm 1962: 25. Vlijm et al. 1963: 75; 1970: 476. Edgar 1970: 487. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Kessler 1973: 30. Power 1974: 9. Meijer 1974: 171. Wiebes et al. 1974: 11, 20. Van Helsdingen 1976: 38; 1984: 2; 1997a: 116; 1999b: 9; 2002a: 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 38. Fokkema 1978: 100. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1992: xxvii; 1994: xxxiii; 1996: 173, 218; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 158. Poot et al. 1989: 7. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi; 2004: 206; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 58. Spoek 1997b: 7. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 15. Prinsen 2002: 118. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009b: 17; 2010: 17; 2013: 26; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009b: 202. Wielink et al. 2009: 221. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2011: 21. Van 't Veer et al. 2012: 14. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141.
- Lycosa amentata*; Van Hasselt 1886b: 85; 1886c: 103. Van der Hammen 1950: 112. Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254. IJland et al. 2010: 29. Wielink et al. 2020: 342.
- Lycosa annulata*; Van Hasselt 1886b: 86 (p. p.).
- Lycosa agrestis*; Van Hasselt 1890b: 192.
- Lycosa hortensis*; Van Hasselt 1898: 49 (p. p.).
- Lycosa pallidicola*; Chrysanthus 1957b: 31.

NL: (15c, 121, 213, 214, 224a, 224b, 234, 249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u), Leens (182k), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Schiermonnikoog (160a, 174c), Terschelling (Formerum, Midsland, Oosterend, Seeryp, West-Terschelling) (182v), Bolsward (122, 247), Ooststellingwerf (75 n), Oranjewoud (122, 247). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Anloo/Andersen/Elsbroek (Scheebroekerloop) (211k), Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Echten (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Lievinge (160b, 186a), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerveld (Boschoord) (183a). OV: Almelo (kanaal Almelo-Nordhorn) (182x), Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Eerde, Eerder Achterbroek, Nieuwebrug) (182i), Steenwijk (174c), idem (De Eese) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: (7, 12, 247), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Arnhem (136, 247), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: O. & Z. Flevoland (174c, 211a), NO-polder (211a), Almere (218b), Dronten (Harderbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m), Zeewolde (Winkelze Zand) (182m). UT: (7, 220, 247), Amersfoort (69n), Maartensdijk - De Bilt (12, 247),

Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (174c, 235a, 235d), idem (Bijlmermeer) (73), Kortenhoefse Plassen (147j), Wieringermeer-polder (75c), Texel ('t Horntje) (182y), Zaanstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: (121), Ackerdijkse Plassen (148j), Loosduinen (247), Scheveningen (129, 247), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreidings) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: (7, 247), Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Cottessen (182e), Gronsveld (44, 247), Heerlen (65, 202c, 247), Helenaveen (Mariapeel) (147a), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (12, 44, 247), idem (Sint Pietersberg) (182e, 240, 247), idem (Neercanne) (in grot) (83), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roerdalen (Holst, Hoosden, Vlodrop) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Schinveld (Breukberg) (164n), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vaals (182e), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

- *Pardosa hortensis*; Becker 1882: 143. Wiebes 1959b: 51; 1962: 10. Vlijm et al. 1968: 153. Wiebes et al. 1974: 11, 20. Tutelaers 1978: 87. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii. Poot et al. 1989: 7. Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Krediet, 2015b: 9. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 342.
- *Lycosa hortensis*; Van Hasselt 1886b: 86. Chrysanthus 1954b: 40.

NL: (249; 250b: kaartje). GL: (12, 121), Doorwerth (247). UT: (121), Utrecht (12, 247). ZE: Schouwen (247). NB: Baarle-Nassau (247), Breda (12, 121, 247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Landschut) (230d). LI: Colmond (247), Epen (52, 247), Eys (De Piepert) (183r), Geuldal (235c), Maasband (186c), Maastricht (235c), idem (Sint Pietersberg) (247), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mechelen (247), Jabeek (193b), Mook (235c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (247), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schin-op-Geul (247), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

- *Lycosa silvicultrix*; Six 1858b: 299.
- *Lycosa alacris*; Six 1858b: 299. Van Hasselt 1871: 46.
- *Lycosa lugubris*; Van Hasselt 1886b: 87.
- *Lycosa chelata*; Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 42.
- *Pardosa lugubris*; Wiebes 1959b: 53; 1960: 83; 1962: 9. Hulsebos 1961: 3; 1964b: 100; 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Kessler 1970: 78. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Edgar 1972: 2. Van der Aart 1973: 272; 1974: 180. Wiebes et al. 1974: 10, 19. Meijer 1974: 171; 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 38; 1999b: 9; 2002a: 10; 2019b: 38. Fokkema 1978: 100; 1978a: 596. Tutelaers 1978: 87; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 158. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 2004: 206. Siepel et al. 1996: 46, 53. De Bruyn 1996: 47. Mabelis 1996: 125-132. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Prinsen 2002: 118; 2005: 113. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 33. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2012: 27. Prinsen et al. 2009: 192. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29; 2011: 21. Noordijk et al. 2010: 745. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (121, 213, 214, 249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: (75p), Appelscha (boswachterij Appelscha: Canadameer, 't Groote Veen) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Oostermeer (75p), Oosterwolde (75p), Ooststellingwerf (75 n), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m), Opsterland (247), Oudemirdum (75p). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160f, 160g, 247), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b),

Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Ruinen (182f), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerbork (182f, 247), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Twente (191b), Denekamp (247), Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Herikerberg (247), Lemele (var.) (160e), Ommen (Beerzerveld, Lemelerberg, Nieuwebrug) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen (Springendaal) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (247), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bennekom (247), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Elburg (de Haere) (202a), Epe (247), Garderen (247), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoenderlo (72), Hoge Veluwe (247), Hulshorst (247), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Wilp (247), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m). UT: (7, 220), De Bilt (220, 247), Bilthoven (247), Hilversum - Amersfoort (12, 247), Hollandse Rading (74), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Zeist (247). NH: Bennebroek (247), Heemstede (247), Hilversum (174a, 247), Vogelenzang (74), Wijk aan Zee (247), Zandvoort (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Leiden (247), Oegstgeest (247), Oostvoorne (247), Rockanje (247), Wassenaar (94, 247), idem (Meijendel) (1, 2, 3, 4, 25b, 247), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Baarle-Nassau (247), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (247), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Esbeek (247), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (5a, 230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Leende (247), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leempetten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Valkenswaard (247), Vessem (Landschotse Heide) (182t), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d), Wintelre (182t). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Bezel (247), Brunssum (44, 247), Epen (247), Eys (De Piepert) (183r), Eys (247), Eysden (247), Geleen (247), Geulem (247), Gulpen (247), Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbos (247), Maastricht (12, 247), idem (Sint Pietersberg) (247), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mechelen (247), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schin-op-Geul (247), Schinveld (Breukberg) (164n), Swartbroek (247), Vijlen (247), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Opmerking. 'Pardosa lugubris' blijkt een soortcomplex te zijn. Naast *P. lugubris* blijken in Nederland in ieder geval *P. saltans* Töpfer-Hofmann (zie aldaar) en vermoedelijk *P. alacris* (C.L. Koch) voor te komen. Uit het hierboven samengestelde overzicht van oudere citaten is duidelijk te zien, dat bijna anderhalve eeuw geleden al oude synoniemen werden gebruikt, zoals *alacris* en *silvicultrix*. Zie verder onder *Pardosa saltans*.

Pardosa monticola (Clerck, 1757)

- *Lycosa monticola*; Six 1858b: 299. Van Hasselt 1876b: liii; 1886b: 88. Chrysanthus 1954b: 40. Hulsebos 1959: 254. Van Heerdt et al. 1960: 235.
- *Pardosa monticola*; Van Hasselt 1870b: 30. Becker 1879a: xl; 1882: 128. Chrysanthus 1961: 40. Hulsebos 1961: 3. Wiebes 1959: 42, 43; 1960: 83; 1962: 10. Van der Land 1960: 2. Vlijm et al. 1967: 31; 1968: 152. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Van der Aart 1973: 272. Kessler et al. 1973: 51; 1984: 262. Meijer 1973b: 27. Kessler 1973: 30. Power 1974: 9. Wiebes et al. 1974: 10, 20. Koomen 1986: 202; 1993: xxxiii; 1998a: xxxv; 2015: 158. Verstegen et al. 1992: 71. Koomen et al. 1993a: 572; 1993b: 216; 1996: xxv; 2001: xxxix; 2005: 87. De Bruyn 1996: 44. Simon Thomas et al. 2000: 6. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 38. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www); 2003: 6; 2008: 25, 28. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 26, 58; 2003b: 910. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Noordijk 2005: 33. Bonte 2006: 10, 17. Noordijk et al. 2008a: 83, 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 342.
- *Lycosa agricola*; Chrysanthus 1954b: 40. Roelofs-Ditters 2007: 21.

NL: (213, 214, 249; 232w: heide hogere gronden; 250b: kaartje). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (160a, 174f, 174h, 179, 235b, 235c, 247), Terschelling (137, 186, 247), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger

(Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160b), Echten (160b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Ommen (Archem, Eerde) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Steenwijk (174c). GL: (7, 121), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bennekom (247), Deelen (247), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Hoenderlo (247), Hoge Veluwe (235c, 247), Molencate (91, 247), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Stroe (247). FL: NO-polder (211a), O. & Z. Flevoland (211a). UT: (7, 121), Maartensdijk - De Bilt (12, 247), De Bilt (220, 247), Bilthoven (247), Hollandse Rading (235c), Utrecht (12, 247). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Den Helder (247), Egmond (182w), Hilversum (103, 247), Hilversum - Naarden (12, 247), Texel (247), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: (121), duinen (AWD) (17a, 17b), Groenendaal (247), Katwijk (247), Maaldrift (247), Oostvoorne (247), Rockanje (247), Wassenaar (182s²), Wassenaar (Meijendel) (1, 3, 4, 25b, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Renesse (247). NB: (121), Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Cranendonck (230e, 230k), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Oosterhout (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: (121), Beegden (182s¹), Bergen (Maasduinen) (215m), Boekoel (52, 247), Horn (52, 65, 247), Mookerheide (235c), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)

- *Pardosa nigriceps*; Becker 1881: xxviii; 1882: 133. Van Damme et al. 1959: 42. Wiebes 1959b: 52; 1960: 85; 1962: 9. Vlijm et al. 1967: 31. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Van der Aart 1973: 272; 1974: 180. Kessler 1973: 30. Kessler et al. 1973: 51. Meijer 1973b: 27; 1976a: 6. Wiebes et al. 1974: 10, 20. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 38. Tutelaers 1978: 87; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2003: 6; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Hulsebos 1989: 23. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1990: xv; 1991: xviii; 1993: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a). Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2005: 87. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Kessler-Geschiere 2001: 15. Prinsen 2002: 118; 2005: 113. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 34; 2008: 33. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2010: 17. Lambeets 2008: 14. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Noordijk et al. 2010: 745. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. IJland et al. 2011: 21. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.
- *Lycosa nigriceps*; Van Hasselt 1886b: 88. Chrysanthus 1954b: 40. Hulsebos 1959: 254. Lambregts et al. 2013: 16.

NL: (213, 214, 249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (160a, 174c, 174f, 210a, 237, 247), Terschelling (247), idem (Huneplak, Jan Thijssensduin, Koegelwieck, Noordvaarder, Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m), Opsterland (247). DR: Dwingeloo (160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f, 247), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Staphorst (247), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (174c), Wezep (247). GL: (121), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Garderen (247), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoge Veluwe (247), Hulshorst (247), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Schaarsbergen (247), Winterswijk (Wooldse veen) (247). UT: (121), Amersfoort (69n, 247). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Bloemendaal (247), Egmond (182w), Schoorl (182w), Texel (Mokbaai) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Texel ('t Horntje) (182y), Zandvoort (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: (121), duinen (AWD) (17a, 17b), Oostvoorne (247), Rockanje (247), Wassenaar (Meijendel) (1, 2, 3, 4, 25b, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Axel (247),

Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Haamstede (182c), Vijfhoek (247). NB: (121), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e, 230k), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (11, 12, 247), Oosterhout (247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessel (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Arcen (52, 247), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Haelen (247), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (247), Maastricht (Sint Pietersberg) (247), Ospel (Grote Peel) (147a), Ter Hagen (186c), Vijlen (247), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pardosa paludicola (Clerck, 1757)

- *Lycosa palludicola*; Six 1858b: 299. Snellen van Vollenhoven 1859: 61; 1868: 61. Van Hasselt 1877: xxvi; 1886b: 86; 1886c: 103.
- *Pardosa palludicola*; Becker 1879a: xl; 1882: 145. Wiebes 1959b: 46; 1962: 11. Hulsebos 1962: 234. Wiebes et al. 1974: 11, 21.

Onjuiste opgave: Chrysanthus 1957b: 31 (= *Pardosa amentata*) (zie 65, 247).

NL: (7, 224a, 224b, 249; 250b: kaartje). FR: Bolsward (122, 247), Oranjewoud (122, 247). DR: Dwingeloo (160c). UT: (121, 220), Utrecht (12, 247). NH: Amsterdam (12, 121, 247), Hilversum (247). ZH: Giesendam (121, 247), 's-Gravenhage (12, 121, 247), Wassenaar (121, 247). ZE: (247), Middelburg ? (107). NB: Breda (12, 247), Oosterhout (247).

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

- *Lycosa herbigrada*; Van Hasselt 1886b: 89; 1887a: xxxii; 1890b: 203.
- *Lycosa tarsalis*; Kluyver 1933: 105, 136. Hulsebos 1959: 254.
- *Pardosa palustris*; Wiebes 1959b: 44. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Wiebes et al. 1974: 10, 21. Van Helsdingen 1976: 38; 1997a: 116; 2002a: 10, 11; 2003d: 22. Fokkema 1978a: 596. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 158. Jacobs 1992: 133. Versteegen et al. 1992: 73. Hulsebos 1995: 5. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2001: xxxix. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28. Bonte et al. 2003a: 26. Prinsen 2005: 113. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Spoek 2005: 26. Bonte 2006: 10, 17. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 17; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9.
- *Pardosa palustris* var. *herbigrada*; Wiebes 1962: 10; 1964: 97. Vlijm et al. 1968: 152. Wiebes et al. 1974: 18, 21. Simon Thomas et al. 2000: 6. Bink 2016: 3. VAN COLEN ET AL. 2022: 141.

NL: (213, 214, 249; 232w: heide hogere gronden; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Oosterend, Seeryp) (182v), Dronrijp (75p). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Taarlo (De Heest) (211k), Westerbork (*herbigrada*) (247), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord, Vledder Aa) (183a). OV: Ommen (Beerzerveld, Eerde) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Ootmarsum (247), Zwolle (*herbigrada*) (121, 247). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Boeschoten (*herbigrada*) (247), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elspeet (*herbigrada*) (235c), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n), Mookerheide (De Bruuk) (235c), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Nijmegen (Millingerwaard) (202q), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Vierhouten (*herbigrada*) (250a), Wageningen (181b, 247), Wilp (247), Winterswijk (*herbigrada*) (123, 129, 247), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amsterdam (235c), Amsterdamse Bos (*herbigrada*) (235c), Egmond (182w), Zaanstad (Euverenweg) (232b). ZH: Papendrecht (import) (16h). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Bladel

(187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Cottessen (182e), Epen (247), Eys (De Piepert) (183r), Eys (247), Heerlen (202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), IJlkhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Maastricht (Sint Pietersberg) (247), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vijlen (247), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

- *Lycosa annulata*; Van Hasselt 1886b: 86 (p. p.).
- *Lycosa riparia*; Van Hasselt 1886b: 87. Kluyver 1933: 136.
- *Lycosa prativaga*; Van Hasselt 1886b: 88.
- *Pardosa prativaga*; Wiebes 1959b: 54; 1962: 9; 1964: 97. Van der Land 1960: 2. Hulsebos 1961: 3; 1995: 5. Vlijm 1968: 153. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Den Hollander 1970: 274; 1971: 257; 1972: 136. Den Hollander et al. 1972: 206; 1973: 3. Van der Aart 1973: 272. Meijer 1973b: 27; 1974: 171. Kessler 1973: 30. Power 1974: 9. Wiebes et al. 1974: 10, 19. Van Helsdingen 1984: 2; 1997a: 116; 1999a: 6; 1999b: 9; 2003d: 22; 2019b: 38. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 58. Spoek 1997b: 7. Ma et al. 1997: 76. Koomen 1999: xxxiv; 2000: xxxviii; 2010: 210. Faber et al. 1999: bijlage 2. Kessler-Geschiere 2001: 15. Bonte et al. 2003a: 26. Kessler 2004: 7. Bonte 2006: 17. Prinsen et al. 2006: 88. Tutelaers 2006: 17; 2009c (www); 2017: 278. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 22; 2009b: 17; 2010: 17; 2013: 26. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Cuppen 2010: 192. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Franken et al. 2016: 177. Vogels 2019: 29. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 23.

NL: (213, 214, 249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: Leens (182k). FR: Ameland (197), Schiermonnikoog (174c), Terschelling (186, 247), idem (Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Diever (160h), Dwingeloo (160b, 186a), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Kampen (247), Steenwijk (174c), idem (Weerribben) (197), Wezep (247). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Barneveld (247), Ede (Ginkelse Zand) (75w1), Mook (De Bruuk) (235c), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (181b, 247), Winterswijk (Wooldse veen) (247), idem (Korenburgerveen) (186a), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), O. & Z. Flevoland (211a), NO-polder (211a), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m), Zeewolde (Winkelse Zand) (70c, 182m). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Bovenkerk (153a), Heemstede (153b), Kortenhoefse Plassen (147j), Oud-Valkeveen (235c), Vogelenzang (153v, 235c), Zaandstad (Euverenweg, Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: 's-Gravenhage (121, 247), Loosduinen ? (121, 247), Nieuwkoop (247), Oostvoorne (153a, 153b, 235c, 247, 250a), Reeuwijk (247), Rockanje (153a, 153b, 153d, 153v), Scheveningen ? (121, 247), Voorschoten (247), Warmond (121, 247), Wassenaar (Meijendel) (1), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Axel (247), Cadzand (Zwinuitbreidings) (231b). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (121, 247), Casteren (Cartierheide) (182t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oisterwijk (247), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Wintelre (182t). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Cottessen (247), Heerlen (202c), Herkenbosch (247), IJlkhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

- *Lycosa pullata*; Six 1858b: 299. Van Hasselt 1886b: 87. Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254.
 □ *Pardosa pullata*; Becker 1879a: xli; 1882: 136. Hulsebos 1961: 3; 1995: 5. Van Damme et al. 1959: 42. Wiebes 1959b: 55; 1960: 85; 1962: 9; 1964: 97. Van der Land 1960: 2. Vlijm et al. 1967: 31. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Den Hollander 1970: 274; 1971: 257; 1972: 136. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Den Hollander et al. 1972: 206; 1973: 3. Van der Aart 1973: 272. Kessler 1973: 30. Kessler et al. 1973: 51; 1984: 262. Meijer 1973b: 28; 1974: 171; 1976a: 6. Wiebes et al. 1974: 10, 19. Van Helsdingen 1976: 38; 1987: 187; 1997a: 116; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019: 47. Tutelaers, 1978: 87; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1990: xv; 1991: xviii; 1993: xxxii; 1998a: xxxv; 1999: xxxiv; 2015: 158. Bosmans 1988: 32. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 74. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2004: 206; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Kessler-Geschiere 2001: 15. Prinsen 2002: 118; 2005: 113. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 34; 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009b: 17; 2010: 18; 2012: 27, 29; 2013: 26. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29; 2011: 21. Noordijk et al. 2010: 745. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (213, 214, 249, 250a; 232w: heide hogere gronden; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (153a, 153b, 160a, 174c, 174f, 174h, 235b, 247), Terschelling (Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Dwingelose heide (186a), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f, 247), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Denekamp (153a), Haaksbergen (182d), Ommen (Archem, Beerzerveld, Lage Veld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (153a, 174c), idem (De Eese) (197), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: (7, 12, 121), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Elburg (de Haere) (202a), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wilp (247), Winterswijk (Wooldse veen en Korenburgrerveen) (186a). FL: Almere (218b), Flevopolder (174c), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 12, 121), Amersfoort (247), Bilthoven (247), Driebergen (220, 247), Hollandse Rading (174c), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Soest (247). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (174c), Bovenkerk (153a, 153b), Bergen aan Zee (247), Hilversum (153a, 153b, 153v), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: (7, 121), Gouderak (247), Maaldrift (247), Oostvoorne (153a, 247), Rockanje (153a, 153b, 153d, 153v, 247), Wassenaar (Meijendel) (1, 3, 4, 25b, 247, 248). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Haamstede (182c), Renesse (247). NB: Baarle-Nassau (247), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oisterwijk (247), Ossendrecht (Leempatten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessel (Landschotse Heide) (17r, 182t), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44, 247), Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Cottessen (247), Epen (247), Eys (De Piepert) (183r), Eys (247), Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (247), Maasband (186c), Maastricht (12, 247), idem (SintPietersberg) (247), Margraten (Schiepersberg) (210b), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (247), Roerdalen (Holst) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Tulle (247), Valkenburg (247), Vijlen (247), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (247), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

- *Lycosa purbeckensis*; De Jong 1949b: 215.
- *Pardosa purbeckensis*; Chrysanthus 1951a: 26. Wiebes 1959: 45; 1962: 10. Kessler-Geschiere 1965: 159. Van Heerd et al. 1967: 112. Vlijm et al. 1967: 35; 1968: 153; 1980: 239. Richter 1970a: 185; 1970b: 200. Meijer 1973a: 179; 1977: 84, 85; 1980a: 229. Kessler et al. 1973: 51; 1984: 262. Kessler 1973: 30. Wiebes et al. 1974: 10, 21. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Wingerden 1977: 105. Koomen et al. 1997: xxxvi. Meijer & Barendrecht 2018: 128.
- *Pardosa agrestis purbeckensis*; Koomen 1999: xxxiv. Van Klink 2015: 195.

NL: (38, 213, 214, 249; 250b: kaartje). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k), Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174c, 174f, 174h, 175a, 180b, 210a, 237, 235e, 254a), Terschelling (138, 247), idem (Noordvaarder, Oosterend, Seeryp) (182v). OV: Steenwijk (174c). FL: Flevopolder (174c), NO-polder (Blokzijl) (169e, 247). NH: Amsterdam (174c, 235c), Texel (Eendracht) (169e, 247). ZH: Oostvoorne (247), Scheelhoek (247).

Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000

(= *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) p. p.)

- *Pardosa saltans*; Koomen et al. 1997: xxxvi; 2001: xxxix. Koomen 1998a: xxxv; 1999: xxxiv; 2010: 210; 2015: 158. Noordam 1998: 233. Bonte et al. 2003a: 26. Prinsen 2005: 113. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Noordijk 2005: 34; 2008: 33. Bonte 2006: 15. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009b: 17; 2010: 18. IJland et al. 2010: 29; 2011: 21. Noordijk et al. 2010: 745. Franken et al. 2018: 46. Van Helsdingen 2019b: 38. Vogels et al. 2023: 6.

NL: (201p), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg, Canadameer) (183a), Terschelling (Formerum, Hoorn, Huneplak) (182v). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Smilde (boswachterij Smilde) (183a). OV: Ommen (Archem, Eerde, Nieuwebrug) (182i). GL: Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Lochem/Klein Dochteren (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). LI: Eperheide (Bovenste Bos, Onderste Bos) (164n).

Opmerking. De juiste verspreiding binnen ons land en de oecologische parameters zullen nog moeten worden uitgezocht. Vele van de oude opgaven voor *P. lugubris* zullen op deze soort betrekking hebben.

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908)

- *Pardosa sphagnicola*; Den Hollander 1970: 274. Den Hollander et al. 1973: 3. Wiebes et al. 1974: 10, 19. Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 38; 1980: 34; 1999a: 6. Vossen 1985b: 7; 1985d: 215. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 158. Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Roelofs-Ditters 2007: 21.
- *Pardosa prativaga* var. *fulvipes*; Den Hollander 1971: 257; 1972: 136. Prinsen et al. 2009: 192.

NL: (250b: kaartje). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Fochteloeërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a, 225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Steenwijk (De Eese) (153a, 153b, 153v), idem (Woldberg) (153b, 153v). GL: Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Winterswijk (182g). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a, 147f), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pardose tenuipes L. Koch, 1882

Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)

- *Pardosa proxima*; Mac Gillavry 1914: 91. Wiebes 1959b: 49; 1964: 97. Vlijm et al. 1968: 153. Wiebes et al. 1974: 11. Alderweireldt 1988: 20. Koomen 1992: xxvii. Tutelaers 2006: 15, 17. Noordijk 2006b: 20, 21. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 22; 2010: 17; 2015a: 5. Lambeets 2008: 11, 13. Prinsen et al. 2009: 192. Noordijk et al. 2010 : 745. Krediet, 2015b: 9. Van Colen et al. 2022: 141.

Onjuiste vermeldingen: Becker 1879a: xli; 1882: 134 (gebaseerd op onjuiste determinaties van Van Hasselt). Van Hasselt 1886b: 86 (= *Pardosa amentata* en *Pardosa prativaga*) (zie 247).

NL: (202s: wegbermen). FR: Terschelling ? (192a). GL: Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). ZE: Braakman (Braakman) (202c), Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Cottessen (182e), Epen (Geuldal) (4b, 235c, 250b), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Maastricht (ENCI-groeve) (202c), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

Pirata piraticus (Clerck, 1757)

- *Lycosa piratica*; Six 1858b: 298.
- *Lycosa (Potamia) piratica*; Van Hasselt 1873a: xxvi.
- *Pirata piraticus*; Van Hasselt 1886b: 80. Becker 1879a: xl; 1882: 123. Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1954b: 40. Wiebes 1959b: 61; 1962: 11. Van der Land 1960: 3. Hulsebos 1961: 3; 1989: 23. Kessler-Geschiere 1965: 159; 2001: 15. Van der Aart 1973: 272. Van Wingerden 1973: 208; 1977: 105. Meijer 1973a: 179. Power 1974: 9. Wiebes et al. 1974: 12, 22. Van Helsdingen 1976: 38; 1981a: 34; 1984: 2; 1997a: 116; 1999a: 6; 2002a: 10, 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2006c: 24; 2019b: 38. Van der Velde 1978: 130. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1999: xxxiv; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2005: 87. Noordam 1996: 7. Siepel et al. 1996: 45, 48, 51, 53, 58. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Tutelaers 2006: 17; 2009c (www); 2017: 278. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009b: 17; 2012: 27, 29; 2013: 26; 2015a: 5. Lambeets 2008: 13. Noordijk 2008: 33. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745; Noordijk et al. 2011: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Franken et al. 2016: 177; 2018: 46. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (121, 249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwerszeepolder (195), Lauwersmeer (198u). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (174h, 175a, 253, 254a), Terschelling (Kroonpolders, Noordvaarder, Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Anloo/Andersen/Elsbroek (Scheebroekerloop) (211k), Diever (160b), Dwingeloo (160b, 160f, 186a), idem (Dwingelderveld) (182f), Eext (247), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Lievinge (160b, 186a), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord, Vledder Aa) (183a), Wijster (247). OV: Haaksbergen (182d), Kampen (247), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (247), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Ede (De Ginkel, Hindenkamp, Kreelse Plas) (75w1), Ede (Ginkelse Zand) (75w1), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Nijmegen (Oude Waal) (232d), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wageningen (181b, 247), Wilp (247), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), O. & Z. Flevoland (211a), Kraggenburg (Waterloopbos) (149d), NO-polder (211a, 247), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 220), Amersfoort (69n), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (12). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Bergen aan Zee (Zuider achterveld) (75w2), Diemen (247), Egmond-Binnen (75w2), Huisduinen (247), Kortenhoefse Plassen (147j), Naardermeer (247), Texel (Mokbaai) (182y), Texel ('t Horntje) (182y), Texel (Den Hoorn, Mokweg) (182y), Velzen (100, 247), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld) (232b). ZH: (7), Ackerdijkse Plassen (148j), Gouderak (247), De Kaag (247), Leiden (247), Leiderdorp (247), Maassluis (247), Nieuwkoop (247), Portugal (247), Rozenburg (247), Voorne (247), Wassenaar (247), idem (Meijendel) (1, 25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 12), Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Baarle-Nassau (247), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (12, 247), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-

Grafven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (12, 247), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Ulvenhout (247), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: (7), Arcen (52, 247), weg Asten-Meijel (147f), Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Cottessen (182e), Heerlen (247), Herkenbosch (247), Houthem (247), IJlkhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Maastricht (12, 247), Ospel (Grote Peel) (147f), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Vlodrop (247), idem (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wellerloo (247).

Pirata piscatorius (Clerck, 1757)

□ *Pirata piscatorius*; Becker 1882: 122. Van Hasselt 1886b: 80. Wiebes 1959b: 62; 1962: 11. Wiebes et al. 1974: 12, 22. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 2002b: 11. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 158. Koomen et al. 1996: xxv; 2004: 206. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Prinsen et al. 2006: 88. Tutelaers 2006: 15, 17; 2009c (www). Roelofs-Ditters 2007: 21. Van 't Veer et al. 2012: 14.

NL: (249; 250b: kaartje). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg) (183a), Fochteloeरveen (148e). DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Vries (De Punt) (211k), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord, Vledder Aa) (183a), Wijster (247). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Geldermalsen (247), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Winterswijk (182g). UT: Maarssen (121, 247), Utrecht (12, 247). NH: Zaanstad (Guisveld, Westzijderveld) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j). NB: Baarle Nassau (247), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oisterwijk (247). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (247), Maastricht (12, 247), Vlodrop (247), idem (Meinweg) (239d, 239f).

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

□ *Pirata tenuitarsis*; Van Helsdingen 1981a: 34. Bosmans 1988: 32. Koomen et al. 1996: xxv. Simon Thomas et al. 2000: 6. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 21. Prinsen et al. 2009: 192. Tutelaers 2009c (www). Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Lambregts et al. 2013: 16. Koomen 2015: 158. Franken et al. 2016: 177. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg) (183a), Westerveld (Vledder Aa) (183a). GL: Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Winterswijk (Wooldse veen) (147f). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Oisterwijk (247), Nieuw-Ginneken (Strijbeekse heide) (147f), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: weg Asten-Meijel (147f), Ospel (Grote Peel) (147f).

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

Pirata hygrophilus Thorell, 1872

□ *Pirata hygrophilus*; Van Hasselt 1886b: 80; 1890b: 203. Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 45. Wiebes 1959b: 63; 1962: 11; 1964: 98. Van der Land 1960: 3. Hulsebos 1961: 3; 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Kessler-Geschiere 1972: 153; 2001: 15. Van der Aart 1973: 272. Meijer 1974: 171; 1976a: 6. Wiebes et al. 1974: 12, 22. Van Helsdingen 1976: 38; 1984: 2; 1997a: 116; 1999a: 6; 2002a: 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2006c: 24; 2019b: 38. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 2000: xxxviii; 2015: 158. Versteegen et al. 1992: 74. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2004: 206; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 46, 51, 53, 58. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2006: 17; 2009c (www); 2017: 278. Prinsen 2002: 118; 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Noordijk 2005: 34. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 22; 2009b: 17; 2010: 18; 2015a: 5. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 20, 23.

□ *Piratula hygrophila*; Van Helsdingen et al. 2012: 27, 29; 2013: 26. Versteeg 2024: 11.

NL: (232w: heide hogere gronden; 249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg) (183a), Terschelling (Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160f, 160g, 186a), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Ruinen (182f), Vries (De Punt) (211k), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Archem) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (Weerribben) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Springendal) (182x), Tubbergen (Hezingen, Paardenslenkte) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Bronckhorst/Baak (waard) (211n), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Lochem/Klein Dochteren (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wilp (247), Winterswijk (182g, 186a), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Kraggenburg (Waterloopbos) (149d), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (247), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v), Woudenberg (247). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (175c), Kortenhoefse Plassen (147j), Naardermeer (247), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), 's-Gravenhage (121, 247), IJsselmonde (247), Loosduinen (121, 247), Nieuwkoop (247), Reewijk (247), Wassenaar (Meijendel) (1, 250a), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Sas van Gent (247). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Esbeek (247), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oisterwijk (247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Cottessen (182e), Heerlen (62, 247), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (247), Illikhoven (Visserweert) (186c), Nederweert (De Banen) (182m), Ospel (Grote Peel) (147a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roermond (129, 247), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Weiler (247).

Piratula knorri (Scopoli, 1763)

Pirata knorri (Scopoli, 1763)

- *Pirata knorri*; Becker 1882: 119. Van Hasselt 1886b: 81; 1890b: 194. Wiebes 1959b: 64; 1962: 11. Wiebes et al. 1974: 12. Van Helsdingen 1981b: 15. Krediet 2015a: 6.

NL: (249); nog voorkomend? (147g). UT: Utrecht (12, 121, 247, 250b). LI: Maastricht (12, 121, 247, 250b), Partij (langs Geul) (183q).

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

Pirata latitans (Blackwall, 1841)

- *Pirata latitans*; De Jong 1949b: 216. Wiebes 1959b: 65; 1962: 12; 1964: 98. Vlijm et al. 1968: 154. Kessler-Geschiere 1972: 153; 2001: 15. Power 1974: 9. Meijer 1974: 171. Wiebes et al. 1974: 12, 22. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Van Helsdingen 1984: 2. Tutelaars 2000: 14; 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Koomen et al., 2004: 206. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 21. Lambeets 2008: 13. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2009b: 17; 2013: 26; 2015a: 5. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Noordijk et al. 2010: 745. IJland et al. 2011: 21. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2016: 177. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Ootmarsum (250a), Steenwijk (Weerribben) (197), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Mook (De Bruuk) (235c), Renkum (Laag-

Wolfheze) (211j), Winterswijk (Wooldse veen) (250a). FL: O-Flevopolder (211a), NO-polder (211a), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (175c), Kortenhoefse Plassen (147j), Naardermeer (169e, 247), Zaandstad (Euverenweg, Guisveld, Westzijderveld) (232b). ZH: Hoogmade (247), Nieuwkoop (247, 250a), Reewijk (247), Voorne (247). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Renesse (247), Sas van Gent (247). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Maasven) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Cottessen (182e), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Maasband (186c), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Ter Hagen (186c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Piratula uliginosa (Thorell, 1856)

Pirata uliginosus (Thorell, 1856)

- *Pirata uliginosus*; Wiebes 1962: 11; 1964: 98. Wiebes et al. 1974: 12. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6. Hulsebos 1989: 23. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1994: xxxiii; 1998a: xxxv. Koomen et al. 1995: xxix. Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Tutelaars 2000: 14; 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 21. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Roelofs-Ditters et al. 2011: 7. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 27, 29. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Fochtelooërveen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: (249), Dalen (250a, 250b), Dwingeloo (160f), Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a, 225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zwartemeer (250a, 250b). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: (249), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 250a, 250b), Winterswijk (182g). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Scheidingsven en Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Eperheide (Onderste Bos) (164n), Eys (De Piepert) (183r), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r).

Trochosa robusta (Simon, 1876)

- *Lycosa robusta*; Becker 1882: 115.
- *Trochosa robusta*; Van Hasselt 1886b: 82; 1890b: 194. Chrysanthus 1955g: 518, 519; 1958b: 144. Wiebes 1959b: 25; 1962: 8. Wiebes et al. 1974: 9. Koomen 1992: xxvii. Koomen et al. 1995: xxix. Van Helsdingen et al. 2009a: 7.

NL: (249). DR: Veenhuizen ? (247). UT: Utrecht (12, 121, 247, 250b). NB: Breda (12, 121, 247, 250b), Casteren (Cartierheide) (182t). LI: Colmond (64, 247, 250b), Maastricht (12, 64, 247, 250b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (64, 247, 250b), Roermond (64, 247, 250b), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

- *Lycosa ruricola*; Becker 1879a: xl; 1882: 114. Van Hasselt 1883a: xxxii. Bouwman 1935: 79.
- *Trochosa ruricola*; Van Hasselt 1886b: 81; 1886c: 103. Kluyver 1933: 105, 136. Waage 1938: 181. Chrysanthus 1951g: 100; 1955g: 518, 519. Wiebes 1959b: 21; 1960: 85; 1962: 8. Hulsebos 1962: 234. Kessler-Geschiere 1965: 159. Van der Aart 1973: 272. Power 1974: 9. Wiebes et al. 1974: 8, 18. Meijer 1974: 171. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Wingerden 1977: 138. Buizer 1982: 72. Van Helsdingen 1984: 2; 1997a: 116; 2002a: 10, 11; 2003d: 22; 2019b: 38. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 2000: xxxviii. Koomen et al. 1993a: 572. Jacobs 1992: 133. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53, 58. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Noordam et al. 1998: 344. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaars 2000: 14; 2001e (www). Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Heuts 2007: 15. Roelofs-

Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 23; 2010: 18. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009b: 202; 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Van 't Veer et al. 2012: 14. Van Klink 2015: 195. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342.

- Tarentula ruricola*; Heselhaus 1915: 273.
- Trochosa spinipalpis*; Chrysanthus 1961: 40.

NL: (7, 22 (prooi van *Psammochares* (= *Pompilus viaticus* F.), 249, 250b (kaartje)), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (175a, 180b, 210a, 254a), Terschelling (247), Bolsward (122, 247), Oranjewoud (122, 247). DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Veenhuizen (121), Westerbork ? (247), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Wijster (247). OV: Enschede (247), Steenwijk (De Eese) (197). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Barneveld (247), Emst ? (247), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (112, 181b, 247), Wilp (247), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), O. & Z. Flevoland (211a), NO-polder (211a). UT: De Bilt (12, 247), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Woudenberg (247). NH: Beverwijk (247), Kortenhoefse Plassen (147j), Uithuizen (Biezenwaard) (151x), Texel (247), Zaanstad (Euverenweg, Giusveld, Westzijderveld) (232b). ZH: Boskoop (247), 's-Gravenhage (247), Ketel (247), Koudekerk a.d. Rijn (247), Rhoon (247), Rotterdam (25s), Voorne ? (247), Voorschoten (247), Wassenaar (247), idem (Meijendel) (1, 25b, 201z, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Renesse (247). NB: Cranendonck (230e), Esbeek (247), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Oisterwijk (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (247). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Brunssum (64, 65, 247), Caestert (247), Eys (De Piepert) (183r), Geulem ? (247), Gronsveld (247), Heerlen (202c, 247), Herkenbosch (247), Houthem (247), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Maastricht (12, 44, 247), idem (Sint Pietersberg) (240, 247), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Rijckholt (247), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (182s¹), Thorn (Koningssteen) (182m), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c), Vlodrop (247), idem (Meinweg) (239d, 239f), Wahlwiller (44, 247), Wahlwiller (Kruisberg) (182a), Wellerloo (247).

***Trochosa spinipalpis* (F.O. Pickard-Cambridge, 1895)**

- Trochosa spinipalpis*; Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1955g: 518, 519. Hulsebos 1959: 254; 1962: 234. Wiebes 1959b: 24; 1962: 8. Wiebes et al. 1974: 9. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Vangsgård et al. 1996: 82. Spoek 1997b: 7. Tutelaers 2000: 14; 2001e ([www](#)); 2009c ([www](#)). Kessler-Geschiere 2001: 15. Koomen et al., 2004: 206. Roelofs-Ditters 2007: 21. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1958b: 144 (= *Trochosa ruricola*) (zie 65, 247).

NL: (249). W: (231a). FR: Schiermonnikoog (160a). DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b). OV: Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Wageningen ? (181b, 247). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d). NB: Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oosterhout (247, 250b), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Herkenbosch (247, 250b), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Weiler (247, 250b).

***Trochosa terricola* Thorell, 1856**

- Lycosa terricola*; Becker 1879a: cxxix; 1882: 112.
- Trochosa terricola*; Van Hasselt 1886b: 82; 1886c: 103. Kluyver 1933: 136. Van der Hammen 1949a: 81. Van der Drift 1951: 120. Chrysanthus 1951g: 100; 1955g: 518, 519. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3; 1989: 23; 1990: 155; 1995: 5. Van Damme et al. 1959: 44. Wiebes 1959a: 84 (gynandromorph); 1959b: 23; 1960: 85; 1962: 8. Kessler-Geschiere 1965: 159. Van der Aart et al. 1971: 119; 1975: 4. Van der Aart 1973: 272. Van de Laar 1973: 17. Meijer 1973b: 28; 1974: 171. Wiebes et al. 1974: 9, 18. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 1999b: 9; 2002a: 10; 2003d: 22; 2019b: 38. Tutelaers 1978: 87; 2000: 9, 14; 2001e ([www](#)); 2006: 17; 2008: 25, 28; 2009c ([www](#)); 2017: 278. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986:

202; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Verstegen et al. 1992: 74. Koomen et al. 1993a: 572; 1993b: 217; 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2001: xxxix ; 2004: 206. De Bruyn 1996: 46. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Prinsen 2002: 118 ; 2005 : 113. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 9, 15. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 18; 2015a: 5. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Noordijk et al. 2010: 745. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Vogels 2019: 29. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (121, 249; 232w: heide hogere gronden; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a, 196, 247), Terschelling (247), idem (Formerum, Koegelwieck, Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v), Bolsward (122, 247), Fochteloërvéen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m), Oranjewoud (122, 247). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160b, 160h), Dwingeloo (160b, 160f, 160g, 247), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Hoogeveen (247), Ruinen (182f), Westerbork (247), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Ommen (Eerde, Lemelerberg) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Hezingen, Paardenslenkte) (182x), Wezep (247). GL: Apeldoorn (182s¹), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (247), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede ? (247), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Epe (247), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 247), Hulshorst (247), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Stroe ? (247), Voorthuizen (247), Wageningen ? (181b, 247), Wekerom (16b), Wilp (247), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n), Zeddam (247). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (247), Bilthoven (247), Hilversum - Amersfoort (7, 12, 247), Leusden (247), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (12, 247), Woudenberg (247). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Heemstede (247), Hilversum (247), Schoorl (182w), Texel (247), Zandvoort (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Delft ? (81), Leiden (247), Maaldrift ? (247), Oegstgeest (247), Rozenburg (247), Wassenaar (Meijendel) (1, 3, 4, 25b, 185, 246, 247, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Alphen en Riel (182s¹), Baarle-Nassau (247), Berkell-Enschot (182s¹), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (12, 247), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Drunen (182s, 247), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eersel (182t), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Esbeek (247), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Hilvarenbeek (182s¹), Kasteren (De Geelders) (230v), Loon op Zand (182s¹), Moergestel (182s¹), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Son en Breugel (182s²), Tilburg (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Ulvenhout (247), Vessem (Landschotse Heide) (182t), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Arcen (247), Beegden (182s¹), Bergen (Maasduinen) (215m), Broekhuizen (247), Brunssum (44, 247), Eys (De Piepert) (183r), Eysden (247), Geleen (44, 247), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (247), Horn ? (247), Maastricht (12, 247), idem (Sint Pietersberg) (247), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mechelen (247), Nederweert (De Banen) (182m), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (247), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roermond (247), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Sint Odiliënberg (247), Swalmen (247), Vijlen (247), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a), Wellerloo (247).

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)

- *Lycosa miniata*; Becker 1879c: cxxix; 1882: 104.
- *Xerolycosa miniata*; Chrysanthus 1951g: 99 (p. p.). Wiebes 1959b: 17; 1960: 87; 1962: 7. Van der Aart 1973: 272. Wiebes et al. 1974: 8, 17. Siepel et al. 1996: 46, 48, 53. Koomen et al. 1997: xxxvi. Koomen 2000: xxxvii. Van Helsdingen 2002a: 10; 2003d: 22. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 113. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2010: 18. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009b: 202;

2009c: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1886b: 82 (*Tarentula miniata*) (= *Xerolycosa nemoralis*) (zie 247). Chrysanthus 1951g: 99 (p. p. = *Xerolycosa nemoralis*) (zie 247).

NL: (249; 250b: kaartje). FR: Terschelling (Noordvaarder) (182v). OV:v. GL: Boeschoten (247), Nijmegen (Millingerwaard) (202q, 202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: De Bilt (12, 121, 247), Maartensdijk - De Bilt (9, 247), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Den Helder (247), Texel (247), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (Meijendel) (1, 247, 248). NB: Bladel (187a), Horn (247), Tilburg (247), Tilburg (Kaaistoep) (71p), 250d, Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Brunssum (44), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (Sint Pietersberg) (247), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

- Lycosa nivalis*; Six 1858b: 298. Becker 1882: 103.
- Tarentula nivalis*; Van Hasselt 1886b: 82.
- Tarentula miniata*; Van Hasselt 1886b: 82.
- Xerolycosa miniata*; Chrysanthus 1951g: 99 (p. p.).
- Xerolycosa nemoralis*; Chrysanthus 1953d: 88. Van Damme et al. 1959: 43. Wiebes 1959b: 16; 1962: 7; 1964: 97. Van der Land 1960: 2. Hulsebos 1961: 3. Wiebes et al. 1974: 8, 17. Van Helsdingen 1976: 38. Tutelaars 1978: 87; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2008: 28. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1991: xviii; 1994: xxxiii; 1998a: xxv; 2000: xxviii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 2004: 206. Jacobs 1992: 133. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Bonte et al. 2003a: 27. Noordijk 2005: 34; 2008: 33. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 21. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29; 2011: 21. Noordijk et al. 2010: 745. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van Helsdingen et al. 2012: 27. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (249; 250b: kaartje), (202s: wegbermen). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg, 't Groote Veen) (183a). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (247), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord) (183a), Wijster (250a). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Junner Koeland) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (247), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bennekom (247), Boeschoten (247), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Elspeter heide (250a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoge Veluwe (247), Nijmegen (121, 247), Nunspeet (182u), Renkum (Reijerscamp) (150o), Schaarsbergen (247), Stroe (247), Wageningen (121, 247), Wilp (247), Winterswijk (Wooldse veen, Korenburgerveen) (182g, 186, 247), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i). UT: De Bilt (121, 220, 247), Bithoven (247), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (12, 247). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). NB: Bladel (187a), Breda (12, 247), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230j), Esbeek (247), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Helenaveen (247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Brunssum (44, 247), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Epen (247), Eperheide (Onderste Bos) (164n), Eysden (247), Heerlen (247), Maastricht (12, 247), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roermond (247), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schin op Geul (247), Vijlen (247), Vlodrop (50, 247), idem (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

MACROTHELIIDAE

[Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)]

- Macrothele calpeiana*; Van Helsdingen 2011a: 5, 6; 2015: 34.

UT: Utrecht (import) (149s). NH: Uithoorn (import) (149s). LI: Elsloo (import) (149x).

MIMETIDAE

Ero aphana (Walckenaer, 1802)

- *Ero atomaria*; Van Hasselt 1885c: 188.
- *Ero aphana*; Peeters 1985: 51. Meijer 1985: 136. Noordam 1996: 14. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 9; 2001e (www); 2006: 16. Heuts 2001: 11. Kessler 2004: 7. Koomen et al. 2005: 87. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 21. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 26. Bink 2014b: 13. Van Helsdingen 2019b: 38. Wielink et al. 2020: 342.

DR: (119). OV: (119). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NH: Amstelveen (151u), Amsterdam (151u), Huizen (Gooise heide) (151u), Uithoorn (151u), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Wassenaar (Meijendel) (201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Reuver (204c), Roerdalen (Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s).

Ero cambridgei Kulczynski, 1911

- *Ero cambridgei*; Van Helsdingen 1976: 38; 2019b: 38. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 15. Tutelaers 2006: 14, 16. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Koomen 2015: 158. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Lauwersmeer (198u). DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Ospel (Grote Peel) (147a), Roerdalen (Hoosden) (150s).

Ero furcata (Villers, 1789)

- *Ero thoracica*; Van Hasselt 1885c: 188; 1890b: 202.
- *Ero furcata*; Becker 1896a: 75. Hulsebos 1962: 234; 1995: 5. Kessler-Geschiere 1965: 159; 2001: 15. Meijer 1973b: 28. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1976: 38; 2019b: 38. Vossen 1983: 236. Koomen 1986: 202. Hulsebos 1989: 23. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Verstegen et al. 1992: 71. Siepel et al. 1996: 48, 53. De Bruyn 1996: 48. Koomen et al. 1997: xxxvii. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Tutelaers 2000: 9, 14; 2001e (www); 2017: 277. Heuts 2002: 8. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Prinsen 2005: 113. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2008: 23. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2010: 29. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (175a, 210a), Terschelling (Noordvaarder) (182v). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160c, 160f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m). FL: Almere (218b). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Uithoorn (151v), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen (119), Scheveningen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB:

Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Kasteren (De Geelders) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: (13a), Echt (in grot) (239b), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (129).

Ero tuberculata (De Geer, 1778)

□ *Ero tuberculata*; Six 1858b: 294; 1863: 125. Becker 1879a: xliv; 1896a: 74. Van Hasselt 1879b: xxv; 1885c: 187; 1886c: 109; 1890b: 202. Mahler & Heimans 1910: 64. Chrysanthus 1955c: 16. Hulsebos 1961: 3. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Spoek 1997b: 7. Heuts 2002: 8. Roelofs-Ditters 2007: 22. Tutelaers 2009b: 13; 2017: 277. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Noordijk et al. 2011: 17. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Zwartemeer (160b). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (119). UT: (7, 119), Amersfoort (192b), Driebergen (222b), Utrecht (220) (TYPE LOCALITY). NH: Uithoorn (151v). ZH: (119). NB: Cuijk (122), Heeze (Groote Heide) (230r), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f). LI: Maastricht (13a, 129), Mook (109), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerlooi (55).

MITURGIDAE

ZORIDAE

voor Cheiracanthium, zie CHEIRACANTHIIDAE]

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

□ *Zora nemoralis*; Noordam 1998: 154. Tutelaers 2000: 13, 18; 2001e (www).

NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (201p).

Zora parallela Simon, 1878

□ *Zora parallela*; Tutelaers 1978: 86, 87; 2000: 8, 13, 18; 2001e (www). Noordam 1998: 155. Roelofs-Ditters 2007: 19.

NB: Breda (Kogelvanger) (215f), Cranendonck (230e), Eindhoven (201p), Heeze (Heezerven) (230d).

Zora pardalis Simon, 1878

□ *Zora pardalis*; Roelofs-Ditters 1996: 1. Noordam 1998: 155. Roelofs-Ditters 2007: 19.

NB: Eindhoven (201p), Eindhoven (Strabrechtse Heide) (215c), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f).

Zora silvestris Kulczynski, 1897

□ *Zora silvestris*; Tutelaers 1978: 86, 87; 2000: 8, 13, 18; 2001e (www). Koomen et al. 1995: xxix. Noordam 1998: 154. Prinsen 2000: 88. Roelofs-Ditters 2007: 19.

GL: Renkum (Renkumse beekdal) (211f). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Eindhoven (201p), Waalre (Meelberg) (230d).

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

□ *Zora spinimana*; Six 1858b: 297. Van Hasselt 1870b: 30; 1876b: lii. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 308. Chrysanthus 1951g: 100. Van Damme et al. 1959: 40. Hulsebos 1961: 2; 1989: 23; 1990: 155. Kessler-Geschiere 1965: 158; 2001: 15. Van der Aart et al. 1971: 119. Van der Aart et al. 1975: 4. Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1999a: 6; 2006c: 24; 2019: 47; 2019b: 38. Tutelaers 1978: 5; 2000: 8, 13; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28; 2009c (www). Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1993: xxii; 1994: xxii; 1998a: xxiv; 1999: xxiv; 2015: 159. Bosmans 1988: 32. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 71. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxiv; 1997: xxvi; 2001: xxxix; 2004: 206; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 48, 53. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2. Prinsen 2002: 118; 2005:

112. Bonte et al. 2003a: 23, 27. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 19. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 279. Van Helsdingen et al. 2008: 24; 2009b: 17; 2010: 18; 2012: 28, 29; 2013: 28. Prinsen et al. 2009: 192. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 23; 2011: 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 13. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.

□ *Hecaerge maculata*; Van Hasselt 1885c: 138.

NL: (119; 232w: heide hogere gronden). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (Huneplak, Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Dwingeloo (160f, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160b), Havelte (Havelterberg) (230i), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Haaksbergen (182d), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Springendal) (182x), Tubbergen (Hezingen, Paardenslenkte) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Elburg (de Haere) (202a), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Molencate (91), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b), Kraggenburg (Waterloopbos) (149d), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Driebergen (220), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Egmond (182w), Hilversum (103), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (4, 25b), idem (Bierlap) (3), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Zaanstad (Euverenweg) (232b). NB: Bladel (187a), Breda (13b), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (215f, 230e), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Waschven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (13b), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Dommeldal) (230x), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Eys (De Piepert) (183r), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (7, 13b), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (44).

MYSMENIDAE

Microdipoena jobi Kraus, 1967

Mysmenella jobi (Kraus, 1967)

□ *Mysmenella jobi*; Prinsen 2003: 47.

LI: Vlodrop (Meinweg) (211h).

NESTICIDAE

Howaia mogera (Yaginuma, 1972)

□ *Nesticella mogera*; Bloem et al. 2021: 38.

ZH: Rotterdam (Blijdorp) (lijkt gevestigde soort) (16 l).

Nesticus cellularis (Clerck, 1757)

□ *Meta cellularis*; Six 1858c: 20; 1863: 125.

□ *Nesticus cellulanus*; Becker 1879a: xliv. Van Hasselt 1885c: 157; 1898: 52. Van der Hammen 1947c: 480; 1950: 110. Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1961: 3. Poot et al. 1989: 7. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Roelofs-Ditters 2007: 22. IJland et al. 2010: 29. Colijn et al. 2017: 14.

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Meppel (160b). UT: (7, 119), Amersfoort (69n), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (221, 222b). ZH: (119), Leerdam (Fort Asperen) (215f), Loosduinen (136). ZE: (7, 119). LI: Bunde (50), idem (in grot) (83), Geulhem (in grot) (80, 83), Heerderberg (in grot) (83), Maastricht (Sint Pietersberg, in grot) (83), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mechelen (in grot) (83), Neercanne (in grot) (83), Valkenburg (Geuldal) (83, 136).

OECOBIIDAE

[*Oecobius amboseli* Shear & Benoit, 1974]

□ *Oecobius amboseli*; IJland 2013: 39.

ZH: Leiden (164e) (import).

(*Oecobius cellariorum* (Dugès, 1836))

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1885c: 149 (= *Oecobius navus* Blackwall) (zie 82).

Het voorkomen van deze soort in ons land is niet aangetoond.

[*Oecobius navus* Blackwall, 1859]

Oecobius annulipes Lucas, 1846

□ *Oecobius cellariorum*; Van Hasselt 1885c: 149. Van der Hammen 1949b: 374.

UT: (119), Utrecht (ingevoerd) (82). NH: (119), Amsterdam (ingevoerd) (82).

OONOPIDAE

[*Heteroonops spinimanus* (Simon, 1892)]

□ *Heteroonops spinimanus*; Bloem et al. 2021: 38.

ZH: Rotterdam (Blijdorp) (16 l).

[*Ischnothyreus velox* Jackson, 1908]

□ *Ischnothyreus velox*; Van der Hammen 1969: 27.

UT: Baarn (in kas) (85).

Oonops domesticus De Dalmas, 1916

□ *Oonops pulcher*; Van Hasselt 1885c: 123; 1890b: 205 (beide p. p.). Meijer & Van Wingerden 1975: 137 (p. p.).

GR: Grijpskerk (198v). DR: ? (119). OV: ? (119). UT: ? (119). NH: ? (119). ZH: ? (119), Nootdorp ? (129).

Oonops pulcher Templeton, 1835

□ *Oonops pulcher*; Van Hasselt 1885c: 123; 1890b: 205 (beide p. p.). Chrysanthus 1966: 156. Meijer & Van Wingerden 1975: 137 (p. p.). Deeleman 1978: 4. Roelofs-Ditters 2007: 18.

DR: ? (119). OV: ? (119). UT: ? (119). NH: ? (119). ZH: ? (119), Leiden (198v), Nootdorp ? (129). NB: Ossendrecht (71k), Sint Michielsgestel (215f). LI: Heerlen ? (68).

[*Silhouettella loricatula* (Roewer, 1942)]

Dysderina loricata (Simon, 1873)

Gamasomorpha loricatula (Roewer, 1942)

- Oonops pulcher*; Van Hasselt 1885c: 123; 1890b: 205 (beide p. p.).

Het betreft hier één mannelijk exemplaar, aanwezig in het door Van Hasselt als *Oonops pulcher* Templeton vermelde materiaal; de herkomst van dit ene exemplaar is daarom niet nauwkeuriger aan te geven dan: DR, OV, UT, NH of ZH (119). Het is een zuidelijke, warmteminnende soort, die in het mediterrane gebied voorkomt en ook in Zuid-Duitsland is gevonden. Ik acht het niet onmogelijk dat het exemplaar ter vergelijking is gebruikt en niet zelf in Nederland is gevangen, maar dit valt natuurlijk niet te bewijzen. De soort wordt daarom als geïmporteerd beschouwd.

Tapinestis inermis (Simon, 1882)

- Tapinesthis inermis*; Van Helsdingen 2003b: 19; 2012: 22.

ZH: Oegstgeest (148l, 149v).

[Triaeris stenaspis Simon, 1891]

- Triaeris stenaspis*; Bloem et al. 2021: 38.

ZH: Rotterdam (Blijdorp) (16 l).

OXYOPIDAE

Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804)

- Oxyopes lineatus*; Van Hasselt 1886b: 89; 1887a: xxxii; 1890b: 203 (alle drie p. p.).
- Oxyopes heterophthalmus*; IJland et al. 2011: 20, 21. Van Helsdingen et al. 2012: 27. Franken et al. 2016: 177. Versteeg 2023: 12

GL: Apeldoord/Ede (H.oge Veluwe) (232o), Ede (Hindenkamp, Mosselsche Veld) (75w1), Winterswijk ? (123, 129). NB: Breda ? (121), Oisterwijk ? (121). LI: Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht ? (121).

(Oxyopes lineatus Latreille, 1806)

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1886b: 89; 1887a: xxxii; 1890b: 203 (= *Oxyopes heterophthalmus* (Latreille) en *O. ramosus* (Panzer)).

Er zijn geen zekere meldingen van deze soort, die daarom van onze faunalijst dient te worden geschrapt.

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)

- Sphasus variegatus*; Van Hasselt 1872d: 113.
- Oxyopes variegatus*; Van Hasselt 1882: xxvii.
- Oxyopes ramosus*; Becker 1882: 152. Chrysanthus 1961: 41. Van Helsdingen 1976: 36; 2019: 47. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2017: 278. IJland et al. 2011: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 27, 29. Vogels 2019: 29.
- Oxyopes lineatus*; Van Hasselt 1886b: 89; 1887a: xxxii; 1890b: 203 (alle drie p. p.).

GL: Ermelo (Speulderveld) (150w2), Winterswijk ? (123, 129). NB: Breda (98), Cranendonck (230e), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oisterwijk ? (121). LI: Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Heerlen (65), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (12), Roerdalen (Meinweg) (236c), Valkenburg (111), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

PHILODROMIDAE

Philodromus albidus Kulczyński, 1911

- Philodromus rufus*; Van Helsdingen 1984: 2. Noordijk et al. 2001: 21. Tutelaers 2006: 15, 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 192. Van Helsdingen et al. 2013: 26. Bink 2016: 3. Noordijk 2022: 51.

GL: Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n). NH: Kortenhoefse Plassen (147j, 202m). ZH: Papendrecht (import) (16h). NB: Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Nuenen ('t Spekt) (215f), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (202af). LB: Roerdalen (Holst, Hoosden) (150s), Stokhem (202m).

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

□ *Philodromus aureolus*; Six 1858b: 300; 1863: 128. Snellen van Vollenhoven 1859: 63; 1868: 63. Van Hasselt 1871: 46; 1877: xxvi; 1879b: xxiv; 1886b: 73. Becker 1879a: xli; 1882: 232. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1959: 254; 1961: 2. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1974: 171. Van Helsdingen 1976: 37; 1999b: 9; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 14; 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1990: xv; 1993: xxxii; 1994: xxxii; 2000: xxxviii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2005: 87. Noordijk et al. 2001: 21. Prinsen 2002: 118; 2005: 112; 2007: 141. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Van Helsdingen et al. 2010: 18; 2012: 27; 2013: 26. IJland et al. 2011: 21. Van 't Veer et al. 2012: 14. Bink 2016: 3. Franken et al. 2018: 46. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 121, 224a, 224b). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum) (182v). DR: Diever (160b), Dwingeloo (160b), Ruinen (182f), Zweeloo (Mepperveld) (182f). OV: Steenwijk (De Eese) (197). GL: (12), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: De Bilt (12), Rijnsburg (220, 222b), Utrecht (12). NH: Amsterdam (202m), Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaanstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: 's-Gravenhage (12), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (94), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg ? (107), Westerschouwen (182c). NB: Breda (12), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Eersel (182t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Kasteren (De Geelders) (230v), Mierlo (Rederijk) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg) (230d), Wintelre (182t). LI: Brunssum (44), Eperheide (Bovenste Bos, Onderste Bos) (164n), Geleen (44), Jabeek (193b), Maasgouw (Linnerheid) (150s), Maastricht (12, 44), Mook (109), Rijckholt (44), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (44).

Philodromus buchari Kubcova, 2004

□ *Philodromus longipalpis*; Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Bink 2016: 3. Van Helsdingen 2019b: 39.

FR: Terschelling (Formerum) (182v). NH: Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).

Philodromus buxi Simon, 1884

□ *Philidromus constellatus*; Van Hasselt 1886b: 74.
□ *Philodromus buxi*; Meijer 1987b: 88. Roelofs-Ditters 2007: 19. Bink 2016: 3.

ZH: Papendrecht (import) (16h). NB: (121), Sint Michielsgestel (215f). LI: Jabeek (193e).

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

□ *Philodromus cespiticolens*; Van Hasselt 1886b: 74; 1898: 64.
□ *Philodromus caespiticolis*; Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1961: 2. Kessler-Geschiere 1965: 159. Meijer 1974: 171.
□ *Philodromus cespitum*; Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1987: 187; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 39. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xviii. Koomen et al. 1996: xxv; 2001: xxxix; 2004: 206; 2005: 87. Spoek 1997b: 6; 1999: 3. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 26. Prinsen 2005:

112. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 15. Tutelaers 2006: 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 19. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Van Helsdingen et al. 2010: 18; 2012: 27; 2015a: 5. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. IJland et al. 2011: 22. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Schiermonnikoog (175a), Fochteloërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: (121), Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Steenwijk (De Eese) (197). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: Maarsbergen (136). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Azenray (50), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Philodromus collaris C.L. Koch, 1835

□ *Philodromus collaris*; De Jong 1949b: 216. Chrysanthus 1957a: 45; 1966: 156. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1976: 37; 2019b: 39; 2019c: 47. Koomen 1993: xxxii; 2015: 158. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 2001: xxxix; 2004: 206. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Tutelaers 2000: 8, 14; 2001e (www); 2003: 6; 2017: 279. Prinsen 2002: 118; 2007: 141. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 192. Noordijk et al. 2011: 17. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 26; 2015a: 5. Bink 2016: 3.

GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg) (183a). DR: Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Baak (waard) (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (182u), Renkum (169e). NH: Egmond (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e, 230k), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Oosterhout (61), Sint Michielsgestel (215f), Wintelre (182t). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (68), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maasgouw (Linnerheid) (150s), Roerdalen (Herkenbosch (De Muitert)) (150s).

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

□ *Philodromus limbatus*; Six 1858b: 300; 1863: 128. Van Hasselt 1877: xxvi.
□ *Philodromus dispar*; Van Hasselt 1886b: 73. Becker 1879a: xli; 1882: 234. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1961: 2. Klomp et al. 1973: 334. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1998a: xxxv; 2015: 158. Koomen et al. 2005: 87. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2017: 279. Prinsen 2002: 118. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 192. IJland et al. 2010: 29; 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 26. Van 't Veer et al. 2012: 14. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Franken et al. 2018: 46. Vogels 2019: 29. Van Helsdingen 2019b: 39.

NL: (121). GR: Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). DR: Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Westerbork (182f), Westerveld (Wapserveld) (183a). OV: Ommen (Eerde, Lemelerberg) (182i). GL: Arnhem (181a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n). UT: (7, 12), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (220, 222b), Amersfoort (69n). NH: (7), Egmond-Binnen (75w2), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Zaanstad (232b). ZH: (7), 's-Gravenhage (12), Papendrecht (import) (16h). Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 12), Middelburg ? (107). NB: Breda (12), Cranendonck (230e), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel

(215f). LI: Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Maasgouw (Linnerheid) (150s), Maastricht (12, 44), Neercanne (44), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (44), Roerdalen (Holst, Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schinveld (Breukberg) (164n), Wahlwiller (44).

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)

□ *Philodromus emarginatus*; Klomp et al. 1973: 334.

GL: Arnhem (181a).

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)

□ *Philodromus fuscomarginatus*; De Winkel et al. 2014: 180.

OV: Dalfsen (Arriënveld, Rechterense Veld) (255b), Hellendoorn (Hellendoornse Berg, Sprengenberg/Koningsbelten) (255b), Hof van Twente (Landgoed Twickel) (255b), Ommen (Junner Koeland, Landgoed Beerze, Landgoed Junne, Lemelerveld) (255b). GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (255b), Roosendaal (Koolhof) (255b).

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757)

□ *Aratamus jejunus*; Six 1858b: 300. Snellen van Vollenhoven 1859: 63; 1868: 63.
□ *Philodromus margaritatus*; Becker 1879a: xli; 1879b: lxxxix; 1882: 222b. Van Hasselt 1886b: 73; 1892: xxviii. Bouwman 1936: 80. Chrysanthus 1957a: 44; 1957b: 31. Klomp et al. 1973: 330. Tutelaers 2006: 15, 18. Van Helsdingen et al. 2013: 27. Koomen 2015: 158. Bink 2016: 3. Fleurbaaij 2024: 6.
□ *Philodromus poecilus*; Van Hasselt 1886b: 73 (p. p.).
□ *Philodromus laevipes*; Tinbergen 1951: 62. Noordijk et al. 2001: 21.

NL: (8, 22, 224a, 224b). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a). OV: (121). GL: (7, 12, 121), Apeldoorn (131), Arnhem (181a), Hulshorst (230b), Nijmegen (121). UT: (7, 12, 121). NH: Amsterdam (202m). ZH: Papendrecht (import) (16h). NB: De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Leende (Klein Hasselsven) (230n), Luijkgestel (Stevensbergen) (230n), Moorsele (Strabrechtse Heide) (230n), Valkenswaard (Eindhovense golf) (230n). LI: (121), Maasgouw (Linnerheid) (150s), Maastricht (12), Wellerlooi (62).

Philodromus poecilus (Thorell, 1872)

□ *Philodromus poecilus*; Van Hasselt 1886b: 73 (p. p.).

GL: Nijmegen (121).

Philodromus praedatus O.P.-Cambridge, 1871

□ *Philodromus praedatus*; Peeters et al. 1986: 93. Koomen 1993: xxxii; 1994: xxxii; 1998b: 225; 2000: xxxviii. Tutelaers 2006: 15, 18; 2017: 279. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2015a: 5. Bink 2016: 3. Van Helsdingen 2019b: 39.

DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f). GL: Winterswijk (182g). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Reuver (204u), Schinveld (Breukberg) (164n).

Philodromus rufus Walckenaer, 1826

□ *Philodromus rufus*; Becker 1881: xxix; 1882: 230. Van Hasselt 1886b: 75; 1890b: 194. Chrysanthus 1961: 41. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 19. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen 2015a: 5; 2019b: 39; 2019c: 47. Bink 2016: 3. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Van Helsdingen 1984: 2 (= *Philodromus albidus*).

GL: Ermelo (Speulderbos) (150w2), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (11, 12), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Heerlen (65), Maastricht (12), Schinveld (Breukberg) (164n).

Rhysodromus fallax (Sundevall, 1833)

Philodromus fallax Sundevall, 1833

- *Philodromus fallax*; Becker 1882: 227. Van Hasselt 1886a: xxxvi; 1886b: 74. Van Heerd et al. 1960: 235. Buizer 1982: 73. Noordam 1996: 13; 2003: 29; 2019: 7; 2020a: 17. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 39. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

FR: Terschelling (137), Dreents-Friese (201s), Wold Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). GL: Veluwe (201r, 201s), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m). NH: Valkeveen (120, 121), Zwanenwater (148f). ZH: duinen Meijendel en Berkheide (201r, 201s), 's-Gravenhage (12), Katwijk (121, 201s, 201t), Loosduinen (121), Scheveningen (12, 121), Wassenaar (121), Wassenaar (Meijendel) (201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Breda (121).

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819)

Philodromus histrio (Latreille, 1819)

- *Philodromus histrio*; Becker 1879a: xli; 1882: 229. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1961: 2. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xviii; 1993: xxii. Spoek 1997b: 6. Tutelaars 2000: 8; 2001e (www); 2008: 29. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 15. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 19. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2011: 17.
- *Philodromus elegans*; Van Hasselt 1886b: 74.

DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (182f). OV: Haaksbergen (182d), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (7, 12, 121). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: (121), Rotterdam (25s). NB: (121), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Graffen) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: (7, 121), Brunssum (44), Maastricht (12), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

- *Thanatus formicinus*; Six 1858b: 300. Becker 1879a: xlvi; 1882: 242. Van Hasselt 1886b: 75; 1887a: xxxii; 1890b: 203, 210; 1898: 74. Noordijk 2005: 34. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

GL: (7, 12, 121), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (129), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Ede (Otterlose Zand) (215m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (129), Winterswijk (123, 129). UT: (7, 12, 121, 220). NB: Cuijk (129).

(*Thanatus rayi* Simon, 1875)

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1886b: 75 (= *Thanatus striatus*).
Deze soort dient van onze faunalijst te worden geschrapt.

Thanatus striatus C.L. Koch, 1845

- *Thanatus striatus*; Van Hasselt 1886b: 75. Hulsebos 1959: 254. Meijer 1973b: 27. Verstegen et al. 1992: 71. Koomen 1993: xxxii; 1999: xxxiv. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Van Helsdingen 1999a: 6. Tutelaars 2000: 8, 14; 2001e (www); 2009c (www). Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 27, 58; 2003b: 911. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 19. Dekkers-Scheutjens 2010: 19. Lambregts et al. 2013: 15. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.
- *Thanatus rayi*; Van Hasselt 1886b: 75. Van Helsdingen et al. 2010: 18.

NL: (232w: heide hogere gronden). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Amelanderduin, Kroonpolders, Oosterend) (182v), idem (West-Terschelling) (182v), Fochteloërveen (148e). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: Zeist (121). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen (121), Scheveningen (121). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d).

Thanatus vulgaris Simon, 1870

□ *Thanatus vulgaris*; Van Helsdingen 2010d: 10. Noordijk et al. 2020: 133.

GR: (202ae). FR: (202ae). OV: IJsselmuiden (149q, 202ae). GE: Ermelo (202ae), Gelderse Vallei (202ae). UT: Amersfoort (202ae), Zeist (202ae). NH: (202ae). ZH: Sliedrecht (202ae). NB: Tilburg (202ae). LI: Deurne (202ae).

Tibellus maritimus (Menge, 1875)

□ *Thanatus maritimus*; Van Hasselt 1877: xxvii.
 □ *Tibellus maritimus*; Van Hasselt 1886b: 76; 1890b: 195. Van Heerdt et al. 1960: 235. Van Helsdingen 1976: 37; 1984: 2; 1999a: 6; 1999b: 9. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Hulsebos 1989: 23. Koomen 1990: xv. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Spoek 1997b: 6. Bonte et al. 2003a: 22, 27, 59. Bonte 2006: 15. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Bink 2019: 7.

FR: Terschelling (137), idem (Kroonpolders, Noordvaarder) (182v), Fochteloërveen (148e). DR: Dwingeloo (160f), Emmen (Oosterbos) (225b). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Moksloot) (182y), Zwanenwater (148f). ZH: Barendrecht (import) (16 i). ZE: Domburg (107), Westerschouwen (182c). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Ospel (Grote Peel) (147a), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

□ *Thanatus oblongus*; Six 1858c: 21; 1863: 128.
 □ *Thanatus trilineatus*; Van Hasselt 1871: 46; 1877: xxvi.
 □ *Tibellus oblongus*; Van Hasselt 1886b: 76; 1890b: 210. Becker 1879a: xlvi; 1882: 239. Chrysanthus 1951g: 100. Hulsebos 1962: 233. Meijer 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1999a: 6; 2019: 47; 2019b: 39. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxii; 1994: xxxiii; 2015: 158. Bosmans 1988: 32. Koomen et al. 1995: xxix; 2001: xxxix. De Bruyn 1996: 44. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2003: 6; 2008: 29; 2017: 279. Prinsen 2002: 118; 2007: 141. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 27. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 93; 2010: 745; 2011: 17. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2010: 18; 2013: 27. Dekkers-Scheutjens 2010 2012: 27: 19. IJland et al. 2011: 22. Van 't Veer et al. 2012: 14. Franken et al. 2018: 46. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (202s: wegbermen). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Fochteloërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: (121), Dwingeloo (160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord, Doldersumerveld) (183a). OV: Haaksbergen (182d), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 121), Amersfoort (221, 222b). NH: (7, 121), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2), Zaandstad (Westzaan) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7, 121), Katwijk aan Zee (94), Scheveningen (12, 221, 222b), Wassenaar (94), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (7, 121), Middelburg ? (107). NB: (121), Bladel (Cartierheide) (211m), Breda (12), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e, 230k), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p),

250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Nederweert (Grote Peel) (215f), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Herkenbosch (Turkooelen)) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

PHOLCIDAE

[*Belisana ambengan* Huber, 2005]

□ *Belisana ambengan*; Bloem et al. 2012: 38.

ZH : Rotterdam (Blijdorp) (16 l).

[*Holocnemus pluchei* (Scopoli, 1763)]

□ *Holocnemus pluchei*; Van Helsdingen 2010 :27.

ZH: Naaldwijk (in kas) (149r), Rijnsburg (in kas) (149r). ZE: Rilland (in kas) (149r).

Onjuiste vermeldingen: Van Hasselt 1885c: 151; 1887b: xcv (beide *Pholcus rivulatus*) (= *Smeringopus elongatus* (Vinson)) (zie 81).

***Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)**

□ *Pholcus opilionoides*; Van Hasselt 1869: 25; 1870a: 21; 1870d: 160c.
□ *Pholcus phalangioides*; Van Hasselt 1870d: 341-343, 356; 1885c: 151; 1890b: 197; 1898: 59. Becker 1879a: xlvi; 1896b: 179. Pinkhof 1941: 224. Van Eydenvoven 1946: xxiii. Van der Hammen 1949a: 75; 1950: 110. Chrysanthus 1950d: 81, 82; 1951g: 98. Hulsebos 1961: 2. Van Helsdingen 1981b: 15; 2019b: 39; 2019b: 39. Vossen 1983: 236. Platel 1985: 2. Koomen 1988: 17; 1990: xv; 1991: xviii; 1992: xxvi; 1993: xxxii; 1998a: xxxiv; 1999: xxxiv; 2000: xxxviii. Koomen et al. 1996: xxiv. Simon Thomas et al. 2000: 6. Decae 2000a: 25. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 18. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Noordijk et al. 2011: 17. Van 't Veer et al. 2012: 13. Van Helsdingen et al. 2013: 27. Colijn et al. 2017: 14. Bloem et al. 2021: 38. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (90). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k). DR: Meppel (160b), Ruinen (182f). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Bronckhorst/Vorden (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m). UT: (7, 119, 136), Amersfoort (69n), Utrecht (13b, 37, 89, 93, 192b). NH: Amsterdam (37, 93, 119, 136, 192b, 206f), idem (in kas) (81), Haarlem (75), Velsen (37, 129, 136), Zaandam (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Delft (37, 93, 119, 136, 192b), Dordrecht (37, 93, 119, 136, 192b), Leiden (37, 93, 119, 136, 182b, 192b), idem (in kas) (81), Rotterdam (37, 71h, 119, 136), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c), Zierikzee (37, 129, 136). NB: Boxtel (207), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Echt (in grot) (239b), Hunsel (182m), Maastricht (13b, 44), Mechelen (Elset) (182e), Rijckholt ? (44), Roerdalen (Holst) (150s), Sint Pietersberg (in grot) (83).

***Psilochorus simoni* (Berland, 1911)**

□ *Psilochorus simoni*; Vossen 1983: 236. Koomen 1988: 17. Prinsen 1989: 3. Fürst et al. 1993: 77. Heuts 2003: 8. Van Helsdingen 2010a: 7. Bloem et al. 2021 : 38.

NL: (75y). NH: Amstelveen (kas) (151w). GL: Wageningen (in kas) (211c). ZH: Leiden (182b), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Voorschoten (in huis) (149n). LI: Echt (in grot) (239b).

[*Smeringopus pallidus* (Blackwall, 1858)]

Smeringopus elongatus (Vinson, 1863)

□ *Pholcus rivulatus*; Van Hasselt 1885c: 151; 1887b: xcv.
□ *Smeringopus elongatus*; Van der Hammen 1949a: 75.

UT: Utrecht (in kas) (81, 119, 124).

[Spermophora kerincki Huber, 2005]

□ *Spermophora kerincki*; Noordijk 2020: 106.

DR: Emmen (in kas, import) (202h).

PHRUROLITHIDAE

CORINNIDAE

Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)

□ *Phrurolithus festivus*; Six 1858c: 20; 1863: 126. Van Hasselt 1885c: 139; 1890b: 206; 1898: 69. Wasmann 1891: 61. Schmitz 1915: 167, 174. Chrysanthus 1953c: 113; 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 40. Van Helsdingen 1976: 37; 1978b: 36 (kaart); 1997a: 116; 2002a: 11; 2003d: 22; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 87; 2000: 13; 2001e (www); 2009c (www); 2017: 279. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii; 1994: xxxii. Bosmans 1988: 32. Poot et al. 1989: 6. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 132. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxiv. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Prinsen 2002: 118; 2005: 112. Bonte et al. 2003a: 26. Noordijk 2005: 33; 2006b: 21. Bonte 2006: 17. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 93; 2010: 745; 2011: 17. Van Helsdingen et al. 2008: 18; 2009a: 6; 2009b: 17; 2010: 16; 2012: 26, 28. Lambeets 2008: 13. Prinsen et al. 2009: 191. Dekkers-Scheutjens 2010: 15. IJland et al. 2010: 26; 2011: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 6. Van 't Veer et al. 2012: 13. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2018: 46. Vogels 2019: 29.
□ *Micariosoma festiva*; Becker 1879a: xlvi; 1896b: 294. Wielink et al. 2020: 341.

NL: (49), (202s: wegbermen). GR: Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Dwingeloo (147c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a, 147c), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (119, 129), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a, 147c), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoenderlo (147c), Lochem/Klein Dochteren (211n), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wiessel (147c), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 119), Baarn (147c), Driebergen (147c, 221), Leersum (147c), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Rijnsenburg (147c), Utrecht (147c, 222b), Woudenberg (147c). NH: (7), duinen (Noordhollands Duinreservaat (17b), Egmond-Binnen (75w2), Zaanstad (Noordzeekanaal) (232b). ZH: (7, 119), 's-Gravenhage (13b, 147c), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (119), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (147c, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Heezerven) (147c, 230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (13b, 147c), Ossendrecht (147c), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Vasse (Landschotse Heide) (17r). LI: (129), Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Exaeten (242), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (64, 147c, 202c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (13b, 147c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Mook (Plasmolen) (147c), Obbicht - Grevenbicht (186c), Ospel (Grote Peel) (147a, 147c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (64, 147c, 165a, 182a), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839

□ *Phrurolithus minimus*; Noordam 1998: 152. Lambeets 2008: 14.

GL: Veluwe (201p). NB: (201p). LI: (201p), Obbicht - Grevenbicht (186c).

PISAURIDAE

De in de literatuur genoemde vindplaatsen geven een vertekend beeld van de werkelijke verspreiding. De twee *Dolomedes*-soorten werden door Chrysanthus en Wiebes niet goed uit elkaar gehouden. De vermoedelijke verspreiding is te vinden in Van Helsdingen 1993b (147u) en 1995c (147z).

***Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757)**

- *Dolomedes fimbriatus*; Six 1858b: 298. Snellen van Vollenhoven 1859: 60; 1868: 60. Becker 1879a: xl; 1882: 87 (p. p.). Van Hasselt 1886b: 78. Waage 1938: 181. Pinkhof 1941: 228. Chrysanthus 1949b: 137; 1951a: 27; 1957b: 31. Van Damme et al. 1959b: 45. Wiebes 1959b: 70; 1962: 12. Van der Land 1960: 3. Virgilius 1967: 149. Wiebes et al. 1974: 13. Van Helsdingen 1976: 38; 1981a: 35; 1993a: 18; 1993b: 59; 1993c: 185; 1995c: 45. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 159. Koomen et al., 2004: 207. Prinsen 2007: 141. Tutelaers 2017: 278.
- *Dolomedes limbatus*; Van Hasselt 1893b: xxxii.

Een groot deel van onderstaande vindplaatsen zal waarschijnlijk op *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) betrekking hebben. De twee soorten zijn lange tijd met elkaar verward.

NL: (38, 147v, 224a, 224b, 249; 147t, 147u, 147y, 250b: kaartje). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a). DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f). OV: Denekamp (33, 247), Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Dwarsgracht (33, 247), Enschede (33, 247), Rijssen (33), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Zwolle (33, 121, 247). GL: Eerbeek (33), Groesbeek (186a), Winterswijk (Wooldse veen) (247), Winterswijk (182g). FL: Dronten (Harderbos) (182m). UT: (7), Driebergen (220, 247), Gagelpolder (33), IJsselstein (220, 247), Oud-Maarseveen (247), Tienhoven (33, 121, 247), Vossegat (33, 121, 247), Vreeland (12, 33, 121, 247), Westbroek (33, 121, 247), Wilnis (33, 121, 247). NH: Amsterdam (veenplassen Z. van A.) (206f, 247), Ankeveen (33), Kortenhoef (33). ZH: (7), Nieuwkoop (33), Vlaardingen (33). NB: (7), Baarle-Nassau (247), Bladel (Cartierheide) (211m), Breda (33, 121, 247), Cuijk (33, 121, 247), Esbeek (247), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (12, 33, 121, 247), Oisterwijk (33, 133, 247), Terheyden (33). LI: (7, 233), Ginneken (33), Helenaveen (33, 147f), idem (Mariapeel) (147a), Maastricht (12, 33, 121, 247), idem (Sint Pietersberg) (240, 247), Ospel (Grote Peel) (147f), Plasmolen (33), Roerdalen (Meinweg) (236c), Vlodrop (247), idem (Meinweg) (239d, 239f), Wellerlooi (62, 247).

***Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757)**

- *Dolomedes fimbriatus*; Becker 1882: 87 (p. p.).
- *Dolomedes plantarius*; Van Hasselt 1886b: 79. Chrysanthus 1951a: 27. Wiebes 1959b: 71; 1962: 12. Wiebes et al. 1974: 13. Van Helsdingen 1993a: 18; 1993b: 60; 1993c: 185; 1995c: 44; 1996: 3; 2005a: 3; 2006c: 23, 24; 2011b: 17; 2012: 22; 2013: 20; 2019a: 41. Roelofs-Ditters 2003: 18. Zwanenburg 2006: 6. Ritter 2006: 2. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2009: 17; 2011b: 17; 2016b: 46. Cuppen et al. 2010: 2. Colijn 2011: 83. Elfferich, 2022: 24. Giesbers 2023: 69.

Onjuiste vermelding: Van der Land 1960: 3 (= *Dolomedes fimbriatus*).

NL: (38, 147v, 249; 147t, 147u, 147y, 250b: kaartje, 148p: kaartje, 149d: kaartje). FR: Eernewoude (247), Heereveen (Tjongervallei) (149d), Rottige Meenthe (147z, 149d), Wolvega (Lindevallei) (149d). DR: Ruinen (Ruiner Aa) (149w). OV: De Wieden (75a1, 75y2, 147z), Wanneperveen (247), Weerribben (75y2, 147z). GL: Oldebroek (polder Oldebroek) (70b). FL: Kampereiland (149t, 149v, 149w, 150v), Kraggenburg (Waterloopbos) (149d, 149v, 149w, 149z, 150v, 215b, 256), Luttelgeest (Kuinderbos) (69m, 150p). UT: De Gagel (247), Molenpolder (147z), Noord-Maarsseveense Plas (147z), Tienhoven (121, 247), Utrecht ? (12, 247), Vossegat (121, 247), Vreeland (12, 121, 247), Westbroek (121, 247), Wilnis (121, 247). NH: Ankeveen (247), Ankeveense Plassen (147z), Kortenhoefse Plassen (147z), Naarden (Naardermeer) (149v), Naardermeer (147z). ZH: Nieuwkoop (247). NB: Oirschot ? (12, 247), 's-Hertogenbosch (Moerputten) (215e), Vlijmen (Moerputtenweg) (215f). LI: Maastricht ? (12, 247).

***Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757)**

- *Ocyale mirabilis*; Six 1858b: 297. Van Hasselt 1870b: 30; 1871: 46; 1876b: lii; 1877: xxvi; 1886b: 78; 1890b: 210. Becker 1879a: xl; 1882: 84.
- *Ocyale rufofasciata*; Six 1863: 127.
- *Dolomedes mirabilis*; Snellen van Vollenhoven 1859: 60; 1868: 60.

□ *Pisaura mirabilis*; Bouwman-Buis 1939a: 171. Chrysanthus 1951g: 99; 1955a: 40. Van Damme et al. 1959: 45. Wiebes 1959b: 67; 1960: 87; 1962: 12. Van der Land 1960: 3. Van Heerdt et al. 1960: 236. Hulsebos 1961: 3. Van Halm 1963: 167. Van der Aart et al. 1971: 119. Meijer 1973b: 28; 1976a: 6. Van der Aart 1974: 180. Wiebes et al. 1974: 12, 23. Van Helsdingen 1976: 38; 1993b: 58; 1999b: 9; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 14; 2001e (www); 2006: 17; 2008: 28; 2009c (www); 2017: 278. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 159. Poot et al. 1989: 7. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Kessler 1993: 7. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 52, 53. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Noordijk 2005: 34; 2006b: 21. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 21. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2010: 18; 2012: 27; 2013: 27; 2015a: 5. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745; 2011: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 29; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2016: 177. Colijn et al. 2017: 14. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 181, 342.

NL: (7, 23, 53, 121, 249; 147u, 174d (duinen), 250b: kaartje), (202s: wegbermen). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg, Canadameer, 't Groote Veen) (183a), Terschelling (137, 186a), idem (Formerum, Huneplak, Koegelwieck, Oosterend) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersummerveld) (183a). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Ommen (Beerzerveld, Eerde) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Bronckhorst/Baak (waard) (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Ede (Ginkelse Zandbos) (75w1), Molencate (91, 247), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b). UT: Amersfoort (69n), Amersfoort - Hilversum (12, 247), Bilthoven (247), Driebergen (220, 222b, 224a, 224b, 247), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Beverwijk (129, 247), Hilversum (103, 247), Schoorl (182w), Texel (De Koog) (77), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaanstad (Noordzeekanaal, Fort Wijkemeer) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), 's-Gravenhage (12, 247), Wassenaar (94, 247), idem (Meijendel) (2, 3, 25b, 248), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Middelburg ? (107, 247). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (12, 247), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182j), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Brunssum (44, 247), Eys (De Piepert) (183r), Gronsveld (44, 247), Heerlen (202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Jabeek (193b), Maastricht (12, 247), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Rijckholt (44, 247), Roerdalen (Holst) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Vaals (182e), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

SALTICIDAE

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

- *Dia quinquepartita*; Six 1858b: 301; 1858c: 21.
- *Attus quinquepartitus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 65; 1868: 65.
- *Acherops insignita*; Becker 1879a: xl; 1882: 54.

- *Aelurillus v-insignitus*; Van Hasselt 1886b: 99. Chrysanthus 1952a: 118; 1954b: 40. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 14; 2001e (www); 2008: 25, 29. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxiii. Hulsebos 1995: 4, 5. De Bruyn 1996: 44. Koomen et al. 1997: xxxvi; 1993b: 217. Spoek 1997b: 7; 2005: 25. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 21, 24; 2003b: 910. Noordijk 2005: 34; 2006a: CD-rom (bijlage 7). Bonte 2006: 15. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. IJland 2009: 4. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Franken et al. 2018: 46.

NL: (45, 224a, 224b). FR: Terschelling (Huneplak, Kroonpolders) (182v), Fochteloevrveen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Diever (160h), Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c). GL: (12, 121), Veluwe (berm autoweg) (202n, 202o), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Apeldoorn (Nieuw-Millingsche zand) (202o), Apeldoorn (Bremert) (202o), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202b, 202o). UT: (12, 121), Driebergen (220, 221). NH: (7), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Bergen aan Zee (Zuider achterveld) (75w2), Egmond-Binnen (75w2), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: (7, 121), Wassenaar (182s²), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (121), Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d, 230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: (121), Bergen (Maasduinen) (215m), Horn (52), Maastricht (12).

Attulus caricis (Westring, 1861)

Sitticus caricis (Westring, 1861)
Sittiflor caricis (Westring, 1861)

- *Attus caricis*; Van Hasselt 1886b: 96; 1890b: 204; 1898: 56.
- *Sitticus caricis*; Chrysanthus 1961: 41. Hulsebos 1962: 233. Meijer 1976a: 6. Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Koomen 2015: 159. Wielink et al. 2020: 342.
- *Attulus caricis*; Versteeg 2024: 11.

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Havelte (160c), Westerveld (Vledder Aa) (183a). GL: Groesbeek (136), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). NB: Ossendrecht (129), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Vorst.bos) (215f). LI: Heerlen (65), Valkenburg (121).

Attulus distinguendus (Simon, 1868)

Sitticus distinguendus (Simon, 1868)
Sitticus helveolus (Simon, 1868)

- *Attus cinereus*; Van Hasselt 1886b: 96.
- *Attulus helveolus*; Chrysanthus 1952a: 118; 1954b: 40.
- *Sitticus distinguendus*; Noordam 1996: 13. Tutelaers 2000: 8; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008b: 260.
- *Sitticus helveolus*; Koomen et al. 1997: xxxvi.

NL: (45). FR: Terschelling (Noordvaarder) (182v), Terschelling (West-aan-Zee) (215f). GL: Elburg (de Haere) (202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202o). ZH: Katwijk (121), Loosduinen (121), Scheveningen (121), Wassenaar (Meijendel) (201k). NB: Cranendonck (230e). LI: Maastricht (52).

Attulus floricola (C.L. Koch, 1837)

Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837)
Sitticus littoralis (Hahn, 1832)
Sittiflor floricola (C.L. Koch, 1837)

- *Maturna littoralis*; Six 1858b: 301.
- *Attus floricola*; Becker 1879a: xxxix; 1882: 48. Van Hasselt 1886b: 96; 1890b: 204.
- *Salicus littoralis*; Van Hasselt 1886b: 101.
- *Sitticus floricola*; Hulsebos 1962: 233. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 159. Spoek 1997b: 7. Tutelaers 2006: 15, 18. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2011: 18. Van Helsdingen et al. 2012: 29.
- *Sitticus littoralis*; Prinsen 2002: 118. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Koomen et al., 2004: 206.

GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Westerveld (Vledder Aa) (183a). DR: Dwingeloo (160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Havelte (160c), Wijster (IJsbaan) (211k). OV: (121), Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Arnhem (129), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Winterswijk (182g). UT: (7, 121), Driebergen (220). NB: (7, 121), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Grote Peel (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Moorsel (Strabrechtse Heide, Beuven) (230n), Oirschot (12), Sint Michielsgestel (215f). LI: (121).

? Attulus inexpectus (Logunov & Kronestedt, 1997)

? *Sitticus inexpectus* Logunov & Kronestedt, 1997
? *Sittiflor inexpectus* (Logunov & Kronestedt, 1997)

- *Sitticus inexpectus*; Noordam 1998: 213.

NL: ? (201p).

Attulus pubescens (Fabricius, 1775)

Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)
Sittipub pubescens (Fabricius, 1775)
Hypositicus pubescens (Fabricius, 1775)

- *Ino pubescens*; Six 1858b: 301.
□ *Attus pubescens*; Becker 1879a: xxxix; 1882: 46. Van Hasselt 1886b: 96.
□ *Sitticus pubescens*; Van der Hammen 1949a: 81. Chrysanthus 1951b: 137; 1951g: 100. Hulsebos 1961: 3. Wijnhoven 1997: 2. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 14. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 39, 121). DR: Dwingeloo (160b). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Nijmegen (251). UT: (12), Driebergen (220), Utrecht(220). NH: Zaanstad (Westzaan) (232b). ZH: Lisse (in kas) (81). NB: Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Brunssum (44), Maastricht (12).

Attulus saltator (O.P.-Cambridge, 1868)

Sitticus saltator (O.P.-Cambridge, 1868)

- *Attus saltator*; Becker 1882: 50. Van Hasselt 1886b: 96; 1890b: 204.
□ *Attulus saltator*; Chrysanthus 1953d: 88. Van Heerd et al. 1960: 236.
□ *Sitticus saltator*; Noordam 1996: 13. De Bruyn 1996: 42. Vangsgård et al. 1996: 82. Koomen et al. 1997: xxxvi. Bonte et al. 2003a: 22, 58; 2003b: 911. Bonte 2006: 10, 15. Noordijk 2006a: CD-rom (bijlage 7). Noordijk et al. 2008b: 260. De Koninck 2010: 32. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van Helsdingen 2019b: 39.

W: (231a). FR: Terschelling (137), idem (Noordvaarder) (182v). GL: Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202b, 2020), Wageningse berg (121). NH: duinen (AWD) (17a, 17c). ZH: Loosduinen (121), Scheveningen (12), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f). LI: Roermond (50, 129).

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Ballus depressus (Walckenaer, 1802)

- *Marpissa brevipes*; Six 1858b: 300; Six 1858c: 21. Van Hasselt 1872b: xxxiii; 1882: xxvii; 1883a: xxxiii.
□ *Ballus heterophthalmus*; Six 1858b: 301.
□ *Attus annulipes*; Snellen van Vollenhoven 1859: 65; 1868: 65.
□ *Ballus depressus*; Van Hasselt 1886b: 94; 1887a: xxxii; 1888: xxix; 1890b: 211. Becker 1879a: xl; 1882: 74. Chrysanthus 1951g: 100; 1952a: 117. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Poot et al. 1989: 8. Koomen 1996: 218; 1998a: xxxv; 1998b: 225.
□ *Ballus chalybeius*; Wijnhoven 1997: 2. Koomen et al. 2001: xxxix. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 112. Spoek 2005: 25. Tutelaars 2006: 18; 2008: 29; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 20. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 29; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van

Helsdingen et al. 2013: 27; 2015a: 5. Franken et al. 2016: 177. Colijn et al. 2017: 14. 2019b: 39. Van Helsdingen 2019b: 39. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (45, 121, 224a, 224b). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Eerde, Lemelerberg) (182i). GL: Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Lochem (Groot Boevink) (211n), Nijmegen (251), Renkum (Laag-Wolheze) (211j), Wageningen (112), Winterswijk (123). UT: (7, 12), Amersfoort (69n), De Bilt (220), Driebergen (220, 221), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Egmond (182w), Haarlem (12), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen (129), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7), Best (De Scheeken) (230v), Breda (12, 96), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Geleen (44), Gronsveld (44), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Maastricht (12), Margraten (Schiepersberg) (210b), Roerdalen (Hoosden, Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Valkenburg (111, 125), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Dendryphantes rufus (Sundevall, 1833)

- *Singa conica*; Snellen van Vollenhoven 1859: 51; 1868: 51.
- *Hasarius arcuatus*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1886b: 97; 1887a: xxxii; 1892: xxviii (pp).
- *Dendryphantes rufus*; Van Hasselt 1886b: 94; 1890b: 204. Chrysanthus 1951g: 100; 1952a: 118, Hulsebos 1962: 233. Klomp et al. 1973: 330. Tutelaers 2001e (www). Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 20. IJland et al. 2011: 22.

NL: (45, 224a, 224b). DR: Dwingeloo (160c). GL: Arnhem (181a), Nijmegen (121). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (121). NB: Cranendonck (215f). LI: Brunssum (44), Geleen (44), Valkenburg (129).

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

- *Attus frontalis*; Six 1858a: 170; 1858b: 301.
- *Euophrys frontalis*; Becker 1879a: xl; 1882: 68. Van Hasselt 1886b: 95. Chrysanthus 1952a: 118; 1954b: 40. Van Damme et al. 1959: 51. Van Heerdt et al. 1960: 236; 1967: 112. Hulsebos 1961: 3; 1990: 155. Kessler-Geschierie 1965: 159; 2001: 15. Meijer 1973b: 27. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 2003d: 22; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 14; 2001e (www); 2008: 29; 2009c (www). Buizer 1982: 73. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202 1990: xv; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1998a: xxxv; 2000: xxxviii; 2015: 159. Poot et al. 1989: 8. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2004: 206; 2005: 87. Noordam 1996; 2020b: 18: 7. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 46. Spoek 1997b: 7; 2005: 25. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Prinsen 2002: 118; 2005: 112. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Bonte et al. 2003a: 22, 25. Noordijk 2005: 34; 2006b: 21; 2022: 51. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 18; 2012: 27; 2013: 27. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 29; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 14. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 11.

NL: (7, 45, 121), (202s: wegbermen). GR: Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (175a, 210a), Terschelling (137, 138), idem (Formerum, Huneplak) (182v), Fochteloeरveen (148e), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160b), Dwingeloo (160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (Dwingelderveld) (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Beerzerveld) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: (12), uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Vorden

(Grote Veld) (211n), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nijmegen (Millingervaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Otterlo (Hoge Veluwe) (201u, 232p), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (12), Amersfoort (69n), De Bilt (220), Driebergen (219, 220). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Egmond (182w), Texel (Mokbaai) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Rotterdam (25s), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c), Westerschouwen (182c). NB: Bladel (187a), Breda (12), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 215f, 250d), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Heerlen (202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Lerop (52), Maastricht (12), Eys (De Piepert) (183r), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Euophrys herbigrada (Simon, 1871)

- Euophrys molesta*; Hulsebos 1962: 233.
- Euophrys herbigrada*; Koomen 1993: xxxiii.

DR: Havelte (160c), Ruinen (182f).

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

- Hasarius arcuatus*; Becker 1879a: xxxix; 1882: 34. Van Hasselt 1879b: xxv; 1886b: 97; 1887a: xxxii; 1892: xxviii (pp). Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.
- Evarcha arcuata*; Van Helsdingen 1976: 38; 2019b: 39. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 18; 2009c (www). Koomen et al., 2004: 206. Noordijk 2005: 34. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93; 2011: 18. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27, 29. Vogels et al. 2019: 226.

DR: Prinsen et al. 2006: 88. OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (7), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (131), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nijmegen (121), Wageningse berg (121), Winterswijk (123). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7, 121), Cranendonck (230e, 230k), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44), Helenaveen (Mariapeel) (147a, 236m,), Maastricht (12, 121), Mook (109), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 236m, 239d, 239f).

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

Evarcha flammata (Clerck, 1757)

- Euophrys falcata*; Six 1858b: 301.
- Euophrys flammata*; Van Hasselt 1870b: 30.
- Attus flammata*; Van Hasselt 1876b: liii; 1882: xxvii.
- Hassarius flammata*; Van Hasselt 1886b: 98; 1888: xxix; 1890b: 211. Becker 1879a: xxxix; 1882: 38.
- Hasarius arcuatus*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1886b: 97; 1887a: xxxii; 1892: xxviii (pp).
- Evarcha flammata*; Chrysanthus 1951g: 100; 1952a: 117.
- Evarcha arcuata*; Chrysanthus 1951g: 100.
- Evarcha falcata*; Hulsebos 1961: 3. Meijer 1974: 171; 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 38; 2019: 47; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 87; 2003: 6; 2008: 29; 2017: 279. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xviii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2000: xxxviii. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2004: 206. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 25. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 20. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 29; 2011: 22. Van Helsdingen et al.

2010: 18; 2013: 27. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Noordijk et al. 2011: 18. Franken et al. 2018: 46. Vogels et al. 2019: 226 (236m). Noordem 2020b: 18. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (45). FR: Terschelling (Hoorn) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo (Schipborg, Kniphorstbos) (211k), Diever (160b), Dwingeloo (10), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen (Springendaal) (182x). GL: (121), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Molencate (192a), Otterlo (Hoge Veluwe) (201u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (182g). UT: (7, 121), De Bilt (220), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (7, 121), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Hilversum (103), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Egmond-Binnen (75w2). ZH: (7, 121). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (121), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230k), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Vught (Bleijendijk) (215f), Waalre (Landschut) (230d), Wintelre (182t). LI: (7, 121), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Geleen (44), Heerlen (omgeving) (236aa), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (12), Roerdalen (Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s), Ter Hagen (186c), Valkenburg (111, 125), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

***Evarcha michailovi* Logunov, 1992**

- Hasarius laetabundus*; Van Hasselt 1886b: 98.
- Evarcha laetabunda*; Tutelaers 1978: 87. IJland et al. 2011: 20, 22.
- Evarcha michailovi*; Vogels et al. 2019: 226-227. Van der Meijden 2022: 19. Kimpel 2022: 80. Versteeg 2024: 11, 12.

DR: (121). OV: Sallandse heuvelrug (236m). GL: Ermelo (Speulderveld) (236m), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p). ZH: 's-Gravenhage (Bierlap) (175f, 192d). NB: Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (236m), Waalre (Meelberg) (236m). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n, 236m).

***Hasarius adansonii* (Audouin, 1826)**

- Hasarius adansonii*; Van der Hammen 1949a: 81. Chrysanthus 1952a: 118. Van Helsdingen 2005c: 17. Bloem et al. 2021: 38.

NL: (in kassen, 45). UT: (in kas) (81). NH: Baarn (in kas) (81). ZH: Ameide (148y), Delft (in kas) (81), 's-Gravenhage (in kas) (81), Leiden (in kas) (81), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Voorschoten (in kas) (81).

***Heliophanus aeneus* (Hahn, 1832)**

- Attus muscorum*; Van Hasselt 1876b: liii.
- Heliophanus aeneus*; Koomen et al. 2001: xxxix.

NH: Egmond (182w), Hilversum (103).

***Heliophanus auratus* C.L. Koch, 1835**

- Heliophanus auratus*; Virgilius 1967: 149. Koomen 1992: xxvii. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Lambeets 2008: 13. Van 't Veer et al. 2012: 14.

GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2). NH: Zaandstad (Noordzeekanaal) (232b). LI: (233), Maasband (186c), Maastricht (Pietersberg) (182e), Meers (Weerterhof) (186a), Obbicht - Grevenbicht (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c).

***Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802)**

- Heliophanus cupreus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 64; 1868: 64. Six 1858b: 300. Van Hasselt 1870b: 30; 1873a: xxvi; 1886b: 92. Becker, 1a: xl; 1882: 57. Chrysanthus 1951b: 137; 1954b: 40. Koomen 1994:

xxxiii. Roelofs-Ditters 2007: 20. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2013: 27. Krediet, 2015b: 9. Tutelaers 2017: 279. Franken et al. 2018: 46. Van Helsdingen 2019b: 39. Wielink et al. 2020: 342.
□ *Heliophanus dubius*; Van Hasselt 1886a: 92; 1890b: 195 (beide p. p.).

NL: (7, 39, 121, 224a, 224b). GL: Molencate (91), Winterswijk (182g). UT: (12), De Bilt (220), Driebergen (220). NH: Egmond-Binnen (75w2), Velzen (100). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (129), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (12), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d). LI: Arcen (52), Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Eys (De Piepert) (183r), Maastricht (12), Roerdalen (Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s).

***Heliophanus dubius* C.L. Koch, 1835**

□ *Heliophanus dubius*; Six 1858b: 300. Becker 1879a: xl; 1882: 59. Van Hasselt 1886b: 92; 1890b: 195 (beide p. p.).
□ *Heliophanus flavipes* var.; Six 1858c: 21.

Onjuiste vermelding: Van Hasselt 1886a: 92; 1890b: 195 (p. p.= *Heliophanus cupreus*) (zie Noordam 1997: 22).

UT: (7), De Bilt (220, 221), Driebergen (220, 221). NB: (129), Breda (12). LI: Maastricht (12).

***Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832)**

□ *Heliophanus mitens*; Six 1858c: 21.
□ *Heliophanus flavipes*; Six 1858c: 21; 1863: 128. Becker 1879a: xl; 1882: 62. Van Hasselt 1871: 46; 1886b: 92. Chrysanthus 1953d: 88. Meijer 1973b: 27. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 2015: 159. Koomen et al. 1993b: 216; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2004: 206; 2005: 87. Noordam et al. 1998: 344. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 39. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2003: 6; 2017: 279. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 25. Prinsen 2005: 112. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Spoek 2005: 25. Bonte 2006: 15. Noordijk 2006b: 21. Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Noordijk et al. 2010: 745. Van Helsdingen et al. 2010: 18; 2012: 27. IJland et al. 2011: 22. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 9. Franken et al. 2016: 177; 2018: 46. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (121), (202s: wegbermen). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Terschelling (Koegelwieck, Kroonpolders) (182v). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersumerveld) (183a). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: (7, 12), De Bilt (221, 222b), Driebergen (221). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Texel (Mokbaai) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Texel (De Cocksdorp, De Slufter) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (94), idem (Meijendel) (201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Cranendonck (230e, 230k), Kasteren (De Geelders) (230v), Loon op Zand (182s²), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Ulvenhout (Nieuw Bosch) (215f). LI: Bunde (50), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

***Heliophanus kochii* Simon, 1868**

□ *Heliophanus kochii*; Noordam 1997: 30; 1998a: 199.

ZH: duinen (201n), Katwijk (201p).

[*Heliophanus tribulosus* Simon, 1868]

□ *Heliophanus tribulosus*; Van Helsdingen et al. 2015: 13.

ZH: Cromstrijen (Klaaswaal) (import ?) (150u).

[*Icius hamatus* (C.L. Koch, 1846)]

□ *Icius hamatus*; Van Overdijk 2022: 187.

NB: Tilburg (import?) (203c).

[*Icius subinermis* Simon, 1937]

□ *Icius subinermis*; Van Helsdingen 2006a: 2.

OV: Enschede (in huis) (import?) (149b).

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

□ *Macaroeris nidicolens*; Van Keer et al. 2006: 39. Van Helsdingen 2006b: 22; 2020: 22. Fleurbaaij 2024: 6.

GL: Brummen (150w3), Nijmegen (Hees) (150w3). UT: Nieuwegein (150w3). ZH: Alblasserdam (150w3), Alphen aan den Rijn (150w3), Barendrecht (150w3)t, Benthuizen (150w3), Berkel en Rodenrijs (Weidebloem, Vogelwijk) (150w3), Capelle aan den IJssel (150w3), Delfgauw (150w3), Dordrecht (Dubbeldam, Wielwijk) (150w3), Gorinchem (150w3), Gouda (Groene Wal) (150w3), Gouderak (150w3), Hendrik-Ido-Ambacht (150w3), Hoek van Holland (dorp) (150w3), Krimpen aan de Lek (150w3), Krimpen aan de IJssel (150w3), Leiden (Hortus Botanicus) (150w3), Maasdam (150w3), Mijnsheerenland (150w3), Oud-Beijerland (150w3), Poortugaal (150w3), Pijnacker (Klapwijk, Tolhek) (150w3), Rhoon (150w3), Rotterdam (Centrum) (150w3), Rotterdam (Kralingen) (150w3), Schiedam (Kethel, Woudhoek) (150w3), Sliedrecht (150w3), Spijkenisse (vermoedelijk import) (231c, 149c), Spijkenisse (Vriesland) (150w3), Vlaardingen (Holy) (150w3), Waddinxveen (Bomenwijk) (150w3), Zoetermeer (Buytenwegh, Meerzicht, Rokkeveen) (150w3), Zwijndrecht (150w3). ZE: Nieuwvliet-Bad (150w3). NB: De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Oeffelt (Uiterwaarden) (150w3). LI: Arcen (Klein Vink, Roobek) (150w3), Bergen (Bergerheide, Gemeenteheide) (150w3), Blitterswijk (150w3), De Hamert (Looierheide, Wellsche Heide) (150w3), Heythuysen (dorp) (150w3), Limbricht (Gelders Eind (150w3)), Maastricht (150w3), Meinweg (150w3), Montfort (Reigersbroek) (150w3), Nuth-Hulsberg (150w3), Sittard (150w3), Swolgen (Tienraijse en Swolgender Heide) (150w3), Tegelen (150w3), Venlo (Kraijselheide) (150w3), Venray (150w3), Well (Paddenhoek) (150w3).

Marpissa muscosa (Clerck, 1757)

□ *Marpissa muscosa*; Six 1858b: 301. Van Hasselt 1879b: 30; 1872b: xxxiii; 1886b: 93; 1886c: 103. Becker 1879a: xxxix; 1882: 16. Chrysanthus 1951b: 137; 1951g: 100. Van Heerdt et al. 1960: 236. Hulsebos 1961: 3. Koomen et al. 1995: xxix. Koomen 1996: 218; 1998a: xxxv. Wijnhoven 1997: 2. Ma et al. 1997: 76. Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Heuts 2001: 10. Noordijk et al. 2001: 23. Prinsen 2002: 118. Roelofs-Ditters 2007: 20. Prinsen et al. 2009: 192. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 27. Van 't Veer et al. 2012: 14. Colijn et al. 2017: 14. Bink 2019: 7. Van Helsdingen 2019b: 39. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 39, 121). GR: Haren (202m), Vlagtwedde (Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: Terschelling (137), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Klazienaveen (160b), Zwartemeer (160b). OV: Ommen (Eerde) (182i, 202m). GL: uiterwaarden Waal (191a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Harderwijk (202m), Lochem (Groot Boevink) (211n), Molencate (91), Oosterbeek (202m), Nijmegen (251), Tiel (202m), Ulft (202m). UT: (220), Amersfoort (69n), Driebergen (220), Houten (202m). NH: Amsterdam (151u, 202m), Uithoorn (151u), Zaandam (202m, 232b). ZH: Barendrecht (import) (16 i), Delft (202m), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bergen op Zoom (202m), Best (De Scheeken) (230v), Boxtel (202m), Breda (12, 96, 202m), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250c, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182h), Valkenswaard (202m), Wintelre (182t). LI: Brunssum (44), Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Maastricht (12, 44), Roerdalen (Melick, Sint-Odiliënberg) (150s).

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)*Hyctia nivoyi* (Lucas, 1846)

- Attus Nivoyi*; Van Hasselt 1877: xxvii.
- Hyctia nivoyi*; Van Hasselt 1886b: 97. Van Heerdt et al. 1960: 236. Kessler-Geschiere 1965: 159. Meijer 1980b: 19. Noordam 1996: 14. Koomen et al. 1997: xxxvi; 2005: 87. Bonte et al. 2003a: 26; 2003b: 910. Bonte 2006: 15. Van Helsdingen 2019b: 39.

GR: Lauwerszeepolder (198f). FR: Schiermonnikoog (175a), Terschelling (137), idem (Formerum) (182v). GL: Arnhem (121), Nijmegen (121). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y). ZH: Loosduinen (121), Scheveningen (121), Wassenaar (121), Wassenaar (Meijendel) (201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Domburg (107), Oostkapelle (121, 197).

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)

- Marpissa pomatia*; Van Hasselt 1886b: 93; 1893a: xiii; 1898: 55. Buizer 1982: 73.

GL: Arnhem (136), Groesbeek (132, 136), Nijmegen (121), Wageningen (121, 132). ZH: Loosduinen (121, 132), Rotterdam (25s).

Marpissa radiata (Grube, 1859)

- Marpissa strigipes*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1883a: xxxiii.
- Marpissa radiata*; Van Hasselt 1891: xl. Van Helsdingen 1976: 36, 38; 1999b: 9. Tutelaers 2006: 15, 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2012: 29; 2013: 27.

GL: Groesbeek (130), Wageningen (112). NH: Zwanenwater (148f). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bergeijk (Liskes) (230n), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (Moerputten) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Lierop (Kleine Aa) (215f), Valkenswaard (Malpiebeemden) (230n), Waalre (Elshouters) (230n). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Mook (109), Roerdalen (Hoosden) (150s).

Myrmachne formicaria (De Geer, 1778)

- Salticus formicarius*; Van Hasselt 1876a: xii; 1886b: 100; 1890b: 204; 1893b: xxxii; 1898: 56, 74. Becker 1879a: xxxix; 1882: 8. Schmitz 1915: 131, 190.
- Myrmachne formicaria*; Chrysanthus 1953c: 113. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1994: xxxiii; 2000: xxviii. Roelofs-Ditters 2007: 20. Tutelaers 2009c (www). IJland et al. 2011: 22. Krediet, 2015b: 9.

NL: (49, 217z, in mierennesten). GL: (7, 12), Arnhem (121), Winterswijk (182g). NB: (7, 12), Best (De Scheeken) (230v), Geldrop (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Hoogerheide bij Bergen op Zoom (102, 121), Mierlo (Beuven) (215f), Oisterwijk (in mierenest) (136), Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Eys (De Piepert) (183r), Roermond (129), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

- Neon reticulatus*; Van Hasselt 1886b: 95; 1890b: 204; 1891: xli. Chrysanthus 1958b: 144. Van Damme et al. 1959: 41. Hulsebos 1962: 233. Meijer 1973: 27; 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 38; 1999a: 6; 2019b: 39. Koomen 1986: 202; 1993: xxxiii; 1998a: xxxv; 2000: xxviii; 2015: 159. Kessler et al. 1988: 135. Poot et al. 1989: 8. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxvi; 2004: 206. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 25. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 8, 14; 2001e (www); 2008: 29; 2009c (www); 2017: 279. Prinsen 2002: 118; 2005: 112; 2007: 141. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 26. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 20. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2009b: 17. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 16. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Terschelling (Formerum) (182v), Fochteloeरveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerseveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: Elburg (de Haere) (202a), Apeldoorn (Soerense bos) (129), idem (Kootwijkerveen) (147a), Groesbeek (130), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wekerom (16b). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Roggebotzand (174g). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (121), Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Vorst.bos) (215f), Valkenswaard (Tongelreep) (230x). LI: Helenaveen (Mariapeel) (147a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roermond (129), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Schin op Geul (64), Schinveld (Breukberg) (164n), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Neon valentulus Falconer, 1912

□ *Neon valentulus*; Hulsebos 1962: 233. Meijer 1976a: 6. Siepel et al. 1996: 52, 53. Noordam 1998: 206. Roelofs-Ditters 2007: 20. Tutelaers 2009c ([www](#)).

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (198a). OV: Oldemarkt (Weerribben) (201p). DR: Dwingeloo (160c). FL: Almere (218b). NB: Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s).

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

□ *Pales crucigera*; Six 1858b: 301.
 □ *Pellenes tripunctatus*; Becker 1879a: xxxix; 1882: 43. Van Hasselt 1886b: 98; 1890b: 211. Chrysanthus 1952a: 118; 1953d: 88. Hulsebos 1962: 233. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii; 1998a: xxv. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 20; 2001e ([www](#)); 2008: 29. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 32, 34; 2006a: CD-rom (bijlage 7). Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Wielink et al. 2020: 342. Fleurbaaij 2024: 6.

NL: (45). DR: Dwingeloo (160c), Westerbork (182f). OV: Ommen (Archem) (182i). GL: (7, 12), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202b, 202o), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Nijmegen (129), Oosterbeek (121), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: (7, 12), De Bilt (121, 220), Driebergen (121, 220), Zeist (121). ZE: Zierikzee (121). NB: (121), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Oirschot (12), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: (121), Bergen (Maasduinen) (215m), Swalmen (50), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

[Phidippus audax (Hentz, 1845)]

□ *Phidippus audax*; Noordijk et al. 2016: 146.

GL: Overbetuwe (Elst) (import, in loods) (202w).

[Philaeus chrysops (Poda, 1761)]

□ *Philaeus chrysops*; Van Helsdingen 2004: 12. Noordijk et al. 2019: 2.

GR: Groningen (import) (202z). NH: Blaricum (import) (202z), Hoofddorp (import) (202z), Oostzaan (import) (202z). ZH: Brielle (import) (202z), Voorhout (in huis) (148o, 202z). ZE: Goes (import) (202z).

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

- Ino aprica*; Six 1858b: 301.
- Parthenie fasciata*; Six 1858b: 301.
- Attus fasciatus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 65; 1868: 65.
- Phlegra fasciata*; Becker 1879a: xl; 1882: 52. Van Hasselt 1886b: 99. Chrysanthus 1954b: 40. Van Heerd et al. 1960: 236. Kessler-Geschiere 1965: 159. Meijer 1973b: 27. Koomen 1986: 202. De Bruyn 1996: 44. Koomen et al. 1997: xxxvi. Tutelaers 2000: 8, 14; 2001e (www); 2008: 29. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 26, 58; 2003b: 910. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 34; 2006a: CD-rom (bijlage 7); 2008: 31, 33. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260; 2010: 745. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 10. Van Helsdingen 2019b: 39. Wielink et al. 2020: 342. Fleurbaaij 2024: 6.

NL: (224a, 224b), (202s: wegbermen). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (137), idem (Huneplak) (182v). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (202o), Elburg (de Haere) (202a, 202o), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a, 202b, 202o), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202o), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: De Bilt (121, 220), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (7), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7), duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (121), Scheveningen (121), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Horn (52), Maastricht (12, 121), Meers (Weerterhof) (186a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Ter Hagen (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)

- Pseudeuophrys erratica*; IJland 2008: 29.

OV: Losser (Lutterzand) (164b).

Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)

Euophrys lanigera (Simon, 1871)

- Euophrys lanigera*; Wijnhoven 1997: 2. Heuts 2001: 10. Decae 2001a: 21. Roelofs-Ditters 2007: 20.
- Pseudeuophrys lanigera*; IJland 2008: 29. Colijn et al. 2017: 14. Van Helsdingen 2019b: 39.

OV: Oldenzaal (in huis) (164b). GL: Nijmegen (251). UT: Amersfoort (69n). NH: Uithoorn (151u). ZH: Rotterdam (71j), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Sint Michielsgestel (215f), Vught (Marktveld) (215f).

Saitis barbipes (Simon, 1868)

- Saitis barbipes*; Van Helsdingen 2000a: 22; 2020: 21.

GL: Nijmegen (Hazenkamp) (150w3), Wageningen (Hamelakkers) (150w3), Wijchen (West) (150w3). UT: Amersfoort (Kruiskamp) (150w3). NH: Akersloot (150w3), Castricum (150w3). ZH: Oegstgeest (ingevoerd) (148g), Vlaardingen (150w3). NB: Eindhoven (Henri Dunantpark) (150w3), Vlijmen (150w3).

Salticus cingulatus (Panzer, 1797)

- Epiblemmum cingulatum*; Van Hasselt 1883a: xxxiii; 1886b: 91.
- Salticus cingulatus*; Chrysanthus 1951b: 137; 1953d: 88. Van Damme et al. 1959: 41. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1976: 38; 2019b: 39. Tutelaers 1978: 87; 2006: 18; 2017: 279. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii; 1996: 173, 218; 1998b: 225. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi. Prinsen 2002: 118; 2005: 112; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88. Spoek 2005: 25. Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Van Helsdingen 2015a: 5. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.
- Salticus angulatus*; Bosmans 1988: 32. Kessler 2004: 7. Wielink et al. 2009: 221.

NL: (39, 121). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Terschelling (Formerum, Hoorn) (182v). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wageningen (112). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Maarheeze (De Pan) (215f), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250c, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vesse (Landschotse Heide) (17r). LI: Grevenbicht (50), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Salticus scenicus (Clerck, 1757)

- *Aranea scenica*; Bennet et al. 1825: 473.
- *Calliethera scenica*; Six 1858b: 300. Becker 1879a: xxxix; 1882: 28.
- *Calliethera histrionica*; Six 1858b: 300.
- *Attus scenicus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 64; 1868: 64. Leefmans 1910: 227.
- *Epiblemmum scenicum*; Van Hasselt 1886b: 91; 1886c: 103.
- *Salticus scenicus*; Thijssse 1931: 290. Pinkhof 1941: 226. Chrysanthus 1951b: 135; 1951g: 100. Hulsebos 1959: 253; 1961: 2. Meijer 1973b: 27. Meijer 1985: 136. Poot et al. 1989: 8. Koomen et al. 1995: xxix; 1997: xxxvi. Koomen 1996: 218; 2000: xxxviii; 2015: 159. Wijnhoven 1997: 2. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Van Helsdingen 1999a: 6; 2019b: 39. Noordijk et al. 2001: 22; 2011: 18. Decae 1997a: 18. Roelofs-Ditters 2007: 20. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Van 't Veer et al. 2012: 14. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 15c, 121, 224a, 224b). GR: Haren (202m), Nieuw Wolda (202m). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum) (182v), Bolsward (122), Drachten (202m), Fochteloevrveen (148e), Harlingen (202m), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Echten (160b), Emmen (202m), Havelte (160b), Klazienaveen (160b), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Zwartemeer (160b). OV: Ommen (202m), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Deventer (202m), Harderwijk (202m), Nijmegen (251), Ulft (202m), Wijchen (215f). UT: (12, 220), Amersfoort (69n), Houten (202m). NH: Amsterdam (12, 187k, 202m, 206f), Bloemendaal (227b), Zaandam (202m), Zaanstad (Westzaan, Wormerveer, Zaandam, Noordzeekanaal) (232b). ZH: Gouda (202m), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (71c), Stellendam (202m), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bergen op Zoom (202m), Boxmeer (202m), Boxtel (202m), Breda (12), Eindhoven (Gestel) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (12), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250c, 250d), Udenhout (De Brand) (182h), Wintelre (182t). LI: Brunssum (44), Jabeek (193b), Maastricht (12, 44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Rijckholt (44), Thorn (Koningssteen) (182m).

Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837)

- *Epiblemmum affinatum*; Van Hasselt 1886b: 92; 1890b: 203.
- *Epiblemmum zebraneum*; Van Hasselt 1890b: 192.
- *Salticus zebraneus*; Chrysanthus 1966: 156. Jacobs 1992: 133. Koomen 1994: xxxii; 2000: xxxviii. Wijnhoven 1997: 2. Noordijk et al. 2001: 23. Tutelaars 2001e (www). Koomen et al., 2004: 206. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 20. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 27; 2015a: 5.

OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x). GL: Apeldoorn (129), Hoog Soeren (129), Nijmegen (251), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: Venendaal (121). NH: Amsterdam (202m). ZH: Monster (121). ZE: Middelburg (202m). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Boxmeer (202m), Breda (202m), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230j), Sint Michielsgestel (215f), Valkenswaard (202m). LI: Heerlen (68), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a), Roerdalen (Herkenbosch (De Muitert)) (150s), Roermond (129), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n).

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

- Ballus aenescens*; Van Hasselt 1886b: 94.
- Bianor aenescens*; Van Helsdingen 1976: 33. Koomen 1993: xxxiii. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Heuts 2001: 10. Prinsen 2005: 112. Prinsen et al. 2006: 88.
- Bianor aurocinctus*; Heuts et al. 2009: 28.
- Sibianor aurocinctus*; Roelofs-Ditters 2007: 20. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Van Helsdingen et al. 2010: 18 (= *Sibianor larae*).

DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nijmegen (121), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). UT: Lage Vuursche (121). NH: Huizen (Gooise heide) (151u, 151z). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Valkenburg (121).

Sibianor larae Logunov, 2001

- Sibianor larae*; Vogels 2012: 254. IJland et al. 2013: 19.

DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (236a). GL: Renkum (Reijerscamp) (150o, 164o). NB: Heeze (Strabrechtse Heide) (236a).

Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846)

- Synageles hilarulus*; Van Helsdingen 1996b: 7; 1999a: 6. Spoek 1997a: 4. Spoek 1997b: 7. Roelofs-Ditters 2007: 20. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

FR: Fochtelöerveen (148a, 148e). DR: Emmen (Bargerveen: Meerstalblok) (148a, 225a, 225b), Emmen (Oosterbos) (225a), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f). LI: Bergen (Maasduinen) (215m).

Synageles venator (Lucas, 1836)

- Synageles venator*; Van Hasselt 1886b: 100. Chrysanthus 1951g: 100; 1953c: 113. Van Heerd et al. 1960: 236. Noordam 1996: 14. Ma et al. 1997: 76; 1998: 4. Koomen 2000: xxxviii. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler 2004: 7. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 23. Tutelaers 2017: 279. Van Helsdingen 2019b: 39.

NL: (49, 201q (duinen)). FR: Terschelling (137). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Oosterbeek (121). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Katwijk (121), Loosduinen (121), Scheveningen (121), Wassenaar (Meijendel) (201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Oirschot (De Mortelen) (230v). LI: Brunssum (44), Gronsveld (44), Obbicht - Grevenbicht (186c), Thorn (Koningssteen) (182m).

Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)

Euophrys aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)

- Euophrys aequipes*; Van Hasselt 1890b: 193. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii. Prinsen 2005: 113.
- Talavera aequipes*; Roelofs-Ditters 2007: 20. Tutelaers 2008: 29; 2017: 279. Noordijk et al. 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2009a: 7; 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

GL: Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202o), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). ZH: Loosduinen (129). NB: Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Kasteren (De Geelders) (230v). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Talavera aperta (Miller, 1971)

- Talavera aperta*; Vogels 2019: 25, 30.

LI: Maastricht (Pietersberg, bij Duivelsgrot) (236c).

Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837)

Euophrys petrensis (C.L. Koch, 1837)

- *Euophrys petrensis*; Chrysanthus 1951f: 77; 1951g: 100. Hulsebos 1962: 233. Noordijk 2006a: CD-rom (bijlage 7).
- *Talavera petrensis*; Tutelaers 2000: 14; 2001e (www); 2008: 29. Spoek 2005: 26. Noordijk 2005: 34. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. IJland 2009: 4. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Krediet, 2015b: 10.

FR: Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 2020), Apeldoorn (Nieuw-Millingschezand) (2020), Apeldoorn (Bremmert) (2020), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (2020), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a, 202b, 2020), Harderwijk (Beekhuizerzand) (2020), Hoge Veluwe (43). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p). LI: Eys (De Piepert) (183r), Geleen (43, 44), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

SCYTODIDAE

(*Scytodes fusca Walckenaer, 1837*)

Onjuiste vermelding: Van der Hammen 1949b: 374 (= *Scytodes venusta* (Thorell)).
Er bestaan geen andere vermeldingen uit ons land.

***Scytodes thoracica* (Latreille, 1802)**

- *Scytodes thoracica*; Six 1858b: 302. Snellen van Vollenhoven 1859: 67; 1868: 67. Becker 1879a: xlvi. Van Hasselt 1885c: 150. Pinkhof 1941: 224. De Jong 1942: 217. Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1962: 233. Van der Hammen 1969: 27. Peeters 1984b: 23. Meijer 1984: 26; 1986: 136. Vossen 1985c: 13. Koomen 1991: xviii. Roelofs-Ditters 2007: 18. Van 't Veer et al. 2012: 13. Colijn et al. 2017: 14.

NL: (224a, 224b). DR: Meppel (160c). OV: Haaksbergen (182d). GL: (119). UT: (7, 119, 220), Amersfoort (69n), Utrecht (in kas) (85). NH: (7, 119), Amsterdam (169a, 206f), Zaandstad (232b). ZH: (7, 119), Rotterdam (215f). LI: Echt (239e), Koningsbosch (239e), Maastricht (193b), Reuver (193a, 204b), Roermond (50).

[*Scytodes venusta* (Thorell, 1890)]

- *Scytodes fusca*; Van der Hammen 1949b: 374.

ZH: Leiden (import) (82).

SEGESTRIIIDAE

***Segestria bavarica* C. L. Koch, 1843**

- *Segestria bavarica*; Van Hasselt 1885c: 122. Becker 1896b: 312. Pelzers 1984: 248. Meijer 1985: 136. Van Helsdingen 1988a: 1; 1988b: 95; 1990a: 354; 1990b: 26; 2019b: 39. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www). Roelofs-Ditters 2007: 18. Noordijk et al. 2010: 5, 6. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Bloem et al. 2021: 38.

NL: (147q, r, s, kaart). FR: Vlieland (202t). DR: Meppel (202t). GL: Berg en Dal (119, 147q, 205a), Beuningen (202t), Hees (147q), Ubbergen (Duivelsberg) (147q, 205a), Wageningen (202t). UT: Amersfoort (69n). NH: Alkmaar (202t), Den Helder (202t), Texel Ecomare (202t). ZH: Goederede (147p, 147q), Hellevoetsluis (147p, 147q), Leerdam (202t), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (202t), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: (147q), Haamstede (147q), Kapelle (147q), Kloetinge (147q), Krabbendijke (147q), St. Rotterdam (Blijdorp) (16 l), NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (202t), Erp (147q), Geldrop (202t), Ginneken (119, 147q, 205a), Sint Michielsgestel

(215f), Veghel (215f). LI: Maastricht (13b, 119, 147q, 193b), Meijel (202t), Mook (St. Jansberg) (119, 147q, 205a), Neercanne (147q), Wanssum (202t).

Segestria florentina (Rossi, 1790)

- Segestria perfida*; Becker 1879a: xlvi. Van Hasselt 1885c: 122.
- Segestria florentina*; Van Helsdingen 1988a: 1; 1988b: 95; 1990a: 354; 1990b: 26; 2008b: 3; 2011b: 17; 2013: 20; 2019b: 39.. Bosmans 1991: 11. Decae 1993: 124. Heuts 2001: 10. Jacobusse 2001: 168. Roelofs-Ditters 2007: 18. Soonawala et al. 2009: A116.

NL: (147q, r, s, kaart; 224c (import)). NH: Amsterdam (149i, 151u), Hilversum (149i). ZH: Alphen aan den Rijn (149w), 's-Gravenhage (71a, 149i), Hazerswoude-Rijndijk (149i), Leiden (149w), Noordwijk (149t), Rotterdam (71a, 149i), Voorhout (149w), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1), Woubrugge (149i). ZE: (7, 165k), Walcheren (119, 147q), Zeeuws-Vlaanderen (17q), Aardenburg (147s), Haamstede (147p, 147q, 147s), Hoedekenskerke (147p, 147q), Hoek (215f), Hulst (147s), Kapelle (147p, 147q), Krabbendijke (147p, 147q, 147s), Nisse (147p, 147q), Renesse (147p, 147q, 147s), Retranchement (147s), Sas van Gent (147s), Sluis (147s), St. Annaland (147p), Westdorpe (147s), Yerseke (147p, 147q).

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

- Aranea senoculata*; Bennet & Olivier 1825: 474.
- Segestria senoculata*; Six 1858b: 302. Snellen van Vollenhoven 1859: 66; 1868: 66. Becker 1879a: xlv. Van Hasselt 1879b: xxiv; 1885c: 122; 1886c: 103. Van der Hammen 1949a: 75. Chrysanthus 1955c: 16. Van Damme et al. 1959: 36. Hulsebos 1961: 2. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1976: 37; 1988a: 1; 2019b: 39.. Koomen 1986: 202; 1994: xxxii; 2000: xxxviii. Koomen et al. 1993a: 572; 1995: xxix; 1996: xxiv; 1997: xxxvi; 1998: xxxiv; 2004: 206; 2005: 87. De Bruyn 1996: 45. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www); 2017: 277. Noordijk et al. 2001: 18. Prinsen 2002: 118. Kessler 2004: 7. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 18. IJland et al. 2010: 30. Van Helsdingen et al. 2013: 27. Colijn et al. 2017: 14.

NL: (15c, 224a, 224b). GR: Groningen (215f), Vlagtwedde (Ter Apel) (211g). FR: Terschelling (Formerum) (182v), Bolsward (122), Harlingen (202m), Oranjewoud (122). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Dwingeloo ? (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte ? (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Deventer (202m), Ommen (Lemelerberg) (182i), Saasveld (Molenven) ? (70d, 147a), Tubbergen (Manderheide) (182x), Zwolle (202m). GL: (119), Arnhem ? (181a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Harderwijk (202m), 's Heerenberg (202m), Oosterbeek (202m), Winterswijk (182g). UT: (7, 119, 200), Amersfoort (69n), Houten (202m), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (7, 119), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7, 119), Leiden (in kas) (81), Stellendam (202m), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (147p), Kapelle (147p), Middelburg (202m). NB: (7, 119), Bergen op Zoom (202m), Boxmeer (202m), Cranendonck (215f, 230e), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (182s¹), Valkenswaard (202m), Wintelre (182t). LI: Maasgouw (Linnerheide) (150s), Maastricht (202m), Mook (109), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond (55), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Weert (Tungelrooijse Wallen) (182m).

SICARIIDAE

[Loxosceles deserta Gertsch, 1973]

- Loxosceles deserta*; Noordijk et al. : 71.

FR: Leeuwarden (import) (202ai).

[Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)]

- Loxosceles rufescens*; Van der Hammen 1949b: 374.

ZH: Leiden (import) (82).

SPARASSIDAE

[*Barylestis variatus* (Pocock, 1900)]

□ *Barylestis variatus*; Van Helsdingen 2019a: 43.

ZH: Katwijk (veilng Rijnsburg, import) (150v).

[*Eusparassus dufouri* Simon, 1932]

□ *Eusparassus dufouri*; Noordijk et al. 2017: 58.

GL: Arnhem (in huis; import) (202x), Rekken (import) (202x).

[*Eusparassus walckenaeri* (Audouin, 1826)]

□ *Eusparassus walckenaeri*; Van Helsdingen 2015: 33.

ZH: Ridderkerk (import) (149x).

[*Heteropoda venatoria* (Linnaeus, 1767)]

□ *Heteropoda venatoria*; Van der Hammen 1949b: 374. Van Rossum et al. 1957: 63. Noordijk et al. 2017: 58.

NL: (import) (149x, 217a). FR: Bolsward (import) (82). ZH: Rotterdam (import) (82).

[*Micrommata ligurina* (Clerck, 1757)]

□ *Micrommata ligurina*; Noordijk et al. 2017: 58, 60.

ZH: Katwijk aan Zee (import) (202x).

***Micrommata virescens* (Clerck, 1757)**

□ *Sparassus virescens*; Six 1858b: 300. Van Hasselt 1872b: xxxiii; 1879b: xxiv; 1883a: xxxiii.
□ *Sparassus ornatus*; Six 1858c: 21; 1863: 128.
□ *Sparassus smaragdinus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 63; 1868: 63.
□ *Micrommata virescens*; Van Hasselt 1886b: 76; 1888: xxix; 1890b: 210. Becker 1879a: xli; 1882: 157.
Van Helsdingen et al. 2012: 27.
□ *Micrommata ornata*; Van Hasselt 1886b: 77; 1890b: 195. Becker 1879a: xli; 1882: 159.
□ *Micrommata roseum*; Chrysanthus 1953d: 88; 1956: 139. Van Helsdingen 1980: 103. Vossen 1985b: 6;
1985c: 215.

NL: (60, 224a, 224b). GL: (7, 121), Apeldoorn (129), Arnhem (112). UT: (7, 12, 121), Amersfoort (121, 221), Driebergen (220), Utrecht (12), Zeist (121, 222b). NB: Breda (96). LI: (121), Maastricht (12), Mook (109), Oud-Valkenburg (Gerendal) (147e), Valkenburg (125), Vlodrop (Meinweg) (50, 150r, 239d, 239f), Wahlwiller (50).

[*Nolavia spec.*]

□ *Nolavia spec.*; Noordijk 2018: 195.

ZH: Hellevoetsluis (import) (202g).

[*Olios argelasius* (Walckenaer, 1806)]

□ *Olios argelasius*; Noordijk et al. 2017: 58, 60. Van Helsdingen 2020: 22.

GL: Oldebroek (import) (202x, 150w3). UT: Doorn (import) (202x, 150w3). NH: Huizen (import) (150w3).

ZH: 's-Gravenhage (150w3), Leiden (import) (150w3), Rijnsburg (import) (150w3), Sliedrecht (import) (202x, 150w3). NB: Eindhoven (150w3), Tilburg (150w3, 150w4).

[*Tychicus longipes* (Walckenaer, 1837)]

- Olios longipes*; Van Hasselt 1872c: lxii.
- Tychicus longipes*; Noordijk et al. 2017: 58.

ZH: Leiden (import) (97).

TETRAGNATHIDA

Meta menardi (Latreille, 1804)

- Meta menardi*; Maurissen 1882: cxx. Van Hasselt 1886b: 52; 1898: 62. Schmitz 1938: 287. Van der Hammen 1950: 111. Chrysanthus 1958b: 144.

LI: Maastricht (136, 192c), Sint Pietersberg (83, 121, 218a), Rijckholt (83), Gronsveld (64). Alle opgaven betreffen vondsten in grotten.

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

Meta mengei (Blackwall, 1869)

- Meta segmentata mengei*; Becker 1879a: xlivi. Van Damme et al. 1959: 48. Klomp et al. 1973: 330.
- Meta mengei*; Van Hasselt 1886b: 52; 1890b: 195. Chrysanthus 1951g: 99; 1955d: 59. Hulsebos 1959: 254. Meijer 1973b: 28; 1974: 172; 1976a: 7. Van Helssingen 1976: 39; 1984: 2; 1987: 187. Vossen 1983: 236. Meijer 1985: 136. Koomen 1990: xv; 1991: xix; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1996: 218. Siepel et al. 1996: 51, 53. Simon Thomas et al. 2000: 6. Noordam 2024: 24.
- Metellina mengei*; Bosmans 1988: 32. Poot et al. 1989: 7. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxxvii; 1998a: xxxv; 2000: xxxviii; 2001: xxxix; 2004: 207; 2005: 88. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Van Helssingen 1999a: 6; 1999b: 10; 2019b: 39. Tutelaars 2000: 15; 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Faber et al. 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 15. Prinsen 2002: 119; 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22. IJland 2009: 4. Van Helssingen et al. 2009b: 17; 2013: 27; 2015a: 5. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Koomen 2010: 210; 2015: 159. IJland et al. 2011: 22. Franken et al. 2016: 177; 2018: 46. Vogels 2019: 28, 29. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 121). GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg (183a), Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum, Hoorn, Hoornse Bos, Koegelwieck, Kroonpolders, Oosterend) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Wijster (IJsbaan) (211k). OV: Haaksbergen (182d), Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Eerde) (182i), Saasveld (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Ginkelse Zandbos) (75w1), (182u), Millingen aan de Rijn (Millingerwaard) (236c), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Almere (218b), Dronten (Harderbos) (182m), Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Voorschoten (56), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c), Westerschouwen (182c). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Goirle (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v, 236c), Udenhout (De Brand) (182h), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Veldhoven (Halfmijl) (236c), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44), Cottessen (182e), Echt (in grot) (239b), Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Margraten (Schiepersberg) (210b), Rijckholt (193b), Roerdalen (Holst, Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Vaals (182e).

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

Meta merianae (Scopoli, 1763)

- *Meta merianae*; Six 1858b: 293. Becker 1879a: xlivi; 1896a: 59. Van Hasselt 1879b: xxiv; 1882: xxvii; 1886b: 52; 1886c: 103. Van der Hammen 1950: 111. Chrysanthus 1951g: 99. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3; 1990: 155. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2; 2002b: 11. Vossen 1983: 236. Koomen 1990: xv; 1992: xxvii.
- *Metellina merianae*; Poot et al. 1989: 7. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv. Noordam 1996: 9. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2017: 278. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2013: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Van Helsdingen 2019b: 39. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160g), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Utrecht (13a, 220). NH: (7), Amsterdam (13a), Kortenhoefse Plassen (147j). ZH: (7), Ackerdijkse Plassen (148j), 's-Gravenhage (13a), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c). NB: Best (De Scheeken) (230v), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), 's-Hertogenbosch (Binnendieze-Hellegrat) (215f), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: (7), Brunssum (44), Echt (in grot) (239b), Geulhem (in grot) (83), Heerderberg (in grot) (83), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (13a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Mook (109), Neercanne (in grot) (83), Roerdalen (Hoosden) (150s), Sible (in grot) (83), Vaals (182e), Valkenburg (111).

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

Meta segmentata (Clerck, 1757)

- *Aranea reticulata*; Bennet et al. 1825: 470.
- *Zilla reticulata*; Six 1858b: 293. Snellen van Vollenhoven 1859: 51; 1868: 51. Van Hasselt 1870b: 30.
- *Meta segmentata*; Van Hasselt 1886b: 51; 1886c: 103. Becker 1879a: xlivi; 1896a: 58. Bouwman 1935: 80, 83. Van der Hammen 1949a: 80; 1950: 112. Chrysanthus 1951g: 99. Kleinhout 1958: 181. Van Damme et al. 1959: 49. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Klomp et al. 1973: 337. Meijer 1974: 172. Van Helsdingen 1976: 39; 1981a: 38. Fokkema 1978: 100. Vermeulen et al. 1980: 155. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1991: xix; 1998b: 225. Kessler 1993: 6. Berg 1997: 162.
- *Meta reticulata*; Pinkhof 1924: 95; 1941: 226. Van der Drift 1951: 120.
- *Metellina segmentata*; Poot et al. 1989: 7. Koomen et al. 1996: xxv. De Bruyn 1996: 49. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Van Helsdingen 1999b: 10; 2002b: 11; 2019b: 39. Tutelaers 2000: 20; 2001d (www); 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Kessler-Geschiere 2001: 15. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 114. Prinsen et al. 2006: 88. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2008: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30. Noordijk et al. 2011: 18. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al. 2017: 14. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 13a, 15c, 22, 121, 224a, 224b). GR: Vlagtwedde (Weende) (211g). FR: Schiermonnikoog (160a, 174d, 232 m), Bolsward (122), Ooststellingwerf (75n), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Emmen (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Havelte (160b), Havelte (Havelterberg) (230i), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), De Wijk (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zwartemeer (160b). OV: Haaksbergen (182d), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Steenwijk (De Eese) (197). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72, 178), Molencate (91), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m), Wekerom (16b). UT: Amersfoort (69n), Driebergen (220), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (220). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (206c, 206f; in kas, 81), Zaandstad (Euverenweg, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Delft (in kas) (81), Leiden (in kas) (81), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 215f, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182j). LI:

Helenaveen (Mariapeel) (147f), Maastricht (44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Reuver (193b), Rijckholt (44), Sint Pietersberg (in grot) (83), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

□ *Pachygnatha clercki*; Six 1858b: 296. Van Hasselt 1877: xxvii; 1885c: 178. Becker 1879a: xlivi; 1896a: 69. Kluyver 1933: 136. Van der Hammen 1950: 111. Chrysanthus 1951g: 99; 1955d: 56. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3; 1989: 23; 1990: 155. Van Heerdt et al. 1960: 235; 1967: 111. Kessler-Geschiere 1972: 157; 2001: 15. Meijer 1973a: 179; 1973b: 28; 1974: 172; 1977: 84, 85; 1980a: 229; 1980b: 20. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2; 1997a: 116; 1999a: 6; 1999b: 10; 2002a: 10, 11; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 39.. Van Wingerden 1977: 110. Fokkema 1978: 100; 1981: 807. Buizer 1982: 73. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii; 1996: 174, 218; 1998b: 225; 2000: xxxviii. Poot et al. 1989: 8. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133. Noordam 1996: 7. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. De Bruyn 1996: 47. Koomen et al. 1997: xxxvii; 2004: 207. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2006: 17; 2009c (www); 2017: 278. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Kessler 2004: 7. Bonte 2006: 15. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 23; 2009b: 17; 2010: 18; 2012: 27. Lambeets 2008: 13. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 15. Lambregts et al. 2013: 17. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

NL: (13a, 119), (202s: wegbermen). GR: Lauwerszeepolder (195, 198b, 198e, 198f). FR: (75s), Lauwersmeer (198u), Ameland (196), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (160a, 174h, 180b, 254a), Terschelling (137, 138), idem (Hoorn, Kroonpolders, Oosterend) (182v), Fochteloeरveen (148e), Ooststellingwerf (75n). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Anloo/Andersen/Elsbroek (Scheebroekerloop) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160b, 160f, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Lievinge (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (181b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT:(7), De Bilt (220), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (175c), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (euverenweg, Guisveld, Westzijderveld, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Rotterdam (25s), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: (7), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Moergestel (Helsbroek) (215f), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Woensdrecht (107). LI: Berg aan de Maas - Nattenhoven (186c), Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (44), Cottessen (182e), Geleen (44), Heerlen (202c), Heerderberg (in grot) (83), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maasband (186c), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Scharnderberg (in grot) (83), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Sint Pietersberg (in grot) (83), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Valkenburg (in grot) (83), Wahlwiller (56).

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

□ *Pachygnatha degeeri*; Six 1858b: 296. Van Hasselt 1873a: xxvi; 1885c: 178. Becker 1879a: xlivi; 1896a: 66. Heselhaus 1915: 273. Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1951g: 99. Van Damme et al. 1959: 48. Hulsebos 1961: 3; 1989: 23. Kessler-Geschiere 1965: 159; 1972: 157; 2001: 15. Van Heerdt et al. 1967: 111. Meijer 1973b: 28; 1974: 172. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1976: 39; 1997a: 116;

2002a: 10,11; 2003d: 22; 2019b: 39. Van Wingerden 1977: 105. Tutelaers 1978: 88. Fokkema 1978: 100; 1981: 807. Buizer 1982: 73. Kessler et al. 1984: 262. Koomen 1986: 202; 1990: xv; 1998a: xxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2015: 159. Poot et al. 1989: 8. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Jacobs 1992: 133; 1993: xxxiii. Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxxvii; 2001: xxxix; 2004: 207; 2005: 88. Siepel et al. 1996: 48, 51, 53. De Bruyn 1996: 47. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Ma et al. 1997: 76. Noordam et al. 1998: 344. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2006: 17. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Prinsen 2005: 114. Spoek 2005: 26. Bonte 2006: 10, 15. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2009a: 7; 2010: 18; 2013: 27. Lambeets 2008: 13. Prinsen et al. 2009: 192. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30. Van 't Veer et al. 2012: 15. Lambregts et al. 2013: 17. Van Klink 2015: 195. Krediet, 2015b: 10. Franken et al. 2016: 177. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (13a, 119), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Ameland (196), Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (174h, 175a, 180b, 210a, 254a), Terschelling (75s, 138), idem (Oosterend, Seeryp) (182v), Ooststellingwerf (75n). DR: Dwingeloo (160b, 160f), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Lievinge (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Ommen (Archem, Eerde) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen (Mander, Mosbeek) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Ede (Ginkelse Zand) (75w1), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (181b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Almere (218b). UT: (7), Amersfoort (69n), De Bilt (220), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (220). NH: duinen (AW; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (175c), Egmond (182w), Velsen (100), Texel (Westerduinen) (182y), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Texel (Mokbaai) (182y), Zaandstad (Guisveld, Westzijderveld, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Rotterdam (25s), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). Haamstede (182c). NB: (7), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Breda (119), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Brunssum (44), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Illikhoven (Visserweert) (186c), Maastricht (44), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Holst) (150s), Roosteren (Schansberg) (186c), Sint Pietersberg (44), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Pachynotata listeri Sundevall, 1830

□ *Pachynotata listeri*; Six 1858b: 296. Becker 1879a: xlivi; 1896a: 67. Van Hasselt 1885c: 178. Chrysanthus 1953d: 88. Van Damme et al. 1959: 48. Hulsebos 1962: 234; 1989: 23. Kessler-Geschiere 1972: 157; 2001: 15. Van Helsdingen 1976: 39; 1999a: 6; 2019b: 39. Fokkema 1981: 807. Buizer 1982: 73. Bosmans 1988: 32. Koomen 1994: xxxiii; 1998a: xxv. Koomen et al. 1996: xxv; 2004: 207. De Bruyn 1996: 49. Prinsen 2005: 114. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Tutelaers 2017: 278. Vogels et al. 2023: 6. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

NL: (13a, 119). FR: Bakkeveen (75s), Fochteloevréen (148e). DR: Dwingeloo (160c, 160f). OV: Ommen (Eerde) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Tubbergen (Hezingen, Paardenslenkte) (182x). GL: Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7), Utrecht (220), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Amsterdam (175c). ZH: Rotterdam (25s), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7), Diessen-Haghorst (Den Opslag) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg

(Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Bunde (50), Obbicht (50), Wahlwiller (50), Watersley (50).

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873

□ *Tetragnatha dearmata*; Van Hasselt 1886b: 53; 1889b: xxviii; 1890b: 202. Chrysanthus 1950b: 145. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Tutelaers 2006: 15, 17.

NL: (35). GL: Hoog Soeren (127, 129). UT: De Bilt (121). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep-Prikven) (215f). LI: Roermond (129), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

□ *Aranea extensa*; Bennet et al. 1825: 473.

□ *Tetragnatha extensa*; Six 1858b: 293. Snellen van Vollenhoven 1859: 52; 1868: 52. Van Hasselt 1877: xxvi; 1879b: xxiv; 1886b: 53; 1886c: 103. Becker 1879a: xlili; 1896a: 63. Pinkhof 1941: 228. Chrysanthus 1950b: 145; 1958b: 144. Van Heerdet et al. 1960: 235. Hulsebos 1962: 234. Meijer 1974: 172. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2; 1999a: 6; 1999b: 10; 2002a: 11; 2003d: 22; 2019b: 39. Buizer 1982: 73. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1990: xv; 1991: xix; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1996: 174, 218; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2010: 210; 2015: 159. Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxxvii; 2004: 207; 2005: 88. Spoek 1997b: 8; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Prinsen 2002: 119; 2005: 114; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 27, 29; 2013: 27; 2015a: 6. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Noordijk et al. 2011: 18. Van 't Veer et al. 2012: 15. Franken et al. 2016: 177. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 278. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Wielink et al. 2020: 342.

Tetragnatha gibba; Van Hasselt 1871: 46.

Pachygnatha extensa; Simon Thomas et al. 2000: 6.

NL: (7, 13a, 15c, 121, 224a, 224b). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Terschelling (137), idem (Formerum) (182v), Bolsward (122), Fochtelooërveen (148e), Oranjewoud (122). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Meppel (160c), Osdijk/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord, Doldersummerveld, Vledder Aa) (183a), Wijster (Ijsbaan) (211k). OV: Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst (Bronckhorster Waarden) (211n), Ede (De Ginkel, Hindenkamp) (75w1), Ede (Ginkel Zand) (75w1), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148i, 148n). FL: Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: (220), Amersfoort (69n), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Amsterdam (206f), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Rotterdam (25s), Wassenaar (94), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c), Walcheren (107), Westerschouwen (182c). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Best (De Scheeken) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Cottessen (182e), Heerlen (64), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Mook (109), Ospel (Grote Peel) (147a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Thorn (Koningssteen) (182m), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Tetragnatha montana Simon, 1874

□ *Tetragnatha montana*; Van der Hammen 1949a: 80. Chrysanthus 1950b: 145; 1955c: 16. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Meijer 1973a: 179; 1974: 172. Van Helsdingen 1984: 2; 1999b: 10; 2002b: 11; 2003d: 22; 2019b: 39. Meijer 1985: 136. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1990: xv;

1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1996: 174, 218; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2010: 210. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2004: 207; 2005: 88. De Bruyn 1996: 50. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2001e (www); 2006: 17; 2017: 278. Kessler 2004: 7. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 27, 29; 2013: 27; 2015a: 6. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Belgers 2011: 11. Van 't Veer et al. 2012: 15. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwerszeepolder (195). FR: Schiermonnikoog (160a). DR: Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Ruinerwold (160b), Westerbork (182f), Wijster (IJsbaan) (211k). OV: Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Eerde) (182i), Steenwijk (De Eese) (197), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (15a), Utrecht (Amelisweerd) (201v). FL: Dronten (Harderbos) (182m), Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p, 182m), Zeewolde (Harderbroek) (182m). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Schiedam (in kas) (81), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230j), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Sprang-Capelle (Labbegat) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Cottessen (182e), Kerkrade (55), Rijckholt (193b), Roerdalen (Hoosden, Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Vaals (182e), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886

□ *Tetragnatha nigrita*; Chrysanthus 1950b: 145; 1954b: 40. Hulsebos 1959: 254. Van Helsdingen 1984: 2; 1999b: 10. Koomen 1993: xxxiii; 1996: 174, 218; 1998b: 225; 2010: 210; 2015: 159. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler 2004: 7. Koomen et al., 2004: 207. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van 't Veer et al. 2012: 15.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Schiermonnikoog (160a). DR: Ruinen (182f). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (182m). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Voorschoten (35). NB: Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Arcen (52).

Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837

□ *Tetragnatha obtusa*; Van Hasselt 1886b: 53. Chrysanthus 1950b: 145; 1957b: 31. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2. Koomen 1993: xxxiii; 2000: xxxviii; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxvii. Spoek 1997b: 8. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2003: 6; 2017: 278. Prinsen 2002: 119. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 27; 2013: 27. Van 't Veer et al. 2012: 15. Vogels 2019: 29. Noordijk 2022: 51.

GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Terschelling (Formerum) (182v), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Arnhem (181a), Nunspeet (182u). NH: Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg) (232b). NB: Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e, 230k), Best (De Scheeken) (230v), Sint Michielsgestel (Halse Barrier) (215f), Tilburg (Kaaistoep) (202af). LI: Heerlen (62),

Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m).

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

□ *Tetragnatha pinicola*; Chrysanthus 1950b: 145; 1957b: 31. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Tutelaers 2017: 278. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f). GL: Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Winterswijk (182g). NH: Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). NB: Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Grevenbicht (62), Heerlen (62), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939)

□ *Tetragnatha reimoseri*; Tutelaers 2001b: 6.

LI: Kempen-Broek (NL?) (230g).

Tetragnatha striata L. Koch, 1862

□ *Tetragnatha striata*; Van Hasselt 1886b: 53; 1890b: 210; 1898: 54. Chrysanthus 1950b: 145. Van Helsdingen 1996a: 3; 2002b: 11; 2019b: 39. Faber et al. 2001: 46. Van 't Veer et al. 2012: 15.

OV: Weerribben (147z), De Wieden (147z). GL: uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b). UT: Botshol (147z), Molenpolder (147z), Noord-Maarsseveense Plass (147z). NH: Ankeveense Plassen (147z), Kortenhoefse Plassen (147z), Naardermeer (147z), Wormer- en Jisperveld (147z), Zaanstad (Guisveld) (232b). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Delft (121), Hillegersberg (129), Nieuwkoopse Plassen (147z), Reeuwijkse Plassen (147z), Stompwijk (121), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).. NB: Oisterwijk (136).

THERAPHOSIDAE

Euathlus truculentus L. Koch, 1875

□ *Euathlus truculentus*; Noordijk et al. 2003: 27.

GL: Arnhem (import) (202ag).

THERIDIIDAE

Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)

Selimus vittatus (C.L. Koch, 1836), *Seycellocesa vittata* (C.L. Koch, 1836)

□ *Theridium vittatum*; Six 1858b: 294. Van Hasselt 1870b: 30; 1873a: xxvi; 1877: xxvi. Hulsebos 1961: 3.
□ *Theridion vittatum*; Becker 1879a: liv. Chrysanthus 1955c: 16. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1974: 172; 1976a: 7. Tutelaers 2006: 16.
□ *Anelosimus vittatus*; Van Helsdingen 1984: 2; 1987: 187; 1999b: 9; 2019b: 39. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1990: xv; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1996: 174, 218; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 2000: xxxviii; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2001: xxxix; 2004: 207; 2005: 87. Spoek 1997b: 7; 1999: 3. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2017: 277. Noordijk et al. 2001: 24. Prinsen 2002: 119; 2005: 113; 2007: 141. Kessler 2004: 7. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2015a: 6. Franken et al. 2018: 47. Vogels 2019: 28. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.
□ *Theridium pulchellum*; Van Hasselt 1876b: lii.
□ *Theridion pulchellum*; Van Hasselt 1885c: 155. Becker 1896a: 104.
□ *Seycellocesa vittata*; Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2010: 18; 2013: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Koomen 2010: 211. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 15. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 119). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Anloo (Schipborg, Kniphorstbos) (211k), Dwingeloo (160b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerveld (Vledder Aa, Wapserveld) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Eerde) (182i, 202m), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Millingen aan de Rijn (Millingerwaard) (236c), Molencate (91), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Tiel (202m), Winterswijk (182g). FL: Dronten (Harderbos) (182m), Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Lelystad (202m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Winkelse Zand) (182m). UT: Driebergen (220). NH: Amsterdam (202m), Bergen (202m), Egmond (182w), Egmond (Wimmenum) (75w2), Enkhuizen (202m), Hilversum (103), Hippolytushoef (202m), Kortenhoefse Plassen (147j), Velzen (100), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaandam (202m, 232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c), Walcheren (107). NB: Bergen op Zoom (202m), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Casteren (Goorloop) (182t), Chaam (Chaamse Bossen) (215f), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Wintelre (182t). LI: Gulpen (Waterop) (147o), Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Kerkrade (55), Maastricht (13a), Roerdalen (Hoosden, Herkenbosch (De Muitert), Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Asagena phalerata (Panzer, 1801)

Steatoda phalerata (Panzer, 1801)

- *Asagena serratipes*; Six 1858b: 296. Van Hasselt 1876b: lii; 1879b: xxv.
- *Asagena phalerata*; Van Hasselt 1885c: 159; 1886c: 106; 1890b: 208. Becker 1879a: xliv. Van der Vecht 1926: 117. Chrysanthus 1958b: 143. Hulsebos 1962: 234. Meijer 1976a: 7. Tutelaars 1978: 88. Koomen 1993: xxxiii; 1998a: xxxv; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv. Noordam 1996: 16. Lambregts et al. 2013: 16. Van Helsdingen 2019b: 39; 2019c: 47. Fleurbuur 2024: 6.
- *Steatoda phalerata*; Tutelaars 2000: 15; 2001e (www). Prinsen 2002: 119; 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88. Bonte et al. 2003a: 22; 2003b: 911. Spoek 2005: 26. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 22. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008: 33; 2010: 745. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2010: 18. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (202s: wegbermen). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: (7), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Ermelo (Speulderveld) (150w2), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nijmegen (119), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: (7), Amersfoort (119), De Bilt (119, 220), Bilthoven (232), Driebergen (119, 220). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17c), Hilversum (103). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (119, 129), Scheveningen (119), Wassenaar (119), Wassenaar (Meijendel) (201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Heeze (Heezerven) (230d), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Colmond (64), Heel (64), Meers (Weerterhof) (186a), Mook (109), Maastricht (122).

[Coleosoma floridanum Banks, 1900]

□ *Coleosoma floridana*; Van Helsdingen 1995b: 4. Bloem et al. 2021: 38.

ZH: Honselersdijk (147x), Rotterdam (Blijdorp) (16 l).

Crustulina guttata (Wider, 1834)

- *Theridium guttatum*; Six 1863: 125. Van Hasselt 1879b: xxv.
- *Steatoda guttata*; Becker 1879a: xliv. Van Hasselt 1885c: 158; 1890b: 198; 1898: 52, 70.
- *Crustulina guttata*; Becker 1896a: 114. Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 47. Hulsebos 1962: 234. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2001: xxxix. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Van Helsdingen 1999a: 6; 2019b: 4. Tutelaers 2000: 14; 2001e ([www](#)); 2009c ([www](#)). Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 25; 2003b: 910. Prinsen 2005: 113. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2010: 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Koomen 2015: 159. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Van Damme et al. 1959: 47 (= *Cnephalocotes obscurus* (Blackwall)) (zie 142).

GR: Lauwersmeer (198u). FR: Fochteloëveen (148e). DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Saasveld (Molenven) (70d). GL: (7), Arnhem (136), Barneveld (Kootwijkzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o). UT: (7), Amersfoort (119), Doorn (129, 136), Driebergen (119, 222b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Zeist (119). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Schoorl (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Mook (109), Roermond (13a, 129), Schinveld (Breukberg) (164n), St. Jansberg (119), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerlooi (62).

Crustulina sticta (O.P.-Cambridge, 1861)

- *Crustulina sticta*; Noordam 1998: 287. Tutelaers 2009c ([www](#)).

NB: Eindhoven (201p), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s).

[Cryptachaea blatta (Urquhart, 1886)]

- *Cryptachaea blatta*; Bink 2014a: 11.

ZH: Sliedrecht (ingevoerd) (16f).

Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)

Achaearanea riparia (Blackwall, 1834)

- *Ero saxatilis*; Six 1858b: 293. Van Hasselt 1872b: xxxiii; 1882: xxvii.
- *Theridion saxatile*; Van Hasselt 1883a: xxxii. Becker 1879a: xliv.
- *Theridion riparium*; Van Hasselt 1885c: 153; 1888: xxviii; 1892: xxix; 1898: 60, 71, 74. Becker 1896a: 94.
- *Theridium saxatile*; Snellen van Vollenhoven 1859: 52; 1868: 52. Hulsebos 1962: 234.
- *Theridium riparium*; Schmitz 1915: 167.
- *Achaearanea riparia*; Spoek 2005: 26. Roelofs-Ditters 2007: 22.

NL: (136, 217z: in mierennesten; 224a, 224b). DR: Dwingeloo (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: De Lutte (131). GL: (7, 119), Wageningen (112). UT: (7, 119, 220), Utrecht (13a). ZH: (119). NB: (7, 119), Breda (96), Sint Michielsgestel (215f). LI: (119), Maastricht (13a), Valkenburg (111, 125).

Dipoena erythropus (Simon, 1881)

- *Lasaeola erythropus*; Van Hasselt 1885c: 159.

DR: (119).

Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)

- *Dipoena melanogaster*; Van Hasselt 1885c: 157; 1898: 52. Hulsebos 1964a: 94. Peeters 1985: 51. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 27; 2015a: 6. Koomen 2015: 159. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 277. Wielink et al. 2020: 342.
- *Atea melanogaster*; Van Hasselt 1894: xl. Vogels 2019: 29.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a). DR: Dwingeloo (Leggelderveld) (160d). GL: Apeldoorn (134, 136), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Lochem (136), Zutphen (Warnsveld) (211n). UT: Amersfoort (69n). ZH: 's-Gravenhage (Scheveningse Bosjes) (119). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Beesel (204c), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Reuver (204c), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schinveld (Breukberg) (164n).

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876)

- *Enoplognatha caricis*; Van Helsdingen 1996a: 3; 1996b: 7. Tutelaers 2006: 14, 16.

OV: Weerribben (147z, 148a), De Wieden (147z, 148a). UT: Molenpolder (147z, 148a), Noord-Maarsseveense Plas (147z, 148a). NH: Kortenhoefse Plassen (147z, 148a). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n).

Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859)

- *Enoplognatha diversa*; IJland 2023: 22.

ZH: Leiden (164g).

Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982

- *Enoplognatha latimana*; Meijer et al. 1985: 240. Koomen 1986: 202; 1996: 174, 218; 1998b: 225. Janssen 1986: 10. Siepel et al. 1996: 46, 52, 53. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Van Helsdingen 1999b: 9. Prinsen 2005: 113. Tutelaers 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 22. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 20. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Wielink et al. 2020: 342.
- *Theridion ovatum*; Chrysanthus 1951g: 98.
- *Enoplognatha thoracica*; Chrysanthus 1958b: 143.

GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). FL: Almere (218b). NH: Zwanenwater (148f). NB: Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: Beesel (Bussereind) (193s), Belfeld (193s), Bemelerberg (193s), Brunssum (44, 193s), Heerlen (64), Maastricht (166a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Sint-Pietersberg (193s).

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)

- *Zilla mordax* Thorell 1875a: 82 (spec. nov., ♂); 1875b: 15. Van Hasselt 1886b: 56.
- *Enoplognatha maritima*; Chrysanthus 1957a: 44. Van Hasselt et al. 1967: 112. Meijer 1973a: 179; 1980a: 229.
- *Enoplognatha schaufussi*; Meijer 1977: 85.
- *Enoplognatha mordax*; Van Helsdingen 1978a: 192; 1984: 2. Ma et al. 1997: 76. Koomen 2000: xxxviii. Koomen et al. 2005: 87. Faber et al. 1999: bijlage 2. Lambeets 2008: 14. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Colen et al. 2022: 141.

NL: (228, 229). GR: Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b), Terschelling (61, 138). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2). UT: langs Kromme Rijn (121, 147b). NH:

Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (De Cocksdrorp, De Slufter) (182y). ZE: Cadzand (Zwinuitbreidung) (231b). LI: Maasband (186c), Nederweert (De Banen) (182m).

Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875)

Enoplognatha oelandica; De Koninck 2009: 5.

NB: Hoogerheide (Groote Meer) (70e).

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

- Theridium redimitum*; Six 1858b: 294. Snellen van Vollenhoven 1859: 53; 1868: 53. Van Hasselt 1877: xxvi. Pinkhof 1941: 230.
- Theridion redimitum*; Van Hasselt 1870b; 30. Van der Hammen 1947c: 480.
- Theridion venustum*; Van Hasselt 1885c: 157; 1890b: 194.
- Phyllonethis lineata*; Van Hasselt 1885c: 157; 1886c: 103.
- Theridium lepidum*; Thorell 1875b: 53.
- Theridion lineatum*; Becker 1879a: xliv; 1896a: 84.
- Theridium lineatum*; Van der Vecht 1926: 118.
- Theridion ovatum*; Van der Hammen 1950: 110. Van Heerd et al. 1960: 236. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Fokkema 1978: 100.
- Theridion ovatum* var. *redimitum*; Hulsebos 1959: 254; 1961: 3.
- Theridion ovatum* var. *lineatum*; Hulsebos 1959: 254.
- Enoplognatha ovata*; Meijer 1976a: 7; 1985: 136. Van Helsdingen 1984: 2; 1999b: 9; 2019b: 40; 2019c: 47. Meijer et al. 1985: 240. Koomen 1986: 202; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998b: 225; 2000: xxxviii; 2010: 211. Poot et al. 1989: 8. Koomen et al. 1995: xxx; 2001: xxxix; 2004: 207; 2005: 87. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Prinsen 2002: 119; 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Bonte et al. 2003a: 25. Bonte 2006: 15. Tutelaers 2006: 16; 2017: 277. Roelofs-Ditters 2007: 22. Noordijk et al. 2009c: 23; 2011: 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 28, 29; 2013: 27. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al. 2017: 14. Bink 2019: 7. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1951g: 98 (*Theridion* o., = *Enoplognatha latimana*) (zie 193s).

NL: (119, 224a, 224b, 229). GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen, Sellingen, Ter Apel, Weende) (211g). FR: Schiermonnikoog (160a), Terschelling (137), Bolsward (122), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (75n), Oranjewoud (122). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Havelte (160b), Klazienaveen (160b), Meppel (160b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Zwartemeer (160b). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Bronckhorst/Vorden (Kasteel Hackfort) (211n), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Molencate (91), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfeze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Luttelgeest (Luttelgeest (Kuinderbos)) (182m). UT: (7, 119, 220), Amersfoort (69n), Bilthoven (232). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amsterdam (206f), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, De Zandkuil) (182y), Zaandam (Euverenweg, Zaandam) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: Barendrecht (import) (16 i), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Walcheren ? (107). NB: Best (De Scheeken) (230v), Casteren (Goorloop) (182t), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Bemelerberg (193s), Eijsden (44), Geulhem (in grot) (80, 83), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (13a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (193b), Roerdalen (Holst) (150s), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m).

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

Steatoda thoracica; Becker 1879a: xliv.

- *Drepanodus albipunctatus*; Van Hasselt 1885c: 160.
- *Drepanodus obscurus*; Van Hasselt 1885c: 161.
- *Neriene albipunctata*; Van Hasselt 1890b: 198.
- *Enoplognatha thoracica*; Van Damme et al. 1959: 48. Hulsebos 1961: 3. Van Helsdingen 1976: 39; 2019b: 40. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www). Koomen 1986: 202; 1992: xxvii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1999: xxxv; 2000: xxxviii. Poot et al. 1989: 8. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Versteegen et al. 1992: 73, 75. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxxvii. De Bruyn 1996: 46. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 7; 2005: 26. Noordam et al. 1998: 344. Bonte et al. 2003a: 21, 25. Prinsen 2005: 113. Bonte 2006: 15. Noordijk 2006b: 21; 2008: 33. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2009a: 7; 2010: 18; 2012: 28. Tutelaers 2008: 27. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Noordijk et al. 2010: 745. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 16. Krediet, 2015b: 10. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Wielink et al. 2020: 342.

Onjuiste vermelding: Chrysanthus 1958b: 143 (= *Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala).

NL: (232w: heide hogere gronden), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Terschelling (Huneplak, Oosterend) (182v). DR: Assen (119), Dwingeloo (160b), Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (119), Wekerom (16b), Winterswijk (182g). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (7). ZH: (7), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Scheveningen (119), Wassenaar (119), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7, 119), Bladel (187a), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f), 250d, Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Margraten (Schiepersberg) (210b), Meers (Weerterhof) (186a), Roermond (129), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

- *Episinus angulatus*; Chrysanthus et al. 1959: 183. Van Damme et al. 1959: 47. Meijer 1973b: 28; 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 40. Bosmans 1988: 32. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii. Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxxvii; 2001: xxxix. Noordam 1998: 5. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 113. Tutelaers 2006: 16; 2009c (www); 2017: 277. Roelofs-Ditters 2007: 22. Prinsen et al. 2009: 192. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 28; 2013: 27. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (201q (duinen)). FR: Ameland (196), Terschelling (Formerum, Hoorn) (182v), Fochteloërvéen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Dwingelo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: Egmond (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhoovense Zegge) (230n), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Roerdalen (Hoosden, Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Episinus truncatus Latreille, 1809

- *Episinus truncatus*; Six 1858b: 293; 1863: 125. Becker 1879a: xliv; 1896a: 77. Van Hasselt 1885c: 152. Chrysanthus 1951g: 98. Spoek 2005: 26.

NL: (13a). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d). UT: (7), Driebergen (119, 220, 222b). ZH: Loosduinen (119). LI: Brunssum (44), Valkenburg (119).

Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)

- Micryphantes flavomaculatus*; Six 1860: 21; 1863: 126.
- Euryopis flavomaculata*; Becker 1879a: xliv. Van Hasselt 1885c: 158; 1898: 52. Van Damme et al. 1959: 47. Hulsebos 1962: 234. Chrysanthus 1966: 156. Van Helsdingen 1976: 39; 2019b: 40.. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www); 2009c (www). Koomen 1986: 202; 1998a: xxxv. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2001: xxxix. Noordam 1996: 16; 1998: 5. De Bruyn 1996: 48. Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Bonte et al. 2003a: 22, 25; 2003b: 910. Prinsen 2005: 113. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 22. Tutelaers et al. 2008: 12; 2017: 277. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2010: 18. IJland 2009: 4. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 29. IJland et al. 2011: 22. Lambregts et al. 2013: 17. Krediet, 2015b: 10. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (201q (duinen)). DR: Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nijkerk (136), Nijmegen (119), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (119). UT: (7), Driebergen (119, 222a, 222b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: (7), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Schoorl (182w). ZH: (7), Loosduinen (119), Wassenaar (119), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Eersel (182t), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Scheidingsven) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Valkenswaard (Dommeldal) (230x), Waalre (Meelberg, Landschut) (230d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (68), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Schinveld (Breukberg) (164n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Laseola coracina (C.L. Koch, 1837)

Dipoena coracina (C.L. Koch, 1837)

- Dipoena coracina*; Noordam 1998: 284. Prinsen 2005: 113. Prinsen et al. 2009: 192.

GL: Zuid-Veluwe (201p), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j).

Laseola prona (Menge, 1868)

Dipoena prona (Menge, 1868)

- Euryopis prona*; Van Hasselt 1890b: 184.
- Dipoena prona*; Spoek 1997b: 7. Koomen et al. 2005: 87.
- ?Euryopis inornata*; Van Hasselt 1885c: 159. Noordam 1997: 22 (? = *D. prona*; = *Laseola prona*).

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: Arnhem (129). NH: Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y). ZH: ?Loosduinen (119).

Laseola tristis (Hahn, 1833)

Dipoena tristis (Hahn, 1833)

- Theridium tristis*; Six 1858b: 294. Schmitz 1915: 131, 190, 202, 204.
- Euryopis tristis*; Becker 1879a: xliv.
- Theridion tristis*; Van Hasselt 1883a: xxxii; 1885c: 155; 1898: 51, 71.
- Theridium (Laseola) tristis*; Wasmann 1899b: 4, 8, 9.
- Dipoena tristis*; Chrysanthus 1958b: 143. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen et al. 1995: xxx.
- Laseola tristis*; Tutelaers 2003: 4, 6. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 27. Koomen 2015: 159.

NL: (217z, in mierennesten). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a). GL: (119), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Wageningen (112). UT: (7, 119), Driebergen (220). NB: Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230k), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Exaeten (in mierennest) (217z, 243b), Roerdalen (Herkenbosch (Turfkoelen)) (150s), Roermond (136), Vlodrop (Meinweg) (64, 150r, 239d, 239f).

[*Latrodectus geometricus* C.L. Koch, 1841]

- Latrodectus geometricus*; Noordijk 2016: 19; 2021: 111. Noordijk et al. 2003: 27.

ZH: Delft (import) (202ag), Rotterdam (haven, import) (202f). LI: Eygelshoven (import) (202ad).

[*Latrodectus hasselti* Thorell, 1870]

- Latrodectus hasselti*; Noordijk et al. 2013: 16. Noordijk 2016: 19. Van Helsdingen 2019a: 43.

NL: (import) (202f, 202v). GL: Veenendaal (import) (150v, 202f). NH: Amsterdam (import) (150v), Den Helder (import) (150v, 202f). ZH: Sliedrecht (import) (150v).

[*Latrodectus hesperus* Chamberlin & Ivie, 1935]

- Latrodectus hesperus*; Noordijk et al. 2013: 16. Noordijk 2016: 21; 2021: 110.
- Latrodectus cf. hesperus*; Noordijk 2021: 110.
- Latrodectus hesperus/mactans*; Noordijk 2021: 110.

FR: Damwoude (import) (*hesperus* or *mactans*?) (149e, 202f). OV: Glanerbrug (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f, 202v). GL: Elst (import) (202f). UT: Amersfoort (*Hesperus/mactans*) (import) (202ad). NH: Aalsmeer (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f, 202v). ZH: 's-Gravenhage (import) (202f, 202v), Ridderkerk (import) (202f, 202v), Waddinxveen (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f, 202v). NB: Best (202ad), Moerdijk (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f). LI: Horst (cf. *Hesperus*) (import) (202ad).

[*Latrodectus mactans* (Fabricius, 1775)]

- Zwarte weduwe; Van Helsdingen 2006d: 26.
- Latrodectus mactans*; Noordijk et al. 2013: 16.
- Latodectus hesperus/mactans*; Noordijk 2016: 20.

FR: Damwoude (import) (*hesperus* or *mactans*?) (149e, 202f). DR: Assen (import) (*mactans*?) (202f, 202v). OV: Glanerbrug (import) (*hesperus* or *mactans*?) (149e, 202f). UT: Montfoort (import) (*mactans*?) (202f, 202v). NH: Aalsmeer (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f, 202v). ZH: Ridderkerk (import) (202v), Waddinxveen (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f, 202v). NB: Moerdijk (import) (*hesperus* or *mactans*?) (202f).

[*Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790)]

- Latrodectus tredecimguttatus*; Noordijk 2023: 107.

GL: Lochem (import) (202ah).

[*Meotipa spiniventris* (O.P.-Cambridge, 1869)]

[*Chrysso spiniventris* (O.P.-Cambridge, 1869)]

***Theridion spiniventre* O.P.-Cambridge, 1869**

- Theridion spiniventre*; Van der Hammen 1949a: 76.

GL: Wageningen (in kas) (81). UT: Utrecht (in kas) (81). ZH: Delft (in kas) (81), Leiden (in kas) (81).

Deze soort is geimporteerd en komt alleen in kassen voor.

[*Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767)]

***Theridion bimaculatum* (Linnaeus. 1767)**

- Linyphia bimaculata*; Six 1858b: 295; 1863: 125. Snellen van Vollenhoven 1859: 53; 1868: 53.

- *Theridion dorsiger*; Van Hasselt 1873a: xxvi.
- *Theridion bimaculatum*; Van Hasselt 1876b: lii; 1877: xxvii; 1884b: lxxviii; 1885c: 155; 1886c: 106; 1898: 60. Becker 1879a: xliv; 1896a: 81. Chrysanthus 1951g: 98; 1955a: 40. Van Heerdt et al. 1960: 236. Hulsebos 1961: 3. Meijer 1973b: 28; 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1987: 187. Tutelaers 1978: 88. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1990: xv; 1991: xix; 1992: xxvii; 1993: xxxiii. Bosmans 1988: 32. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxxvii. De Bruyn 1996: 44. Ma et al. 1997: 76. Bonte et al. 2003a: 22, 27. Bonte 2006: 16.
- *Neottiura bimaculata*; Spoek 1997b: 7; 1999: 3; 2005: 26. Simon Thomas et al. 2000: 6. Koomen et al. 2001: xxxix; 2004: 207; 2005: 87. Van Helsdingen 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 40. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2003: 6; 2017: 277. Prinsen 2002: 119; 2005: 113. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2010: 18; 2012: 28, 29; 2013: 27. Noordijk et al. 2011: 18. Koomen 2015: 159. Vogels 2019: 28. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (53, 224a, 224b). GR: Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Terschelling (137), idem (Koegelwieck, Kroonpolders, Noordvaarder, Oosterend) (182v), Fochteloeरveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Havelte (160b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: (115, 119), uiterwaarden Waal (191a), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Lochem (Groot Boevink) (211n), Lochem/Klein Dochteren (211n), Millingen aan de Rijn (Millingerwaard) (236c), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: (7, 115, 119), Driebergen (220, 222b), Rheden (Grebbeberg) (164m), Rijsenburg (222b). NH: (119), duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Egmond (182w), Hilversum (103), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Velzen (100), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zandvoort (De Vlaay) (215f), Zwanenwater (148f). ZH: (119), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Domburg (107), Haamstede (182c), Westerschouwen (182c). NB: Casteren (Goorloop) (182t), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Scheidingsven) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Landschut) (230d). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Geleen (44), Gulpen (Waterop) (147o), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Maastricht (13a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Rijckholt (44), Roerdalen (Vlodrop) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Theridion pallens Blackwall, 1834

- *Theridion pallens*; Van Hasselt 1885c: 156; 1890b: 197; 1898: 51. Chrysanthus 1958b: 143. Van Damme et al. 1959: 47. Hulsebos 1962: 234. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1974: 172. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1992: xxvii; 1994: xxxiii. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 1997: xxxvii; 2005: 87. Spoek 1997b: 8. Simon Thomas et al. 2000: 6.
- *Paidiscura pallens*; Koomen et al. 2001: xxxix. Prinsen 2002: 119; 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 27; 2015a: 6; 2019b: 40. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Koomen 2010: 211; 2015: 159. IJland et al. 2011: 22. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 277. Vogels 2019: 29. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen, Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Applescha: Hildenberg) (183a), Terschelling (Formerum, Koegelwieck) (182v). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Steenwijk (De Eese) (197). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Arnhem (181a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (129, 182g). FL: Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT:

(119), Amersfoort (69n). NH: Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: 's-Gravenhage (136), Nootdorp (129), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Goorloop) (182t), Eersel/Vessem (Meerven, Molenbroek) (211m), Oirschot (De Mortelen) (230v), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Nuenen (Heerendonk) (215f), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d), Wintelre (182t). LI: Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Heerlen (64), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roermond (129), Vaals (182e).

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

Achaearanea lunata (Clerck, 1757)

- *Theridium lunatum*; Six 1858a: 169; 1858b: 294. Hulsebos 1961: 3.
- *Theridium formosum*; Van Hasselt 1876b: iii. Pinkhof 1941: 230.
- *Theridion formosum*; Van Hasselt 1885c: 152; 1886c: 103; 1891: xli. Becker 1896a: 97.
- *Theridion lunatum* Becker 1879a: xliv. Chrysanthus 1951g: 98.
- *Achaearanea lunata*; Van Helsdingen 1984: 2; 1987: 187. Koomen 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2000: xxviii. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2001: xxxix; 2004: 207. Spoek 1997b: 7. Simon Thomas et al. 2000: 6. Noordijk et al. 2001: 24. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Tutelaers 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Wielink et al. 2020: 342.
- *Parasteatoda lunata*; Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Noordijk et al. 2011: 18. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 27; 2015a: 6. Van 't Veer et al. 2012: 15. Colijn et al.: 14. Tutelaers 2017: 277. Van Helsdingen 2019b: 40; 2019c: 47.

NL: (7, 13a, 119). FR: Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Diever (160b), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b). OV: Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u), Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Tubbergen (Springendal) (182x), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: Groesbeek (130), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (69n). Utrecht (219, 220). NH: Amsterdam (206f), Egmond (182w), Hilversum (103), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaandam (202m), Zaanstad (Euverenweg) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Stellendam (202m), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (De Geelders, De Scheeken) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Wintelre (182t). LI: Eperheide (Bovenste Bos) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (44), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Roerdalen (Hoosden) (150s), Schinveld (Breukberg) (164n), Vaals (182e).

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

Achaearanea simulans (Thorell, 1875)

- *Achaearanea simulans*; De Jong 1982: 114. Koomen 1994: xxxiii. Prinsen 2002: 118; 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Koomen et al., 2004: 207. Tutelaers 2006: 14, 16. Van Helsdingen et al. 2009b: 17.
- *Parasteatoda simulans*; Koomen 2010: 211. Van Helsdingen et al. 2015a: 6. Van Helsdingen 2019b: 40.

GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen) (211g). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Oosterhesselen (169f). OV: Denekamp (169f), Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Tubbergen (Manderheide) (182x), Wanneperveen (169f). GL: Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Kotten (169f), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). FL: Kraggenburg (Kadoelerbos, Waterloopbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: Amstelveen (169f), Diemen (169f), Kortenhoef (169f). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Castelré (Het Merkske) (150t), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m).

[Parasteatoda tabulata Levi, 1980]

□ *Parasteatoda tabulata*; Bink 2014b: 12.

ZH: Rotterdam (Maasvlakte) (16g).

Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

- *Theridium tepidariorum*; Six 1858b: 294. Pinkhof 1933: 198; 1941: 230. Hulsebos 1962: 3.
- *Theridion tepidariorum*; Becker 1879a: xliv; 1896a: 99. Van Hasselt 1885c: 152; 1886c: 103. Van der Hammen 1949a: 75; 1953: 17. Chrysanthus 1953d: 88. Bink 2014b: 13.
- *Achaearanea tepidariorum*; Vossen 1983: 236. Decae 1999: 25. Roelofs-Ditters 2007: 22. Wielink et al. 2020: 342.
- *Parasteatoda tepidariorum*; Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 277. Bink 2019: 7. Van Helsdingen 2019b: 40. Bloem et al. 2021: 38.

NL: (13a, 119, in kassen). FR: Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Klazienaveen (160c). GL: Wageningen (in kas) (81). UT: (7), Amersfoort (69n), Baarn (in kas) (81), Utrecht (81: in kas; 220). NH: Amsterdam (206d; in kas: 81, 206f). ZH: Papendrecht (import) (16h, 16 i), Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v) , Oirschot (De Mortelen) (230v), Heusden (215f). LI: Brunssum (staatsmijn Hendrik) (81), Buggenum (50), Echt (in grot) (239b).

Pholcomma gibbum (Westring, 1851)

- *Pholcomma gibbum*; Van Hasselt 1890b: 185. Chrysanthus 1957b: 31. Hulsebos 1962: 234. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1981a: 35; 1999a: 6. Fokkema 1978: 100. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxiii. De Bruyn 1996: 42. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www). Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 15. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

FR: Fochtelooërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Ooststellingwerf (75n). DR: Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oevermansbosje) (225c), Havelte (160c), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Ede (Otterlose Zand) (215m). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Loosduinen (129), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Helenaveen (147f), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Roermond (129), Wellerloo (62), Valkenburg (129).

? Phycosoma inornatum (O.P.-Cambridge, 1861)

Dipoena inornata (O.P.-Cambridge)

- *Euryopis inornata*; Van Hasselt 1885c: 159. Noordam 1997: 22 (? = *D. prona*; ? = *Laseola prona*).

ZH: Loosduinen (119).

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

Theridion impressum L. Koch, 1881

- *Theridion impressum*; De Jong 1949b: 212. Chrysanthus 1955c: 16. Van Heerd et al. 1960: 236. Hulsebos 1962: 234. Koomen 1991: xix; 1993: xxxiii. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Tutelaers 2000: 20; 2001e (www); 2003: 6; 2006: 16. Heuts 2001: 11. Koomen et al., 2004: 207. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 22. Prinsen et al. 2009: 192. Wielink et al. 2020: 342.
- *Phylloneta impressa*; Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Van Helsdingen et al. 2012: 28, 29.

FR: Terschelling (137), Bosplaat (169e). DR: Dwingeloo (160c), idem (Dwingelderveld) (182f), Westerbork (182f). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Tubbergen (Springendal) (182x), Tubbergen (Manderheide) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden

Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NH: Huizen (Gooise heide) (151u). NB: Cranendonck (230e, 230k), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Herkenbosch (Meinweg) (150r), Wellerloo (55).

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

Theridion sisyphium (Clerck, 1757)

- *Theridion sisyphus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 52; 1863: 52. Six 1858b: 294.
- *Theridion nervosum*; Van Hasselt 1870b: 30; 1871: 46; 1872b: xxxiii; 1873a: xxvi; 1877: xxvi.
- *Theridion sisyphium*; Van Hasselt 1872b: iii; 1885c: 153. Becker 1879a: xliv; 1896a: 101. Mac Gillavry 1914: 91. Chrysanthus 1954b: 39. Van Heerdt et al. 1960: 236. Hulsebos 1961: 3. Klomp et al. 1973: 334. Meijer 1974: 172; 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1987: 187. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Koomen 1991: xix; 1993: xxxiii; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2004: 207. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Prinsen 2002: 119; 2005: 114; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Faber et al. 2001: 46. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 28.

NL: (7, 13a, 224a, 224b). GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen, Sellingen) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Terschelling (137, 192a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Havelte (160b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: (119), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Molencate (91), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (119), Utrecht (220). NH: (119), Hilversum (103), Velzen (100). ZH: (119), Wassenaar (94). ZE: Walcheren ? (107). NB: Breda (96), Casteren (Goorloop) (182t), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t). LI: Arcen (52), Gulpen (Waterop) (147o), Heerlen (52), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Mheer (52), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)

Keijia tincta (Walckenaer, 1802)

Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)

- *Theridion irroratum*; Van Hasselt 1879b: xxiv.
- *Theridion tinctum*; Van Hasselt 1885c: 154; 1886c: 103, 106. Becker 1876a: 89. Van der Hammen 1949a: 76. Chrysanthus 1951g: 98. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Klomp et al. 1973: 330. Van Helsdingen 1984: 2. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2001: xxxix. Spoek 1997b: 8. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www). Prinsen 2005: 113.
- *Keijia tincta*; Kessler 2004: 7. Koomen et al. 2005: 87. Spoek 2005: 26. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Roelofs-Ditters 2007: 22.
- *Platnickina tincta*; Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 27. Van 't Veer et al. 2012: 15. Bink 2014b: 13. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 277. Van Helsdingen 2019b: 40; 2019c: 47. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (119). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Oranjewoud (122). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Arnhem (181a), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Winterswijk (182g). UT: Amersfoort (69n). NH: Amsterdam (in kas) (81), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaanstad (Euverenweg, Zaandam) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Leiden (in kas) (81), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De

Scheeken) (230v), Cranendonck (230e), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Wintelre (182t). LI: Brunssum (44), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Maastricht (13a, 44), Mook (109), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Pedanostethus arundineti*; Becker 1896b: 5.
- *Robertus arundineti*; Hulsebos 1962: 234. Meijer 1973a: 179; 1977: 84, 85; 1980a: 229; 1980b: 20. Van Helsdingen 1976: 39. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Spoek 1997b: 8. Heuts 2001: 11. Prinsen et al. 2006: 88. Van Klink 2015: 195. Meijer & Barendrecht 2018: 129.

GR: Lauwerszeepolder (195, 198c, 198e, 198f), Lauwersmeer (198u). FR: Noord-Friesland Buitendijks (Noarderleech) (180b), Schiermonnikoog (180b). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Dwingeloo (160c), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a). NH: Uithoorn (151u). NB: Ossendrecht (Leemputten) (71m). LI: Maastricht (14).

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

- *Erigone lividus*; Becker 1879a: xlivi.
- *Pedanostethus lividus*; Heselhaus 1915: 273.
- *Robertus lividus*; Van der Drift 1951: 121. Chrysanthus 1957b: 31. Van Damme et al. 1959: 48. Hulsebos 1962: 234; 1990: 155; 1995: 5. Meijer 1973a: 179; 1973b: 28; 1974: 172. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Van Helsdingen 1976: 39; 1997a: 116; 1999b: 9; 2003d: 22; 2019b: 40. Tutelaers 1978: 88; 2000: 9, 15; 2001e (www). Koomen 1986: 202. Kessler et al. 1988: 135. Bosmans 1988: 32. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Koomen 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxxviii; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1997: xxxvii. Siepel et al. 1996: 45, 47, 50, 53. De Bruyn 1996: 48. Berg 1997: 162. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26. Ma et al. 1997: 76. Noordam et al. 1998: 344. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Kessler-Geschiere 2001: 15. Kessler 2004: 7. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 15. Tutelaers 2006: 16; 2009c (www); 2017: 277. Heuts 2007: 15. Roelofs-Ditters 2007: 22. Tutelaers et al. 2008: 12. Van Helsdingen et al. 2008: 23; 2009b: 17; 2010: 18; 2012: 28. Lambeets 2008: 14. IJland 2009: 4. Noordijk et al. 2009c: 23. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 15. Lambregts et al. 2013: 17. Bink 2016: 3. Wielink et al. 2020: 342. Versteeg 2024: 11.

GR: Lauwerszeepolder (195), Leens (182k). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (210a), Terschelling (Koegelwieck) (182v), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Diever (160h), Dwingeloo (160c, 160g), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Havelte (160c), Ruinen (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Oldemarkt (Weerribben) (197), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Ede (Otterlose Zand) (215m), Hoenderlo (Hoge Veluwe) (72), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Otterlo (Hoge Veluwe) (232p), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wekerom (16b), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Roggebotzand (174g), Uithoorn (Biezenwaard) (151x), Zaandstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201z). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7), Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eersel (182t), Eindhoven (Urkhoense Zegge) (230n), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f, 230s), Oisterwijk (247), Ossendrecht (Leemputten) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Udenhout (De Brand) (182j), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Valkenswaard (Het Heike) (230x), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Illikhoven (Visserweert) (186c), Nederweert (De Banen) (182m), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roggel & Neer en Haelen (Leubekkdal) (182m), Wellerlooi (62), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c).

Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Robertus neglectus*; Hulsebos 1962: 234. Chrysanthus 1966: 156. Noordam 1996: 17. De Bruyn 1996: 48. Faber et al. 1999: bijlage 2. Lambeets 2008: 14. Prinsen et al. 2009: 192.

DR: Havelte (160c). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Bronckhorst/Veldwijk (211n). ZH: Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). LI: Heerlen (68), Ter Hagen (186c).

Robertus scoticus Jackson, 1914

- *Robertus scoticus*; Hulsebos 1962: 234; 1964a: 94; 1989: 23; 1995: 5. Fokkema 1978: 100. Spoek 1997b: 8; 1999: 3; 2005: 26.

FR: Ooststellingwerf (75n). DR: Diever (160h), Dwingeloo (Leggelderveld, Brandeveen) (160c, 160d, 160f), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Westerbork (Mantingerveld) (225d).

Rugathodes instabilis (O.P.-Cambridge, 1871)

- *Theridion instabile*; Van Helsdingen 1984: 2; 2006c: 24.
- *Rugathodes instabilis*; Tutelaers 2017: 277.

FL: Kraggenburg (Waterloopbos) (149d). NH: Kortenhoefse Plassen (147j). NB: Best (De Scheeken) (230v).

Sardinidion blackwalli (O.P.-Cambridge, 1871)

Theridion blackwalli O.P.-Cambridge, 1871

- *Theridium hasseltii* Thorell 1875a: 92 (spec. nov., ♂♀); 1875b: 51. Van Hasselt 1885c: 156; 1898: 51.
- *blackwalli*; Klomp et al. 1973: 334. Van Helsdingen 1978a: 195. Peeters 1985: 51. Heuts 2002: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22.

NL: (228, 229). GL: Arnhem (181a). UT: Zeist (119, 147b). NH: Amsterdam-Oost (151v). ZH: Loosduinen (136, 147b). NB: Sint Michielsgestel (215f). LI: Reuver (204c).

Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)

Theridion simile (C.L. Koch, 1836)

- *Theridion simile*; Six 1858c: 20; 1863: 125. Becker 1879a: xliv; 1896a: 102. Van Hasselt 1885c: 154; 1890b: 197. Chrysanthus 1951g: 98. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39. Vossen 1985b: 7; 1985c: 215. Bosmans 1988: 32. Koomen 1991: xix; 1993: xxxiii. Koomen et al. 1996: xxv. De Bruyn 1996: 44. Spoek 1997b: 8. Tutelaers 2000: 20. Bonte et al. 2003a: 27. Prinsen 2005: 113; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Bonte 2006: 16.
- *Simitidion simile*; Tutelaers 2001e (www) ; 2017 : 277. Koomen et al., 2004: 207. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2010: 18; 2012: 28; 2013: 27. IJland et al. 2011: 22. Koomen 2015: 159. Colijn et al. 2017: 14. Vogels 2019: 29.

FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, 't Groote Veen) (183a), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo/Gasteren (Gasterse duinen) (211k), Anloo (De Burgvallen) (211k), Dwingeloo (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Oosterbos) (225b), Westerbork (182f). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: Apeldoorn (13a, 129), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Nunspeet (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (13a, 129). UT: (7, 119), Amersfoort (69n), Driebergen (221, 222b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZH: Monster (119), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Bladel (Cartierheide) (211m), Breda (Liesbos) (119), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Vessem (Landschotse Heide) (17r). LI: Brunssum (44), Brunssum (Brunsummerheide) (164n), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f).

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)

- Phrurolithus corollatus*; Six 1863: 126. Van Hasselt 1879b: xxv.
- Steatoda corollata*; Becker 1879a: xliv.
- Lithyphantes corollatus*; Becker 1896a: 118. Van Hasselt 1885c: 160; 1886c: 106. Mac Gillavry 1914: 91.
- Steatoda albomaculata*; Chrysanthus 1954b: 39. Hulsebos 1962: 234. De Bruyn 1996: 42. Koomen 2000: xxxviii. Tutelaers 2000: 9, 15; 2001e (www); 2008: 27. Prinsen 2005: 113. Noordijk 2005: 34. Noordijk et al. 2008a: 93; 2008b: 260. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

FR: Terschelling (192a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Dwingeloo (160c). OV: Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a, 202o), Apeldoorn (Bremmert) (202o), Arnhem (122), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202o), Nijmegen (119), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). UT: (7), Zeist (119). ZH: Scheveningen (119), Wassenaar (Meijendel) (25b). NB: Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p). LI: Beegden (Fransche Berg) (182m), Bergen (Maasduinen) (215m), Horn (52), Maastricht (13a), Mook (109), Nuth (119).

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

- Aranea bipunctata*; Bennet et al. 1825: 470.
- Euchasia bipunctata*; Six 1858b: 294.
- Steatoda bipunctata*; Becker 1879a: xliv; 1896a: 112. Van Hasselt 1885c: 158; 1886c: 103. Pinkhof 1941: 230. Chrysanthus 1951g: 98; 1955d: 56. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Meijer 1985: 136. Koomen 1992: xxvii; 1998a: xxxv; 1999: xxxv; 2000: xxxvii. Koomen et al. 1996: xxv; 2001: xxxix. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 40. Noordijk et al. 2001: 23. Roelofs-Ditters 2007: 22. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Van 't Veer et al. 2012: 15. Van Helsdingen et al. 2013: 27. Colijn et al. 2017: 14. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 13a, 15c, 119). GR: Eenrum (Pieterburen) (182k). FR: Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Drachten (202m), Oranjewoud (122). DR: Dwingeloo (160b), Klazienaveen (160b), Meppel (160b), Zwartemeer (160b). OV: Ommen (Lemelerberg) (182i). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Opheemert) (75a2), Nunspeet (182u). UT: Amersfoort (69n), Driebergen (220), Utrecht (220). NH: Amsterdam (202m, 206f), Egmond (182w), Hippolytushoef (202m), Zaanstad (Zaandam, Westzaan) (232b), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Cadier en keer (193b), Hunsel (182m), Jabeek (193b), Maastricht (44), Mechelen (Elset) (182e), Mheer (193b), Rijckholt (44), Roerdalen (Holst) (150s), Wellerlooi (56).

Steatoda castanea (Clerck, 1757)

- Steatoda castanea*; Van Hasselt 1877: xxvii.

ZE: Oostkapelle (107).

Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)

- Steatoda grossa*; Van der Hammen 1969: 27. Heuts 2001: 11. Van Helsdingen 2008a: 29; 2013: 20; 2019b: 40. Bink 2014b: 13. Colijn et al. 2017: 14. Bloem et al. 2021: 38. Noordijk et al. 2003: 26.

NL: (202ag). UT: Amersfoort (69n), Baarn (kas) (85, 149h), Utrecht (kas) (85, 149h). NH: Amsterdam (151u). ZH: 's-Gravenhage (149h), Leiden (149h), Rotterdam (Maasvlakte) (16g), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Sliedrecht (149h), Voorschoten (kas) (85, 149h), Waddinxveen (149h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1).

Steatoda nobilis (Thorell, 1875)

- Steatoda nobilis*; Bink 2014b: 13. Van Helsdingen 2015: 34. Noordijk et al. 2003: 26.

NL: (202ag). ZH: Leiden (149x), Rotterdam (Maasvlakte) (16g).

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806)

- Steatoda paykulliana*; Noordijk et al. 2023: 26. Van Helsdingen 2023: 23.

DR: Assen (import) (202ag). GL: Wageningen (import) (202ag). NH: Callantsoog (import) (150a, 202ag). ZH: Rotterdam (haven) (202ag).

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

- Steatoda triangulosa*; Peeters 1984a: 180. Bink 2014b: 13; 2019: 7. Noordijk et al. 2003: 26.

NL: (202ag). ZH: Barendrecht (import) (16 i), Rotterdam (Maasvlakte) (16g). L: Maastricht (204a).

Theonoe minutissima (O.P.-Cambridge, 1879)

- Theonoe minutissima*; De Jong 1982: 114.

L: Epen (169f).

Theridion asopi Vanuytven, 2014

- Theridion asopi*; Vanuytven 2014: 130. Vogels 2019: 30.

LI: Maastricht (Sint-Pietersberg, Duivelsgrot) (231d).

Theridion familiare O.P.-Cambridge, 1871

- Theridion familiare*; Van Hasselt 1885c: 154; 1898: 51. Chrysanthus 1951g: 98. Meijer 1985: 136. Noordijk et al. 2001: 24.

OV: (119). ZH: (119), Loosduinen (136). LI: Jabeek (193b), Rijckholt (44), Stokhem (202m).

Theridion hannoniae Denis, 1945

- 2014: 7. Bink 2014b: 13. Van Helsdingen 2019a: 42.

ZH: Rotterdam (Maasvlakte) (16e, 16g, 150v).

Theridion hemerobium Simon, 1914

- Theridion hemerobium*; Van Helsdingen 1996a: 3; 1996b: 8; 2002b: 11. Ma et al. 1997: 76. Anthes 2000: 44. Faber et al. 1999: bijlage 2. Prinsen et al. 2009: 192. Bink 2014b: 13. Tutelaers 2017: 277.

NL: (5a). FR: De Oude Venen (147z, 148a). OV: Weerribben (147z, 148a), De Wieden (147z, 148a). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Lochem (Groot Boevink) (211n). UT: Molenpolder (147z, 148a), Noord-Maarsseveense Plas (147z, 148a), Vinkeveense Plassen (147z, 148a). NH: Ankeveense Plassen (147z, 148a), Kortenhoefse Plassen (147z, 148a), Naardermeer (147z, 148a), Wormer- en Jisperveld (147z, 148a). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Nieuwkoopse Plassen (147z, 148a), Reeuwijkse Plassen (147z, 148a), Rotterdam (Maasvlakte) (16g). NB: Best (De Scheeken) (230v).

Theridion melanurum Hahn, 1831

- Theridion denticulatum*; Van Hasselt 1885c: 154; 1898: 51.
- Theridion melanurum*; Chrysanthus 1951g: 98. Hulsebos 1962: 234. Van Helsdingen 1976: 39. Koomen 1990: xv; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1998a: xxxv; 2000: xxxviii. Faber et al. 1999: bijlage 2; 2001: 46. Koomen et al. 2001: xxxix. Van 't Veer et al. 2012: 15. Van Helsdingen et al. 2013: 28. Bink 2014b: 13; 2016: 3.

DR: (119), Dwingeloo (160c), Ruinen (182f). OV: Ommen (182i). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Nijkerk (136). UT: (119). NH: Egmond (182w), Zaanstad (232b). ZH: (119), Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (Maasvlakte) (16g). ZE: Haamstede (182c). LI: Brunssum (44), Hunsel (182m), Mechelen (Elset) (182e), Rijckholt (44), Roerdalen (Hoosden) (150s).

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

- *Theridion neglectum*; Chrysanthus 1957a: 445; 1961: 40. Hulsebos 1959: 254; 1962: 234. Koomen 1990: xv; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii.
- *Theridion mystaceum*; Koomen et al. 1996: xxv; 1997: xxxvii; 2004: 207. Ma et al. 1997: 76. Faber et al. 1999: bijlage 2. Noordijk et al. 2001: 24. Prinsen 2005: 113. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Van 't Veer et al. 2012: 15. Tutelaers 2017: 277. Bink 2019: 7. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

GR: Haren (202m). FR: Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Formerum) (182v), Metsalawier (202m). DR: Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160c), Havelte (160c), Ruinen (182f). OV: Tubbergen (Manderheide) (182x), Zwolle (202m). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Deventer (202m), Oosterbeek (202m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Tiel (202m), Winterswijk (182g). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). NH: Amsterdam (202m), Bergen (202m), Enkhuizen (202m), Zaandam (202m, 232b). ZH: Barendrecht (import) (16 i). ZE: Haamstede (182c). NB: Bergen op Zoom (202m), Boxtel (202m), Kasteren (De Geelders) (230v), Oosterhout (61), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d), Valkenswaard (202m). LI: Heerlen (65), Maastricht (202m), Mechelen (Elset) (182e), Stokhem (202m).

Theridion pictum (Walckenaer, 1802)

- *Theridion pictum*; Van Hasselt 1885c: 153; 1890b: 197; 1893b: xxxii; 1898: 51. Becker 1896a: 93. Chrysanthus 1955c: 16. Van Helsdingen 1984: 2; 2019b: 40. Koomen et al. 1995: xxx. Koomen 1996: 174, 218; 1998b: 225; 2000: xxxviii. Spoek 1999: 3. Prinsen et al. 2006: 88. Tutelaers 2006: 16; 2017: 277. Prinsen 2007: 141. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 29; 2013: 28. Van 't Veer et al. 2012: 15. Wielink et al. 2020: 342.

DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Emmen (Oeversebosje) (225c). UT: Zeist (119). NH: Amsterdam (119), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg, Zaandam) (232b). ZH: Warmond (119), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Nuenen (Heerendonk) (215f), Oisterwijk (136), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j). LI: (13a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Nuth (129), Roerdalen (Hoosden) (150s), Thorn (Koningssteen) (182m), Wellerlooi (55).

Theridion pinastri L. Koch, 1872

- *Theridion pinastri*; Becker 1896a: 92. Van Hasselt 1898: 47. Klomp et al. 1973: 330. Meijer 1976a: 7. Koomen 1998a: xxxv; 2000: xxxviii. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2006: 16. Prinsen 2005: 113. Prinsen et al. 2009: 192. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2012: 28. Noordijk 2022: 51. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Oldeberkoop (Delleburen) (198a). OV: Ommen (Eerde) (182i). GL: Arnhem (181a), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Doesburg (136), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NB: Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d). LI: Heel en Panheel (Tuspeel) (182m), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (13a), Schinveld (Breukberg) (164n).

Theridion uhligi Martin, 1974

- *Theridion uhligi*; Prinsen 1996: 5; 2005: 114. Van Helsdingen 1996b: 8. Noordam 1998: 298. Tutelaers 2000: 15, 17; 2001e (www); 2003: 6; 2008: 27. IJland et al. 2011: 20, 22.

GL: Mossel (148a, 211d), Renkum (Doorwerthse Heide) (148a, 211d), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). NB: (201p), Cranendonck (230e, 230k), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n).

Theridion varians Hahn, 1833

□ *Theridion varians*; Six 1858b: 294. Van Hasselt 1870b: 30; 1884b: lxxviii; 1885c: 154; 1886c: 103. Becker 1879a: xliv; 1896a: 87. Heselhaus 1915: 273. Van der Hammen 1949a: 78. Chrysanthus 1951g: 98. Hulsebos 1959: 254; 1961: 3. Klomp et al. 1973: 334. Meijer 1976a: 7. Van Helsdingen 1976: 39; 1984: 2; 1987: 187; 1999b: 9; 2019b: 40. Meijer 1985: 136. Bosmans 1988: 32. Koomen 1990: xv; 1991: xix; 1993: xxxiii; 1996: 174, 218; 1998a: xxv; 1998b: 225; 1999: xxxv; 2000: xxviii; 2010: 211; 2015: 159. Koomen et al. 1995: xxx; 1996: xxv; 2001: xxxix; 2004: 207. Spoek 1997b: 8; 1999: 3. Noordam 1998: 5. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 15; 2001e (www); 2006: 16; 2017: 277. Noordijk et al. 2001: 24. Prinsen 2002: 119; 2005: 114; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Kessler 2004: 7. Roelofs-Ditters 2007: 22. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 28, 2013: 28; 2015a: 6. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2011: 22. Van 't Veer et al. 2012: 15. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 13a, 119, 201q (duinen)). GR: De Marne (Marnewaard) (182k), Haren (202m), Vlagtwedde (Sellingen, Ter Apel) (211g). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Hildenberg, 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (160a), Bolsward (122), Oldeberkoop (Delleburen) (198a), Oranjewoud (122). DR: Anloo (Schipborg, De Strubben) (211k), Anloo/Gasteren/Taarlo/Vries (De Heest) (211k), Dwingeloo (160b), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Smilde (boswachterij Smilde) (183a), Westerbork (182f), Westerveld (Wapserveld) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Ommen (Beerzerveld, Eerde) (182i), Tubbergen (Springendal) (182x). GL: uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Molencate (91), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j). FL: Kraggenburg (Voorsterbos-West, Appelhof) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (220), Baarn (in kas) (81). NH: Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Zaanstad (Euverenweg, Guisveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Katwijk (115), Loosduinen (115), Scheveningen (115), Schiedam (in kas) (81), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (Cartierheide) (211m), Castelré (Het Merkske) (150t), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Hilvarenbeek/Gorp/Gorp en Rovert (211m), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Sint Michielsgestel (215f), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182h, 182j), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Wintelre (182t). LI: Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Eperheide (Bovenste Bos, Onderste Bos) (164n), Gulpen (Waterop) (147o), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (193b), Rijckholt (44), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roggel & Neer en Haelen (Leubekdal) (182m), Schinveld (Breukberg) (164n), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c).

THERIDIOSOMATIDAE

***Theridiosoma gemmosum* (L. Koch, 1877)**

□ *Theridiosoma gemmosum*; De Jong 1982: 114. Van Helsdingen 1984: 2; 1996a: 3. Koomen et al. 1996: xxvi; 2004: 207. Simon Thomas et al. 2000: 5, 6. Tutelaers 2006: 14, 16; 2017: 277. Van Helsdingen et al. 2012: 28.

OV: Tubbergen-Reutum (Reutumerveen) (182x), Weerribben (147z). GL: Mook (De Bruuk) (169f), Nunspeet (169f, 182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m). UT: Botshol (147z), Molenpolder (147z), Noord-Maarsseveense Plas (147z). NH: Ankeveense Plassen (147z), Kortenhoefse Plassen (147j, 147z), Naardermeer (147z, 169f). NB: (169f), Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Maarheeze (230n). LI: Herkenbosch (Meinweg) (150r).

THOMISIDAE

***Bassaniodes robustus* (Hahn, 1832)**

Xysticus robustus (Hahn, 1832)

□ *Xysticus robustus*; Van Hasselt 1886b: 68; 1898: 63. Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1955b: 191.

NL: (54). GL: Wageningen (181b). UT: Zeist (121).

Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837)

□ *Coriarachne depressa*; Chrysanthus 1957b: 31. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www). Prinsen et al. 2009: 192. De Koninck 2010: 32. Noordijk 2022: 51. Fleurbaaij 2024: 6.

GL: Bronckhorst/Vorden (211n). NB: Cranendonck (230e), De Moer, Huis ter Heide (N. van Tilburg) (75g), Huijbergen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide) (70f), Tilburg (De Kaaistoep) (202af)..L: Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wellerlooi (62).

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)

Ozyptila blackwalli Simon, 1875

□ *Oxyptila blackwalli*; Van Hasselt 1886b: 72. Noordam 1997: 21 (? = *Ozyptila nigrita*).

OV: Zwolle (121).

Diae dorsata (Fabricius, 1777)

□ *Thomisus dorsatus*; Six 1863: 128. Van Hasselt 1870b: 30; 1882: xxvii.

Diae dorsata; Van Hasselt 1886b: 66; 1888: xxix; 1890b: 210. Becker 1879a: xli; 1882: 215. Chrysanthus 1955c: 16. Van Helsdingen 1981a: 34; 2019b: 40; 2019c: 47. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1992: xxvii; 1998a: xxxv. Spoek 1999: 3. Heuts 2001: 11. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 192. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 28; 2013: 28. Noordijk et al. 2011: 18. Franken et al. 2016: 177. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Tutelaers 2017: 279.

DR: Emmen (Oeversebosje) (225c). OV: (121), Ommen (Archem, Eerde) (182i), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: (121), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Ginkelse Zandbos) (75w1), Ermelo (Speulderbos) (150w2), Molencate (91), Nijmegen (215f). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: (7, 12, 121), Amersfoort (69n). NH: Amstelveen (151u). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (7, 12, 121), Best (De Scheeken) (230v), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v). LI: (121), Griendtsveen (Griendtsveense Peel) (147f), Helenaveen (Mariapeel) (147f), Roerdalen (Hoosden) (150s), Vaals (182e), Valkenburg (111, 125), Vlodrop (Meinweg) (150r, 239d, 239f), Wellerlooi (55).

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)

□ *Misumena tricuspidata*; Becker 1879a: xli; 1882: 212. Maurissen 1882: cxx. Van Hasselt 1886b: 65; 1898: 63. Chrysanthus 1951g: 100.

□ *Misumenops tricuspidatus*; Tutelaers 2004: 4; 2006: 15, 18. *Ebrechtella tricuspidata*; Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2012: 28.

□ *Ebrechtella tricuspidata*; Van Helsdingen et al. 2013: 28. Titulaers 2017: 279.

NB: (121), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230 l, 230n), Hapert (Goorloop) (230 l), Heeze (Witte Loop) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Sint Oedenrode (Moerkulen) (230 l), Someren (Beuven) (230 l), Valkenswaard (golfterrein bij Tongelreep) (230 l), Waalre (Elshouters) (230 l). LI: (121), Brunssum (44), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Maastricht (7, 12, 192c), Roerdalen (Hoosden) (150s), Stramproy (Wijffelterbroek) (230 l), Venlo (136), Weert (Weerterbos) (230 l).

Misumena vatia (Clerck, 1757)

□ *Thomisus calycinus*; Six 1858b: 299. Snellen van Vollenhoven 1859: 62; 1868: 62. Becker 1879a: xli; 1882: 210.

□ *Thomisus vatia*; Van Hasselt 1879b: xxv.

□ *Misumena vatia*; Van Hasselt 1886b: 65. Bouwman 1913: 60; 1935: 80. Chrysanthus 1950c: 135; 1951g: 100; 1955b: 192; 1956: Hulsebos 1962: 233. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen et al. 1995:

xxix. Tutelaers 2006: 15, 18; 2017: 279. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 28. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 22, 54, 60, 121, 224a, 224b). DR: Dwingeloo (160c). UT: De Bilt ? (19), Driebergen (220). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda ? (19), Casteren (Goorloop) (182t), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Netersel (Neterselse Heide) (230n), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (12), Tilburg (Kaaistoep) (250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (230n). LI: Maastricht (12, 36, 44), Mook (109), Roerdalen (Hoosden) (150s), Vlodrop (Meinweg) (150d, 239d, 239f).

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

- *Xysticus horticola*; Six 1858c: 20. Van Hasselt 1871: 46. Becker 1879a: xli; 1882: 196.
- *Xysticus atomaria*; Van Hasselt 1886b: 71.
- *Oxyptila atomaria*; Chrysanthus 1958b: 144. Van Heerdt et al. 1960: 235. Meijer 1973b: 27. Koomen 1986: 202. De Bruyn 1996: 44. Koomen et al. 1997: xxxvi. Van Helsdingen 1999b: 9.
- *Ozyptila atomaria*; Vangsgård et al. 1996: 82. Noordam 1996: 10. Koomen et al. 2001: xxxix; 2005: 87. Bonte et al. 2003a: 22, 26, 58; 2003b: 910. Bonte 2006: 16. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. IJland et al. 2010: 30. Krediet, 2015b: 10. Van Helsdingen 2019b: 40.

W: (231a). FR: Ameland (196), Terschelling (137), idem (Huneplak) (182v). UT: (7, 12, 121), De Bilt (221), Rhenen (Grebbbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zwanenwater (148f). ZH: (121), duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (94), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). LI: (121), Colmond (64), Eys (De Piepert) (183r), Maastricht (12), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)

- *Oxyptila brevipes*; Van Hasselt 1886b: 71; 1898: 55. Chrysanthus 1961: 41.
- *Ozyptila brevipes*; Koomen 1990: xv. De Bruyn 1996: 49. Kessler 2004: 7. Van Helsdingen 2019b: 40.

NH: Texel (136). ZH: Scheveningen (121), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Haamstede (182c). LI: Heerlen (65).

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)

- *Oxyptila nigrita*; Van Hasselt 1886b: 72. Chrysanthus 1961: 41. Koomen 1986: 202; 1992: xxvii. De Bruyn 1996: 45.
- *Ozyptila nigrita*; Noordam 1996: 10; 1997: 21. Koomen et al. 2001: xxxix. Bonte et al. 2003a: 22, 26; 2003b: 910. Bonte 2006: 9, 16.
- *Ozyptila claveata*; Kessler 2004: 7. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Krediet, 2015b: 10. Van Helsdingen 2019b: 40.

OV: Zwolle ? (121, 201m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Loosduinen (121), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (65), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)

- *Xysticus praticola*; Six 1858b: 300; 1858c: 20; 1863: 128. Van Hasselt 1876b: liii; 1877: xxvii; 1886b: 71.
- *Oxyptila praticola*; Becker 1879a: xli; 1882: 199. Heselhaus 1915: 273. Chrysanthus 1951g: 100. Van Damme et al. 1959: 41. Hulsebos 1959: 254; 1961: 2. Van Helsdingen 1976: 37; 1984: 2; 1997a: 116; 2002b: 11; 2003d: 22. Fokkema 1978: 100. Koomen 1986: 202; 1990: xv; 1992: xxvii; 1993: xxxii; 1998a: xxxv; 2000: xxxviii. Jacobs 1992: 133. Koomen et al. 1995: xxix. De Bruyn 1996: 47. Koomen et al. 1997: xxxvi. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Faber et al. 2001: 46.
- *Ozyptila praticola*; Koomen et al. 2001: xxxix; 2005: 87. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www); 2009c (www); 2017: 279. Noordijk et al. 2001: 20. Prinsen 2002: 118. Bonte et al. 2003a: 22, 26. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 17, 23;

2009a: 7; 2009b: 17; 2010: 18; 2013: 28; 2015a: 6. Prinsen et al. 2009: 192. Wielink et al. 2009: 221. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30. Noordijk et al. 2011: 18. Koomen 2015: 159. Colijn et al. 2017: 14. Franken et al. 2018: 47. Van Helsdingen 2019b: 40. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 12, 121). GR: Vlagtwedde (Ellersinghuizen) (211g), Winschoten (202m). FR: Schiermonnikoog (160a), Terschelling (Hoorn, Huneplak, Oosterend) (182v), Ooststellingwerf (75n). DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje, Oevermansbosje) (225c), Ruinen (182f), Ruinerwold (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Vledder Aa) (183a). OV: Ommen (202m), Ommen (Archem) (182i), Saasveld (Molenven) (70d, 147a), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: uiterwaarden Waal (Afferden) en IJssel (Olst) (75b), Bronckhorst/Veldwijk (211n), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Hoevelaken (202m), Oosterbeek (202m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Tiel (202m), Ulft (202m), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n), Zwartebroek (202m). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Amersfoort (69n), Driebergen (221, 222b), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (220, 222b). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amsterdam (202m), Egmond (182w), Egmond-Binnen (75w2), Hilversum (103), Hippolytushoef (202m), Kortenhoefse Plassen (147j), Schoorl (182w), Texel (Den Burg, Westerduinen) (182y), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Gouda (202m), Leiden (202m), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Oostkapelle (107), Westerschouwen (182c). NB: Asten (202m), Boxmeer (202m), Boxtel (202m), Breda (202m), Castelré (Het Merkske) (150t), Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (230s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250c, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t). LI: Maastricht (44), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Thorn (Koningssteen) (182m), Valkenburg (in gang *Talpa europaea* L.) (151c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

Oxyptila pullata (Thorell, 1875)

- Oxyptila pullata*; Janssen 1992: 9.
- Oxyptila rauda*; Van Helsdingen 1996b: 7. Van Helsdingen et al. 2009a: 7.

L: Gulpen (Wrakelberg) (148a, 166b), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Oxyptila rauda Simon, 1875

- Oxyptila rauda*; Van Helsdingen 2009a: 12.
- Onjuiste vermelding: Van Helsdingen 1996b: 7 (= *Oxyptila pullata*) (zie 166b).

GL: Herwen (Rijnwaarden) (149j).

Oxyptila sanctuaria (O.P.-Cambridge, 1871)

- Oxyptila sanctuaria*; Van Hasselt 1886b: 72; 1890b: 203.
- Oxyptila sanctuaria*; Koomen 1986: 202. Bonte et al. 2003a: 26; 2003b: 910. Bonte 2006: 16. Noordijk et al. 2010: 745. Krediet, 2015b: 10. Van Colen et al. 2022: 141.

NL: (202s: wegbermen). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c). ZH: Gouda (121). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). LI: Eys (De Piepert) (183r), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roermond (129), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Oxyptila scabricula (Westring, 1851)

- Oxyptila scabricula*; Chrysanthus 1959: 182. Van Damme et al. 1959: 41.
- Oxyptila scabricula*; Van Helsdingen 1976: 37. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202. Noordijk 2005: 32, 34. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 82, 93; 2008b: 260.

OV: Saasveld (Molenven) (69b, 70d, 147a). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Elburg (de Haere) (202a, 202o). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d), Heeze (Strabrechtse Heide) (215f), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Ozyptila simplex (O.P.-Cambridge, 1862)

- Ozyptila simplex*; Van Hasselt 1886b: 71. Kluyver 1933: 136.
- Ozyptila simplex*; Koomen 1986: 202; 2000: xxxviii. Bonte et al. 2003a: 26. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 19. Lambeets 2008: 13. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Van Colen et al. 2022: 141.

GL: Wageningen (121, 181b). NH: duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b). NB: Vught (Bleijendijk) (215f). LI: Illikhoven (Visserweert) (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Papenhoven (Kellerweerd) (186a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Ter Hagen (186c), Thorn (Koningssteen) (182m), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

- Ozyptila trux*; Van Hasselt 1885a: xxix; 1886b: 70. Chrysanthus 1961: 41. Van der Ploeg et al. 1975: 171. Koomen 1986: 202; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1999: xxxiv. Hulsebos 1989: 23; 1990: 155. Jacobs 1992: 133. De Bruyn 1996: 49. Van Helsdingen 1997a: 116; 2002b: 11; 2003d: 22. Ma et al. 1997: 76. Kessler-Geschierie 2001: 15.
- Ozyptila trux*; Koomen et al. 2001: xxxix; 2005: 87. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 112. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Van 't Veer et al. 2012: 13. Koomen 2015: 159. Krediet, 2015b: 10. Titulaers 2017: 279. Meijer & Barendrecht 2018: 128. Van Helsdingen 2019b: 40. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 24.

NL: (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u). FR: Schiermonnikoog (210a). DR: Dwingeloo (160f, 160g), Westerveld (Vledder Aa) (183a), Zweeloo (Mepperveld) (182f). GL: uiterwaarden Waal (191a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). UT: Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (Amelisweerd) (201v). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Egmond (182w), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zaandstad (Guisveld, Euverenweg, Westzijderveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: Ackerdijkse Plassen (148j), Wassenaar (Meijendel) (25b), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Breda (Liesbos) (117, 121), Heeze (Kleine Dommel) (215f), Heeze (Strabrechtse Heide-Witte Loop) (215f), Kasteren (De Geelders) (230v), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d). LI: Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (65), Oud-Valkenburg (Gerendal) (165a, 182a), Schinveld (Breukberg) (164n).

Ozyptila westringi (Thorell, 1873)

- Ozyptila westringi*; Noordam 1998: 179. Meijer & Barendrecht 2018: 128.

W: (201p). GR: Lauwersmeer (198u).

Pistius truncatus (Pallas, 1772)

- Pistius truncatus*; Van Hasselt 1886b: 64; 1890b: 203; 1892: xxviii. Hulsebos 1962: 233. Bink 2019: 7.

DR: Dwingeloo (160c). GL: Apeldoorn (129, 131). ZH: Barendrecht (import) (16 i). LI: Valkenburg (121).

Psammitis ninnii (Thorell, 1872)

- Xysticus ninnii*; Van Hasselt 1879b: xxv; 1886b: 69; 1890b: 203. Noordam 1996: 5, 6, 9, 10, 12, 19, 20; 1998: 4. De Bruyn 1996: 43. Noordam 1997: 30. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 40. Tutelaers 2000: 8, 14; 2001e (www). Bonte et al. 2003a: 23, 27, 59; 2003b: 911. Koomen et al. 2005: 87. Bonte 2006: 10, 16. Roelofs-Ditters 2007: 20. Noordam et al. 2008b: 260. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.

GL: Apeldoorn (Bremmert) (2020), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (2020), Oosterbeek (121). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Katwijk (Berkheide) (201q), Loosduinen (121), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), duinen (201n), Wassenaar (NP Hollandse Duinen)

(150w1). NB: Cranendonck (230e), Heeze (Strabrechtse Heide-Grafven) (215f), Oirschot (129). LI: Mook (109), St. Jansberg (121).

Psammitis sabulosus (Hahn, 1832)

- *Xysticus sabulosus*; Six 1863: 128. Becker 1879a: xli; 1882: 185. Van Hasselt 1886b: 67; 1887a: xxxii. Klomp et al. 1973: 334. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 14; 2001e (www). Versteegen et al. 1992: 73. Noordam 1996: 5, 6, 19, 20. De Bruyn 1996: 42. Bonte et al. 2003a: 59. Roelofs-Ditters 2007: 20. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8.
- *Xysticus setosus*; Van Hasselt 1886b: 67.
- *Xysticus arenicola*; Van Hasselt 1886b: 70.
- *Xysticus dentiger*; Van Hasselt 1890b: 192.
- *Xysticus lineatus*; Van Hasselt 1890: 192.

NL: (232w: heide hogere gronden). GL: (121), Arnhem (181a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Winterswijk (123). UT: (7, 12, 121), Driebergen (222b). NH: (7). ZH: (7, 121), 's-Gravenhage (12, 129), Loosduinen (121), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k). NB: (121), Breda (12), Cranendonck (215f, 230e), Heeze (Heezerven) (230d). LI: (7, 121), Maastricht (12).

Synema globosum (Fabricius, 1775)

- *Thomisus globosus*; Van Hasselt 1872d: 113.
- *Diae globosa*; Van Hasselt 1885a: xxix.
- *Synaema globosa*; Van Hasselt 1886b: 66; 1888: xxviii. Becker 1879a: xli; 1882: 190.

GL: (121). ZH: (121). NB: (7, 12, 121), Breda (Liesbos) (98, 117). LI: (7, 121), Maastricht (12), Valkenburg (125).

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

- *Thomisus diadema*; Van Hasselt 1872d: 113.
- *Thomisus onustus*; Van Hasselt 1886b: 64.
- *Thomisus albus*; Chrysanthus 1950c: 135; 1953d: 88; 1955b: 192; 1956: 140, 142.

NL: (54, 60). GL: Arnhem (36, 121). NB: Breda (36, 98, 121). LI: Helenaveen (36), Roermond (50).

Tmarus piger (Walckenaer, 1802)

- *Xysticus cuneolus*; Van Hasselt 1887a: xxxi.
- *Tmarus piger*; Van Hasselt 1890b: 191; 1898: 55. Chrysanthus 1951g: 100. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215.

GL: Nijmegen (123, 129). LI: Brunssum (44), Bunde (129), Venlo (136), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Xysticus acerbus Thorell, 1872

- *Xysticus acerbus*; Van Helsdingen 1986b: 86. Peeters et al. 1986: 93. Koomen 1986: 202. Noordijk 2006b: 20, 21. Lambeets 2006: 25; 2008: 8, 14. Van Helsdingen et al. 2009a: 7. Noordijk et al. 2010: 745. Krediet, 2015b: 10.

NL: (202s: wegbermen). LI: (147m), Eys (De Piepert) (183r), Gulpen (Wrakelberg) (202c), Heerlen (202c), Maasband (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Reuver (204u), Roerdalen (Meinweg) (236c), Roosteren (186b), Roosteren (Schansberg) (186c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Xysticus audax (Schrank, 1803)

- *Xysticus audax*; Six 1858a: 170; 1858b: 299.
- *Thomisus pini*; Van Hasselt 1876b: liii.
- *Xysticus pini*; Van Hasselt 1886b: 67. Becker 1879a: xli; 1882: 169. Kluyver 1933: 136.
- *Xysticus audax*; Chrysanthus 1951g: 100. Klomp et al. 1973: 331. Van Helsdingen 1976: 37. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1993: xxxiii. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Simon Thomas et al. 2000: 6. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www); 2003: 6; 2008: 29. Kessler 2004: 7.

Bonte et al. 2003a: 27. Prinsen 2005: 112. Bonte 2006: 10, 16. Noordijk 2006b: 21; 2022: 51. Roelofs-Ditters 2007: 19. Prinsen et al. 2009: 192. Van Helsdingen et al. 2010: 18. Bink 2019: 7.

DR: Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d). GL: Apeldoorn (Kootwijkerveen) (147a), Arnhem (181a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o), Wageningen (181b). UT: (7, 121), De Bilt (12), Driebergen (219, 220), Utrecht (12). NH: (7), duinen (Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Hilversum (12, 103), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i). ZH: (7, 121), Barendrecht (import) (16 i), 's-Gravenhage (12). NB: (121), Breda (12), Cranendonck (230e, 230k), Heeze (Strabrechtse Heide) (230p), Moergestel (Helsbroek) (215f), Oirschot (12), Reusel (Reuselse Moeren) (182t), Tilburg (Kaaistoep) (202af). LI: Brunssum (44), Heerlen (202c), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837

□ *Xysticus bifasciatus*; Six 1858b: 300. Becker 1879a: xli; 1882: 178. Van Hasselt 1879b: xxiv; 1886b: 69. Kluyver 1933: 136. Koomen 1986: 202. Koomen et al. 1996: xxv. Simon Thomas et al. 2000: 6. Van Helsdingen et al. 2008: 16, 24; 2010: 18. Prinsen et al. 2009: 192. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Krediet, 2015b: 10. Vogels et al. 2023: 6.

NL: (121). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Ede (Otterlose Zand) (215m), Lochem/Barchem (Beekvliet) (211n), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (181b). UT: (7, 12), De Bilt (220). NH: (7). ZH: (7). NB: (7, 12). LI: (7), Eys (De Piepert) (183r), Maastricht (12), Mook (109), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Wahlwiller (Kruisberg) (182a).

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

□ *Xysticus cristatus*; Becker 1879a: xli; 1882: 167. Van Hasselt 1886b: 66. Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1959: 253; 1961: 2; 1989: 23; 1990: 155. Meijer 1973b: 27; 1976a: 6. Van Helsdingen 1976: 37; 1984: 2; 1997a: 116; 1999a: 6; 1999b: 9; 2003d: 22; 2019b: 40.. Tutelaars 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Buizer 1982: 72. Kessler et al. 1984: 262. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Koomen 1986: 202; 1990: xv; 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1994: xxxiii; 1998a: xxxv; 1999: xxxiv; 2010: 211; 2015: 159. Bosmans 1988: 32. Deeleman-Reinhold 1990: 109. Verstegen et al. 1992: 71, 76, 77. Hulsebos 1995: 5. Koomen et al. 1995: xxix; 1996: xxv; 1997: xxxvi; 2001: xxxix; 2004: 206; 2005: 87. Siepel et al. 1996: 46, 48, 51, 53. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Ma et al. 1997: 76. Simon Thomas et al. 2000: 6. Faber et al. 1999: bijlage 2. Kessler-Geschiere 2001: 15. Prinsen 2002: 118; 2005: 112. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Bonte et al. 2003a: 23, 27. Kessler 2004: 7. Noordijk 2005: 34; 2006b: 21; 2008: 33. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 19. Van Helsdingen et al. 2008: 24; 2009a: 7; 2010: 18. Lambeets 2008: 14. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30; 2011: 22. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 13. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 10. Bink 2016: 3. Colijn et al. 2017: 14. Meijer & Barendrecht 2018: 129. Vogels 2019: 28, 29. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (121; 232w: heide hogere gronden), (202s: wegbermen). GR: De Marne (Lauwersmeer, Marnewaard) (182k), Lauwersmeer (198u), Leens (182k), Vlagtwedde (Sellingen) (211g). FR: Ameland (196), Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand, Hildenberg, 't Groote Veen) (183a), Schiermonnikoog (160a, 174h), Terschelling (Formerum, Huneplak, Koegelwieck, Oosterend) (182v), Fochtelooërveen (148e), Oldeberkoop (Delleburen) (198a). DR: Anloo (De Burgvallen) (211k), Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Borger (Drouwenerzand) (215m), Diever (160h), Dwingeloo (160b, 160f, 160g), idem (Dwingelderveld) (182f), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Doldersumerveld, Vledder Aa) (183a). OV: Haaksbergen (182d), Ommen (Archem, Beerzerveld) (182i), Tubbergen (Springendaal) (182x). GL: uiterwaarden Waal (191a), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerveen) (215m), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Millingen aan de Rijn (Millingerwaard) (236c), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Nunspeet (182u), Nunspeet (De Vennen, Mythstee) (218m), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp)

(150m, 150o), Winterswijk (182g), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b), Zeewolde (Harderbroek) (182m). UT: Amersfoort (69n), De Bilt (12), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m), Utrecht (12). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Egmond (182w), Kortenhoefse Plassen (147j), Texel (Den Burg, Ploegelanden) (182y), Zaandstad (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Papendrecht (import) (16h), Rotterdam (25s), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Haamstede (182c), Westerschouwen (182c). NB: (7), Bladel (187a), Breda (12), Casteren (Cartierheide) (182t), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), Oirschot (De Mortelen) (230v), Oirschot (12), Ossendrecht (Leempadden) (71m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d), Valkenswaard (Malpiebeemden) (182t), Vessem (Landschotse Heide) (17r), Waalre (Meelberg) (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunssummerheide) (164n), Buggenum (50), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Maastricht (12), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roosteren (Schansberg) (186c), Schinveld (Breukberg) (164n), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f), Voerendaal (Wrakelberg) (150n), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)

- *Xysticus erraticus*; Becker 1881: xxix; 1882: 176. Van Hasselt 1883a: xxxiii; 1886b: 69. Chrysanthus 1957b: 31. Kessler-Geschiere 1965: 159. Meijer 1973b: 27. Tutelaers 1978: 87; 2000: 8, 13; 2001e (www). Koomen 1986: 202; 1998a: xxxv. Koomen et al. 1996: xxv; 2001: xxxix; 2005: 87. Noordam 1996: 5, 6, 10, 18, 22. De Bruyn 1996: 45. Spoek 1997b: 6; 2005: 25. Van Helsdingen 1999b: 9; 2019b: 40. Bonte et al. 2003a: 23, 27, 59; 2003b: 911. Prinsen 2005: 112. Noordijk 2005: 34. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 93. Van Helsdingen et al. 2008: 24; 2009a: 7; 2010: 18. Lambeets 2008: 14. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Lambregts et al. 2013: 15. Vogels 2019: 29; 2023: 6. Wielink et al. 2020: 342.

FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (175a), Terschelling (Midsland) (182v). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Emmen (Bargerveen) (225b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Ommen (Archem) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: (121), Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Nunspeet (Elspeetsche Heide) (182u), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (112). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b, 17c), Egmond (182w), Texel (Den Hoorn, Westerduinen) (182y), Zwanenwater (148f). ZH: (121), duinen (AWD) (17a, 17b), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: (121), Bladel (187a), Breda (11, 12), Cranendonck (230e), Heeze (Heezerven) (230d), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Heerlen (62), Obbicht - Grevenbicht (186c), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Meinweg) (236c), Voerendaal (Wrakelberg) (150n).

Xysticus ferrugineus Menge, 1876

- *Xysticus ferrugineus*; Tutelaers 1978: 87, 89; 2000: 13; 2001e (www) . Noordijk 2005: 32, 34. Roelofs-Ditters 2007: 19. Noordijk et al. 2008a: 93. IJland 2009: 4. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. IJland et al. 2011: 22. Lambregts et al. 2013: 15.

OV: Hellendoorn (Haarlerberg) (164c), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: Veluwe (berm autoweg) (202n), Apeldoorn (Kootwijkerzand) (230d), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Ede (Otterlose Zand) (215m). NB: Bladel (187a), Cranendonck (215f, 230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Soerendonk (230d), Waalre (230d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Brunssum (Brunssummerheide) (164n).

Xysticus kempeleni Thorell, 1872

- *Xysticus kempeleni*; Noordam 1996: 12. Noordijk et al. 2008a: 93.

GL: Veluwe (201k), Veluwe (berm autoweg) (202n).

Xysticus kochi Thorell, 1872

- *Xysticus viaticus*; Six 1858b: 299. Van Hasselt 1877: xxvi; 1886b: 67. Kluyver 1933: 136.

- *Thomisus viaticus*; Snellen van Vollenhoven 1859: 62; 1868: 62.
- *Xysticus kochi*; Becker 1879a: xli; 1882: 160d. Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1953d: 88. Hulsebos 1959: 253; 1961: 2. Meijer 1973b: 27. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1992: xxvii; 1998a: xxxv; 2000: xxxviii. Noordam 1996: 5, 6, 10, 19, 20. Siepel et al. 1996: 46, 48, 53. De Bruyn 1996: 44. Van Helsdingen 1997a: 116; 1999b: 9; 2003d: 22; 2019b: 40. Faber et al. 1999: bijlage 2. Tutelaers 2000: 8, 13; 2001e (www); 2006: 18; 2017: 279. Bonte et al. 2003a: 23, 27. Kessler 2004: 7. Spoek 2005: 25. Noordijk 2005: 34; 2006b: 21; 2008: 33. Bonte 2006: 16. Roelofs-Ditters 2007: 20. Van Helsdingen et al. 2008: 17, 24; 2010: 18. Lambeets 2008: 13. Prinsen et al. 2009: 192. Noordijk et al. 2009c: 23; 2010: 745. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2010: 30. Roelofs-Ditters et al. 2011: 8. Van 't Veer et al. 2012: 13. Lambregts et al. 2013: 15. Krediet, 2015b: 10. Bink 2016: 3. Van Colen et.al. 2022: 142. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 121, 224a, 224b), (202s: wegbermen). FR: Ameland (196), Schiermonnikoog (160a), Ooststellingwerf (Aeckingerzand) (215m). DR: Borger (Drouwenerzand) (215m), Dwingeloo (160b), Westerbork (Mantingerveld) (225d). OV: Enschede (Boekelo) (182d), Ommen (Eerde) (182i), Ommen (Lemelerberg) (215m). GL: (12), uiterwaarden Waal (Afferden, Ophemert) (75a2), Apeldoorn (Caitwickerzand) (202a), Barneveld (Kootwijkerzand) (215m), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Ede (Otterlose Zand) (215m), Elburg (de Haere) (202a), Harderwijk (Beekhuizerzand) (202a), Harderwijk (Hulshorsterzand) (202a), Nijmegen (Millingerwaard) (202r), Renkum (Reijerscamp) (150m, 150o), Wageningen (181b), Zaltbommel (uiterwaarden) (148n). FL: Almere (218b). UT: (12), De Bilt (220), Rhenen (Blauwe Kamer) (148b), Rhenen (Grebbeberg) (164m). NH: duinen (AWD; Noordhollands Duinreservaat) (17a, 17b), Zaandam (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: duinen (AWD) (17a, 17b), Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (Meijendel) (25b, 201k), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). ZE: Cadzand (Zwinuitbreiding) (231b), Middelburg ? (107). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Cranendonck (230e), Drunen (Loonse en Drunense Duinen) (215m), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 215f, 250d). LI: Bergen (Maasduinen) (215m), Eys (De Piepert) (183r), Heerlen (202c), IJlikhoven (Visserweert) (186c), Lerop (50), Maastricht (12), Meers (Weerterhof) (186a), Nederweert (De Banen) (182m), Obbicht - Grevenbicht (186c), Roosteren (Schansberg) (186c), Ter Hagen (186c), Wahlwiller (Kruisberg) (182a, 182e).

Xysticus Ianio C.L. Koch, 1835

- *Xysticus Ianio*; Six 1858b: 299. Van Hasselt 1870b: 30; 1886b: 67. Becker 1879a: xli; 1882: 175a. Mac Gillavry 1914: 91. Chrysanthus 1966: 156. Koomen et al. 1996: xxv. Koomen 1998a: xxxv; 1998b: 225; 2015: 159. Prinsen 2005: 112. Spoek 2005: 25. Tutelaers 2006: 15, 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 20. Prinsen et al. 2009: 192. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2010: 18. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. IJland et al. 2011: 22. Bink 2016: 3. Vogels 2019: 29. Van Helsdingen 2019b: 40. Noordijk 2022: 51. Vogels et al. 2023: 6. Wielink et al. 2020: 342. Noordam 2024: 23.

NL: (7, 12, 121). FR: Terschelling (192a). DR: Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Wapserveld) (183a). OV: Ommen (Eerde) (182i). GL: Apeldoorn (Hoog Soeren) (182u), Apeldoorn (Meervelderbosch) (236a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Bronckhorst/Wichmond (Kasteel Hackfort) (211n), Molencate (91), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Renkum (Reijerscamp) (150o). FL: Luttelgeest (Kuinderbos) (150p). UT: Driebergen (220), Utrecht (Amelisweerd) (201v). ZH: Papendrecht (import) (16h), Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Eindhoven (Urkhovense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (Stadswallen) (230n), Kasteren (De Geelders) (230v), Moorsel (Strabrechtse Heide, Pingoven) (230n), Oirschot (De Mortelen) (230v), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 202af, 250d), Tilburg (Kaaistoep-Prikpolder) (215f), Udenhout (De Brand) (182j), Ulvenhout (St. Anna-bosch) (215f), Veldhoven (Halfmijl) (236c), Waalre (Elshouters) (230n). LI: Eperheide (Onderste Bos) (164n), Heerlen (68), Weert (Weererbos) (230n).

(? *Xysticus lineatus* (Westring, 1851))

- *Xysticus lineatus*; Hulsebos 1959: 254.

Het materiaal van Hulsebos is verloren gegaan. De juistheid van de determinatie wordt door Noordam (1997: 22) in twijfel getrokken vanwege het verspreidingspatroon van deze soort binnen Europa. Hij

veronderstelt dat het om *Xysticus sabulosus* gaat. Het voorkomen in ons land van *X. lineatus* is daardoor zeer twijfelachtig. De soortnaam is voorlopig van de Nederlandse lijst geschrapt.

FR: Schiermonnikoog (160a).

***Xysticus luctator* L. Koch, 1870**

□ *Xysticus luctator*; Becker 1882: 164. Van Hasselt 1886b: 68; 1890b: 203. Vogels et al. 2023: 3.

GL: Apeldoorn (Meervelderbosch) (236d), Hoog Soeren (129). UT: De Bilt (121), Utrecht ? (12).

***Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836)**

□ *Xysticus luctuosus*; Van Hasselt 1883a: xxxiii; 1886b: 68. Chrysanthus 1957b: 31. Tutelaers 2000: 13; 2001e (www).

GL: Wageningen (112, 121). NB: Cranendonck (230e). LI: Heerlen (62).

***Xysticus ulmi* (Hahn, 1831)**

□ *Xysticus ulmi*; Van Hasselt 1873a: xxvi; 1886b: 69. Becker 1879a: xli; 1882: 171. Kluyver 1933: 136. Chrysanthus 1953d: 88. Meijer 1974: 171. Van Helsdingen 1976: 37; 1984: 2; 1999a: 6; 1999b: 9; 2019b: 40. Meijer 1985: 136. Koomen 1986: 202; 1991: xviii; 1992: xxvii; 1993: xxxiii; 1998b: 225; 2010: 211; 2015: 159. Koomen et al., 2004: 206. Spoek 1997b: 6; 1999: 3; 2005: 25. Ma et al. 1997: 76. Kessler-Geschiere 2001: 15. Kessler 2004: 7. Prinsen 2005: 112; 2007: 141. Prinsen et al. 2006: 88; 2009: 192. Tutelaers 2006: 18; 2017: 279. Roelofs-Ditters 2007: 20. Lambeets 2008: 14. Van Helsdingen et al. 2009b: 17; 2012: 28, 29; 2013: 28. Dekkers-Scheutjens 2010: 21. Noordijk et al. 2010: 745. Cuppen 2010: 192. Van 't Veer et al. 2012: 13. Lambregts et al. 2013: 15. Colijn et al. 2017: 14. Vogels 2019: 29. Wielink et al. 2020: 342.

NL: (7, 121), (202s: wegbermen). FR: Appelscha (boswachterij Appelscha: Aeckingerzand) (183a), Fochteloeरveen (148e). DR: Anloo/Vries (Schipborg, Drentsche Aa) (211k), Emmen (Bargerveen) (225b), Emmen (Oosterbos) (225b), Emmen (Oeversebosje) (225c), Ruinen (182f), Westerbork (182f), Westerbork (Mantingerveld) (225d), Westerveld (Boschoord, Vledder Aa) (183a). OV: Denekamp-Lattrop (Brecklenkampsche Veld) (182x), Haaksbergen (182d), Oldemarkt (Weerribben) (197). GL: (12), uiterwaarden Waal (191a), Bronckhorst/Vorden (Grote Veld) (211n), Renkum (Laag-Wolfheze) (211j), Wageningen (181b). FL: Dronten (Harderbos) (182m), Luttelgeest (Kuinderbos) (150p), Zeewolde (Winkelse Zand) (70c, 182m). UT: (12), Amersfoort (69n). NH: Amstelveen (Amstelveense Poel) (175d), Kortenhoefse Plassen (147j), Velsen (100), Zaanstad (Westzijderveld) (232b), Zandvoort (Amsterdamse waterleidingduinen) (174i), Zwanenwater (148f). ZH: Wassenaar (NP Hollandse Duinen) (150w1). NB: Best (De Scheeken) (230v), Bladel (187a), Eindhoven (Urkhouvense Zegge) (230n), 's-Hertogenbosch (Moerputten) (215f), Oirschot (De Mortelen) (230v), Nuenen (Heerendonk) (215f), Reusel-De Mierden (Reuselse Moeren) (211m), Tilburg (Kaaistoep) (71p, 250d), Udenhout (De Brand) (182j). LI: Cottessen (182e), Helenaveen (Mariapeel) (147a), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Jabeek (193b), Maasband (186c), Maastricht (12), Ospel (Grote Peel) (147a), Oud-Valkenburg (Gerendal) (182a), Roerdalen (Hoosden) (150s), Roerdalen (Meinweg) (236c), Schipperskerk (Koeweide) (186c), Swalmen (50), Ter Hagen (186c), Wahlwiller (Kruisberg) (182e).

TITANOECIDAE

[*Pandava laminata* (Thorell, 1878)]

□ *Pandava laminata*; Rozwalka et al. 2016: 122.

NL: (217b). ZH: (in kas) (217b), Bleiswijk (kas) (217b).

***Titanoeca quadrigutata* (Hahn, 1833)**

□ *Titanoeca quadrigutata*; Van Hasselt 1885c: 143.

ZH: Loosduinen (119). LI: Nuth (119).

ULOBORIDAE

Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)

□ *Hyptiotes paradoxus*; Van Hasselt 1894: xl; 1898: 49. Chrysanthus 1952b: 45. Tutelaers 2001a: 119; 2001c: 8; 2009: 2; 2017: 277. Noordijk et al. 2011: 18. Van Helsdingen et al. 2012: 28; 2013: 28. Versteeg 2023: 13. Wielink et al. 2020: 184.

NL: (46). GL: Apeldoorn (134, 136), Apeldoorn/Ede (Hoge Veluwe) (232o), Beekbergen (Spelderholt) (232o). OV: Beuningen (230q), Latrop (Breklenkamp) (230q), Staphorst (Boswachterij Staphorst) (202u). GL: Apeldoorn/Ede (Hoge Veluwe) (232o). NB: Aalst (Achtereind) (230q), Heeze (Grote Heide) (230h, 230q), Heeze (Van Tuylhoeve) (230q), Herkenbosch (Meinweg) (150r), Liessel (Deurnsche Peel) (230q), Maasgouw (Linnerheide) (150s), Oirschot (De Mortelen) (230v), Someren (Moorsel) (230q), Someren (Keelven) (230q), Stramproy (Crixhoek, Kettingdijk) (230f, 230q), Swolgen (Schuitwater) (230q), Valkenswaard (Valkenhorst) (230q).

Uloborus plumipes Lucas, 1846

□ *Uloborus plumipes*; Van Helsdingen 1986a: 3. Roelofs-Ditters 2007: 18. Tutelaers 2010: 36. Noordijk et al. 2018: 8. Bloem et al. 2021: 38.

NL: kaartje (202y). GR: Groningen (in kas) (147l). GL: Malden (in huis) (230u), Spijk (Hooge Veld) 230u). FL: Emmeloord (230u). NH: Rijenhout (230u). ZH: Monster (230u), Rotterdam (Blijdorp) (16 l), Sliedrecht (230u). ZE: Rilland-Bath Eerste Bathpolder) (230u). NB: Dongen (215f), Geldrop (in huis) (230u).

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

□ *Uloborus walckenaerius*; Van der Hammen 1947b: 163. Chrysanthus 1952b: 45; 1954b: 40. Vossen 1985b: 6; 1985c: 215. Peeters et al. 1986: 93, 94.

GL: Hoge Veluwe (46, 79). LI: Melick (52), Reuver (204u), Vlodrop (Meinweg) (239d, 239f).

ZODARIIDAE

Zodarion italicum (Canestrini, 1868)

□ *Zodarion italicum*; Noordam 1998: 103. Bloem et al. 2021: 38.

ZH: Rotterdam (Blijdorp) (16 l). LI: Zuid-Limburg (201p).

Zodarion rubidum (Simon, 1914)

□ *Zodarion rubidum*; Verhoogt & IJland 2021: 7-12.

GL: Ede (232f), Elst (232f), ZH: Leiden (232f).

ZORIDAE, zie MITURGIDAE

ZOROPSIDAE

Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)

□ *Zoropsis spinimana*; Van Helsdingen 2007b: 36; 2015: 34; 2016: 22; 2019a: 42; 2023: 8. IJland 2010: 2.

NL: (150b). GL: Aalten (149y). UT: De Bilt (149y), IJsselstein (import) (149x, 149y), Utrecht (149g), Veenendaal (150v). NH: Amsterdam (164d). NB: Breda (149y), Son en Breugel (149y). LI: Heerlen (149y).

LITERATUUR – LIST OF REFERENCES

1. Aart, P.J.M. van der 1973. Distribution analysis of wolfspiders (Araneae, Lycosidae) in a dune area by means of principal component analysis. – Netherlands Journal of Zoology 23: 266-329.
2. Aart, P.J.M. van der 1974. Spinnen zonder web. – In: Bakker, K. (red.), Meijendel, duin-water-leven. Van Hoeve, Den Haag/ Baarn: 178-182.
3. Aart, P.J.M. van der & T. de Wit 1971. A field study on interspecific competition between ants (Formicidae) and hunting spiders (Lycosidae, Gnaphosidae, Ctenidae, Pisauridae, Clubionidae). – Netherlands Journal of Zoology 21: 117-126.
4. Aart, P.J.M. van der & N. Smeenk-Enserink 1975. Correlations between distributions of hunting spiders (Lycosidae, Ctenidae) and environmental characteristics in a dune area. – Netherlands Journal of Zoology 25: 1-45.
- 4a. Alderweireldt, M. 1987. Tweede Belgische waarneming van *Centromerus persimilis* (O.P.-Cambridge). (De verspreiding van deze soort in Europa.) – Arabel, Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging 4: 17-22.
- 4b. Alderweireldt, M. 1988. Enkele voor de Belgische fauna zeldzame spinnen (Araneae). – Arabel, Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging 7: 19-21.
- 4n. Anonymus 2003. Nieuwsflits: Tijgerspin ontdekt. – Tussen duin en dijk 2: 22.
- 4p. Anonymus 2005. Wespenspin in de Krimpenerwaard. – Zuid-Hollands Landschap 2005(4): 14.
- 5a. Anthes, N. 2000. Verbreitung und ökologische Charakterisierung der Kugelspinne *Theridion hemerobium* Simon, 1914 (Araneae: Theridiidae) in Europa. – Arachnologische Mitteilungen 20: 43-55.
5. Arnoud, Br. 1965. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de maandvergadering van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, te Heerlen op woensdag 14 juli 1965.] – Natuurhistorisch Maandblad 54: 87-88.
6. Ausserer, A. 1871. Beiträge zur Kenntnis der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor.). – Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 21: 117-224.
7. Becker, L. 1879a. Aranéides de Néerlande. – Annales de la Société entomologique de Belgique 22, C.R.: xxxix-xlvii.
8. Becker, L. 1879b. Aranéides nouveaux pour la faune de Belgique. – Annales de la Société entomologique de Belgique 22, C.R.: cxxxix-xc.
9. Becker, L. 1879c. Aranéides nouveaux pour la faune néerlandaise. – Annales de la Société entomologique de Belgique 22, C.R.: cxxix.
10. Becker, L. 1879d. Espèces nouvelles d'Aranéides de Néerlande. – Annales de la Société entomologique de Belgique, 22, C.R.: clxxvi.
11. Becker, L. 1881. Arachnides nouveaux pour la faune néerlandaise. – Annales de la Société entomologique de Belgique 25, C.R.: xxviii-xxix.
12. Becker, L. 1882. Les Arachnides de Belgique, 1e partie. – Annales du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 10: 1-246.
- 13a. Becker, L. 1896a. Les Arachnides de Belgique, 2e partie. – Annales du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 12 (1): 1-127.
- 13b. Becker, L. 1896b. Les Arachnides de Belgique, 3e partie. – Annales du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 12 (2): 1-378.
- 15a. Belgers, D. 2011. Levensloop van een ectoparasiet (Hymenoptera) op *Tetragnatha montana* (Aaneae, Tetragnathidae). – Nieuwsbrief SPINED 30: 11-13.
- 15c. Bennet, J.A. & G. Olivier 1825. Naamlijst van Nederlandse Insecten. – Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 14: 1-521.
- 16a. Benno, P. 1969. Aantekeningen bij enige Nederlandse weg wespen (Hymenoptera, Pompilidae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 29: 72-76.
- 16b. Berg, M.P. 1997. Decomposition, nutrient flow and food web dynamics in a stratified pine forest soil. – Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam. [proefschrift]
- 16e. Bink, J. & P.J. van Helsdingen 2014. *Theridion hannoniae* (Denis, 1944) (Araneae, Theridiidae) nieuw voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 34: 7-11.
- 16f. Bink, J. 2014a. *Cryptachaea blattea* (Urquhart, 1886) (Araneae, Theridiidae) voor het eerst waargenomen in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 34: 11.
- 16g. Bink, J. 2014b. *Parasteatoda tabulata* Levi, 1980 (Araneae, Theridiidae) voor het eerst waargenomen in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 34: 12-15.

- 16h. Bink, J. 2016. Transport van spinnen naar Nederland: een voorbeeld van een bedrijf in Papendrecht. – Nieuwsbrief SPINED 36: 2-4.
- 16 i. Bink, J. 2019. Spinnentransport, voorbeelden van een Papendrechts bedrijf II: aanvullingen, inclusief een nieuwe importsoort voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 38: 5-7.
- 16k. Blick, T. & N. Klapkarek 1993. *Neriene hammeni* - neu für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). – Arachnologische Mitteilungen 5: 39-42.
- 16 l. Bloem, G.J. & J. Noordijk, J. 2021. Arachnids (Arachnida: Araneae, Mesostigmata, Pseudoscorpiones) from tropical greenhouses at Rotterdam Zoo (the Netherlands), including a pholcid spider new to Europe. – Arachnologische Mitteilungen 61: 36-44.
- 16m. Bokx, E.M. de 1997. Hydrobiologisch onderzoek in de Amsterdamse waterleidingduinen. [Omschrijving van de monsterlocaties op basis van de gevonden macrofauna.] – Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Vogelenzang.
- 17a. Bonte, D. 2006. Spinnen van mosduinen en duingraslanden in de duinen van Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 21: 3-16.
- 17b. Bonte, D. & I. van Thournout 2003a. De spinnenfauna van de grijze duinen van de Amsterdamse Waterleidingsduinen en het Noordhollands duinreservaat: soortensamenstelling, diversiteit en vergelijking met de Vlaamse en Noord-Franse duingebieden. – Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie: 1-65.
- 17c. Bonte, D., P. Criel, I. van Thournout & J.-P. Maelfait 2003b. Regional and local variation of spider assemblages (Araneae) from coastal grey dunes along the North Sea. – Journal of Biogeography 30: 901-911.
- 17p. Boorn, M. van der 1939. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de Roermondsche vergadering van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg op 5 september 1939.] – Natuurhistorisch Maandblad 28: 85.
- 17q. Bosmans, R. 1991. Enkele opmerkingen over vroeger van België geciteerde spinnen, waarvan het voorkomen in ons land twijfelachtig is of dient bevestigd te worden. – Arabel, Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging 6(3): 9-12.
- 17r. Bosmans, R. 1988. Verslag van de Arabel-Spined excursie van 24.v.1986 naar de "Landschotse Heide" (Nederland), de "Korhaan" en de "Liereman" (België). – Arabel, Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging 7: 29-33.
18. Bouwman, B.E. 1909. De zwarte mijnspin (*Atypus spec.*). – De Levende Natuur 14: 9-12.
19. Bouwman, B.E. 1913. De gele dovenetel (*Galeobdolon luteum*.). – De Levende Natuur 18: 54-60.
20. Bouwman, B.E. 1915. De weg wespen en hun parasiet (*Pompilus* en *Ceropales*). – De Levende Natuur 20: 241-246.
21. Bouwman, B.E. 1916. Een nieuwe weg wesp? *Calicurgus fasciatellus* (= *hyalinatus*). – De Levende Natuur 21: 245-247.
22. Bouwman, B.E. 1935. Spinneweb. – De Levende Natuur 40: 78-87.
23. Bouwman-Buis, C.M. 1939a. Een aardige wolfspin. *Ocyale mirabilis* Cl., de merkwaardige hardloper. – De Levende Natuur 43: 171-176.
24. Bouwman, B.E. 1939b. Kaardespinnen. – De Levende Natuur 44: 75-79.
- 25a. Bouwman, B.E. 1939c. Het heidekaardertje. – De Levende Natuur 44: 142-146.
- 25b. Bruyn, G.J. de 1996. Dierengemeenschappen in de Hollandse duinen. – Meijendel Mededelingen 30: 13-50.
- 25s. Buizer, J. 1982. De bodemfauna van ANS, (IV) de spinnen. – Natura 79: 72-74.
26. Cambridge, O. Pickard- 1885. Descriptions of two new species of Araneidea. – Annals and Magazine of Natural History (5) 16: 237-238.
27. Christilla, M. 1957. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de maandvergadering van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, te Maastricht, op woensdag 3 juli 1957.] – Natuurhistorisch Maandblad 46: 86.
28. Chrysanthus, P. 1947a. Spinnen en Hymenoptera Aculeata. – Tijdschrift voor Entomologie 88: 482-488.
29. Chrysanthus, P. 1947b. Onze huisspinnen. – De Levende Natuur 50: 102-104.
30. Chrysanthus, P. 1948a. De labyrinthspin (*Agelena labyrinthica* (L.)). – De Levende Natuur 51: 43-46.
31. Chrysanthus, P. 1948b. De labyrinthspin (*Agelena labyrinthica* (L.)). – De Levende Natuur 51: 57-60.
32. Chrysanthus, P. 1949a. Paringsbiologie bij spinnen. – In: Besemer, A.F.H. (red.), In het voetspoor van Thijssse. – Veenman, Wageningen: 349-359.

33. Chrysanthus, P. 1949b. De gerande oeverspin (*Dolomedes*). – De Levende Natuur 52: 133-139.
- 34 . Chrysanthus, P. 1950a. Spinachtigen en Duizendpoten. – Wat leeft en groeit 33: 1-147.
35. Chrysanthus, P. 1950b. *Tetragnatha nigrita* Lendl nieuw voor de Nederlandse fauna. – Entomologische Berichten, Amsterdam 13: 145-146.
36. Chrysanthus, P. 1950c. Onze "Kameleon-spinnen" (*Misumena vatia* en *Thomisus albus*). – Natuurhistorisch Maandblad 39: 135-139.
37. Chrysanthus, P. 1950d. De sidderspin (*Pholcus phalangioides* Fuessl.). – De Levende Natuur 53: 81-86.
38. Chrysanthus, P. 1951a. Spinnen en water II. – De Zwerver 11: 26-28.
39. Chrysanthus, P. 1951b. Springspinnen 1. – De Zwerver 11: 135-137.
40. Chrysanthus, P. 1951c. *Clubiona germanica* Thorell 1870 (Araneae, Clubionidae), f.n.sp. – Entomologische Berichten, Amsterdam 13: 272.
41. Chrysanthus, P. 1951d. Hangmatspinnen (Linyphiidae). – De Levende Natuur 54: 81-84.
42. Chrysanthus, P. 1951e. Een mooie zeldzame kruisspin uit Zuid-Limburg (*Araneus alsine* Wilk.). – Natuurhistorisch Maandblad 40: 62-63.
43. Chrysanthus, P. 1951f. Enkele goede spinnevengsten uit Zuid-Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad 40: 77.
44. Chrysanthus, P. 1951g. Spinnen uit Limburg . - Natuurhistorisch Maandblad 40: 97-100.
45. Chrysanthus, P. 1952a. Springspinnen II. – De Zwerver 12: 115-118.
46. Chrysanthus, P. 1952b. Een merkwaardige kaardespin (*Uloborus walckenaeri* Latr.). – De Levende Natuur 55: 45-49.
47. Chrysanthus, P. 1953a. Over de variabiliteit van enkele kruisspin-soorten. – Entomologische Berichten, Amsterdam 14: 209-215.
48. Chrysanthus, P. 1953b. Is *Meta mengei* Blackwall a variety of *Meta segmentata* (Clerck)? (Aranei-Argiopidae). – Zoologische Mededelingen 32: 155-163.
49. Chrysanthus, P. 1953c. Mierspinnen. – De Zwerver 13: 113-116.
50. Chrysanthus, P. 1953d. Spinnen uit Limburg . II. – Natuurhistorisch Maandblad 42: 87-88.
51. Chrysanthus, P. 1954a. Spinachtigen-Arachnoidea. I. Nederlandse spinnen. – Wetenschappelijke Mededelingen. K.N.N.V. 13 (1e druk): 1-30.
52. Chrysanthus, P. 1954b. Spinnen uit Limburg III. – Natuurhistorisch Maandblad 43: 39-40.
53. Chrysanthus, P. 1955a. "Moederliefde" bij spinnen 1. – De Zwerver 15: 40-41.
54. Chrysanthus, P. 1955b. Kannibalisme bij spinnen. – De Zwerver 15: 191-192.
55. Chrysanthus, P. 1955c. Spinnen uit Limburg. IV. – Natuurhistorisch Maandblad 44: 16.
56. Chrysanthus, P. 1955d. On defectively regenerated palps in male spiders. – Natuurhistorisch Maandblad 44: 56-59.
57. Chrysanthus, P. 1955e. Spinnen, nieuw voor de Nederlandse fauna (Aran.). – Entomologische Berichten, Amsterdam 15: 494.
58. Chrysanthus, P. 1955f. Notes on spiders I. – Entomologische Berichten, Amsterdam 15: 301-303.
59. Chrysanthus, P. 1955g. Notes on spiders II. – Entomologische Berichten, Amsterdam 15: 518-520.
60. Chrysanthus, P. 1956. Defensie-politiek bij spinnen. – De Zwerver 16: 139-143.
61. Chrysanthus, P. 1957a. Enkele merkwaardige spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 17: 44-45.
62. Chrysanthus, P. 1957b. Spinnen uit Limburg. V. (1954-1956). – Natuurhistorisch Maandblad 46: 31.
63. Chrysanthus, P. 1958a. Notes on spiders III. The females of some *Clubiona* species. – Entomologische Berichten, Amsterdam 18: 111-115.
64. Chrysanthus, P. 1958b. Spinnen uit Limburg. VI (1954-1958). – Natuurhistorisch Maandblad 47: 143-144.
65. Chrysanthus, P. 1961. Spinnen uit Limburg. VII (1958-1960). – Natuurhistorisch Maandblad 50: 40-41.
66. Chrysanthus, P. 1963. Spinachtigen - Arachnida. I. Nederlandse spinnen. – Wetenschappelijke Mededelingen. K.N.N.V. 13 (2e druk): 1-32.
67. Chrysanthus, P. 1965. On the identity of *Coelestes atropos* (Walckenaer), *saxatilis* (Blackwall) and *terrestris* (Wider) (Araneida, Agelenidae). – Tijdschrift voor Entomologie 108: 61-71.
68. Chrysanthus, P. 1966. Spinnen uit Limburg VIII (1961-1965). – Natuurhistorisch Maandblad 55: 156-157.
69. Chrysanthus, P. 1971. Spinachtigen - Arachnida. I. Nederlandse spinnen. – Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V. 13 (3e druk): 1-32.

- 69a. Chrysanthus, P. 1980. Spinachtigen - Arachnida. Nederlandse spinnen. Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V. 141 (4e, herziene druk door P.J. van Helsdingen): 1-32.
- 69b. Chrysanthus, P., E.N.G. van Damme & C. Naaktgeboren 1959. Enige nieuwe spinnesoorten voor de Nederlandse fauna. – Entomologische Berichten, Amsterdam 19: 182-185.
- 69m. Colijn, E. 2011. De 1.000-soortendag en de biodiversiteit van het Kuinderbos. In: Bergman, H., R. Knol, T. Klooster, M. de Vrieze & G. van Breemen 2011, Wandel en handel op de zeebodem, 50 jaar Kuinderbos, schitterende 're-creatie' op waardeloze grond, pp. 81-90. – Staatsbosbeheer Regio Oost.
- 69n. Colijn, E., K. Quaadgras, K. de Heer, R. van Assema & R. Kleukers 2017. 2582 soorten planten en dieren in Amersfoort. – Nieuwsbrief EIS Kenniscentrum Insecten en Overige Ongewervelden 65: 13-30.
- 70a. Coolen, F.C.M. 1994. Het Dubbroek in ontwikkeling. – Natuurhistorisch Maandblad 83: 34-40.
- 70b. Cuppen, J.G.M & P.J. van Helsdingen 2010. Eerste waarneming van de Grote Gerande Oeverspin *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) In de provincie Gelderland (Araneae, Pisauridae). – Nieuwsbrief SPINED 28: 2-4.
- 70c. Cuppen, J.G.P. 2010. Entomofauna van Flevoland. Verslag van de 164^e zomerbijeenkomst te Kraggenburg. Araneae - spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 70: 110-212.
- 70d. Damme, E.N.G. van, R. Wijsman & C. Naaktgeboren 1959. Verslag van het onderzoek Molenvennen - Saasvelderseveen. – RIN, Leersum. [ongenummerd RIN-rapport]
- 70e. De Koninck, H. 2009. *Enoplognatha oelandica* (Thorell, 1875), een nieuwe spinnensoort voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 26: 3-4.
- 70f. De Koninck, H. 2010. *Zelotes aeneus* (Simon, 1878) (Araneae, Gnaphosidae), een nieuwe spinnensoort voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 28: 31-32.
- 71a. Decae, A.E. 1993. De een z'n dood is de ander z'n brood, of wel een triest geval van uitsterven in Rotterdam. – Straatgras 5: 122-124.
- 71b. Decae, A.E. 1996. De spinnen van 10-hoog. Deel 1 *Clubiona terrestris*. – Straatgras 8: 46-47.
- 71c. Decae, A.E. 1997a. De spinnen van 10-hoog. Deel 2: De 1^e en 2^e sexe. – Straatgras 9: 18-19.
- 71d. Decae, A.E. 1997b. De spinnen van 10-hoog. Deel 3: Spinnenplaag in flatgebouw Ternate. – Straatgras 9: 47-49.
- 71e. Decae, A.E. 1998a. De spinnen van 10-hoog. Deel 4: Ballooning. – Straatgras 10: 19- 21.
- 71f. Decae, A.E. 1998b. De spinnen van 10-hoog. Deel 5: Nieuwerwetse spinnen in ouderwetse spinsels. – Straatgras 10: 57- 59.
- 71g. Decae, A.E. 1999. De spinnen van 10-hoog. Deel 6: Angts, Agressie en Afhankelijkheid. – Straatgras 11: 22- 25.
- 71h. Decae, A.E. 2000a. De spinnen van 10-hoog. Deel 7: De kosmopoliet en zijn gevolg. – Straatgras 12: 22- 25.
- 71 i. Decae, A.E. 2000b. De spinnen van 10-hoog. Deel 8: Slap gif. – Straatgras 12: 46-48.
- 71j. Decae, A.E. 2001a. De spinnen van 10-hoog. Deel 9: Panta Rheï. – Straatgras 13: 18-21.
- 71k. Decae, A.E. 2001b. De spinnen van 10-hoog. Deel 10: Lof der dyslexie. – Straatgras 13: 46-49.
- 71 l. Decae, A.E. 2003. De spinnen van 10-hoog. Deel 12: Story telling animals. – Straatgras 15: 5-8.
- 71k. Deeleman-Reinhold, C.L. 1978. New data from old books? – Newsletter British Arachnological Society 22: 4.
- 71l. Deeleman-Reinhold, C.L. & P.R. Deeleman 1988. Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderinae), les espèces méditerranéennes occidentales exceptées. – Tijdschrift voor Entomologie 131: 141-269.
- 71m. Deeleman-Reinhold, C.L. 1990. Changes in the spider fauna over 14 years in an industrially polluted area in Holland. – Acta Zoologica Fennica 190: 103-110.
- 71p. Dekkers-Scheutjens, A. 2010. Spinnen (Araneae) van het Natuurreervaat "De Kaaistoep". – Nieuwsbrief SPINED 28: 8-21.
72. Drift, J. van der 1951. Analysis of the animal community in a beech forest floor. – Tijdschrift voor Entomologie 94: 1-168.
73. Edgar, W.D. 1970. Prey and feeding behaviour of adult females of the wolf spider *Pardosa amentata* (Clerck). – Netherlands Journal of Zoology 20: 487-491.
74. Edgar, W.D. 1972. The life-cycle of the wolf spider *Pardosa lugubris* in Holland. – Journal of Zoology 168: 1-7.
75. Eijndhoven, G.L. van 1946. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 99e zomer vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Amsterdam op zaterdag 14 juni 1944.] – Tijdschrift voor Entomologie 87: xxiii.

- 75a1 Elfferich, C. 2022. Grote piraat let op de kleintjes. – Natura 119: 24.
- 75a2. Faber, J.H., R.J.M. van Kats, B. Aukema, J. Bodt, J. Burgers, D.R. Lammertsma & A.P. Noordam 1999. Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden. – IBN-Rapport 442, 48 pp. + 2 bijlagen.
- 75b. Faber, J.H., J. Burgers, B. Aukema, J.M. Bodt, J. Burgers, R.J.M. van Kats, D.R. Lammertsma & A.P. Noordam 2001. Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden. Monitoringsverslag 2000. – Alterra-rapport 287, 58 pp.
- 75c. Feekes, W. 1936. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeer-polder, de eerste grote droogmakerijk van de Zuiderzee. – Landbouwhoogeschool Wageningen, Wageningen. [proefschrift]
- 75d. Feenstra, M. 2016. Winterkoning dodelijk verstrikt in spinnenweb. – Natura 113: 14-15.
- 75f. Felix, C. 1986. [Wetenschappelijke mededeling tijdens bijeenkomst van 5 september 1985 van het Natuurhistorisch Genootschap: *Argiope bruennichi* in Zuid-Limburg.] – Natuurhistorisch Maandblad 75: 145.
- 75g. Fleurbaaij, P. 2024. The spider with the smiley ☺ *Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866) in the lead (Araneae: Gnaphosidae) [De spin met de smiley ☺ *Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866) in de hoofdrol (Araneae: Gnaphosidae)]. – Nieuwsbrief Spined 41: 2-6.
- 75n. Fokkema, J. 1978. Over de spinnenfauna van een houtwal (Araneida). – Entomologische Berichten, Amsterdam 38: 98-102.
- 75p. Fokkema, J. 1978a. Wolfspinnen. – Veld en Vitrine 62: 596-597.
- 75q. Fokkema, J. 1978b. De "dwergspin" en het "zout". – Veld en Vitrine 63: 608-609.
- 75r. Fokkema, J. 1980. Spinnen van het Friese vasteland - (1) . – Veld en Vitrine 69: 719-725.
- 75s. Fokkema, J. 1981. Spinnen van het Friese vasteland. 2. Strekspinnen. – Veld en Vitrine 1981 (73): 806-808.
- 75t. Fokkema, J. 1996. Alledaagse soorten dichterbij – de Kruisspin. – Twirre 7: 14-17.
- 75u. Fokkema, J. 2000. "Vreemde" kruisspinnen. – Veld en Vitrine 146: 2077.
- 75v. Fokkema, J. 2000. Niet alledaagse celspin te Huins. – Fries Naturmuseum Leeuwarden, website.
--- Folmer, T., zie Tiddo-Folmer.
- 75w1. Franken, O. & M.P. Berg 2016. Entomofauna in de gemeente Ede. Verslag van de 170^e NEV-zomerbijeenkomst. – Entomologische Berichten 76: 174-195.
- 75w2. Franken, O. & M.P. Berg 2018. Entomofauna van de Noord-Hollandse duinen. Verslag van de 171^e NEV-zomerbijeenkomst. – Entomologische Berichten 78: 42-69.
- 75y. Fürst, P.-A. & G. Blandenier 1993. *Psilochorus simoni* (Berland, 1911) (Araneae, Pholcidae): Découvertes de nouvelles stations suisses et discussions de son écologie. – Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles 116: 75-85.
- 75y2. Giesbers, E. 2023. Grote Gerande Oeverspin. Waakzame watertijger. – Roots, September 2023: 68-73.
- 75z. Graaf, D.Th. de 1988. [Wetenschappelijke mededeling tijdens bijeenkomst van 1 oktober 1987 van het Natuurhistorisch Genootschap: *Argiope bruennichi* in Zuid-Limburg.] – Natuurhistorisch Maandblad 77: 2.
- 76a. Groneman, H.J.H. 1899. Geldersche "Reuzenspinnen". – De Levende Natuur 4: 69.
- 76b. Grunsven, R.H.A. van 2010. De Gewone mijnspin (*Atypus affinis*) in Oost-Nederland (Araneae, Atypidae). - Nieuwsbrief SPINED 29: 4-5.
77. Halm, H. van, 1963. De grote wolfspin. – Natura 60: 167-174.
78. Hammen, L. van der 1947a. Notes on the spiderfamily Hahniidae. – Zoologische Mededelingen 28: 287-290.
79. Hammen, L. van der 1947b. De spin *Uloborus walckenaeri* Latr. – Entomologische Berichten, Amsterdam 12: 163.
80. Hammen, L. van der 1947c. Opiliones en Araneae uit Zuid Limburgsche grotten. – Tijdschrift voor Entomologie 87: 477-481.
81. Hammen, L. van der 1949a. On Arachnida collected in Dutch greenhouses. – Tijdschrift voor Entomologie 91: 72-82.
82. Hammen, L. van der 1949b. Over levend naar Nederland getransporteerde exotische spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 12: 374.
83. Hammen, L. van der 1950. The Arachnida of the artificial caves in Southern Limburg (Netherlands). – Natuurhistorisch Maandblad 39: 108-113.
84. Hammen, L. van der 1953. Spinnen in onze kolenmijnen. – Natuurhistorisch Maandblad 42: 17.

85. Hammen, L. van der 1969. Aanvullende gegevens over de kassenfauna van Nederland. – Zoologische Bijdragen 11: 25-28.
86. Hasselt, A.W.M. van 1858a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 13e Algemene Vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Utrecht, den 4den july 1857.] – Tijdschrift voor Entomologie 1: 40-41.
87. Hasselt, A.W.M. van 1858b. Over huid- en kleurverwisseling van *Dolomedes fimbriatus* (Hahn) in verband met zijne soort-bepaling en die van andere spinnen uit dit geslacht. – Tijdschrift voor Entomologie 1: 163-167.
88. Hasselt, A.W.M. van 1862. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 17e algemene vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Haarlem den 24sten augustus 1861.] – Tijdschrift voor Entomologie 5: 18.
89. Hasselt, A.W.M. van 1869. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 23e algemeene vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Gehouden te Nijmegen, den 25sten juli 1868.] – Tijdschrift voor Entomologie 12: 25-27.
90. Hasselt, A.W.M. van 1870a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 24e algemene vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Zwolle, den 31sten juli 1869.] – Tijdschrift voor Entomologie 13: 21-22.
91. Hasselt, A.W.M. van 1870b. Araneae op de excursie van 1 aug. 1869 te Molencate gevangen door Dr. A.W.M. van Hasselt. – Tijdschrift voor Entomologie 13: 30.
92. Hasselt, A.W.M. van 1870c. Studien over den *Pholcus opilionoides*, Schrank. – Tijdschrift voor Entomologie 13: 159-174.
93. Hasselt, A.W.M. van 1870d. Études sur le *Pholcus opilionoides* Schrank. – Archives néerlandaises des Sciences Exactes et naturelles 5: 340-356.
94. Hasselt, A.W.M. van 1871. Excursie juni 1870. – Tijdschrift voor Entomologie 14: 46-47.
95. Hasselt, A.W.M. van 1872a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 26e zomer vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Breda den 1sten juli 1871.] – Tijdschrift voor Entomologie 15: xii-xix.
96. Hasselt, A.W.M. van 1872b. [Verslag van excursie naar het Mastbosch en de Galdersche heide bij Breda.] – Tijdschrift voor Entomologie 15: xxix-xxxvi.
97. Hasselt, A.W.M. van 1872c. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de winter vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden den 23sten december 1871.] – Tijdschrift voor Entomologie 15: lxii- lxvi.
98. Hasselt, A.W.M. van 1872d. Over den *Eresus annulatus* Hahn.- Tijdschrift voor Entomologie 15: 113-117.
99. Hasselt, A.W.M. van 1872e. Observation de la copulation chez l'une des plus petites espèces d'araignées (*Micryphantes* s. *Erigone rurestris* C. Koch). – Archives néerlandaises des Sciences Exactes et naturelles 7: 460-465.
100. Hasselt, A.W.M. van 1873a. [Verslag van excursie naar Velzen.] – Tijdschrift voor Entomologie 16: xxvi-xxviii.
101. Hasselt, A.W.M. van 1873b. Waarneming der copulatie bij eene der kleinste spinsoorten (*Micryphantes* s. *Erigone rurestris*, C. Koch). – Tijdschrift voor Entomologie 16: 61-66.
102. Hasselt, A.W.M. van 1876a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 30e zomer vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Amsterdam op zaterdag 24 juli 1875.] – Tijdschrift voor Entomologie 19: x-xiv.
103. Hasselt, A.W.M. van 1876b. [Verslag excursie naar Hilversum.] – Tijdschrift voor Entomologie 19: li-liv.
104. Hasselt, A.W.M. van 1876c. Geschiedenis van een spinnen-cocon (*Agelena* s. *Agroeca brunnea* Blackw.). – Tijdschrift voor Entomologie 19: 28-42.
106. Hasselt, A.W.M. van 1876d. Histoire d'un cocon d'araignée (*Agelena* s. *Agroeca brunnea* Blackw.). – Archives néerlandaises des Sciences Exactes et naturelles 11: 117-130.
107. Hasselt, A.W.M. van 1877. [Verslag excursie in de omgeving van Middelburg.] – Tijdschrift voor Entomologie 20: xxvi-xxvii.
108. Hasselt, A.W.M. van 1879a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 33e zomer vergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Nijmegen op zaterdag 29 juni 1873.] – Tijdschrift voor Entomologie 22: xiii-xvii.

109. Hasselt, A.W.M. van 1879b. [Verslag excursie naar den St. Jansberg onder Mook.] – Tijdschrift voor Entomologie 22: xxiii-xxvi.
110. Hasselt, A.W.M. van 1880. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 34e zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Haarlem op zaterdag 30 augustus 1879.] – Tijdschrift voor Entomologie 23: xi-xii.
111. Hasselt, A.W.M. van 1882. [Verslag van excursie naar Meersen en Valkenburg.] – Tijdschrift voor Entomologie 25: xxvii.
112. Hasselt, A.W.M. van 1883a. [Verslag van excursie naar Wageningen.] – Tijdschrift voor Entomologie 26: xxxii-xxxiii.
113. Hasselt, A.W.M. van 1883b. Kleine entomologische mededelingen, 7. Bijdrage over de nesten der zoogenaamde metselspinnen. – Tijdschrift voor Entomologie 26: 229-233.
114. Hasselt, A.W.M. van 1884a. [Verslag van excursie naar Drenthe.] – Tijdschrift voor Entomologie 27: xxii-xxiii.
115. Hasselt, A.W.M. van 1884b. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 17e wintervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden op 13 januari 1884.] – Tijdschrift voor Entomologie 27: lxxviii-lxxx.
116. Hasselt, A.W.M. van 1884c. Waarnemingen omtrent anomalien van de geslachtsdrift bij spinnennmares. – Tijdschrift voor Entomologie 27: 197-206.
117. Hasselt, A.W.M. van 1885a. [Verslag van excursie naar het Liesbosch bij Breda.] – Tijdschrift voor Entomologie 28: xxvii-xxix.
118. Hasselt, A.W.M. van 1885b. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 18e wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden op 25 januari 1885.] – Tijdschrift voor Entomologie 28: lxxxix-xcv.
119. Hasselt, A.W.M. van 1885c. Catalogus Aranearum hucusque in Hollandia inventarum. – Tijdschrift voor Entomologie 28: 113-188.
120. Hasselt, A.W.M. van 1886a. [Verslag van excursie naar Valkenveen.] – Tijdschrift voor Entomologie 29: xxxiii-xxxvi.
121. Hasselt, A.W.M. van 1886b. Catalogus Aranearum, hucusque in Hollandia inventarum. – Tijdschrift voor Entomologie 29: 51-102.
122. Hasselt, A.W.M. van 1886c. Catalogus Aranearum, hucusque in Hollandia inventarum, suppl. I. – Tijdschrift voor Entomologie 29: 103-110.
123. Hasselt, A.W.M. van 1887a. [Verslag van excursie naar Winterswijk.] – Tijdschrift voor Entomologie 30: xxxi-xxxii.
124. Hasselt, A.W.M. van 1887b. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 2e wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden op 16 januari 1887.] – Tijdschrift voor Entomologie 30: xciv-xcviii.
125. Hasselt, A.W.M. van 1888. [Verslag van excursie naar Valkenburg.] – Tijdschrift voor Entomologie 31: xxvii-xxix.
126. Hasselt, A.W.M. van 1889a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 43e zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Apeldoorn op zaterdag 23 juni 1888.] – Tijdschrift voor Entomologie 32: xiii-xvi.
127. Hasselt, A.W.M. van 1889b. [Verslag van excursie naar Hoog Soeren.] – Tijdschrift voor Entomologie 32: xxv-xxviii.
128. Hasselt, A.W.M. van 1890a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens 44e zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Bergen-op-Zoom, op zaterdag 13 juli 1889.] – Tijdschrift voor Entomologie 33: xiv-xviii.
129. Hasselt, A.W.M. van 1890b. Catalogus Aranearum, hucusque in Hollandia inventarum, suppl. II. – Tijdschrift voor Entomologie 33: 181-214.
130. Hasselt, A.W.M. van 1891. [Verslag van excursie naar Groesbeek.] – Tijdschrift voor Entomologie 34: xl-xli.
131. Hasselt, A.W.M. van 1892. [Verslag van excursie naar De Lutte.] – Tijdschrift voor Entomologie 35: xxvii-xxix.
132. Hasselt, A.W.M. van 1893a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 47e zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Tilburg op zaterdag 16 juli 1892.] – Tijdschrift voor Entomologie 36: xii-xvii.

133. Hasselt, A.W.M. van 1893b. [Verslag van excursie naar Oisterwijk.] – Tijdschrift voor Entomologie 36: xxxii.
134. Hasselt, A.W.M. van 1894. [Verslag van excursie naar Laag-Soeren.] – Tijdschrift voor Entomologie 37: xli.
135. Hasselt, A.W.M. van 1896. [Verslag van excursie naar Loosduinen.] – Tijdschrift voor Entomologie 39: lvii.
136. Hasselt, A.W.M. van 1898. Catalogus Aranearum, hucusque in Hollandia inventarum, suppl. III. – Tijdschrift voor Entomologie 41: 46-76.
137. Heerdt, P.F. van & M. F. Möller Bruyns 1960. A biocenological investigation in the yellow dune region of Terschelling. – Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275.
138. Heerdt, P.F. van & W. Bongers 1967. A biocenological investigation of salt marshes on the south coast of the isle of Terschelling. – Tijdschrift voor Entomologie 110: 107-131.
139. Heimans, E. 1906. Een zeldzame spin. – De Levende Natuur 11: 24-26.
140. Helsdingen, P.J. van 1961. Revision of the Micryphantidae and Linyphiidae of the Van Hasselt collection. – Zoologische Mededelingen 37: 241-263.
141. Helsdingen, P.J. van 1963a. *Linyphia hammeni*, a new species, and its relation to *Linyphia albolimbata* Karsch (Araneida, Linyphiidae). – Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen C 66: 153-156.
142. Helsdingen, P.J. van 1963b. The Micryphantidae and Linyphiidae (Araneida) of the Netherlands, with some notes on the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866. – Zoologische Verhandelingen 62: 1-38.
143. Helsdingen, P.J. van 1965. Sexual behaviour of *Lepthyphantes leprosus* (Ohlert) (Araneida, Linyphiidae), with notes on the function of the genital organs. – Zoologische Mededelingen 41: 15-42.
144. Helsdingen, P.J. van 1968. Comparative notes on the species of the Holarctic genus *Stemonyphantes* Menge (Araneida, Linyphiidae). – Zoologische Mededelingen 43: 117-139.
145. Helsdingen, P.J. van 1969. A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning on the genitalia (Araneida, Linyphiidae). I. – Zoologische Verhandelingen 105: 1-303.
146. Helsdingen, P.J. van 1970. A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae). II. – Zoologische Verhandelingen 111: 1-86.
147. Helsdingen, P.J. van 1974. The affinities of *Wubana* and *Allomengea* with some notes on the latter genus (Araneae, Linyphiidae). – Zoologische Mededelingen 46: 295-321.
- 147a. Helsdingen, P.J. van 1976. Aandacht voor "De Peel" en haar spinnenfauna. – Entomologische Berichten, Amsterdam 36: 33-42.
- 147b. Helsdingen, P.J. van 1978a. Some synonymies in Old World spiders. – Zoologische Mededelingen 53: 185-197.
- 147c. Helsdingen, P.J. van 1978b. De Nederlandse Clubionidae en hun verspreiding. – Zoologische Bijdragen 25: 1-42.
- 147d. Helsdingen, P.J. van 1979. Remarks concerning Clubionidae. – Bulletin of the British Arachnological Society 4: 298-302.
- 147e. Helsdingen, P.J. van 1980. De mijnen in Limburg zijn nog niet dicht. – De Levende Natuur 82: 99-104.
- 147f. Helsdingen, P.J. van 1981a. Nieuwe spinnen uit het Peelgebied (Arachnida). – Entomologische Berichten, Amsterdam 41: 33-39.
- 147g. Helsdingen, P.J. van 1981b. A difficult start in spider faunistics. – Nieuwsbrief European Invertebrate Survey-Nederland 10: 13-16.
- 147h. Helsdingen, P.J. van 1982. Postglaciale uitbreiding van *Argiope bruennichi* Scop. nu ook tot in Nederland. – De Levende Natuur 84: 121-123.
- 147i. Helsdingen, P.J. van 1983. Excursie Duin en Kruidberg 1983. – Nieuwsbrief SPINED 1: 3-4.
- 147j. Helsdingen, P.J. van 1984. Excursie naar de Kortenhoefse Plassen in 1982. – Nieuwsbrief SPINED 2: 1-5.
- 147k. Helsdingen, P.J. van 1985. *Porrhomma*: een groep vol problemen. – Nieuwsbrief SPINED 3: 3-5.
- 147l. Helsdingen, P.J. van 1986a. *Uloborus plumipes* Lucas in ons land. – Nieuwsbrief SPINED 4: 3-4.
- 147m. Helsdingen, P.J. van 1986b. Discrimination between *Xysticus luctuosus* (Blackwall) and *X. acerbus* Thorell (Araneae, Thomisidae). – Mémoires de la Société Royal Belge d'Entomologie 33: 85-92.
- 147n. Helsdingen, P.J. van 1986c. The *Porrhomma microphthalmum* species-group. – Bulletin of the British Arachnological Society 7: 11-16.

- 147o. Helsdingen, P.J. van 1987. Het voorkomen van *Neriene hammeni* (Arachnida, Araneae, Linyphiidae) in Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad 76: 185-187.
- 147p. Helsdingen, P.J. van 1988a. *Segestria*-soorten in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 5: 1.
- 147q. Helsdingen, P.J. van 1988b. Note provisoire sur la répartition des espèces du genre *Segestria* aux Pays-Bas (Araneae, Segestriidae). – Bulletin de la Société des sciences de Bretagne 59 (hors série 1): 91-98.
- 147r. Helsdingen, P.J. van 1990a. The presence of *Segestria florentina* (Rossi) in the Netherlands. – Bulletin de la Société européenne d'Arachnologie, Hors Série 1: 353-357.
- 147s. Helsdingen, P.J. van 1990b. Subtropisch avontuur in Zeeland. – Stern 35: 24-27.
- 147t. Helsdingen, P.J. van 1993a. Gerande oeverspinnen in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 7: 17-18.
- 147u. Helsdingen, P.J. van 1993b. Grote wolfspinnen in Nederland. – Jaarboek Natuur 1993: 56-62.
- 147v. Helsdingen, P.J. van 1993c. Ecology and distribution of *Dolomedes* in Europe (Araneida: Dolomedidae). – Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 26: 181-187.
- 147w. Helsdingen, P.J. van 1995a. *Ceraticelus bulbosus* (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae), een ouder synoniem van *Ceraticelus sibiricus* Eskov, 1987, in Nederland gevonden. – Nieuwsbrief SPINED 9: 1-4.
- 147x. Helsdingen, P.J. van 1995b. Een stukje tropen in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 9: 4-6.
- 147y. Helsdingen, P.J. van 1995c. Ecology and distribution of *Dolomedes* in Europe (Araneida, Dolomedidae). – Proceedings of the 9th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Helsinki: 41-46.
- 147z. Helsdingen, P.J. van 1996a. Veldwerk in Nederlandse laagveenplassen in 1995. – Nieuwsbrief SPINED 10: 2-4.
- 148a. Helsdingen, P.J. van 1996b. Nieuwe soorten voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 10: 7-8.
- 148b. Helsdingen, P.J. van 1997a. Floodplain spider communities. – Proceedings of the 16th European Colloquium on Arachnology, Siedlce: 113-126.
- 148c. Helsdingen, P.J. van 1997b. Een klein ongemak door een klein spinnetje. – Nieuwsbrief SPINED 12: 11.
- 148d. Helsdingen, P.J. van 1998. Groot spinneweb in Groningen. – Nieuwsbrief SPINED 13: 5-7.
- 148e. Helsdingen, P.J. van 1999a. Spinnen van het Fochtelooërveen. – Nieuwsbrief SPINED 14: 5-7.
- 148f. Helsdingen, P.J. van 1999b. Spinnen van het Zwanenwater. – Nieuwsbrief SPINED 14: 7-10.
- 148g. Helsdingen, P.J. van 2000a. *Saitis barbipes* (Salticidae) in Nederland? – Nieuwsbrief SPINED 15: 22.
- 148h. Helsdingen, P.J. van 2000b. *Eresus sandaliatus* in haar rol betrapt. – Nieuwsbrief SPINED 15: 22-23.
- 148i. Helsdingen, P.J. van 2002a. Spinnen in de uiterwaarden rond Zaltbommel. – EIS Rapport 2002-01: 1-11.
- 148j. Helsdingen, P.J. van 2002b. Spinnen van de Ackerdijkse Plassen (Arachnida: Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 17: 10-11.
- 148k. Helsdingen, P.J. van 2003a. *Halorates reprobus* (O. P.-Cambridge, 1879) nieuw voor Nederland (Araneae, Linyphiidae). – Nieuwsbrief SPINED 18: 10-11.
- 148l. Helsdingen, P.J. van 2003b. *Tapinesthis inermis* (Simon, 1882) voor het eerst in ons land gevonden (Araneae, Oonopidae). – Nieuwsbrief SPINED 18: 19.
- 148m. Helsdingen, P.J. van 2003c. De veranderende verspreiding in Nederland van *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Araneae, Argiopidae). – Nieuwsbrief SPINED 18: 8-9.
- 148n. Helsdingen, P.J. van 2003d. Ongewervelde fauna van het Rijntakkengebied, met veldstudie in uiterwaarden rond Zaltbommel – Deelrapport spinnen. – EIS Rapport 2003-06: 1-25.
- 148o. Helsdingen, P.J. van 2004. *Philaeus chrysops* (Poda, 1761) (Salticidae) in ons land gezien. – Nieuwsbrief SPINED 19: 12.
- 148p. Helsdingen, P.J. van 2005a. De Grote gerande oeverspin *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757). – Waarnemingenverslag 2005, EIS-Nederland, De Vlinderstichting, Nederlandse Vereniging Libellenstudie: 4-6.
- 148q. Helsdingen, P.J. van 2005b. De Lentevuurspin *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778). – Waarnemingenverslag 2005, EIS-Nederland, De Vlinderstichting, Nederlandse Vereniging Libellenstudie: 7-9.
- 148y. Helsdingen, P.J. van 2005c. *Hasarius adansoni* (Audouin, 1826) in het vrije veld (Araneae: Salticidae). – Nieuwsbrief SPINED 20: 17.

- 149a. Helsdingen, P.J. van 2005d. Drie nieuwe spinnensoorten voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 20: 18.
- 149b. Helsdingen, P.J. van 2006a. *Icius subinermis* Simon, 1937 in Nederland waargenomen (Araneae, Salticidae). – Nieuwsbrief SPINED 21: 2.
- 149c. Helsdingen, P.J. van 2006b. Nieuwe soort voor Nederland in buitenlandse literatuur. – Nieuwsbrief SPINED 22: 22.
- 149d. Helsdingen, P.J. van 2006c. Nieuwe vindplaatsen voor *Dolomedes plantarius* (Clerck) (Araneae, Pisauridae) in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 22: 23-25.
- 149e. Helsdingen, P.J. van 2006d. Zwarte weduwe haalt krant. – Nieuwsbrief SPINED 22: 26.
- 149f. Helsdingen, P.J. van 2007a. Sluipend gevaar. – Nieuwsbrief SPINED 23: 35.
- 149g. Helsdingen, P.J. van 2007b. Van het exotenfront. – Nieuwsbrief SPINED 23: 36.
- 149h. Helsdingen, P.J. van 2008a. Terreinwinst voor *Steatoda grossa* (C.L. Kch, 1833) (Araneae, Theridiidae). – Nieuwsbrief SPINED 24: 29.
- 149i. Helsdingen, P.J. van 2008b. The distribution of *Segestria florentina* (Araneae, Segestriidae) in the Netherlands. – Nieuwsbrief SPINED 25: 3.
- 149j. Helsdingen, P.J. van 2009a. Nieuwe vindplaats van *Ozyptila rauda* Simon, 1875. – Nieuwsbrief SPINED 26: 12.
- 149k. Helsdingen, P.J. van 2009b. Nieuwe vindplaats van *Labulla thoracica* Wider. – Nieuwsbrief SPINED 26: 15.
- 149l. Helsdingen, P.J. van 2009c. Nieuwe vindplaatsen voor *Eresus sandaliatus* (Araneae, Eresidae). – Nieuwsbrief SPINED 27: 18.
- 149m. Helsdingen, P.J. van 2009d. Waar komt hij nog niet voor? – Nieuwsbrief SPINED 27: 29.
- 149n. Helsdingen, P.J. van 2010a. A new Dutch record of *Psilochorus simoni* (Berland, 1911) (Araneae, Pholcidae). – Nieuwsbrief SPINED 28: 7.
- 149o. Helsdingen, P.J. van 2010b. Vooraankondiging: The first record of *Gibbaranea ullrichi* (Hahn, 1835) (Araneae, Araneidae) from the Netherlands. – Nieuwsbrief SPINED 28: 22.
- 149p. Helsdingen, P.J. van 2010c. *Gibbaranea ullrichi* (Hahn, 1835) (Araneae, Araneidae) in the Netherlands. – Nieuwsbrief SPINED 29: 6-9.
- 149q. Helsdingen, P.J. van 2010d. *Thanatus vulgaris* Simon, 1870 in Nederland (Araneae, Philodromidae). – Nieuwsbrief SPINED 29: 10-12.
- 149r. Helsdingen, P.J. van 2010e. *Holocnemus pluchei* (Scopoli, 1763) in Nederland (Araneae, Pholcidae). – Nieuwsbrief SPINED 29: 27.
- 149s. Helsdingen, P.J. van 2011a. Welkom voor *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805) (Araneae, Hexathelidae). – Nieuwsbrief SPINED 31: 5-6.
- 149t. Helsdingen, P.J. van 2011b. Nieuwe vindplaatsen voor twee aandachtsoorten (Araneae, Pisauridae, Segestriidae). – Nieuwsbrief SPINED 31: 17.
- 149u. Helsdingen, P.J. van 2011b. Eindrapportage: Spin van het jaar 2011, de labyrinthspin *Agelena labyrinthica*. – Nieuwsbrief SPINED 31: 2-4.
- 149v. Helsdingen, P.J. van 2012. *Dolomedes plantarius* en *Tapinesthis inermis* (Araneae): stand van zaken eind 2012. – Nieuwsbrief SPINED 32: 22.
- 149w. Helsdingen, P.J. van 2013. Dynamiek in de spinnenwereld: stand van zaken bij enkele soorten. – Nieuwsbrief SPINED 33: 20.
- 149x. Helsdingen, P.J. van 2015. Binnenwandelende exoten. – Nieuwsbrief SPINED 35: 33-34.
- 149y. Helsdingen, P.J. van 2016. *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820), de Valse wolfspin: exoot of inheems?. – Nieuwsbrief SPINED 36: 22-24.
- 149z. Helsdingen, P.J. van 2016. Monitoring *Dolomedes plantarius* in het Waterloopbos. – Nieuwsbrief SPINED 36: 46.
- 150a. Helsdingen, P.J. van 2023. *Steatoda paykulliana* in Spaanse broccoli. – Nieuwsbrief SPINED 40: 23-24.
- 150b. Helsdingen, P.J. van 2023. De topverspreider *Zoropsis Spinimana*, de Stekelpotige Valse Wolfspin. – Nieuwsbrief SPINED 40: 8-11.
- 150k. Helsdingen, P.J. van, K. Thaler & C. Deltshev 1977. The *tenuis* group of *Leptyphantes* Menge (Araneae, Linyphiidae). – Tijdschrift voor Entomologie 220: 1-54.
- 150l. Helsdingen, P.J. van & S. IJland 2007. *Mermessus* species in the Netherlands (Araneae, Linyphiidae). – Nieuwsbrief SPINED 23: 27-29.

- 150m. Helsdingen, P.J. van & S. IJland 2008. Spinnen van de Reijerscamp (Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 24: 13-24.
- 150n. Helsdingen, P.J. van & J. van Dalen 2009a. Spinnen van de Wrakelberg bij Simpelveld (Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 26: 5-7.
- 150o. Helsdingen, P.J. van & S. IJland 2010. Spinnen van de Reijerscamp (Araneae), deel 2. – Nieuwsbrief SPINED 29: 13-18.
- 150p. Helsdingen, P.J. van, J. Miller & S. IJland 2009. Snelle inventarisatie van het Luttelgeest (Kuinderbos) in Flevoland (Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 27: 16-17.
- 150q. Helsdingen, P.J. van & S. IJland 2011. *Porrhomma microcavense* Wunderlich, 1990 (Araneae, Linyphiidae) new for the Netherlands. – Nieuwsbrief SPINED 31: 23-26.
- 150r. Helsdingen, P.J. van, S. IJland & P. Tutelaers 2012. Spinnen (Araneae) uit de Meinweg. – Nieuwsbrief SPINED 32: 25-29.
- 150s. Helsdingen, P.J. van, S. IJland, Noordijk, J. & H. Wijnhoven 2013. Arachniden van het Roerdal: 1000-soortendag met enkele aanvullingen (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). – Nieuwsbrief SPINED 33: 21-28.
- 150t. Helsdingen, P.J. van & S. IJland 2015a. Spinnen (Araneae) verzameld tijdens de 1000-soortendag 2015 in het reservaat “Het Merkske”. – Nieuwsbrief SPINED 35: 4-6.
- 150u. Helsdingen, P.J. van & F. IJsselstijn 2015b. *Heliophanus tribulosus* (Araneae, Salticidae) waargenomen in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 35: 13-14.
- 150v. Helsdingen, P.J. van 2019a. Faunistiek en dynamiek in de spinnenwereld. – Nieuwsbrief SPINED 38: 41-43.
- 150w1. Helsdingen, P.J. van 2019b. Spinnen (Araneae) in het 5000-soortenjaar 2018 aangetroffen in het zoekgebied “Nationaal Park Hollandse Duinen”. – Nieuwsbrief SPINED 38: 35-40.
- 150w2. Helsdingen, P.J. van 2019c. Excursie 2018: Speulderveld en Speulderbos. – Nieuwsbrief SPINED 38: 47.
- 150w3. Helsdingen, P.J. van 2020. Faunistiek en dynamiek in de spinnenwereld 2020. – Spined 39: 20-24.
- 150w4. Helsdingen, P.J. van 2020. Vestiging van een nieuwe soort via één geïmporteerd vrouwtje blijkt bij spinnen goed mogelijk. – Nature Today, Natuurberichten 3 december 2020.
(https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26963)
- 151a. Hermans, J.T. & H.J.M. van Buggenum 1984. De Vullensbeek, een laaglandbeek in Midden-Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad 73: 182-187.
- 151b. Heselhaus, Fr. 1913. Ueber Arthropoden in Maulwurfnestern. – Tijdschrift voor Entomologie 56: 195-237.
- 151c. Heselhaus, Fr. 1915. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Nidicolen. – Tijdschrift voor Entomologie 58: 251-274.
- 151u. Heuts, B. 2001. Spinnen nieuw voor Noord-Holland. – Nieuwsbrief SPINED 16: 9-12.
- 151v. Heuts, B. 2002. Nieuwe spinnensoorten voor Noord-Holland. – Nieuwsbrief SPINED 17: 7-8.
- 151w. Heuts, B. 2003. Enkele waarnemingen van spinnen in Noord-Holland (Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 18: 8.
- 151x. Heuts, B. 2007. Een gelukje met de zeldzame *Bolyphantes luteolus* (Araneae: Linyphiidae). – Nieuwsbrief SPINED 23: 15.
- 151y. Heuts, B. & T. Brunt 2006. Adulte en pre-adulte levensduur van dwergspin-soorten (Linyphiidae) hangt samen met hun habitat-hoogte boven grondniveau. – Nieuwsbrief SPINED 22: 9-12.
- 151z. Heuts, B. & P.J. van Helsdingen 2009. First record of *Walckenaeria clavicornis* (Araneae, Linyphiidae) in the Netherlands. – Nieuwsbrief SPINED 27: 27-28.
- 153a. Hollander, J. den 1970. Morphological variation in *Pardosa prativaga* L. Koch, 1870, *P. prativaga* var. *fulvipes* Collett, 1875 and *P. pullata*, 1757 (Araneae, Lycosidae). – Tijdschrift voor Entomologie 113: 273-288.
- 153b. Hollander, J. den 1971. Life-histories of species of the *Pardosa pullata* group, a study of ten populations in the Netherlands (Araneae, Lycosidae). – Tijdschrift voor Entomologie 114: 255-281.
- 153c. Hollander, J. den 1972. Species barriers in the *Pardosa pullata* group (Araneae, Lycosidae). – Proceedings of the 5th International Arachnological Congress, Brno, 1971: 129-141.

- 153d. Hollander, J. den & H. Lof 1972. Differential use of the habitat by *Pardosa pullata* (Clerck) and *Pardosa prativaga* (L. Koch) in a mixed population (Araneae, Lycosidae). – Tijdschrift voor Entomologie, 115: 205-215.
- 153v. Hollander, J. den, H. Dijkstra, H. Alleman & L. Vlijm 1973. Courtship behaviour as species barrier in the *Pardosa pullata* group (Araneae, Lycosidae). – Tijdschrift voor Entomologie 116: 1-22.
155. Honig, D. 1903. De metselspin, *Atypus Sulrezi*. – De Levende Natuur 8: 20.
156. Hoogenraad, H.R. 1911. De heidespin (*Agroeca brunnea* Blackw.). – De Levende Natuur 16: 162-163.
157. Hoogenraad, H.R. 1912. Nog eens de heidespin (*Agroeca brunnea* Blackw.). – De Levende Natuur 17: 297-302.
158. Hoogenraad, H.R. 1928. De mijnspin (*Atypus affinis* Eichw.). – Natura 1928 (10) (361): 204.
- 160a. Hulsebos, J. 1959. Spinnen van Schiermonnikoog. – Entomologische Berichten, Amsterdam 19: 253-254.
- 160b. Hulsebos, J. 1961. Spinnen uit Drente (I). – Entomologische Berichten, Amsterdam 21: 2-4.
- 160c. Hulsebos, J. 1962. Spinnen uit Drente (II). – Entomologische Berichten, Amsterdam 22: 233-235.
- 160d. Hulsebos, J. 1964a. Over enkele nieuwe en zeldzame spinnesoorten in Nederland. – De Levende Natuur 67: 93-96.
- 160e. Hulsebos, J. 1964b. Ueber *Pardosa lugubris* (Walck.) (Araneae, Lycosidae). – Entomologische Berichten, Amsterdam, 24: 100.
- 160f. Hulsebos, J. 1989. Gevolgen van grondwaterpeilverlaging op de spinnenfauna. – Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V. 192: 19-23.
- 160g. Hulsebos, J. 1990. Pitfall trapping of spiders in a small stand of oak near Dwingeloo, SW Drenthe (Arachnida: Aranei). – Entomologische Berichten, Amsterdam 50: 154-156.
- 160h. Hulsebos, J. 1995. Spinnen (Arachnida: Araneae) uit Drenthe. – Nieuwsbrief SPINED 8: 4-6.
- 164a. Iersel, V. van 1938. Een inheemse vogelspin (*Atypus piceus*). – De Zwerver 1938: 329-330.
- 164b. IJland S. 2008. *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826) nieuw voor Nederland (Araneae, Salticidae). – Nieuwsbrief SPINED 25: 29.
- 164c. IJland S. 2009. Enkele spinnen van de Haarlerberg (Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 27: 3-4.
- 164d. IJland S. 2010. *Zoropsis spinimana* (Dufour) voor de tweede keer in Nederland gevonden (Araneae, Zoropsidae). – Nieuwsbrief SPINED 29: 2-3.
- 164e. IJland, S. 2013. *Oecobius amboeli* Shear & Benoit, 1974 (Araneae, Oecobiidae) found in the Netherlands and Ethioia. – Nieuwsbrief SPINED 33: 39-40.
- 164f. *Gasteracantha cancriformis* (Araneae, Araneidae) geïmporteerd in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 40: 21.
- 164g. IJland, S. 2023. *Enoplognatha diversa* (Araneae, Theridiidae) geïmporteerd in Nederland met een bloemkool. – Nieuwsbrief SPINED 40: 22.
- 164m. IJland, S. & P.J. van Helsdingen 2010. Spinnen van de Grebbeberg (Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 28: 22-28.
- 164n. IJland, S., J. Miller, Y.J. van Sluijs & P.J. van Helsdingen 2011. Enkele spinnen uit Zuid-Limburg, met *Monocephalus castaneipes* (Araneae, Linyphiidae) nieuw voor Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 31: 19-22.
- 164o. IJland, S. & P.J. van Helsdingen 2013. Spinnen van de Reijerscamp (Araneae), deel 2: correcties. – Nieuwsbrief SPINED 33: 19.
- 165a. Jacobs, J. 1992. Inventarisatie van spinnen in het "Gerendal". – Natuurhistorisch Maandblad 81: 129-136.
- 165d. Jacobs, M. 2017. Monitoring loopkevers en spinnen in nieuw open zand en stuifzand in het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide d.m.v. bodemvallen. – Rapport onderzoeksjaar 8/2017.
- 165k. Jacobusse, C. 2001. Kerkzesoog *Segestria florentina*. In: Jacobusse, C., M.A. Hemminga & A.A. Karman (red.), Zeldzaam Zeeuws, Stichting Het Zeeuwse Landschap: 168-169.
- 166a. Janssen, M. 1986. Komt *Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala voor in België? – Arabel, Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging 1: 9-11.
- 166b. Janssen, M. 1992. *Oxyptila pullata* (Thorell, 1875) (Araneae, Thomisidae) in België. – Arabel, Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging 7(1): 9.
167. Jansen, S. & W. Jansen 1991. Een kleurige immigrant in Midden-Limburg. De wespenspin heeft het hier naar haar zin. – Natuurhistorisch Maandblad 80: 214-215.

- 168a. Jansen, W. & G. Verrijdt 1992. Een vindplaats van de zwarte kaardespin in Noord-Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad 81: 137-138.
- 168b. Jansen, W., S. Jansen, R. Walenbergh & J. Walenbergh 1994. Om het behoud en beheer van het landgoed De Hout. – Natuurhistorisch Maandblad 83: 24-30.
- 169a. Jong, B. de 1942. De getijgerde lijmspuiter. – De Levende Natuur 46: 217-219.
- 169b. Jong, B. de 1947. *Aranea displicata* (Hentz) nieuw voor de Nederlandse fauna. – Tijdschrift voor Entomologie 87: 511-514.
- 169c. Jong, B. de 1948. Onze spinnen. – De Levende Natuur 51: 115-122.
- 169d. Jong, B. de 1949a. Prooivangst bij onze spinnen. – In: Besemer, A.F.H. (red.), In het voetspoor van Thijssse. Veenman, Wageningen: 97-111.
- 169e. Jong, B. de 1949b. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse spinnenfauna (Araneae). – Bijdragen tot de Dierkunde 28: 212-217.
- 169f. Jong, B. de 1982. Nieuwe soorten van spinnen voor de Nederlandse fauna (Araneae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 42: 113-115.
- 169g. Jong, H. de, A.P. Noordam & Th. Zeegers, 2000. The Acroceridae (Diptera) of The Netherlands. – Entomologische Berichten 60: 171-179.
170. Joosten, H. 1985. De betekenis van de boerenkuilen in de Peel, 1. – Natuurhistorisch Maandblad 74: 19-26.
- 170a. Joven, Y. 2023. Foto omslag: *Agelena labyrinthica*. – Entomologische Berichten, Amsterdam 83.: omslag voorzijde.
171. Kampen, P.N. van 1906. *Atypus*. – De Levende Natuur 11: 151.
172. Katwijk, W. van 1976. Spinnen van Nederland. – Balkema, Rotterdam.
- 174a. Kessler, A. 1970. Egg production in *Pardosa*. I. Influence of mating on the egg-ripening period in *Pardosa lugubris* (Walckenaer) (Araneae, Lycosidae). – Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle (2) 41 (suppl.): 98-101.
- 174b. Kessler, A. 1971. Relation between egg production and food consumption in species of the genus *Pardosa* (Lycosidae, Araneae) under experimental condition of food-abundance and food-shortage. – Oecologia (Berlin) 8: 93-109.
- 174c. Kessler, A. 1973. A comparative study of the production of eggs in eight *Pardosa* species in the field (Araneae, Lycosidae). – Tijdschrift voor Entomologie 116: 23-41.
- 174d. Kessler, A. 1993. Spinnen in het duin. – Duin 16: 5-7.
- 174e. Kessler, A. 1997. *Arctosa cinerea* (Fabricius): zeldzaam? – Nieuwsbrief SPINED 12: 4-5.
- 174f. Kessler, A. & A. Fokkinga 1973. Hymenopterous parasites in egg sacs of spiders of the genus *Pardosa* (Araneida, Lycosidae). – Tijdschrift voor Entomologie 116: 43-61.
- 174g. Kessler, A. & N. van der Ham 1988. Microhabitat selection in some linyphiid spiders inhabiting the forest floor. – Bulletin de la Société européenne d'Arachnologie, Hors Série 1: 133-138.
- 174h. Kessler, A., J.W.C. Vermeulen & P. Wapenaar 1984. Partitioning of the space in tussocks of the sedge, *Carex distans*, during winter, by a spider community. – Journal of Zoology, London 204: 259-269.
- 174i. Kessler, A. 2004. Inventarisatie van spinnen in de Amsterdamse waterleidingduinen. – Nieuwsbrief SPINED 19: 6-8.
- 175a. Kessler-Geschiere, A.M. 1965. Spinnen van Schiermonnikoog. – Entomologische Berichten, Amsterdam 25: 158-160.
- 175b. Kessler-Geschiere, A.M. 1970. Sex-ratio in spiders inhabiting the field layer. – Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle (2) 41 (suppl.): 102-107.
- 175c. Kessler-Geschiere, A.M. 1972. Distribution and interspecific competition of congeneric spiders in a series of marshy habitats. – Proceedings of the 5th International Arachnological Congress, Brno, 1971: 151-158.
- 175d. Kessler-Geschiere, A.M. 2001. Bodemspinnen in de oeverlanden van de Amstelveense Poel, 1965-1967. I. – Nieuwsbrief SPINED 16: 12-17.
- 175e. Kessler-Geschiere, A.M. 2003. Bodemspinnen in de oeverlanden van de Amstelveense Poel, 1965-1967. III. – Nieuwsbrief SPINED 18: 11-17.
- 175f. Kimpel, N. 2022. Weer een leuke nieuwe springspin voor Meijendel erbij, de Heidespringspin. – Holland's Duinen 80: 80.
178. Kleinhout, J. 1958. Het verzamelen van prooien van sociale wespen. – De Levende Natuur 61: 179-182.

179. Kleinhout, J. 1963. Waarnemingen aan de mijnbspin (*Atypus affinis* Eichw.). – De Levende Natuur 66: 165-167.
- 180a. Kleinhout, J. 1967. De spin *Atypus affinis* Eichw. – Natura 64: 156.
- 180b. Klink, R. van & I.M. van Schrojenstein Lantman 2015. Effecten van kwelderbeweiding op spinnen en insecten. – Entomologische Berichten 75: 188-199.
- 181a. Klomp, H. & B.J. Teerink 1973. The density of the invertebrate summer fauna on the crowns of pine trees, *Pinus sylvestris*, in the central part of the Netherlands. – Beiträge zur Entomologie 23: 325-344.
- 181b. Kluyver, H.N. 1933. Bijdrage tot de biologie en de ecologie van den spreeuw (*Sturnus vulgaris vulgaris* L.) gedurende zijn voortplantingstijd. – Landbouwhogeschool Wageningen, Wageningen. [proefschrift].
- 181c. Kocsis, T. & B. Schnerch 2024. First record of *Diplocephalus graecus* (O. Pickard-Cambridge, 1873) in the Netherlands. - Nieuwsbrief Spined 41: 7-9.
- 181d. Kooistra-Vroegop, A., O. Goubitz & T. Ponsen-Bruinvis 2002. Een 'tijger' in een web. – Natura 99: 20.
- 182a. Koomen, P. 1986. Spinnen (Arachnida, Araneae) van het Gerendal en de Kruisberg. – Natuurhistorisch Maandblad 75: 198-207.
- 182b. Koomen, P. 1988. *Psilochorus simoni* (Berland, 1911) doet Leiden aan. – Nieuwsbrief SPINED 5: 17.
- 182c. Koomen, P. 1990. Verslag van de 144^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging te Haamstede. Araneida-spinnen (en andere niet-insekten). – Entomologische Berichten, Amsterdam 50: xiv-xix.
- 182d. Koomen, P. 1991. Verslag van de 145^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 8-10 juni 1990 te Buurse. Araneida-spinnen (en andere niet-insekten). – Entomologische Berichten, Amsterdam 51: xvii-xxii.
- 182e. Koomen, P. 1992. Verslag van de 146^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 31 mei-2 juni 1991 te Mechelen (L.). Araneida-spinnen, Opilionida-hooiwagens, Ixodida-teken, en Myriapoda-duizend- en miljoenpoten. – Entomologische Berichten, Amsterdam 52: xxii-xxxvi.
- 182f. Koomen, P. 1993. Verslag van de 147^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 12-14 juni 1992, te Ansen (Dr.). Araneida-spinnen, Opilionida-hooiwagens, Ixodida-teken, en Myriapoda-duizend- en miljoenpoten. – Entomologische Berichten, Amsterdam 53: xxxii-xxix.
- 182g. Koomen, P. 1994. Verslag van de 148^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 11-13 juni 1993, te Woold bij Winterswijk. Araneida - spinnen, Opilionida - hooiwagens en Myriapoda - duizend- en miljoenpoten. – Entomologische Berichten, Amsterdam 54: xxxii-xxxvi.
- 182h. Koomen, P. 1996. Araneae (Spinnen). – In: Zuijlen, J.W. van et al. (red.), Brand-stof, Een inventarisatie van de entomofauna van het natuurreervaat "De Brand" in 1990. Insektenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg: 171-175.
- 182i. Koomen, P. 1998a. Verslag van de 152^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 30 mei-1 juni 1997, te Ommen (Overijssel). Araneida - spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 58: xxxiv-xxxvi.
- 182j. Koomen, P. 1998b. Winter activity of *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802) (Araneae: Anyphaenidae). – Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997: 223-225.
- 182k. Koomen, P. 1999. Verslag van de 153^e zomerbijeenkomst te Pieterburen, 5 t/m 7 juni 1998. Arachnida - spinachtigen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 59: xxxiv-xxxvi.
- 182m. Koomen, P. 2000. Verslag van de 154^e zomerbijeenkomst te Hunsel, 4 t/m 6 juni 1999. Araneae - spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 60: 210-211.
- 182n. Koomen, P. 2010. Entomofauna van Flevoland. Verslag van de 164^e zomerbijeenkomst te Kraggenburg. Araneae - spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 70: xxxvii-xxxix.
- 182s¹. Koomen, P. & T.M.J. Peeters 1993a. New prey records for spider hunting wasps (Hymenoptera: Pompilidae) from the Netherlands. – Memoirs of the Queensland Museum 33: 571-574.
- 182s². Koomen, P. & T.M.J. Peeters 1993b. Prey records for spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae) from The Netherlands: period 1992-1993. – Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 26: 215-220.
- 182t. Koomen, P. & J. Prinsen 1995. Verslag van de 149^e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 3-5 juni 1994, te Kreijlt bij Wintelre. Araneida - spinnen, Opilionida -

- hooiwagens en Myriapoda - duizend- en miljoenpoten. – Entomologische Berichten, Amsterdam 55: xxix-xxxii.
- 182u. Koomen, P. & J. Prinsen 1996. Verslag van de 150^e zomer vergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 9-11 juni 1995, te Vierhouten. Araneida - spinnen, Opilionida - hooiwagens, Ixodida - teken en Myriapoda - duizendpootachtigen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 56: xxiv-xxvii.
- 182v. Koomen, P. & J. Prinsen 1997. Verslag van de 151^e zomer vergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 29 mei t/m 2 juni 1996, te Formerum op Terschelling. Araneae - spinnen. – Entomologische Berichten, Amsterdam 57: xxxv-xxxviii.
- 182w. Koomen, P. & J. Prinsen 2001. Verslag van de 155^e zomerbijeenkomst te Egmond, 26 t/m 28 mei 2000. Araneida – spinnen. – Entomologische Berichten 61: xxxviii-xl.
- 182x. Koomen, P. & S. Tiemersma 2004. Entomofauna van Noordoost-Twente. Verslag van de 158^e zomerbijeenkomst te Ootmarsum. Araneida – spinnen. – Entomologische Berichten 64: 206-207.
- 182y. Koomen, P., J.D. Prinsen & S. Tiemersma 2005. Entomofauna van Texel. Verslag van de 159^e zomerbijeenkomst te Den Hoorn. Araneida – spinnen. – Entomologische Berichten 65: 87-88.
- 183a. Koomen, P. 2015. Entomofauna van het Drents-Friese Wold. Verslag van de 169^e NEV-zomerbijeenkomst. Arachnida – Spinachtigen. – Entomologische Berichten 75: 157-159.
- 183m. Koster, A. 1985. Spoorwegterreinen van betekenis voor plant en dier. – De Levende Natuur 86: 194-199.
- 183n. Koster, J. 2009. Zeldzame spinnensoort ontdekt in de Duivelshof te Losser in 2008. – Natuurbode 35 (2): 8-9.
- 183q. Krediet, A. 2015a. De wolfspin *Piratula knorri* (beekpiraat) na 124 jaar aangetroffen in Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 35: 6.
- 183r. Krediet, A. 2015b. Spinnen en hooiwagens van kalkgrasland De Piepert. – Nieuwsbrief SPINED 35: 7-10.
184. Kronestedt, T 1968. Notes on the Swedish species of the genus *Centromerus* F. Dahl (Araneae, Linyphiidae). A faunistic report with ecological remarks. – Entomologisk Tidskrift 89: 111-127.
185. Laar, L.M. van de 1973. Verspreidingspatronen en dichtheden van wolfspinnen in Meijendel. – Meijendel Mededelingen 2 (3): 17-18.
- 186a. Land, J. van der 1960. Door CJN-ers in 1959 gevangen wolfspinnen. – Heksepoot 8: 2-3.
- 186b. Lambeets, K. 2006. Vindplaatsen van *Xysticus acerbus* Thorell, 1872 langs de Grensmaas. – Nieuwsbrief SPINED 22: 25.
- 186c. Lambeets, K. 2008. De spinnenfauna (Araneae) van de grindoevers langs de Nederlandse zijde van de Grensmaas. – Nieuwsbrief SPINED 25: 4-17.
186. Lamberigts, M., B. van Maanen & B. Pex, 2003. De vennen op de Beegderheide. – Natuurhistorisch Maandblad 92: 112-125.
- 187a. Lambregts, J., H. De Koninck & M. Jacobs 2013. Grensoverschrijdend onderzoek naar spinnen (Araneae) in de omgeving van het ecoduct Kempengrens. – Nieuwsbrief SPINED 33: 3-18.
- 187k. Leefmans, S. 1910. Een mooie spin. – De Levende Natuur 14: 226-227.
- 188a. Leesberg, A.F.A. 1903. In memoriam [Dr. Alexander Willem Machiel van Hasselt] – Tijdschrift voor Entomologie 46: 71-77.
- 188b. Lejeune, M. & G. Kurstjens 1996. Eijsder Beemden. Jaarverslag 1994-1995. – Stichting Ark, Laag Keppel.
- 188c. Lejeune, M. & G. Kurstjens 1997. Kleine Weerd. Jaarverslag 1994-1995. – Stichting Ark, Laag Keppel.
- 188d. Leruth, R. 1939. La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. – Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 87: 1-506.
- 189a. Linden, J. van der 2000. De opmars van de wespenspin *Argiope bruennichi* in Nederland (Araneae: Araneidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 11: 45-53.
- 189b. Linden, J. van der 2002. Oproep Tijgerspin. – Natura 99: 87.
- 189c. Linden, J. van der 2003: Een topjaar voor de wespenspin *Argiope bruennichi* (Araneae: Araneidae). – Waanemingenverslag Ongewervelden 2004: 27-30. EIS-Nederland, Vlinderstichting, NVL.
190. Locket, G.H. 1962. Miscellaneous notes on linyphiid spiders. – Annals and Magazine of Natural History (13)5: 7-15.

- 191a. Ma, W.C., H. Siepel & J.H. Faber 1997. Onderzoek naar mogelijke ecotoxicologische effecten van bodemverontreiniging in de uiterwaarden op de terrestrische invertebratenfauna. – IBN-rapport 289: 1-79.
- 191b. Mabelis, A. 1996. Forest floor spiders of woodlots in an agricultural landscape. – *Ekologia Polska* 44: 119-136.
- 192a. Mac Gillavry, D. 1914. De entomologische fauna van het eiland Terschelling tot zoover zij tot nu toe bekend is. – *Tijdschrift voor Entomologie* 57: 89-106.
- 192b. Mahler, C. & E. Heimans 1910. Spinnennestje. – *De Levende Natuur* 15: 64.
- 192c. Maurissen, A.H. 1882. Lijst van insecten in Limburg en niet in de andere provincien van Nederland waargenomen. – *Tijdschrift voor Entomologie* 25: cx-cxx.
- 192d. Meijden, E. van der 2022. Honderd jaar natuuronderzoek in Meijendel. – *Holland's Duinen* 81: 8-23.
- 193a. Meijer, A.W.F. 1984. [Mededeling tijdens de bijeenkomst van het natuurhistorisch Genootschap in Limburg, te Heerlen op 12 december 1983.] – *Natuurhistorisch Maandblad* 73: 26.
- 193b. Meijer, A.W.F. 1985. Spinnen uit Limburg. – *Natuurhistorisch Maandblad* 74: 135-137.
- 193c. Meijer, A.W.F. 1986. Eerste vondsten van de wolfspin *Aulonia albimana* (Walckenaer, 1805) (Araneae, Lycosidae) in Zuid-Limburg. – *Natuurhistorisch Maandblad* 75: 121-124.
- 193d. Meijer, A.W.F. 1987a. Over de aanwezigheid van de "mijnspinnen" *Atypus affinis* Eichwald en *A. piceus* (Sulzer) (Arachnida, Araneae, Atypidae) op de Bemelerberg. – *Natuurhistorisch Maandblad* 76: 66-70.
- 193e. Meijer, A.W.F. 1987b. Eerste vondst van de krabspin *Philodromus buxi* Simon (Arachnida, Araneae, Philodromidae) in ons land sinds 1886. – *Natuurhistorisch Maandblad* 76: 88.
- 193s. Meijer, A.W.F. & J.H.G. Peeters 1985. Waarnemingen in Midden- en Zuid-Limburg van de pas ontdekte kogelspin *Enoplognatha latimana* Hippa en Oksala (Araneae, Theridiidae). – *Natuurhistorisch Maandblad* 74: 240.
194. Meijer, J. 1971. Immigration of arthropods into the new Lauwerszee Polder. – *Miscellaneous Papers Landbouwhogeschool, Wageningen* 8 (1971): 53-64.
195. Meijer, J. 1973a. Die Besiedlung des neuen Lauwerszee polders durch Laufkäfer (Carabidae) und Spinnen (Araneae). – *Faunistisch-ökologische Mitteilungen* 4: 169-184.
196. Meijer, J. 1973b. Spinnen van Ameland. – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 33: 26-31.
197. Meijer, J. 1974. Spinnen (Araneida) en een hooiwagen (Opilionida) uit noordwest Overijssel. – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 34: 171-172.
198. Meijer, J. 1975. Aeronautiek bij spinnen. – *Natura* 72: 55-56.
- 198a. Meijer, J. 1976a. Spinnen (Araneida) uit Delleburen. – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 36: 6-7.
- 198b. Meijer, J. 1976b. A glandular secretion in the ocular area of certain erigonine spiders (Araneae, Linyphiidae). – *Bulletin of the British Arachnological Society* 3: 251-252.
- 198c. Meijer, J. 1977. The immigration of spiders (Araneida) into a new polder. – *Ecological Entomology* 2: 81-90.
- 198d. Meijer, J. 1979. Pioniers in de polder. De Lauwersmeer. – *Werkgroep Lauwersmeer, Harlingen*.
- 198e. Meijer, J. 1980a. The development of some elements of the arthropod fauna of a new polder. – *Oecologia (Berlin)* 45: 220-235.
- 198f. Meijer, J. 1980b. Colonization of the Lauwerszeepolder by some elements of the arthropod fauna. – *Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam. [proefschrift]*
- 198u. Meijer, J. & A. Barendrecht 2018. Forty years of undisturbed change in the ground dwelling fauna in the Lauwersmeer, a reclaimed tidal estuary of the Dutch Waddensea. – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 78: 122-151.
- 198v. Meijer, J. & W.K.R.E. van Wingerden 1975. Some data on *Argenna patula* (Simon), *Perimones arenarius* (Emerton) and other spiders new to the Dutch spider fauna (Arachnida, Araneida). – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 35: 135-140.
199. Meijere, J.C.H. de 1920. Derde supplement op de nieuwe naamlijst van Nederlandse Diptera. – *Tijdschrift voor Entomologie* 62: 161-195.
200. Nieukerken, E.J. van & J. van Tol 1972. Macrofauna van de wateren in "De Grote Peel" - een voorjaarsbeeld -. – *De Levende Natuur* 75: 132-140.
- 201a. Nieukerken, E.J. van & G. van der Velde 1973. Een hydrobiologische inventarisatie van sloten in het Oude Land van Strijen en de St. Anthonie-polder (Hoekse Waard). – *De Levende Natuur* 76: 273-279.

- 201k. Noordam, A.P. 1996. Spinnen in Meijendel. Bewerking van het "1953-1960-materiaal". – Meijendel Mededelingen 29: 1-24.
- 201m. Noordam, A.P. 1997. Enkele correcties op de soortenlijst van de spinnen van Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 11: 21-22.
- 201n. Noordam, A.P. 1997. Spinnen uit Meijendel en Berkheide internationaal. – Holland's Duinen 31: 29-30.
- 201p. Noordam, A.P. 1998. Spinnengids. – Tirion, Baarn. [Bewerking van M.J. Roberts, 1995, Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field Guide.]
- 201q. Noordam, A.P. 1998. De strijd van duinsspinnen met mieren en wespen. – Duin 21: 4-6.
- 201r. Noordam, A.P. 2003. Bodemfauna in het afgegraven duin. – Holland's Duinen 43: 28-29.
- 201s. Noordam, A.P. 2019. Schitterend gecamoufleerd op zand. De kustrenspin. – Tussen Duin & Dijk 18 (4): 7-10.
- 201t. Noordam, A.P. 2020a. De Kustrenspin, schitterend gecamoufleerd op zand. – Veelpoot 31: 17-25.
- 201u. Noordam, A.P. 2020b. Een verrassing van de Hoge Veluwe – vlieg Acrocera wint van spin Euophrys. – Veelpoot 31 (2): 17-20.
- 201v. Noordam, A.P. 2024. Van Transsylvanië naar Amelisweerd. Van Saloca naar Nemastoma. – Veelpoot 35 (3): 19-27.
- . Noordam, A.P., R.A. Samson & W. Sudhaus 1998. Fungi and Nematoda on *Centromerus sylvaticus* (Araneae, Linyphiidae). – Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburough 1997: 343-347.
- 202a. Noordijk, J. 2005. Spinnen van bermen op de Veluwe (Arachnida, Araneae). – Nieuwsbrief SPINED 20: 29-34.
- 202b. Noordijk, J. 2006a. Entomofauna van het Hulshorsterzand. Het belang van stuifend zand (Bijlage 7). CD-rom. In: P.D. Jungerius, R. Ketner-Oostra, H. van den Acker, A. Aptroot, P. Boer, P.J. Keizer, G. Koopmans, J. Noordijk, H. Raaijmakers, M. Riksen, R. Struijk, L. Verkerk 2006. Onderzoek voor de toepassing van effectgerichte maatregelen in het stuifzandlandschap van het Hulshorster Zand. Stichting Geomorfologie & Landschap. Ede. 81 pp.
- 202c. Noordijk, J. 2006b. *Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758), *Xysticus acerbus* Thorell, 1872) en *Pardosa proxima* (C.L. Koch, 1874) gevonden bij Heerlen (Araneae, Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae). – Nieuwsbrief SPINED 22: 19-22.
- 202d. Noordijk, J. 2007. De getsreepte muisspin *Haplodrassus dalmatensis* (L. Koch) is niet zeldzaam op de Veluwe (Araneae: Gnaphosidae). – Nieuwsbrief SPINED 23: 2-3.
- 202e. Noordijk, J. 2008. De fenologie van *Arctosa perita* (Araneae, Lycosidae). – Nieuwsbrief SPINED 25: 30- 33.
- 202f. Noordijk, J. 2016. Nieuwe vondsten van weduwen *Latrodectus* in Nederland (Araneae, Theridiidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 47: 17-26.
- 202g. Noordijk, J. 2018. Ondetermineerbare jachtkrabspin tussen bananen (Araneae: Sparassidae: *Nolavia*). – Entomologische Berichten 78: 194-195.
- 202h. Noordijk, J. 2020. Een nieuwe trilspin in Nederland: *Spermophora kerincki* (Araneae: Pholcidae). – Entomologische Berichten 80: 106.
- 202m. Noordijk, J. & M. Berg 2001. De corticole fauna van platanen: I. Arachnidien (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 15: 13-32.
- 202n. Noordijk, J., K.V. Sýkora & A.P. Schaffers 2008a. Conservation value of sandy highway verges for arthropods – implications for management. – Proceedings of the Netherlands Entomological Society Meeting 19: 75-93.
- 202o. Noordijk, J., A.P. Schaffers & K.V. Sýkora 2008b. Diversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and spiders (Araneae) in wegbermen with grey hair-grass vegetation. – European Journal of Entomology 105: 257-265.
- 202p. Noordijk, J., R. Verdonschot & K.V. Sýkora 2009a. Arthropod richness in wegbermen in the Netherlands. – Terrestrial Arthropod Reviews 2: 63-76.
- 202q. Noordijk, J., I.P. Raemakers, A.P. Schaffers & K.V. Sýkora 2009b. Wolfspinnen in een vegetatiegradiënt in de Millingerwaard. – De Levende Natuur 110: 199-205.
- 202r. Noordijk, J., R. Verdonschot & P.J. van Helsdingen 2009c. Spinnen en hooiwagens van verschillende leefgebieden in de Millingerwaard (Arachnida: Araneae & Opiliones). – Nieuwsbrief SPINED 27: 19-24.

- 202s. Noordijk, J., A.P. Schaffers, Th. Heijerman, P. Boer, M. Gleichman & K.V. Sýkora 2010. Effects of vegetation management on ground-dwelling arthropods. – Ecological Engineering 36: 740-750.
- 202t. Noordijk, J., P. Tutelaers & P. J. van Helsdingen 2010. *Segestria bavarica* (Araneae, Segestriidae): . wijder verspreid dan gedacht. – Nieuwsbrief SPINED 28: 5-6.
- 202u. Noordijk, J., P.J. van Helsdingen, S. IJland, P. Tutelaers, L. Tutelaers & J. Cuppen 2011. Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) van boswachterij Staphorst. – Nieuwsbrief SPINED 30: 14-20.
- 202v. Noordijk, J., J. Vos & B. Schoelitz 2013. Risicobeoordeling van zwarte weduwen en verwante spinnensoorten. EIS 2013-03, EIS-Nederland, Leiden & KAD Wageningen, 34 pp. + bijlagen. Internet: <http://www.eis-nederland.nl/rapporten.html>
- 202w. Noordijk, J., M. Brooks & T. Heijerman 2016. Een import van de springspin *Phidippus audax* (Araneae: Salticidae) in Nederland. – Entomologische Berichten 76: 146-148.
- 202x. Noordijk, J. & M. de Winkel 2017. *Eusparassus dufouri* en andere jachtkrabspinnen (Araneae: Sparassidae) getransporteerd naar Nederland. – Entomologische Berichten, Amsterdam 77: 58-61.
- 202y. Noordijk, J., J. Bink & R. Morssinkhof 2018. De kaskaardespin *Uloborus plumipes* heeft zich wijd verspreid gevestigd in Nederland (Araneae: Uloboridae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 50: 5-12.
- 202z. Noordijk, J., K. van Dorp & P. Koomen 2019. Aanvullende waarnemingen van de springspin *Philaeus chrysops* (Araneae: Salticidae). – Nieuwsbrief SPINED 38: 2-5.
- 202aa. Noordijk, J. 2019. In Nederland geïmporteerde “Braziliaanse zwerfspinnen” (Araneae: Ctenidae: *Phoneutria*). – Entomologische Berichten 79: 202-207.
- 202ab. Noordijk, J. & A. Groenendijk 2020. Groot gezamenlijk web van *Ostearius melanopygius* (Linyphiidae).
- 202ac. Noordijk, J. & P. Boer 2021. First record of the exotic dwarf spider *Erigone dentosa* in the Netherlands (Araneae: Linyphiidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 57: 109.
- 202ad. Noordijk, J. 2021. – Aanvullende vondsten van weduwen *Latrodectus* in Nederland (Araneae: Theridiidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 57: 109-111.
- 202ae. Noordijk, J., S. van Overdijk & J. Groothuis 2020. De exotische krekeldiefspin *Thanatus vulgaris* in Nederland (Araneae: Philodromidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 55: 131-134.
- 202af. Noordijk, J. 2022. Twee voor Nederland nieuwe spinnensoorten, *Porrhoclubiona leucaspis* en *Tuberta maerens*, gevangen in boomkronen (Araneae: Clubionidae, Cybaeidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 59: 49-56.
- 202ag. Noordijk, J., G. Vierbergen & J. Bink 2023. Eerste vondsten van de kogelspin *Steatoda paykulliana* in Nederland (Araneae: Theridiidae). – Entomologische Berichten 83: 26-28.
- 202ah. Noordijk, J. 2023. Een Europese zwarte weduwe *Latrodectus tredecimguttatus* lift met een caravan mee naar Nederland (Araneae: Theridiidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 60: 107-109.
- 202ai. Noordijk, J. & H. Donner 2024. Import van een woestijnvioolspin *Loxosceles deserta* (Araneae: Sicariidae). – Entomologische Berichten 84 (2): 71.
- 202zz. Oldenburg, C. 2024. Etenstijd voor de kleintjes. – Natura 120 (4): 25.
- 203a. Oudemans, A.C. 1903. *Atypus piceus* Slz. – Entomologische Berichten, Amsterdam 1: 72.
- 203b. Oudemans, A.C. 1918. Mijnspin. – De Levende Natuur 23: 71.
- 203c. Overdijk, S. van 2022. Eerste bevestigde waarneming van de springspin *Icius hamatus* in Nederland (Araneae: Salticidae). – Entomologische Berichten 82: 187.
- 204a. Peeters, J.H.G. 1984a. Nieuwe spinnen voor de Nederlandse en Limburgse fauna. – Natuurhistorisch Maandblad 73: 180-181.
- 204b. Peeters, J.H.G. 1984b. Een zeldzaam spinnetje. – Natuurhistorisch Maandblad 73: 23-24.
- 204c. Peeters, J.H.G. 1985. Nieuwe spinnen voor de Nederlandse en Limburgse fauna, deel 2. – Natuurhistorisch Maandblad 74: 50-51.
- 204s. Peeters, H., D.Th. de Graaf & P. Poot 1987a. De wespenspin, *Argiope bruennichi* Scop., rukt op. – Natuurhistorisch Maandblad 76: 11-15.
- 204t. Peeters, H., D.Th. de Graaf & P. Poot 1987b. Nogmaals de wespenspin (*Argiope bruennichi* Scop.). – Natuurhistorisch Maandblad 76: 113-114.
- 204u. Peeters, J.H.G. & A.W.F. Meijer 1986. Nieuwe spinnen (Arachnida, Araneae) voor de Nederlandse en Limburgse fauna, deel 3. – Natuurhistorisch Maandblad 75: 93-96. [Correctie in Natuurhistorisch Maandblad 75: 120.]

- 204v. Peeters, L. & K. van Keer 2009. Aanwezigheid van *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778) (Araneae: Eresidae) in België. – Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 241: 153-154.
- 205a. Pelzers, E. & M. Vossen 1984. Over enkele vondsten van *Segestria bavarica* C.L. Koch in Nederland (Araneida, spinnen). – Natura 81: 248-250.
- 205b. Petit, J. 1987. L'Araignée-Frelon (*Argiope bruennichi* Scopoli) à la montagne Saint-Pierre. – Natura Mosana 39: 100-110.
- 206a. Pinkhof, M. 1913. Huisspinnen. – De Levende Natuur 18: 365-369, 396-399, 462-467.
- 206b. Pinkhof, M. 1919. Een nieuwe vindplaats van de mijnspin. – De Levende Natuur 23: 40.
- 206c. Pinkhof, M. 1924. Waarnemingen bij kruisspinnen. – De Levende Natuur 29: 95-96.
- 206d. Pinkhof, M. 1933. David en Goliath. – De Levende Natuur 38: 198-199.
- 206e. Pinkhof, M. 1935. Jonge spinnen in het voorjaar (*Aranea litterata* Olivier). – De Levende Natuur 40 (Suppl.): 176-178.
- 206f. Pinkhof, M. 1941. Spinnen in en om Amsterdam. – In: Gedenkboek K.N.N.V., Afdeling Amsterdam, Amsterdam natuurhistorisch gezien. Scheltema & Holkema, Amsterdam: 223-231.
207. Platel, T.G.H. 985. *Pholcus phalangioides* buitenshuis. – Nieuwsbrief SPINED 3: 2.
- 210a. Ploeg, S.W.F. van der & W.K.R.E. van Wingerden 1975. The influence of trampling on spiders. – Proceedings of the 6th International Arachnological Congress, Amsterdam, 1974: 167-172.
- 210b. Poot, P. & J.H.G. Peeters 1989. Spinnen van de Schiepersberg. – Nieuwsbrief SPINED 6: 5-8.
- 211a. Power, R.H. 1974. Een oriënterend onderzoek naar de verspreiding van wolfspinnen, hooiwagens en pisseebedden in IJsselmeerpolders. – Instituut voor Oecologisch Onderzoek 3: 1-23.
- 211b. Prinsen, J.D. 1985. Hoe zeldzaam is *Mioxena blanda*? – Nieuwsbrief SPINED 3: 1-2.
- 211c. Prinsen, J.D. 1989. *Psilochorus simoni* (Berland, 1911) in Wageningen. – Nieuwsbrief SPINED 6: 3.
- 211d. Prinsen, J.D. 1996. *Theridion uhligi* Martin, 1974 (Araneae: Theridiidae), een zeldzame kogelspin van heideterreinen. – Nieuwsbrief SPINED 10: 4-7.
- 211e. Prinsen, J.D. 1996. *Eperigone eschatologica* (Crosby, 1924) (Araneae: Linyphiidae), een nieuwe spin in de Nederlandse kassen. – Nieuwsbrief SPINED 11: 1-3.
- 211f. Prinsen, J.D. 2000. Spinachtigen van het Renkumse beekdal. In: Bax, G.M., C.F. van de Bund, C.C. van Rijswijk, G.M. Sanders, R.J. Schaafsma 2000, Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999: 88. KNNV, Wageningen.
- 211g. Prinsen, J.D. 2002. Araneida – spinnen. In: Vorst, O. & J.G.M. Cuppen 2002, Entomofauna van Westerwolde (Verslag van de 156^e zomerbijeenkomst te Ter Apel). – Entomologische Berichten 62: 118-119.
- 211h. Prinsen, J.D. 2003. [Wetenschappelijke mededeling tijdens 135e Wintervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereniging op 8 februari 2003 te Utrecht.] – Entomologische Berichten 63: 47.
- 211j. Prinsen, J.D. 2005. Spinnen: 105-115. In: J. Brouwer & D. van Dam (Red.), Inventarisatie van flora en fauna van Laag-Wolfheze in 2003 en 2004, KNNV afdeling Wageningen en omstreken, 139 p.
- 211k. Prinsen, J.D. & S. Tiemersma, 2006. Araneida – spinnen. In: Drost, B. & J.G.M. Cuppen 2006, Entomofauna van Noord-Drenthe (Verslag van de 160^e zomerbijeenkomst te Schipborg). – Entomologische Berichten 66: 88-89.
- 211m. Prinsen, J.D. 2007. Araneida – spinnen. In: J.G.M. Cuppen 2007 & B. Drost, Entomofauna van de Kempen (Verslag van de 161^e zomerbijeenkomst te Baarschot). – Entomologische Berichten 67: 141-142.
- 211n. Prinsen, J.D. & S. Tiemersma 2009. Araneida – Spinnen. In: J.G.M. Cuppen & B. Drost 2009, Entomofauna van de noordelijke Achterhoek, Verslag van de 163^e zomervergadering te Vorden. – Entomologische Berichten, Amsterdam 69: 191-192.
- 211p. Putte, F. van de 2018. *Nigma puella* (Simon, 1870), het Bont kaardertje, nieuw voor Nederland (Araneae, Dictynidae). – Nieuwsbrief SPINED 37: 2.
- 212a. Raemakers, I. & P.J. van Helsdingen 1999. De vuurspindoder *Eoferreola rhombica*, een voor Nederland nieuwe spinnendoder, en haar bijzondere waarde: de lentevuurspin *Eresus sandaliatus* (Hymenoptera: Pompilidae; Araneae: Eresidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 9: 1-6.
- 212b. Redeke, H.C. & A.P.C. de Vos 1932. Beiträge zur Kenntnis der Fauna niederländischer oligotropher Gewässer. – International Review of Hydrobiology and Hydrography 28: 1-45.

213. Richter, C.J.J. 1970a. Relation between habitat structure and development of the glandulae ampullaceae in eight wolfspider species (*Pardosa*, Araneae, Lycosidae). – *Oecologia* (Berlin) 5: 185-199.
214. Richter, C.J.J. 1970b. Aerial dispersal in relation to habitat in eight wolf spider species (*Pardosa*, Araneae, Lycosidae). – *Oecologia* (Berlin) 5: 200-214.
- 215a. Ritsema, C. 1872. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 26e zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Breda den 1sten juli 1871.] – *Tijdschrift voor Entomologie* 15: xxvii- xxviii.
- 215b. Ritter, J. 2006. Bijzondere waarnemingen door vrijwilligers in 2006. – *Vrijwilligerskrant Natuurmonumenten Oktober 2006*: 2.
- 215c. Roelofs-Ditters, E. 1996. *Zora pardalis* Simon op de Strabrechtse Heide. – *Nieuwbrief SPINED* 10: 1-2.
- 215d. Roelofs-Ditters, E. 2003. *Larinoides ixobolus* (Thorell, 1873) (Arachnida, Araneidae) ook in Nederland gevonden. – *Nieuwbrief SPINED* 16: 3-5.
- 215e. Roelofs-Ditters, E. 2003. Een nieuwe vindplaats van *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) in Noord-Brabant (Araneae, Pisauridae). – *Nieuwbrief SPINED* 18: 18.
- 215f. Roelofs-Ditters, E. 2007. De spinnencollectie van Natuurmuseum Brabant in Tilburg. – *Nieuwbrief SPINED* 23: 16-26.
- 215g. Roelofs-Ditters, E. 2011. *Cheiracanthium montanum* L. Koch, 1877 (Araneae, Miturgidae) van het Kootwijkerzand. – *Nieuwsbrief SPINED* 31: 14.
- 215m. Roelofs-Ditters, E. & M. Nijssen 2011. Spinnen van zeven Nederlandse stuifzandgebieden. – *Nieuwbrief SPINED* 30: 2-8.
216. Romijn, C. 1918. Maas-expeditie 8 tot 12 Juli 1918. Hydrobiologisch gedeelte. – *Jaarboek Natuurhistorisch Genootschap in Limburg* 1918: 124-145.
- 217a. Rossum, G. van, H.C. Burger & C.F. van de Bund 1957. Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten in het jaar 1957. – *Entomologische Berichten*, Amsterdam 18: 62-69.
- 217b. Rozwalka, R. & P. Bielak-Bielecki 2017. First records of the alien spider *Pandava laminata* (Thorell, 1878) (Araneae: Titanoecidae) in Poland. *Fragmenta Faunistica, Warsaw* 59(2, 2016): 121-126.
- 217z. Schmitz, H. 1915. De Nederlandsche mieren en haar gasten. – *Jaarboek Natuurhistorisch Genootschap in Limburg* 1915: 95-238.
- 218a. Schmitz, H. 1938. Het dierenleven in de onderaardsche gangen. – In: Schaik, D.C. van (red.), *De Sint Pietersberg*. Leiter-Nypels, Maastricht: 273-295.
- 218b. Siepel, H., J. Burgers, R.J.M. Kats, D.R. Lammertsma & A.P. Noordam 1996. De bijdrage van verruigde akkerranden aan de biodiversiteit van het landelijk gebied in Zuidelijk Flevoland. – *IBN-rapport* 215: 1-73.
- 218c. Sies, D. 2023. Een vondst van het Noords Kaardertje *Dictyna major* (Araneae: Dictynidae). – *Nieuwsbrief SPINED* 40: 19-20.
- 218d. Sies, D. 2024. De hangmatspin *Diplocephalus graecus* voor het eerst in Nederland aangetroffen (Araneae: Linyphiidae). – *Entomologische Berichten* 84: 103-104.
- 218m. Simon Thomas, R.T. & W.N. Ellis 2000. Lijst van Land-Arthropoda waargenomen op de landgoederen "De Vennen" en "De Mythstee", Nunspeet. – Vierde uitgave, Nunspeet.
219. Six, G.A. 1858a. Opmerkingen omtrent de kleurverandering van *Epeira herii* Hahn, en eenige andere spinnen. – *Tijdschrift voor Entomologie* 1: 168-170.
220. Six, G.A. 1858b. Lijst van spinnen in de provincie Utrecht gevonden en gedetermineerd. – In: Herklots, J.A. (red.), *Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland* 2. E.J. Brill, Leiden: 292-302.
221. Six, G.A. 1858c. [Wetenschappelijke mededeling tijdens 14e algemene vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Amsterdam, den 17 juli 1858.] – *Tijdschrift voor Entomologie* 2: 14-21.
- 222a. Six, G.A. 1860. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de 15e algemene vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Arnhem, den 30sten juli 1859.] – *Tijdschrift voor Entomologie* 3: 19-22.
- 222b. Six, G.A. 1863. Nieuwe bijdrage tot de kennis der inlandsche spinnen. – *Tijdschrift voor Entomologie* 6: 124-128.
223. Smits, J. 2011. Het raadsel van de mijnspinkousjes (Araneae: Atypidae: *Atypus affinis*). – *Entomologische Berichten* 71: 154-157.

- 224a. Snellen van Vollenhoven, S.C. 1859. De dieren van Nederland. Overzicht der gelede dieren. – Kruseman, Haarlem.
- 224b. Snellen van Vollenhoven, S.C. 1868. Natuurlijke Historie van Nederland. De gelede dieren 1. – Kruseman, Haarlem.
- 224c. Soonawala, D., E.A.T. Brienen & L.G. Visser 2009. Diagnostisch gebruik van internet: google de spin. – Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 153: A116, 4pp.
- 225a. Spoek, G.L. 1997a. Bodembewonende spinnen, hooiwagens en bastaardschorpioenen in het hoogveenreservaat Het Bargerveen en in het Oosterbos. – Nieuwsbrief SPINED 11: 3-4.
- 225b. Spoek, G.L. 1997b. Bodembewonende spinnen, hooiwagens en bastaardschorpioenen in het hoogveenreservaat “Het Bargerveen” en in het “Oosterbos”. – Nieuwsbrief SPINED 12: 5-10.
- 225c. Spoek, G.L. 1999. Spinnen, hooiwagens en bastaardschorpioenen in het Oeversebosje en Oevermansbosje. – Nieuwsbrief SPINED 14: 2-5.
- 225d. Spoek, G.L. 2005. Spinnen, hooiwagens en bastaardschorpioenen in het Mantingerveld (Arachnida). – Nieuwsbrief SPINED 20: 23-28.
226. Steenbergen, H.A. 1993. Macrofauna-atlas van Noord-Holland: verspreidingskaarten en responsies op milieufactoren van ongewervelde waterdieren. – Provincie Noord-Holland, Dienst Ruimte en Groen, Haarlem.
- 227a. Thijssse, J.P. 1926. De flora en fauna. – In: Baren, J. van et al. (red.), Gelderland. Van Loghum Slaterus, Arnhem: 75-117.
- 227b. Thijssse, J.P. 1931. Het zebraspinnetje (*Salticus scenicus*). – De Levende Natuur 35: 290-291.
228. Thorell, T. 1875a. Diagnoses aranearum Europaeorum aliquot novarum. – Tijdschrift voor Entomologie 18: 81-108.
229. Thorell, T. 1875b. Descriptions of several European and North-African spiders. – Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 13 (5): 1-203.
- 230a. Tiddo-Folmer (Folmer, T.) 1896. De kruisspin (*Epeira Diadema* L.). – De Levende Natuur 2: 151-154.
- 230b. Tinbergen, N. 1951. Schoonheid die niet gezien wil worden. – De Levende Natuur 54: 61-64.
- 230c. Torenbeek, R. 1988. Hydrobiologie en waterhuishouding: een beleidsvoorbereidende studie. – RIN-rapport 88/55: 1-147.
- 230d. Tutelaers, P. 1978. Spinnen uit de Kempen, Noord-Brabant (Araneae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 38: 85-90.
- 230e. Tutelaers, P. 2000. Spinnen uit Cranendonck. – Nieuwsbrief SPINED 15: 5-21.
- 230f. Tutelaers, P. 2001a. De Driehoekswebspin: eindelijk gevonden! – Natura 98: 116-119.
- 230g. Tutelaers, P. 2001b. *Tetragnatha reimoseri*: een geval van grensoverschrijding. – Nieuwsbrief SPINED 16: 6-7.
- 230h. Tutelaers, P. 2001c. Herfstspinnen bij onze hunnebedden. – Nieuwsbrief SPINED 16: 7-9.
- 230i. Tutelaers, P. 2001d. Herfstspinnen van de Havelterberg. – <http://www.knnv.nl/amsterdam/108spinnenverslag.html>
- 230j. Tutelaers, P. 2001e. Distribution of *Hyptiotes paradoxus* in NW-Europe. An internet distribution map. – <http://www.knnv.nl/eindhoven/iwg/Araneae/Hp>
- 230k. Tutelaers, P. 2003. Verslag van de grensoverschrijdende SPINED-ARABEL excursie van 2002. – Nieuwsbrief SPINED 18: 4-7.
- 230l. Tutelaers, P. 2004. Nieuwe vindplaatsen van *Misumenops tricuspidatus* (Fabricius, 1775) (Struikkameleonspin) in Zuid-Nederland. – Nieuwsbrief SPINED 19: 4-5.
- 230m. Tutelaers, P. 2005. Habitatkeuze van *Araneus alsine* (Walckenaer, 1802) in de Kempen (Araneae, Araneidae). – Nieuwsbrief SPINED 20: 19-20.
- 230n. Tutelaers, P. 2006. Spinneninventarisatie Urkhovense Zegge (Noord-Brabant). – Nieuwsbrief SPINED 22: 13-18.
- 230o. Tutelaers, P. 2007. Waarnemingen aan *Araneus angulatus* Clerck 1757 (schouderkruisspin) (Araneae: Araneidae). – Nieuwsbrief SPINED 23: 4-6.
- 230p. Tutelaers, P. 2008. Heidestuifzandspinnen (Araneae) van de Strabrechtse Heide. – Nieuwsbrief SPINED 24: 25-29.
- 230q. Tutelaers, P. 2009a. Nieuwe vindplaatsen van *Hyptiotes paradoxus* (C.L. Koch). – Nieuwsbrief SPINED 26: 2.
- 230r. Tutelaers, P. 2009b. Nieuwe vindplaatsen van *Hyptiotes paradoxus* (C.L. Koch). – Nieuwsbrief SPINED 26: 13-14.

- 230s. Tutelaers, P. 2009c. De echte spinnen (Araneae). In: Tutelaers, P., I. Raemakers & J. Smits 2009, Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop. – <http://www.knnv.nl/eindhoven/iwg>
- 230t. Tutelaers, P. 2010a. Het spotten van de Gewone Mijnspin (*Atypus affinis*) (Araneae, Atypidae). – Nieuwsbrief SPINED 28: 4.
- 230u. Tutelaers, P. 2010b. Kaskaardespin (*Uloborus plumipes* Lucas) (Araneae, Uloboridae) in huis. – Nieuwsbrief SPINED 28: 36.
- 230v. Tutelaers, P. 2017. Spinnen (Arachnida: Araneae) uit leembossen van Het Groene Woud. – Entomologische Berichten 77: 274-282.
- 230x. Tutelaers, P. & L. Tutelaers 2007. Winterspinnen van onze beekdalen. – Nieuwsbrief SPINED 24: 9-12.
231. Uijttenboogaart, D.L. 1905. Nestbouw van *Argyroneta aquatica*. – Entomologische Berichten, Amsterdam 2: 2-4.
- 231a. Vangsgård, C., H.-D. Reinke, W. Schultz & P. J. van Helsdingen 1996. Red list of spiders (Araneae) of the Wadden Sea Area. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 47: 77-82.
- 231b. Van Colen C., P. Verhelst, T. Simons & T. Moens 2022. Macrofauna en Nekton. – In Cosyns E. (red.) Monitoring van het natuurherstel in het grensoverschrijdende Zwin 2011 - 2021. Eerste tussentijds rapport WVI, INBO, Natuurpuntstudie en Universiteit Gent i.o.v. WVI, Brugge. i.o.v. Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaams Nederlandse Schelde commissie en de Provincie Zeeland.
- 231c. Van Keer, K., H. De Koninck, H. Vanuytven & J. Van Keer 2006. Some – mostly southern European – spider species (Araneae), new or rare to the Belgian fauna, found in the city of Antwerp. – Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 21: 33-40.
- 231d. Vanuytven, H. 2014. *Theridion asopin* n. sp., a new member of the *Theridion melanurum* group (Araneae: Theridiidae) in Europe. – Arachnology 16: 127-134.
232. Vecht, J. van der 1926. De Nederlandsche *Miscophus*-soorten (Hym., Sphecidae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 7: 114-119.
- 232a. Veer, R. van 't 1979. Wielwebspinnentabel. – Jeugdbondsuitgeverij, 's-Graveland/Zeist.
- 232b. Veer, R. van 't & J. Noordijk 2012. Natuuratlas Zaanstad. Bijlage 6. Spinnen en hooiwagens in Zaanstad: 1-17. – Ecologisch Adviesbureau Van 't Veer & De Boer (Jisp) & Stichting Natuur- en Milieueducatie Zaanstreek.
- 232d. Velde, G. van der 1978. Structure and function of a nymphaeid-dominated system. – Proceedings EWRS 5th Symposium Aquatic Weeds 1978: 127-133.
- 232e. Verdonschot, P.F.M. 1996. Migratie van beekmacrofauna en beekvissen. – IBN-rapport 237: 1-85.
- 232f. Verhoogt, K. & S. IJland 2021. De Sepia mierenjager *Zodarion rubrum* nieuw voor Nederland (Araneae: Zodariidae). – Nederlandse Faunistische Medelingen 57: 7-12.
- 232m. Vermeulen, C. & A. Kessler 1980. Coexistence of webspiders (Linyphiidae, Argiopidae) in buckthorn bushes (*Hippophae rhamnoides* L.). – Verhandlungen 8. Internationaler Arachnologen-Kongress, Wien: 155-159.
- 232n. Versteeg, R., K. Middelkamp & N. de Vries 2015. Een waarneming van *Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866) (Araneae, Gnaphosidae). – Nieuwsbrief SPINED 35: 2-3.
- 232o. Versteeg, R. 2023. Interessante spinnensoorten op "De Hoge Veluwe". – Nieuwsbrief SPINED 40: 12-15
- 232p. Versteeg, R. 2024. Spinnen zoeken op de bodem. - Nieuwsbrief Spined 41: 10-12
- 232w. Verstegen, M.A.J.M., H. Siepel, A.H.P. Stumpel & H.A.H. Wijnhoven 1992. Heide en heidefauna: indicaties voor het beheer. – RIN-rapport 92/26: 1-112.
233. Virgilius, Br. 1967. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de maandvergadering van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, te Maastricht op donderdag 5 oktober 1967.] – Natuurhistorisch Maandblad 56: 149.
234. Vlijm, L. 1962. Vorming van de eicocon bij de wolfspin *Pardosa amentata* (Lycosidae). – De Levende Natuur 65: 25-28.
- 235a. Vlijm, L., A. Kessler & C.J.J. Richter 1963. The life history of *Pardosa amentata* (Cl.) (Araneae, Lycosidae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 23: 75-80.
- 235b. Vlijm, L. & A.M. Kessler-Geschiere 1967. The phenology and habitat of *Pardosa monticola*, *P. nigriceps* and *P. pullata* (Araneae, Lycosidae). – Journal of Animal Ecology 36: 31-56.
- 235c. Vlijm, L., A. Kessler & A.M. Kessler-Geschiere 1968. Enige aanvullende gegevens over Nederlandse wolfspinnen (Araneae-Lycosidae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 28: 152-154.

- 235d. Vlijm, L., J. den Hollander & S.E. Wendelaar Bonga 1970. Locomotory activity and sexual display in *Pardosa amentata* (Cl.) (Lycosidae, Araneae). – Netherlands Journal of Zoology 20: 475-484.
- 235e. Vlijm, L. & H. Dijkstra 1980. The behaviour of females of *Pardosa* (Lycosidae) towards a lost egg sac. – Verhandlungen 8. Internationaler Arachnologen-Kongress, Wien: 239-242.
- 236a. Vogels, J. 2012. First record of the salticid spider *Sibianor larae* (Araneae: Salticidae) in the Netherlands. – Entomologische Berichten, Amsterdam 72: 254-258.
- 236b. Vogels, J. 2014. Een zeldzaam geval van epigyne duplicatie in de steppekampoot *Zelotes petrensis* (C.L. Koch, 1839) (Araneae, Gnaphosidae). – Nieuwsbrief SPINED 34: 2-4.
- 236c. Vogels, J. 2019. Verslag van een vakantieweek spinnen verzamelen met *Talavera aperta* (Miller, 1971) nieuw voor de Nederlandse fauna. – Nieuwsbrief SPINED 38: 25-27.
- 236d. Vogels, J. & C. Hiddes 2023.: *Xysticus luctator* L. Koch, 1870 (Araneae, Thomisidae) na 131 jaar weer in Nederland aangetroffen. – Nieuwsbrief SPINED 40: 2-7.
- 236m. Vogels, J., P. Koomen, P. Tutelaers & S. IJland 2019. De heidespringspin *Evarcha michailovi* nieuw gemeld voor Nederland: habitatbeschrijving en determinatie Nederlandse *Evarcha*-soorten. – Entomologische Berichten 79 (6): 217-229.
- 239b. Vossen, M.H.G 1983. *Psilochorus simoni* (Berland) en andere spinnen uit een schuilkelder. – Natuurhistorisch Maandblad 72: 235-237.
- 239c. Vossen, M.H.G. 1985a. In de schijnwerper: *Alopecosa accentuata* (Latreille). – Nieuwsbrief van de Spinnenwerkgroep Limburg 2: 2-3.
- 239d. Vossen, M.H.G. 1985b. Spinnen van Meinweg, een eerste verslag. – Nieuwsbrief van de Spinnenwerkgroep Limburg 2: 4-13.
- 239e. Vossen, M.H.G. 1985c. Interessante waarnemingen. – Nieuwsbrief van de Spinnenwerkgroep Limburg 2: 13.
- 239f. Vossen, M.H.G. 1985d. Spinnen - onbekend maakt onbemind? – Natuurhistorisch Maandblad 74: 214-216.
- 239v. Vugts, H.F. & W.K.R.E. van Wingerden 1976. Meteorological aspects of aeronautic behaviour of spiders. – Oikos 27: 433-444.
240. Waage, G.H. 1938. De dierenwereld op den Sint Pietersberg. – In: Schaik, D.C. van (red.), De Sint Pietersberg. Leiter-Nypels, Maastricht: 180-181.
241. Walckenaar, C.A. 1842. Histoire naturelle des insectes. Aptères 2. Paris.
242. Wasmann, E. 1891. Verzeichniss der Ameisen und Ameisen-gäste von Holländisch Limburg. – Tijdschrift voor Entomologie 34: 39-64.
- 243a. Wasmann, E. 1899a. [Wetenschappelijke mededeling tijdens de vergadering te Venlo, 11 juni 1898.] – Tijdschrift voor Entomologie 41: 60-65. [verslag]
- 243b. Wasmann, E. 1899b. Erster Nachtrag zu den Ameisengästen von holländisch Limburg mit biologischen Notizen. – Tijdschrift voor Entomologie 41: 1-19.
244. Wezel, H.A.T.M. van 1987. Heidefauna in het nationale park de Hoge Veluwe. – RIN-rapport 87/26: 1-30, bijlagen.
245. Wiebes, J.T. 1956. *Tricca lutetiana* Simon, a rare spider, new to the Dutch fauna (Araneae, Lycosidae). – Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 59: 415.
246. Wiebes, J.T. 1959a. A gynandromorphous specimen of *Trochosa terricola* Thorell (Araneae, Lycosidae). – Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen C 62: 84.
247. Wiebes, J.T. 1959b. The Lycosidae and Pisauridae (Araneae) of the Netherlands. – Zoologische Verhandelingen 42: 1-78.
248. Wiebes, J.T. 1960. De wolfspinnen van Meijendel (Araneae, Lycosidae, Pisauridae). I. Levenscycli. II. Vicariantie. III. Habitats. – Entomologische Berichten, Amsterdam 20: 56-62, 69-75, 83-89.
249. Wiebes, J.T. 1962. Spinachtigen-Arachnoidea. II. Nederlandse wolfspinnen-Lycosidae en Pisauridae. – Wetenschappelijke Mededelingen. K.N.N.V. 41: 1-12.
- 250a. Wiebes, J.T. 1964. Nieuwe gegevens over Nederlandse wolfspinnen (Araneae, Lycosidae). – Entomologische Berichten, Amsterdam 24: 97-99.
- 250b. Wiebes, J.T. & J. den Hollander 1974. Spinachtigen- Arachnoidea. II Nederlandse wolfspinnen (Lycosidae en Pisauridae). – Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V. 41: 1-24.
- 250c. Wielink, P. van, R. Felix & H. Spijkers 2009. Biodiversiteit op stammen van zomereiken in De Kaaistoep: 2. Fauna met uitzondering van kevers. – Entomologische Berichten 69: 214-225.
- 250d. Wielink, P. van, R. Felix, J. van Kemenade, A. Mol, T. Peeters & G. Stooker 2020. De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland. – KNNV-afd. Tilburg, Tilburg.

251. Wijnhoven, H. 1997. *Euophrys lanigera* (Simon) met recht op de Nederlandse soortenlijst (Arachnida, Salticidae). – Nieuwsbrief SPINED 12: 1-3.
252. Wilcke, J. 1947. Onze spinnendoders en hun biologie. – De Levende Natuur 50: 37-49.
253. Wingerden, W.K.R.E. van 1973. Dynamik einer Population von *Erigone arctica* White (Araneae, Micryphantidae). Prozesse der Natalität. – Faunistisch-ökologische Mitteilungen 4: 207-222.
254. Wingerden, W.K.R.E. van 1975. Population dynamics of *Erigone arctica* (White) (Araneae, Linyphiidae). – Proceedings of the 6th International Arachnological Congress, Amsterdam 1974: 71-76.
- 254a. Wingerden, W.K.R.E. van 1977. Population dynamics of *Erigone arctica* (White) (Araneae, Linyphiidae). – Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam. [proefschrift]
- 254b. Wingerden, W.K.R.E. van 1980. Aeronautic dispersal of immatures of two linyphiid spider (Araneae, Linyphiidae). – Verhandlungen 8. Internationaler Arachnologen-Kongress, Wien: 91-96.
- 255a. Wingerden, W.K.R.E. van & H.F. Vugts 1974. Factors influencing aeronautic behaviour of spiders. – Bulletin British Arachnological Society, 3: 6-10.
- 255b. Winkel, M. de & J. Noordijk 2014. Een nieuwe renspin voor Nederland: *Philodromus fuscomarginatus* (Araneae: Philodromidae). – Entomologische Berichten 74: 180-186.
256. Zwanenburg, L. 2006. Bedreigde ooverspin in Waterloopbos gevonden. – Van Nature 16(10): 6.

VERSPREIDING VAN DE SPINNEN VAN NEDERLAND OVER DE PROVINCIES

DISTRIBUTION OF SPIDERS OVER THE DUTCH PROVINCES

Voor de provincies zijn de volgende afkortingen gebruikt: NL = Nederland, W = waddengebied, GR = Groningen, FR = Friesland, DR = Drenthe, OV = Overijssel, GL = Gelderland, FL = Flevoland, UT = Utrecht, NH = Noord-Holland, ZH = Zuid-Holland, ZE = Zeeland, NB = Noord-Brabant, LI = Limburg.

VERSPREIDING VAN DE SPINNEN VAN NEDERLAND OVER DE PROVINCIES

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AGELENIDAE (14) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757) | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | ? | + | + |
| <i>Allagelena gracilens</i> (C.L. Koch, 1841) | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834) | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + |
| <i>Eratigena agrestis</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Eratigena atrica</i> (C.L. Koch, 1843) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Eratigena picta</i> (Simon, 1870) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
| <i>Histopona torpida</i> (C.L. Koch, 1837) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| <i>Inermocoelotes inermis</i> (L. Koch, 1855) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + |
| <i>Tegenaria ferruginea</i> (Panzer, 1804) | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| <i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1840 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| <i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785) | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872 | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| <i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMAUROBIIDAE (4) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768) | + | - | ? | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + |
| <i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830) | + | - | + | + | - | - | - | ? | - | + | - | + | + |
| <i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861) | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| <i>Callobius claustrarius</i> (Hahn, 1833) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| ANAPIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Comaroma simoni</i> Bertkau, 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| ANYPHAENIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802) | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ARANEIDAE (36 + 1) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Agalenatae redii</i> (Scopoli, 1763) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| <i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + |
| <i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757 | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + |
| <i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1757 | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| <i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1757 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + |
| <i>Araneus sturmi</i> (Hahn, 1831) | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
| <i>Araneus trivittatus</i> (Fabricius, 1775) | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + |
| <i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Araniella displicata</i> (Hentz, 1847) | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
| <i>Araniella inconspicua</i> (Simon, 1874) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Araniella opistographa</i> (Kulczynski, 1905) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
| <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| <i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| [<i>Gasteracantha cancriformis</i> (Linnaeus, 1758)] | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| <i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| <i>Gibbaranea ullrichi</i> (Hahn, 1835) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851) | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - |

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Hypsosinga heri (Hahn, 1831) | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
| Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844) | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Larinoides cornutus (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Larinoides ixobolus (Thorell, 1873) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larinoides patagiatus (Clerck, 1757) | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Larinoides sericatus (Clerck, 1757) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Singa hamata (Clerck, 1757) | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + |
| Singa nitidula C.L. Koch, 1844 | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Zilla diodia (Walckenaer, 1802) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845) | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + |
| Zygiella x-notata (Clerck, 1757) | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| ATYPIDAE (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Atypus affinis Eichwald, 1830 | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Atypus piceus (Sulzer, 1776) | + | - | - | - | - | ? | - | ? | - | - | - | ? | + |
| CHEIRACANTHIIDAE (5 + 1?) | | | | | | | | | | | | | |
| Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Cheiracanthium pennyi O.P.-Cambridge, 1873 | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| ? Cheiracanthium punctorum (Villers, 1789) | ? | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) | + | + | + | + | + | - | ? | + | + | - | + | + | + |
| CICURINIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Cicurina cicur (Fabricius, 1793) | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + |
| CLUBIONIDAE (24) | | | | | | | | | | | | | |
| Clubiona brevipes Blackwall, 1841 | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Clubiona comta C.L. Koch, 1839 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862 | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995 | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Clubiona germanica Thorell, 1871 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Clubiona juvenis Simon, 1878 | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Clubiona lutescens Westring, 1851 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + |
| Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 | - | + | + | - | + | - | ? | + | + | - | + | + | + |
| Clubiona norvegica Strand, 1900 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clubiona pallidula (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Clubiona pseudonelecta Wunderlich, 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Clubiona rosserae Locket, 1953 | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Clubiona subsultans Thorell, 1875 | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Clubiona subtilis L. Koch, 1867 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Clubiona terrestris Westring, 1851 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ? | + | + |
| Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - |
| Porrhoclubiona vegeta (Simon, 1918) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| CTENIDAE (1 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Phoneutria boliviensis (F.O. P.-Cambridge, 1879)] | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| CYBAEIDAE (4) | | | | | | | | | | | | | |
| Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834) | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Mastigusa arietina (Thorell, 1871) | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
| Mastigusa macrophthalmus (Kulczynski, 1897) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberta maerens (O. P.-Cambridge, 1863) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| DICTYNIDAE (13) | | | | | | | | | | | | | |
| Argenna patula (Simon, 1874) | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Brigittea civica (Lucas, 1848) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Brigittea latens (Fabricius, 1775) | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
| Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | ? | + | + |
| Dictyna major Menge, 1869 | + | - | - | ? | - | + | - | - | - | ? | - | - | - |
| Dictyna pusilla Thorell, 1856 | + | - | - | ? | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Dictyna uncinata Thorell, 1856 | + | - | + | + | + | + | + | - | - | ? | ? | ? | + |
| Lathys humilis (Blackwall, 1855) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nigma flavescentia (Walckenaer, 1830) | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Nigma puella (Simon, 1870) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) | + | - | - | ? | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| DYSDERIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | |
| Dysdera crocata C.L. Koch, 1838 | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) | + | - | - | - | - | - | - | + | ? | + | + | + | + |
| Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + |
| ERESIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| FILISTATIDAE (1 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Filistata insidiatrix (Forsskål, 1775)] | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| GNAPHOSIDAE (33) | | | | | | | | | | | | | |
| Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) | - | - | - | - | - | ? | - | + | ? | - | - | - | + |
| Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Drassodes pubescens (Thorell, 1856) | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
| Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866) | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
| Haplodrassus dalmatinus (L. Koch, 1866) | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Micaria dives (Lucas, 1846) | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
| Micaria formicaria (Sundevall, 1831) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + |
| Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Micaria lenzi</i> Bösenberg, 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Micaria silesiaca</i> L. Koch, 1875 | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
| <i>Micaria subopaca</i> Westring, 1861 | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
| <i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866) | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871) | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + |
| <i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| <i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837) | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Zelotes aeneus</i> (Simon, 1878) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| HAHNIIDAE (7) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
| <i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875 | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| <i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841) | - | + | + | + | + | + | - | ? | + | + | - | + | + |
| <i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + |
| <i>Iberina candida</i> (Simon, 1875) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Iberina montana</i> (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| LINYPHIIDAE (237 + 1 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Abacoproeces saltuum</i> (L. Koch, 1872) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Acartauchenius scurrialis</i> (O.P.-Cambridge, 1873) | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Agyneta affinis</i> (Kulczynski, 1898) | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Agyneta cauta</i> (O.P.-Cambridge, 1903) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| <i>Agyneta conigera</i> (O.P.-Cambridge, 1863) | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
| <i>Agyneta decora</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - |
| <i>Agyneta innotabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863) | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
| <i>Agyneta mollis</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Agyneta ramosa</i> Jackson, 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| <i>Agyneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Agyneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Agyneta subtilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| <i>Allomengea scopigera</i> (Grube, 1859) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879) | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| <i>Anguliphantes angulipalpis</i> (Westring, 1851) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Aphileta misera</i> (O.P.-Cambridge, 1882) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Araeoncus crassiceps</i> (Westring, 1861) | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - |
| <i>Araeoncus humillis</i> (Blackwall, 1841) | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884) | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
| <i>Baryphyma maritimum</i> (Crocker & Parker, 1970) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861) | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
| <i>Baryphyma trifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863) | - | - | - | + | + | - | + | ? | + | + | + | ? | - |
| <i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |

FAMILIE / SOORT

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Erigone maritima Kulczynski, 1902 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Erigone promiscua (O.P.-Cambridge, 1873) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Erigonella ignobilis (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Floronia bucculenta (Clerck, 1757) | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glypesis servulus (Simon, 1882) | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - |
| Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Gonatium rubens (Blackwall, 1833) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871) | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + |
| Gongyliidiellum murcidum Simon, 1884 | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Gongyliidiellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Halorates reprobus (O.P.-Cambridge, 1879) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Helophora insignis (Blackwall, 1841) | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Hybocoptus corrugis (O.P.-Cambridge, 1875) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hylaphantes graminicola (Sundevall, 1830) | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Hylaphantes nigritus (Simon, 1881) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - |
| Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1903) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Kaestneria pullata (O.P.-Cambridge, 1863) | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Labulla thoracica (Wider, 1834) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Leptyphantes leprosus (Ohlert, 1865) | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Leptyphantes minutus (Blackwall, 1833) | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + |
| Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Lessertia dentichelis (Simon, 1884) | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Linyphia hortensis Sundevall, 1830 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Linyphia triangularis (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Macrargus carpenteri (O.P.-Cambridge, 1895) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Macrargus rufus (Wider, 1834) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Maro minutus O.P.-Cambridge, 1907 | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Maso gallicus Simon, 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Maso sundevalli (Westring, 1851) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Megalephyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
| Mermessus denticulatus (Banks, 1898) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Metopobactrus prominulus (O.P.-Cambridge, 1873) | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Micrargus subaequalis (Westring, 1851) | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Microctenonyx subitaneus (O.P.-Cambridge, 1875) | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Microlinyphia impigra (O.P.-Cambridge, 1871) | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
| Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |

FAMILIE / SOORT

| | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834) | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - |
| <i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884) | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
| <i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851) | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| <i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1841) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
| <i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1841) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| <i>Neriene furtiva</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| <i>Neriene hammeni</i> (Van Helsdingen, 1963) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Neriene montana</i> (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Neriene peltata</i> (Wider, 1834) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Neriene radiata</i> (Walckenaer, 1841) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Obscuriphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841) | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853) | - | - | ? | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834) | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| <i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Ostearius melanopygus</i> (O.P.-Cambridge, 1880) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| <i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| <i>Palliduphantes insignis</i> (O.P.-Cambridge, 1913) | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + |
| <i>Palliduphantes pallidus</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Panamomops mengei</i> Simon, 1926 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| <i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Parapelecopsis nemoraliooides</i> (O.P.-Cambridge, 1884) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Pelecopsis elongata</i> (Wider, 1834) | - | - | + | - | - | - | + | + | + | ? | - | + | ? |
| <i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| <i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834) | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Pelecopsis radicicola</i> (L. Koch, 1872) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| <i>Peponocranium ludicum</i> (O.P.-Cambridge, 1861) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953 | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Poeciloneta variegata</i> (Blackwall, 1841) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| <i>Porrhomma cambridgei</i> Merrett, 1994 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Porrhomma campbelli</i> F.O.P.-Cambridge, 1894 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| <i>Porrhomma egeria</i> Simon, 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| <i>Porrhomma errans</i> (Blackwall, 1841) | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| <i>Porrhomma microcavense</i> Wunderlich, 1990 | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Porrhomma micropthalmum</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Porrhomma microps</i> (Roewer, 1931) | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Porrhomma montanum</i> Jackson, 1913 | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Porrhomma oblitum</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| <i>Porrhomma pallidum</i> Jackson, 1913 | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| <i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834) | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |

FAMILIE / SOORT

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Praestigia duffeyi Millidge, 1954 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prinerigone vagans (Audouin, 1826) | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1906) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Satilatlas britteni (Jackson, 1913) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Savignya frontata Blackwall, 1833 | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Silometopus ambiguus (O.P.-Cambridge, 1906) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Silometopus bonessi Casemir, 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1873) | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Silometopus reussi (Thorell, 1871) | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Styloctetor compar (Westring, 1861) | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
| Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1873) | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Syedra gracilis (Menge, 1869) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Tapinopa longidens (Wider, 1834) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Taranucnus setosus (O.P.-Cambridge, 1863) | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
| Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + |
| Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Theonina cornix (Simon, 1881) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Thyreosthenius biovatus (O.P.-Cambridge, 1875) | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Tiso vagans (Blackwall, 1834) | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Trichoncus affinis Kulczynski, 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Trichoncus hackmanni Millidge, 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Trichoncus saxicola (O.P.-Cambridge, 1861) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Trichoncus vasconicus Denis 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Trichopterna cito (O.P.-Cambridge, 1873) | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ? | - | + | + |
| Typhocrestus digitatus (O.P.-Cambridge, 1873) | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Walckenaeria antica (Wider, 1834) | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Walckenaeria atrotibialis (O.P.-Cambridge, 1878) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Walckenaeria capito (Westring, 1861) | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
| Wackenaeria clavicornis (Emerton, 1882) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Walckenaeria corniculans (O.P.-Cambridge, 1875) | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836) | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + |

FAMILIE / SOORT

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pardosa pullata (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pardosa purbeckensis F.O.P.-Cambridge, 1895 | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - |
| Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
| Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
| Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 | - | ? | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Pirata piraticus (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pirata piscatorius (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Pirata tenuitarsis Simon, 1876 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Piratula hygrophila (Thorell, 1872) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Piratula knorri (Scopoli, 1763) | ? | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Piratula latitans (Blackwall, 1841) | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Piratula uliginosa (Thorell, 1856) | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| Trochosa robusta (Simon, 1876) | + | - | - | ? | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Trochosa ruricola (De Geer, 1778) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Trochosa spinipalpis (F.O.P.-Cambridge, 1895) | + | - | + | + | + | ? | - | - | + | - | + | + | + |
| Trochosa terricola Thorell, 1856 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| MACROTHELIDAE (1 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)] | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| MIMETIDAE (4) | | | | | | | | | | | | | |
| Ero aphana (Walckenaer, 1802) | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Ero cambridgei Kulczynski, 1911 | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + |
| Ero furcata (Villers, 1789) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Ero tuberculata (De Geer, 1778) | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| MITURGIDAE (5) | | | | | | | | | | | | | |
| Zora nemoralis (Blackwall, 1861) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Zora parallela Simon, 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Zora pardalis Simon, 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Zora silvestris Kulczynski, 1897 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Zora spinimana (Sundevall, 1833) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| MYSMENIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Microdipoena jobi (Kraus, 1967) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| NESTICIDAE (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Howaia mogera (Yaginuma, 1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
| OECOBIIDAE (2 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Oecobius amboseli Shear & Benoit, 1974] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| [Oecobius navus Blackwall, 1859] | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| OONOPIDAE (3 + 4 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Heteroonops spinimanus (Simon, 1892)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [Ischnothyreus velox Jackson, 1908] | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Oonops domesticus De Dalmas, 1916 | + | - | ? | ? | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| Oonops pulcher Templeton, 1835 | - | - | ? | ? | - | - | ? | ? | ? | + | - | + | ? |
| [Silhouettella loricatula (Roewer, 1942)] | - | - | ? | ? | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| Tapinestis inermis (Simon, 1882) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [Triaeris stenaspis Simon, 1891] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| OXYOPIDAE (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | - | + |

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | + | + |
| PHILODROMIDAE (19) | | | | | | | | | | | | | |
| Philodromus aureolus (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Philodromus buchari Kubcova, 2004 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Philodromus buxi Simon, 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Philodromus collinus C.L. Koch, 1835 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Philodromus dispar Walckenaer, 1826 | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Philodromus poecilus (Thorell, 1872) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philodromus praedatus O.P.-Cambridge, 1871 | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Philodromus rufus Walckenaer, 1826 | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Rhysodromus fallax (Sundevall, 1833) | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Thanatus striatus C.L. Koch, 1845 | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Thanatus vulgaris Simon, 1870 | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Tibellus maritimus (Menge, 1875) | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PHOLCIDAE (2 + 4 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Belisana ambengan Huber, 2005] | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| [Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)] | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Psilochorus simoni (Berland, 1911) | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + |
| [Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858)] | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| [Spermophora kerinci Huber 2005] | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PHRUROLITHIDAE (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| PISAURIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | |
| Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ? |
| Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + |
| SALTICIDAE (43 + 1? + 5 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Attulus caricis (Westring, 1861) | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Attulus distinguendus (Simon, 1868) | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Attulus floricola (C.L. Koch, 1837) | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
| ? Attulus inexpectus (Logunov & Kronestedt, 1997) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attulus pubescens (Fabricius, 1775) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Attulus saltator (O.P.-Cambridge, 1868) | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Euophrys herbigrada (Simon, 1871) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evarcha arcuata (Clerck, 1757) | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Evarcha falcata (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Evarcha michailovi Logunov, 1992 | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + |

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Hasarius adansonii</i> (Audouin, 1826) | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| <i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1832) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| <i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835 | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| <i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802) | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Heliophanus dubius</i> C.L. Koch, 1835 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| <i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Heliophanus kochii</i> Simon, 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [<i>Icius hamatus</i> (C.L. Koch, 1846)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| [<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937] | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| <i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846) | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
| <i>Marpissa pomatia</i> (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859) | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + |
| <i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| <i>Neon valentulus</i> Falconer, 1912 | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Pellenes tripunctatus</i> (Walckenaer, 1802) | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + |
| [<i>Phidippus audax</i> (Hentz, 1845)] | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| [<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)] | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| <i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826) | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Pseudeuophrys lanigera</i> (Simon, 1871) | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| <i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868) | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| <i>Salicus cingulatus</i> (Panzer, 1797) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Salicus scenicus</i> (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Salicus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837) | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| <i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865) | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + |
| <i>Sibianor larae</i> Logunov, 2001 | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Synageles hilarulus</i> (C.L. Koch, 1846) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836) | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
| <i>Talavera aequipes</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
| <i>Talavera aperta</i> (Miller, 1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837) | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| SCYTODIDAE (1 + 1 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + |
| [<i>Scytodes venusta</i> (Thorell, 1890)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| SEGESTRIIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843 | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| <i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790) | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| <i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| SICARIIDAE (2 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [<i>Loxosceles deserti</i> Gertsch, 1973] | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [<i>Loxosceles rufescens</i> (Dufour, 1820)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| SPARASSIDAE (1 + 8 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [<i>Barilestis variatus</i> Pocock, 1900] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [<i>Eusparassus dufouri</i> Simon, 1932] | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| [<i>Eusparassus walckenaeri</i> (Audouin, 1826)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| [<i>Heteropoda venatoria</i> (Linnaeus, 1767)] | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

FAMILIE / SOORT

| FAMILIE / SOORT | NL | GR | FR | DR | OV | GL | FL | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ozyptila pullata (Thorell, 1875) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Ozyptila rauda Simon, 1875 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ozyptila sanctuaria (O.P.-Cambridge, 1871) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Ozyptila scabricula (Westring, 1851) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Ozyptila simplex (O.P.-Cambridge, 1862) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Ozyptila trux (Blackwall, 1846) | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Ozyptila westringi (Thorell, 1873) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistius truncatus (Pallas, 1772) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Psammitis ninnii (Thorell, 1872) | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Synema globosum (Fabricius, 1775) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Thomisus onustus Walckenaer, 1805 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Tmarus piger (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Xysticus acerbus Thorell, 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Xysticus audax (Schrantz, 1803) | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837 | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Xysticus cristatus (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Xysticus ferrugineus Menge, 1876 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Xysticus kempeleni Thorell, 1872 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xysticus kochi Thorell, 1872 | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + |
| Xysticus lanio C.L. Koch, 1835 | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
| Xysticus luctator L. Koch, 1870 | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Xysticus ulmi (Hahn, 1831) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| TITANOECIDAE (1 + 1 introduced) | | | | | | | | | | | | | |
| [Pandava laminata (Thorell, 1878)] | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Titanoeeca quadriguttata (Hahn, 1833) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| ULOBORIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | |
| Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834) | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Uloborus plumipes Lucas, 1846 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
| ZODARIIDAE (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Zodarion italicum (Canestrini, 1868) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Zodarion rubidum Simon, 1914 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| ZOROPSIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + |