

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES
NATURELLES DE BELGIQUE

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT
VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

DOCUMENTS DE TRAVAIL

STUDIEDOCUMENTEN

N° 23

CATALOGUE DES ARAIGNEES DES PYRENEES
Espèces citées, nouvelles récoltes, bibliographie

par

R. BOSMANS et R. DE KEER^{*}

* : Rijksuniversiteit Gent
Laboratorium voor Oecologie, Zoögeografie en Natuurbehoud
Ledeganckstraat 35
B - 9000 GENT

Edition du
Patrimoine de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique
Rue Vautier 29, B-1040 BRUXELLES

D/1985/0339/5

.....	35
Pisauridae, Dolomedidae, Agelenidae	36
Cybaeidae, Hahniidae	38
Dictynidae	39
Titanoecidae, Amaurobiidae, Oxyopidae, Anyphaenidae	40
Liocranidae, Clubionidae	41
Gnaphosidae	42
Zoridae, Eusparassidae, Philodromidae	47
Thomisidae	49

S U M M A R Y

=====

The catalogue gives a list of 860 species of spiders known from the French and Spanish Pyrénées. For each species, the authors list all localities, cited in the literature. They also indicate the author of each citation. Observations by the authors themselves are added under the heading "New localities".

R E S U M E

=====

Le catalogue donne une liste de 860 espèces d'araignées déjà connues des Pyrénées françaises et espagnoles. Pour chaque espèce, les auteurs donnent toutes les localités mentionnées dans la littérature et précisent l'auteur de chaque citation. Des captures récentes faites par les auteurs eux-mêmes sont également incorporées et sont citées comme des "Localités Nouvelles".

I N T R O D U C T I O N

=====

Lors d'un stage ("Field Course") organisé par la "British Arachnological Society" dans les Pyrénées orientales (Mas Forges, Villefranche-le-Conflent), un grand nombre d'araignées ont été capturées par les participants. Leur identification s'est heurtée à de nombreuses difficultés, tant durant le stage qu'après.

En effet, le seul ouvrage général disponible était celui de SIMON: "Les Arachnides de France" (1914-1937). Depuis il s'est ajouté un grand nombre de contributions à la faune aranéologique des Pyrénées, publiées dans divers périodiques, principalement par DENIS (1931-1967). Citons également différents ouvrages sur la faune aranéologique d'autres parties de l'Europe, et quelques révisions de genres, améliorant la connaissance de l'aire de répartition des espèces, et établissant de nouvelles synonymies.

Pour faciliter nos identifications et évaluer nos nouvelles récoltes, nous avons rassemblé toutes ces données sur fiches. Nous croyons utile de publier un résumé de ces recherches, afin que ce vaste travail ne passe pas inaperçu; de la sorte, les identifications par les futurs étudiants de la faune aranéologique des Pyrénées seront grandement facilitées. Le résultat en est un catalogue mis à jour des araignées des Pyrénées.

Nous avons également incorporé des données nouvelles, notamment les récoltes faites par quelques collègues belges, par les participants au stage à Mas Forges et par nous-mêmes.

Pour des raisons pratiques, nous avons limité notre étude à Andorre, aux départements français et aux provinces espagnoles s'étendant au moins en partie sur le territoire des Pyrénées. Ceci a fortement facilité les recherches bibliographiques et a permis d'inclure de nombreuses données anciennes où seule la province était citée.

Pour chaque espèce citée, nous mentionnons dans l'ordre :

1. Les données bibliographiques. Les localités sont groupées par ordre alphabétique selon la province; les chiffres entre parenthèses se réfèrent à l'annexe 1 (liste bibliographique).

2. Les localités nouvelles. Celles-ci ont été établies par L. BAERT, R. BOSMANS, K. DESENDER, J. KEKENBOSCH, J. MERTENS et par les participants belges au "Field Course" à Mas Forges, Pyrénées Orientales (R. BOSMANS, D. CRAPPE, H. HOFTE et R. JOCQUE). Trois participants anglais (F & J. MURPHEY, D. JONES) nous ont communiqué leurs listes de captures, également incorporées. Une liste de toutes les localités, avec une description sommaire de l'habitat, constitue l'annexe 2.

3. L'aire de répartition de l'espèce, selon ROEWER (1942, 1954) et BRIGNOLI (1983), ainsi que les données de nos fiches.

La nomenclature suivie est celle de BRIGNOLI (1983).

Gand, 20 février 1985.

L I S T E D E S A B B R E V A T I O N S

=====

- NL . : nouvelles localités
- M : capture à main
- T : capture par tamisage
- P : capture par piègage (pitfall)
- A : capture par respiratoire modifié
- BP : Basses Pyrénées
- HP : Hautes Pyrénées
- HG : Haute Garonne
- ARI : Ariège
- PO : Pyrénées Orientales
- AN : Andorra
- GU : Guipuzcoa
- NA : Navarra
- ARA : Aragon
- HU : Huesca
- LE : Lerida
- GE : Gerona
- * : espèces endémiques.

LISTE DES ESPECES

CTENIZIDAE

1. *Nemesta caementaria* (LATREILLE, 1798)
Lit. : PO : Amélie (35), Banyuls (97),
La Bastide (42), Cerbère (42),
Céret (18), Collioure (97),
St.-Marin-d'Albère (35),
Haute vallée de la Massane (18),
Montesquieu (42)
Ca (97).
Europe méridionale.
2. *Nemesta dubia* CAMBRIDGE, 1874
Lit. : PO : Banyuls (97), Canigou (97),
Collioure (42), Molyt (97),
Montalba (42), Pézilla-de-Conflent
(42), La Preste (97), Sournia (42),
Vallespir (31).
GE : Bagur (38), Ripol (38).
N.L. : PO : Prats-de-Mollo 1/1 (5).
HU : Jaca 700m 3/- (21).
Europe Sud-Ouest.
3. *Nemesta eleanora* CAMBRIDGE, 1873
Lit. : GE : Tosca de Mar (38).
Europe Sud-Ouest.
- * 4. *Nemesta raripila* SIMON, 1914
Lit. : PO : Banyuls (18,97), Céret (97),
Massane (18,97), Velmany 1000m
(97).
Pyrénées.
5. *Nemesta simoni* CAMBRIDGE, 1874
Lit. : BP : 0 - 1200m (97).
HP : 0 - 1200m (97).
HG : 0 - 1200m (97), Payssous (42),
Saint-Gaudens (42), Saleich (42).
ARI : 0 - 1200m (97), Ercé (35), Mont
Rouch 1700 - 1800m (35).
PO : Banyuls (42), Las Illas (42),
La Trinité (42).
Europe Sud-Ouest.

ATYPIDAE

6. *Atypus affinis* EICHWALD, 1830
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Castet d'Aleu (35), Moulis (35).
PO : Pic de la Coumeille > 1200m (19),
Prats-de-Mollo > 750m (19), Saint-
Laurent-de-Cerdans 850m (19).
Europe occidentale, centrale et méridionale,
Algérie.

FILISTATIDAE

7. *Filistata insidiatrix* (FORSKOL, 1775)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES, 1982).
Région méditerranéenne, Afrique orientale.

SCYTODIAE

8. *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1804)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
Palalda (18), Vingrou (Coll. MURPHY,
1982).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (41) -/1 (42),
Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY, 1982).
Cosmopolite.
9. *Scytodes velutina* HEINEKEN & LOWE, 1836
Lit. : PO : Banyuls (18).
Europe méridionale, Afrique.
10. *Loxosceles rufescens* (DUFOUR, 1820)
(= *L. distincta* (LUCAS, 1846))
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
Cosmopolite.

PHOLCIDAE

11. *Pholcus opilionoides* (SCHRANK, 1781)
Lit. : HP : Orédon 1860m (24).
PO : Amélie (18), Banyuls (98),
Gorges de Caranca (52), Prats-
de-Mollo (18), La Preste (18).
AN : Andorra la Vella (22), Encamps
1260m (22), Les Escaldes (22),
Massana 1320-1630m (22).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (42), Fillols 850m
-/1 (43).
Europe centrale et méridionale, Asie centrale.
12. *Pholcus phalangioides* (FUESSL, 1775)
Lit. : PO : Arles-sur-Tech (18), Banyuls (18),
Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
GU : Mondragon (116).
Cosmopolite.
13. *Holocnemus pluckei* (SCOPOLI, 1763)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
Massane (18).
AN : Sant Julia de Loria 1040m (22).
Europe méridionale, Afrique du Nord.
14. *Spermophora senoculata* (DUGES, 1836)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
Région méditerranéenne.

DYSDERIDAE

15. *Dysdera cribrata* SIMON, 1882
Lit. : PO : Banyuls (98).
AN : 2550m (22).
Alpes, Pyrénées.
16. *Dysdera crocata* C.L. KOCH, 1839
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (42).
Cosmopolite.

17. *Dysdera erythrina* (WALCKENAER, 1802)

Lit. : BP : Lescun (33), Sare 400-600m (28)
 HP : Glaire 1800m (31), Marcadau-Vignemale 1780-2050m (27), Orédon 1800-1900m (24, 25, 31), Las Soula 1750m (35).

ARI : Donnezan 1300m (36), Lacave (42), Sentenac (35), Vicderros 2400m (42).

PO : Banyuls (18,39), Capcir 1600m (36), Carlit 2040-2650m (26), Canigou 2400m(42), Massane 750m (42).

AN : 1050-1840m (22).

N.L. : PO : Canigou 2200m -/1 (37), Col de Portus 1600m 1/- (45) -/1 (46) -/2 (47) 1/- (49), Mas Forges 750m -/1 (31), Prats-de-Mollo 1/- (5) -/1 (31).

Europe.

Dysdera erythrina fervida SIMON, 1882

Lit. : BP : Eaux-Bonnes 800-1380m (32)
 Midi de la France, Corse, Baléares.

* 18. *Dysdera subsquarrosa* (SIMON, 1914)

Lit. : Pyrénées (97)

N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
 Pyrénées.

* 19. *Harpactocrates cantabrorum* SIMON, 1914

Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400m (32), Sainte-Engrâce (35).

HP : Marcadau-Vignemale 1780m (27).
 Pyrénées.

* 20. *Harpactocrates gurdus* SIMON, 1914

Lit. : PO : Canigou (97)

CA : "Montagnes" (97)
 Pyrénées.

21. *Harpactocrates ignavus* (SIMON, 1882)

Lit. : ARI : Ax-les-Termes (97), Salau (28).
 Midi de la France, Espagne.

* 22. *Harpactocrates radulifer* SIMON, 1914

Lit. : PO : Canigou (97).
 Pyrénées.

* 23. *Harpactocrates ravastellus* SIMON, 1914

Lit. : BP : Arudy (97), Gabas (97), Larrou (97), Lescun (33), Urdos (97).

HP : Gavarnie (97), Orédon 1900m (25), Payolles (97).

ARI : Freychinède 1310m (35), Montvalier 2400m (28), Sentenac (35).

PO : Canigou (97), 2200m (42).

AN : Andorra la vella 2070m (22).

N.L. : BP : Larrou 1050m -/1 (17).
 PO : Canigou 1500m 1/11 (57) 1750m 2/13 (56) 2200m 1/1 (54), Col de Portus -/1 (46).

Pyrénées.

24. *Harpactea corticalis* SIMON, 1882

Lit. : PO (97)

ARI : Mont Rouch 1700-1800m (35).
 France méridionale, Italie, Corse.

25. *Harpactea hombergi* (SCOPOLI, 1763)

Lit. : BP : Herboure 200m (28), Jatzou (28), Sare 400-600m (28).

PO : Banyuls (18), Palalda (18), Prats-de-Mollo (18).

AN : Sant Julia de Loria 1350-1400m (22).

N.L. : PO : Banyuls -/1 (42), Canigou 750m (Coll. MURPHY 1982), Vernet-les-Bains 1/- (36).

Europe.

26. *Harpactea serenus* SIMON, 1907

Lit. : PO : Collioure (97), Le Vernet (97).
 Midi de la France, Espagne.

SEGESTRIIDAE27. *Segestria bavarica* C.L. KOCH, 1843.

Lit. : PO : Capcir (36), Prats-de-Mollo (18).
 Europe.

28. *Segestria florentina* (ROSSI, 1790)

Lit. : PO : Banyuls (18), Montalba (18).
 AN : Santa Julia de Loria 1050m (22).
 Europe centrale et méridionale.

29. *Segestria fusca* SIMON, 1882

Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (97), Collioure (97).
 Midi de la France.

30. *Segestria senoculata* (LINNE, 1758)

Lit. : HP : Lespitau 1400m (35).

PO : Amélie (18), Banyuls (98), Capel (18), Carlit 1950-2020m (26), Roc Saint-Sauveur (18), La Preste (18), Tour-de-Carol (18).

AN : Sant Julia de Loria 1390-1860m (22).

N.L. : PO : Canigou 1500m 1/- (57), Col de Portus 1600m -/1 (45), Gorges de Caranca 800m -/1 (48).

Région paléarctique.

31. *Ariadna insidiatrix* AUDOUIN, 1827

Lit. : PO : Banyuls (18).
 Europe et Afrique méditerranéenne.

OONOPIDAE32. *Orchestina pavesi* (SIMON, 1873)

Lit. : PO : (97).
 Région ouest-méditerranéenne.

33. *Orchestina simoni* DALMAS, 1916

Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Prats-de-Mollo (18).
 Midi de la France, Suisse.

34. *Tapinesthis inermis* (SIMON, 1882)

Lit. : PO : Amélie (18).
 Midi de la France.

35. *Oonops amoenus* DALMAS, 1916

Lit. : PO : Banyuls (18).
 Midi de la France.

36. *Oonops placidus* DALMAS, 1916

Lit. : PO : Banyuls (18), Massane (18).
 Midi de la France.

* 37. *Oonops procerus* SIMON, 1882

Lit. : ARI : Donnezan 1350m (36).
 PO : Banyuls (18), Céret (18,97), Sainte Marie (51), Velmanya (97)

- HU : Loarre (111), Rodellar (111).
 N.L. : PO : Canigou 750m -/1 (59), Canigou
 750m (Coll. MURPHY 1981),
 Canigou 1500m 1/4 (57), Vernet-
 les-Bains 1/- (34).
 HU : San Juan de la Pena 1200m -/2 (22).
 Pyrénées.
38. *Conops pulcher* TEMPLETON, 1834
 N.L. : PO : ? Montlouis 1600m (Coll. MURPHY
 1982).
 Europe centrale et occidentale, Algérie.
39. *Conopinus angustatus* (SIMON, 1882)
 Lit. : PO : Banyuls (97).
 Région ouest-méditerranéenne.
40. *Dysderina loricatula* ROEWER, 1942
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 Europe sud-ouest, Afrique du Nord.

LEPTONETIDAE

41. *Leptoneta convexa* SIMON, 1872
 Lit. : HG : Gouillou (34).
 ARI : Aven Casteras (34), Canjole (34),
 Liqué (34), Mas d'Azil (34),
 Moulis (34), Prat (97), St.-
 Girons (97).
 Pyrénées.
42. *Leptoneta fouresi* DRESCO, 1979
 Lit. : HG : Gouillou (53).
 Pyrénées.
43. *Leptoneta infuscata* SIMON, 1872
 Lit. : HG : Arbas (97).
 ARI : Aulus (28), Bastide-de-Sérou (34),
 Marroulis (42), Massat (28),
 Montgauch (51), Mont Rouch 1700-
 1800m (35), Montseron (34), Salau
 (28).
 LE : Durro (89), Villanova de Meya (89).
 Pyrénées.
- Leptoneta infuscata iberica* FAGE, 1913
 Lit. : LE : Camarasa (109)
 Pyrénées espagnoles.
- Leptoneta infuscata minos* SIMON, 1882
 Lit. : ARI : Aven d'Alos (34), Gourgue (34),
 Montardit (34).
 PO : Arles-sur-Tech (18), Banyuls (18,
 97), Coustouges (18), Montbolo (35),
 Prats-de-Mollo (18), La Preste (18),
 Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m 2/- (59) 1250m 1/-
 (58) 1500m 1/1 (57), Vernet-les-
 Bains 2/- (33).
 Midi de la France.
- Leptoneta infuscata corberensis* FAGE, 1913
 Lit. : PO : Corbère (97).
 Pyrénées.

- * 44. *Leptoneta jeanneli* SIMON, 1907
 Lit. : HP : Nistos (28,57), Tibirran (97).
 Pyrénées.
- * 45. *Leptoneta leucophthalma* SIMON, 1907
 Lit. : HU : La Fortunada (89, 109).
 LE : Seradell, Toralla, Erina (89, 109)
 Pyrénées espagnoles.
- * 46. *Leptoneta microphthalma* SIMON, 1872
 Lit. : HG : Pic de Cogire 900m (34), Arbas (57)
 Saleich (57).
 ARI : Aulus (34,97), Cazavet (97),
 Plagnol de la Plagne (34), Saint-
 Girons (34), Saleich (34, 97).
 Pyrénées.
- * 47. *Leptoneta parocula* SIMON, 1907
 Lit. : HU : Buerba (89), Cueva de Abajo de
 los gloces (89), Espluga de
 Barrau (89), Jaca, Vallée d'Anso
 (111).
 LE : Cova del Ladre (89).
 Pyrénées espagnoles.

TELEMIIDAE

- * 48. *Telema tenella* SIMON, 1882
 Lit. : PO : Arles-sur-Tech (18), Canigou
 (102), Can Pey (18), Cova
 Bastera (33), La Preste (18, 97),
 Ria (97).
 Pyrénées.

ERESIDAE

49. *Eresus niger* (PETAGNA, 1787)
 Lit. : PO : Banyuls (18), Cerbère (18), Col
 de L'Ouillat 1000m (42).
 GE : Rosas (64).
 Région paléarctique.
50. *Eresus robustus* FRANGANILLO, 1918
 Lit. : NA : Leire (89).
 Espagne.

ZODARIIDAE

51. *Storena reticulata* (SIMON, 1870)
 Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
 CA : San Miguel del Fay.
 France méridionale, Espagne, Algérie.
52. *Zodarion elegans* (SIMON, 1873)
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 Europe méridionale.
53. *Zodarion fuscum* (SIMON, 1870)
 Lit. : BP : Hendaye (97), St.-Jean-de-Luz (97)
 Europe sud-ouest.
- * 54. *Zodarion marginiceps* SIMON, 1914
 Lit. : PO : Banyuls (97), Canigou (97),
 Montlouis (97).
 Pyrénées.
- Zodarion marginiceps pseudoelegans* DENIS, 1914
 Lit. : PO : La Tour-de-Carol (18), Quès (18)
 Pyrénées.

- * 55. *Zodariion monticola* DENIS, 1950
Lit.: HP : Gavarnie 1710m (31), Orédon 1900m (24).
Pyrénées.
56. *Zodariion pusio* SIMON, 1914
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Canigou 750m (Coll. MURPHY, 1982, Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
France méridionale, Italie.
57. *Zodariion rubidum* SIMON, 1914
Lit. : ARI : Donnezan. 1800m (36).
PO : Canigou (97), La Preste (18), Massane (97), Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 3/- (59) 1250m 4/1 (58) 1500m 2/1 (57) 1750m 4/1 (56), Mas Forges 750m -/1 (31).
France.

OECOBIIDAE

58. *Oecobius annulipes* LUCAS, 1846
Lit. : PO : Banyuls (18)
Cosmopolite.
59. *Oecobius cellariorum* (DUGES, 1836)
Lit. : PO : Banyuls (18)
Région ouest-méditerranéenne.
60. *Oroctea durandi* (LATREILLE, 1809)
Lit. : ARI : Pic d'Engral 1300m (35).
PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech 910-1200m (18), Banyuls (18), Sorède 350m (42).
AN : Sant Julia de Loria
N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/- (59).
Région méditerranéenne.

ULOBORIDAE

61. *Uloborus plumipes* LUCAS, 1846
Lit. : PO : Banyuls (18).
Europe et Asie méridionale, Afrique.
62. *Uloborus walckenaerius* LATREILLE, 1806
Lit. : PO : Banyuls (18), Massane (18), Vallespir (18).
GE : Amer (64), Arbucias (64), Caldas de Malavella (64).
AN : Sant Julia de Loria (22).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES, 1982), Mas Forges 800m -/6 (32).
Région paléarctique.
63. *Hyptiotes paradoxus* (C.L. KOCH, 1837)
Lit. : CA : San Miguel del Fay (64).
AN : Sant Julia de Loria 1390-1400m (22).
Europe, Madère.

TETRAGNATHIDAE

64. *Tetragnatha extensa* (LINNE, 1758)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Orédon 1850-1920m (24, 25).
ARI : Donnezan 1200m (36), Lers 1390m (35) Suc 1000m (35).
PO : Capcir 1650m (36), Carlit 1970-1990m (26), Coustouges (18), Manyagues (18).
N.L. : PO : Cerdagne 1/- (3).
Région paléarctique et néarctique.
65. *Tetragnatha montana* SIMON, 1874
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Gèdre 980m (31), Pierrefitte-Nestalas (31).
PO : Amélie (18), Collioure (18), Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18), Le Tech (18).
AN : Andorra la vella 1050-1390m (22) Sant Julia de Loria 900-1000m (22).
N.L. : BP : Bruges 370m 2/- (90).
Région paléarctique.
66. *Tetragnatha nitens* (AUDOUIN, 1827)
Lit. : PO : Banyuls (97).
Europe méridionale, Afrique.
67. *Tetragnatha obtusa* C.L. KOCH, 1837
Lit. : HP : Loudenvielle (35), Marcadau-Vignemale 2311m (27).
ARI : Etang d'Arbu 1660m (35).
PO : Arles-sur-Tech (18), Canet (42), Prats-de-Mollo (18), Vallée de la Massane (18).
N.L. : PO : Cerdagne 1/- (3).
Région paléarctique.
68. *Tetragnatha pinicola* C.L. KOCH, 1870
Lit. : Pyrénées (97).
N.L. : PO : Col de Portus -/1 (46).
HU : Selva de Oza 1500m -/1 (23).
Région paléarctique.
69. *Pachygnatha clercki* SUNDEVALL, 1823
Lit. : HP : Gave d'Héas 1300m (31).
PO : Amélie (18), Montbolo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
Région paléarctique.
70. *Pachygnatha degeeri* SUNDEVALL, 1830
Lit. : HG : St.-Béat (28).
ARI : Aulus (42).
PO : Amélie (18), La Massane (18), Montbolo (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Andorra la vella 2100m (22), Sant Julia de Loria 980-1350m (22).
N.L. : BP : Bruges 350m 1/- (83).
PO : Prats-de-Mollo 7/7 (5).
HU : Selva de Oza 1500m 2/- (23).
Région paléarctique.

71.. *Pachygnatha listeri* SUNDEVALL, 1830

Lit. : ARI : L'Ayguette (35).
Région paléarctique.

72. *Eucta isidis* SIMON, 1880

Lit. : BP : Biarritz (97).
Région méditerranéenne, Afrique et
Asie tropicale.

METIDAE73. *Meta bourneti* SIMON, 1922

Lit. : BP : Camou-Cihigue (50, 51),
Ossas (34), Suhau (50).
HG : Arbon (97).
ARI : Cazavet (97), Espiougne (51),
Eychheil (51), Montfa (51),
Riverenert (34), Tourtouse (51).
PO : Banyuls (97), Calmeilles (51),
Ouis (51).
GU : Aitzulupe (57), Arrobieta (57),
Hernani (57), Iturmendi (57),
Kursaal (57), Landarbaso (57),
San Adriaan (57), Tolosa (109).
NA : Pochiqueta (89), Urdax (109).
HU : Barrau (57).
LE : Fonda de Trago (57), Cova del
Muricets (57).

Région méditerranéenne.

74. *Meta menardi* (LATREILLE, 1804)

Lit. : BP : Arudy (57), Aischkiuneco lecia
(57), Aussurucq (28), Bidouze
(51), Camou-Cihigue (50, 51),
Caraïbie (57), Lanne (34), Lévé-
noby (57).
HP : Bas-Nistos (28), Haiouat de Pelou
(28), St.-Laurent-de-Neste (57).
HG : Francazal (51), Gautier (57),
St.-Bertrand-de-Comminges (50).
ARI : Aurouze (57), Belesta (51),
Espiougne (51), Massat (51), Monta-
gagne (34), Peyrounard (57), Salau
(28), Saurat (51), Suc (34),
Tourtouse (51).
PO : Corsavy (51), Pouade (57), La Preste
(51).
GU : Areuzazu (38).

Région paléarctique et néarctique.

75. *Meta mengei* (BLACKWALL, 1869)

Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32), Lescun (33).
HP : Genost 1100m (35), Orédon 1850-
1900m (24), La Pez 1350m (35).
HG : Arbas (52), Espingo 1820m (29).
PO : Arles-sur-Tech (18), Amélie (18),
Fargos (18), Manyagues (18), Las
Palmas (18), Prats-de-Mollo (18),
La Preste (18), Saint-Laurent-de-
Cerdans (18).
GE: Santa Pelaya (38).
AN : Andorra la vella 1275m (22), Canillo
1600m (35), La Massana 1400m (22).
N.L. : BP : Gourette 2/- (92).
PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982),
Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982), *
Vernet-les-Bains 1/- (33).

Région paléarctique.

76.. *Meta mericanae* (SCOPOLI, 1763)

Lit. : BP : Aischkiuneco lecia (57),
Canou-Cihigue (50), Eaux-Bonnes
1400-1500m (32), Lecénoby (57),
Lescun (33), Ordiap (50), Saint-
Just-Ibard (51).
HP : Bas-Nistos (52), Gèdre 1100m (31),
Haut-Nistos (51), Lesquesde (52),
Saint-Pé -de-Bigorre (51).
HG : Arbas (51), Espingo 1280-1800m(24),
Saint-Bertrand-de Comminges (50).
ARI : Enlenne (51), Espiougne (51),
Estours (51), Las Cabesses (34),
Riverenert (34), Vernajouls (51).
PO : Pouade (57), Sainte-Marie (57).
GU : Aitzulupe (31), Ataur (109), Azkona
Zulueta (31), Iturmendi (31),
Tolosa (109), etc. (116).
HU : Buerla (57), Orsa de Anzo (57).
AN : Andorra la vella 1290-1080m (22).
NA : Orbaiceta (109).
N.L. : BP : Col d'Haltza 650m -/1 (12), Olhette
300m 1/- (6), Sare -/2 (9).
PO : Gorges de Kaouetta 550m 1/1 (14),
Gorges de Caranca 800m -/1 (48),
Vernet-les-Bains -/2 (33).

Europe, Algérie, Syrie.

77. *Meta segmentata*

Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1720-1740m (27),
Orédon 2030-2040m (24), Pic du Midi
de Bigorre 1500m (39).
HG : La Glère 1700m (28), Jouéou 1200-
1700m (28), St.-Béat (28).
ARI : Freychinède 1300m (35), Lers 1390m
(35).
PO : Capcir (36), Carlit 1980m (26).
GE : Arbucias (64), Cerdaña espagnola (6
Cova de Rialp (57).
HU : Escuain (113).
LE : Tremp (109).

Région paléarctique.

NESTICIDAE78. *Nesticus cellulanus* (CLERCK, 1804)

Lit. BP : Compagnaga Lecia (57), Licq (34),
Rébénacq (57).
HP : Asque (57), Bas-Nistos (51), Gargas
(57).
HG : Gouillou (57), Gourgue (57), Izault-
de-l'Hôtel (34).
ARI : Lacourt (51), Garosse (34), Massat
(51), Montesquieu-Avantès (51),
Moulis (34), Riverenert (34),
Vernajouls (51).
PO : Can-Pey (57), Brixot (57), Montbolo
(34,57), Pouade (57), La Preste (34),
Sizacl (57), Velmanya (57).
GU : Landarbaso (57), Oyarzun (116)
LE : Forat-la-Bou (57), Forat del Or (57).
GE : Buhero de Estartit (57).
N.L.:BP : Sare 1/- (9).
PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982).

Europe, Etats Unies.

79. *Nesticus obcaecatus* SIMON 1907

Lit. : HU : Cueva del Molino (57, 114).
Pyrénées.

THERIDIOSOMATIDAE

80. *Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1878)
 Lit. : BP : Biarritz (97), Saint-Jean-de-Luz (97).
 Région paléarctique et néarctique.

ARANEIDAE

81. *Araneus adiantus* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : ARI : Donnezan 1200m (36), Izourt (35).
 PO : Banyuls (18), Prats-de-Mollo (18).
 LE : Pic d'Erill 1400-1550m (39).
 GE : (64).
 AN : Canillo 2180-2300m (22), Sant Julia de Loria 1000-1350m (22).
 N.L. : HU : Jaca 1/- (68).
 Région paléarctique.

82. *Araneus alpicus* (L. KOCH, 1869)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1799m (33).
 HP : Louron 1280m (35).
 HG : Jouéou 1200m (28).
 Montagnes d'Europe.

83. *Araneus alsine* WALCKENAER, 1802
 Lit. : BP : Gourette 1/- (92).
 Région paléarctique.

84. *Araneus angulatus* CLERCK, 1757
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 GE : (64).
 AN : La Massana 1660m (22).
 N.L. : HU : Jaca -/1 (72).
 Région paléarctique et néarctique.

Araneus angulatus personatus SIMON, 1929
 Lit. : HP : Cauterets (97).
 Pyrénées, Belgique.

85. *Araneus armidus* (AUDOUIN, 1825)
 N.L. : PO : Vingrau (Coll. JONES 1982).
 Région méditerranéenne.

Araneus armidus pumilus SIMON, 1929
 Lit. : PO : Banyuls (97).
 CA : (89).
 Pyrénées.

86. *Araneus bituberculatus* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : PO : Manyagues (18), Montbolo (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 800m -/1 (32), Vingrau (Coll. JONES, 1982).
 Région paléarctique.

87. *Araneus carbonarius* (L. KOCH, 1869)
 Lit. : PO : Carlit 2280-2400m (26).
 AN : Canillo 2180-2300m (22), Encamp 2385-2430m (22).
 Europe boréo-alpine, Amérique du Nord.

88. *Araneus ceropegius* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1450-1750m (33).
 HP : Aubert 2150m (31), Bassias 2367m (35), Cap-del-Long 2100m (31), Coume Escure 2160m (31), Estibère 2150m (31), Gavarnie 1710m (31), Marcadau-Vignemale 1780-1860m (27), Orédon 1830-2080m (24), Pic du Midi de Bigorre 1500m (39), La Soula 1750m (35).
 HG : Espingo 1700-2350m (29).
 ARI : Arbu 1200m (35), Donnezan 1200-1600 (36), Izourt (35), Montvallier 1600m (28), Suc 1400m et plus (35).
 PO : Capcir (36), Carlit 1950-2670m (26) Prats-de-Mollo (18).
 LE : Pic d'Erill 1400-1550m (39).
 AN : Andorra la vella 1450-2100m (22), Canillo 1870-2250m (22), Encamp 2180-2275m (22), Ordino 1400m (22).
 N.L. : BP : Gourette 1550m -/1 (91).
 PO : Etang de la Coumouze 1/- (63), Mont-Louis 1600m (Coll. JONES 1982).
 HU : Selva de Oza 1/- (70).
 Région paléarctique.

89. *Araneus cornutus* CLERCK, 1757
 Lit. : HP : Coume Escure 2150-2165m (31), Mouniquot 2245m (31), Orédon 2150-2300m (24).
 PO : Banyuls (18), Carlit 1950-2190m (26).
 AN : Encamp 1890-2300m (22).
 N.L. : PO : Carlit -/2 (62).
 Région paléarctique et néarctique.

90. *Araneus cucurbitinus* CLERCK, 1757
 Lit. : BP : Sare 400-600m (28).
 HP : Aspin 1550m (35), Aubagnes 1400m (35), Orédon 1950m (24).
 HG : Jouéou 1200m (28), St.-Béat (28).
 ARI : Moulis (42).
 PO : Capcir (36), Carlit 2020m (26), le long de la côte (18).
 AN : Andorra la vella 1070-1520m (22), Encamp 1715m (22), Sant Julia de Loria 1080-1580m (22).
 N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982), Mas Forges 750m -/1 (59) 750m (Coll. MURPHY 1982).
 HU : Jaca 1300-1700m -/1 (71).
 Région paléarctique.

91. *Araneus diadematus* CLERCK, 1757
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400-1750m (32), Lescun (33).
 HP : Aubagnes 2400m (35), Gave d'Héas 1300m (31), Genost 1300m (35), La Glairie 2098m (31), Marcadau-Vignemale 1590-1900m (27), Mouniquot 2245m (31), Orédon 1830-2410m (24), Ourtiga 2000m (35), La Pez 1300m (35).
 HG : Espingo 1150-2250m (29), Jouéou 1700m (28), Saint-Béat (28).
 ARI : L'Ayguette (35), Donnezan 1300m (36), Freychinède (35), Izourt (35), Suc (35).

- PO : Banyuls-Vallespir (18), Capcir (36), Carlit 1980m (26).
 AN : Andorra la vella 1420-2100m (22), Canillo 1600m (35) 1865m (22), Encamp 1840m (22), La Massana 1630-1660m (22), Ordino 1300-1325m (22), Sant Julia de Loria 1050-1075m (22).
 N.L. : Prats-de-Mollo 1/- (94).
 Région paléarctique et néarctique.
92. *Araneus gibbosus* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : PO : Coustouges (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES, 1982).
 Europe.
93. *Araneus inconspicuus* (SIMON, 1874)
 Lit. : HP : Gabas (97).
 ARI : Ax-les-Termes (97).
 Région paléarctique.
94. *Araneus marmoreus* CLERCK, 1757
 Lit. : HP : Loudenvielle 965m (35), La Pez 1300m (35).
 ARI : Donnezan 1300m (36), Riu de Sentenac 1200m (35).
 PO : Carlit 1980m (26).
 AN : Canillo 1870-2020m (22).
 Région paléarctique et néarctique.
95. *Araneus omoedus* (THORELL, 1870)
 Lit. : PO : Montlouis (97).
 Europe centrale, septentrionale et orientale, Sibérie, Japon.
96. *Araneus opistographus* (KULCZYNSKI, 1905)
 N.L. : PO : Cerdagne 1/- (3).
 Europe.
97. *Araneus pallidus* (OLIVIER, 1789)
 Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97), Laroque-des-Albères (42).
 Europe sud-ouest, Algérie.
98. *Araneus patagiatus* CLERCK, 1757
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1450-1750m (32).
 HP : Aumar 2192m (35), Cap-de-Long 2100m (31), Orédon 1850-1900m (24).
 HG : Espingo 1800m (29).
 ARI : Donnezan 1870-1940m (36).
 PO : Banyuls 1400m et plus (18), Carlit 1980-2180m (26).
 AN : Andorra la vella 1885-2100m (22), Canillo 1740-1920m (22), Encamp 1350-2400m (22), Sant Julia de Loria 1180m (22).
 N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES, 1982).
 Région paléarctique et néarctique.
99. *Araneus quadratus* CLERCK, 1757
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1750m (32).
 HP : Gavarnie 1710m (31), Marcadau-Vignemale 2070m (27), Peyresourde 1569m (35).
 HG : Espingo 1800m (29), La Glère 1700m (28).
 ARI : Arbu 1200-1660m (35), Donnezan 1200-1300m (36), Izourt (35), Suc (35).
 PO : Capcir (36), Carlit 1950-2280m (26).
 GE : Cerdana espanola (64).
 AN : Canillo 1820-2080m (22).
 Région paléarctique.
100. *Araneus redii* (SCOPOLI, 1763)
 Lit. : HP : Orédon 1860m (25).
 PO : Amélie (18), Banyuls (18), Coustouges (18), Roc Saint-Sauveur 1200m et plus (18), Saint-Laurent de Cerdans (18).
 GE : Amer (64), Caldas de Malavella (64).
 N.L. : PO : Vingrau (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique.
101. *Araneus sericatus* CLERCK, 1757
 Lit. : HP : Gave d'Héas 1300m (31), Orédon 1830-2228m (24).
 PO : Amélie (18), Banyuls (18), Carlit 1980-2120m (26), Prats-de-Mollo (18).
 GE : Amer (64), Arbucias (64).
 AN : Andorra la vella 1050-1100m (22).
 Sant Julia de Loria 1000m (22).
 N.L. : HU : Jaca 700m -/1 (21) -/2 (68).
 Région paléarctique et néarctique.
102. *Araneus sturmi* (HAHN, 1831).
 Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1900m (27).
 HG : Jouéou 1200m (28), St.-Béat (28).
 ARI : Suc (35).
 PO : Capcir (36).
 AN : Encamp 1715m (22), Sant Julia de Loria 1390-1400m (22).
 N.L. : PO : Canigou 1500m 1/- (57), Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982), Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
 Europe.
103. *Araneus triguttatus* FABRICIUS, 1793
 Lit. : PO : Coustouges (18), Saint-Laurent de Cerdans (18).
 Région paléarctique.
104. *Araneus ullrichi* (HAHN, 1834)
 Lit. : PO : Col de la Nantille (18).
 Europe, Turkestan.
105. *Araneus umbraticus* CLERCK, 1757
 Lit. : ARI : Donnezan 1250m (36).
 PO : Amélie (18), Banyuls (18), Prats-de-Mollo (18).
 *AN : Sant Julia de Loria 950m (22).
 Europe, Afrique du Nord.
106. *Araneus v-notata* (THORELL, 1875)
 Lit. : PO : Amélie (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
 Midi de la France, Algérie.
107. *Zilla diodia* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : BP : Herboure 200m (28), Sare 400-600m (28).
 HP : La Pez 1350m (35).
 HG : Espingo 1507m (29).
 PO : Banyuls-Vallespir (18), Capcir (36).
 AN : Andorra la vella 1070-1090m (22).
 N.L. : PO : Banyuls -/1 (40), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Vernet-les-Bains -/1 (33), Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
 Europe, Afrique du Nord.
108. *Hypsozinga albovittata* (WESTRING, 1851)
 Lit. : HP : Cap-de-Long 2200m (31).
 Europe, Afrique du Nord, Turkestan.

108. *Hypsosinga rufulus* (SIMON, 1871)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
Europe.
109. *Hypsosinga sanguinea* (C.L. KOCH, 1845)
Lit. GE : Amer (64), Arbucias (64).
Europe, Afrique du Nord, Asie mineure.
110. *Singa hamata* CLERCK, 1757
Lit. : PO : Banyuls (18).
Région paléarctique.
111. *Cercidia prominens* (WESTRING, 1851)
Lit. : PO : Amélie (18), La Massane (18),
Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Col de Jau 1/- 1500m (30),
Mas Forges 800m 1/- (32),
Montlouis 1600m (Coll. JONES,
1982).
Europe, Etats-Unies.
112. *Zygiella atrica* (C.L. KOCH, 1845)
Lit. : HG : Espingo 2200m (29).
AN : Andorra la vella 1850-1880m (22).
Europe, Amérique du Nord.
113. *Zygiella montana* (C.L. KOCH, 1839)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1800m (32).
HP : Aumar 2192m (35), Marcadau-Vigne-
male 1860-1900m (27), Orédon 1850-
1900m (24).
ARI : Donnezan 1876m (36).
PO : Canigou 2200m (42), Capcir (36),
Carlit 1950-2010m (26).
N.L. : PO : MontLouis 1600m (Coll. JONES 1982).
Région paléarctique et néarctique.
114. *Zygiella x-notata* (CLERCK, 1757)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Arles-
sur-Tech (18), Montbolo (18).
GU : Vergara (89).
CA : La Garrigue (89).
Région paléarctique.
115. *Mangora acalypha* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32), Lescun
(33), Sare 400-600m (28).
HP : Marcadau-Vignemale 2311m (27).
PO : Banyuls-Vallespir 1200m (18).
GE : Amer (64).
AN : Andorra la vella 1070-1090m (22),
Sant Julia de Loria 1000-1580m (22).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982),
Fillols 850m -/2 (43), Iles-sur-Têt
(Coll. JONES 1982), Mas Forges 800m
-/1 (32), Vernet-les-Bains -/1 (34).
Europe, Afrique du Nord, Asie mineure.
116. *Cyclosa algerica* SIMON, 1885
Lit. : PO : Massane (97).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES, 1982),
Mont-Louis 1600m (Coll. MURPHY 1982),
Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
Région méditerranéenne.
117. *Cyclosa conica* (PALLAS, 1772)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1860-1900m (27)
HG : Jouéou 1200m (28), St.-Béat (28).
ARI : Engral 1300m (35), Freychinède
(35), Tartaras (35).
PO : Amélie (18), Coustouges (18),
Massane (18), Palalda (18), Prats-
de-Mollo (18), La Preste (18),
Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Andorra la vella 1450-1880m (22),
Canillo 1925m (22), Encamp 1260-
1840m (22), Ordino 1475m (22),
Sant Julia de Loria 1200m (22).
N.L. : PO : Gorges de Caranca 800m -/1 (48),
Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982)
Vernet-les-Bains (1/1 (33).
HU : Hoz de Binies 700m -/1 (20).
Région paléarctique et néarctique.
- Cyclosa conica dimidiata* SIMON, 1929
Lit. : Pyrénées (97).
Pyrénées.
- Cyclosa conica rubricauda* SIMON, 1929
Lit. : PO : La Preste (18), Saint-Laurent-de
Cerdans (18).
Europe centrale.
118. *Cyclosa oculata* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Biarritz (97), St.-Jean-de-Luz-
(97).
PO : Coustouges (18).
Région paléarctique et néarctique.
119. *Argiope bruennichi* (SCOPOLI, 1772)
Lit. : ARI : Suc (35).
GE : (64)
N.L. : BP : Bruges 370m 1/- (85) 370m 1/-
(90).
Région paléarctique.
120. *Argiope lobata* (PALLAS, 1772)
Lit. : PO : Banyuls (18).
Région méditerranéenne.
- Argiope lobata retracta* FRANGANILLO, 1918
Lit. : HU (89).
Espagne.
121. *Nemoscolus lauræ* (SIMON, 1868)
Lit. PO : Banyuls (18).
Europe sud-ouest, Afrique du Nord.

MIMETIDAE

122. *Ero apha* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Banyuls (18).
AN : Andorra la vella 1070m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY, 1982)
Europe centrale et méridionale, Afrique du
Nord.
123. *Ero furcata* (VILLERS, 1789)
Lit. : PO : Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Fillols 850m 1/- (44), Mas Forges
750m (Coll. JONES 1982).
Europe, Amérique du Nord.

124. *Ero tuberculata* (DE GEER, 1778)
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 Europe, Afrique du Nord.
125. *Mimetus laevigatus* (KEYSERLING, 1863)
 Lit. : PO : Massane (18).
 Région méditerranéenne.

LINYPHIIDAE - ERIGONINAE

126. *Ceratinella brevipes* (WESTRING, 1851)
 Lit. : HP : Orédon (25).
 PO : Montlouis (97)
 Europe.
127. *Ceratinella brevis* (WIDER, 1834)
 Lit. : BP : Herboure 200m (28), Louvie-
 Juzon (35), Sare 400-600m (28).
 ARI : Engomer (34).
 PO : Capcir (36), Manyagues (18),
 Massane (18), Prats-de-Mollo
 (18), La Preste (18).
 LE : Bohi 2000-2200m (39).
 GE : Puerto de Tosas 1800m (38).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY
 1982), Mas Forges 750m 1/1 (31)
 750m -/1 (59).
 Europe.
128. *Ceratinella scabrosa* (CAMBRIDGE, 1870)
 Lit. : BP : Louvie-Juzon (35).
 HP : Orédon 1900m (24), St.-Sauveur
 (97).
 N.L. : PO : Canigou 2000m 5/3 (55).
 Europe.
129. *Walckenaeria acuminata* BLACKWALL, 1833
 Lit. : HP : Estibère 2300m (35), Orédon 1910m
 (24).
 HG : Aspet (28).
 ARI : Arize (42), Engomer (42), Ercé
 (35), Montardit (42), Moulis (42),
 Rimont (42), Sarraillé (42), Suc
 (35).
 PO : Amélie (18), Prats-de-Mollo (18),
 Saint-Laurent-de-Cerdans (18), Le
 Tech (18).
 GE : Collado de Coubet (38).
 N.L. : BP : Col d'Haltza 650m 1/- (12),
 Gourette 2150m -/1 (87), Larrau
 1050m 1/- (17), Olhette 300m -/1
 (6).
 PO : Canigou 1750m -/1 (56).
 Europe.
130. *Walckenaeria antica* (WIDER, 1834)
 Lit. : BP : Herboure 200m (27), Sare 400-600m
 (27).
 ARI : Tarascon (42).
 Europe.
- Walckenaeria antica flavida* (MENGE, 1868)
 Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 2310-2780m (27).
 Europe.

131. *Walckenaeria capito* (WESTRING, 1862)
 Lit. : HP : Orédon 2320-2350m (24).
 PO : Carlit 2450m (26).
 Europe.
132. *Walckenaeria corniculans* (CAMBRIDGE, 1875)
 Lit. : BP : Arudy (97), Sare (28).
 HP : Cap-de-Long 2870m (31), Bagnères
 (97), Cauterets (97), Esterragne
 (35), Orédon 1930m (24), Pic du
 Midi (97), 3030-3150m (42).
 HG : Espingo 2750-3100m (29).
 ARI : Rimont (42).
 PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech (18),
 Banyuls (18,97), Canigou (97),
 Mont-alba (18), Montlouis (97),
 Prats-de-Mollo (18), La Preste (18)
 Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Andorra la vella 2460m (22), Casa-
 manya 2650m (22).
 N.L. : BP : Eaux-Bonnes 900m -/1 (89), Larrau
 1050m -/1 (17).
 PO : Canigou 1500m -/1 (57), 1750m -/1
 (56) 2200m 1/3 (37), Col de Mentet
 1900m -/1 (52).
 HU : Selva de Oza 1200m -/1 (24).
 Europe occidentale, centrale et méridionale,
 Afrique du Nord.
133. *Walckenaeria cucullata* (C.L. KOCH, 1836)
 Lit. : PO : Capcir (36).
 N.L. : PO : Canigou 1500m -/2 (57), Mas Forges
 750m -/1 (59).
 Europe.
134. *Walckenaeria cuspidata* (BLACKWALL, 1833)
 Lit. : PO : Lanoux (42).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale,
 Kamschatka.
- * 135. *Walckenaeria dalmasi* SIMON 1914
 Lit. : HP : Gabas (97).
 PO : 1000-1500m (87)
 N.L. : PO : Canigou 1250m -/1 (58), 1500m 1/-
 (57) 1750m 1/- (56) 2200m 1/-
 (54), Col de Portus -/1 (47).
 Pyrénées.
136. *Walckenaeria fugax* (CAMBRIDGE, 1870)
 N.L. : PO : Canigou 1750m (56).
 Europe occidentale et centrale.
137. *Walckenaeria melanocephala* (CAMBRIDGE, 1879)
 Lit. : PO : Palau del Vidre (97).
 GE : Collado de Coubet (38).
 Europe.
138. *Walckenaeria monoceros* (WIDER, 1834)
 Lit. : PO : Costabona (97), Montlouis (97).
 Europe occidentale et centrale.
- * 139. *Walckenaeria pyrenaea* DENIS, 1952
 Lit. : PO : Carlit 2120m (26).
 Pyrénées.

140. *Dicymbium nigrum* (BLACKWALL, 1834)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HG : Marsoulas (42).
 ARI : Riu de Sentenac (35).
 PO : Amélie (18), La Muga (18), Le Tech (18), Prats-de-Mollo (18).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982), Mas Forges 750m -/1(59).
 Europe, Sibérie.
141. *Entelecara aestiva* SIMON, 1918
 Lit. : HP : Pierrefitte-Nestalas (31).
 PO : Prats-de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 France, Corse.
- *142. *Entelecara cacumineum* DENIS, 1954
 Lit. : HG : Espingo 3000m (29).
 Pyrénées.
143. *Entelecara erythropus* (WESTRING, 1851)
 Lit. : HP : Bagnère-de-Bigorre (97).
 PO : Carlit 2293m (26).
 Europe occidentale, centrale et méridionale.
144. *Diplocephalus graecus* (CAMBRIDGE, 1872)
 Lit. : PO : Coustouges (18), La Preste (97).
 Europe méridionale, Afrique du Nord.
145. *Entelecara turbinata* SIMON, 1918
 Lit. : ARI : Ax-les-Thermes (97).
 France méridionale.
146. *Nematogmus sanguinolentus* (WALCKENAER, 1841)
 Lit. : HP : Oréson 1830-1850m (24).
 PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 Europe, Japon, Afrique du Nord.
147. *Moebelia penicillata* (WESTRING, 1851)
 Lit. : BP : St.-Jean de Luz (97).
 Europe.
148. *Erigonidium graminicola* (SUNDEVALL, 1830)
 N.L. : BP : Bidarray -/1 (26), Bruges 370m -/1 (90).
 Europe, Asie.
149. *Gnathonarium dentatum* (WIDER, 1834)
 Lit. : HP : Orédon 2228m (24).
 PO : Amélie (18), Palalda (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18), Le Tech (18).
 N.L. : BP : Ascaïn 50m -/2 (8), Banyuls -/1 (40).
 Région paléarctique.
150. *Hyllyphantes nigrinus* (SIMON, 1881)
 Lit. : BP : Betharram (97), Pau (97), St.-Jean-de-Luz (97).
 N.L. : BP : Bruges 370m -/1 (85) 370m -/2 (90).
 Europe centrale, Russie.
151. *Gongylidium rufipes* (LINNE, 1758)
 Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
 Europe, Sibérie.
152. *Dismodicus bifrons* (BLACKWALL, 1841)
 Lit. : PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES, 1982).
 Europe, Sibérie.
- *153. *Metopobractus falcifrons* SIMON, 1884
 Lit. : PO : Montlouis (97), La Preste (97), Prats-de-Mollo (18), Tour de Mir 1200m (18).
 N.L. : PO : Canigou 1250m 10/2 (58) 1500m 2/- (57), Col de Portus -/7 (46), Prats-de-Mollo 1/- (5).
 Pyrénées.
154. *Metopobractus prominulus* (CAMBRIDGE, 1872)
 Lit. : ARI : Donnezan (36), Pic d'Engral 1300m (35).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale.
155. *Metopobractus verticalis* (SIMON, 1881)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 France méridionale, Corse.
156. *Hybocoptus decollatus* (SIMON, 1881)
 Lit. : PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (23).
 Europe occidentale et ouest-méridionale.
157. *Gonatium ensipotens* (SIMON, 1881)
 Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (97), Collioure (97), Manyagues (18).
 Europe ouest-méridionale.
158. *Gonatium occidentale* SIMON, 1918
 Lit. : BP : (97).
 France ouest-méridionale, Espagne, Algérie.
159. *Gonatium rubens* (BLACKWALL, 1833)
 N.L. : PO : Canigou 2200m (54), Prats-de-Mollo (5).
 Europe, Asie.
160. *Maso gallica* SIMON, 1894
 Lit. : BP : Lescun (33).
 PO : Palalda (18), Le Tech (18).
 Europe occidentale.
161. *Maso sundevalli* (WESTRING, 1851)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HG : Espingo 1280m (29).
 PO : Prats-de-Mollo (18).
 N.L. : PO : Canigou 1250m 15/1 (58), Col de Portus 1/- (49), Fillols 850m -/1 (43), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982), Mas Forges 750m 1/- (59) 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Europe, Amérique du Nord.
162. *Minicia marginella* (WIDER, 1834)
 Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
 PO : Prats-de-Mollo (18).
 Europe centrale.
163. *Pocadicnemus pumila* (BLACKWALL, 1841)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Genost 1020m(35).
 ARI : Donnezan 1200m (36), Pic d'Engral 1300m (35).
 PO : Amélie (18), Capcir (36), Le Tech (18), Prats-de-Mollo (18).
 AN : Sant Julia de Loria 1050m (22).
 N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58), Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982), Col de Portus 1/1 (46) 1/- (49), Fillol 850m -/1 (44).
 Europe occidentale et septentrionale, Amérique du Nord.
- *163. bis *Pocadicnemus jacksoni* MILLIDGE, 1974
 Lit. : PO : Corsavy, 900m (121).
 Pyrénées.

164. *Oedothorax agrestis* (BLACKWALL, 1853)
N.L. : BP : Bruges 350m 1/1 (83), Tardets-Sorholus 1/- (18).
HU : Hoz de Binies 700m 1/- (20).
Europe.
165. *Oedothorax apicatus* (BLACKWALL, 1850)
Lit. : ARI : Moulis (42).
PO : Palalda (18).
N.L. : BP : ? Olhette 300m -/1 (6), Tardets-sorholus 1/2 (18).
PO : Carlit 1/1 (62), Fillols 850m 1/- (44), Vernet-les-Bains -/1 (33).
HU : Jaca 700m 1/- (21) 1300-1700m -/1 (71) +/3 (67).
Europe, Sibérie.
166. *Oedothorax fuscus* (BLACKWALL, 1834)
Lit. : HP : Orédon 2228m (24).
ARI : Le Lez (42), Moulis (42), Orle (42), Prat (42).
PO : Collioure (18), Palalda (18), La Preste (18).
N.L. : BP : Ascain 50m 1/- (8), ? Ossas -/2 (65).
Europe, Afrique du Nord.
167. *Oedothorax gibbifer* (KULCZYNSKI, 1882)
Lit. : BP : Arudy (97), Gabas (97), St.-Jean-de-Luz (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Orédon 2228m (24).
Europe alpine.
168. *Oedothorax retusus* (WESTRING, 1851)
Lit. : ARI : Donnezan 1220m (36), Moulis (28).
PO : Carlit 2110-2270m (26).
Europe, Sibérie.
169. *Oedothorax tuberosus* (BLACKWALL, 1841)
N.L. : PO : Col de Jau 1500m 1/3 (30), Col de Portus -/2 (46).
Europe.
170. *Ostearius melanopygius* (CAMBRIDGE, 1879)
Lit. : ARI : Illarteu (42).
Cosmopolite.
171. *Trichopterna cito* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : PO : Montlouis (97).
Europe occidentale, centrale et orientale.
172. *Trichopterna cucurbitina* (SIMON, 1881)
Lit. : PO : Banyuls (97), Palau del Vidre (97).
Europe ouest-méridionale.
- * 173. *Dresconella nivicola* (Simon, 1884)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1920m (32).
HP : Orédon 2230-2500m (24), Pic du Midi de Bigorre (97).
PO : Carlit 2120m (26).
Pyrénées.
174. *Eriginoplus simplex* MILLIDGE, 1979
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982).
Italie, Pyrénées.
- * 175. *Eriginoplus turriger* (SIMON, 1881)
Lit. : PO : Massane (97), Perpignan (97).
Pyrénées.
176. *Pelecopsis bucephalus* (CAMBRIDGE, 1875)
Lit. : PO : Banyuls-sur-Mer (97).
Europe ouest-méridionale, Afrique du Nord.
177. *Pelecopsis ineditum* (CAMBRIDGE, 1875)
Lit. : ARI : Ax (97).
PO : Banyuls (97), Velmanya (97).
Europe ouest-méridionale, Afrique du Nord.
- * 178. *Pelecopsis montana* DENIS, 1960
Lit. : ARI : Mont Rouch (35).
Pyrénées.
- * 179. *Pelecopsis muticus* DENIS, 1957
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2340m (32).
PO : Capcir (36).
Pyrénées.
180. *Pelecopsis nemoralis* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : BP : Herboure 200m (28), Jatxou (28).
ARI : Suc (35).
PO : Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Prats-de-Mollo -/1 (5), Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
Europe occidentale, centrale et orientale.
181. *Pelecopsis parallela* (WIDER, 1834)
Lit. : ARI : Moulis (42).
PO : Prats-de-Mollo (97), Velmanya (97).
N.L. : PO : Cerdagne -/1 (3), Montlouis 1600m (Coll. JONES 1983).
Europe.
- * 182. *Pelecopsis partitus* DENIS, 1953
Lit. : HG : Espingo 2325m (29).
ARI : Montvalier 2400m (28).
Pyrénées.
- * 183. *Pelecopsis pyrenaea* (SIMON, 1918)
Lit. : HP : Gavarnie (97), Orédon (24, 25), Payalles (97).
ARI : Ax (97), Donnezan (36), Salau (35).
PO : Canigou (97), Velmanya (97).
N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58).
Pyrénées.
184. *Silometopus nitidithorax* (SIMON, 1914)
N.L. : BP : Gourette 2150m (87).
PO : Canigou 2000m 6/5 (55).
France méridionale.
- * 185. *Silometopus tenuispinus* DENIS, 1949
Lit. : ARI : Donnezan 2000m (36).
AN: La Massana 2340m (22).
Pyrénées.
186. *Mecopisthes crassirostris* (SIMON, 1884)
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Canigou 2000m 1/- (55) 2200m 2/- (54).
Europe ouest-méridionale.
187. *Cineta gradata* (SIMON, 1881)
Lit. : ARI : Bonabé (97).
Europe centrale.
188. *Cnephlocotes obscurus* (BLACKWALL, 1834)
Lit. : HP : Barège (97).
N.L. : PO : Canigou 1250 2/- (58).
Europe.
- * 189. *Cnephlocotes tristis* DENIS, 1954
Lit. : HG : Espingo 2000m (29).
Pyrénées.

190. *Acartauchenius depressifrons* SIMON, 1884
Lit. : BP : La Rhône (97)
Ca : (89)
France ouest-méridionale, Espagne,
Portugal.
191. *Acartauchenius scurrilis* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
Europe.
192. *Trichoncus affinis* KULCZYNSKI, 1894
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY,
1982), Col de Jou 1125m
(Coll. MURPHY, 1982).
Europe occidentale, centrale et ouest-méridionale.
- * 193. *Trichoncus gibbulus* DENIS, 1944
Lit. : PO : Amélie (41), Saint-Laurent-
de-Cerdans (41).
Pyrénées.
194. *Trichoncus scrofa* SIMON, 1884
Lit. : PO : Banyuls (41), La Preste (41),
Saint-Laurent-de-Cerdans (41).
Europe ouest-méridionale.
195. *Trichoncus sordidus* SIMON, 1884
Lit. : PO : Les Abeilles (97), Banyuls (97),
La Preste (41).
Europe ouest-méridionale et centrale.
- * 196. *Trichoncus varipes* DENIS, 1965
Lit. : HG : Arbas (28,41)
HP : Coume escure 2165m (31,41)
ARI : Durban (41)
PO : Forêt des Angles 1700m (41).
Pyrénées.
197. *Trichoncus vasconicus* DENIS, 1944
Lit. : HG : Bouconne (41)
ARI : Durban (41).
PO : Vernet-les-Bains (41).
France méridionale.
Trichoncus vasconicus hackmani (MILLIDGE, 1955)
Lit. : HP : Barèges (41).
PO : Capcir (36).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 6/2 (59).
Europe occidentale et septentrionale.
198. *Ceratinopsis romana* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32).
HP : Coume Escure 2165m (31), Orédon
2500m (24).
PO : Arles-sur-Tech (18), Banyuls (18,
97), Palalda (18).
N.L. : PO : Cerdagne 3/3 (3).
Europe occidentale, centrale et méridionale,
Afrique du Nord.
199. *Evansia oirtensis* (SIMON, 1884)
Lit. : PO : Banyuls (97).
Europe ouest-méridionale, Afrique du Nord.
200. *Evansia maerens* CAMBRIDGE, 1900
Lit. : HP : Lespitau (36).
PO : Canigou (97).
Europe occidentale et centrale.
201. *Tiso aestivus* (KOCH, 1872)
Lit. : HP : Col d'Aragon 2780m (27)
Europe boréo-alpine.
202. *Tiso vagans* (BLACKWALL, 1834)
Lit. : HP : Aspin (35).
AN : Ordino 1500m (22), Sant Julia
de Loria 1350m (22).
N.L. : BP : Pic d'Orhy 1750m 1/2 (15),
La Rhune 900m -/1 (11).
PO : Canigou 2000m -/2 (55), Prats-
de-Mollo -/1 (5).
Europe.
203. *Alioranus pauper* (SIMON, 1881)
Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97).
Europe ouest-méridionale.
204. *Troxochrus scabriculus* (WESTRING, 1851)
Lit. : BP : Lescun 1400m (33).
PO : Prats-de-Mollo (18), Saint-
Laurent-de-Cerdans (18).
Europe.
205. *Mnyriolus pusillus* (WIDER, 1834)
Lit. : ARI (38).
PO : Capcir (36), Coustouges (18),
Prats-de-Mollo (18).
GE : Collado de Coubet (38).
N.L. : BP : Gourette 1300m -/3 (79).
PO : Canigou 1250m 9/1 (58) 1500m
2/1 (57).
HU : San Juan de la Pena 1200m -/1
(22).
Europe.
- * 206. *Tapinocyba affinis pyrenaea* MILLIDGE, 1979
Lit. : HG : Jouéou (35,87).
PO : 1000-1300m (87).
Pyrénées.
207. *Tapinocyba pallens* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : BP : Gabas (97).
ARI : Donnezan (36).
PO : Capcir (36), Valcebolère (35).
GE : Puerto de Tosas 1800m (38).
Europe.
208. *Tapinocyba praecox* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : BP : Gabas (97).
PO : Lanoux (42).
Europe occidentale et centrale.
209. *Tapinocyba ventosa* MILLIDGE, 1979
Lit. : PO : La Preste 1200m (87).
N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982
France méridionale.
210. *Diastanillus pecuarius* (SIMON, 1884)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1650m (32), Lescun (33)
HP : Aubert 2150m (35), Aumar 2192m
(35), Marcadau-Vignemale 2310m
(27), Mourèle-Oueilh Nègre 2350m
(31), Orédon 1800-2230m (24).
ARI : Bonabé (97).
PO : Canigou (97), Carlit 2020-2200m
(26), Costabona (97), La Preste
(97).
Europe alpine.

- * 211. *Trachelocamptus derisor* SIMON, 1918
Lit. : HP : Gavarnie (97).
Pyrénées.
212. *Trachelocamptus nasutus* (CAMBRIDGE, 1879).
Lit. : PO : Banyuls (97), Conat (97).
Europe ouest-méridionale.
213. *Aulacocyba subitanea* (CAMBRIDGE, 1875)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 2320m (27),
Orédon 1900m (24).
HG : Izault-de-l'Hôtel (34).
ARI : Massat (28).
PO : Collioure (18).
HU : Cueva Fornazos (57).
N.L. : PO : Col de Mentet 1600m -/1 (50),
Mas Forges 750m -/1 (31).
Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord.
214. *Thyreosthenius biovatus* (CAMBRIDGE, 1875)
Lit. : PO : Canigou (97).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/1 (31).
Europe occidentale et centrale.
215. *Monocephalus fuscipes* (BLACKWALL, 1836)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400m (32), Licq (35).
HP : Aubagnes 1400m (35), Orédon (25).
ARI : Ercé (42), Suc (35).
N.L. : BP : Gourette 1400m -/2 (86) 1720m
-/1 (74), Larrau 1050m -/1 (17),
Sare 350m -/1 (7).
PO : Col de Portus 1600m -/1 (56).
Europe occidentale.
216. *Saloca dicerus* (CAMBRIDGE, 1871)
Lit. : BP : Sainte-Engrâce (35).
ARI : Moulis (35).
NA : Burguete (38).
Europe occidentale et centrale.
217. *Wiehlea calcarifera* (SIMON, 1884)
Lit. : PO : Prats (42).
Europe occidentale.
218. *Gongylidiellum latebricola* (CAMBRIDGE, 1871)
Lit. : HG : Aspet (42).
ARI : Nescus (42).
Europe occidentale, centrale et septentrionale.
219. *Gongylidiellum murcidum* SIMON, 1884
Lit. : BP : Aspe (97), Camou-Cihique (34),
Lescun (33), St.-Christou (97),
Ste.-Engrâce (35).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Lespi-
tau 1400m (35), Peyrouse (34).
ARI : Arcé (35), Salau (28, 35).
PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
GE : Collado de Coubet (38), Tossa
de Mar (38).
AN : Os 1000m (22), Sant Julia de
Loria 1350m (22).
N.L. : BP : Col d'Haltza 650m -/12 (12),
Larrau 1050m -/2 (17).
PO : Gorges de Caranca 800m -/1 (48).
Europe, Asie
220. *Gongylidiellum vivum* (CAMBRIDGE, 1875).
Lit. : ARI : Biert (42), Castet d'Aleu (42),
Sentein (42).
Europe, Algérie.
- * 221. *Micrargus cupidon* (SIMON, 1913)
Lit. : BP : Tardets-Sorholus (109).
HP : Castel Mouly (97).
GU : Cueva de Mendicute (89).
NA : Cueva de Martinchurrito (89).
Pyrénées.
222. *Micrargus herbigradus* (BLACKWALL, 1854)
Lit. : BP : Louvie-Juzon (35), Lescun (33).
HP : Aumar 2192m (35), Marcadau-Vigne-
male 2250m (27), Orédon 1890m
(24).
HG : Cazaunous (35).
ARI : Engomer (34), Donnezan (36).
PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Canillo 1850m (22), Envalira
2000m (35).
N.L. : BP : La Rhône 900m -/1 (11), Gorges de
Kakouetta 550m -/1 (14).
PO : Canigou 1750m 1/2 (56) 1900m
1/- (39) 2200m 1/1 (55), Col de
Mentet 1600m -/2 (50) 1900m -/1
(52) 2200m -/1 (53), Col de Portus
1600m -/1 (45), Mas Forges 750m
-/2 (31).
HU : Hoz de Binies 700m 1/- (20).
Europe.
223. *Micrargus laudatus* (CAMBRIDGE, 1881)
Lit. : HP : Orédon 1860m.
N.L. : BP : La Rhône 900m -/1 (11).
PO : Vernet-les-Bains 4/4 (33).
Europe occidentale.
224. *Micrargus subaequalis* (WESTRING, 1851)
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Moulis (35), Prades (97),
Saint-Girons (34).
PO : Conat (97).
Europe occidentale et centrale.
225. *Delorhipis fronticornis* SIMON, 1884
Lit. : PO : Conat (97), Velmanya (97).
Europe ouest-méridionale, Algérie.
- * 226. *Erigonella subelevata pyrenaea* DENIS, 1964
Lit. : ARI : Aula 2200-2400m (40).
Pyrénées.
227. *Diplocephalus cristatus* groupe *foraminifer*
(CAMBRIDGE, 1875)
N.L. : HU : Hoz de Binies 700m -/1 (20).
Lit. : BP : La Rhune (97) St.-Jean-de-Luz (97).
HG : Espingo 2900m (29).
ARI : Lanoux (97), Donnezan 1250m (36).
HP : Cap de Long 2870m (31), Marcadau-
Vignemale 2500m (29), St.-Sauveur
(97), 2560m (42).
PO : Prats-de-Mollo, la Preste (97),
Le Tech (18).
GU : Cuevas del Chorotte (89).
Région paléarctique et néarctique, Nouvelle
Zélande.
- * 228. *Diplocephalus culminicola* (SIMON, 1881)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2240m (32).
HP : Marcadau-Vignemale 2348m (27),
Pic Long 3160m (31), Pic du
Midi (97).
HG : Espingo 3000-3100m (29).
Pyrénées.
229. *Diplocephalus graecus* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : PO : Coustouges (18), La Preste (97).
Europe méridionale, Afrique du Nord.
230. *Diplocephalus latifrons* (CAMBRIDGE, 1863)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Gave d'Héas 1300m (31).
BG : Col du Portet d'Aspet (42).
ARI : Donnezan 1800-1880m (36).
N.L. : BP : Ascain 50m -/1 (8), Olhette 300m
-/1 (6), Tardets-Sorholus 1/1
(18).
Europe.

231. *Diplocephalus longicarpus* SIMON, 1884
Lit. : PO : La Preste (97).
France méridionale.
232. *Diplocephalus lusiscus* (SIMON, 1872)
Lit. : BP : Camou-Cihigue (28), Oxybar (57),
Tardets-Sorholus (109).
HP : Asgues (57), Gargas (57), Gerde
(57), Tibiran (57).
HG : grottes (97).
ARI : Ercé (34), grottes (97).
Europe occidentale.
233. *Diplocephalus permixtus* (CAMBRIDGE, 1870)
N.L. : PO : Col de Jou 1500m -/1 (30).
Europe occidentale, centrale et septentrionale.
234. *Diplocephalus picinus* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : BP : Lescun (33).
N.L. : PO : Prats-de-Mollo 1/- (5).
Europe occidentale, centrale et septentrionale.
235. *Diplocephalus protuberans* (CAMBRIDGE, 1875)
Lit. : HP : Orédon 1890-2330m (24,25), Sou-
labère (28).
HG : Luchon (97).
ARI : Aulus (97), Donnezan 1936m (36),
Vernajouls (57).
PO : Carlit 1990-2310m (26), La Muga
(18), La Preste (18), Saint-Laurent-
de-Cerdans (18).
N.L. : BP : Larrau 1750m -/2 (15).
PO : Col de Mentet 1900m -/1 (51),
Gorges de Caranca 800m -/1 (48).
Europe occidentale.
- *236. *Araeonus altissimus* SIMON, 1884
Lit. : BP : Lescun (33).
PO : Coustouges (18), Manyagues (18),
La Preste (18, 97), Saint-Laurent-
de-Cerdans (18), Sorède (97).
Pyrénées.
237. *Araeonus discedens* (SIMON, 1881)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 2020m (27).
HG : Doline de Terre-blanque (28).
PO : Canigou (97), Carlit 2150m (26),
Montlouis (97), Targassone (97).
N.L. : PO : ? Carlit -/1 (62), ? Coumouse -/1
(63), ? Col de Portus -/1 (46).
France méridionale.
238. *Araeonus humilis* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : BP : Licq (42).
HG : Arbon (42).
ARI : Freychinède 1250m (35), Haut-
Vicdessus 2400m (42).
Europe, Afrique du Nord.
- *239. *Panamomops mutilus* (DENIS, 1962)
Lit. : GE : Collado de Coubet (38).
Pyrénées.
240. *Lessertia denticelis* (SIMON, 1884)
Lit. : ARI : Moulis (28), St.-Girons (33,97).
PO : Amélie (18), Eanyuls (18),
Palau-del-Vidre (97).
HU : Soleneco de Murrano (57).
GE : Terrades (115).
N.L. : PO : Tour de Madelon -/1 (4).
Europe occidentale et ouest-méridionale,
Afrique du Nord.
241. *Lessertinella kulczynski* (LESSERT, 1962)
Lit. : HG : Saint-Martory (42).
Europe alpine (Pyrénées, Alpes).
- *242. *Asthenargus longespina* (SIMON, 1914)
Lit. : PO : Montlouis (97).
GE : Puerto de Tosas 1800m (38).
Pyrénées.
243. *Asthenargus paganus* (SIMON, 1884)
Lit. : ARI : Ax-les-Thermes (97).
Europe occidentale et centrale.
- *244. *Typhochrestus alticola* DENIS, 1953
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 2793m (27).
Pyrénées.
245. *Typhochrestus digitatus* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : PO : Canigou (97), Molitg (97).
Europe occidentale et centrale.
- *246. *Collinsia despazi* (DENIS) 1950
Lit. : HP : Orédon 2220m (24).
Pyrénées.
247. *Milleriana inerrans* (CAMBRIDGE, 1884)
Lit. : PO : Canigou ("sommet") (97).
HU : Forau de la Drolica (57).
N.L. : BP : Larrau 1500m -/1 (15).
Europe.
248. *Erigone atra* (BLACKWALL, 1833)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Orédon 2170-2230m (24).
ARI : Arbu 1660m (35).
PO : Carlit 1990-2180m (26).
AN : Andorra la vella (22).
Région paléarctique, Etats Unies.
249. *Erigone dentipalpis* (WIDER, 1834)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1370-1400m.
HP : Alhets 2200m (31), Estibère 2150m
(31), Marcadau-Vignemale 1820-
1900m (27), Orédon 1850m (31),
Pau (28).
HG : Arbas (28).
ARI : Donnezan 1200-1300m (36).
PO : Carlit 1980-2190m (26), Vallespir
(18).
AN : Sant Julia de Loria 980m (22).
N.L. : BP : Bruges 350m 2/5 (83) 370m -/1
(90), Larrau 1750m 1/1 (15),
Ossas 1/- (65), Tardets-Sorholus
1/1 (18).
PO : Carlit 1/6 (62), Col de Jau 1500m
-/1 (30), Col de Portus -/3 (46),
Lac des Bouillouses 1750m 2/2
(60) -/3 (61).
GU : St.-Martin 1650m -/1 (19).
HU : Jaca 700m 1/- (21) 750m 1/- (28),
Seiva de Oza 1500m 1/3 (23).
Région paléarctique, Canada.
250. *Erigone jugorum* SIMON, 1884
Lit. : BP : Arrémoulit 2305m (35), Eaux-Bonnes
1920-2200m (32).
HP : Astazou 2245m (31), Cap-de-Long
2100m (31), Estaubé 2300m (35),
Estibère 2320m (35) 2150m (31),
Estelat (31), Marcadau-Vignemale
2090-2550m (27), Orédon 2150-
2350m, Pic du Midi de Bigorre (97),
Tourbière 2160m (31).

HG : Espingo 1920-2325m (29).
 ARI : (97).
 PO : Canigou (97), Carlit 2130-2180m (26).
 AN : Canillo 2400-2550m (22), La Cabanette 2400m (22).
 N.L. : BP : Larrau 1700m 1/3 (66).
 Pyrénées.

251. *Erigone promiscua* (CAMBRIDGE, 1873)

Lit. : HU : Pourtalet 1600m (39).
 Europe occidentale.

252. *Erigone remota* L. KOCH, 1869

Lit. : HP : Orédon 2080-2330m (24,25).
 AN : Andorra la vella 2240m (22).
 Europe boréo-alpine, Sibérie.

253. *Erigone vagans* AUDOUIN, 1827

Lit. : HP : Coume Escure 2157m (31), Estibère 2150m (31) 2320m (35), Marcadau-Vignemale 1570-2320m (27), Orédon 1850-2350m (24), Pau (28), Val de Nère 2550m (35).

HG : Espingo 1800m (29).
 ARI : Donnezan 1220m (36), Etang de Lers 1390m (35), Mont Rouch 1700-1800m (35).

PO : Carlit 1980-2430m (26), Collioure (18), Prats-de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).

N.L. : BP : Ascain 50m -/1 (8), Tardets-Sorholus -/1 (18).

PO : Banyuls 1/- (40), La Bouillouse -/1 (64), Carlit 3/3 (62), La Coumouze 1/- (63), Col de Portus -/3 (46), Lac des Bouillouses 1750m 1/4 (66).

HU : Jaca 700m -/1 (21) 1/- (67).

Cosmopolite.

254. *Erigone welchi* JACKSON, 1911

Lit. : HP : Tourbière 2160m (31).
 Europe occidentale, Suède.

* 255. *Erigonopterna dilata* DENIS, 1949

Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1630m (27).
 AN : Ordino 2350m (22).
 Pyrénées.

* 256. *Shaebothorax pyrenaicus* DENIS, 1950

Lit. : HP : Orédon 2500m (24).
 Pyrénées.

257. *Drepanotylus uncatius* (CAMBRIDGE, 1873)

N.L. : PO : Lac des Bouillouses -/1 (61).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale.

258. *Hilaira excisa* (CAMBRIDGE, 1870)

Lit. : BP : Gabas (97).
 HP : Orédon 1880-1900m (24).
 Europe boréo-alpine.

LINYPHIIDAE - LINYPHIINAE

259. *Porrhomma egeria* SIMON, 1884

Lit. : HG : Cazaunous (42).
 ARI : Anglade 1400m (35), Grotte de Capètes (57).
 Europe occidentale.

260. *Porrhomma microphthalmum* (CAMBRIDGE, 1871)

Lit. : HG : Grotte Hailouat de Pelou-Haut-Nistos (52).
 Europe occidentale et centrale.

261. *Porrhomma convexum* (WESTRING, 1861)

Lit. : BP : Betharram (57), Rébénacq (57).
 HP : La Bastide (51), da Manera del Moumouch (57)
 ARI : Aulus (34), Las Cabesses (34),

Férobac (37), Lavelanet (37), Montesquieu-Avantès (118), Neuf-Fonts (37), Rieu fourcaud (37), Riverenert (34), Salau (35), Vernajouls (37).

PO : Céret (42), Feuillan (57), Ria (34), Siroi (57).

NA : Alsasua (64).

HU : Cueva de San Salvador, Bibils (57, 120), Espes, Santorens, Sararillo (120).

LE : Mòntsec Ager, Oden (120), Seradel (109).

Europe occidentale et centrale.

262. *Porrhomma pygmaeum* (BLACKWALL, 1834)

Lit. : ARI : Durban (42).
 Europe, Sibérie.

263. *Syedra gracilis* (MENGE, 1869)

Lit. : BP : Ahusquy (97), Licq (42), St.-Christau (97), St.-Jean-de-Luz (97).

HP : Bagnères-de-Bigorre (42).

Europe occidentale et centrale.

264. *Agyneta conigera* (CAMBRIDGE, 1863)

Lit. : PO : La Massane (97), Montlouis (97), La Preste (97).

N.L. : PO : Canigou 1750m 15/6 (56).

Europe occidentale et centrale.

265. *Agyneta subtilis* (BLACKWALL, 1863)

Lit. : PO : Capcir (36).

Europe.

266. *Meioneta beata* (CAMBRIDGE, 1906)

Lit. : ARI : Donnezan 1220m (36).

Europe occidentale, centrale et septentrionale.

267. *Meioneta fuscipalpis* (C.L. KOCH, 1836)

Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1920m (32), Lescun (33).

HP : Estaubé 2300m (35), Gave d'Héas 1300m (31), Orédon 1850m (24), Sentinelle 1710m (31).

PO : Lanoux (42), Prats-de-Mollo (18).

N.L. : PO : Carlit 1/2 (62).

Europe, Afrique du Nord, Sibérie.

268. *Meioneta gulosa* (L. KOCH, 1869)

Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2340m (32).

HP : Arratille 2537m (28), Estarragne (35), Orédon 1920-2090m (24).

ARI : Donnezan 1600-2000m (36).

PO : Capcir (36), Carlit 2120m (26).

Europe occidentale, centrale et septentrionale.

269. *Meioneta mollis* (CAMBRIDGE, 1871)

Lit. : BP : Lescun (33).

HP : Orédon 2150m (24).

Europe occidentale, centrale et orientale.

270. *Meioneta nigripes* (SIMON, 1884)

Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2020m (32).

HP : Col d'Aragon 2780m (28), Orédon 2350-2550m (24), Pic du Midi de Bigorre (97).

PO : Carlit 2020m (26).

Europe boréo-alpine.

* 271. *Meioneta rufidorsum* DENIS, 1961

Lit. : ARI : Donnezan (36).
 Pyrénées.

272. *Meioneta rurestris* (C.L. KOCH, 1836)

Lit. : BP : Lescun 1550-1850m.

HP : Estibère 2150m (31), Gave d'Héas 1300m (31), Lespitau 1400m (35), Néouvielle 3030m (31), Orédon 1850m (24).

HG : Arbas (28), Espingo 2250-2625m (29).

ARI : Donnezan 1300-2000m (36).

- N.L. : BP : Bruges 350m -/1 (83) 370m -/1 (90), Gourette 1680m -/2 (77) 1680m 1/1 (88) 2150m 1/- (87) -/2 (92), Larrau 1750m -/1 (15), La Rhûne 900m 1/- (11), Tardets-Sorholus -/1 (18).
 PO : Banyuls 2/1 (40), La Bouillouse 1/5 (64), Canigou 1250m 1/- (58) 2000m 4/2 (55) 2200m 3/- (54), Col de Jou 1125m (Coll. JONES, 1982), Col de Mentet 1600m 1/- (50), Col de Portus 1/- (46), La Coumouze -/1 (63), Carlit 1/2 (62), Err 2200-2400m 1/- (2), Lac des Bouillouses 1/1 (61), Mas Forges 750m 1/1 (31) 750m (Coll. MURPHY 1982), Montlouis 1750m 1/- (60).
 NA : St.-Martin 1650m 2/1 (19).
 HU : Jaca 750m -/4 (28).
 Région paléarctique.
273. *Microneta viaria* (BLACKWALL, 1841)
 Lit. : ARI : Le Portel (42), Sentenac-de-Sérou-Bethmale (42).
 PO : Amélie (18), Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m -/2 (59) 750m (Coll. MURPHY 1982), Vernet-les-Bains 1/3 (33) -/4 (35).
 HU : Hoz de Binies 700m -/1 (20), Selva de Oza 1200m -/2 (24).
 Région paléarctique, Amérique du Nord
274. *Theonina cornix* SIMON, 1881
 Lit. : PO : Banyuls (18), Conat (97), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18,97).
 N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58).
 Europe centrale.
275. *Centromerus albidus* SIMON, 1929
 Lit. : HP : Bas-Nistos (42).
 HG : La Henne Morte (42).
 ARI : Bélesta (18).
 PO : Amélie (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
 GE : Tossa de Mar (38).
 Europe centrale et méridionale.
276. *Centromerus arcanus* (CAMBRIDGE, 1873)
 Lit. : HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Orédon (26).
 ARI : Carazet (50).
 PO : Canigou (97), Col de Puymorens 1850m (35), Montlouis (97).
 GE : Puerto de Toras 1800m (38).
 AN : 1080m (22).
 N.L. : BP : Larrau 1050m -/1 (17).
 PO : Canigou 2000m 1/- (55) 2200m 13/6 (54), Col de Mentet 1900m 2/- (52), Col de Portus -/1 (47).
 Europe centrale, occidentale et septentrionale.
Centromerus arcanus ensifera (SIMON, 1884)
 Lit. : PO : Montlouis (97).
 Alpes, Pyrénées.
277. *Centromerus capucinus* (SIMON, 1884)
 Lit. : PO : Banyuls (97).
 Europe occidentale et centrale.
278. *Centromerus cinctus phoceorum* SIMON, 1929
 Lit. : PO : Banyuls (18, 97).
 France méridionale, Afrique du Nord.
279. *Centromerus dilutus* (CAMBRIDGE, 1875)
 Lit. : HG : Arbus (28).
 ARI : Salau (35).
 PO : Amélie (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 GE : Collado de Coubet (35), Santa Pellaga (35), Tossa de Mar (35).
 N.L. : PO : Canigou 1500m -/2 (57) 2200m -/1 (54), Col de Jau 1500m -/1 (30).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale.
280. *Centromerus microps* (SIMON, 1911)
 Lit. : BP : Oxibar (57).
 HG : Herran (51).
 ARI : Aurouze (57), L'Herus (57), Labastide de Sérou (97), Lestelas (45, 57), Queire (57).
 NA : Abaurrea Alta (109), Lecumberri (57), Oroz-Betelu (109).
 HU : Cueva del Orso de Anzo (57).
 France méridionale, Espagne.
281. *Centromerus pabulator* (CAMBRIDGE, 1875)
 Lit. : GE : Collado de Coubet (38).
 Europe centrale.
282. *Centromerus paradoxus* (SIMON, 1884)
 Lit. : LE : Cova Fosca de Villanova (57).
 France méridionale, Espagne.
283. *Centromerus prudens* (CAMBRIDGE, 1873)
 Lit. : HP : Arralhé 2490m (28), Bagnères-de-Bigorre (51), La Bastide (34), La Fache 2360-2430m (28), 2156m (18), Pic du Midi de Bigorre (50).
 HG : Espingo 2097m (29).
 ARI : Col de Puymorens (97), Donnezan 1876m (36), Salau 1600m (35).
 PO : Amélie (18), Banyuls (18, 97), La Massane (18, 97), Montbolo (34, 50), Palau del Vidre (18, 97), Pla de l'Espinasse (18), Prats-de-Mollo (18, 97), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
 HU : Grallera de Estadilla (57).
 GE : Calonge (38), San Jorge (38).
 N.L. : BP : La Rhûne 900m -/2 (11).
 PO : Col de Portus -/1 (47), Vernet-les-Bains -/1 (36).
 HU : Villanua 900m -/1 (26).
 Europe occidentale et centrale.
Centromerus prudens electus (SIMON, 1884)
 Lit. : HP : Orédon 1850-2320m (24, 25), Pic du Midi (97).
 Midi de la France.

284. *Centromerus sellarius* (SIMON, 1884)
 Lit. : BP : Aspe (97), Marcadau (97), Larrau (97).
 HP : Haut Nistos (50), Lourdes (97), Marcadau 2000m (27), Orédon (25).
 HG : Grotte de Ganties (57).
 ARI : Ax-les-Thermes (97), Carazet (50), Freychinède 1300m (35), Montvalier (28).
 PO : Canigou (97).
 Europe centrale et méridionale.
285. *Centromerus serratus* (O.P. CAMBRIDGE, 1875)
 Lit. : HP : Ilhet (34).
 ARI : Bélesta (42), Castelnaud-Durban (42), Moulis (42), Le Portel (42).
 PO : Céret (42).
 Europe occidentale et centrale.
286. *Centromerus similis* KULCZYNSKI, 1894
 Lit. : PO : Amélie (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 Europe centrale.
287. *Centromerus sylvaticus* (BLACKWALL, 1841)
 Lit. : BP : Licq (42).
 HG : Saleich (42).
 ARI : Freychinède 1310m.
 N.L. : PO : Prats-de-Mollo -/2 (5).
 Europe.
288. *Centromerus sinus* (SIMON, 1884)
 Lit. : BP : Aspeigh (97).
 HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Lourdes (97).
 ARI : Marrous (42).
 Midi de la France.
289. *Centromerus timidus* (SIMON, 1884)
 Lit. : NA : Alsasua (64).
 Espagne, Roumanie.
290. *Centromerita bicolor* (BLACKWALL, 1833)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1920m (34), Lescun (33).
 HP : Gave d'Héas 1300m (31), Estarragne (35), Lac d'Arratille 2250m (28), Lac de Gaibe 1730m (28), Orédon 1890-1920m (24).
 HG : Espingo 2097m (29).
 ARI : Donnezan 1876m (36), Etang de Lers 1390m (35), Salau 1600m (35).
 PO : Amélie (18), Capcir 1600m (36), Lac de Lanoux (42).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale.
291. *Centromerita concinna* (THORELL, 1875)
 Lit. : HG : Cabane de l'Homme 2089m (42).
 PO : Amélie (18).
 N.L. : PO : Canigou 2000m -/1 (55), Carlit -/1 (62).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale.
292. *Sintula corniger* (BLACKWALL, 1856)
 Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
 N.L. : PO : Col de Portus 1600m (45).
 Europe boréo-alpine.
293. *Sintula diceros* SIMON, 1926
 Lit. : PO : Banyuls (97), Canigou (97), Collioure (97).
 France méridionale.
294. *Sintula retroversus* (CAMBRIDGE, 1875)
 Lit. : PO : Amélie (18).
 Europe méridionale.
295. *Saaristoa abnormis* (BLACKWALL, 1841)
 Lit. : BP : Aussurucq (51), Eaux-Bonnes 800-850m (32), Herboure 200m (28), Lescun (33), Oxibar (57).
 HP : La Bastide (34), Orédon (25).
 HG : Arbus (35), Juzet d'Izaut (51).
 ARI : Donnezan (36), Ercé (35), Esplas de Sérou (50), Neuf-Fonts (57), Riverenert (34, 50), Tourignon-le-Vieux (51).
 NA : (89).
 N.L. : BP : Col d'Haltza 650m -/2 (12), Larrau 1050m 1/1 (17), Olhette -/2 (6), Sare 1/1 (9).
 PO : Canigou 1750m 1/- (56), Mas Forges 750m -/1 (31).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale.
296. *Oreonetides vaginatus* (THORELL, 1872)
 Lit. : HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
 Europe boréo-alpine, Amérique du Nord.
297. *Macrargus rufus* (WIDER, 1834)
 Lit. : PO : Banyuls (42).
 Europe.
298. *Bathyphantes gracilis* (BLACKWALL, 1841)
 Lit. : BP : Lescun (34).
 ARI : Moulis (42).
 N.L. : BP : Ascain 50m -/1 (8), Bruges 350m 1/7 (83) 370m 1/- (85).
 Europe, Sibérie.
299. *Bathyphantes nigrinus* (WESTRING, 1851)
 Lit. : ARI : Donnezan 1250m (36).
 Europe occidentale, centrale et septentrionale, Amérique du Nord.
300. *Bathyphantes vittiger* SIMON, 1884.
 Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
 HP : (97).
 ARI : Alos (34).
 PO : La Preste (18).
 N.L. : BP : Olhette 300m 1/- (6).
 France méridionale.
301. *Diplostyla concolor* (WIDER, 1834)
 Lit. : HP : Loudenvielle 1200m (35).
 ARI : Vallée de l'Ayguette (35).
 PO : Amélie (18), Capcir (36), Coustouges (18), Montbolo (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Sorède (42), Le Tech (18).
 GE : Campellas (38).
 AN : 1000m (22).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982) Col de Portus -/3 (49), Mas Forges 750m -/1 (31).
 Europe, Amérique du Nord.

302. *Poeciloneura variegata* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : BP : Gabas (97).
HG : Espingo 2097m (29).
Europe septentrionale, centrale et est-méridionale.
303. *Drapetisca socialis* (SUNDEVALL, 1832)
Lit. : HG : Jouéou 1200m (28).
Europe occidentale, centrale et septentrionale, Sibérie.
304. *Tapinopa disjugata* SIMON, 1884
Lit. : PO : Banyuls (18).
France méridionale, Algérie.
305. *Tapinopa longidens* (WIDER, 1834)
Lit. : PO : Amélie (18).
Europe occidentale, centrale, septentrionale et orientale.
306. *Taranucus setosus* (CAMBRIDGE, 1863)
Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
Europe occidentale, centrale et septentrionale.
307. *Labulla flahaulti* SIMON, 1914
Lit. : BP : Gabas (97), Larrau (97).
HG : Espingo 1250-2100m (29).
ARI : Aulus (97).
PO : Canigou (97), La Massane (18).
N.L. : PO : Carlit 1/- (62), Col de Mentet 1900m 1 juv. (52), Col de Portus 2 juv. (46) 2 juv. (57).
HU : Selva de Oza 1200m -/2 (24).
Régions montagneuses de la France méridionale.
308. *Labulla thoracica* (WIDER, 1834)
Lit. : ARI : Castelnaud-Durban (42), Caumont (42).
Europe occidentale, centrale et septentrionale.
309. *Stemonyphantes lineatus* (LINNE, 1758)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Prats-de-Mollo (18).
Région paléarctique et néarctique.
310. *Bolyphantes alticeps* (SUNDEVALL, 1833)
Lit. : HP : Orédon 1855-1900m (25, 31), Marcadau 1860m (27).
HG : Vallée de la Glère 1700m (28).
N.L. : BP : Gourette -/6 (90).
Europe boréo-alpine, Sibérie.
311. *Bolyphantes index* (THORELL, 1856)
Lit. : PO : Cauterets (97), Gabas (97), Montlouis (97).
Europe boréo-alpine, Sibérie.
312. *Bolyphantes luteolus* (BLACKWALL, 1833)
N.L. : PO : Canigou 2200m -/3 (37).
Europe boréo-alpine.
313. *Bolyphantes nigropictus* SIMON, 1884
Lit. : PO : Banyuls (97), Montlouis (97), Prats-de-Mollo (18), Roc Saint-Sauveur (18).
France méridionale, Corse, Sardaigne.
314. *Troglohyphantes affirmatus* (SIMON, 1913)
Lit. : HU : Cueva de Cantol (57), Forau de la Drolica (57), Salinas (109), Tesserefts du Colleroda (57).
N.L. : HU : Villanua 900 -/6 (26).
Espagne.
315. *Troglohyphantes alluaudi* FAGE, 1919
Lit. : GU : Cueva de San Valerio (57); Tolosa (116), Cestona (116).
Espagne septentrionale.
- * 316. *Troglohyphantes balazuci* DRESCO, 1953
Lit. : BP : Rénénacq.
Pyrénées.
- * 317. *Troglohyphantes caecus* FAGE, 1919
Lit. : BP : Betharram (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (50), Peyrouse (51), St.-Pé-de-Bigorre (51, 97).
Pyrénées.
- * 318. *Troglohyphantes cerberus* (SIMON, 1884)
Lit. : BP : Grottes de Béthanan, de l'Oeuil du Néez, d'Istaurdy, d'Oxybar, de Sare, d'Astuté, St. Christeau (97), Anharp, St. Engrâce (34), Ordiab (50), Arthez-d'Asson, Aussurucq (45).
NA : Cueva de Leorlas (89).
N.L. : BP : Gorges de Kakouetta 550m -/5 (14).
Pyrénées.
319. *Troglohyphantes furcifer* (SIMON, 1884)
Lit. : GU : Albistur (57), Alza (57), Anoeta (57), Onate (57), Renteria (57), Tolosa (57).
NA : Martinchurito (45), Orobé (57).
N.L. : BP : Olhette 300m -/1 (6).
Espagne.
- * 320. *Troglohyphantes marqueti* (SIMON, 1884)
Lit. : BP : Arudy (97), Betharram (97), lac Marescot (97), Mauléon (97), Sare (97), St.-Christau (97).
ARI : presque toutes les grottes (97), grotte d'Aubert (57), Sentenac-de-Sérar (50), Seix (34).
HP : Pic du Midi-de-Bigorre, Lourdes (97), Haut-Nistos, La Bastide (51), grotte d'Ilhet, de Gargas, du Bédar, de Judéous (57), Bagnères-de-Bigorre, Peyrouse Pic du Midi du Bigorre (50).
HG : Arbas(45,50), Carric Ner (57), Paloumère (45), Puits de Pène-blanque (45), Puits de las Templas (45).
HU : Cueva de Bujaruelo (89).
N.L. : BP : Gorges de Kakouetta 550m -/7 (14).
Pyrénées.
- Troglohyphantes marqueti pauciaculeatus* SIMON, 1929
Lit. : HG : Saleich (97).
Pyrénées.
321. *Troglohyphantes orphaeus* (SIMON, 1884)
Lit. : ARI : Aurouze (97), Freychenet (97).
PO : Prugnanes (97).
France méridionale.
- * 322. *Troglohyphantes phragmitis* (SIMON, 1884)
Lit. : BP : Biarritz (97).
Pyrénées.

- * 323. *Troglohyphantes pumilio* DENIS, 1959
Lit. : BP : Arudy (34)
Pyrénées.
- * 324. *Troglohyphantes pyrenaeus* SIMON, 1907
Lit. : BP : Camou-Cihigue (28, 34, 97).
Pyrénées.
- * 325. *Troglohyphantes simoni* FAGE, 1919
Lit. : BP : Mauléon (97).
Pyrénées.
326. *Lepthyphantes alutacius* SIMON, 1884
Lit. : ARI : Riverénert (42).
PO : Banyuls (97), La Massane (97).
HG : Montmaurin (50).
N.L. : PO : Canigou 1500m 3/- (57) 1750m
1/1 (56), Col de Mentet 1900m
-1 (52), Col de Portus 1600m
-2 (45).
France, Espagne, Italie, C.S.S.R.
- * 327. *Lepthyphantes arlaudi* DENIS, 1954
Lit. : HG : Espingo 3040m (29).
Pyrénées.
328. *Lepthyphantes bigerrensis* SIMON, 1929
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97),
Orédon (25).
France méridionale.
- * 329. *Lepthyphantes carlittensis* DENIS, 1952
Lit. : ARI : Donnezan 2500m (36).
PO : Carlit (26).
Pyrénées.
- * 330. *Lepthyphantes ceretanus* DENIS, 1961
Lit. : PO : Cerdagne (37, 42).
Pyrénées.
331. *Lepthyphantes cernuus* SIMON, 1884
Lit. : BP : Aspe (97), Eaux-Bonnes 1400m
(32), Larrau (97), Salies de
Béarn (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
HG : Gouillou (57).
PO : Banyuls (97).
N.L. : BP : Bruges 350m -1 (84), Gorges
de Kakouetta 550m 1/- (14).
PO : Canigou 1250m 3/1 (58) 1750m
1/- (56), Col de Jou 1125m
(Coll. MURPHY 1982), Col de
Portus 1600m 1/- (45).
France, Corse.
- * 332. *Lepthyphantes coiffaiti* DENIS, 1953
Lit. : BP : Arudy (28).
N.L. : PO : Col de Mentet 1600m 1/- (50).
Pyrénées.
333. *Lepthyphantes cristatus* (MENGE, 1866)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
GE : Ripoll (42).
N.L. : PO : Prats-de-Mollo -1 (5).
Europe.
334. *Lepthyphantes decolor* (WESTRING, 1862)
(Syn. : *L. parallelogrammus* SIMON, 1884)
Lit. : PO : Banyuls (18), Collioure (18).
NA : Alsasua (64).
Europe.
- * 335. *Lepthyphantes ecclesiasticus* DENIS, 1959
Lit. : HP : Bas-Nistos (34, 50).
Pyrénées..
336. *Lepthyphantes ericaeus* (BLACKWALL, 1853)
Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
Europe occidentale.
- * 337. *Lepthyphantes eugeni* ROEWER, 1942
Lit. : HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
Pyrénées.
338. *Lepthyphantes expunctus* (CAMBRIDGE, 1875)
Lit. : HP : Loudenvielle 1010m (35).
ARI : Pic d'Engral 1300m (35).
PO : Canigou 2400-2600m (42).
AN : Bony de las Neras, Alt del Grió,
Canillo 2010-2180m (22).
N.L. : PO : Mont-Louis 1750m 1/- (60).
Europe boréo-alpine.
- * 339. *Lepthyphantes fagicola* SIMON, 1929
Lit. : PO : La Preste (51), 1200-1500m (97).
N.L. : BP : ? La Rhûne 900m -1 (11).
PO : Canigou 1250m 2/- (58).
Pyrénées.
340. *Lepthyphantes flavipes* (BLACKWALL, 1854)
N.L. : BP : Sare 350m -4 (7).
PO : Col de Jau 1500m -2 (30), Vernet-
les-Bains -1 (33) -1 (34).
HU : Rodellar (105).
Europe centrale.
341. *Lepthyphantes frigidus* SIMON, 1884
Lit. : PO : Font-Romeu (97), Montlouis (97).
N.L. : PO : Canigou 2000m -1 (55), 2200m
9/3 (54), Col de Portus 1/2 (46).
Europe alpine.
342. *Lepthyphantes herbicola* SIMON, 1884
Lit. : PO : Banyuls (97).
HU : Rodellar (105).
France, Algérie, Italie, Espagne, Yougoslavie.
343. *Lepthyphantes homonymus* DENIS, 1934
Lit. : PO : Banyuls (21).
France, Portugal.
344. *Lepthyphantes ignavus* SIMON, 1884
Lit. : PO : Canigou (97)
AN : Cirque des Pessons 2600-2800m (35)
2250m (22).
France alpine.
345. *Lepthyphantes improbulus* SIMON, 1929.
Lit. : PO : Canigou (97), Velmania (97),
Font-Romeu (97)
N.L. : PO : Canigou 1750m -1 (56) 1900m
1/3 (39) 2200m 2/7 (37) 2200m
5/6 (54).
Pyrénées, D.D.R., C.S.S.R.
- * 346. *Lepthyphantes johannes-lupi* DENIS, 1953
Lit. : HP : Chapeau d'Espagne 2594m (27),
Riu de la Badèta 2340m (27).
Pyrénées.
- * 347. *Lepthyphantes jugorum* DENIS, 1954
Lit. : HP : Col de la Pez 2482m (30).
HG : Espingo 3000m (29).
Pyrénées.

348. *Lepthyphantes keyserlingi* (AUSSENER, 1867)
Lit. : PO : Capcir (36), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Europe centrale.
349. *Lepthyphantes leprosus* (OHLERT, 1865)
Lit. : BP : Lecénoby (57).
HP : Camous (57), Orédon (24).
ARI : Aubert (57).
PO : Pla de Périllos (57).
N.L. : HU : San Juan de la Pena 1200m 2/- (22).
Région paléarctique.
350. *Lepthyphantes mansuetus* (THORELL, 1875)
Lit. : BP : Gabas (97).
PO : Montlouis (97).
N.L. : PO : Canigou 1500m -/3 (57), Col de Mentet 1900m -/1 (52).
HU : San Juan de la Pena 1200m -/1 (22).
Europe centrale et méridionale.
- * 351. *Lepthyphantes margaritae* DENIS, 1934
Lit. : ARI : Donnezan 2500m (36).
PO : Banyuls (21).
CA : La Fèbre (89).
Pyrénées.
- * 352. *Lepthyphantes meillonae* DENIS, 1953
Lit. : HP : Marcadau 1780m (27).
Pyrénées.
353. *Lepthyphantes mengei* KULCZYNSKI, 1887
Lit. : HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Lespitau 1400m (35), Loudenvielle 1010-1200m (35), Marcadau 1860m (27).
HG : Lac Saoussat 1925m (29).
ARI : Donnezan 1300m (36), Pic d'Engral 1300m (35), Riu de Sentenac (35).
PO : Carlit (26), Montlouis (97), Sournia (42).
N.L. : BP : Bruges 350m -/1 (83), Larrau 1750m 1/- (15).
PO : Canigou 1250m -/1 (58), 1500m -/4 (57) 1750m -/1 (56), Col de Mentet 1900m -/2 (52).
Europe centrale et septentrionale.
354. *Lepthyphantes minutus* (BLACKWALL, 1883)
Lit. : BP : Herboire 200m (28).
Europe, Etats-Unis.
355. *Lepthyphantes monachus* SIMON, 1884
Lit. : PO : Canigou (97).
Europe alpine (Pyrénées, Alpes, Balkan).
- * 356. *Lepthyphantes negrei* DRESCO 1951
Lit. : HP : Saint-Pé-de-Bigorre (51).
HG : Montmaurin (42).
ARI (51).
Pyrénées.
357. *Lepthyphantes obscurus* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32), St.-Jean-de-Luz (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
PO : Carlit (26).
N.L. : PO : Mont-Louis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
Europe.
- Lepthyphantes obscurus dilutior* SIMON, 1929
Lit. : BP : Gabas (97).
ARI (97).
PO : Canigou (97), Montlouis (97).
N.L. : PO : Canigou 1750m 1/- (56).
Pyrénées, Alpes.
- * 358. *Lepthyphantes ollivieri* DENIS, 1957
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32).
Pyrénées.
- * 359. *Lepthyphantes opilio* SIMON, 1929
Lit. : HP : Pic du Midi de Bagnère (97).
ARI : Haut Vicdessos 2400m (42).
Pyrénées.
- * 360. *Lepthyphantes oredonensis* DENIS, 1950
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1700m (32), Sainte Engrâce (35).
HP : Col d'Aspin (35), Orédon 1860m (25).
ARI : Moulis (42).
Pyrénées.
361. *Lepthyphantes pallidus* (CAMBRIDGE, 1871)
Lit. : ARI : Aven de la Carrière (34), Riverenert (34).
HG : Arbas (34).
LE : Lo Grallé (89).
GE : Ribas de Freser (38).
Europe.
362. *Lepthyphantes pinicola* SIMON, 1884
Lit. : PO : Montlouis (97).
Europe centrale et occidentale.
- * 363. *Lepthyphantes pyrenaicus* DENIS, 1953
Lit. : HP : Col d'Aragon 2780m (27), Hourquète d'Aussocie 2734m (27), Pic de Cambalès 2965m (27).
Pyrénées.
364. *Lepthyphantes spiniger* SIMON, 1929
Lit. : Forêts de conifères des Pyrénées (97).
BP : Eaux-Bonnes 800-1400m (32).
ARI : St.-Lizier (105).
HP : Bagnères-de-Bigorre (105).
N.L. : BP : Bruges 350m -/1 (83), Eaux-Bonnes 900m 1/- (89), Gorges de Kakouetta 550m 1/- (14), Gourette 1400m -/1 (75) 1400m 3/6 (86), Larrau 1050m 1/1 (17), Sare 1/- (9).
PO : Canigou 1250m 1/- (58), Col de Mentet 1900m 1/2 (52).
Pyrénées, Alpes (?).
365. *Lepthyphantes stygius* SIMON, 1884
Lit. : PO : Pla de Perillos (97).
HU : Cueva Fornazos (57).
France méridionale, Espagne.
366. *Lepthyphantes tenebricola* (WIDER, 1834)
Lit. : HP : Aubagnes 1450m (35), Orédon 1850m (24).
ARI : Riu de Sentenac (35).
PO : Capcir (36).
GE : San Jorge (38).
N.L. : PO : Canigou 1750m 7/- (56), Cerdagne 2/3 (3), Col de Mentet 1900m -/3 (52), Vernet-les-Bains -/1 (34).
Europe.

- * 367. *Lepthyphantes tenerrimus* SIMON, 1929
Lit. : PO : Canigou (97).
Pyrénées.
368. *Lepthyphantes tenuis* (BLACKWALL, 1852)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Orédon 1860-2060m (24), Peyrouse (34).
ARI : Donnezan 1220m (30), Freychinède 1300m (35), Pic d'Engral 1300m (35), Salau (35), Suc (35).
PO : Amélie (18), Banyuls (18), Capcir (26), Coustouges (18), La Massane (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Le Tech (18), Saint-Laurent de Cerdans (18).
AN : 1000-1980m (18).
HU : Rodellar (105).
N.L. : BP : Ascain 50m 1/- (8), Gourette 1/- (92), Col d'Haltza 650m -/1 (12), Larrau 1750m -/4 (15), Olhette 300m -/3 (6).
PO : Banyuls 1/3 (40), Canigou 1250m -/1 (58) 1500m 1/2 (57) 1750m -/2 (56) 2000m 8/11 (55) 2200m 1/1 (37) 2200m -/1 (38), Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982), Col de Mentet 1900m 1/2 (52), Col de Portus -/1 (46), Fillols 850m 1/- (44), Mas Forges 750m -/1 (31) 750m (Coll. MURPHY 1982), Prats-de-Mollo -/2 (5), Vernet-les-Bains -/1 (34).
NA : St.-Martin 1650m 1/1 (19).
HU : Jaca 700m -/1 (21), Selva de Oza 1500m 4/- (23).
Afrique du Nord, Amérique du Nord, Nouvelle Zélande.
369. *Lepthyphantes zimmermanni* BERTKAU, 1890
Lit. : BP : Istaürdy (57), Lescun (33).
HP : Gorges de Clarabide 1330m (35), Loudenvielle 1010m (35), Orédon 1860m (24, 25), 2156m (18).
HG : Arbas (51), Aspet (34).
ARI : Capètes (57), Pic d'Engral 1300m (35).
PO : Carlit (26), Collioure (18), Costabona (18), La Presta (18).
HU : Cueva de Valporquero (57).
AN : 1350m (22).
N.L. : BP : Cerdagne 1/- (3), Gorges de Kakouetta, 550m 1/2 (14), Gourette 1400m -/1 (86), Larrau 1050m 1/1 (17), Olhette 300m 2/1 (6), Sare 350m 2/3 (22).
PO : Banyuls -/1 (41), Canigou 1500m 3/1 (57) 1750m 2/2 (56) 2200m -/1 (54), Mas Forges 750m 1/- (31), Vernet-les-Bains -/1 (34) 1/5 (33).
HU : Selva de Oza 1200m 1/- (24).
Europe.
370. *Lepthyphantes zonatus* SIMON, 1884
Lit. : PO : Banyuls (97).
France méridionale, Portugal, Tunisie.
371. *Cresmatoneta mutinensis* (CANESTRINI, 1868)
N.L. : PO : Banyuls -/2 (40).
Europe méridionale.
372. *Linyphia hortensis* SUNDEVALL, 1830
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18), La Preste (18).
N.L. : PO : Col de Jau 1500m -/2 (30), Col de Mentet 1600m 1/3 (50), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Gorges de Caranca 800m -/1 (48), Prats-de-Mollo 2/- (5).
Europe.
373. *Linyphia triangularis* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Orédon 1900m (24), 1300m (35).
HG : St.-Béat (28).
ARI : Moulis (28).
PO : Amélie (18), Laroque-des-Albères (42), Prats-de-Mollo (18).
GE : Amer (64), Arbucias (64), Caldas de Malavella (64), Cerdana espagnola (64).
AN : 1000-1630m (22).
N.L. : BP : Bruges 370m 1/- (85).
Région paléarctique.
374. *Linyphia maura* THORELL, 1875
Lit. : PO : Banyuls (97, 103), Canigou 850-1000m (42).
Europe ouest-méridionale, Algérie.
375. *Nerisene clathrata* (SUNDEVALL, 1830)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Bagnères-de-Bigorre (103), Loudenvielle 1010m (35), Lourdes (28).
PO : Amélie (18), Prats-de-Mollo (18), Le Tech (18).
N.L. : PO : Ascain 50m -/1 (8), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Col de Portus -/2 (49), Mas Forges 750m -/1 (31) 750m (Coll. MURPHY 1982).
Europe, Sibérie, Amérique du Nord.
376. *Nerisene emphana* WALCKENAER, 1941
Lit. : BP : Eaux-Bonnes (32).
HP : Bagnères-de-Bigorre (103), Pic du Midi de Bigorre 1500m (39), Orédon 1870m (25).
ARI : Donnezan 1200-1600m (36).
PO : Capcir (36).
N.L. : BP : Gorges de Kakouetta 550m -/1 (14), Larrau 1750m 1/- (15).
PO : Col de Jou 1725m (Coll. JONES 1982).
Région paléarctique.
377. *Nerisene furtiva* (CAMBRIDGE, 1871)
Lit. : ARI : Donnezan 1200m (36), Pic d'Engral 1300m (35).
PO : Banyuls (18), Prats-de-Mollo (18).
N.L. : BP : Bruges 350m -/1 (84).
PO : Fillols 850m 1/2 (44), Mas Forges 750m -/1 (59).
Europe, Afrique du Nord.
378. *Nerisene radiata* (WALCKENAER, 1841)
Lit. : BP : Lescun (33), Sare 400-600m (28).
HP : Aubagnes (35), Pez 1350m (35) Pierrefitte-Nestalas (31).
PO : Fargos (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Tour de Mir (18).
LE : Pic d'Erill 1400-1550m (39).
AN : 1000-1700m (22).
N.L. : PO : Fillols 850m 1/3 (43), Gorges de Kakouetta 550m -/1 (14), Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982) 800m -/1 (32).
HU : Jaca 700m -/1 (27).
Europe, Sibérie, Amérique du Nord.

379. *Neritene montana* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Lescun (33).
Région paléarctique.
380. *Neritene peltata* (WIDER, 1834)
Lit. : HP : Marcadieu 1900m (27), Orédon 1870m (24).
ARI : Ayguette (35), Freychinède (35), Pic d'Engral 1300m (35), Suc (35), Saleix 1500m (35).
PO : Puig de l'Estelle (18).
Europe.
381. *Microlinyphia pusilla* (SUNDEVALL, 1830)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400m (32).
HP : Orédon 2100m (24), Pic du Midi de Bigorre 1500m (39).
HG : Espingo 1880-1980m (29).
PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : 1900m (22).
N.L. : PO : Carlit 1/2 (62), La Coumouse -/3 (63).
HU : Jaca 700m -/1 (21) 750m -/7 (28) 1300-1700m -/1 (71).
Europe, Sibérie, Amérique du Nord.
382. *Frontinellina frutetorum* (C.L. KOCH, 1834)
Lit. : ARI : Donnezan 1200-1300m (36).
PO : Amélie (16), Coustouges (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : 1000-1750m (22).
LE : Seo de Urgel #104).
N.L. : BP : Col d'Haltza 650m -/1 (12).
PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Mas Forges 750m 1/- (31), 750m (Coll. JONES 1982) 800m 3/9 (32).
Europe, Afrique du Nord.
383. *Pityochyphantes phrygianus* (C.L. KOCH, 1836)
Lit. : PO : Capcir (36).
N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
Europe boréo-alpine, Amérique du Nord.

MYSMENIDAE

384. *Cepheia longiseta* (SIMON, 1881)
Lit. : PO : Banyuls (97).
Midi de la France.

THERIDIIDAE

385. *Argyrodes rostrata* (SIMON, 1873)
Lit. : BP : Aspe (97).
Région méditerranéenne.
386. *Episinus angulatus* (BLACKWALL, 1836)
Lit. : PO : Banyuls (18), La Massane (18).
Europe.
- * 387. *Episinus pyrenaeus* (SIMON, 1914)
Lit. : BP : La Rhône (97), Vallée d'Aspe (97).
Pyrénées.
388. *Episinus truncatus* LATREILLE, 1809
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Pic d'Engral 1300m (35).
PO : Amélie (18), Banyuls (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Saint-Laurent de Cerdans (18).
GE : Amer (64), Arbucias (64).
N.L. : BP : Gorges de Kakouetta 550m -/1 (14).
Région paléarctique et néarctique.
389. *Euryopis acuminata* (LUCAS, 1846)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
Région méditerranéenne.
390. *Euryopis flavomaculata* (C.L. KOCH, 1836)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
Europe.
391. *Dipoena braccata* (C.L. KOCH, 1841)
Lit. : AN : Encamp 1560m (22).
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord, Israël.
392. *Dipoena convexa* (BLACKWALL, 1870)
Lit. : PO : Banyuls (18).
Région méditerranéenne.
393. *Dipoena erythropus* (SIMON, 1881)
Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
PO : La Massane (18, 97).
Europe centrale.
394. *Dipoena inornata* (CAMBRIDGE, 1861)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
Europe.
395. *Dipoena melanogaster* (C.L. KOCH, 1837)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Coustouges (18), Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Andorra la vella 1070-1090m (22) Sant Julia de Loria 1390-1400m (22).
GE : Ribas de Freser (38).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES, 1982), Mas Forges 750m 1/- (59), Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
Europe, Afrique du Nord.
- * 396. *Dipoena praecelsa* SIMON, 1914
Lit. : PO : Collioure (97).
Pyrénées.
397. *Dipoena prona* (MENGE, 1868)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18), La Preste (18).
Europe centrale.
398. *Dipoena tristis* (HAHN, 1831)
Lit. : PO : Coustouges (18).
Europe centrale et orientale.
399. *Dipoena umbratilis* (SIMON, 1873)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
Europe sud-ouest, Algérie.

400. *Crustulina guttata* (WIDER, 1834)
 Lit. : BP : Jatxou (28), Lescun (33).
 HP : Marcadau-Vignemale (27),
 Orédon (27).
 ARI : Donnezan 1700m (35).
 PO : Amélie (18), Céret (18),
 Capcir (35), Prats-de-Mollo
 1200m (18), Saint-Laurent-
 de-Cerdans (18).
 N.L. : BP : La Rhûne 900m -/1 (11).
 PO : Canigou 1500m 1/- (57), Col de
 Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982),
 Col de Mentet 1600m 1/1 (50),
 Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982),
 Mas Forges 750m (Coll. MURPHY
 1982), Montlouis 1600m (Coll.
 MURPHY 1982).
 HU : Hoz-de- Binies 700m -/3 (20).
 Région paléarctique et néarctique.
401. *Crustulina scabripes* SIMON, 1881
 Lit. : PO : Banyuls (18), Fargos (18), Pic
 de la Coumeille 1699m (18), Prats-
 de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-
 Cerdans (18).
 GE : Arbucias (64), Collado de Coubet
 (38).
 Europe méridionale, Afrique du Nord, Israel.
402. *Steatoda albomaculata* (DE GEER, 1778)
 Lit. : ARI : Donnezan 1800m (36).
 PO : Banyuls (18), Carlit 2110-2430m
 (26), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Andorra la vella 2160-2600m (22),
 Encamp 1720-2425m (22), Canillo
 2310m (22), Col d'Ordino 1980-2475m
 (22).
 Région paléarctique et néarctique.
403. *Steatoda bipunctata* (LINNE, 1758)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Cabane d'Ourtiga 1620m (35), Louden-
 vielle 965m (35), Orédon (35).
 Cosmopolite.
404. *Steatoda grossa* (C. KOCH, 1838)
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 HU : Salinas (109).
 Cosmopolite.
405. *Steatoda paykullianus* (WALCKENAER, 1806)
 Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Saint-
 Laurent-de-Cerdans (18).
 Europe méditerranéenne.
406. *Steatoda phalerata* (PANZER, 1801)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1550m (32), Lescun
 (33).
 HP : Aumar 2192m (35), Coume Escure
 2160m (31), Marcadau-Vignemale 2020m
 (27), Orédon 1800-2235m (24).
 HG : Espingo 1880-1980m (29).
 ARI : Donnezan 1800m (36), Engral 1300m
 (35).
 PO : Capcir 1600m (36), Carlit 2020-
 2120 (26), La Preste (18).
 LE : Rio Noguerra (38).
 AN : Andorra la vella 1750m (22), Encamp
 1710-1980m (22), Ordino 1450m (22).
 N.L. : PO : Canigou 1900m -/3 (39).
 Région paléarctique.
407. *Steatoda triangulosa* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Cap
 de l'Abeille (28), Prats-de-Mollo
 (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Sant Julia de Loria 1075m (22).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique, Amérique du Nord.
408. *Anelosimus pulchellus* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : PO : Amélie (18), Coustouges (18),
 Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 CA : San Miguel del Fay (64).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Europe, Afrique du Nord.
409. *Anelosimus aulicus* (C.L. KOCH, 1836)
 Lit. : PO : Banyuls (18), Coustouges (18).
 GE : (64).
 N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982).
 Europe méridionale, Afrique du Nord.
410. *Anelosimus vittatus* (C.L. KOCH, 1836)
 Lit. : PO : Coustouges (18), Saint-Laurent-
 de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY, 1982),
 Mas Forges (Coll. MURPHY 1982).
 Région paléarctique.
411. *Achaearanea conigerum* (SIMON, 1914)
 Lit. : BP : La Rhûne (97).
 France, Allemagne.
412. *Achaearanea lunatum* (CLERCK, 1757)
 Lit. : HP : Orédon 1830m (24).
 PO : Banyuls-Vallespir (18).
 AN : Encamp 1420m (22), La Massana
 1290m (22), Sant Julia de Loria
 1025-1050m (22).
 N.L. : PO : Gorges de Caranca 800m -/1 (48),
 Vernet-les-Bains -/3 (33),
 Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982),
 Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Région paléarctique et néarctique.
413. *Achaearanea tepidariorum* (C.L. KOCH, 1841)
 Lit. : PO : Banyuls (42).
 N.L. : BP : Ascain 50m 4/4 (8).
 Cosmopolite.
414. *Theridion belliosum* SIMON, 1873
 Lit. : HG : Mane (42).
 Europe alpine.
415. *Theridion bimaculatum* (LINNE, 1767)
 Lit. : BP : Camou-Cihigue (34), Lescun (33).
 HP : Orédon (25).
 PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Sant Julia de Loria 1025-1080m
 (22).
 Europe, Sibérie.
416. *Theridion herbigrada* SIMON, 1873
 Lit. : PO : Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 Europe méridionale.
417. *Theridion impressum* (L. KOCH, 1881)
 Lit. : HP : Genost 1300m (35).
 PO : Prats-de-Mollo (18).
 AN : Andorra la vella 1070-1080m (22),
 Encamp 1715m (22), Ordino 1475m
 (22), Sant Julia de Loria 1390-
 1400m (22).
 Europe.

418. *Theridion instabile* CAMBRIDGE, 1870
 Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
 Europe.
419. *Theridion melanurum* HAHN, 1831
 Lit. : HP : Gèdre 1100m (31), Marcadau-Vignemale 2130m (27), Orédon 1850m (24), La Pez 1350m (35).
 PO : Carlit 2010m (26), Banyuls-Vallespir (18)
 AN : Encamp 1700m (22).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982).
 Europe, Afrique du Nord.
420. *Theridion nigropunctatum* LUCAS, 1846
 Lit. : BP : Licq-Athérey (97).
 PO : Banyuls (18).
 N.L. : PO : Banyuls 1/- (42).
 Région méditerranéenne.
421. *Theridion nigrovariegatum* SIMON, 1873
 Lit. : ARI : Ax (97).
 PO : Banyuls (97), Céret (97), Massane (97), Vernet (97).
 GE : Amer (64).
 BP : Sare -/1 (9).
 Europe centrale et méridionale, Syrie, Sibérie.
422. *Theridion pallens* BLACKWALL, 1834
 Lit. : PO : Amélie (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Andorra la vella 1070-1090m (22).
 Europe.
423. *Theridion petraeum* L. KOCH, 1872
 Lit. : PO : (97).
 Europe, Afrique du Nord.
- * 424. *Theridion pyrenaeum* DENIS, 1944
 Lit. : AN : Encamp (110), Cirque de Pessons (110).
 Pyrénées.
425. *Theridion pictum* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1860m (27).
 PO : Prats-de-Mollo (18), Le Tech (18).
 Région paléarctique.
426. *Theridion saxatile* C.L. KOCH, 1834
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Loudenvielle 965m (35).
 GE : Arbucias (64).
 N.L. : GU : Renteria 1/- (29).
 Région paléarctique.
427. *Theridion simile* C.L. KOCH, 1836
 Lit. : PO : Banyuls (18), Coustouges (18), Prats-de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Europe, Afrique du Nord.
428. *Theridion sisypium* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1450m (32), Lescun (33).
 HP : Gavarnie 1710m (31), Lespitau 1400m (35), Louron (35), Marcadau-Vignemale 1900m (27), Orédon 1850-1950m (24), Pla de Nabias 1350-1400m (35).
- HG : Espingo 1250-2000m (29)
 ARI : Arbu 1200-1660m (35), Donnezan 1155-1300m (36), Pic d'Engral 1300m (35), Saleix 1500m (35), Suc (35).
 PO : Capcir (36), Carlit 1950-2150m (26), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Andorra la vella 1520-1880m (22), Canillo 1810-2180m (22), Encamp 1420-1715m (22), La Massana 1500-1660m (22), Ordino 1390-1480m (22), Sant Julia de Loria 1375m (22).
 N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982) 1750m -/2 (60), Vernet-les-Bains -/2 (33).
 Afrique du Nord, Europe.
429. *Theridion suaveolens* SIMON, 1879
 Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
 Europe sud-ouest.
430. *Theridion tinctum* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech (18), Prats-de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982).
 Europe, Japon.
431. *Theridion varians* HAHN, 1831
 Lit. : BP : Camou-Cihique (42), Sare 400-600m (28).
 HP : Orédon 1850-1900m (24).
 HG : Jouéou 1200m (28).
 ARI : Luzenac (35).
 PO : Banyuls (18), Carlit 2020m (26), Prats-de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-Cerdans (18).
 AN : Andorra la vella 1760m (22), Encamp 1560m (22).
 N.L. : BP : Bruges 370m 1/- (85).
 PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Région paléarctique.
432. *Ulesanis paradoxa* (LUCAS, 1846)
 Lit. : BP : Aspe (97).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Région méditerranéenne.
433. *Enoplognatha mandibularis* (LUCAS, 1846)
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 Europe occidentale, centrale et méridionale, Asie.
434. *Enoplognatha ovata* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Loudenvielle 1010-1200m (35), Genost 1250m (35), Pierrefitte-Nestalas (31).
 ARI : Ayguette (35), Donnezan 1160-1880m (36), Engral 1300m (35), Freychinède (35), Riu de Sente-nac (35), Suc (35).
 PO : Banyuls-Vallespir (18).
 N.L. : BP : Bruges 370m -/9 (85), Eaux-Bonnes 900m -/3 (89), Olhette 300m 1/- (6).
 Région paléarctique et néarctique.
- 434'. *Enoplognatha latimana* HIPPA & OKSALA, 1982
 Lit. : BP : (122).
 Europe
- 434''. *Enoplognatha afrodite* HIPPA & OKSALA, 1983.
 Lit. : PO : Collioure (123).
 N.L. : PO : Banyuls, -/2 (40).
 Région méditerranéenne.

- Enoplognatha ovata lineatum* (CLERCK, 1757)
Lit. : AN : Andorra la vella 1070-1520m (22),
Sant Julia de Loria 1000-1350m
(22).
- Enoplognatha ovata redimitum* (LINNE, 1758)
Lit. : AN : Sant Julia de Loria (22).
435. *Enoplognatha testacea* SIMON, 1884
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Mont-
alba (18), Palalda (18), Prats-
de-Mollo (18), Saint-Laurent-de-
Cerdans (18).
GE : Calonge (38), San Jorge (38).
Europe méridionale et centrale.
436. *Enoplognatha thoracica* (HAHN, 1831)
Lit. : HP : Lespitau 1400m (35), Loudenvielle
975m (35), Pont du Prat 1200m (35).
ARI : Donnezan 1200-1300m (36), Engral
1300m (35).
PO : Amélie (18), Banyuls (18), Capcir
1550m (36), Coustouges (18), Mont-
bolo (18), La Muga (18), Prats-de-
Mollo (18), La Preste (18), Saint-
Laurent-de-Cerdans (18).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY
1982), Mas Forges 750m -/1 (31),
Montlouis 1600m (Coll. JONES
1982).
Europe, Afrique du Nord.
437. *Robertus arundineti* (CAMBRIDGE, 1870)
Lit. : ARI : Donnezan 1300-1400m (36), Mont
Rouch 1700-1800m (35).
PO : Amélie (18).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (40).
Europe.
438. *Robertus lividus* (BLACKWALL, 1836)
Lit. : BP : Arthez d'Asson (117), Eaux-
Bonnes 800-850m (32), Lescun
(33), Sainte-Engrâce (35).
HG : Mane (18).
ARI : Le Bosc (18), Col de la
Crousette 900m (18), Donnezan
1876m (36), Montvalier 1500m
(28), Riu de Sentenac (35).
PO : Vallespir (18).
AN : Canillo 2400m (22), Port Dret
(35).
N.L. : BP : Gorges de Kakouetta 550m 1/-
(14).
PO : Col de Mentet 1900m -/1 (51)
1900m -/2 (52), Col de Portus
1/1 (46).
Europe, Amérique du Nord.
439. *Robertus scoticus* JACKSON, 1914
Lit. : ARI : Donnezan (36), Pas du Portel
(42).
Europe alpine.
440. *Robertus truncorum* (L. KOCH, 1872)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1900-2735m
(27).
Alpes, Pyrénées.
- * 441. *Robertus umbilicatus* (DENIS, 1961)
Lit. : ARI : Donnezan (36).
PO : Nohèdes (42).
Pyrénées.
442. *Larodectus tredecimguttatus* (ROSSI, 1790)
Lit. : PO : Amélie (18).
CA : (64).
Europe méridionale, Afrique du Nord, Asie
mineure.
443. *Pholcomma gibbum* (WESTRING, 1851)
Lit. : BP : Herboure 200m (28), Sare 400-
600m (28).
ARI : Castet d'Aleu (42), Sentein (42),
Sentenac-de-Sérou (42).
PO : Banyuls (18), La Bastide (42),
La Preste (18).
GE : Collado de Coubet (38), Ripoll (38),
Santa Pella (38).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY
1982), Mas Forges 750m (Coll.
MURPHY 1982).
Europe, Algérie.
444. *Theonoe minutissima* (CAMBRIDGE, 1879)
Lit. : BP : Larrau (42), Ordiarp (42).
HP : Pierrefitte-Nestalas (31).
ARI : Ercé (35), Lestelas (35),
Rodome-Prades (97).
GE : Ripoll (38).
Europe occidentale et centrale.

LYCOSIDAE

445. *Pardosa agrestis* (WESTRING, 1861)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Lac d'Aumar 2192m (35), Marcadau-
Vignemale 2250m (27), Orédon
1860m (24).
PO : Carlit 2150-2350m (26), Sournia
(42).
N.L. : PO : Lac des Bouillouises 2100-2200m
1/- (1).
Europe.
446. *Pardosa agricola* (THORELL, 1856)
Lit. : NA (106).
Région paléarctique..
447. *Pardosa amentata* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1380-1750m (32),
Lescun (33).
HP : Aumar (35), Cap de Long 2200m
(31), Estibère 2150m (31),
Lespitau 1400m (35), Marcadau-
Vignemale 1860-1900m (27), Orédon
1850m (25) 2320-2500m (24),
L'Oueil-Nègre 2338m (31), Pla
de Labasse 1600m (35).
HG : Espinac 1920-2100m (29).
ARI : Arbu 1660m (35), L'Ayquette (35),
Donnezan 1300-1700m (36),
Freychinède (35), Izourt (35),
Suc 1450m (35).

- LE : Aigues tortes près de Bohi 1800m (39).
 AN : Andorra la vella 1070-2260m (22), Canillo 1820-2410m (22), Encamp 2450m (22), Ordino 2200m (22), Sant Julia de Loria (22).
 N.L. : PO : La Bouillouse 1/1 (64), Col de Jau 1500m 2/- (30), Col de Mentet 1/1 (53). Etang de Castille -/7 (62), Etang de la Coumouse -/1 (63), Lac des Bouillouses 1/2 (61), Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982), Puigmale d'Err 2200-2400m 2/- (2).
 HU : Jaca 1300-1700m -/1 (71)
 Région paléarctique.
448. *Pardosa bifasciata* (C.L. KOCH, 1848)
 Lit. : HP : Orédon 1860m (24).
 ARI : Donnezan 1260m (36), Suc (35).
 AN : Andorra la vella 1450-1600m (22), Encamp 1660-1850m (22), Sant Julia de Loria 1050m (22).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Fillols 850m -/1 (43), Mas Forges 800m 1/- (32), Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
 Europe centrale, Asie mineure.
449. *Pardosa blanda* (C.L. KOCH; 1834)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2120-2490m (32), Lescun (33).
 HP : Aumar 2192m (35), Cap de Long 2200m (31), Gavarnie 1720m (31), Lespitau 1400m (35), Hourquette d'Es Toudous 2260m (31), Orédon 1860-2260m (24), L'Oueilh Nègre 2338-2360m (31).
 HG : Espingo 2200-2550m (29).
 ARI : Arbu 1660m (35), Donnezan 1800-2000m (36), Freychinède 1300m (35), Pic Montcalm 2700-3080m (35).
 PO : Canigou 2100m (42), Carlit 2020-2430m (26).
 LE : Aigues Tortes près de Bohi 2000-2200m (39).
 AN : Andorra la vella 1760-2590m (22), Canillo 1900-2365m (22), Encamp 1950-2440m (22), La Massana 1340-2000m (22), Sant Julia de Loria 1550m (22).
 N.L. : BP : Olhette 300m -/2 (18).
 PO : Canigou 2000m 2/1 (55).
 Europe alpine.
450. *Pardosa cribrata* SIMON, 1876
 Lit. : PO : Banyuls (97).
 GE : (64).
 Europe sud-ouest.
451. *Pardosa femoralis* SIMON, 1876
 Lit. : PO : Palau del Vidre (97).
 Pyrénées, Alpes, Macédoine.
452. *Pardosa hortensis* (THORELL, 1872)
 Lit. : NA : Estella (106), Olagne (106).
 LE : Pic d'Erill 1400-1550m (39).
 AN : La Massana 1305m (22).
 N.L. : PO : Mas Forces 750m -/4 (59) 750m (Coll. JONES 1982), Mas Forges 750m -/1 (31) 800m -/1 (32).
 HU : Jaca 700m -/1 (21).
 Région paléarctique.
453. *Pardosa lugubris* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HG : Espingo 1520m (29), Jouéou 1200m (28).
 ARI : Donnezan 1300m (36).
 AN : Ordino 1780m (22).
 N.L. : PO : Canigou 750m 2/26 (59) 1250m 28/15 (58) 1500m 1/- (57) 1750m 2/- (56), Col de Jau 1500m 1/2 (30), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Mas Forges 750m -/4 (31), Prats-de-Mollo 9/- (5).
 Région paléarctique.
454. *Pardosa monticola* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-2483m (32), Lescun (33).
 HP : Astazou 2445m (31), Le Gave de la Glaire 1700m (31), Lespitau 1400m (35), Marcadau-Vignemale 2320m (27), La Mourèle 2305m (31), Orédon 1800-2330m (24), La Pez 1300m (35), La Soula 1750m (35).
 ARI : Donnezan 1300-2000m (36), Engral 1300m (35), Freychinède (35), Izourt (35).
 PO : Canigou (99), Capcir 1550-1650m (36) Carlit 1955-2250m (26).
 LE : Aigues Tortes près de Bohi 1800m (39), Pic d'Erill 1400-1550m (39).
 AN : Andorra la vella 1710-2160m (22), Encamp 1475m 2000m (22), La Massana 1580-2020m (22), Ordino 1390-2000m (22), Sant Julia de Loria 1050-1375m (22).
 N.L. : BP : Larrau 1700m -/1 (91).
 PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
 NA : Col de Pierre 1650m -/1 (19).
 Région paléarctique.
Pardosa monticola pseudosaltuaria SIMON, 1937
 Lit. : PO : Sommet du Canigou (97).
 Pyrénées.
455. *Pardosa morosa* (L. KOCH, 1870)
 Lit. : Pyrénées (97).
 N.L. : PO : Vernet-les-Bains 1/- (34).
 Europe centrale et méridionale.
456. *Pardosa occidentalis* SIMON, 1881
 N.L. : HU : Jaca 700m -/1 (21).
 Europe Sud-ouest.
457. *Pardosa paludicola* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 Région paléarctique.
458. *Pardosa proxima* (C.L. KOCH, 1848)
 Lit. : BP : La Rhune (97).
 HP : Carrot de Sentinelle 1710m (31), Gavarnie (31), Le Gave d'Héas (31).
 ARI : Moulis (42).
 PO : Banyuls (97), Carlit 2172m (26), Canigou (97).
 N.L. : BP : Ascain 50m 1/1 (8), Bruges 350m -/4 (83).
 HU : Jaca 750m -/1 (28).
 Europe occidentale, centrale et méridionale, Afrique du Nord.

459. *Pardosa pullata* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400-1750m (32), Lescun (33).
 HP : Aubagnes 1350m (35), Lespitau 1400m (35), Peyresourde 1569m (35), La Pez 1300m (35), Le Prat 1200m (35).
 HG : Espingo 1250-1280m (29).
 ARI : Donnezan 1200-1800m (36), Freychinède 1300m (35), Izourt (35).
 PO : Capcir (36), Carlit 1990-2000m (26).
 HU : Le Pourtalet 1600m (39), Aiguas Tortes près de Bohi 1800m (39).
 AN : Andorra la vella 1454-1710m (22), Canillo 1810m (22), Encamp 1480m (22), La Massana 1350-1660m (22), Sant Julia de Loria 1025-1350m (22).
 N.L. : BP : Col d'Haltza 650m -/1 (12), Eaux-Bonnes 900m 1/2 (89), Olhette 300m -/2 (6), Pic d'Orhy 1750m -/10 (15).
 PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Col de Mentet 1600m 2/2 (50), Col de Portus 3/3 (46), Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982) 1750 1/- (50), Prats-de-Mollo 25/16 (5), Puigmale d'Err 2200-2400m 1/- (2).
 NA : Col de Pierre 1650m -/3 (19).
 HU : Jaca 1300-1700m -/1 (71), Selva de Oza 1500m -/2 (23).
 Europe, Asie mineure.
460. *Pardosa saltuaria* (L. KOCH, 1870)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1600-2300m (32), Col du Palas 2450m (35), Lescun (33).
 HP : Aubert 2150m (35), Bassias 2367m (35), Cap-de-Long 2260m (31), Coume Escure 2160m (31), Coume Estrète 2600m (31), Esquierry 2131m (35), Estiouère 2300-2600m (35), Marcadau-Vignemale 1780-2450m (27), Orédon 1900m (25), 2320 (24), Néouvielle 2600m (31), L'Oueilh Nègre 2330-2340m (31).
 HG : Espingo 2000-2700m (29).
 ARI : Donnezan 1800-2200m (36).
 PO : Canigou 2100m (42), Carlit 2200-2350m (26).
 AN : Andorra la vella (22), Canillo 1890-2520m (22), Encamp 1980-2340m (22), La Massana 2020-2340m (22), Ordino 2350m (22).
 N.L. : BP : Gourette 2150m 10/8 (87).
 PO : La Bouillouise -/6 (64), Canigou 2000m 90/9 (55), 2200m 54/15 (54), Col de Portus 3/- (46), Etang de la Coumouse -/1 (63), Lac des Bouillouses 2100-2200m 3/- (1), Puigmale d'Err 2200-2400m -/1 (2).
 Europe boréo-alpine.
461. *Pardosa strigillata* SIMON, 1876
 Lit. : BP : Saint-Jean-de-Luz (97).
 PO : Carlit 2120m (26).
 Europe méridionale.
462. *Pardosa torrentum* SIMON, 1876
 Lit. : HP : Aumar 1860m (31), Marcadau-Vignemale 2610-3010m (27).
 PO : Carlit 2430m (26).
 Europe centrale.
463. *Pardosa vittata* (KEYSERLING, 1863)
 N.L. : HU : Jaca 750m -/1 (28).
 Europe centrale.
464. *Pardosa wagleri* (HAHN, 1822)
 Lit. : Pyrénées.
 Europe alpine.
465. *Acantholycosa pyrenaea* (SIMON, 1876)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-2600m (32), Lescun 1850m (33).
 HP : Balaitous 2950m (35), Bassias 2367m (35), Cap de Long 2875-2700 (31), Coume Estrète 2600m (31), Lac de la Glaière 2050m (31), Lac Vert 2680m (31), Marcadau-Vignemale 1740-2250m (27), La Muga 2800m (35), Néouvielle 2500-3070m (31), Nère 2400-2700m (35), Orédon 1860-2350m (24), Pic Long 3100-3180m (31), Pic Palas (35).
 HG : Espingo 2300-2900m (29).
 AN : 1580-2725m (22).
 Alpes, Pyrénées.
466. *Acantholycosa rupicola* (DUFOUR, 1821)
 Lit. : HP : Cauterets (97), Lac bleu (97), Orédon 2200-2300m (24), Pic de Lustou 2880-3035m (35), Pic du Midi de Bigorre (97), St.-Sauveur (97).
 HG : Espingo 2200-2800m (29), Luchon (97).
 ARI : Pic Montcalm 2700-3080m (35).
 Pyrénées, Alpes.
467. *Hygrolycosa rubrofasciata* (OHLERT, 1865)
 Lit. : BP : Pau (97).
 Europe centrale et septentrionale.
468. *Xerolycosa albofasciata* (BRULLE, 1832)
 Lit. : PO : Banyuls (98).
 HU : (89).
 GE : (64).
 Région méditerranéenne.
469. *Xerolycosa miniata* (C.L. KOCH, 1834)
 Lit. : ARI : Donnezan 1200m (36).
 Région paléarctique.
470. *Xerolycosa nemoralis* (WESTRING, 1862)
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1650-2200m (32), Lescun (33).
 HP : Aspin 1550m (35), Camou 1900m (31), Carrot de Sentinelle 1710m (31), Hourquette d'Es Toudous 2250m (31), Loudenvielle (975m), Marcadau-Vignemale 1760-1780m (27), Orédon 1800-2230m (24).
 HG : Espingo 1350-1500m (29), Jouéou 1700m (28).
 ARI : Donnezan 1250-1300m (36), Engral 1300m (35), Freychinède 1300m (35), Suc (35).
 PO : Banyuls (98).
 AN : Andorra la vella 1520-1550m (22), Canillo 1575-1660m (22), Encamp 1820m (22), La Massana 1360-1880m (22), Sant Julia de Loria 1390-1950m (22).
 N.L. : PO : Canigou 1750m 39/7 (56), Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique.

471. *Alopecosa alpicola* (SIMON, 1876)
Lit. : HU (89).
Alpes, Pyrénées, Corse.
472. *Alopecosa accentuata* (LATREILLE, 1817)
Lit. : BP : Lescun (33).
PO : Capcir (36).
AN : Encamp 1880m (22), Canillo
1885m (22).
N.L. : PO : Canigou 2000m 1/- (38).
Région paléarctique.
473. *Alopecosa cuneata* (CLERCK, 1757)
Lit. : PO : Capcir (36).
AN : Canillo 2020m (22), Ordino
1390-1780m (22).
N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. MURPHY
1982), Prats-de-Mollo 4/- (5).
Région paléarctique.
474. *Alopecosa fabrilis* (CLERCK, 1757)
Lit. : PO : Carlit 2250-2430m (26).
N.L. : PO : Mas Forges 800m -/4 (32).
Europe, Turkestan.
475. *Alopecosa laciniosa* SIMON, 1876
Lit. : PO (97), Banyuls-sur-Mer (83).
N.L. : HU : Col de Pierre 1650m -/1 (19).
France méridionale, Sardaigne.
476. *Alopecosa pulverulenta* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1750-1900m (32),
Lescun (33).
HP : Coume Escure 2160m (31),
Esquierry 2131m (35), Estibère
2150m (31), Marcadau-Vignemale
1780m (27), Orédon 1850-2320m
(24, 119).
HG : Espingo 1250m (29).
ARI : Donnezan 1936m (36).
LE : Pic d'Eriill 1400-1550m (39).
AN : Encamp 2100-2300m (24).
N.L. : PO : Canigou 1250m -/1 (58), 1500m
5/1 (57) 1750m 3/1 (56) 2000m
2/- (38), Col de Jau -/1 (40),
Col de Mentet 2200m 1/- (53),
Col de Portus 2/2 (49), Larrau
1750m -/4 (15), Montlouis 1600m
(Coll. JONES, 1982), Prats-de-
Mollo 5/- (5), Vernet-les-Bains
5/- (34).
Région paléarctique.
477. *Alopecosa trabalis* (CLERCK, 1757)
Lit. : ARI : Donnezan 1700m (36).
PO : (83) Banyuls (42).
AN : Andorra la vella 1070-1090m (22),
Encamp 1390m (22), La Massana
1660m (22).
N.L. : PO : Canigou 1250m 3/- (58), Mas Forges
750m -/2 (59) 800m -/1 (43).
Europe centrale et occidentale, Asie mineure,
Turkestan.
478. *Trochosa robusta* (SIMON, 1876)
Lit. : AN : Sant Julia de Loria 1080m (22).
Région paléarctique.
479. *Trochosa ruricola* (DE GEER, 1778)
Lit. : PO : Banyuls (39).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (40), Mas Forges 750m
-/1 (59) 750m -/2 (31).
Région paléarctique.
480. *Trochosa terricola* (THORELL, 1856)
Lit. : BP : Lescun (33), Sare 400-600m (28).
HG : Mane (42).
ARI : Pic d'Engral 1300m (35).
GE : Cerdana espanola (64).
AN : La Massana 1270-1480m (22),
Ordino 1500m (22), Sant Julia de
Loria 950-1000m (22).
N.L. : BP : Olhette 309m -/1 (6).
PO : Col de Portus 1/- (49), Prats-de-
Mollo 1/- (5) 2/2 (94).
Région paléarctique.
481. *Arctosa cinerea* (FABRICIUS, 1777)
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Suc (35).
PO : Banyuls (42).
Région paléarctique.
482. *Arctosa leopardus* SUNDEVALL, 1833
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Donnezan 1300-1400m (36).
PO : Capcir 1650m (36).
Région paléarctique.
483. *Arctosa maculata* HAHN, 1822
N.L. : NA : Col de Pierre 1650m 1/1 (19).
Europe centrale et orientale.
484. *Arctosa perita* (LATREILLE, 1799)
Lit. : PO : Banyuls (98).
GU : Vergara (64).
GE : Arbucias (64).
N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
Région paléarctique.
485. *Arctosa stigmata* (THORELL, 1875)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400-1700m (32).
Paléarctique, Europe centrale et orientale.
486. *Arctosa variana* C.L. KOCH, 1848
N.L. : BP : Ossas -/1 (65).
HU : Santa Cilia de Jaca (21).
Europe méridionale.
487. *Arctosa villica* LUCAS, 1846
Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97),
Vernet (97).
Europe méridionale, Afrique du Nord.
488. *Hogna radiata* (LATREILLE, 1819)
Lit. : HG : St.-Béat (28).
PO : Tour Madeloc 494m (39).
CA : San Miguel del Fay (64).
GE : Amer (64), Arbucias (64),
Caldas de Malavella (64), Mortorell
de la Selva (64), Port-Bou (64).
Région méditerranéenne.

489. *Tricca lutetiana* (SIMON, 1876)
Lit. : ARI : Ax (97).
PO : Banyuls (42).
Europe.
490. *Pirata hygrophilus* (THORELL, 1872)
Lit. : HP : Pierrefitte-Nestalas (31).
ARI : Moulis (42).
Région paléarctique.
491. *Pirata latitans* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Donnezan 1300-1400m (36).
AN : Sant Julia de Loria 1050m (22).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (40).
Europe.
492. *Pirata piraticus* (CLERCK, 1757)
Lit. : HP : Orédon 2150m (24).
PO : Capcir 1650m (36), Carlit 1980-2120m (26).
Région paléarctique et néarctique.
493. *Pirata piscatorius* (CLERCK, 1757)
Lit. : ARI : Donnezan 1300m (36).
Région paléarctique.
494. *Pirata tenuitarsis* SIMON, 1876
N.L. : BP : Banyuls -/3 (40).
Europe.
495. *Pirata uliginosum* (THORELL, 1856)
N.L. : BP : Olhette 300m -/1 (6).
Europe.
496. *Aulonia albimana* (WALCKENAERA, 1805)
Lit. : BP : Herboire 200m (28), Lescun (33).
ARI : Campagne-sur-Arize (42).
GE : Collada de Coubet (38).
N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58).
Europe, Afrique du Nord.
497. *Trabaea paradoxa* SIMON, 1876
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1983), Mas Forges 750m 1/1 (32).
Europe sud-ouest, Algérie.

PISAUROIDAE

498. *Pisaura mirabilis* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Lespitau 1420m (35), Loudenvielle 1010m (35).
HG : St.-Béat (28).
ARI : Donnezan 1200-1300m (36), Engral 1300m (35), Izourt (35), Suc (35).
PO : Banyuls (42).
AN : La Massana 1600m (22), Sant Julia de Loria 1350-1375m (22).
N.L. : PO : Canigou 1250m 1/2 (58), Mas Forges 750m -/1 (31) 750m -/1 (59).
Région paléarctique.

DOLOMEDIDAE

499. *Dolomedes fimbriatus* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Vallée d'Aspe (97).
Région paléarctique.

AGELENIDAE

500. *Agelena agelenoides* (WALCKENAERT, 1841)
Lit. : BP : La Rhône (97)
Maroc, Algérie, Espagne, Portugal, Basses Pyrénées françaises.
501. *Agelena gracilens* L. KOCH, 1841
Lit. : PO : Laroque-des-Albères (42)
GE : Arbucias (64), Caldas de Malavella (64)
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982).
HU : Jaca 700m 2/1 (21).
Europe centrale, méridionale, Asie mineure, Chine.
502. *Agelena labyrinthica* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Lescun (33)
HP : Genost 1000-1450m (35), La Pez 1250-1350m (35).
ARI : Arbu 1600m (35), Cascade de l'Arbu 1200m (35), Riu de Sentenac (35), Donnezan 1200-1300m (36).
PO : Canigou 850-1000m (42).
AN : Andorra la vella 1070-1750m (22), Canillo 1885m (22), Ordino 1480m (22), Sant Julia de Loria 1000-1375m (22).
Europe, Asie septentrionale et centrale.
503. *Malthonica lusitanica* SIMON, 1898
Lit. : BP : Larra 600m (97).
N.L. : BP : Sare 350m -/1 (7).
HU : Pena de Oroel 1200m 2/- (25), San Juan de la Pena 1200m 2/- (22), Selva de Oza 1200m 2/- (24).
Europe sud-ouest.
504. *Lycosoides coarctata* (DUFOUR, 1831)
Lit. : PO : Banyuls (42).
CA (5).
Région méditerranéenne.
505. *Textrix caudata* L. KOCH, 1873.
Lit. : PO : Banyuls (42).
GE (5).
AN : Sant Julia de Loria 1050m (22).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982).
Europe méridionale.
506. *Textrix denticulata* (OLIVIER, 1789)
Lit. : HP : Orédon 1860m (24).
ARI : Donnezan 1200m (36).
PO : Capcir (36), Carlit 1950m (26), La Massana 750m (42), L'Ouillat 1000m (42).
AN : Andorra la vella 1550-1875m (22), Encamp 1580m (22), La Massana 1430m (22).
LE : Bohi 1615m (39).
N.L. : PO : Canigou 1500m 1/- (57) 2000m 1/- (38), Cerdagne -/1 (3), Gorges de Caranca 800m -/1 (48).
Europe.

507. *Textrix pinicola* SIMON, 1875
Lit. : PO : Banyuls (97).
Corse. Pvrénées, montagnes d'Espagne.
508. *Tegenaria agrestis* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Amélie-les-Bains (47),
La Massana (42), Prats-de-Mollo
(47).
CA (5).
N.L. : PO : Mas Forques 750m (Coll. JONES 1982).
HU : Jaca 700m 1/- (27).
Europe, Etats Unies.
- * 509. *Tegenaria antrorum* SIMON, 1916
Lit. : PO : Villefranche (97).
N.L. : PO : Canigou 1500m -/1 (57).
Pyrénées.
510. *Tegenaria atrica* KOCH, 1843
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1875-2250m
(27), Orédon 1850m (31).
ARI : Bèdeillac (47), Montfa (51).
PO : Amélie-les-Bains (47),
Arles-sur-Tech (51), Banyuls
(97), Cap Dey (47), Canigou
2100m (42), Le Coral de la Cabra
(47), Eyne (97), Gorges de
Caranca (47), La Massana 750m (42)
Montbolo (47), Pouade (42),
Puig Ferréol (47), Roc-St.-Sauveur
(47), St.-Laurent-de-Cerdans (47),
Ultrera (47).
AN : St.-Julia (115).
GE : Bora (115), Terrades (115).
Europe.
511. *Tegenaria fuesslini* PAVESI, 1873
Lit. : HP (5).
ARI (5).
PO : Amélie-les-Bains (47), Arles-sur-
Tech (47), Banyuls (47), Coustouges
(47), Vernet (47), Montbolo (35,47),
Prats-de-Mollo (5,47), Roc St.-
Saureur (47), St.-Laurent-de-Cerdans
(47), Pyrénées centrales (97).
HU : Passo di Monrepos 1216m (3),
Balneario de Panticosa 2000m (3),
Ibidem 2900m (3), St.-Urbez 800m (3).
GE : Santa Fé 1500m (3).
N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58), Col de Jou
1125m (Coll. MURPHY 1983), Col de
Portus -/1 (49), Mas Forges 750m 1/-
(31) 750m 15/3 (59), 750m (Coll.
MURPHY 1983), Prats-de-Mollo 6/1 (5) 3/-
(94), Vernet-les-Bains -/1 (33).
HU : Jaca 700m -/1 (27).
Europe centrale et méridionale.
- * 512. *Tegenaria nervosa* SIMON, 1870
(= *T. derouetae* DRESCO, 1957)
Lit. : PO : Cova Bastera (47),
Villefranche (5).
Pyrénées.
513. *Tegenaria domestica* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Loudenvielle 965m (35).
ARI : Donnezan 1250m (36), Le Mas
d'Azil (57).
PO : Carlit 2015m (26),
Les Bouillouses (47),
St.-Laurent-de-Cerdans (47).
HU : Abaho del Collarada (57).
Cosmopolite.
514. *Tegenaria ferruginea* (PANZER, 1804)
Lit. : PO : Carlit 1950m (25), Montlouis (47).
ARI : Donnezan 1300-1600m (36).
Europe.
515. *Tegenaria inermis* SIMON, 1870
Lit. : BP : Arudy (97), Asp (97), Aussurucq
(97), Camon-Cihique (50), Lanne
(34), Mauléon (97), St.-Engrâce (50)
St.-Jean-de-Luz (97), Suhau (50).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Eaux-
Bonnes (97), Haut-Nistos (52),
Lourdes (97), Saint-Pé-de-Bigorre
(51), Orédon 2260-2350m (24),
St.-Laurent-de-Neste (52).
HG : Arbas (50), Espingo 1290m (29),
Izaut de l'Hotel (50), St.-Bertrand,
de-Comminges (50).
ARI : Bélesta (51), Castelnaud-Durban (50)
Esplas de Sévou (50), Estours (51),
Lacourt (51), Massat (50),
Montesquieu-Avantès (51), Rive-
renert (50), Sue (50), Vernajouls
(51).
PO (5)
GU : Albistur, Mondragon, Onate (116).
NA : Martinchurito (57), Mendicute (57).
Europe sud-ouest.
516. *Tegenaria montigena* SIMON, 1937
Lit. : BP : La Rhûne (97).
HP : La Pez 1350m (35).
HU : Balneario de Albarracin 1600m (3),
Puerto de Monrepos 1216m (3).
GE : Santa Fé 1500m (3).
Europe sud-ouest.
- * 517. *Tegenaria oribata* SIMON, 1916
Lit. : PO : Amélie (97), Arles-sur-Tech (47),
Banyuls (47), Canigou (97), La
Preste (97), Forêt de Céret (47),
Forêt de Sorède (47), Prats-de-
Mollo (47).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 3/- (59) 800m 4/- (32),
Prats-de-Mollo -/1 (94).
Pyrénées.
518. *Tegenaria pagana* C.L. KOCH, 1841
Lit. : HU : La Algeta (46).
Région paléarctique.
519. *Tegenaria parietina* (FOURCROY, 1785)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1726m (27).
PO : Banyuls (5).
GU : Vergara (64).
GE : Amer (64), Arbucias (64), Cerdana
espanola (64).
Région paléarctique.
520. *Tegenaria picta* SIMON, 1871
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1400-1700m (32).
HP : Orédon 1860m (24).
ARI : Moulis (5).
PO : Amélie (47), Arles-sur-Tech (47),
Palalda (47), Vernet-les-Bains (47).
HU : Forau de la Drolica (5), Sierra de
l'Aquilla 1200m (3).
N.L. : BP : Gourette 1300m -/1 (79), Olhette
300m -/1 (6).
HU : Selva de Oza 1500m -/1 (23).
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.

521. *Tegenaria racovitzai* SIMON, 1907

Lit. : HU : Los Gloces (5), La Brolicia (5),
Paco de Naya (5).
Europe sud-ouest.

522. *Tegenaria saeva* BLACKWALL, 1844

Lit. : HP : Gavarnie 1710m (28), Gave de la
Glaire 1800m (28).
PO : Amélie-les-Bains (47).
AN : Sant Julia de Loria 1100m (22).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982).
Europe.

523. *Tegenaria silvestris* L.KOCH, 1873

Lit. : AR : Prat-et-Bonrepaux (50).
HP : Haut-Nistos (51).
PO : Amélie-les-Bains (47).
AN : Andorra la vella 1760-1880m
(22).
HG : Arbas (50).
Europe centrale et méridionale.

524. *Hysteronoma torpida* (C.L.KOCH, 1834)

Lit. : PO (5).
Europe centrale et méridionale

* 525. *Coelotes pyrenaeus* SIMON, 1870

Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Orédon 1800m (24).
PO : Banyuls (42), Canigou (97),
Eyne (97), La Massana (97),
Planès (97), Sorède (97),
Velmanya (97).
CA (64).
AN : Encamp 1580m (22).
Pyrénées.

526. *Coelotes segestriiformis* (DUFOUR, 1820)

Lit. : BP : Arudy (97), Bielle Benon (97),
Eaux-Bonnes (97), Lescun (33),
Urds (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Bassias
2367m (33), Cirque de l'Estarragne
2200m (119), Couterets (97),
Estiouère 2100-2600m (35),
Gavarnie (97), Lac de Nère 2380-
2450m (35), Lac de la Mourèle
2350m (31), Lespitau 1400m (35),
Orédon 1880-2350m (24), Pic du
Midi de Bigorre 1500m (39), Le
Prat 1200m (35).
HG : Espingo 950-3000m (29), Luchon (97).
Venasque (97).
ARI : Aulus (97), Donnezan 1200-1800m
(36), Freychinède (35), Mont
Rouch 1700-1800m (35).
PO : Barèges (97), Capcir (36),
Lanoux (97), La Preste (97).
HU : (5).
LE : (5).
AN : Canillo 2500-2730m (22), Pic du
Casamanya 2370m (22).
N.L. : BP : Larrau 1700m -/1 (66) 1900m 2/2
(16).
Europe méridionale.

527. *Coelotes terrestris* (WIDER, 1834)

Lit. : BP : St. Christau (97).
HP : Col d'Aspin 1550m (35), Lac
Bleu (97).
Europe.

CYBAEIDAE

528. *Cybaeus angustiarum* L. KOCH, 1868

Lit. : BP : Arthez d'Asson (52), Eaux-Bonnes
1400m (32), Sainte-Engrace (52).
HP : La Bastide (34), Peyrouse (51).
HG : Espingo 1250m (29).
N.L. : BP : Eaux-Bonnes 900m 1/- (89),
Gourette 1400m 2/1 (86).
Europe septentrionale et centrale.

HAHNIIDAE

* 529. *Diploia pyrenaea* SIMON, 1898

Lit. : PO : Montlouis (97), Velmanya (97).
N.L. : PO : Gorges de Caranca 800m -/2 (48).
Pyrénées.

530. *Cryphoeca silvicola* (C.L.KOCH, 1834)

Lit. : HP : Orédon 1850-1900m (24,25,31,35).
ARI : Donnezan (36).
N.P. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
Region paléarctique.

531. *Iberina masarredoi* SIMON, 1881

Lit. : BP : Camou-Cihigue (34), Rébénacq (34,
97).
Pyrénées françaises, Espagne.

532. *Antistea elegans* (BLACKWALL, 1841)

Lit. : BP : Lescun (33), Ordian (50).
ARI : Donnezan 1300m (36), Salau (35).
PO : Capcir (36).
Région paléarctique.

Antistea elegans propinqua (SIMON, 1875)

Lit. : ARI : Prades (97).
Pyrénées, Vosges, Alpes.

533. *Hahnica helveola* SIMON, 1875

Lit. : HP : Ilhet (34).
ARI : Bélesta (42).
GE : Calonge (38), San Jorge (38).
N.L. : HU : San Juan de la Pena 1200m 1/1 (22).
Europe centrale et occidentale.

534. *Hahnica montana* (BLACKWALL, 1841)

Lit. : ARI : Donnezan 1350-1880m (36).
N.L. : HU : Selva de Oza 1200m 1/1 (24).
Europe centrale et occidentale.

535. *Hahnica onidium* SIMON, 1875

Lit. : PO : Valcebolère (35).
N.L. : HU : San Juan de la Pena 1200m 2/2 (22).
Europe centrale et occidentale.

536. *Hahnica petrobia* SIMON, 1875

Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97), Coume
Estrète 2764m (31).
HG : Espingo 2840-3050m (29).
ARI (97).
PO : Banyuls (97), Collioure (97).
Europe centrale.

DICTYNIDAE

537. *Devade hirsutissima* (SIMON, 1880)
Lit. : PO : Banyuls (18).
Région méditerranéenne.
538. *Dictyna arundinacea* (LINNE, 1758)
Lit. : HP : Orédon 1880m (24).
PO : Banyuls (18), Capcir (36),
Carlit 1990 - 2150m (26),
Coustouges (18), St.-Laurent-
de-Cerdans (18), Vallespir
(18).
GE (64).
AN : Canillo 1860 - 1920m (22),
Ordino 1981m (22).
N.L. : PO : Prats-de-Mollo 1/- (5).
Europe, Sibérie, Amérique du Nord.
539. *Dictyna bicolor* SIMON, 1870
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll.JONES 1982).
Europe méridionale et centrale,
Afrique du Nord.
540. *Brigittea civica* (LUCAS, 1850)
Lit. : PO : Banyuls (18).
Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord.
541. *Brigittea kosiorowiczi* SIMON, 1873
(= *B. latens* ?; LEHTINEN 1967)
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll.
MURPHY 1982).
Europe sud-ouest.
542. *Brigittea latens* (FABRICIUS, 1775)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1860m (28).
PO : Banyuls (98).
AN : Andorra la vella 1070-1090m
(22), Encamp 1715m (22),
Ordino 1475m (22), Pic Paderu
1750m (22), Sant Julia de
Loria 1350m (22), Sant Miguel
d'Engolasters 1920m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 800m -/1 (32), Mas
Forges 750m (Coll.MURPHY 1982),
Iles-sur-Têt (Coll.JONES 1982).
Europe, Afrique du Nord, Turkestan.
543. *Dictyna pusilla* THORELL, 1856
(= *D. arundinacea* ?, LEHTINEN, 1967)
Lit. : PO : Montlouis (97).
Région paléarctique.
544. *Dictyna uncinata* THORELL, 1856
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1550m (32).
PO : Manyagues (18), Prats-de-Mollo
(18), St.-Laurent-de-Cerdans
(18).
CA : San Miguel del Fay (64).
N.L. : PO : Banyuls 1/1 (40), Mas Forges
750m -/1 (31), Mas Forges 750m
(Coll.JONES 1982).
Europe, Sibérie.
545. *Nigma hortensis* (SIMON, 1871)
Lit. : PO : Arles-sur-Tech (18),
Coustouges (18), St.-Laurent-
de-Cerdans (18).
France méridionale, Espagne, Algérie.
546. *Nigma puella* (SIMON, 1871)
Lit. : HP : Orédon (24).
PO : Coustouges (18), Prats-de-Mollo
(18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
CA : San Miguel del Fay (64).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll.MURPHY 1982).
Europe ouest et sud-ouest, Algérie.
547. *Nigma walckenaeri* (ROEWER, 1954)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
Europe, Afrique du Nord.
Nigma walckenaeri vulnerata SIMON, 1914
Lit. : BP : Aspe (97), Licq-Athérey (97),
St.-Jean-de-Luz (97).
PO : Banyuls (97).
Pyrénées, Bulgarie.
548. *Lathys humilis* (BLACKWALL, 1855)
Lit. : GE : Ribas de Freser (38).
AN : Sant Julia de Loria 1400m (22).
Europe, Asie
Lathys humilis meridionalis SIMON, 1878
Lit. : AN : Andorra la vella 1070-1090m (22).
Europe méridionale.
549. *Lathys narbonensis* (SIMON, 1876)
(Syn. : *Analtella brevitarsis* DENIS, 1947)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (23,97).
Midi de la France.
550. *Lathys serpustulata* (SIMON, 1878)
Lit. : BP : Aspe (97), La Rhône (97).
PO : St.-Laurent-de-Cerdans.
N.L. : PO : Prats-de-Mollo 1/- (5).
Midi de la France.
551. *Altella lucida* (SIMON, 1874)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (97).
Europe occidentale et centrale.
552. *Cicurina cicurea* (FABRICIUS, 1793)
Lit. : HP : Lac de la Mourèle - Lac de l'Oueilh
Nègre 2350m (31).
Europe, Japon.
553. *Cicurina raymondi* SIMON, 1916
Lit. : BP : Gabas (97), Larrau (97).
France, Italie.
554. *Chorizomma subterranea* SIMON, 1872
Lit. : BP : Aven Lucueille (34), Camou-Cihique
(34,50,51), Lescun (33), Ossas (34),
Rébénacq (34).
HP : Campan (50), Ilhet (34), La Pez
1350m (35), Rebouc (35).
HG : Arbas (35), Arbon (50), Espingo
1500-1550m (29), Gouffre Béguet
(51), Izaut (50) Juzet d'Izaut (51).
ARI : Mas d'Azil (34), Montrouch 1700-
1800m (35), Mont Valier 1300m (35),
Moulis (34), Quérigut (35), Riverert
(34), St.-Lary (35), Taurignan-
Vieux (34), Tourtouse (51), Tute de
Oulette (35).
GU : Arenzazu (38), Onate (38), Tolosa
(116), Cegama, Hernana (116).
NA : Larraun (116), Lecumberri (109),
Zarau (116).
N.L. : BP : Bidarray -/1 (13), Col d'Haltza
650m -/1 (12), Larrau 1050m 2/1
(17) 1750m 1/- (15).
France méridionale, Espagne.

555. *Desidiopsis racovitzae* FAGE, 1909
Lit. : PO : Banyuls (97).
Europe méridionale.
556. *Tetrilus arietinus* (THORELL, 1870)
Lit. : HP : Orédon 1860m (25).
HG : Boussens (42).
PO : Collioure (97).
Europe, Algérie.
- * 557. *Tetrilus lucifugus* SIMON, 1898
Lit. : PO : La Massan (97).
Pyrénées.
558. *Tetrilus macrophthalmus* (KULCZYNSKI, 1894)
Lit. : PO : La Preste (97).
Europe.

TITANOECIDAE

559. *Titanoeca monticola* (SIMON, 1870)
Lit. : PO (97).
Alpes, Pyrénées.
560. *Titanoeca nivalis* SIMON, 1874
Lit. : HP : Marcadou-Vignemale 2537-
2965m (27).
PO : Carlit 2250 - 2910m (26).
AN : Andorra la vella 2450-2475m
(22), Canillo 2570-2841m (22),
Casamanya 2680-2700m (22),
Pla de Claro 2600m (22).
Alpes, Pyrénées.
561. *Titanoeca obscura* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : HP : Orédon 1880-1950m (24).
ARI : Donnezan 1700m (36).
PO : Coumeille 1699m (18), Prats-
de-Mollo (18), Saint-Sauveux
1200m (18).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982).
Europe.
562. *Titanoeca praefica* (SIMON, 1870)
Lit. : PO (97).
Pyrénées, Espagne, Algérie.
563. *Titanoeca schineri* (L. KOCH, 1872)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
Palalda (18).
Europe méridionale.

AMAUROBIIDAE

564. *Amaurobius erberi* (KEYSERLING, 1863)
Lit. : PO : Banyuls (18).
GE : Ribas de Freser (38).
AN : Sant Julia de Loria (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/3 (31).
Europe méridionale, Afrique du Nord.
565. *Amaurobius fenestralis* (STROEM, 1768)
Lit. : HG : Aspet (57).
Europe.
566. *Amaurobius ferox* (WALCKENAER, 1825)
Lit. : BP : Sare (57).
PO : Banyuls (42), Prats-de-Mollo
(18), St.-Laurent-de-Cerdans
(18).
Europe, Amérique du Nord.

567. *Amaurobius occidentalis* SIMON, 1892
Lit. : BP : La Rhune (97).
CA (89).
Montagnes de France méridionale, Espagne et
Portugal.
568. *Amaurobius similis* (BLACKWALL, 1861)
Lit. : PO : Banyuls (18), Canigou 1300-2000m (42)
ARI : Tarascou (34).
AN : Encamp 1715m (22), Ordinio 1460m (22)
N.L. : PO : Col de Portus -/2 (49), Mas
Forges 750m (Coll. JONES 1982),
Prats-de-Mollo -/1 (94), Vernet-
les-Bains -/1 (33).
Europe.

OXYOPIIDAE

569. *Oxyopes carvajalli* FRANGANILLO, 1918
Lit. : NA : Javier (89).
Espagne.
570. *Oxyopes heterophthalmus* (LATREILLE, 1804)
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),
Mas Forges 800m -/1 (32), Vingrau
(Coll. MURPHY 1982).
Région paléarctique.
571. *Oxyopes lineatus* LATREILLE, 1806
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),
Vingrau (Coll. JONES 1982).
Région méditerranéenne.
572. *Oxyopes nigripalpis* KULCZYNSKI, 1875
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1983).
Région méditerranéenne.
573. *Oxyopes ramosus* (PANZER, 1804)
Lit. : PO : Montlouis (97).
Europe.

ANYPHAENIDAE

574. *Anyphaena accentuata* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : HG : Jouéou 1200m (28).
PO : Amélie (18), Coustouges (18),
Manyaques (18), Prats-de-Mollo (18),
St.-Laurent-de-Cerdans (18).
GE (64).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982),
Prats-de-Mollo 1/- (5).
Europe, Asie occidentale.
575. *Anyphaena alboirrorata* SIMON, 1878
Lit. : PO : Amélie (18), Bouches-du-Rhone (97),
Palalda (18).
France méridionale, Espagne.
576. *Anyphaena numida* SIMON, 1896
Lit. : PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech (18),
Banyuls (18, 97), La Preste (18).
France méridionale, Algérie.
577. *Anyphaena sabina* L. KOCH, 1866
Lit. : PO : Arles-sur-Tech (18), Banyuls (18),
Coustouges (18), Manyaques (18),
St.-Laurent-de-Cerdans (18).
GE : Martorell de la Selva (64).
Europe méridionale.

LIOCRANIDAE

578. *Trachelas minor* CAMBRIDGE, 1872
Lit. : PO : Palalda.
Europe méridionale, Afrique septentrionale et occidentale.
579. *Trachelas rayi* SIMON, 1878
N.L. : Cerdagne -/1 (3).
Europe sud-ouest.
580. *Agroeca inopina* *CAMBRIDGE, 1866
Lit. : ARI : Cirque de Mont Rouch (35).
PO : Amélie (97), Banyuls (97).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/2 (59).
Europe occidentale et centrale.
581. *Agroeca proxima* (CAMBRIDGE, 1871)
N.L. : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),
Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982).
Europe occidentale et centrale.
582. *Agroeca pullata* THORELL, 1875
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Europe, Turkestan.
583. *Scotina celans* (BLACKWALL, 1841)
Lit. : PO : Banyuls (18), Biert (42),
Céret (18), Prats-de-Mollo (18).
GE : Olot (38).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/1 (31).
Europe, Algérie.
584. *Scotina palliardi* (L.KOCH, 1881)
Lit. : PO : Banyuls (18).
Europe.
585. *Apostenus fuscus* WESTRING, 1851
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 800-850m (32).
Europe centrale et septentrionale
- * 586. *Apostenus humilis* SIMON, 1932
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18, 97),
Céret (97), Conat (97), Mas-
sane (97), Montbolo (18),
Palalda (18), La Preste (18).
Pyrénées.
- * 587. *Liocranum apertum* DENIS, 1960
Lit. : HP : Gorges de Clabaride 1330m (35).
Pyrénées.
588. *Liocranum rupicola* (WALCKENAER, 1825)
Lit. : PO : Amélie (18), Palalda (18).
Europe, Sibérie.
589. *Mesiotelus mauritanicus* SIMON, 1909
Lit. : PO : Banyuls (18), Massane (18),
Palalda (18).
Europe sud-ouest et Afrique nord-ouest.
- Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Loudenvielle 975m (35), Orédon
1900m (24).
PO : Amélie (18), Palalda (18),
Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent
de-Cerdans (18).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/1 (59), Mas
Forges 750m (Coll. JONES 1982),
Col de Jou 1125m (Coll. JONES
1982), Mas Forges 750m 2/2
(31).
Europe, Afrique du Nord.
591. *Phrurolithus flavitarsis* (LUCAS, 1846)
Lit. : PO : Banyuls (18), Valce Bolère
(35).
Europe méridionale, Algérie.
592. *Phrurolithus minimus* C.L.KOCH, 1839
Lit. : BP : Lescun 1400m (33).
HP : Louron 1200m (35).
ARI : Le Bou (42), Donnezan 1350m
(36).
PO : Capcir (36), Vallespir (18).
Europe occidentale, septentrionale et
centrale.
593. *Phrurolithus nigrinus* (SIMON, 1878)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1370-2070m (32).
ARI : Donnezan 1220-1200m (36).
PO : Massane (18), Vallespir (18).
AN : Encamp 1480-1830m (22), Ordino
1450-1500m (22), Sant Julia
de Loria 1080-1400m (22).
N.L. : PO : Banyuls 1/3 (40), Col de Jou
1125m (Coll. MURPHY 1982),
Col de Mentet 1600m 3/1 (50),
Mas Forges 750m -/1 (31),
Vernet-les-Bains -/1 (44).
Europe centrale.
594. *Clubiona brevipes* BLACKWALL, 1841
Lit. : PO : Manyaques (18), Palalda (18),
GE (64).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll.
MURPHY 1982).
Europe.
595. *Clubiona coerulescens* L.KOCH, 1866
Lit. : Pyrénées (97).
PO : Amélie (18).
Europe, Sibérie.
596. *Clubiona compta* C.L.KOCH, 1839
Lit. : BP : Sare 400-600m (28).
ARI : Suc (35).
PO : Coustouges (18), Manyaques (18),
Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-
de-Cerdans (18), Tour de Mir (18).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982)
Europe, Afrique du Nord.
597. *Clubiona corticalis* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech (18),
Palalda (18), Prats-de-
Mollo (18).
Europe.
598. *Clubiona diniensis* SIMON, 1878
Lit. : PO : Collioure (97), Prats-de-Mollo
(97).
CA (89).
Montagnes de France et d'Espagne.

CLUBIONIDAE

590. *Phrurolithus festivus* (C.L.KOCH, 1835)

599. *Clubiona diversa* (CAMBRIDGE, 1862)
Lit. : HP : Orédon 2380m (25).
N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58).
Europe.
600. *Clubiona germanica* THORELL, 1870
Lit. : BP : Pau (97), St.-Christau (97),
St.-Jean-de-Luz (97).
HG : Saint-Béat (119).
PO : Prats-de-Mollo (18).
Europe, Sibérie.
601. *Clubiona frutetorum* L.KOCH, 1867
Lit. : PO : Le Tech (97).
Europe.
602. *Clubiona leucaspis* SIMON, 1932
Lit. : PO : St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Europe sud-ouest.
603. *Clubiona neglecta* CAMBRIDGE 1861
Lit. : HP : Orédon 1850m (24).
ARI : Donnezan 1240-1800m (36).
PO : Capcir 1600m (36), Prats-de-
Mollo (18).
AN : Andorra la vella 1710m (22),
Sant Julia de Loria 900m (22).
Europe, Sibérie.
604. *Clubiona pallidula* (CLERCK, 1757)
Lit. : CA : Corvera (64).
GE : Cerdana espanola (64).
Europe, Sibérie.
605. *Clubiona reclusa* CAMBRIDGE, 1863
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32).
HP : La Pez 1500m (35).
ARI : Donnezan 1650-1876m (36).
PO : La Preste (18).
Europe, Sibérie.
606. *Clubiona similis* L.KOCH, 1866
Lit. : PO : Carlit 2120-2270m (26).
Palau del Vidre (18.97). Prats-
de-Mollo.
AN : Sant Julia de Loria 1080m (22).
Europe.
607. *Clubiona subtilis* L.KOCH, 1866
Lit. : HP : Orédon 1950m (24).
Europe occidentale et centrale.
608. *Clubiona terrestris* WESTRING, 1851
Lit. : ARI : Moulis (42).
PO : Manvagues (18). Prats-de-Mollo
(18).
AN : Sant Julia de Loria 1100m (22).
GE : Arbucias (64).
N.L. : PO : Col de Jau 1500m -/1 (30),
Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
Europe.
609. *Clubiona vegeta* SIMON, 1918
Lit. : PO : Banyuls (18), St.-Laurent-
de-Cerdans (18).
N.L. : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
Europe sud-ouest, Algérie.
610. *Chiracanthium erraticum* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1550m (32).
PO : Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Mas Forges 800m 1/1 (32).
Région paléarctique.
611. *Chiracanthium mildei* L.KOCH, 1864
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
Collioure (18), Manyagues (18),
St.-Laurent-de-Cerdans (18).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES
1982), Vingrau (Coll. MURPHY
1982).
Région méditerranéenne
612. *Chiracanthium pelasgicum* (C.L.KOCH, 1837)
Lit. : PO : Arles-sur-Tech (18), Prats-
de-Mollo (18).
GE : Arbucias (64).
Région méditerranéenne.
613. *Chiracanthium pennatum* SIMON, 1878
Lit. : PO : St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Midi de la France, Corse.
614. *Chiracanthium punctuorum* (VILLIERS, 1789)
Lit. : ARI : Donnezan 1240m (36).
PO : Saint-Cyprien (42).
GE : Arbucias (64), Caldas de
Malavella (64).
AN : Canillo 2030m (22).
Europe, Turkestan.
615. *Chiracanthium virescens* (SUNDEVALL, 1831)
N.L. : PO : Canigou 2000m -/1 (55).
Europe, Sibérie.

GNAPHOSIDAE

- * 616. *Drassodes andorranus* DENIS, 1937
Lit. PO : Carlit 2120m (26).
AN : Canillo 1785m (18), Encamp 1980m
(18).
Pyrénées.
- * 617. *Drassodes cervinus* SIMON, 1914
Lit. : PO : Céret (97), Coustouges (18),
St.-Laurent-de-Cerdans (18),
Velmanya (97).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/- (31)
Pyrénées.
618. *Drassodes cupreus* (BLACKWALL, 1834)
N.L. : PO : Col de Jau 1125m (Coll.
JONES 1982), Mas Forges 750m
1/- (31).
Europe occidentale et centrale.
- * 619. *Drassodes frutillifer* SIMON, 1914
Lit. : PO : Cap Céris (97).
Pyrénées.
620. *Drassodes fugax* (SIMON, 1878)
Lit. : BP : Col de Palas 2450m (35), Eaux-
Bonnes 1750-2200m (32).
HP : Pic Badet 3160m (31), Lac de Coume
Estrête 2794m (31), Pentes
d'Estiouère 2100-2840m (35),
Marcadou-Vignemale 1730-3000m
(27), Pic Hourgade 2965m (29), Lac
de la Mourèle 2764m (31), Turon
de Néouvielle 3031m (31), Lacs
de Nère 2386-2430m (35), Orédon
1800-2550m (24,25), La Soula
1750m (35), Pic de Spyeoles
3000m (29).
HG : Espingo 2250-3050m (29).
ARI : Donnezan 1700m (36), Haut
Videssos 2400m (42).
PO : Canigou 1300-2100m (97), Carlit
2020-2350m (26).
AN : Andorra la vella 2070m (22), Casa-
manya 2680-2690m (22), Encamp
1980-2350m (22), La Massana
2070m (22).
Alpes, Pyrénées.

621. *Drassodes hispanus* (L. KOCH, 1866)
Lit. : PO : Canigou (97).
Montagnes d'Espagne, France et Suisse.
622. *Drassodes hypocrita* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Banyuls (18), Coustouges (18), Montues (18), Prats-de-Mollo (18).
Europe méridionale.
623. *Drassodes lapidosus* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Lescun 1400m (33).
HG : Espingo 1880-2100m (29).
ARI : Donnezan 1200-2500m (36).
PO : Banyuls (18,42), Canigou 2100m (42), Capcir (36), Carlit 2140-2250m (25), Palalda (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), Tour-de-Carol (18), Tour de Mir (18).
HP : Cirque de l'Esparragne 2200m (119), Orédon 1700m (119).
AN : Encamp 1900m (22), Sant Julia de Loria 1000-1250m (22).
HU : Biescas (109).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982) 2000m -/1 (55), Col de Portus 1/- (46), Mas Forges 750m 1/- (31), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982).
Région paléarctique.
- Drassodes lapidosus bidens* (SIMON, 1878)
Lit. : Pyrénées (97).
N.L. : PO : Canigou 1750m 1/- (56) 2200m 1/- (54), Col de Mentet 1600m 1/- (50), Col de Portus 1/- (46), Mas Forges 750m 2/- (31), Vernet-les-Bains -/1 (33).
Alpes, Pyrénées.
624. *Drassodes luteomicans* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97), Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Iles sur Têt (Coll. MURPHY 1982).
Europe méridionale.
625. *Drassodes lutescens* (C.L. KOCH, 1939)
Lit. : PO : Collioure (18), régions méditerranéenne (97).
Europe méridionale.
626. *Drassodes pubescens* (THORELL, 1856)
Lit. : HP : Orédon 1880-1920m (24).
ARI : Donnezan 1200-1300m (36).
PO : Capcir 1550m (36), Pla de l'Espinasse (18), Prats-de-Mollo (18).
AN : La Massana 1630-1660m (22), Ordinio 1580m (22).
N.L. : PO : Canigou 1250m 2/1 (58) 2200m -/1 (37), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Col de Portus -/2 (47), Mas Forges 750m -/2 (31) 800m -/1 (32), Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982), Prats-de-Mollo 1/- (5).
Europe.
627. *Drassodes rubidus* (SIMON, 1878)
Lit. PO : Canigou (97).
Europe sud-ouest.
628. *Drassodes villosus* (THORELL, 1856)
Lit. : Pyrénées (97).
Europe septentrionale, centrale et orientale, Sibérie.
629. *Drassodes vinosus* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Carlet 2117-2430m (26).
AN : Canillo 2300-2760m (22), Casamanya 2370m (22), Encamp 2435m (22).
Alpes, Pyrénées.
630. *Haplodrassus concertor* (SIMON, 1878)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1370-2070m (32).
HP : Aubert 2150m (35), Aumar 2192m (35), Marcadau-Vignemale 1780-2965m (27), Néouvielle 3031m (29), Orédon 1950-2350m (24).
HG : Espingo 2848m (29).
ARI : Donnezan 2000m (36).
PO : Lac de Lanoux (42).
AN : Andorra la vella 2100-2260m (22), Casamanya 2600m (22), Encamp 1500m (22), La Massana 2340m (22), Ordinio 1450m (22).
N.L. : PO : Canigou 1750m 1/- (56) 2000m 21/8 (55) 2200m 17/4 (54) 2200m -/1 (37), Col de Mentet 1900m -/1 (52).
Pyrénées, Puy-de-Dôme.
631. *Haplodrassus dalmatensis* (L. KOCH, 1866)
Lit. : PO : Coustouges (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Europe.
632. *Haplodrassus macellinus* (THORELL, 1871)
Lit. : PO : Banyuls (18), Collioure (18), Pla de l'Espinasse (18), Puy-Ferreol (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18), Serre de Montues (18).
N.L. : PO : 750m 1/- (59).
Europe sud-ouest.
633. *Haplodrassus severus* (C.L. KOCH, 1939)
Lit. : PO : Banyuls (18), Cap Cerbère (18), Collioure (18), Massane (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Région méditerranéenne.
634. *Haplodrassus signifer* (C.L. KOCH, 1839)
Lit. : HG : Espingo 1880-1980m (29).
ARI : Donnezan 1250-1800m (36).
PO : Amélie (18), Carlit 2020m (26), Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Col de Mentet 1600m 1/1 (50), Col de Portus 1/- (46), Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982), Montlouis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
Région paléarctique.
635. *Haplodrassus silvestris* (BLACKWALL, 1833)
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982), Col de Jau 1500m -/1 (30).
Europe occidentale, septentrionale et centrale.
636. *Haplodrassus umbratilis* (L. KOCH, 1866)
Lit. PO : Capcir (36), Carlit 2120m (26).
Europe.
637. *Leptodrassus albidus* SIMON, 1914
Lit. : PO : Banyuls (97).
Europe sud-ouest.

633. *Leptodrassus simoni* DALMAS, 1919
Lit. : BP : Urdos
Europe sud-ouest.
639. *Phaeocedus braccatus* (L.KOCH, 1866)
Lit. : BP : Lescun (33).
PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech (18),
Collioure (18), Prats-de-Mollo
(18), Roc St.-Sauveur. 1200m et plus
haut (18), St.-Laurent-de-
Cerdans (18).
AN : Encamp 1725m (22), Ordino 1450m
(22).
Europe.
Phaeocedus braccatus jugorum SIMON, 1914
Lit. : PO : Canigou 2500m.
Pyrénées.
- * 640. *Herpyllus aculeatus* (SIMON, 1914)
Lit. : HP (97).
Pyrénées.
641. *Herpyllus blackwalli* (THORELL, 1873)
Lit. : BP : Caraibié (42), Ordcarp
(42).
Europe.
642. *Herpyllus loricatus* (L.KOCH, 1866)
Lit. : BP : la Rhûne (97).
Région paléarctique.
643. *Herpyllus musculus* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Banyuls.
France méridionale, Madeira.
644. *Herpyllus validus* (LUCAS, 1846)
Lit. : HP : Héas-Estaubé 1300m (35).
PO : Arles-sur-Tech (18), Palalda
(18), Rousillon-Vallespir (35).
Région ouest-méditerranéenne.
645. *Zelotes apricorum* (L.KOCH, 1876)
N.L. : PO : Canigou 1750m 1/3 (56) 2000m
-/1 (38), Col de Jau 1500m
-/1 (30), Col de Jou 1125m
(Coll.MURPHY 1982).
Europe occidentale et centrale.
646. *Zelotes carmeli* (CAMBRIDGE, 1872)
Lit. : PO : Banyuls (73).
Europe méridionale.
647. *Zelotes circumspectus* (SIMON, 1878)
N.L. : BP : Larrau 1750m -/1 (15).
Europe méridionale.
648. *Zelotes civicus* (SIMON, 1878)
Lit. : HP (97).
PO : Prats-de-Mollo (64).
LE : Pic d'Erille 1400-1550m (39).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY
1982), Col de Jou 1125m (Coll.
MURPHY 1982), Mas Forges 750m
1/1 (31).
Europe ouest-méridionale, Suisse.
649. *Zelotes cyanescens* SIMON, 1914
Lit. : HP : Pic du Mide de Bagnères (97).
PO : Canigou (97).
Alpes, Pyrénées.
- * 650. *Zelotes donnezanus* DENIS, 1961
(= *Z. cyanescens* SIMON ?)
Lit. : ARI : Donnezan 1876m (36).
Pyrénées.
- * 651. *Zelotes egregius* SIMON, 1914
Lit. : PO : Canigou (97), Velmanya (97).
AN : Sant Julia de Loria 1000m
(22).
Pyrénées.
652. *Zelotes electus* (C.L.KOCH, 1839)
Lit. : Pyrénées (97).
PO : Pic de Coumeille (18), Prats-
de-Mollo (18).
Europè.
653. *Zelotes fulvopilosus* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Banyuls (18).
AN : La Massana 1360m (22), Ordino
1450-1840m (22).
Europe sud-ouest.
654. *Zelotes gallicus* (SIMON, 1914)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Marcadau-Vignemale 1900-2660m (27),
Lac de Nère 2386m (35).
HG : Espingo 1510-2625m (29).
PO : Amélie (73), Canigou (97),
Montlouis (97), Pla de l'
Espinasse (73), Prats-de-Mollo
(73), La Preste (73,97), St.-
Laurent-de-Cerdans (73), Sorède
(97).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/1 (59) 1250m
1/- (58), Mas Forges 750m -/1
(31) 800m -/1 (32).
Europe méridionale et centrale.
655. *Zelotes holosericeus* (SIMON, 1878)
Lit. : HG : Espingo 1880-1980m (29).
PO (97).
France, Espagne, Portugal.
656. *Zelotes labilis* SIMON, 1914
Lit. : PO : Massane (97).
France (Pyrénées, Var).
657. *Zelotes latreillei* (SIMON, 1878)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2070m (32),
Lescun (33).
HP : Orédon 1860-1950m (24,25).
PO : Prats-de-Mollo (18), Vernet
(73).
AN : Canillo 1820m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/2 (31),
Prats-de-Mollo -/1 (5).
Europe.
- * 658. *Zelotes longestylus* SIMON, 1914
Lit. : BP : St.-Jean-de-Luz (97).
Pyrénées.
659. *Zelotes longipes* (L.KOCH, 1867)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1550-2070m (32).
HP : Marcadau-Vignemale 1860-2793m
(27).
PO : Banyuls (18), Collioure (18).
Europe centrale et méridionale, Sibérie.
- * 660. *Zelotes Louronensis* DENIS, 1960
(= *Z. apricorum* (L.KOCH)?)
Lit. : HP : Lespitau 1400m (35).
Pyrénées.

661. *Zelotes lutetianus* (L.KOCH, 1867)
Lit. : ARI : Donnezan 1300m (36),
Quévigut (74).
Europe occidentale, centrale et
méridionale.
662. *Zelotes manius* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
Europe méridionale.
663. *Zelotes medianus* DENIS, 1935
N.L. : PO : Canigou 750m (Coll.
MURPHY 1982), Iles-sur-Têt
(Coll. JONES 1982), Vingrau
(Coll. MURPHY 1982).
France méridionale.
664. *Zelotes petrensis* (C.L.KOCH, 1839)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Lourdes (74), Orédon 1900m (25).
HG : Marsoulas (74), Vallée de l'Oueil
1100m (74).
PO : Vernet (74).
AN : Andorra la vella 1750m (22),
Encamp 1660m (22).
Europe occidentale et centrale.
665. *Zelotes praeficus* (L.KOCH, 1860)
Lit. : HP : Gave d'Héas 1300m (31).
ARI : Donnezan 1200m (36), Sougarade
1200m (74).
PO : Amélie (18), Banyuls (18), Massane
(18), Prats-de-Mollo (18), La
Preste (18).
AN : Andorra la vella 1860m (22), La
Massana 1300m (22), Ordino 1450m
(22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/- (59),
Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982),
Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982),
Col de Mentet 1600m 1/1 (50).
Europe, Turkestan.
666. *Zelotes pusillus* (C.L.KOCH, 1833)
Lit. : BP : Lescun 1400m (33).
PO : Canigou (74).
Europe.
667. *Zelotes reconditus* SIMON, 1914
Lit. : HG : Midi de Bigorre (74),
Venasque (74).
PO : Arles-sur-Tech (18), Banyuls (97),
Canigou (97), Carlit 2340-2350m
(26), La Preste (18, 97).
N.L. : HU : Col d'Haltna 650m -/1 (12).
Europe alpine (Alpes, Pyrénées).
Zelotes reconditus mediocris SIMON, 1914
Lit. : HP : Bagnères de Bigorre (97), Orédon
1850-2350m (24, 25).
Pyrénées.
668. *Zelotes rubicundulus* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : Banyuls (73), Port Bou (73).
Europe méridionale.
669. *Zelotes ruscinensis* SIMON, 1914
Lit. : PO : Abbeilles (97), Banyuls (97).
Europe ouest-méridionale (France, Espagne).
670. *Zelotes rusticus* (PAVESI, 1873)
Lit. : GE : Cerdana espanola (64).
Europe, Asie.
671. *Zelotes serotinus* (L.KOCH, 1867)
Lit. : HP : Orédon 1880-1920m (24).
ARI : Donnezan 1250m (36).
PO : Amélie (18), Coustouces (18),
Tour de Mir 1500m (18),
Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-
de-Cerdans (18), Serre-de-
Montnes (18).
AN : Encamp 1900m (22).
Europe, Asie.
- * 672. *Zelotes silvicola* DENIS, 1961
(= *Z. cyanescens* SIMON ?)
Lit. : PO : Capcir 1680m (36).
N.L. : PO : MontLouis 1600m (Coll. MURPHY
1982).
Pyrénées.
673. *Zelotes subterraneus* (C.L.KOCH, 1833)
Lit. : BP : Lescun 2309m (33).
HP : Coume Estrète 2764m (31), Estaubé
2300m (35), Marcadau-Vignemale
2250m (27), Néouvielle 3031m
(31), Lac de Nère inférieur
2386m (35), Orédon 1840-1950m
(24, 119).
HG : Esquierry 1900m (73), Vénasque
1500m (73).
ARI : Cabouie (73), Donnezan 1250-
1800m (36), Paillières (73),
Quérigut (73).
PO : Carlit 2020m (26), Tour de Mir
1500m (18), Prats-de-Mollo (18).
AN : Canillo 1860m.
Europe centrale, occidentale et septentrionale
Une confusion avec *Z. apricorum* est fort
possible, puisque toutes les récoltes
récentes se rapportaient à cette
espèce (voir no. 645).
674. *Zelotes thorelli* SIMON, 1914
Lit. : PO : Banyuls (73), Collioure (73),
Massane (73), Montalba (73),
Palalda (73), Le Tech (73),
Prats-de-Mollo (73).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY
1982), Iles-sur-Têt (Coll.
MURPHY 1982), Vernet-les-Bains
-/1 (34).
Europe méridionale.
675. *Gnaphosa alacris* SIMON, 1878
Lit. : PO : Collioure (97).
AN : Canillo 1820m (22), Encamp
1980m (22).
Europe méridionale.
676. *Gnaphosa atramentaria* SIMON, 1878
Lit. : HP : Cirque de l'Estarragne (119),
Col de Coume Estrète 2764m
(31), Pic Long 3100-3190m
(31), Marcadau-Vignemale 2700-
3000m (27), Neouvielle 3000-
3100m (31), Pic du Midi de
Bigorre (97), Orédon 2200-
2300m (24).
HG : Espingo 2650-2850m (29).
Alpes, Pyrénées.
677. *Gnaphosa badia* (L.KOCH, 1866)
Lit. : AN : Encamp 1830-2450m (22).
Alpes, Pyrénées.
- * 678. *Gnaphosa iberica* SIMON, 1878
Lit. : PO : Canigou 2600m (42), Carlit
(97), Lanoux (42).
AN : Canillo 2500-2841m (22),
Casamanya 2550-2680m (22),
Encamp 1840m (22), Ordino
2350m (22).
Pyrénées.

- * 679. *Gnaphosa inconspicua* SIMON, 1878
Lit. : Pyrénées orientales et centrales.
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982), (97).
Pyrénées.
680. *Gnaphosa leporina* (L. KOCH, 1866)
Lit. : ARI : Donnezan 2000m (36).
PO : Carlit 2200-2300m (26).
AN : Andorra la vella 2450-2600m (22),
Canillo 2310-2820m (22), Ordino 2350m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982), Canigou 2000m 5/1 (55).
Europe.
681. *Gnaphosa lucifuga* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Capcir (36), Vernet-les-Bains (36).
Europe.
682. *Gnaphosa lugubris* (C.L. KOCH, 1839)
Lit. : PO : Carlit 2020-2910m (26).
AN : Encamp 2400m (22).
Europe.
683. *Gnaphosa occidentalis* SIMON, 1878
N.L. : PO : Puigmale d'Err 2200-2400m -/1 (2).
France, Angleterre.
- * 684. *Gnaphosa secreta* SIMON, 1878
Lit. : PO : Vernet (97).
Pyrénées.
685. *Gnaphosa tetrica* SIMON, 1878
Lit. : PO (97).
Europe méridionale.
686. *Gnaphosa tigrina* SIMON, 1878
Lit. : BP : Lescun 2309m (33).
HP : Badet 2909m (31).
PO : Banyuls (97), Céret (97),
Massane (97).
Alpes, Pyrénées.
687. *Aphantaulax seminigra* SIMON, 1878
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
Palalda (18).
GE : Amer (64), Arbuscias (64).
Région méditerranéenne.
688. *Poecilochroa albomaculata* (LUCAS, 1846)
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Cer-
bère (18), Massane (18), St.-
Laurent-de-Cerdans (18).
CA : San Miguel del Fay (64).
Région méditerranéenne.
689. *Poecilochroa dimidiata auspex* (SIMON, 1878)
Lit. : PO : La côte (18,97).
Région ouest-méditerranéenne.
690. *Poecilochroa variana* (C.L. KOCH, 1839)
Lit. : HP : Orédon 1900m (24), La Soula 1750m (35).
PO : Amélie (18), Montalba (18),
Palalda (18), Prats-de-Mollo (18).
AN : Encamp 1650m (22), La Massana 1630-1730m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),
Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982),
Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982).
Europe, Turkestan.
691. *Callilepis nocturna* (LINNE, 1758)
Lit. : BP : Lescun 1400-2200m (33).
HP : Lac de Coume Escure 2165m (31),
Gave d'Héas 1300m (31), Orédon 2220m (24).
PO : Banyuls (18), Carlit 2020-2200m (26),
Tour de Mir 1500m (18), La Preste (18),
St.-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : La Massane 2340m (22), Sant Julia de Loria 1200m (22).
N.L. : PO : Canigou 2200m 1/- (54).
Europe.
692. *Callilepis concolor* SIMON, 1914
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. Murphy, 1982),
Mas Forges 750m 2/- (59).
Europe méridionale (France, Portugal, Rhodos)
693. *Callilepis schusztleri* (HERMAN, 1879)
Lit. : PO : Vernet-les-Bains (86).
Région paléarctique.
694. *Nomisia aussereri* (L. KOCH, 1873)
Lit. : PO : Banyuls (42), Collioure (18).
Région méditerranéenne.
695. *Nomisia celerrima* (SIMON, 1914)
Lit. : AN : Encamp (22), Sant Julia de Loria 1000-1500m (22).
N.L. : PO : Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982).
Midi de la France.
696. *Nomisia exornata* (C.L. KOCH, 1839)
Lit. : PO : Banyuls (98), Collioure (18).
Région méditerranéenne.
697. *Nomisia perpusilla* DALMAS, 1921
Lit. : CA (89).
Europe sud-ouest.
698. *Berlandina cinerea* (MENGE, 1872)
Lit. : AN : Casamanya 2310m (22).
Europe centrale.
699. *Micaria aenea* THORELL, 1871
(Syn. : *M. vandeli* DENIS)
Lit. : HP : Orédon 1900m (24,31,107).
N.L. : PO : Canigou 2200m 2/- (54).
Europe boréo-alpine.
700. *Misaria dives* (LUCAS, 1846)
Lit. : PO : Banyuls (97), Montbolo (18).
Europe centrale et méridionale.
701. *Micaria formicaria* (SUNDEVALL, 1832)
Lit. : BP : Lescun (33), St.-Jean-de-Luz (97).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
ARI : Riu de Sentenac (35).
PO : Capcir (36), Palau-del-Vidre (97).
Europe, Asie, Afrique du Nord.
702. *Micaria fulgens* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 1780m (27),
Orédon 1860m (24).
ARI : Suc (35).
PO : Capcir (36), Montlouis (97).
AN : La Massane 1630m (22).
N.L. : PO : Canigou 1250m 7/1 (58) 1500m 3/3 (57),
Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982).
Europe, Afrique du Nord, Asie.

703. *Micaria guttigera* SIMON, 1878
 Lit. : HP : Pla de Nabias 1410m (35).
 PO : Amélie (18), Banyuls (18,97),
 Canigou (97), Collioure (18,
 97), Massane (18,97), Prats-
 de-Mollo (18), La Preste (18,97),
 St.-Laurent-de-Cerdans (18),
 Le Tech (18), Tour de Mir (18).
 AN : Sant Julia de Loria 1000-1080m
 (22).
 N.L. : PO : Canigou 1250m 3/2 (58).
 Europe méridionale.
704. *Micaria guttulata* (C.L.KOCH, 1839)
 Lit. : BP : St.-Jean de Luz (97).
 HP : Marcadau-Vignemale 1860-2250m (27),
 Orédon 1860m (22).
 PO : Carlit 2430m (26), Montlouis (97).
 Europe centrale et méridionale.
705. *Micaria pulicaria* (SUNDEVALL, 1832)
 Lit. : HP : Orédon 2230m (24).
 ARI : Donnezan 1876m (36).
 PO : Carlit 2309m (26).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982).
 HU : Selva de Oza 1200m 1/- (24).
 Europe, Asie.
706. *Micaria scintillans* (CAMBRIDGE, 1871)
 Lit. : PO : Banyuls (97), Canigou (97),
 Montlouis (97).
 AN : Ordino 1981m (22).
 Europe méridionale, centrale et orientale.
707. *Micaria smaragdula* SIMON, 1878
 Lit. : PO : Velmanya (97).
 Europe méridionale, Suisse, Hongrie.

ZORIDAE

708. *Zora armillata* SIMON, 1878
 Lit. : ARI : Suc (35).
 PO : Palau del Vidre (97).
 Europe occidentale.
709. *Zora manicata* SIMON, 1878
 Lit. : HP : Orédon 1860-1950m (24).
 ARI : Pic d'Engral 1300m (35).
 PO : Canigou (97), Col de la
 Nantil (18), Eyve (97),
 Montlouis (97), Prats-de-
 Mollo (18), La Preste (18),
 St.-Sauveur (18).
 AN : La Massana 1630-1660m (22).
 N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll.
 MURPHY 1982).
 Europe centrale.
710. *Zora nemoralis* (BLACKWALL, 1861)
 Lit. : ARI : Biert (42), Tarascon (42).
 AN : Ordino 1475m (22).
 N.L. : PO : Montlouis 1750m 1/- (60).
 Europe occidentale et centrale.
711. *Zora parallela* SIMON, 1878
 Lit. : PO : Amélie (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 800m 1/2 (32),
 Col de Jou 1125m (Coll.
 MURPHY 1982).
 HU : Jaca 750m -/1 (28).
 Europe.

712. *Zora pardalis* SIMON 1878
 Lit. : PO : St.-Laurent-de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY
 1982), Fillols 850m -/1 (44).
 Europe méridionale.
713. *Zora spinimana* (SUNDEVALL, 1833)
 Lit. : BP : Jatxou (28), Lescun (33).
 ARI : Donnezan 1200m (36), Lacave (42).
 PO : Amélie (18), Palalda (18),
 Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-
 de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m 2/- (59) 1250m
 2/1 (58) 1500m 1/- (57), Col
 de Mentet 1600m -/1 (50),
 Fillols 850m 2/- (44).
 HU : San Juan de la Pena 1200m -/2
 (22).
 Région paléarctique.
714. *Zoropsis media* SIMON, 1878
 Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18).
 N.L. : PO : Banyuls -/1 (41), Mas Forges
 750m 2/- (59) et Coll. MURPHY 1932).
 Région ouest-méditerranéenne.
715. *Zoropsis spinimana* (DUFOUR, 1820)
 Lit. : PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech
 (18), Banyuls (18), Massana
 (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/- (31, et
 Coll. JONES 1982).
 Région méditerranéenne.

EUSPARASSIDAE

716. *Eusparassus dufouri* SIMON, 1932
 Lit. : GE (64).
 Région méditerranéenne.
717. *Olios argelasius* (WALCKENAER, 1806)
 Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18),
 Le Tech (18).
 GE : Amer (64), Arbucias (64).
 Région méditerranéenne.
718. *Micrommata ligurina* (C.L.KOCH, 1845)
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 Région méditerranéenne.
719. *Micrommata virescens* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Gave d'Héas 1300m (32), Orédon
 1850m (24).
 ARI : Donnezan 1876m (36), Suc (35).
 PO : Banyuls (42), Capcir (36),
 Prats-de-Mollo (18).
 AN : Canillo 1825-1850m (22), Encamp
 1515-1715m (22), Ordino 1440m (22),
 Sant Julia de Loria 1000m (22).
 N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58), Mont-
 louis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
 Région paléarctique.

PHILODROMIDAE

720. *Philodromus aureolus* (CLERCK, 1757)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Marcadau-Vignemale 1860m (24).
 PO : Banyuls 494m (39), Banyuls-Vallespir (18), Capcir (36).
 GE : Arbucias (64).
 AN : Encamp 1240m (22), Ordino 1475m (22).
 N.L. : PO : Banyuls 3/- (42), Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982), Mas Forges 750m 1/- (31) 800m -/2 (32), Vingrau (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique, Amérique du Nord.
721. *Philodromus buri* SIMON, 1884
 Lit. : HP : Loudenvielle 965m (35).
 Europe centrale, méridionale et orientale.
722. *Philodromus cespitum* WALCKENAER, 1825
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982), Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982), Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982), Vingrau (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique.
723. *Philodromus collinus* C.L. KOCH, 1835
 Lit. : ARI : Donnezan 1240m (36).
 PO : Capcir (36).
 AN : Encamp 1715-1840m (22), Sant Julia de Loria 1400m (22).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982).
 Europe, Transcaucasie.
724. *Philodromus corticinus* C.L. KOCH, 1837
 Lit. : AN : Sant Julia de Loria 1100m (22).
 Montagnes de France, Allemagne et Suisse.
725. *Philodromus dispar* WALCKENAER, 1825
 Lit. : PO : Amélie (18), Coustouges (18), Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18), La Preste (18), St.-Laurent de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/- (59), Mas Forges (Coll. JONES 1982), Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982), Col de Jau 1500m -/1 (30), Col de Portus -/1 (49), Mas Forges 800m 1/- (32).
 Europe, Transcaucasie.
726. *Philodromus emarginatus* (SCHRANK, 1803)
 Lit. : HP : Gavarnie (31), Carrot de Sentinelle 1710m (31), Marcadau-Vignemale 1860m (27), Orédon 1850-1900m (24).
 PO : Amélie (18), Arles-sur-Tech (18), Capcir (36), Coustouges (18), Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent de-Cerdans (18).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique.
727. *Philodromus fuscomarginatus* (DE GEER, 1778)
 Lit. : AN : Encamp 1715m (22).
 Europe centrale et septentrionale, Sibérie.
728. *Philodromus margaritatus* (CLERCK, 1757)
 Lit. : PO : Massane (18).
 Région paléarctique.
729. *Philodromus parietalis* SIMON, 1875
 Lit. : PO : Conat (97), Le Vernet (97).
 Europe sud-ouest.
730. *Philodromus pulchellus* LUCAS, 1846
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 Région méditerranéenne occidentale.
731. *Philodromus ruficapillus* SIMON, 1885
 Lit. : PO : Banyuls (97).
 N.L. : PO : Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
 Midi de la France, Tunisie.
732. *Philodromus rufus* WALCKENAER, 1825
 Lit. : GE : Arbucias (64).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Région paléarctique et néarctique.
Philodromus rufus virescens SIMON, 1932
 Lit. : PO : Banyuls-sur-Mer (97).
 Pyrénées.
733. *Philodromus vagulus* SIMON, 1875
 Lit. : HP : Carrot de Sentinelle 1710m (31), Gavarnie (31), Marcadau-Vignemale 1740-2020m (27), Orédon 1850-1950m (24, 119).
 PO : Canigou (97), Carlit 1950-2190m (26), Montlouis (97).
 Europe alpine (Pyrénées, Alpes, Carpates).
734. *Thanatus albicans* FRANGANILLO, 1918
 Lit. : HU (89).
 Espagne.
735. *Thanatus alpinus* KULCZYNSKI, 1887
 Lit. : PO : Canigou (97).
 Alpes, Pyrénées.
- * 736. *Thanatus dissimilis* DENIS 1960
 Lit. : HP : Lespitau 1400m (35).
 Pyrénées.
737. *Thanatus formicinus* (CLERCK, 1757)
 Lit. : PO : Capcir (36).
 AN : Casamanya 1680m (22), La Massana 2340m (22).
 N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique et néarctique.
738. *Thanatus jugorum* SIMON, 1916
 Lit. : BP : Eaux-Bonnès 2020m (32)
 HP : Pic du Midi (97).
 PO : Canigou, à grandes altitudes (97)
 AN : Encamp 1930m (22).
 Pyrénées, Espagne.
739. *Thanatus lineatipes* SIMON, 1870
 Lit. : BP (97).
 Europe méridionale.
740. *Thanatus arenarius* THORELL, 1872.
 Lit. : PO : Banyuls (18).
 GE (64).
 Europe, Turkestan.
741. *Thanatus strabus* C.L. KOCH, 1845
 Lit. : BP : Biarritz (97).
 N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll. JONES 1982).
 Région paléarctique et néarctique.

742. *Thanatus vulgaris* SIMON, 1870
Lit. AN : Encamp 1320m (22), Sant Julia de Loria 1050m (22).
Région méditerranéenne.
Thanatus vulgaris atratus (SIMON, 1875)
Lit. : PO : Canigou (97).
Pyrénées, Alpes.
Thanatus vulgaris major SIMON, 1870
Lit. : PO : Banyuls (18).
Région méditerranéenne.
743. *Titellus oblongus* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Amélie (18), Serre-de-Monties (18).
CA : San Miguel del Fay (64).
Région paléarctique et néarctique.
- THOMISIDAE**
744. *Emarus piger* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Amélie (18), Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18), Le Tech (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
GE : Martorell de la Selva (64).
Europe centrale et méridionale, Asie.
745. *Emarus staintoni* (CAMBRIDGE, 1873)
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Vingrau (Coll. JONES 1982).
Europe sud-ouest, Algérie.
746. *Thomisus onustus* WALCKENAER, 1806
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Massane (18), Prats-de-Mollo (18).
GE (64).
AN : Sant Julia de Loria 1380m (22).
N.L. : PO : Banyuls 1/- (42), Mas Forges 800m 1/1 (32), Vernet-les-Bains 1/- (33).
HU : Pena de Oroel -/1 (69), Vingrau (Coll. JONES 1982).
Région paléarctique.
747. *Runcinia lateralis* (C.L. KOCH, 1838)
Lit. : PO : Banyuls (18).
N.L. : PO : Cerdagne -/1 (3), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982), Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
Europe méridionale, Asie occidentale.
748. *Diaea dorsata* (FABRICIUS, 1777)
Lit. : PO : Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Andorra la Vella 1070m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
Région paléarctique.
749. *Misumena occidentalis* (KULCZYNSKI, 1911)
Lit. : PO : Banyuls (18).
HU (89).
Europe sud-ouest.
750. *Misumena vatia* (CLERCK, 1757)
Lit. : PO : Banyuls 494m (39), Coustouges (18), Manyagues (18), Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Andorra la Vella 1520m (22), Canillo 1600m (35), Encamp 1240m (22), Ordino 1475m (22), Sant Julia de Loria 1000m (22).
LE : Pic d'Erill 1400-1550m (39).
CA : San Miguel del Fay (64).
GE : Cerdana espanola (64).
N.L. : BP : Bruges 350m 1/- (83), 370m 1/- (90).
PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982), Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982), Mont-Louis 1600m (Coll. JONES 1982), Prats-de-Mollo -/1 (5).
Région paléarctique et néarctique.
751. *Misumenops tricuspidata* (FABRICIUS, 1775)
N.L. : PO : Cerdagne 1/- (3).
Région paléarctique.
752. *Pistius truncatus* (PALLAS, 1772)
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
Région paléarctique.
753. *Heriaeus virtus* (LATREILLE, 1819)
Lit. : ARI : Suc (28).
PO : Banyuls (98).
N.L. : PO : Canigou 750m (Coll. JONES 1982), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982).
Région paléarctique.
754. *Heriaeus oblongus* SIMON, 1918
Lit. : PO : Amélie (18), Banyuls (18), Le Tech (18).
AN : Sant Julia de Loria 1050m (22).
Europe occidentale, centrale et méridionale.
755. *Synaema globosum* (FABRICIUS, 1775)
Lit. : HG : St. Béat (28).
PO : Banyuls (22).
AN : Andorra la Vella 1520m (22), Sant Julia de Loria 1380m (22).
N.L. : PO : Canigou 2000m 1 juv. (38), Iles-sur-Tech (Coll. JONES 1982), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982).
HU : Jaca -/3 (68).
Région paléarctique.
756. *Xysticus albimanus* (SIMON, 1871)
Lit. : PO : Arles-sur-Tech (18), Banyuls (18), Cap de l'Abeille (28).
N.L. : PO : Vingrau (Coll. JONES 1982).
Région méditerranéenne.
757. *Xysticus audax* (SCHRANK, 1803)
Lit. : HP : Orédon 1880m (24).
PO : Prats-de-Mollo (18), St.-Laurent-de-Cerdans (18).
GE : Cerdana espanola (64), Martorell de la Selva (64).
AN : Andorra la Vella 2100m (22), Ordino 1450m (22).
N.L. : PO : Canigou 750m (Coll. MURPHY 1982).
Région paléarctique.

- Xysticus audax massanicus* SIMON, 1932
Lit. : PO : Massane (97).
Pyrénées.
758. *Xysticus bifasciatus* C.L.KOCH, 1837
Lit. : HG : La Plagne (42).
ARI : Beleste (97).
N.L. : PO : Prats-de-Mollo 1/- (5).
Europe, Afrique du Nord, Turkestan.
759. *Xysticus bonnetti* DENIS, 1937
Lit. : AN : La Cabanette 2740-2840m (22),
Casamanya 2550m (22).
Pyrénées, Alpes.
760. *Xysticus cor* CANESTRINI, 1873
Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97),
La Coumeille (18), St.-Sauveur
(18).
N.L. : PO : Mas Forges 750m 1/- (31).
Europe méridionale.
761. *Xysticus cristatus* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1850m (32).
HP : Marcadau-Vignemale 2337m (27),
Orédon 1900m (25).
HG : Espingo 2650-2700m (29), 1400m
(42).
ARI : Donnezan 1200m (36), Montvalier
2400m (28).
PO : Carlit 2110-2910m (26), La Coumeille
(18), Coustouges (18), Manyagues
(18), Prats-de-Mollo (18), La Preste
(18), St.-Laurent-de-Cerdans.
AN : Andorra la vella 2240-2260m (22),
Canillo 2540m (22), Encamp 2050-
2700m (22), La Massane 1500-2740m (22).
Région paléarctique.
762. *Xysticus erraticus* (BLACKWALL, 1834)
Lit. : PO : Capcir 1550m (36), Laserre (42).
AN : Canillo 1820m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m -/1 (31),
Mont-Louis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
Europe.
763. *Xysticus ferrugineus* MENGE, 1876
Lit. : HP : Lourdes (97), Orédon 1840-1950m
(24).
PO : Amélie (18), Banyuls (98),
La Massane (18, 97).
N.L. : HU : Selva de Oza -/1 (70).
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.
764. *Xysticus gallicus* SIMON, 1875
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1550m (32).
HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
HG : Espingo 1250m (29).
PO : Banyuls (39), St.-Laurent-de-
Cerdans (39).
N.L. : PO : Canigou 1250m 2/- (58), Cerdagne
1/- (3), Col de Mentet 1600m -/1
(50), Mas Forges 750m -/1 (31).
Europe centrale et méridionale, Asie Mineure.
765. *Xysticus iber* SIMON, 1875
Lit. : PO : Canigou (97), Carlit 2910m (26).
Pyrénées, Alpes.
- * 766. *Xysticus johannes-lupi* DENIS, 1952
Lit. : PO : Carlit 2910m (26).
Pyrénées.
767. *Xysticus kempelini* THORELL, 1872
Lit. : PO : St.-Laurent-de-Cerdans (18).
Région paléarctique.
- Xysticus kempelini nigriceps* SIMON, 1932
Lit. : PO : Canigou (97).
Pyrénées, Algérie.
768. *Xysticus kochi* THORELL, 1872
Lit. : HP : Lespitau 1400m (35), Orédon
1840m (24).
HG : Espingo 2540-2700m (29).
PO : Banyuls (98), Capcir 1550m
(36), La Massane (18), St.-
Laurent-de-Cerdans (18).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY
1982).
Europe, Afrique du Nord, Asie occidentale.
769. *Xysticus lanio* C.L.KOCH, 1845
Lit. : PO : Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES
1982), Mont-Louis 1600m (Coll.
JONES 1982), Prats-de-Mollo
-/1 (5).
Région paléarctique.
770. *Xysticus luctuosus* (BLACKWALL, 1836)
Lit. : HP : Barèges (97).
Région paléarctique.
771. *Xysticus ninnii* THORELL, 1872
Lit. : PO : Banyuls (97), Eyne (97), Llivia
(97), Mont-Louis (97).
Région méditerranéenne.
- * 772. *Xysticus ovatus* SIMON, 1876
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1850m (32).
HP : Barèges (97), Orédon 2380m (25),
St.-Sauveur (97).
Pyrénées.
773. *Xysticus robustus* (HAHN, 1831)
Lit. : ARI : Donnezan 1700m (36).
PO : Amélie (18), Collioure (97),
La Preste (18), Le Vernet (97).
Europe.
774. *Xysticus semicarinatus* SIMON, 1932
Lit. : PO : St.-Laurent-de-Cerdans (18).
AN : Sant Julia de Loria 1350m (22).
Europe sud-ouest.
775. *Xysticus tortuosus* SIMON, 1932
Lit. : PO : Banyuls (97).
N.L. : PO : Banyuls 1/- (42).
Europe sud-ouest, Afrique nord-ouest.
776. *Dryptila atomaria* (PANZER, 1801)
Lit. : HP : Lespitau 1400m (35), Orédon
1830m (24).
HG : 1400m (42).
ARI : Le Bose (42), Le Portel (42),
Sentein (42).
PO : Capcir 1550m (36), Pilon de
Belmatx (18), Prats-de-Mollo (18).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY
1982), Col de Mentet 1600m -/1
(50).
Europe.

777. *Oxyptila bicuspis* SIMON, 1932
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500-1550m (32).
PO : Collioure (97).
Pyrénées, Espagne.
778. *Oxyptila blackwalli* SIMON, 1875
Lit. : BP : Herboure 200m (28).
HG : Marsoulas (42).
GE : Collado de Coubet (38).
Europe.
779. *Oxyptila blitea* SIMON, 1875
Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97).
N.L. : PO : Banyuls 1/1 (42).
Région méditerranéenne.
780. *Oxyptila nigella* SIMON, 1875
Lit. : PO : Banyuls (97).
Pyrénées, Corse.
781. *Oxyptila nigrita* (THORELL, 1875)
Lit. : BP : La Rhûne (97).
Europe.
782. *Oxyptila perplexa* SIMON, 1875
Lit. : ARI (97).
PO (97).
France, Espagne, Algérie.
783. *Oxyptila praticola* (C.L.KOCH, 1837)
N.L. : PO : Canigou 750m (Coll.MURPHY 1982),
Col de Portus 1/- (49).
Région paléarctique et néarctique.
784. *Oxyptila rauda* SIMON, 1875
Lit. : ARI : Engomer (42), Le Portel (42).
PO (97).
Europe méridionale et centrale, Sibérie.
785. *Oxyptila simplex* (CAMBRIDGE, 1862)
Lit. : BP : Lescun (33).
ARI : Donnezan 1200m (36), Salau
(42).
Europe.
786. *Oxyptila trux* (BLACKWALL, 1846)
Lit. : ARI : Orle (42), Rimont (42),
Salau (42).
GE : Arbucias (64).
Europe.
787. *Oxyptila umbraculorum* SIMON, 1932
Lit. : PO : Canigou (97).
Pyrénées Orientales, Portugal.
792. *Salticus scenicus* (CLERCK, 1757)
Lit. : BP : Lescun 1550m (33).
HP : Chiroulet-Bigorre 1500m (39),
Barrage du lac d'Aubert 2150m (31),
Coume Escure 2160m (31), Marcadau-
Vignemale 1780-2793m (27), Orédon
1830-2220m (24), La Soula 1750m (35).
ARI : Etang de Lers 1390m (35).
PO : Capcir 1600m (36), Carlit 2000-2020m
(26).
AN : Andorra la vella 1810-2160m (22),
La Massana 1315m (22), Ordino 1450-
2050m (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll.MURPHY 1982),
Col de Jou 1125m (Coll.MURPHY 1982).
Région holarctique.
793. *Salticus olearii* (SCOPOLI, 1763)
Lit. : HP : Orédon 1855m (24).
Europe centrale et méridionale, Russie.
- * 794. *Menemerus schutzae* DENIS, 1961
Lit. : PO : Banyuls (42).
Pyrénées.
795. *Mithion canestrini* (NINNI, 1868)
Lit. : BP : Lac Marescot (97), St.-Jean-de-
Luz (97).
Europe méridionale, Turkestan.
796. *Heliophanus auratus* KOCH, 1848
Lit. : HG : Toulouse (97).
PO : Font Romeu (97).
GE (64).
Europe, Sibérie.
797. *Heliophanus cupreus* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 1500m (32), Lescun
(33).
HP : Pierrefitte-Nestalas (31).
HG : Espingo 1250m (29).
ARI : Donnezan 1200-1700m (36), Frey-
chinède (35), Riu de Sentenac (35).
AN : Andorra la vella 1070-1520m (22),
Encamp 1500-1660m (22), La Massana
1500-1660m (22), Sant Julia de
Loria 1080-1200m (22).
N.L. : PO : Canigou 1250m 1/- (58), Mas Forges
750m (Coll.JONES 1982), Col de Jru
1125m (Coll.MURPHY 1982), Iles-sur-
Têt (Coll.JONES 1982), Col de Jau
1500m 1/1 (30), Col de Mentet 1600m
-/2 (50), Mas Forges 750m 2/1 (31),
Prats-de-Mollo 1/- (33), Vernet-les-
Bains -/1 (33).
Europe.
798. *Heliophanus lubius* C.L.KOCH, 1834
Lit. : HP : Orédon 1850-1950m (24).
N.L. : PO : Montlouis 1600m (Coll.MURPHY 1982).
Europe, Asie.
799. *Heliophanus eruitans* SIMON, 1868
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll.MURPHY 1982).
Europe méridionale.
800. *Heliophanus flavipes* (HAHN, 1831)
Lit. : HP : Gave d'Héas 1300m (31).
PO : Capcir (36).
AN : Andorra la vella 2240-2260m (22).
N.L. : PO : Mont-Louis 1600m (Coll.JONES 1982).
Europe, Asie.

SALTICIDAE

788. *Salticus cingulatus* (PANZER, 1797)
Lit. : HP : Orédon 1855m (24).
Europe, Sibérie.
789. *Salticus conjunctus* (SIMON, 1868)
Lit. : PO : Banyuls (97), Collioure (97),
Velmanya (97).
Europe sud-ouest.
790. *Salticus major* (SIMON, 1868)
Lit. : BP (97).
Europe sud-ouest.
791. *Salticus propinquus* LUCAS, 1846
Lit. : PO : Carlit 2120m (26).
Région méditerranéenne.

801. *Heliophanus kochi* (SIMON, 1868)
Lit. : ARI : Col de Puymorens (97).
PO : Banyuls (42).
AN : Sant Julia de Loria 1000-1080m (22).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982).
Europe méridionale.
802. *Heliophanus lineiventris* SIMON, 1868
N.L. : PO : Cerdagne 1/- (3).
Europe méridionale, Asie.
803. *Heliophanus tuscorum* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Lescun (33).
HP : Coume Escure 2160m (31), Estiouère 2400m (35), Marcadau-Vignemale 1900-1960m (27), Orédon 1700-2220m (24), La Pez 1370m (35).
HG : Espingo 1400-2250m (29), La Glère 1700m (28).
PO : Carlit 2020-2120m (26).
AN : Andorra la vella 1710-2250m (22), Canillo (22), La Massana 1445m (22).
N.L. : PO : Col de Portus -/2 (46), Gorges de Caranca 800m -/1 (48).
Europe centrale et méridionale, Turkestan.
804. *Heliophanus patagiatus* THORELL, 1875
Lit. : Pyrenées (97).
N.L. : HU : Jaca -/1 (67).
Europe occidentale, centrale et méridionale, Sibérie, Turkestan.
- * 805. *Heliophanus semipullatus* DENIS, 1953
Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2070m (32).
HP : Coume Estrête 2764m (31), Marcadau-Vignemale 1920-2450m (27).
Pyrenées.
806. *Heliophanus tribulosus* SIMON, 1868
Lit. : ARI : Engral 1300m (35).
GE (64).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (42), Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982), Vingrau (Coll. JONES 1982).
Europe centrale et méridionale, Asie mineure Turkestan.
807. *Heliophanus viriatus* SIMON, 1868
(= *H. expers* (O.P. CAMBRIDGE)?)
Lit. : PO : Banyuls (42).
AN : Sant Julia de Loria 1000m (22).
Europe.
808. *Marpissa pomatia* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO (97).
Europe centrale et méridionale, Sibérie.
809. *Bianor aenescens* (SIMON, 1868)
Lit. : HP : Bagnères-de-Bigorre (97).
Région paléarctique.
Bianor aenescens tantulus (SIMON, 1868)
Lit. : PO : La Tech (97).
Europe sud-ouest.
810. *Bianor albobimaculatus* (LUCAS, 1846)
Lit. : PO : le long de la côte (97).
Région méditerranéenne.
811. *Dendryphantes nidicolens* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : CA : San Miguel del Fay (64).
GE : Amer (64).
N.L. : PO : Banyuls 1/- (42), Iles-sur-Têt (Coll. MURPHY 1982), Vingrau (Coll. JONES 1982).
Région méditerranéenne.
812. *Dendryphantes rudis* (SUNDEVALL, 1832)
Lit. : PO : Carlit 2020m (26).
AN : Encamp 1640-1860m (22), Ordino 1390-1981m (22), Sant Julia de Loria 1400m (22).
Région paléarctique.
813. *Icius hamatus* (C.L. KOCH, 1846)
Lit. : PO : Banyuls (98).
CA : San Miguel del Fay (64).
AN : Sant Julia de Loria (22).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982), Vingrau (Coll. JONES 1982).
Région méditerranéenne.
814. *Icius subinermis* SIMON, 1871
Lit. : GE : Caldas de Malavella (64), Rosas (64).
N.L. : PO : Banyuls 1/2 (40).
Région méditerranéenne.
815. *Pseudicius incurvatus* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : PO : Carlit 2020m (26).
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982).
Europe centrale et méridionale, Turkestan.
816. *Ballus depressus* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Herboure 200m (28).
AN : Andorra la vella 1070-1090m (22).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982), Vingrau (Coll. JONES 1982).
Europe, Afrique du Nord.
817. *Ballus sequipes* (SIMON, 1868)
Lit. : PO : Les Abeilles (97).
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.
818. *Neon laevis* (SIMON, 1871)
Lit. : ARI : Vallée d'Orle (42).
Europe.
819. *Neon rayi* (SIMON, 1875)
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
Europe méridionale.
820. *Neon reticulatus* (BLACKWALL, 1853)
Lit. : ARI : Suc (35).
GE : Santa Pelaya (38).
N.L. : PO : Vernet-les-Bains 1/- (36).
HU : Hoz de Binies 700m -/1 (20).
Région holarctique.
821. *Chalcoscirtus infimus* (SIMON, 1868)
Lit. : BP : Lescun (33).
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord, Syrie.
- * 822. *Euophrys alticola* DENIS, 1955
Lit. : BP : Hourquette-Badet 2909m (31).
Pyrenées.
823. *Euophrys erraticus* (WALCKENAER, 1825)
Lit. : ARI : Lacave (42).
PO : Capcir (36).
N.L. : PO : Mont-Louis 1600m (Coll. JONES 1982).
Région paléarctique.

824. *Euophrys frontalis* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Col d'Aspin (35), Orédon 1860m (24).
 HG : Espingo 1250m (29).
 ARI : Etang de Lers 1390m (35), Suc (35).
 PO : Carlit 2020-2040m (26).
 AN : Andorra la vella 1720m (22),
 Encamp 1610-1640m (22), La Massana
 1630m (22), Ordino 1450m (22).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982).
 Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982).
 HU : Selva de Oza 1200m -/1 (24).
 Région paléarctique.
825. *Euophrys herbigrada* (SIMON, 1871)
 Lit. : PO : Banyuls (42), Capcir (36).
 Midi de la France, Corse.
826. *Euophrys lanigera* (SIMON, 1871)
 Lit. : HP : Lac Bleu 2675m (31).
 HG : Arbas (33).
 ARI : Campagne-sur-Arize (42).
 PO : Carlit 1960-2430m (26).
 AN : Andorra la vella 2160m (22),
 Encamp 2200m (22).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES
 1982).
 Europe occidentale.
827. *Euophrys nigripalpis* SIMON, 1937
 Lit. : PO : Collioure (22).
 N.L. : BP : Gourette 1300m 1/- (79).
 PO : Vingrau (Coll. MURPHY 1982).
 Midi de la France, Corse.
828. *Euophrys nigratarsis* (SIMON, 1868)
 Lit. : HP : Pic Houryade 2965m (29).
 PO : Carlit 2020-2400m (26), Vernet-
 les-Bains (22).
 N.L. : PO : Col de Portus 1600m -/9 (45),
 Col de Jou 1125m (Coll. JONES 1982)
 1982).
 Pyrénées.
829. *Euophrys pétrensis* C.L. KOCH, 1937
 Lit. : BP : Eaux-Bonnes 2070-2450m (32), Lescun
 2309m (33).
 HP : Hourquette d'Allaus 2420m (35), Lacs
 de Nère 2386-2430m; Col de Nère-
 Arouge 2813m (29), Marcadau-
 Vignemale 1910-2734m (27), Orédon
 1890-2500m (24).
 HG : Espingo 1920-3100m (29), Pic des
 Spijéoles 3000m (29), 1400m (42),
 2089m (42).
 ARI : Etang d'Arbu 1600m (35).
 PO : Banyuls (98).
 AN : Andorra la vella 2260-2600m (22),
 Canillo 2380-2820m (22), Ordino
 2350-2590m (22).
 Europe.
830. *Euophrys peza* SIMON, 1937
 Lit. : PO : Axat (97).
 Pyrénées.
831. *Euophrys rufibarbis* (SIMON, 1868)
 Lit. : ARI : Donnezan 1700-2000m (36).
 Europe méridionale, Asie mineure.
832. *Euophrys rufimana* SIMON, 1876
 Lit. : PO : Le Vernet (97), La
 Preste (97).
 Pyrénées.
833. *Euophrys sedula* (SIMON, 1875)
 Lit. : PO : Lanoux (97).
 Alpes, Pyrénées.
834. *Euophrys sulphurea* (L. KOCH, 1867)
 Lit. : PO : Banyuls (97), Font-Romeu (97).
 AN : Andorra la vella 1070-1090m (22).
 N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982).
 Région méditerranéenne.
835. *Euophrys vafra* (BLACKWALL, 1867)
 Lit. : AN : Canillo 1860m (22), Encamp 1575m
 (22), Sant Julia de Loria 1080m
 (22).
 Europe méridionale, Afrique du Nord.
836. *Sitticus striatus* EMERTON, 1911
 (Syn. : *S. rivalis* SIMON, 1937;
S. lineatus DENIS, 1950)
 Lit. : HP : Orédon 2350m (24).
 Région paléarctique et néarctique.
837. *Sitticus pubescens* (FABRICIUS, 1755)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 HP : Lac d'Aubert 2150m (35), Pic du
 Lustou 2900m (35).
 Europe, Asie, Etats Unies.
838. *Sitticus zimmermanni* (SIMON, 1887)
 (Syn. : *S. semivittatus* SIMON, 1937)
 Lit. : HP : Marcadau-Vignemale 2310m (27).
 Europe centrale.
839. *Evarecha arcuata* (CLERCK, 1757)
 Lit. : HP : La Glaire 1850m (31), Orédon
 1800-1840m (24).
 ARI : Lacave (42).
 GE (64).
 AN : Ordino 1390-1475m (22).
 N.L. : BP : Bruges 370m 2/- (90).
 Région paléarctique.
840. *Evarecha flammata* (CLERCK, 1757)
 Lit. : ARI : Biert.
 N.L. : PO : Canigou 1250m -/1 (58), Col de
 Jau 1500m -/1 (30), Col de Jou
 1125m (Coll. MURPHY 1982).
 Région paléarctique.
841. *Evarecha jucunda* (LUCAS, 1846)
 N.L. : PO : Vingrau (Coll. JONES 1982)
 Région méditerranéenne.
842. *Evarecha laetabunda* (C.L. KOCH, 1848)
 N.L. : PO : Mas Forges 800m 1/3 (32).
 Région paléarctique.
843. *Philaeus chrysope* (PODA, 1761)
 Lit. : AN : Sant Julia de Loria 975m (22),
 Andorra la vella 1520m (22).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. JONES 1982).
 Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.
844. *Carrhotus bicolor* (WALCKENAER, 1802)
 Lit. : BP : Lescun (33).
 Europe centrale et méridionale, Afrique du
 Nord, Sibérie, Japon.
845. *Aelurillus v-insignitus* (CLERCK, 1757)
 Lit. : HP : Col d'Aspin (35), Lac d'Aumar 2250m
 (31), Orédon 1880m (24), La Soula
 1750m (35).
 HG : Espingo 1700-2160m (29).
 ARI : Riu de Sentenac (35).
 PO : Banyuls (42), Capcir (36), Carlit
 2200m (26).
 AN : Andorra la vella 1900-2260m (22),
 Canillo 2480-2840m (22), Encamp
 2275-2450m (22), La Massana 1580-1980
 Sant Julia de Loria 1000m (22).
 N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),

- Col de Portus 2/- (48), Vernet-les-Bains
1/- (33).
Région paléarctique.
846. *Phlegra bresnieri* (LUCAS, 1846)
Lit. : ARI : Le Portel (42).
Région méditerranéenne.
847. *Phlegra cinereofasciata* (SIMON, 1868)
Lit. : PO (97).
Midi de la France.
848. *Phlegra fasciata* (HAHN, 1826)
Lit. : HP : Orédon 1900m (24).
HG : Espingo 2625m (29).
PO : Banyuls (98), Capcir (36)
AN : Canillo 2380-2500m (22), La
Massana 1730m (22).
N.L. : PO : Col de Jou 1125m (Coll. JONES
1982), Col de Mentet 1600m -/1
(50), Lac des Bouillouses 2100-2200m
-/1 (1).
Région paléarctique, Etats Unies.
849. *Phlegra semiglabrata* (SIMON, 1868)
Lit. : BP : Aspe (97), Eaux-Bonnes 1380-
1800m (32), Lescun (33), La Rhûne
(97).
N.L. : PO : Mont-Louis 1600m (Coll. MURPHY 1982).
Pyrénées françaises, Espagne.
850. *Habrocestum pullatum* SIMON, 1876
Lit. : PO (97).
Midi de la France, Espagne.
851. *Synageles albotrimaculatus* (LUCAS, 1846)
Lit. : PO : Collioure (97).
Région ouest-méditerranéenne.
852. *Synageles venator* (LUCAS, 1836)
Lit. : HP : Orédon 1700m (24, 119).
PO : Les Abeilles (97), Capcir
(36).
N.L. : PO : Mas Forges 800m -/1 (32).
Europe centrale et méridionale, Afrique
du Nord, Turkestan.
853. *Leptorchestes mutilloides* (LUCAS, 1846)
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),
Iles-sur-Têt (Coll. JONES 1982),
Vingrau (Coll. JONES 1982).
Région méditerranéenne.
854. *Saitis barbipes* (SIMON, 1868)
Lit. : ARI : Nescus (42).
PO : La Bastide (42), Sorède, au dessus de
400m (42), Sournia (42).
GE : Calonge (38), Sañ Jorge (36).
N.L. : PO : Banyuls 1/- (40) -/1 (41), Mas Forges
750m 5/3 (59) (Coll. JONES 1982)
1900m -/1 (39) 2000m 2/- (55), Col
de Jou 1125m (Coll. MURPHY 1982),
Fillols 850m -/1 (43), Iles-sur-Têt
(Coll. JONES 1982), Mas Forges 750m
-/2 (31) 800m -/2 (32), Vernet-les-Bains
-/1 (33) -/1 (36), Vingrau (Coll. MURPHY
1982).
HU : Jaca 900m 1/- (26), Pena de Oroel 1200m
1/- (25).
Europe méridionale.
855. *Myrmarachne formicaria* (DE GEER, 1778)
Lit. : HP : Orédon 1950m (24).
ARI : Biert (42), Tanzignau-Vieux (42),
N.L. : PO : Mas Forges 750m (Coll. MURPHY 1982),
Col de Portus 1600m 1/2 (45).
Région paléarctique.
356. *Pellenes arcigerus* (WALCKENAER, 1837)
Lit. : Pyrénées espagnoles (64).
Europe méridionale.
- * 857. *Pellenes canosus* SIMON, 1937
Lit. : PO : Banyuls (97)
Pyrénées.
858. *Pellenes geniculatus* SIMON, 1868
Lit. : HG : Espingo 1250m (29).
N.L. : PO : Banyuls -/1 (40).
Région méditerranéenne.
859. *Pellenes tripunctatus* (WALCKENAER, 1802)
Lit. : BP : Lescun (33).
AN : Ordino 1500-1580m (22).
N.L. : HU : Selva de Oza 1500m -/3 (23).
Région paléarctique.
860. *Neaetha membrosa* (SIMON, 1868)
N.L. : PO : Cerdagne -/1 (3).
Région méditerranéenne.

ANNEXE 1 :

Bibliographie .

(Des ouvrages fondamentaux sur la géologie et la végétation sont aussi inclus).

1. BACELAR, A. - 1932 - Inventario das Aranhas migalomorfes da Peninsula Iberica.
Bull. Soc. Port. nat. 9 (15): 169-174.
2. BRAUN-BLANQUET, J. - 1948 - *La végétation alpine des Pyrénées Orientales*.
Instituto Espanol de Edafologia, Ecologia y Fisiologia vegetal, p.1-306.
3. BRIGNOLI, P.M. - 1970 - Su alcune *Tegenaria* d'Ispagna (Araneae, Agelenidae).
Mem. Mus. civ. Stud. nat. Verona 18, p. 307-312.
4. BRIGNOLI, P.M. - 1977 - Ragni d'Italia XXVII. Nuovi dati su Agelenidae, Argyronetidae, Hahniidae, Oxyopidae e Pisauridae cavernicoli ed epigei.
Quad. Mus. speleol. "V. Ribera" 4 (3), p. 3-117.
5. BRIGNOLI, P.M. - 1978 - Quelques notes sur les Agelenidae, Hahniidae, Oxyopidae et Pisauridae de France et d'Espagne (Araneae).
Revue suisse Zool. 85 (2), p. 265-294.
6. BRIGNOLI, P.M. - 1983 - *A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981*.
Manchester Univ. Press, p. 1-755.
7. DALMAS, M. - 1916 - Revision du genre *Orchestina* E. Simon suivié de la description de nouvelles espèces du genre *Oonops* et d'une étude sur les Dictynidae du genre *Scotolathys*.
Ann. Soc. ent. Fr. 85, p. 207-258.
8. DALMAS, M. - 1919 - Catalogue des Araignées du genre *Leptodrassus* (Gnaphosidae) d'après les matériaux de la collection E. SIMON au Muséum nationale d'Histoire naturelle.
Bull. Mus. natn. Hist. nat. 88, p. 279-340.
9. DALMAS, M. - 1918 - Synopsis des Araignées de la famille des Prodidomidae.
Ann. Soc. ent. Fr. 87, p. 279-340.
10. DALMAS, M. - 1920 - Liste d'Araignées de Boudron en Asie Mineure suivie d'une étude des espèces méditerranéennes du genre *Habrocestum*.
Ann. Mus. civ. Stor. nat. Verona 9, p. 57-69.
11. DALMAS, M. - 1921 - Monographie des Araignées de la section des *Pterotricha*. (Araneae, Gnaphosidae).
Ann. Soc. ent. Fr. 89, p. 223-238.
12. DE BLAUWE, R. - 1973 - Revision de la famille des Agelenidae (Araneae) de la région méditerranéenne.
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 49, p. 1-111.
13. DE BLAUWE, R. - 1980 - Revision de la famille des Agelenidae (Araneae) de la région méditerranéenne (2° partie).
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 52 (1), p. 1-54.
14. DE BLAUWE, R. - 1980 - Revision de la famille des Agelenidae (Araneae) habitant la région méditerranéenne (3° partie).
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 52 (11), p. 1-28.

15. DENDALETTCHE, C - 1973 - *Guide du Naturaliste dans les Pyrénées Occidentales (Moyennes Montagnes)*.
Delachaux & Niestlé, p. 1-400.
16. DENDALETTCHE, C - 1974 - *Guide du Naturaliste dans les Pyrénées Occidentales (Hautes Montagnes)*.
Delachaux & Niestlé, p. 1-429.
17. DENIS, J. - 1932 - Araignées de quelques grottes des Pyrénées Orientales.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 64 (3), p. 514-516.
18. DENIS, J. - 1933 - Chasses arachnologiques dans les Pyrénées Orientales (Région de Banyuls et de Vallespir).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 65, p. 529-591.
19. DENIS, J. - 1933 - Remarques biogéographiques à propos des Araignées de la vallée du Tech.
C.R. Séances Soc. Biogéogr. 10 (81), p. 24-26.
20. DENIS, J. - 1933 - Sur la présence de *Latrodectus tredecimguttatus* ROSSI dans les Pyrénées Occidentales.
Bull. Soc. ent. Fr. 37 (15), p. 222-223.
21. DENIS, J. - 1934 - Sur quelques Araignées des Pyrénées Orientales.
Bull. Soc. ent. Fr. 39 (5), p. 72-77.
22. DENIS, J. - 1937 - A contribution to the knowledge of the Spider Fauna of the Andorra Valleys.
Proc. zool. Soc. Lond. Ser. B 107, p. 565-581.
23. DENIS, J. - 1947 - Araignées de Vendée avec la description d'une espèce nouvelle des Pyrénées Orientales.
Rev. fr. Ent. 14 (2), p. 145-155.
24. DENIS, J. 1950 - Araignées de la région d'Orédon (Hautes Pyrénées).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 85, p. 77-113.
25. DENIS, J. - 1951 - Araignées de la région d'Orédon (note complémentaire).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 86, p. 308-312.
26. DENIS, J. - 1952 - Araignées du Massif du Carlit (Pyrénées Orientales).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 87, p. 51-73.
27. DENIS, J.-1953 - Araignées des environs du Marcadau et du Vignemalle (Hautes Pyrénées).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 88, p. 83-112.
28. DENIS, J. - 1953 - Quelques captures d'Araignées pyrénéennes.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 88, p. 259-266.
29. DENIS, J. 1954 - Araignées des environs d'Espingo (Haute Garonne).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 89, p. 137-156.
30. DENIS, J. 1954. Remarques sur les Araignées pyrénéennes.
Bull. Soc. ent. Nord Fr. 71, p. 1-2.
31. DENIS, J. - 1955 - Recherches d'Araignées dans les Pyrénées centrales (de Barèges à Gavarnie).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 90, p. 142-156.

32. DENIS, J. - 1957 - Araignées du massif calcaire des Eaux-Bonnes (Basses Pyrénées).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 92, p. 245-258.
33. DENIS, J. - 1959 - Araignées des environs de Lescun (Basses Pyrénées).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 94, p. 346-356.
34. DENIS, J. - 1959 - Quelques Araignées cavernicoles des Pyrénées.
Annls. Spéléol. 14, p. 219-231.
35. DENIS, J. - 1960 - Quelques captures d'Araignées pyrénéennes (II).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 95, p. 124-144.
36. DENIS, J. - 1961 - Araignées du Capcir et du Donezzan.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 96, p. 113-128.
37. DENIS, J. - 1962 - Description de deux Araignées nouvelles des Pyrénées Orientales.
Vie Milieu 12 (4), p. 673-675.
38. DENIS, J. - 1962 - Quelques Araignées d'Espagne centrale et septentrionale et remarques synonymiques.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 97, p. 276-292.
39. DENIS, J. - 1962 - Quelques Araignées recueillies par MM. B. LANZA et S. CARFI en France méridionale et dans les Pyrénées espagnoles.
Vie Milieu 13 (3), p. 673-675.
40. DENIS, J. - 1964 - Notes sur les Erigonides XXIX. Une forme pyrénéenne d'*Erigonella subelevata* (L. KOCH).
Bull. Soc. zool. Fr. 89 (5-6), p. 673-675.
41. DENIS, J. - 1965 - Notes sur les Erigonides XXVIII. Le genre *Trichoncus* (Araneae).
Annls Soc. ent. Fr. (N.S.) 1(2), p. 425-477.
42. DENIS, J. - 1967 - Quelques captures d'araignées pyrénéennes (III).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 103, p. 32-50.
43. DRESKO, E. - 1950 - Recherches souterraines dans les Pyrénées centrales.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 84, p. 182-196.
44. DRESKO, E. - 1951 - Sur quelques *Lepthyphantes* cavernicoles et description d'une espèce nouvelle (Araneae).
Bull. Mus. natn. Hist. Nat. Paris 23 (4), p. 363-367.
45. DRESKO, E. - 1956 - Note sur quelques Araignées cavernicoles du genre *Troglohyphantes* et description d'espèces nouvelles.
Congr. int. Spéléol. (Paris, 1953)I 3, p. 295-300.
46. DRESKO, E. - 1957 - Captures d'Araignées en Espagne (Campagne biospéléologique de 1952 et 1954). Famille des Agelenidae.
Speleon 7, p. 119-124.
47. DRESKO, E. - 1957 - Description d'une espèce nouvelle de *Tegenaria* et remarques sur *T. saeva* BLACKWALL et *atrica* C. KOCH.
Vie Milieu 8, p. 211-220.
48. DRESKO, E. - 1959 - Araignées et Opilions capturés dans quelques cavités souterraines de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France.
Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 31 (2), p. 88-94.

49. DRESCO, E. - 1959 - Araignées et Opilions capturés dans quelques cavités souterraines de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France.
Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 31 (2), p. 155-158.
50. DRESCO, E.-1962 - Araignées capturées en France dans des grottes ou des cavités souterraines.
Annls. Spéléol. 17, p. 177-193.
51. DRESCO, E. & M. HUBERT - 1968 - Araneae speluncarum Galliae.
Annls. Spéléol. 23 (2), p. 483-500.
52. DRESCO, E. & M. HUBERT - 1975 - Araneae speluncarum Galliae II.
Annls. Spéléol. 30 (3), p. 441-450.
53. DRESCO, E.-1979 - Etudes des *Leptoneta*; description de *Leptoneta fouresi*, araignée cavernicole nouvelle des Pyrénées françaises (Fam. Leptonetidae).
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 115, p. 388-392.
54. DU ROSELLE, A. - 1982 - Contribution à la faune locale. Arachnides.
Bull. Soc. linn. Nord Fr. 10, p. 340-343.
55. FAGE, L. - 1913 - Etude sur les Araignées cavernicoles II. Revision des Leptonetidae (Biospeleologica XXIX).
Arch. Zool. exp. gén. 50 (9), p. 479-576.
56. FAGE, L. - 1919 - Etudes sur les Araignées cavernicoles III. Le genre *Troglohyphantes*.
Arch. Zool. exp. gén. 58 (2), p. 55-148.
57. FAGE, L. - 1931 - Araneae, in: Biospeleologica LV.
Arch. Zool. exp. gén. 71 (2), p. 99-291.
58. FRADE, D. & A. BACELAR - 1931 - Revision des *Nemesia* de la faune ibérique et description de nouvelles espèces de ce genre.
Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 3 (2), p. 222-238.
59. FRANGANILLO BALBAO, P. - 1917 - *Las Arañas. Manuel de Aracnologia*.
Gijon, p. 1-233.
60. FRANGANILLO BALBAO, P. - 1918 - Arañas nuevas.
Bol. Soc. Ent. Esp. 1 (4), p. 58-64.
61. FRANGANILLO BALBAO, P. - 1918 - Aracnidos nuevos o hallados por primera vez en España.
Bol. Soc. Ent. Esp. 1 (6), p. 120-133.
62. FRANGANILLO BALBAO, P. - 1925 - Contribucion al estudio de la geografia aracnológica de la Peninsula Iberica.
Bol. Soc. Ent. Esp. 8 (2), p. 31-40.
63. FUHN, I.E. & F. NICULESCU-BURLACU - 1971 - Fam. Lycosidae, in: *Fauna Republicii Socialisti Romania*. (Arachnida) 5 (3), p. 1-253.
64. GALIANO, E.F. - 1910 - Datos para el conocimiento de la distribucion geografico de las Aracnidos en España.
Mem. Soc. esp. Hist. nat. (5) 6, p. 343-424.
65. HARM, M. - 1971 - Revision der Gattung *Heliophanus* C.L.KOCH (Arachnida: Araneae: Salticidae).
Senckenberg. Biol. 52 (1/2): 53-79.

66. HARM, M. - 1973 - Revision der Gattung *Sitticus* SIMON (Arachnida: Araneae: Salticidae).
Senckenberg. Biol. 54 (4/6), p. 369-403.
67. HARM, M. - 1977 - Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Phlegra* SIMON (Arachnida: Araneae: Salticidae).
Senckenberg. Biol. 58 (1/2), p. 63-77.
68. HARM, M. - 1981 - Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Marpissa* C.L. KOCH 1846 (Arachnida: Araneae: Salticidae).
Senckenberg. Biol. 61 (3/4), p. 277-291.
69. HUBERT, M. - 1964 - Localités nouvelles ou peu connues de quelques araignées cavernicoles françaises.
Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 36, p. 86-96.
70. HUBERT, M. - 1979 - *Les araignées. Généralités. Araignées de France et des pays limitrophes.*
Soc. nouv. Boubée, Paris, p. 1-227.
71. JEANNEL, R. - 1942 - *La genèse des faunes terrestres. Eléments de biogéographie.*
Paris, p. 1-513.
72. JEANNEL, R. - 1947 - Le peuplement des Pyrénées.
Rev. fr. Ent. 14 (1), p. 53-104.
73. JEZEQUEL, J.F. - 1961 - Contribution à l'étude des *Zelotes* femelles (Araneida, Labidognatha, Drassodidae "Gnaphosidae") de la faune française.
Verhandl. deutsch. zool. Ges. Saarbrücken 54, p. 519-532.
74. JEZEQUEL, J.F. - 1962- Contribution à l'étude des *Zelotes* femelles (Araneida, Labidognatha, Gnaphosidae) de la faune française (2° note).
Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 38 (6), p. 599-610.
75. KRATOCHVILL, J. - 1933 - Les espèces européennes de la famille Nesticidae DAHL.
Acta Soc. Sci. nat. Morav. 8, p. 1-59.
76. KRONESTEDT, T. - 1980 - Comparison between *Pirata tenuitarsis* SIMON, new to Sweden and England, and *P. piraticus* (CLERCK) with notes on taxonomic characters in male *Pirata* (Araneae: Lycosidae).
Ent. Scand. 11, p. 65-77.
77. KULCZYNSKI, V. - 1915 - Fragmenta arachnologia X.
Bull. Acad. Cracov 66, p. 897-942.
78. LEMOINE, M. - 1978 - *Geological atlas of alpine Europe and adjoining alpine areas.*
Elseviers sc. publ. Comp., p. 1-400.
79. LOCKET, G.N. & A.F. MILLIDGE - 1951 - *British Spiders I.*
Ray Soc., London, p. 1-310.
80. LOCKET, G.N. & A.F. MILLIDGE - 1953 - *British Spiders II.*
Ray Soc., London, p. 1-449.
81. LOCKET, G.N., A.F. MILLIDGE & P. MERRETT - 1974 - *British Spiders III.*
Ray Soc., London, p. VII + 1-315.

82. LUGETTI, G. & P. TONGIORGI - 1965 - Revisione delle specie italiane dei generi *Arctosa* C.L. KOCH e *Tricca* SIMON con note su una *Acantholycosa* delle Alpi Giulie (Araneae- Lycosidae).
Redia 49, p. 165-228.
83. LUGETTI, P. & P. TONGIORGI - 1969 - Recherche sul genere *Alopecosa*
Atti Soc. tosc. Sci. nat. 76, p.1-100.
84. MACHADO, A. De BARROS - 1939 - Trois nouvelles Araignées cavernicoles de l'Espagne.
Bull. Soc. Zool. Fr. 64, p. 60-70.
85. MACHADO, A. de BARROS - 1941 - Araignées nouvelles pour la faune portugaise II.
Publçoes Inst. Zool. Dr. Augusto Nobre 117, p. XVI + 1-60.
86. MACHADO, A. De BARROS - 1949 - Araignées nouvelles pour la faune portugaise III.
Publçoes Inst. Zool. Dr. Augusto Nobre 38, p. 1-69.
87. MILLIDGE, A.F. - 1979 - Some erigonine spiders from southern Europe.
Bull. br. arachnol.Soc. 4 (7), p. 316-328.
88. PEREZ ACOSTA, S.J. - 1923 - Los Aracnidos de Cataluña.
Treb. Inst. Catal. Hist. nat. 6, p. 9-72.
89. PEREZ de SAN ROMAN A. & F. RUIZ de ZARATE - 1947 - Catalogo de las especies del orden Araneae citadas en España despues de 1910.
Bol. Soc. esp. Hist. nat. Madrid 45, p. 417-491.
90. POLUNIN, O & B.E. SMYTHIES - 1973 - *Flowers of south-west Europe, a field guide.*
Oxford Univ. Press, p. 1-480.
91. RASMONT, R.-1954 - Arachnides du midi de la France.
Naturalistes belges 35, p. 104-108.
92. REIMOSER, E. - 1926 - Arachniden aus dem nördlichen und östlichen Spanien.
Senckenberg. Biol. 8 (2), p. 132-136.
93. ROEWER, C.F. - 1942 - *Katalog der Araneae von 1758 bis 1940, 1.*
Bremen, p. 1-1040.
94. ROEWER, C.F. - 1954 - *Katalog der Araneae, 2a-b.*
Inst.r. Sci. nat. Belg.,Bruxelles, p. 1-1751.
95. RUTTEN, M.G. - 1969 - *The geology of western Europe.*
Elsevier publ. Comp., p. 1-520.
96. SIMON, E. - 1881-1884 - *Les arachnides de France V.*
Paris, p. 1-885.
97. SIMON, E. - 1914-1937 - *Les Arachnides de France VI.*
Paris, p. 1-1298.
98. TAMBS-LYCHE, H. - 1957 - Spiders from Banyuls.
Vie Milieu 8, p. 111- 113.
99. TONGIORGI, P. - 1966 - Italian wolf spiders of the genus *Pardosa*.
(Araneae, Lycosidae).
Bull. Mus. comp. Zool. Harv. 134 (8), p. 275-334.
100. TONGIORGI, P. - 1966 - Wolf spiders of the *Pardosa monticola* group
(Araneae, Lycosidae).
Bull. Mus. comp. Zool. Harv. 134 (9), p. 335-359.
101. TURMEL, J.-M. - 1955 - *Le Pic du Midi d'Ossau, ecologie et végétation.*
Ed. Muséum Paris, p. 1-27.

102. VANDEL, A. - 1950 - Le Canigou, massif de Refuge.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 84, p. 197-201.
103. VAN HELSDINGEN, P.J. - 1969 - A reclassification of the species of *Linyphia* LATREILLE based on functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I.
Zool. Verh. Leiden 105, p. 1-303.
104. VAN HELSDINGEN, P.J. - 1970 - A reclassification of the species of LATREILLE, based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), II.
Zool. Verh. Leiden 111, p. 1-86.
105. VAN HELSDINGEN, P.J., K. THALER & C. DELTSHEV - 1977 - The *tenuis*-group of *Lepthyphantes* MENGE (Araneae, Linyphiidae).
Tijdschr. Ent. 120 (1), p. 1-54.
106. VLIJM, L. - 1971 - Some notes on the occurrence of the genus *Pardosa* (Lycosidae, Araneae) in Southern France Spain and Corsica.
Zool. Med. Leiden 45, p. 281-287.
107. WUNDERLICH, J. - 1979 - Revision der europäischen Arten der Gattung *Micaria* WESTRING 1851, mit Anmerkungen zu den übrigen paläarktischen Arten (Arachnida: Araneidae: Gnaphosidae).
Zool. Beitr. (N.F.) 25 (2), p. 233-341.
108. WUNDERLICH, J. - 1980 - Linyphiidae aus Süd-Europa und Nord-Afrika (Arachnida, Araneae).
Verh. naturw. Ver. Hamburg (N.F.) 23, p. 319-337.
109. MACHADO, A. de BARROS - 1940 - A coleção de aranhas cavernícolas do museu nacional de ciencias de Madrid.
Ciencias 7 (4), p. 1-15.
110. DENIS, J. - 1944. - Sur quelques *Theridion* appartenant à la faune de France.
Bull. Soc. ent. Fr. 49 (9), p. 111-117.
111. DUFFEY, E. & P. BRIGNOLI - 1981 - Two rare spiders from the Spanish Pyrenees.
Bull. Brit. arachnol. Soc. 5 (4), p. 155-158.
112. KRAUS, O. & H. BAUR - 1974 - Die Atypidae der West-Paläarktis. Systematik, Verbreitung und Biologie.
Abh. Verh. naturw. Ver. Hamburg (N.F.) 17, p. 85-116.
113. RIBERA, C. - 1978 - Contribution à la connaissance de la faune cavernicole du nord-est de l'Espagne: le genre *Meta*.
Symp. zool. Soc. London 42, p. 353-358.
114. RIBERA, C. - 1979 - Distribution des Nesticidae cavernicoles de la Péninsule Ibérique.
Rev. arachnol. 2 (6), p. 291-300.
115. RIBERA, C. 1977 - Contribucion al conocimiento de la fauna cavernicola de Catalogna: Fam. Agelenidae.
Comm. 6° Simp. Espeol.: Biospel. Terassa p. 155-156.
116. RIBERA, C. - 1981- Contribucion al conocimiento de la fauna cavernicola del pais vasco. Arachnida, Araneida.
Kobie Bol. Bilbao 10, p. 534-538.

117. DRESCO, E.-1959 - Sur quelques espèces du genre *Robertus* (Araneae, Theridiidae). Description de *R. alpinus* et *R. cardesensis* spp. nov. *Bull. Mus. natn. Hist. nat.* 2° Sér. 31 (3), p. 242-247.
118. HUBERT, M.-1964 - Etudes sur le genre *Porrhomma* (Araneae, Linyphiidae).
1. *P. proserpina* (E.S.), *P. pygmaeum* (BL.).
Annls. Spéléol. 24 (1), p. 225-238.
119. DENIS, J.-1939 - Sur quelques araignées françaises recueillies en 1939.
Rev. fr. Ent. 6 (2), p. 73-79.
120. RIBERA, C.-1980 - Le genre *Porrhomma* dans les cavités de la Péninsule Ibérique.
C.R. V° Coll. Arachmol. Barcelone, p. 212-216.
121. MILLIDGE, A.F.-1974 - Re-examination of the erigonine spiders "*Micrargus herbigradus*" and "*Pocadicnemis pumila*" (Araneae: Linyphiidae).
Bull. Br. arachmol. Soc. 3(6), p.145-155.
122. HIPPA, H. & I. OKSALA-1982 - Definition and revision of the *Enoplognatha ovata* (Clerck) group (Araneae: Theridiidae).
Ent. Scand. 13, p. 213-222.
123. HIPPA, H. & I. OKSALA-1983 - Cladogenesis of the *Enoplognatha ovata* group (Araneae, Theridiidae), with description of a new Mediterranean species.
Ann. ent. Fenn. 49(3), p. 71-74.

ANNEXE 2 :

Liste des localités.A. L.BAERT, 1978

1. 24-VIII-1978 Lac des Bouillouises. Cerdagne. 2100-2200m (PO,M)
2. 25-VIII-1978 Puigmale d'Err 2200-2400m (PO,M)
3. -VIII-1978 Cerdagne, environs d'Err (PO,M)

B. R.BOSMANS, 1980

4. 02-IV-1980 Entre Banyuls et la Tour de Madelon (PO)
Graminées bordant une source (M)

C. J.KEKENBOSCH 1981

5. 01-15-V-1981 Prats-de-Mollo (PO,M)

D. R.BOSMANS, 1981

6. 30-VII-1981 Olhette, 300m (BP,M)
7. 31-VII-1981 Forêt de Sare, 300m (BP)
Forêt feuillue agée, dans les mousses (M)
8. 31-VII-1981 Ascain, 50m (BP)
Plantation de peupliers du Canada (M)
9. 31-VII-1981 Grotte de Sare (BP)
Entrée de la grotte, forêt feuillue obscure
10. 27-31-VII-1981 Olhette, 100m (BP)
Chênaie agée (P)
11. 02-VIII-1981 La Rhune 900m (BP)
Prairie bordant un ruisseau (M)
12. 03-VIII-1981 Col d'Haltna, S.O. St.-Jean-Pied-de-Port, 650m (BP)
Forêt feuillue, dans les mousses et sous les feuilles
mortes (M)
13. 03-VIII-1981 Bidarray (BP)
Terrain vague (M)

14. 04-VIII-1981 Gorges de Kakouette, St.-Engrâce (BP)
Gorge obscure et humide, dans les mousses (M)
15. 04-VIII-1981 Pic d'Orhy, Larrau, 1750m (BP)
Prairie fortement broutée (M)
16. 05-VIII-1981 Pic d'Orhy, Larrau, 1900m (BP)
Zone rocheuse près du sommet, végétation clairsemée (M)
17. 05-VIII-1981 Larrau, 1050 (BP)
Forêt feuillue, sous les feuilles mortes (M)
18. 05-VIII-1981 Tardets-Sorholus (BP)
Bord de la Saison, sous les pierres (M)
19. 07-VIII-1981 Col de Pierre-St.-Martin, versant Espagnole, 1650m (HU)
Prairie alpine, sous les pierres (M)
20. 09-VIII-1981 Hoz de Binies. O. Jaca, 700m (HU)
Gorge humide, dans les mousses, sous les feuilles mortes et sous les pierres (M)
21. 09-VIII-1981 Santa Cilia de Jaca, 700m (HU)
Bord du Rio Aragon, sous les pierres (M)
22. 10-VIII-1981 San Juan de la Pena, 1200m (HU)
Pinède clairsemée (M)
23. 10-VIII-1981 Selva de Oza, 1500m (HU)
Prairie fortement broutée, sous les pierres le long d'un petit ruisseau (M)
24. 10-VIII-1981 Selva de Oza, 1200m (HU)
Forêt feuillue obscure, mousses et feuilles mortes (T)
25. 11-VIII-1981 Pena de Oroel, 1200m (HU)
Ruisseau très ombragé (M)
26. 11-VIII-1981 Grotte de Villanua (N.Jaca) (HU)
Entrée de la grotte, salles de la grotte (M)
27. 09-12-VIII-1981 Santa Cilia de Jaca 700m (HU)
Chênaie sèche (P)
28. 09-12-VIII-1981 Santa Cilia de Jaca 700m (HU)
Champs de lucerne (P)
29. 15-VIII-1981 Renteria (GU)
Terrain vague (camping) (M)

E. R.BOSMANS, D.CRAPPE, H.HOFTE & R.JOCQUE 1982

30. 05-VI-1982 Col de Jau, 1500m (PO)
Prairie humide (M)
31. 05-VI-1982 Mas Forges, Corneilla de Conflent, 750m (PO)
Terrain vague, ruine d'usine (M)
32. 06-VI-1982 Mas Forges, Corneilla de Conflent, 800m (PO)
Pelouse calcaire (M)
33. 06-VI-1982 Vernets-les-Bains, Cascade des Anglais (PO)
Forêt d'aulnes et bouleaux, dans les mousses et sous
les feuilles mortes (M)
34. 06-VI-1982 Vernets-les-Bains, Ruisseau St.-Vincent (PO)
Sur les pierres le long du ruisseau (M)
35. 06-VI-1982 Vernets-les-Bains, Cascade des Anglais (PO)
Litière de forêt feuillue (T)
36. 06-VI-1982 Vernets-les-Bains, Cascades des Anglais (PO)
Sous *Calluna*, a proximité de la cascade (M)
37. 07-VI-1982 Mont Canigou, 2200m (PO)
Sous les pierres, entre arbustes de *Rhododendron* (M)
38. 07-VI-1982 Mont Canigou, 2000m (PO)
Prairie alpine (M)
39. 07-VI-1982 Mont Canigou, 1900m (PO)
Sous de grands rochers (M)
40. 08-VI-1982 Banyuls, Vallée de la Bailleurie (PO)
Le long du ruisseau (M)
41. 08-VI-1982 Banyuls, Vallée de la Bailleurie (PO)
Forêt feuillue obscure, entrée d'une grotte (M)
42. 08-VI-1982 Banyuls, Vallée de la Bailleurie (PO)
Maquis, sous les pierres (M)
43. 09-VI-1982 Fillols, 850m (PO)
Carrière de pierres à chaux (M)
44. 09-VI-1982 Fillols, 850m (PO)
Pelouse calcaire (M)
45. 09-VI-1982 Col de Portus, N.Olette, 1600m (PO)
Pinède, sous les pierres, dans les graminées (M)
46. 09-VI-1982 Col de Portus, 1600m (PO)
Prairie alpine (M)
47. 09-VI-1982 Col de Portus, 1600m (PO)
Dans les crevisses des grands rochers bordant
le lac (M)

48. 10-VI-1982 Gorges de Caranca, 800m (PO)
Gorge humide, dans les mousses (M)
49. 10-VI-1982 Col de Portus 1200m (PO)
Aulnaie, sous les feuilles mortes (M)
50. 10-VI-1982 Col de Mentet, 1600m (PO)
Sous les pierres bordant un ruisseau (M)
51. 10-VI-1982 Col de Mentet, 1900m (PO)
Ruisseau dans une pinède, sous les pierres (M)
52. 10-VI-1982 Col de Mentet, 1900m (PO)
Prairie sèche (M)
53. 10-VI-1982 Col de Mentet, 2200m (PO)
Prairie humide bordant un ruisseau (M)
54. 8-VI-8-VII-1982 Mont Canigou, 2200m (PO)
Broussailles de *Rhododendron* (P)
55. Idem, 2000m. Prairie alpine fortement broutée (P)
56. Idem, 1750m. Pinède (*Abies alba*) obscure (P)
57. Idem, 1500m. Forêt mixte d'*Abies* et *Fagus* (P)
58. Idem, 1250m. Forêt mixte de *Betula* et *Fagus* (P)
59. 8-VI-8-VII-1982 Mas Forges, 750m (PO)
Forêt agé de *Quercus* (P)

F. R. BOSMANS 1982

60. 09-VII-1982 Cerdagne, entre Mont-Louis et Lac des Bouillouses, 1750m
Bord d'un ruisseau (M)
61. 09-VII-1982 Cerdagne, les Bouillouses, 2100m (PO)
Bord de l'Etang de Vive (M)
62. 09-VII-1982 Cerdagne, les Bouillouses, 2100m (PO)
Bord de l'Etang de Castille (M)
63. 09-VII-1982 Cerdagne, les Bouillouses, 2100m (PO)
Prairie bordant l'Etang de la Coumouse (M)
64. 10-VII-1982 Cerdagne, les Bouillouses, 2100m (PO)
Forêt de Burrés, sous les feuilles mortes (M)

G. K. DESENDER 1982

65. 11-VII-1982 Ossès, S. de Bidarray, 120m (BP)
Rives de la Saison (M)
66. 12-VII-1982 Port de Larrau, 1700m (PO)
Prairie alpine (M)
67. 13-VII-1982 Santa Cilia de Jaca, 800m (HU)
Bords du Rio Anason (M)

68. 14-VII-1982 Santa Cilia de Jaca 800m (HU)
Affluent du Rio Aragon, près de l'eau (M)
69. 15-VII-1982 Pena de Oroel, 1200m (HU)
Sur lavande (M)
70. 16-VII-1982 Selva de Oza, N.Jaca, 1500m (HU)
Prairie alpine (M)
71. 18-VII-1982 Zurizza, 1500-1800m (HU)
Prairie alpine (M)
72. 21-VII-1982 Santa Cilia de Jaca, 700m (HU)
Terrain vague (camping)
73. 21-VII-1982 Canfranc, 1050m (HU)
Forêt feuillue, sous les pierres et dans les mousses (M)

H.J.MERTENS, 1982

74. 13-VII-1982 Gourette, 1720m (BP)
Sous *Calluna*, *Vaccinium* et dans les lichens (M)
75. 14-VII-1982 Gourette, Bois Noir, 1400m (BP)
Sur les troncs d'*Abies* dans forêt mixte (A)
76. 16-VII-1982 Cabane de l'Araille, 1720m (BP)
Prairie alpine (A)
77. 18-VII-1982 Gourette, 1680m (BP)
78. Prairie alpine, dans les graminées et sous
Helianthemum (A)
79. 20-VII-1982 Gourette, Bois Noir, 1300m (BP)
Sous les pierres, dans les mousses (A).
80. 24-VII-1982 Gourette, Bois Noir, 1350m (BP)
Forêt mixte de *Fagus* et *Abies*, sur les troncs (A), sur
végétation herbeuse (F)
81. 25-VII-1982 Gourette, Cabane de Bizon, 1550m (BP)
82. Prairie alpine, sur les graminées, *Calluna* et *Thymus*
(81,A) sous les pierres (82,M)
83. 25-VII-1982 Entre Bruges et Asson, 350m (BP)
84. Prairie, entre *Plantago*, *Trifolium* et *Taraxacum* (83,A)
Bois de peupliers et sous-bois d'aulnes, sur *Hedera*,
dans les mousses (84,A)
85. 25-VII-1982 3km N. de Bruges, 370m (BP)
Végétation herbeuse avec fougères, bordant la route (F)
86. 14-22-VII-1982 Gourette, Bois Noir, 1400m (BP)
Forêt mixte d'*Abies* et *Fagus* (P)

87. 18-28-VII-1982 Gourette, Lac d'Anglas, 2150m (BP)
Prairie alpine à buissons de *Rhododendron* (P)
88. 18-29-VII-1982 Gourette, 1680m (BP)
Prairie alpine à *Calluna*, *Helianthemum* et graminées (P)
89. 19-29-VII-1982 Gourette, 4km d'Eaux-Bonnes, 900m (BP)
Végétation de *Buxus*, *Rubus* et fougères (P)
90. 25-VII-1982 à 3km Nord de Bruges, 370m (BP)
Prairie humide (F)
91. 25-VII-1982 Gourette, Cabanes de Bizon, 1550m (BP)
Prairie alpine (M)
92. 27-VII-1982 Gourette, Bois Noir (BP)
93. Prairie alpine (92 : F, 93 : A)

I. J. KEKENBOSCH, 1982

94. 1-30-IX-1982 Prats-de-Mollo et environs, 750m (PO,M)