

SEGNALAZIONI FAUNISTICHE ITALIANE

609 - *Scytodes univittata* Simon, 1882 (Araneae, Scytodidae)

BRESCOVIT A.D. & RHEIMS C.A., 2000 - On the synanthropic species of the genus *Scytodes* Latreille (Araneae, Scytodidae) of Brazil, with synonymies and records of these species in other Neotropical countries. Bulletin of the British Arachnological Society, 11: 320-330.

ÖZKÜTÜK R.S., MARUSIK Y.M., DANIŞMAN T., KUNT K.B., YAĞMUR E.A. & ELVERICI M., 2013 - Genus *Scytodes* Latreille, 1804 in Turkey (Araneae, Scytodidae). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 41: 9-20.

Prima segnalazione per l'Italia e seconda segnalazione per l'Europa di specie sinantropa ad ampia distribuzione.

REPERTI. Liguria: Quarto dei Mille (Genova), interno di abitazione privata, 10 m, 4.IX.2015, 1 ♀, C. Giusto leg., (A. Trotta det. & coll.); Lazio, Roma, Hotel Canova, 13.V.2010, 1 ♂, A. Hänggi leg. (A. Hänggi det., coll. Natural History Museum Basel); Lazio, Roma, abitazione privata, 2013, 1 ♂, 1 ♀, G. Tropea leg. (P. Pantini det., coll. Museo Scienze naturali di Bergamo).

OSSERVAZIONI. Specie per lo più sinantropa, diffusa in Centro-Sud America, Isole Canarie, Spagna, Somalia, Seychelles, Yemen, Iran, Turkmenistan, Kirghizistan, India e Myanmar.

Alessio TROTTA

via delle Ginestre 1/A2, 17024 Finale Ligure (SV), Italia. E-mail: alessiotrotta1973@libero.it

610 - *Dysgonia torrida* (Guenée, 1852) (Lepidoptera, Erebidae, Erebiniae)

GOATER B., RONKAY L., FIBIGER M., 2003 - Catocalinae & Plusiinae. Noctuidae Europaeae, 10.

Prima segnalazione per il Piemonte di specie paleotropical-subtropicale migratrice, già citata sporadicamente di poche altre regioni italiane.

REPERTI. Piemonte: Langhe, Pezzolo Valle Uzzone (CN), 321 m, 16.IX.2015, 1 ♂, E. Gallo leg. (coll. Gallo, Genova). Identificazione confermata mediante l'esame dell'apparato copulatore (Prep. gen. GAL 892).

OSSERVAZIONI. Ampiamente diffusa in tutta l'Africa e dal Vicino Oriente al Sud-Est asiatico, *D. torrida* è invece rara in Europa, dove è stata rinvenuta solo nei settori più meridionali del Continente, dalla Penisola iberica a quella balcanica, prevalentemente in località costiere. Ritenuta estranea alla nostra fauna da Berio (1991), la sua presenza in Italia, già segnalata da Zilli (1990), ha ricevuto in seguito ulteriori conferme. In base alle attuali conoscenze (Bertaccini *et al.*, 2008), le segnalazioni più numerose sono quelle relative alla Sicilia, mentre poche altre si riferiscono a Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio e Sardegna. Più recentemente la specie è stata rinvenuta anche in Umbria (Zerunian & Zilli, 2014). Per quanto invece concerne l'Italia settentrionale, il numero dei reperti è veramente esiguo: sono note infatti soltanto alcune catture effettuate in Veneto e una in Romagna. Una tale scarsità di dati per questa specie in Italia potrebbe comunque dipendere, oltre che dalla sua effettiva rarità, anche da una sottostima della sua presenza dovuta all'estrema somiglianza esterna con la congenera *D. algira* (Linnaeus, 1767), più o meno diffusa in tutta la nostra Penisola, con la quale potrebbe essere stata confusa. Sarebbe pertanto opportuno che gli esemplari conservati nelle collezioni pubbliche e private, determinati come *D. algira*, venissero attentamente controllati. A tal proposito vale la pena segnalare un recente lavoro di Mazel & Pérez-De Gregorio (2015), i quali hanno sensibilmente incrementato i dati relativi alla presenza di *D. torrida* in Francia meridionale e Spagna proprio esaminando i genitali di esemplari di collezione precedentemente identificati come *D. algira*. La cattura effettuata a Pezzolo V. U., dove è presente anche *D. algira*, è avvenuta di sera alla luce di un lampione.

BIBLIOGRAFIA

BERIO E., 1991 - Lepidoptera Noctuidae. II. Sezione Quadrifide - Fauna d'Italia, Vol. XXVII. Calderini, Bologna. 708 pp.

BERTACCINI E., FIUMI G., PARENZAN P., ZILLI A., 2008 - Lepidopteri Eteroceri d'Italia. Noctuidae, Vol. I, Calpinae-Catocalinae, Natura Edizioni Scientifiche, Bologna. 288 pp.

MAZEL R., PÉREZ-DE GREGORIO J.J., 2015 - *Dysgonia torrida* (Guenée, 1852), espèce à «décrypter» en France et en Espagne. Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, 24: 197-199.